欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八一七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百一卷目錄

醫部彙考二百八十一

渴門二

戴思恭證治要訣 消渴
樓英醫學綱目 消渴
李梴醫學入門 消渴
趙獻可醫貫 消渴論
喻昌醫門法律 消渴論　續論　律五條

張介賓景岳全書（論證　論治）

陳士鐸石室祕籙（消渴證治）

方一（五苓散　猪苓湯　文蛤散　人參石膏湯　加減地骨皮散　竹葉石膏湯　竹葉黃芪湯　黃芪湯　麥門冬飲子　門冬飲子　加減三黃丸　猪肚丸　化水丹　神仙減水法　生津甘露飲子　黃連膏　生地黃膏　順利散　參蒲丸　加味錢氏白朮散　清京飲子　甘露膏　爛金丸　天門冬丸　猪腎薺苨湯　腎瀝散　金銀箔丸　白茯苓丸　龍鳳丸　參芪湯　加減八味丸　忍冬丸　藍葉散　薺苨丸　瞿麥湯　葶藶丸　天花散　生地黃飲子　黃芪湯　梅蘇丸　苦楝湯　猪脊湯　水蛇丸　降心湯　清心蓮子飲　生津養血湯　黃芩湯　生津甘露湯　人參散　黃連猪肚丸　藕汁膏）

藝術典第三百一卷

醫部彙考二百八十一

渴門二

明戴思恭證治要訣

消渴

三消得之氣之實血之虛也久久不治氣極虛則無能爲力矣有一僧專用黃芪飲加減其論葢詳以益血爲主三消小便去多上消消心心火炎上大渴而小便多中消消脾脾氣熱燥飲食倍常皆消爲小便

下消消腎腎衰不能攝水故小便雖多而不渴然小便既多津液必竭久而未有不渴者謂之全不渴未爲的論諸消不宜用燥烈峻補之劑惟當滋養除消脾外心腎二消宜用黃芪飲吞八味丸或元菟丹或小菟絲子丸又竹龍散皆可用又六神飲亦治腎消惟脾消則加當歸去黃芪三消小便既多大便必祕宜常服四物湯潤其大腸如加人參木瓜花粉在內仍煑四皓粥食之糯米泔淅二亦可冷進

三消久而小便不臭反作甜氣在溺桶中滾湧其病爲重更有浮在溺面如豬脂濺在桶邊如柏燭淚此精不禁眞元竭矣

上消中消心脾既如此熱小便澀少而反無禁蓋燥熱在上虛冷在下陰陽不交所以成消渴

三消久之精血既虧或目無見或手足偏廢如風疾非風也此證消腎得之爲多消心之病往往因欲飲食過多及食啖辛熱引飲既多小便亦多當抑心火使之下降自然不渴宜半夏瀉心湯去乾薑加苦蔞乾葛如其數吞豬肚丸或酒連丸仍佐獨味黃連湯

多煎候冷遇渴恣飲久而自愈或用糯米煑稀粥然同顗湯梅花湯二藥於三消有渴者皆可用若因用心過度致心火炎上渴而消者宜黃芪飲加蓮肉遠志各半錢吞元菟丹仍以大麥煎湯間下靈砂丹

消脾緣脾經燥熱食物易化皆爲小便轉食轉饑然脾消又自有三曰消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲加生地黃乾葛各半錢或烏金散或止用蓮茗飲

若因色欲過度水火不交腎水下泄心火自焚以致渴者不宜備用凉心冷劑宜堅腎水以濟心火當用黃芪飲加茯苓五味各半錢吞八味丸及小菟絲子丸元菟丹鹿茸丸加減安腎丸皆可選用或靈砂丹

消腎爲病比諸消爲重古方謂之強中又謂之內消多因恣意色欲或餌金石腎氣既衰石氣獨在精水無所養故常發虛陽不交精出小便無度脣口乾焦黃芪飲吞元菟丹八味丸鹿茸丸加減腎氣丸小菟絲子丸靈砂丹皆可選用或未效黃芪飲加茯苓北五味山茱萸各四分薺籠丸茯苓丸

三消之外又有果木渴因多食果子所致宜麝香之

藥

諸病中有渴已各見本證今特舉其無病自渴與病瘥後渴者參朮散四君子湯縮脾湯或七珍散加木瓜一錢皆可選用生料五苓散加人參一錢名春澤湯以五苓散和四君子湯亦名春澤湯尤是要藥更兼作四皓粥食之

諸病久損腎虛而渴宜八味丸黃芪飲四物湯加人參木瓜各半錢或七珍飲大補湯去朮加木瓜如數

諸失血及產婦蓐中渴者名曰血渴宜求益血之劑已於本證中論之

有無病忽然大渴少頃又定只宜蜜湯及縮脾湯之類淅二泔冷進數口亦可

酒渴者乾葛調五苓散

樓英醫學綱目

消渴

上消者經所謂之膈消膈消者渴而多飲是也中消者經謂之消中消中者渴而飲食俱多或不渴而獨飲是也下消者經謂之腎消腎消者飲一溲二其溲

如膏油卽膈消消中之傳變王註謂肺臟消鑠氣無所持是也蓋肺藏氣肺無病則氣能管攝津液而津液之精微者收養筋骨血脈餘者爲溲肺病則津液無氣管攝而精微者亦隨溲下故飲一溲二而溲如膏油也筋骨血脈無津液以養之故其病漸成形瘦焦乾也然肺病本於腎虛腎虛則心寡於畏妄行凌肺而移寒與之然後肺病消故仲景治渴而小便反多用腎氣丸補腎救肺後人因名之腎消及下消也或曰經既云肺消死不治仲景復用腎氣丸治之何也曰飲一溲二者死不治若飲一未至溲二者病尚淺猶或可治故仲景腎氣丸治飲水一斗小便亦一斗之證若小便過於所飲者亦無及矣

飲食不節勞倦所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾病人自以爲渴醫以五苓散治之反加渴燥乃重竭津液以致危亡經云虛則補其母當於心與小腸中補之乃脾胃之根蔕也以甘溫之藥爲之主以苦寒爲之使以酸爲之臣佐以心苦緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛

則以酸補之次以甘溫及甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也

李梴醫學入門

消渴

經曰二陽結謂之消渴二陽者手陽明大腸主津液足陽明胃主血津血不足發爲消渴又有燥結者肺與大腸爲表裏也有氣分渴者因外感傳裏或服食僭燥熱耗津液喜飲冷水當與寒涼滲劑以清利其熱熱去則陰生而渴自止矣有血分渴者因內傷勞役精神耗散胃氣不升或病後胃虛亡津或餘熱在肺口乾作渴喜飲熱湯當與甘溫酸劑以滋益其陰陰生則燥除而渴自止矣

消者燒也如火烹燒物之理也三消上中旣平不復傳下上輕中重下危總皆肺被火邪熏蒸日久氣血凝滯故能食者未傳癰疽水自溢也不能食者未傳脹滿火自炎也皆危

熱在上焦心肺煩躁舌赤脣紅少食引飲小便數者四物湯合生脈散加天花粉地黃汁藕汁乳汁酒客

加葛汁能食者白虎加人參湯不食者錢氏白朮散清心蓮子飲又膈滿者謂之膈消門冬飲子火留肉分變爲癰腫者忍冬藤丸黃芪六一湯益元散

熱蓄中焦脾胃消穀善饑不甚渴小便赤數大便鞕者四物湯加知母黃蘗石膏黃芩滑石以降火熱甚者調胃承氣湯三黃丸初病寒中陰勝陽鬱後變爲熱中者升麻葛根湯瀉黃散濕積毒者消痞丸虛者錢氏白朮散便閉者當歸潤燥湯泄瀉者白朮芍藥湯上中二消者蘭香飲子心火乘脾者黃連豬肚丸肝侵氣衝肌熱不食食即吐蛔者烏梅丸鐵粉丸有蟲耗其津液者單苦楝湯水停於下變爲胕腫者三苓散或去桂加人參尤妙

熱伏下焦腎分精竭引水自救隨即溺下小便混濁如膏淋然腿膝枯細面黑耳焦形瘦者四物湯加知母黃蘗五味子元參人乳汁善調水火或補陰丸腎氣丸或坎離丸八味丸去附子加五味子元菟丹鹿菟丸蔓授天王補心丹威喜丸妙香散單繭絲湯或十全大補湯去桂倍地黃加知母黃蘗上熱下冷者

淸心蓮子飲

有五石過度之人眞氣既盡石氣獨留陽道興強不交精泄者謂之強中小便或如油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利飲食滋味入腹如湯澆雪隨小便而出落於溝中結如白脂肌膚日瘦者無治法

治渴初宜養肺降心久則滋腎養脾蓋本在腎標在肺腎煖則氣上升而肺潤腎冷則氣不升而肺焦故腎氣丸爲消渴良方也然心腎皆通乎脾養脾則津液自生參苓白朮散是也三消通用單文蛤爲末水調服囘津止渴單苦蔞根丸消渴神藥大忌半夏燥劑

水包天地人身臟腑亦津液眞水所包然有形者凡水也兌也坤也無形者天一所生之水氣也坎也乾也能以無形之水沃無形之火是謂既濟雜病渴多虛熱實熱者少凡渴後忌針灸令瘡口出水而死

趙獻可醫貫

消渴論

上消者舌上赤裂大渴引飲逆調論云心移熱於肺傳爲膈消者是也以白虎湯加人參治之中消者善食而瘦自汗大便鞕小便數叔和云口乾飲水多食肌虛癉成消中者是也以調胃承氣湯治之下消者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也六味丸治之古人治三焦之法詳別如此余又有一說焉人之水火得其平氣血得其養何消之有其間攝養失宜水火偏勝津液枯槁以致龍雷之火上炎熬煎既久腸胃合消五臟乾燥令人四肢瘦削精神倦怠故治消之法無分上中下先治腎爲急惟六味八味及加減八味丸隨證而服降其心火滋其腎水則渴自止矣白虎與承氣皆非所治也

總錄謂不能食而渴者末傳中滿能食而渴者必發腦疽背癰蓋不能食者脾之病脾土澆灌四旁與胃行其津液者也脾胃既虛則不能敷布其津液故渴其間縱有能食者亦是胃虛引穀自救若槩用寒凉瀉火之藥如白虎承氣之類則內熱未除中寒復生能不末傳鼓脹耶惟七味白朮散人參生脈散之類

恣意多飲復以八味地黃丸滋其化源纔是治法及能食而渴發疽者乃肥貴人膏粱之疾也數食甘美而肥多故其上氣轉溢而爲消渴不可服膏粱芳草石藥其氣慓悍能助燥熱經曰治之以蘭除陳積也亦不用寒凉及發癰疽者何也經曰膏粱之變饒生大疔此之謂也其腎消而亦有腦疽背癰者蓋腎主骨腦者腎之海背者太陽經寒水所過之地水涸海竭陰火上炎安得不發而爲癰疽也其瘡甚而不潰或赤水者是甚則或黑或紫火極似水之象乃腎水已竭不治或峻補其陰亦可救也

或曰人有服地黃湯而渴仍不止者何也曰此方士不能廢其繩墨而更其道也蓋心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其服如高消中消可以前丸緩而治之若下消已極大渴大燥須加減八味丸料一升內肉桂一兩水煎六七椀恣意冰冷飲之熟睡而渴病如失矣處方之制存乎人之通變耳

或問曰下消無水用六味地黃丸可以滋少陰之腎水矣又加附子肉桂者何蓋因命門火衰不能蒸腐

水穀水穀之氣不能熏蒸上潤乎肺如釜底無薪鍋蓋乾燥故渴至於肺亦無所稟不能四布水精並行五經其所飲之水未經火化直入膀胱正謂飲一升溺一升飲一斗溺一斗試嘗其味甘而不鹹可知矣故用附子肉桂之辛熱壯其少火竈底加薪枯籠蒸溽槁禾得雨生意維新惟明者知之昧者鮮不以爲迂也昔漢武帝病渴張仲景爲處此方至聖元關今猶可想八味丸誠良方也瘡疽痊後及將痊口渴甚者舌黃堅硬者及未患先渴或心煩躁渴小便頻數或白濁陰痿飲食少思肌膚消瘦及腿腫脚瘦口齒生瘡服之無不效

一貴人病疽疾未安而渴作一日飲水數升愚遂獻加減地黃方諸醫大笑云此藥若能止渴我輩當不復業醫矣皆用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等生津液之藥止之而渴愈甚數劑之後茫無功效不得已而用前方三日渴止因相信久服不特渴疾不作氣血亦壯飲食加倍強健過於少壯之年蓋用此藥非予敢自執鄙見實有源流薛氏家藏此方屢用

有驗故詳著之使有渴疾者信其言專志服餌取效無爲庸醫所惑庶廣前人之志久服輕身耳目聰明令人光澤蓋內北五味最爲得力獨能補腎水平補降心氣其肉桂一味不可廢若去肉桂服亦不應一男子患此欲治以前丸彼謂肉桂性熱乃易黃蘗知母等藥渴不止發背疽而歿夫肉桂腎經藥也前證乃腎經虛火炎上無制爲患用桂導引諸藥以補之及引虛火歸元故效成無已云桂尤圭也引導陽氣若執以使

若夫上消者謂心移熱於肺中消者謂內虛胃熱皆認火熱爲害故或以白虎或以承氣卒致不救總之是下焦命門火不歸元遊於肺則爲上消遊於胃卽爲中消以八味腎氣丸引火歸元使火在釜底水火旣濟氣上熏蒸肺受濕氣而渴疾愈矣

有一等渴欲引飲但飲水不過一二口卽厭少頃復渴飲亦不過若此但不若消渴者飲水無厭也此是中氣虛寒寒水泛上逼其浮遊之火於咽喉口舌之間故上焦一段欲得水救若到中焦以水見水正其

所惡也治法如面紅煩躁者理中湯送八味丸又有一等渴欲飲水但飲下少頃即吐出吐出少頃復求飲藥食毫不能下此是陰盛格陽腎經傷寒之證仲景以白通加人尿膽汁熱藥冷探之法一服即愈女人多有此證

醫門法律 臣喻昌著

消渴論

消渴之患常始於微而成於著始於胃而極於肺腎始如以水沃焦水入猶能消之既而以水投石水去而石自若至於飲一溲一飲一溲二則燥火刦其眞陰操立盡之術而勢成熇熇矣內經有其論無其治金匱有論有治矣而集書者採傷寒論厥陰經消渴之文湊入後人不能決擇斯亦不適於用也蓋傷寒傳經熱邪至厥陰而盡熱勢入深故渴而消水及熱解則不渴且不消矣豈襍證積漸爲患之比乎謹從內經擬議言之經謂凡治消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也此中消所由來也肥而不貴食弗給於鮮貴而不肥餐弗過於饔肥而且貴

醇酒厚味孰爲限量哉久之食飲釀成內熱津液乾涸求濟於水然水入尚能消之也愈消愈渴其膏粱愈無已而中消之病遂成矣夫既癉成爲中消隨其或上或下火熱熾盛之區以次傳入矣上消者胃以其熱上輸於肺而子受母累心復以其熱移之於肺而金受火刑金者生水而出高源者也飲入胃中遊溢精氣而上則肺通調水道而下今火熱入之高源之水爲暴虐所逼合外飲之水建瓴而下飲一溲二不但不能消外水且幷素蘊水精竭絕而盡輸於下較大腑之暴注暴泄尤爲甚矣故死不治也所謂由心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日而死者此之謂也故飲一溲二第一危候也至於胃以其熱由關門下傳於腎腎或以石藥耗其眞女謁竭其精者陽强於外陰不內守而小溲渾濁如膏飲一溲一腎消之證成矣經謂石藥之性悍又謂脾風傳之腎名曰疝瘕少腹寃熱而痛出白液名曰蠱明指腎消爲言醫和有云女子陽物也晦淫則生內熱惑蠱之疾此解寃熱及蠱義甚明王太僕謂消爍肌肉如蠱之蝕

日漸損削乃從消字起見淺矣淺矣夫惑女色以喪志精泄無度以至水液渾濁反從火化亦最危候經云君火之下陰精承之故陰精有餘足以上承心火則其人壽陰精不足心火直下腎中陽精所降其人夭矣故腎者胃之關也關門不開則水無輸泄而爲腫滿關門不閉則水無底止而爲消渴消渴屬腎一證金匱原文未脫其曰飲一斗溲一斗者腎氣丸主之於是蒸動精水上承君火而止其下入之陽光此正通天手眼張子和輙敢詆之旣詆仲景復詆河間謂其神芎丸以黃芩味苦入心牽牛大黃驅火氣而下以滑石引入腎經將離入坎眞得黃庭之祕顚倒其說阿私所好識趣卑陋若此又何足以入仲景之門哉何柏齋消渴論中已辨其非昌觀戴人吐下諸案中從無有治消渴一案者可見無其事卽無其理矣篇首論火一段非不有其理也然以承氣治壯火之理施之消渴又無其事矣故下消之火水中之火也下之則愈燔中消之火竭澤之火也下之則愈傷上消之火燎原之火也水從天降可滅徒攻腸胃無

益反損夫地氣上爲雲然後天氣下爲雨是故雨出地氣地氣不上天能雨乎故亟升地氣以慰三農與亟升腎氣以漑三焦皆事理之必然者耳不與昔賢一爲分辨後人亦安能行其所明哉

續論

昌著消渴論聊會內經大意謂始於胃而極於肺腎定爲中上下之三消其他膈消食㑊等證要亦中上之消耳然未得金匱之實據心恆不慊越二歲忽憶內經云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行胃氣熱熱氣熏胷中故內熱恍然悟胷中受病消息唯是胃中水穀之氣與胷中天眞灌注環周乃得清明在躬若有所勞倦傷其大氣宗氣則胷中之氣衰少胃中穀氣因而不盛穀氣不盛胷中所傷之氣愈益難復而不能以充行於是穀氣留於胃中胃中鬱而爲熱熱氣熏入胷中混合其衰少之氣變爲內熱胷胃間不覺易其沖和之舊矣求其不消不渴寧可得乎透此一關讀金匱所不了了者今始明之其云寸口脈浮而遲浮卽爲虛數卽爲勞虛則衛氣不足勞

則榮氣竭趺陽脈浮而數浮則爲氣數則消穀而大堅氣盛則溲數溲數則堅堅數相搏卽爲消渴舉寸口以候胃中之氣舉趺陽以候胃中之氣顯然有脈之可循顯然有證之可察然且難解其微焉蓋陰在內爲陽之守陽在外爲陰之固寸口脈浮陰不內守故衞外之陽浮卽爲虛也寸口脈遲陽不外固故內守之陰遲卽爲勞也總因勞傷榮衞致寸口脈虛而遲也然營者水穀之精氣衞者水穀之悍氣虛而且遲水穀之氣不上充而內鬱已見胃熱之一班矣更參以趺陽脈之浮數浮則爲氣卽內經熱氣熏胃中之變文數則消穀而大堅昌前論中旣如以水投石水去而石自若偶合胃中大堅消穀不消水之象可見火熱本足消水也水入本足救渴也胃中堅燥全不受水之浸潤轉從火熱之勢急奔膀胱故溲數溲去其內愈燥所以堅數相搏卽爲消渴直引內經味過於苦久從火化脾氣不濡胃氣乃厚之意爲消渴之源精矣微矣晉唐以後代不乏賢隨其聰敏揣摩內經各自名家卒皆不入仲景堂奧其所得於

內經者淺耳使深則能隨證比類各出脈證方治以昭成法而金匱遺編家傳戶誦之矣即如消渴證相沿謂中消者宜下之共守一語更無別商豈一下可了其局乎抑陸續徐下之乎夫胃已大堅不受膏沐輒投承氣堅者不受瑕者受之矣膀胱不受大腸受之矣豈不乘其藥勢傳爲利下鶩溏中滿腫脹之證乎總錄謂末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆爲不治之證諸家不亟亟於始傳中傳反於末傳多方療治如忍冬藍葉薺苨丸散及紫蘇葶藶中滿分消湯丸欲何爲耶金匱於小溲微覺不利蚤用文蛤一味治之方書從不錄用詎知軟堅之品非劫陰即傷陰獨此一種平善無過兼可利水誠足寶乎潔古謂能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散加葛根末傳瘡疽者火邪盛也急攻其陽無攻其陰下焦元氣得強者生失強者死末傳中滿者高消中消制之太過速過病所上熱未除中寒復起非藥之罪用藥時失其緩急之制也潔古老人可謂空谷足音矣所云無攻其陰得強者

生失强者死皆慮泉竭之微言令人聳然起敬於是追步後塵徐商一語曰三消總爲火病豈待未傳瘡疽始爲火邪勝耶然火之在陽在陰分何臟腑合何臟腑宜升宜降宜折宜伏各各不同從其性而治之使不相扞格乃爲良法若不治其火但治其熱火無所歸熱寧有止耶如腎消陰病用六味丸陽病用八味丸此亦一法若謂下消只此一法其去中消宜下之說能以寸哉

內經陰陽別論曰二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血病熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結者津血不足結而不行皆燥之爲病也

內經曰心移熱於肺傳爲膈消張子和謂膈消猶未及於肺至心移寒於肺乃爲肺消如此泥文害意非能讀內經者也豈有心移熱於肺肺傳其熱於膈猶未及肺之理必變經文爲心移熱於膈傳爲肺消乃不泥乎要識心肺同居膈上肺爲嬌臟移寒移熱總之易入但寒邪入而外束熱邪入而外傳均一肺消

而治則有分矣

劉河間論三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚六氣中已遺風火二氣矣且以消渴消中消腎分名三消豈中下二消無渴可言耶及引經言有心肺氣厥而渴有肝痹而渴有痹熱而渴有胃與大腸結熱而渴有脾痹而渴有腎熱而渴有小腸痹熱而渴愈推愈泛其不合論消渴但舉渴之一端爲燥熱亡液之驗誠不可解玉機微義深取其說發暖藥補腎之誤吾不知暖藥果爲何藥也世豈有以暖藥治消渴之理哉其意蓋在非金匱之主腎氣丸耳夫腎氣丸蒸動腎水爲治消渴之聖藥後世咸知之而何柏齋復辨之昌恐後學偶閱子和宗厚之說反滋疑眩故再陳之

癉成爲消中胃熱極深胃火極熾以故能食易饑多渴諸家咸謂宜用大承氣湯下之矣不知積漸之熱素蘊之火無取急下下之亦不去徒傷腸胃轉增其困耳故不得已而用大黃當久蒸以和其性更不可合枳實厚朴同用助其疾趨之勢潔古用本方更其

名曰順利散隱然取順利不取攻刼之意方下云治中消熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食爲效不可多利昌恐微利至不欲食胃氣已不存矣承氣非微利之法而可瀆用乎子和更其方爲加減三黃丸合大黃芩連用之不用枳朴矣方下云治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用曾不思消渴證眞氣爲熱火所耗幾見有大實之人耶然則欲除胃中火熱必如之何而後可昌謂久蒸大黃與甘草合用則急緩互調與人參合用則攻補兼施如充國之屯田金城坐困先零庶幾可圖三年之艾目前縱有乘機鬬捷之著在所不舉如之何欲取效眉睫耶昔賢過矣

律五條

凡治初得消渴病不急生津補水降火徹熱用藥無當遷延誤人醫之罪也

凡治中消病成不急救金水二臟泉之竭矣不云自中醫之罪也

凡治肺消病而以地黃丸治其血分腎消病而以白

虎湯治其氣分執一不通病不能除醫之罪也

凡消渴病少愈不急回枯澤槁聽其土燥不生致釀瘡疽無救醫之罪也

凡治消渴病用寒凉太過乃至水勝火湮猶不知反漸成腫滿不救醫之罪也

景岳全書

臣張介賓著

論證

三消之病三焦受病也上消者渴證也大渴引飲隨飲隨渴以上焦之津液枯涸古云其病在肺而不知心脾陽明之火皆能熏炙而然故又謂之膈消也

中消者中焦病也多食善饑不爲肌肉而日加削瘦其病在脾胃又謂之消中也

下消者下焦病也小便黃赤爲淋爲濁如膏如脂面黑耳焦日漸消瘦其病在腎故又名腎消也此三消者古人悉認爲火證然有實火者以邪熱有餘也有虛火者以眞陰不足也使治消證而不辨虛實則未有不誤者矣

消證有陰陽尤不可不察如多渴者曰消渴善饑者

曰消穀小便淋濁如膏者曰腎消凡此者多由於火盛則陰虛是皆陽消之證也至於陰消之義則未有知之者蓋消者消爍也亦消耗也凡陰陽血氣之屬日見消敗者皆謂之消故不可盡以火證爲言何以見之如氣厥論曰心移寒於肺爲肺消飲一溲二死不治此正以元氣之衰而金寒水冷故水不化氣而氣悉化水豈非陽虛之陰證乎又如邪氣臟腑病形篇言五臟之脈細小者皆爲消癉豈以微小之脈而爲有餘之陽證乎此內經陰消之義固已顯然言之而但人所未審耳故凡治三消證者必當察其脈氣病氣形氣但見本元虧損及假火等證必當速救根本以資化源若但知爲火而專務清理未有不陰陽俱敗者矣

論治

凡治消之法最當先辨虛實若察其脈證果爲實火致耗津液者但去其火則津液自生而消渴自止若由眞水不足則悉屬陰虛無論上中下急宜治腎必使陰氣漸充精血漸復則病必自愈若但知清火則

陰無以生而日見消敗益以困矣

上消善渴中消善饑雖曰上消屬肺中消屬胃然總之火在上中二焦者亦無非胃火上炎而然但當微爲分別以治之若二焦果由實火則皆宜白虎湯主之若渴多饑少病多在肺者宜人參白虎湯主之若水虧於下火炎於上有不得不清者宜玉女煎或加減一陰煎之類主之一云上焦渴是心火刑金所致宜降火清金以蘭香葉白葵花黃蘗知母少加升麻以引清氣上升而渴自止此說亦可酌用

中消火證以善饑而瘦古法直以調胃承氣湯及三黃丸之類主之然既已善饑其無停積可知既無停積則止宜清火豈堪攻擊非有乾結不通等證而用此二劑恐非所宜若其果屬胃火別無虛證宜三補丸玉泉散白虎湯及抽薪飲之類皆可擇而用也

下消證小便淋濁如膏如油或加煩躁耳焦此腎水虧竭之證古法用六味地黃丸之類主之固其宜矣然以余觀之則亦當辨其寒熱滑澀分而治之庶乎盡善若淋濁如膏兼熱病而有火者宜補而兼清以

加減一陰煎或補陰丸大補陰丸或六味地黃丸加黃蘗知母之類主之若下消而兼澀者宜補宜利以六味地黃丸之類主之若下焦淋濁而全無火者乃氣不攝精而然但宜壯水養氣以左歸飲大補元煎之類主之若火衰不能化氣氣虛不能化液者猶當以右歸飲右歸丸八味地黃丸之類主之若下焦無火而兼滑者當以固腎補陰爲主宜祕元煎固陰煎及苓朮菟絲丸之類主之

三消證古人以上焦屬肺中焦屬胃下焦屬腎而多從火治是固然矣然以余論之則三焦之火多有病本於腎而無不由乎命門者夫命門爲水火之腑凡水虧證固能爲消爲渴而火虧證亦能爲消爲渴者何也蓋水不濟火則火不歸原故有火遊於肺而爲上消者有火遊於胃而爲中消者有火爍陰精而爲下消者是皆眞陰不足水虧於下之消證也

又有陽不化氣則水精不布水不得火則有降無升所以直入膀胱而飲一溲二以致泉源不滋天壤枯涸者是皆眞陽不足火虧於下之消證也陰虛之消

治宜壯水固有言之者矣陽虛之消謂宜補火則人必不信不知釜底加薪氤氳徹頂槁禾得雨生意歸巔此無他皆陽氣之使然也亦生殺之微權也余因消證多虛難堪剝削若不求其斲喪之因而再伐生氣則消者愈消無從復矣故再筆於此用以告夫明者

石室祕籙　臣陳士鐸著

消渴證治

消渴之證雖分上中下而腎虛以致渴則無不同也故治消渴之法以治腎爲主不必問其上中下之消也吾有一方最奇名合治湯熟地三兩山茱萸麥冬各二兩車前子五錢元參一兩水煎服日日飲之三消自愈此方補腎而加清火之味似乎有腎火者宜之不知消證非火不成也我補水而少去火以分清水濕之氣則火從膀胱而出而眞氣仍存所以消證易平也又何必加桂附之多事哉惟久消之後下身寒冷之甚者本方加肉桂二錢亦響應異常倘不遵吾分兩妄意增減亦速之死而已安望其有生哉

消渴之證雖有上中下之分其實皆腎水之不足也倘用瀉火止渴之藥愈消其陰必至更助其火有渴甚而死者矣治法必須補腎中之水水足而火自消然而此火非實火也實火可以寒消虛火必須火引又須補腎中之火火溫於命門下熱而上熱自除矣方名引火升陰湯元參二兩肉桂北五味各二錢山茱萸四錢熟地麥冬各一兩巴戟天五錢水煎服此方大補腎中之水兼溫命門之火引火歸原而火氣自消正不必止渴而渴自除不必止消而消自愈也

大渴之證必用石膏往往有一晝夜而用至斤許者蓋熱之極藥不得不用之重此時倘守定不可多與之言必殺之矣但此等證乃萬人中一有之不可執之以治凡有胃火之人也

大渴之證用石膏以平胃火無人不知矣尚有未知其故者胃火飛騰奔越不啻如火之燎原必得傾盆之雨始能滂沛而息滅之原取其一時權宜之計故可暫時用之多能取效必不可久用久用則敗亡也尚有一方併傳以爲臨證之鑒大渴不止方用石膏

數兩知母三錢糯米一撮麥冬三兩人參亦數兩與石膏同用半夏三錢甘草一錢竹葉百片元參二兩水煎服

方一

五苓散（金匱下同）

治小便不利而渴

茯苓　猪苓去皮　白朮各七錢半　桂心半兩澤瀉一兩二錢七分

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

猪苓湯

治發熱渴欲飲水小便不利

猪苓去皮　茯苓　阿膠　滑石　澤瀉各一兩

右五味以水四升先煑四味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

文蛤散

治渴欲飲水不止

文蛤四兩

杵爲散以沸湯五合和服方寸匕

人參石膏湯（河間）

治膈消上焦煩渴不欲多食

人參五錢　石膏一兩　知母七錢　甘草四錢

每服五錢水煎食後溫服良方有黃芩杏仁

加減地骨皮散（錢氏）

治上消

知母　柴胡　甘草炙　半夏　地骨皮　黃芪

赤茯苓　白芍藥　石膏　黃芩　桔梗各等分

右爲細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

治消渴

竹葉石膏湯（仲景）

石膏一斤　麥門冬去心一升　半夏半升湯洗

粳米半升　甘草二兩炙　人參三兩　竹葉二把

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

竹葉黃芪湯

治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉　生地黃各二錢　黃芪　麥冬　當歸

川芎　黃芩炒　甘草　芍藥　人參　半夏

石膏煅各一錢

右水煎服

黃芪湯（河間　下同）

治心移寒於肺爲肺消飲少溲多當補肺平心

黃芪三兩　五味　人參　桑皮　麥冬各二兩

枸杞子　熟地黃各一兩半

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

麥門冬飲子

治心移熱於肺傳爲膈消胷滿心煩精神短少

人參　茯神　麥冬　五味子　生地黃　知母

炙甘草　葛根　苦蔞根各等分

右㕮咀每服五錢加竹葉十四片煎至七分溫服無時

門冬飲子（易老）

治老弱虛人大渴

人參　枸杞子　白茯苓　甘草各七錢半

五味子　麥門冬各半兩

右薑水煎服一本有地骨皮無枸杞子

加減三黃丸（子和）

治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

黃芩　春四兩　夏秋六兩　冬三兩

大黃　春三兩　夏一兩　秋二兩　冬四兩

黃連　春四兩　夏七兩　秋三兩　冬二兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服十丸服一月病愈

猪肚丸（三因方）

治强中消渴

黃連　粟米　苦蔞根　茯神各四兩　知母

麥門冬各二兩

右爲細末將大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚爲膏再入煉蜜搜和前藥杵勻丸如梧子大每服五十丸參湯下又方加人參熟地黃乾葛又方除知母粟米用小麥

化水丹（潔古）

治手足少陰渴飲不止或心痛者本事治飲冷水多者

川烏臍大者四枚炮去皮　蛤粉用厚者炮六兩

甘草炙一兩　牡蠣生三兩

右爲細末酢浸蒸餅爲丸每服十五丸新汲水下心痛者酢湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

神仙減水法

一名斬龍劊子手治三焦虛熱消渴飲水無度

人參　花粉　知母　黃連　苦參　麥門冬

浮萍　白扁豆　黃芪各一兩　黃丹少許

右爲細末每服一錢新汲水調下

生津甘露飲子

治消渴膈消大渴飲水無度上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脅下急痛善嚏善怒健忘臂肉腰背疼痛

石膏二錢半　桔梗三錢　人參　薑黃　升麻
甘草炙　山梔　知母酒洗各二錢　白豆蔻
白芷　連翹　甘草生　蓽澄茄各一錢　黃連
木香　柴胡各三分　藿香二分　麥冬　歸身
白葵花　蘭香各五分　黃蘗酒炒　杏仁去皮各一錢半　全蠍一枚去毒

右爲末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子曬乾杵碎如黃米大每服二錢抄在掌中以舌舐之隨津嚥下或白湯少許送亦得此治制之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下消矣一方石膏一兩二錢薑黃山梔仁各一錢

黃連膏

治證同前

黃連一斤研細爲末　牛乳汁　白蓮藕汁

生地黃汁各一斤

右將汁熬膏搓黃連末爲丸如小豆大每服二十丸少呷湯下日進十服

生地黃膏

治證同前

生地黃碗大一握　冬蜜一碗　白茯苓一兩

人參半兩

右先將地黃洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

順利散（潔古）

治中熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食爲效不可多利

厚朴　枳實各一兩　大黃煨四兩

每服五錢水煎食遠服

參蒲丸

治食㑊胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參　赤茯苓　石菖蒲　遠志　地骨皮

牛膝酒浸各一兩

右爲末煉蜜丸每服二十丸米飲下

加味錢氏白术散

治消中消穀善饑

人參　茯苓　白术各二錢　柴胡　枳殼麩炒

藿香　乾葛　五味子　木香　甘草炙各一錢

水煎食遠服

清涼飲子

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活梢　柴胡梢　黃芪根炙　生甘草梢

酒黃芩　酒知母　甘草炙各一錢　防風梢

酒生地黃　防己各五分　桃仁　杏仁各五粒

當歸六分　紅花少許　升麻梢四分　酒黃蘗

龍膽草　石膏各一錢半

右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏

一名蘭香飲子治消渴飲水極多善食而瘦自汗

大便結燥小便頻數

石膏二錢　知母一錢半　甘草生一錢炙五分
防風根一錢　人參　製半夏　蘭香　白豆蔻
連翹　桔梗　升麻各五分
右爲末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子曬乾碎如
米大每用淡薑湯調下二錢

爛金丸

治熱中消渴止後補精益血益諸虛解勞倦去骨
節間熱寧心强志安神定魄固臟腑進飲食免生
瘡瘍

大猪肚一具　黃連三兩　生薑研　白蜜各二兩
先將猪肚淨洗控乾復以葱椒酢麵等同藥以水
酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡
剉研爲細末再用水調爲膏入猪肚內以線縫定
仍入銀石器內水煮爛研如泥搜和下項藥
人參　五味子　杜仲去皮薑汁炒去絲　山藥
石斛　山茱萸去核　車前子　新蓮肉去皮心
鼈甲酢炙　熟地黃　當歸各二兩　磁石煆
白茯苓　槐角子炒　川芎各一兩　黃芪四兩

菟絲子酒浸蒸研五兩　麝香一錢別研入
沉香半兩
右爲細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗數千杵丸如梧子大每服五十九食前用溫酒或糯米飲送下一方有白朮二兩陽起石一兩

天門冬九

治初得消中食已如饑手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天門冬去心　土瓜根乾者　苦蔞根　熟地黄
知母焙　肉蓯蓉酒浸一宿切焙　鹿茸酒炙
五味　赤石脂　澤瀉各一兩半　牡蠣煅二兩
雞內金三具微炙　桑螵蛸十枚炙　苦參一兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十九用粟米飲送下食前

猪腎薺苨湯

治消中日飲水八九升者

猪腎一具　大豆一升　薺苨　石膏各三兩
人參　茯苓　知母　葛根　黄芩　磁石綿裹

苦蔞根　甘草各二兩

右㕮咀用水一斗五升先煑猪腎大豆取一斗去滓下藥煑取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑渴止勿服一方茯苓作茯神

腎瀝散

治消腎腎氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞膍胵微炙　遠志　人參　桑螵蛸炒　黃芪

澤瀉　熟地　茯苓　龍骨　桂　當歸各一兩

麥門冬　川芎各二兩　五味子　炙甘草

元參各半兩　磁石三兩研碎水淘去赤汁

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煑腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心服晚食前再服

金銀箔丸

治消腎尸乾眼澀陰痿手足煩疼小便多

金箔　銀箔各一百片俱細研　丹砂細研

苦蔞根各二兩　巴戟去心　山藥　五味子

澤瀉各一兩半　肉蓯蓉酒浸一宿切焙乾

天冬各二兩半　黃連四兩　白茯苓　生地焙
葛根各三兩　麥冬焙三兩半

右除別研藥外爲細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸不拘時粟米飲送下

白茯苓丸

治消腎因消中之後胃熱入腎消爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚無力

白茯苓　覆盆子　黃連　花粉　萆薢　人參
熟地　元參各一兩　石斛　蛇牀子各七錢半
雞膍胵三十具微炒

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前煎磁石湯送下

龍鳳丸

一名龍肝鳳髓丸治腎消

鹿茸一兩酒炙　菟絲子酒浸　山藥各二兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下濃煎人參湯亦可一方用麪糊爲丸鹽酒

鹽湯任下

參芪湯

治前證

人參　桔梗　天花粉　甘草各一兩　白芍藥

黃芪鹽湯浸炙各二兩　白茯苓　五味各一兩半

右剉每服四錢水一盞半煎八分日進四服畱滓

合煎一方有乾葛木瓜烏梅

加減八味丸

治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心煩

躁渴小便頻數白濁陰痿飲食不多肌膚漸削或

腿腫脚先瘦小

白茯苓去皮　牡丹皮　澤瀉酒潤蒸各八錢

五味子微炒一兩半　肉桂去粗皮不見火

山茱萸肉焙　熟地蒸七次焙　山藥微炒各二兩

右各研末秤和勻煉蜜丸梧子大五更初溫酒鹽

湯任下三五十丸午前晚間空腹再服此藥不惟

止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯

忍冬丸

治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草不以多少根莖花葉皆可用之一名老公鬚一名蜜啜花一名金銀花一名左纏藤水洗淨用

右用米麯酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許爲末卽以所浸酒煑糊爲丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任下一方用忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月開花五出黃白相間微香蔕帶紅外科精要又以酒煑窨服取時不犯鐵氣服至大小腸通利此藥到得力用乾者不及生者效速仍治五種飛尸酒研傅瘡亦好但留一口泄毒氣眞經效奇藥也此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸漏

藍葉散

治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

藍葉　升麻　元參　麥門冬　黃芪　葛根

沉香　赤芍藥　犀角屑　甘草生用各一兩

大黃二兩微炒

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘

時溫服

薺苨丸

治强中爲病莖長興盛不交精溢自出消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

薺苨　大豆去皮　茯神去木　磁石煅研極細

元參　石斛去根　苦蔞根　地骨皮去木

鹿茸各一兩　沉香不見火　人參各半兩

熟地黃酒蒸一兩

右爲細末用猪腎一具如食法爛煮杵爲丸如梧桐子大如難丸入少酒糊或煉蜜亦可每服七十丸空心鹽湯下

瞿麥湯

治消渴欲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗　澤瀉　滑石各半兩　防己七錢半

黃芩　大黃各二錢半　桑螵蛸炒十四枚

右㕮咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良久再服

葶藶丸

治消渴後成水病浮腫

甜葶藶隔紙炒　杏仁去皮尖及雙仁麩炒黃

苦蔞仁　漢防己各一兩

右爲細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服三十九食前赤茯苓煎湯下日三四服

天花散（直指方）

一名玉泉散治消渴之聖藥

天花粉　生乾地黃各二錢　乾葛　麥門冬

五味子各一錢　甘草五分

右剉作一貼粳米百粒煎服

生地黃飲子（簡易方）

治消渴咽乾面赤煩躁

人參　生地黃　熟地黃　黃芪蜜炙　天冬

麥冬　澤瀉　枳殼麩炒　石斛炒　甘草炙

枇杷葉去毛炒各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨臥服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則

小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱旣消其渴自止造化精深妙無踰此

黄芪湯

治諸渴疾

黄芪蜜炙　茯苓　苦蔞根　麥門冬　生地黄　五味子　炙甘草各一錢半

水二鍾煎至一鍾食遠服

梅蘇丸

治消渴膈熱煩躁生津液

白梅肉　蘇葉　烏梅肉各半兩　百藥煎三兩　麥門冬去心七錢半　訶黎勒　人參各二錢半　甘草炙一兩半

右爲細末煉黄蠟汁和爲丸如雞頭實大每服一丸不拘時含化嚥津行路解渴

苦楝湯（夷堅志）

治消渴有蟲

苦楝根皮取新白皮一握切焙　麝香少許

右水二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後

下蟲三四條類蚘蟲而色紅其渴頓止乃知消渴

一證有蟲耗其津液

猪脊湯方（三因）

治三消渴疾

猪脊骨一尺二寸　大棗四十九枚　木香一錢

新蓮肉四十九粒　炙甘草三兩

右用水五椀同煎取汁渴則飲之

水蛇丸方（聖惠）

治消渴四肢煩熱口乾心躁

活水蛇一條剝皮炙黃爲末　天花粉末煎稠

麝香一分　蝸牛五十箇水浸五日取涎

右用粟飯和丸菉豆大每服十丸薑湯下

降心湯方（得效）

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉二錢　人參　遠志　當歸　熟地黃

白茯苓　黃芪蜜炒　五味子　甘草各一錢

右作一貼棗二枚水煎服良方有川芎一錢

淸心蓮子飲方（局）

治心火上炎口乾煩渴小便赤澀

蓮子二錢　赤茯苓　人參　黃芪蜜炙各一錢

黃芩　車前子炒　麥冬　地骨皮　甘草各七分

右剉作一貼水煎服一本有柴胡

生津養血湯（醫鑑）

治上消

當歸　白芍藥　生地黃　麥冬各一錢　川芎

黃連各八分　花粉七分　知母　黃蘗並蜜炒

蓮肉　烏梅　薄荷　甘草各五分

右剉作一貼水煎服

黃芩湯（回春）

治上消

片芩　梔子　桔梗　麥門冬　當歸　生地黃

天花粉　乾葛　人參　白芍藥各一錢

右剉作一貼入烏梅一箇水煎服

生津甘露湯

一名清涼飲子治消中能食而瘦大便燥小便數

石膏　草龍膽　黃蘗各一錢　柴胡　羌活

黃芪製　酒知母　酒黃芩　炙甘草各八分

當歸身六分　升麻四分　防風　防己　生地

甘草各三分　杏仁十箇　桃仁五箇　紅花少許

右剉作一貼水二盞煎至一盞加酒一匙稍熱服

不拘時

人參散（子和）

治消中

滑石二兩　寒水石　甘草各一兩　石膏五錢

人參二錢半

右爲末每服二錢溫水調下

黃連猪肚丸

治消渴消中亦治强中證

雄猪肚一箇　黃連五兩　麥門冬　知母

苦蔞根各四兩

右四味爲末入猪肚內以線封口置甑中蒸爛於石臼中搗令爛入蜜少許作丸梧子大米飲下百丸按千金有粱米五兩苦蔞茯神各四兩知母三兩麥冬二兩猪肚黃連同

藕汁膏（丹溪）

治胃熱消中

白藕汁　生地黄汁　牛乳汁　黄連末　薑汁

天花粉末

右以各汁調二末入白蜜爲膏以匙抄取徐徐留舌上以白湯送下日三四次

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二卷目錄

醫部彙考二百八十二

渴門三

方二

人參茯苓散　加減腎氣丸　補腎地黄丸　鹿茸丸　滋陰養榮湯　活血潤燥生津飲　黄連地黄湯　元菟丹　五汁玉泉丸　荔枝膏　衞生天花丸　消渴方　又方　又方　又方　又方　黄連丸　枸杞湯　鉛丹散　神白散　葛根丸　經驗方　烏梅五味子湯　苦蔞散　茯神丸　黄芪六一湯　止渴剉散　天花粉丸　枸杞子丸　平補丸　三和甘露飲　胜胵散　肉蓯蓉丸　塡骨煎　大補元煎　左歸飲　右歸飲　右歸

（丸　加減一陰煎　抽薪飲　玉女煎　玉泉散　祕元煎　固陰煎）

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百二卷

醫部彙考二百八十二

渴門三

方二

人參茯苓散（東垣）

一名人參散治腎消尿濁如膏

滑石　寒水石各一錢半　甘草七分　赤茯苓

乾葛　黃芩　薄荷　大黃各五分　連翹三分

人參　白朮　澤瀉　桔梗　梔子　天花粉

縮砂各二分

右剉作一貼水煎服

加減腎氣丸（丹溪下同）

治腎消口燥煩渴兩腿枯瘦

熟地黃二兩　丹皮　白茯苓　山茱萸　澤瀉

五味　鹿茸　山藥各一兩　肉桂　沉香各五錢

右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下七八十丸

補腎地黃丸

治腎消能降心火益腎水止消渴明耳目

黃蘗一斤剉　生地半斤酒浸二日蒸爛研膏與黃蘗拌曬乾　白茯苓四兩　熟地　天冬　人參

甘菊各二兩　條芩酒炒　當歸　枳殼　麥冬

片芩生各一兩

右爲末水丸梧子大空心鹽酒下七八十丸

鹿茸丸

治腎虛消渴小便無度

麥門冬二兩　鹿茸　熟地黃　黃芪　五味子

雞膍胵炒　肉蓯蓉酒浸　山茱萸　破故紙炒

牛膝酒浸　人參各七錢半　白茯苓　地骨皮

元參各五錢

右爲末蜜丸梧子大空心米飲下五七十丸良方

無元參

滋陰養榮湯（入門下同）

治消渴亡津液口燥咽乾

人參　生地黃各一錢半　當歸　麥門冬

白芍藥　知母蜜水炒　黃蘗蜜水炒各一錢

甘草五分　五味子十五粒

右剉作一貼水煎服

活血潤燥生津飲

通治消渴

天門冬　麥門冬　五味子　苦蔞仁　麻子仁

當歸　熟地黃　生地黃　花粉　甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

黃連地黃湯（回春）

治三消

黃連　生地黃　花粉　五味子　當歸　人參

乾葛　白茯苓　麥門冬　甘草各一錢

右剉作一貼薑二片棗一枚竹葉十片同煎服

元菟丹（得效方）

治三消渴利神藥禁遺精止白濁延年

菟絲子十兩酒浸製　五味子七兩　白茯苓

蓮子肉　山藥各三兩

右爲末別研山藥末三兩將菟絲子所浸酒煮糊和丸梧子大空心米飲下五七十丸煉蜜丸亦佳

按良方茯苓五兩無山藥名茯菟丸治證同

五汁玉泉丸（回春）

治消渴

黃連　乾葛　花粉　知母　麥門冬　五味子

人參　生地黃　烏梅肉　蓮子去心　當歸

甘草各一兩

右爲末另取人乳汁牛乳汁甘蔗汁無則用砂糖梨汁藕汁先將各汁入蜜一斤半煎成稀膏後將各藥末和前膏熬五七沸每取五茶匙米飲調下日二三忌辛熱之物

荔枝膏（類聚下同）

止消渴生津液

乳糖二十六兩　清蜜十四兩　烏梅肉八兩

生薑五兩取汁　麝香五分

右先取清蜜烏梅肉以水一斗五升熬至半濾去滓下乳糖熬候糖鎔化乃入麝和勻每取一大匙新水調下日二三

衞生天花丸

歌曰消渴消中消腎病三焦五臟生虛熱惟有膀胱冷如氷意中飲水無休歇小便晝夜不流通骨冷皮焦心肺裂本因飲酒炙煿多酒餘色慾勞無節飲水吃食日加增肌肉精髓轉枯竭漩甜如蜜滑如油口苦咽乾舌如血三消病狀最爲危有此仙方眞妙訣

黃連童便浸三日曬乾三兩　白扁豆炒二兩

蘆薈七錢半　辰砂　白茯苓　牡蠣粉　知母

苦參　鐵粉　花粉各五錢　金銀箔各二十片

右爲末生苦蔞根汁和生蜜爲丸梧子大麥門冬

湯下三五十丸

消渴方（千金方下同）

治消渴除腸胃實熱

麥門冬　茯苓　黃連　石膏　萎蕤各八分

人參　草龍膽　黃芩各六分　升麻四分

枳實五分　生薑屑　枸杞子　苦蔞根各十分

右十三味爲末蜜丸如梧子大以茆根粟米汁服十丸日二外臺無枸杞有地骨皮若渴則與後方飲之至足大麻亦得飲方如左

茆根切一升　粟米三合

右二味以水六升煮取米熟用下前藥

又方

治前證

苦蔞根　生薑　生麥門冬汁　蘆根切各二升

茆根切三升

右五味㕮咀以水一升煮取三升分三服

又方

治前證

苦蔞根　麥門冬　鉛丹水飛各八分　茯神
甘草各六分
右五味治下篩以漿水服方寸匕日三外臺無茯
神

又方
治前證
黃芪　茯神　苦蔞根　甘草　麥門冬各三兩
乾地黃五兩
右六味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服
日進一劑服十劑佳

又方
治消渴日飲水一石者
附子二兩　葛根　苦蔞根　鉛丹各三兩
右四味爲末蜜丸如梧子大飲服十丸日三渴則
服之春夏減附子

黃連丸
治渴
黃連　生地黃各一斤

右二味絞地黃取汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾搗末蜜丸梧子大服二十丸日三食前後無拘亦可爲散以酒服方寸匕張文仲地黃作十斤

枸杞湯

治渴而利者

枸杞枝葉一斤　黃連　苦蔞根　生甘草　石膏各三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分五服日三夜二劑者多合渴卽飲之

鉛丹散

一名胡粉散治消渴止小便數兼消中

鉛丹　胡粉　甘草　澤瀉　石膏　苦蔞根　白石脂　赤石脂各五分

右八味治下篩水服方寸匕日三壯人一匕半一年病者一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之丸服亦佳每服十丸傷多令人腹痛肘後白石脂作貝母

神白散（子和下同）

一名六一散一名天水散治眞陰素被損虛多服金石等藥或嗜炙煿鹹物遂成消渴

桂府滑石六兩　甘草一兩生用

右爲細末每服三錢溫水調下或大渴欲飲冷者新汲水尤妙

葛根丸

治消渴消腎

葛根　苦蔞各三兩　附子一兩炮去皮臍

鉛丹二兩

右四味搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九日進三服治日飲石水者春夏去附子

經驗方（悟大師傳）

治飲水百盃尚猶未足小便如油或如杏色服此藥三五日小便大出毒歸於下十日永除根本

水銀四錢　錫二錢用水銀研成砂子　密陀僧

牡蠣　知母　苦參　貝母各一兩　黃丹半兩

苦蔞根半斤

右爲細末男子用不生兒猪肚一箇內藥婦人用豶猪肚一箇麻線縫之新瓦一合繩繫一兩遭米一升更用苦蔞根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內研爛就和爲丸如猪肚丸法用之

烏梅五味子湯（良方下同）

治消渴生津液

烏梅　五味子　百藥煎　巴戟去心酒洗

甘草炙各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

苦蔞散

治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱不能房事多服丹石眞氣既盡石氣孤立脣口乾焦精液自泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十行須當除熱補虛

天花粉　黃連　白扁豆　白茯苓去皮　石膏

寒水石　甘草節　人參　白术　猪苓各等分

右爲細末每服二錢不拘時用白湯調服

茯神丸

治消中煩熱消穀小便數

茯神　人參　枳殼　麥冬　生地黃　牡蠣粉

黃連各一兩　黃芪炙　蓮子肉　知母各半兩

苦蔞根七錢五分

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十丸食遠用米飲送下一方有菟絲蓯蓉石膏無枳殼牡蠣蓮肉

黃芪六一湯

治諸虛不足胷中煩悸時常消渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者宜服之

黃芪去蘆蜜炙九錢　甘草炙一錢五分

右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

止渴剉散

治消渴

枇杷葉去毛炙　生薑切片焙　乾葛各二錢

大烏梅二箇　淡竹葉　生甘草　草果各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

天花粉丸

治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉　人參等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用麥門冬煎湯送下

枸杞子丸

治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞子　白茯苓　牛膝酒浸焙乾　麥門冬　菟絲子酒浸研焙　熟地黃酒洗　黃芪蜜炙　牡蠣粉各一兩　雞內金炙一兩半　桑螵蛸花粉各七錢半　山茱萸　牡丹皮各半兩

右爲細末煉蜜和搗三五百杵爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲湯送下

平補丸

治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲滲之狀

乳香二兩　菟絲酒浸焙　山茰酒浸　益智仁　當歸各半兩　川楝子　牛膝酒浸　胡盧巴炒　杜仲薑汁炒　肉蓯蓉酒浸焙　巴戟各三兩半

右爲細末用糯米糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用棗湯或鹽湯送下

三和甘露飲

大治消渴有此證者每日須進一二服

滑石六錢　石膏四錢　知母　人參　白朮
茯苓　猪苓　澤瀉各一錢半　甘草一錢

右㕮咀作二貼每貼用水二盞煎一盞食遠溫服

膍胵散

治久渴旬日見效

雞膍胵　雞腸各五具炙乾　漏蘆炙　白龍骨
鹿角膠炙焦　白石脂各一兩　土瓜根三兩
桑螵蛸二七箇炙　牡蠣　黃連　苦參各二兩半

右爲細末每服一錢至二錢米飲調下日三夜一

肉蓯蓉丸

治消渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉酒浸切焙　地骨皮　澤瀉　五味子
巴戟　當歸切焙　韭子　熟地黃焙　牡丹皮
白龍骨　甘草炙各一兩　磁石火煆酢淬七次

赤石脂　人參各一兩半　禹餘糧煆三分

桑螵蛸炙十四枚

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十九以牛乳或白湯送下日進三服

塡骨煎

治消渴後虛乏

白茯苓　菟絲子酒浸別搗　山茱萸　麥門冬

附子炮去皮臍　石斛　牛膝酒浸焙　巴戟

當歸各二兩半　大豆炒去皮三合　石葦

桂各一兩三分　五味　遠志　人參各三兩半

肉蓯蓉二兩酒浸切焙　天門冬三兩三分

右爲細末用生地黃生苦蔞根各三斤搗絞取汁以銀石器慢火煎減半然後內藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜丸如雞子黃大米飲下日三藥末不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志

大補元煎（景岳全書下同）

治男婦氣血大壞精神失守消渴等證

人參少則用一二錢多則一二兩　山藥炒黃

杜仲各二錢　熟地少則用二三錢多則二三兩

枸杞　當歸各二三錢（泄瀉者去之）　山茱萸一錢

炙甘草一二錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝消渴者宜此

熟地二三錢或加至一二兩　山藥　枸杞

山萸各二錢（畏酸者少用）　炙甘草一錢　茯苓一錢半

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝而渴者宜此

熟地如前　山藥炒　杜仲薑製　枸杞各二錢

山茱萸肉一錢　甘草炙　肉桂各一二錢

製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸丸

治元陽不足或先天稟衰或勞神過度以致命門

火衰不能生土而爲脾胃虛寒三消乾渴等證

熟地八兩　山萸炒　當歸各三兩　枸杞微炒
山藥炒黃　鹿角膠炒珠　菟絲子酒蒸搗餅
杜仲薑汁炒各四兩　肉桂二兩漸可加至四兩
製附子自二兩漸加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼取二三丸以滾白湯送下其效尤速

加減一陰煎

凡腎水眞陰虛損而成消渴等證者宜此主之

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢
炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

抽薪飲

治渴病火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢
枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

玉女煎

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神若大便溏泄者乃非所宜

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　知母　牛膝各錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

玉泉散

又名一六甘露散治陽明內熱煩渴頭痛二便閉結瘟疫斑黃等證此益元散之變方也其功倍之

石膏六兩生用　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下此方加硃砂三錢亦妙

祕元煎

治三消乾渴等證此方專主心脾

遠志八分炒　山藥炒　芡實炒　金櫻子去核

棗仁炒搗碎各二錢　白朮炒　茯苓各錢半

炙甘草一錢　人參一二錢　五味子十四粒（畏酸去之）

水二鍾煎七分食遠服

固陰煎

治陰虛滑泄消渴淋遺等證此方專主肝腎

人參隨宜　熟地三五錢　菟絲子炒香二三錢

山藥炒二錢　山茱萸一錢半　遠志七分炒

炙甘草一二錢　五味子十四粒

水二鍾煎七分食遠溫服

單方

消渴重者取市門溺坑水服一小盞三度卽瘥勿令知之方（聖惠）

消渴引飲取瓦窑突上黑煤乾似鐵屑者半斤爲末入生薑四兩同擣絹袋盛水五升浸汁每飲五合（聖濟總錄下同）

消渴煩熱鉛白霜枯白礬等分爲末蜜丸芡子大綿裹含化嚥汁

又方鉛白霜一兩根黃硝石各一兩爲末每冷水服

一錢

消渴煩亂黃丹新汲水服一錢以蕎麥粥壓之（聖惠方）

消渴飲水用蜜陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎蠶繭鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸日增五丸至三十九止不可多服五六服後以見水惡心爲度惡心時以乾物壓之日後自定名神效丸甚奇（選奇方）

消渴煩熱水銀鉛各一兩結成砂皂莢一挺酥炙麝香一錢爲末每服半錢白湯下（聖濟總錄下同）

消渴引飲浮石舶上青黛等分麝香少許爲末溫湯服一錢

又方白浮石蛤粉蟬蛻等分爲末鯽魚膽汁七箇調服三錢神效

消渴引飲湯瓶內鹻葛根水萍焙等分每服五錢水煎服

又方湯瓶內鹻菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙爲散每服二錢水一鍾石器煎七分溫呷日一服

消渴引飲人參爲末雞子清調服一錢日三四服

一方用人參苦蔞根等分生研爲末煉蜜丸梧子大每服百丸食前麥門冬湯下日二服以愈爲度名玉壺丸忌酒麪炙煿

消渴方人參一兩粉草二兩以雄猪膽汁浸炙腦子五分爲末蜜丸芡子大每嚼一丸冷水下（鄭氏家傳）

又方人參一兩葛粉二兩爲末發時以燖猪湯一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餳以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效也（聖濟總錄）

消渴尿多用黃連末蜜丸梧子大每服三十丸白湯下（肘后方）

消渴小便滑數如油黃連五兩苦蔞根五兩爲末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌冷水猪肉（崔氏）

又方用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下（總錄）

消渴引飲白芍藥甘草等分爲末每用一錢水煎服日三服鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇朴授此方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不可以

爲易而忽之也（經驗方）

消渴累年不愈莎草根一兩白茯苓半兩爲末每陳粟米飲服三錢日二服

消渴變水服此令水從小便出紫蘇子炒蘿蔔子炒各三兩爲末每服二錢桑白皮煎湯服日三（聖濟總錄）

消渴飲水骨節煩熱用生芭蕉根搗汁時飲一二合（聖惠方）

消渴不止下元虛損牛膝五兩爲末生地黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡爲度蜜丸梧子大每空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑鬚髮津液自生（經驗方）

消渴飲水用上元板橋鮮肥麥門冬二大兩宣州黃連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布磨拭秤之搗末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中搗爛納黃連末併手和丸如梧子大食後飲下五十丸日再但服兩日其渴必定若重者即初服一百五十丸二日服一百二十丸三日一百丸四日八十丸五日五十

丸合藥要天氣晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲之勿食肉勿入鹽不過三劑平復也（海上集驗方）

消渴引飲小便不利葵根五兩水三大盞煑汁平旦服日一服（聖惠方）

消渴引飲虎杖燒過海浮石鯽魚骨丹砂等分爲末渴時以麥門冬湯服二錢日三次忌酒色魚麪鮓醬生冷（衛生家寶方）

消渴引飲甘遂麩炒半兩黃連一兩爲末蒸餅丸菉豆大每薄荷湯下二丸忌甘草（楊氏家藏方）

消渴不止菟絲子煎汁任意飲之以止爲度（事林廣記）

消渴飲水凌霄花一兩擣碎水一盞半煎一盞分二服（聖濟錄）

消渴尿多薔薇根一把水煎日服之（千金方）

消渴煩亂黃苦蔞一箇酒一盞洗去皮子取瓤煎成膏入白礬末一兩丸梧子大每米飲下十丸（聖惠方）

消渴飲水取大苦蔞根去皮寸切水浸五日逐日易

水取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之

又方以苦蔞根薄切炙取五兩水五升煑四升隨意飲之

又方用生苦蔞根三十斤以水一石煑取一斗半去查以牛脂五合煎至水盡用暖酒先食服如雞子大日三服最妙

又方用苦蔞根黃連三兩爲末蜜丸梧子大每服三十丸日二服

消渴飲水王瓜去皮每食後嚼二三兩五七度瘥（聖惠方）

消渴不止拔穀卽菝葜㕮咀半兩水二盞烏梅一箇煎一盞溫服（普濟方）

消渴飲水日至一石者浮萍搗汁服之

又方用乾浮萍苦蔞根等分爲末人乳汁爲丸梧子大空腹飲服二十丸二年者數日愈（千金方）

消渴飲水胡燕窠中草燒灰一兩牡蠣煅二兩白羊肺一具切曬爲末每新汲水調下二三錢

消渴飲水日至數斗小便赤澀秋麻子仁一升水三升煑三四沸飲汁不過五升瘥（肘后方）

消渴心煩用小麥作飯及粥食（心鏡）

三消渴病用糯穀炒出白花桑根白皮等分每用一兩水二椀煎汁飲之名梅花湯（三因方）

消渴飲水取稻穰中心燒灰每以湯浸一合澄清飲之（危氏方）

胃熱消渴以陳粟米炊飯乾食之良（心鏡）

消渴飲水薏苡仁煑粥飲并煑粥食之

腎虛消渴難治者黑大豆炒天花粉等分爲末糊丸梧子大每黑豆湯下七十丸日二服名救活丸（普濟妙方）

消渴飲水烏豆置牛膽中陰乾百日吞盡卽瘥（肘后方）

止渴急方大豆苗嫩者三五十莖塗酥炙黃爲末每服二錢人參湯下（聖濟總錄）

消渴飲水菉豆煑汁並作粥食本草云或研取汁服並佳（普濟方）

老人煩渴寒食大麥一升水七升煎五升入赤餳二合渴卽飲之（奉親書）

消渴引飲韭苗日用三五兩或炒或作羹勿入鹽醬吃至十斤卽住極效過清明勿吃（秦憲副方）

消渴飲水用出了子蘿蔔三枚淨洗切片日乾爲末每服二錢煎豬肉湯澄清調下日三服漸增至三錢生者擣汁亦可或以汁煑粥食之（圖經本草）

消渴飲水乾生薑末一兩以鯽魚膽汁和丸梧子大每服七丸米飲下（聖惠方）

消渴引飲日至一石者菠薐根雞內金等分爲末米飲服一錢日三

積熱消渴冬瓜去皮每食後吃三二兩五七度良（食療）

消渴不止冬瓜一枚削皮埋濕地中一月取出破開取清水日飲之或燒熟絞汁飲之本草云作羹作虀常食佳（聖濟總錄）

消渴骨蒸大冬瓜一枚去瓤入黃連末塡滿安甕內待瓜消盡同研丸梧子大每服三四十丸煎冬瓜湯下（經驗方）

消渴煩亂冬瓜瓤乾者一兩水煎飲（聖惠方）

消渴不止小便多用乾冬瓜子麥門冬黃連各二兩

水煎飲之冬瓜苗葉俱治消渴不拘新乾（摘元方）

消渴煩悶烏梅肉二兩微炒爲末每服二錢水二盞煎一盞去滓入豉二百粒煎至半盞溫服（濟衆方）

消渴飲水用香水梨或鵝梨或江南雪梨皆可取汁以蜜湯熬成瓶收無時以熱水或冷水調服愈乃止（普濟方）

除煩止渴生葡萄搗濾取汁以瓦器熬稠入熟蜜少許同收點湯甚良

消渴尿多能食黃蘗一斤水一升煑三五沸渴卽飲之恣飲數日卽愈本草云或作末水丸服之（獨行方）

消渴有蟲苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨下蟲如蚘而紅色其渴自止消渴有蟲人所不知（夷堅志）

消渴尿多入地三尺桑根剝取白皮炙黃黑剉以水煑濃汁隨意用之亦可入少米勿用鹽（肘后方）

消渴飲水日夜不止小便數者用田螺五升水一斗浸一夜渴卽飲之每日一換水及螺或煑食飲汁亦可（心鏡）

又方用糯米二升煮稀粥一斗冷定入田中活螺三升在內待食粥盡吐沫出乃收飲之立效（聖惠方）

上盛下虛心火炎爍腎水枯涸不能交濟而成渴證白茯苓一斤黃連一斤爲末熬天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸（經驗方）

消渴無度乾猪胞十箇剪破去蒂燒存性爲末每溫酒服一錢（聖濟總錄下同）

消渴無度雄猪膽五箇定粉一兩同煎成丸芡子大每含化二丸嚥下日二

消渴飲水臘日或端午日用黃泥固濟牡蠣煅赤研末每服一錢用活鯽魚煎湯調下只二三服愈（經驗方）

消渴飲水日夜飲水數斗者用雄猪肚一枚煮取汁入少豉渴則飲之肚亦可食煮粥亦可（心鏡）

消渴飲水因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水數尿以麝香當門子酒和作十餘丸枳椇子煎湯送下蓋麝香敗酒壞果枳椇亦敗酒也（濟生方）

消渴尿多竹瀝恣飲數日愈（肘后方）

消渴飲水小便數以黃母雞煮汁冷飲并作羹食肉

（心鏡）

消渴羸瘦用兔一隻去皮爪五臟以水一斗半煎稠去滓澄冷渴卽飲之極重者不過二兔（海上方）

除煩止渴生蒲萄搗濾取汁以瓦器熬稠入熟蜜少許同收點湯飲甚良（居家必用）

發熱口乾小便赤澀取甘蔗去皮嚼汁嚥之飲漿亦可（外臺祕要）

消渴引飲不止用蝸牛十四枚形圓而大者以水三合密器浸一宿取水飲之不過一劑愈（海上方）

又方用蝸牛焙半兩蛤粉龍膽草桑根白皮炒各二錢半研末每服一錢楮葉湯下（聖惠方）

膈消飲水雞內金洗曬乾苦蔞根炒五兩爲末糊丸梧桐子大每服三十丸溫水下日三（總錄）

消渴利水羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合白麪二兩同鹽葱炒食（正要）

消渴飲水牛鼻木二箇男用牝牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四盌煎三盌熱服甚妙（普濟方）

乳石發渴水浸雞子取淸生服甚良（總錄）

胃虛消渴羊肚爛煑空腹服之（古今錄驗）

消渴飲水用鯽魚一枚去腸留鱗以茶葉塡滿紙包煨熟食之不過數枚卽愈（心統）

消渴飲水泥鰌魚十頭陰乾去頭尾燒灰乾荷葉等分爲末每服二錢新汲水調下日三名灰焦散（普濟方）

消渴飲水小便數用野雞一隻五味煑取三升已來汁飲之肉亦可食甚效（心鏡）

消渴飲水無度以黃顙魚涎和靑蛤粉滑石末等分丸梧子大每粟米湯下三十丸名生津丸

消渴煩亂蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大盞同煑一中盞溫服（聖惠方）

消渴飲水晚蠶沙焙乾爲末每用冷水下二錢不過數服（斗門方）

消渴取靑竹葉煑汁飲（本草）

熱渴心煩取地漿一盞飲之妙

消渴及口乾煩躁渴麥門冬去心煑湯飲之

凡消渴而欲發瘡或病癰疽而後渴宜多取黃芪煑

湯服之妙（綱目）

消渴葛根五錢水煎飲之又取生者搗汁飲亦好（本草下同）

消渴取生芋水漬取汁飲之

消渴地骨皮水煎服之又取葉作飲啜之

消渴忍冬水煮取汁四時長服（丹溪）

桑枝茶療口乾如茶常服爲佳（本草下同）

止渴生津黑桑椹搗濾去滓入石器中入蜜熬膏每取二三匙沸湯點服如神

酒渴牡蠣肉和薑酢生食之俗名石花

消渴蚌蛤煮食或和薑酢生食並佳

三消取鮎魚涎搜黃連末作丸烏梅湯下五十丸渴頓減

時氣煩渴生藕取汁一盞入蜜一合分三服止渴最好（綱目）

紅柿止渴取啖之（本草下同）

消渴取獮猴桃霜後熟者常啖之又和蜜作正果尤佳（俗方）

五味子止消渴最良作飲常啜之又作丸久服生津止渴（本草下同）

粟米泔酸者止消渴甚良常取飲之泔久畱則酸

熱中消渴青粱米煑汁飲或煑粥或作飯常食佳

又方糯稻稈灰淋汁飲之甚妙

又方蓴作羹作虀常食佳

又方菘菜常食最佳或取汁飲亦可

三消渴疾退雄雞湯澄清飲之神效白者尤佳（醫鑑）

消渴白鵝煑熟取汁飲之肉亦可食（本草下同）

又方苦蔞根和雞子曝乾更搗爲末水服方寸匕日三服亦得（千金方下同）

又方取七家井索近桶口結燒作灰井華水服之不過三服必瘥

又方濃煑竹根汁飲之瘥止

又方浸豉汁任性多少飲之

消中嗜食多因外傷痹熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃乾燥飲食倍常不生肌肉大便反堅小便無度輕粉一錢爲末薑汁拌勻長流水下齒浮是效後

服猪肚丸補之（得效方）

消渴引飲無名異一兩黃連二兩爲末蒸餅丸菉豆大每服百丸以茄根蠶繭煎湯送下（聖濟總錄）

夏月渴死濃煎蓼汁一盞服（外臺祕要）

煩躁熱渴葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜漉出拌勻煑熟以糜飲和食（心鏡）

熱渴心悶溫水一盞調麪一兩飲之（聖濟總錄）

消渴飲水糯米三合水五升蜜一合研汁分服或煑汁服（楊氏產乳）

腎消飲水小便如膏油用茴香炒苦楝子各等分爲末每食前酒服二錢（保命集）

百合經月變成消渴者百合一升水一斗浸一宿取汁溫浴病人浴畢食白湯餅（小品方）

虛熱作渴桃膠如彈子大含之佳（外臺祕要）

虛勞苦渴骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三升小麥二升水二斗煮至麥熟去滓每服一升口渴卽飲（千金方）

渴利不止羊肺一具入少羊肉和鹽豉作羹食不過

三具愈（普濟方）

老人消渴鹿頭一箇去毛煑爛和五味空心食以汁嚥之（鄙事）

大熱狂渴乾陳人屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清細細與飲即解世俗謂之地清（衍義）

鍼灸

甲乙經曰消渴身熱面黃赤意舍主之

消渴嗜飲承漿主之

消渴腕骨主之

黃癉熱中善渴太衝主之

消癉善喘氣是喉咽而不能言手足青溺黃大便難嗌中腫痛唾血口中熱唾如膠太谿主之

消渴黃癉足一寒一熱舌縱煩滿然谷主之

陰氣不足熱中消穀善饑腹熱身煩狂言三里主之

醫學綱目曰消渴取玉液一分瀉見血訖取三里瀉訖如前補玉液一分再取關元瀉訖再取廉泉

又法取金津玉液承漿不已再取海泉人中廉泉腎俞氣海

又法小腸俞陽池各灸之又取廉泉出惡血方已

又法胃脘心脘亶中各灸之

又法承漿然谷勞宮曲池意舍關元各灸之

導引

保生祕要曰口乾導引法左右足心每搓三十六回按時吐納津廽卽咽六度數週爲兼後功行之

運功以舌托上齶凝懸雍穴貫一竅凉水漸提至口噀咽

又法起湧泉水或腎水皆可

又法想睺下一竅凉水以意提起口中或舌頂上齶或舌壓下齶則津液自生或升腎水或升湧泉水

消渴導引法舌托上齶從腎處想水升至背洗出心

頭復兩眼看兩脚底渾身想水洗之

醫案

衞生寶鑑曰古臺韓子玉父年踰六旬有三病消渴至冬添躁熱須裸袒以冰水噴胷腋乃快日進肉麪數盂頃時即饑如此月餘命予治療診得脈沉細而疾予以死決之子玉及弟泣跪予前曰病固危篤君盡心救治則死而無悔予答曰夫消之爲病其名不一曰食㑊曰消中曰宣疾此膏粱之所致也陽明化燥火津液不能停自汗小便數故飲一溲二胃熱則消穀善饑能食而瘦叔和云多食亦肌虛是也此病

仲景所謂春夏劇秋冬差時制故也令尊今當差時反劇乃腎水乾涸不能制心火旺於不勝之時經曰當所勝之時而不能制名曰眞強乃孤陽絶陰也且人以身爲主天令爲客此天令大寒尚不能制其熱何藥能及經曰主勝逆客勝從正以此也治療徒勞而已固辭而歸遂易醫與灸不數日卒

張安撫芸夫年四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便數多先師以生津甘露飲子治之良愈消渴多傳瘡瘍爲不救旣效亦不成瘡瘍享年七十五

丹溪心法曰徐兄年四十歲口乾小便數春末得之夏來求治診得兩手左濇右略數而不弦重取似大而稍有力左稍沉略弱而不弦然濇却多於右喜兩尺皆不甚起此由飲食味厚生熱謂之痰熱禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾用三消丸十粒左金阿魏丸各五粒以薑湯吞下一日六次又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味子麥門冬煎服一日三次與丸藥間服一二日自覺淸快小便減三之二口亦不乾止渴未除頭運眼花久坐則腰疼遂以摩腰膏

治腰疼仍以四物湯用參芪減川芎加牛膝五味子炒黃蘗麥門冬煎飲調六一散服及覺便多遂去六一散仍服丸藥而安

薛己醫按曰一男子每勞役則食少胷痞發熱頭痛吐痰作渴脈浮大此脾胃血虛病蓋脾屬土爲至陰而生血也彼不信服二陳黃連枳實厚朴病益甚服四物加知蘗麥冬更腹痛作嘔脈洪數而無倫次余先用六君加炮薑痛嘔漸愈用補中益氣全愈

大尹沈用之不時發熱日飲冰水數椀寒藥二劑熱渴益甚形體日瘦尺脈洪大而數時或無力王太僕曰熱之不熱責其無火寒之不寒責其無水又云倏熱往來是無火也時作時止是無水也法當補腎用加減八味丸不~~月~~而愈

州同韓用之年四十有六時仲夏色慾過度煩熱作渴飲水不絕小便淋瀝大便祕結唾痰如湧面目俱赤滿舌生刺兩脣燥裂遍身發熱或時如芒刺而無定處兩足心如烙以冰折之作痛脈洪而無倫此腎陰虛陽無所附而發於外非火也蓋大熱而甚寒之

不寒是無水也當峻補其陰遂以加減八味丸料一斤內肉桂一兩以水頓煎六椀冰冷與飲半晌已用大半睡覺而食溫粥一椀復睡至晚乃以前藥溫飲一椀乃睡至曉食熱粥二椀諸證悉退翌日畏寒足冷至膝諸證仍至或以爲傷寒余曰非也大寒而甚熱之不熱是無火也陽氣亦虛矣急以八味丸一劑服之稍緩四劑諸證復退大便至十三日不通以猪膽導之諸證復作急用十全大補湯數劑方應

醫學綱目曰壬戌年一卒病渴日飲水三斗不食者三月心中煩悶時已十月予謂心中有伏熱與火府丹數服每服五十丸溫水下越二日來謝云當日三服渴止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴效信乎藥要變通用之

本草綱目曰一人病渴逮死有人敎以糯稻稈斬去穗及根取中心淨器中燒作灰每服一合湯水一椀沃浸良久澄去滓取清頓飲之卽取效如神

景岳全書曰省中周公者山左人也年逾四旬因案牘積勞致成羸疾神困食減時多恐懼自冬春達夏

通宵不寐者半年餘矣而上焦無渴不嗜湯水或有少飲則沃而不行然每夜必去溺二三升莫知其所從來且半皆如膏尫羸至極自分必死予診之脉猶帶緩肉亦未脫知其胃氣尚存乃用歸脾湯去木香及大補元煎之屬一以養陽一以養陰出入間用至三百餘劑計人參二十斤乃得全愈此神消於上精消於下之證也可見消有陰陽不得盡言爲火也

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

一八一

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三卷目錄

醫部彙考二百八十三

哮喘門一

黃帝素問 臟氣法時論 調經論 陰陽別論 平人氣象論 大奇論 脈解篇 厥論 示從容論 生氣通天論 陰陽應象大論 脈要精微論 玉機眞臟論 經脈別論 太陰陽明篇 陽明脈解篇 逆調論 舉痛論 痹論 刺禁論 水熱穴論 氣交變大論 至眞要大論 五常政大論 六元正紀大論

靈樞經 五亂篇 經脈篇 熱病篇 脹論 五閱五使篇 本臟篇

張機金匱要略（喘病證治）
華佗中藏經（脈證定生死）
王叔和脈訣（喘脈）
嚴用和濟生方（總論）
劉完素六書（喘因）
李杲十書（喘論）
朱震亨心法（喘病證治　哮病治法）
戴思恭證治要訣（哮喘證治）
樓英醫學綱目（哮喘證治）
王綸明醫雜著（喘脹證治）
李梴醫學入門（辯喘治法　傷寒喘促）
李中梓醫宗必讀（喘病證治）
趙獻可醫貫（喘論）
張介賓景岳全書（論證　論治　哮證治）
陳士鐸石室祕籙（喘病治法）

藝術典第三百三卷

醫部彙考二百八十三

哮喘門一

黃帝素問

臟氣法時論

肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出腎病者腹大脛腫喘欬身重

註　肺主周身之氣腎爲生氣之原也

調經論

氣有餘則喘欬上氣

註　肺主氣而司呼吸故有餘則喘欬上逆

陰陽別論

陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴

註　魄汗肺之汗也經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛皮毛汗出而精血仍藏於陰如魄汗未藏是奪汗而傷其精血矣肺臟之陰液外洩則四臟之陰並逆而起上熏於肺使人喘急喉鳴

二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息賁者死不治

註　二陽陽明胃也病本於精血兩虛風熱交熾津液愈竭火鑠金而傳爲喘急息肩死不治也

平人氣象論

頸脈動喘疾欬曰水

註　此視而知其病也

大奇論

肺之雍喘而兩胠滿

註　肺主呼吸故喘而胠滿

脉解篇

陽明所謂上喘而爲水者陰氣下而復上上則邪客於臟腑間故爲水也

註　陰氣下而復上者謂冬至一陽初生陰氣下降至五月而陰氣復上也陰氣下歸於水臟至陰氣從上而漸盛則水邪隨氣而升上客於臟腑之間故喘而爲水也

少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

註　少陰寒水在下君火之氣在上上下水火不交則諸陽之氣上浮而無所依從矣是以陽熱上逆而爲嘔欬氣喘之病

厥論

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

註　陽明氣厥則喘上逆則欬也

示從容論

喘欬者是水氣幷陽明也

註　喘欬者是下焦之水氣并於陽明之經也

生氣通天論

因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散

註　邪熱甚則迫及所生心主脈故心煩肺乃心之蓋故煩則喘喝也如不煩而靜此邪仍在氣分而氣傷神氣虛故多言天之陽邪傷人陽氣兩陽相搏故體若燔炙陽熱之邪得吾身之陰液而解故汗出乃散也

味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡

註　味過於甘則土氣實矣土實則心氣不能傳之於子故喘滿也腎主水其色黑土亢則傷腎故色黑而腎氣不平

陰陽應象大論

陽勝則身熱腠理閉喘麤爲之俯仰汗不出而熱齒乾以煩寃腹滿死能冬不能夏

註　陽勝乃火熱用事故身熱熱在表則腠理閉熱在裏則喘麤陰勝在腹則爲之俯陽勝在背則爲之仰陽勝於周身則汗不出而熱也此陽熱偏勝

之死證故能苟延於冬而不能幸免於夏

脉要精微論

肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脅下令人喘逆

註 肝脉盛而色不見者血蓄於下也當病墜傷或爲手搏所傷因血凝脅下則經氣上逆而爲喘也

玉機眞藏論

秋脉不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

註 經曰氣并於肺則憂其不及則令人氣虛而喘呼吸少氣而欬虛氣上逆則血隨而上行虛氣下逆則聞呻吟之病音

大骨枯槀大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六月死眞藏脉見乃予之期日

註 陽明氣厥故喘息不便其氣動形者心病而欲傳之於肺肺主氣故氣盛而呼吸動形也眞藏脉見堅而搏如循薏苡子累累然予之期日者當死於壬癸日之中夜也

大骨枯槀大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項期一月死

註　內痛者肺受其傷肺之俞在肩背故痛引肩項也眞臟脉見如循刀刃責責然如按琴瑟弦于之期日當死於庚辛日之薄暮也

大骨枯槀大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項身熱脫肉破䐃眞臟脉見十日之內死

註　眞臟脉見大而虛如羽毛中人膚病傳於心故期以十日之內死蓋心不受邪故死之速也

經脉別論

夜行則喘出於腎淫氣病肺

註　腎屬亥子而氣主閉藏夜行則腎氣外泄故喘出於腎腎爲本肺爲末腎氣上逆故淫傷於肺也

有所墮恐喘出於肝淫氣害脾

註　墮則傷筋筋卽爲肝故喘出於肝木勝土故淫氣害脾

有所驚恐喘出於肺淫氣傷心

註　驚則氣亂故喘出肺肺者心之蓋故淫氣傷心

度水跌仆喘出於腎與骨

註 跌則傷骨骨卽爲腎故喘出焉

太陰陽明篇

犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六腑入六腑則身熱不時臥上爲喘呼

註 陽明氣厥則上爲喘呼

陽明脉解篇

陽明厥則喘而惋惋則惡人

註 陽明之熱上逆於少陰陰陽相薄則恐而惡人

厥逆連臟則死連經則生

註 如熱邪厥逆於上干於心肺之經而爲喘惋者生干於心肺之臟則死矣

逆調論

夫不得臥臥則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也

註 胃之水液從關而下入於腎者順也如陽明逆不得從其道而下入於腎則腎之水氣反循津液之道路而上乘於胃是以胃不和而臥不安也故

曰腎者水藏主藏津液又主臥與喘也

舉痛論

勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣

註勞則腎氣傷而喘息於內陽氣張而汗出於外外內皆越故氣耗散矣

痹論

肺痺者煩滿喘而嘔

註肺痺則煩喘而嘔

心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘

註心主脈故痺閉而令脈不通邪薄心下鼓動而上干心臟則煩煩則心下鼓也肺者心之蓋而心脈上通於肺故逆氣暴上則喘

腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄

註腸痺兼大小腸而言小腸爲心之腑而主小便邪痺干小腸則火熱鬱於上而爲數飲下爲小便不得出也大腸爲肺之腑而主大便邪痺干大腸故上則爲中氣喘爭而下爲飧泄也

淫氣喘息痺聚在肺

註 淫氣而致於喘息則肺氣不藏而痹聚在肺

刺禁論

刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆

註 刺之要氣至而有效若脉內陷而氣反下泄則爲欬喘之逆證矣經云氣上衝胷喘不能久立病在大腸蓋大腸爲肺之腑也

刺膺中陷中肺爲喘逆仰息

註 足陽明之俞在膺中肺經之脉亦循膺中之雲門中府而出若刺膺中之脉陷而入深悞中肺脉令人喘逆仰息蓋因無故而傷之也

水熱穴論

水病下爲胕腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得臥

註 病水則下爲胕腫大腹上則爲喘呼不得臥者此標本俱病蓋腎爲本肺爲標在肺則爲喘呼在腎則爲水腫肺爲氣逆故不得臥也

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬喘

註諸戊歲火運太過則尅金肺受火熱故喘欬也

歲金太過燥氣流行甚則喘欬逆氣

註諸庚歲金運太過則燥氣流行若肅殺太甚則金氣自虛不能生水火無所畏而火氣來復故喘欬逆氣皆肺病也

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則喘欬

註諸丙歲寒氣流行故邪害心火若水淫甚而自傷故水氣上逆而喘欬

至眞要大論

少陰司天熱淫所勝民病胷中煩熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱欬喘甚則腹大滿膨膨而喘欬

註少陰司天子午歲也諸證皆肺金之病蓋火淫則金氣傷

歲少陰在泉熱淫所勝民病腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立

註喘不能久立者火淫肺金也

少陰司天客勝甚則胕腫血溢瘡瘍欬喘

註三之氣乃少陰君火欬喘君火之氣勝也

太陰司天客勝則首面胕腫呼吸氣喘

註　首面胕腫濕淫於上呼吸氣喘淫及於內也

陽明在泉主勝則寒厥於腸上衝胷中甚則喘不能久立

註　寒厥於腸上衝胷中甚則喘者寒氣逆乘陽明之大腸而上及於胷中之肺臟也

太陰之復濕變乃舉飮發於中欬喘有聲

註　氣極則變陰濕之氣盛也欬喘有聲者飮乘於肺也

諸氣忿鬱皆屬於肺諸痿喘嘔皆屬於上諸逆衝上皆屬於火

五常政大論

金太過曰堅成堅成之紀是謂收引其病喘喝胷憑仰息

註　秋令主收是謂收引其病喘喝胷憑仰息金氣太盛而肺氣實也

金不及曰從革從革之紀是謂折收其發欬喘

註　金運不及則收政乃折欬喘火刑肺也

少陰司天熱氣下臨肺氣上從喘嘔

註　肺之病也

六元正紀大論

少陰司天之政終之氣燥令行餘火内格腫於上欬喘

註　終氣乃陽明燥金司令故燥令行氣交之餘熱内格而爲欬喘血溢諸證

靈樞經

五亂篇

清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胷中是謂大悗亂於肺則俯仰喘喝接手以呼

註　清濁相干者循脈之榮衛與行陰行陽之榮衛相干是以亂於胷亂於肺而爲大悗喘喝諸病

經脈篇

肺手太陰之脈是動則病肺脹滿膨膨而喘欬

註　是動則病肺脹滿膨膨而喘欬此爲臂氣厥逆之所致

腎足少陰之脈是動則病喝喝而喘坐而欲起

註　少陰之上君火主之少陰是動爲病喝喝而喘者少陰之生氣不上交於肺而肺氣上逆也

熱病篇

熱病已得汗出而脉尚躁喘且復熱勿刺膚喘甚者死

註　已得汗而脉尚躁者陽熱甚而不從汗解也喘而且復熱者邪入於裏故勿刺膚喘甚者邪盛在裏而陰氣受傷故死

脹論

肺脹者虛滿而喘欬

註　此胃氣逆於城郭之中而爲臟脹也

五閱五使篇

肺病者喘息鼻張

本臟篇

肺小則少飲不病喘喝肺大則多飲善病胷痺喉痺逆氣肺高則上氣肩息欬肺下則居賁迫肺善脇下痛肺堅則不病欬上氣肺脆則苦病消癉易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則胷偏痛也

註　肺居胷中開竅於睺以司呼吸故小則不病喘喝大則善病胷痺睺痺肺主氣故高則上氣息肩而欬也

漢張機金匱要略

喘病證治

濕病篇曰濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

血痺篇曰男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也

脉沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也

肺癰肺痿篇曰問曰病欬逆脉之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死其脉何類師曰寸口脉微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯蓄結癰膿吐如米

粥始萌可救膿成則死

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚

上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之

肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍加石膏湯主之

肺癰胷滿脹一身面目浮腫鼻塞淸涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

胷痹篇曰胷痹之病喘息欬唾胷背痛短氣寸口脉沉而遲關上小緊數苦蔞薤白白酒湯主之

五臟風寒篇曰肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

痰飲篇曰膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼

目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛脉偏弦者飲也

肺飲不弦但苦喘短氣

支飲亦喘而不能臥加短氣其脉平也

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木防己湯去石膏加茯苓芒消湯主之

水氣篇曰正水其脉沉遲外證自喘

太陽病法當骨節疼痛痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者不可發汗

黃疸篇曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火刦其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱

除必噦噦者小半夏湯主之

嘔吐篇曰病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者生薑半夏湯主之

下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死少陰負趺陽者爲順也

吐衄篇曰夫吐血欬逆上氣其脉數而有熱不得臥者死

華佗中藏經

脉證定生死

病氣人一身盡腫四支不收喘無時厥逆不溫脉候沉小者死浮大者生

病寒人狂言不寐身冷脉數喘急目直者死脉有力而不喘者生

人不病而喘息者死

病腹痛而喘其脉滑而利數而緊者死

病上氣脉數者死

病上氣喘急四匝脉澀者死

肩息一日者死

晉王叔和脉訣

喘脉

上氣浮腫肩息頻浮滑之脉卽相成忽然微細應難救神功用盡也無生

肩息直視及脣焦面腫蒼黑也難逃

宋嚴用和濟生方

總論

素問云諸氣皆屬於肺諸喘者亦屬於肺是以人之一呼一吸謂之息呼吸之間脾受其氣通乎榮衞合乎陰陽周流一身無過不及然後權衡得其平矣將理失宜六淫所傷七情所感或因墮墜驚恐度水跌仆飽食過傷動作用力遂使臟氣不和榮衞失其常度不能隨陰陽出入以成息促迫於肺不得宣通而爲喘也診其脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死數者亦死謂其形損故也更有產後喘急爲病尤亟因產所下過多榮血暴竭衞氣無所主獨聚於肺故令喘急謂之孤陽絕陰爲難治醫療之法當推其所感詳其虛實冷熱而治之如產後喘急已載於產科論

中矣茲不再叙亦有痰停胃脘痰與氣搏肺道壅塞亦令人上氣此又不可不知

金劉完素六書

喘因

喘火氣甚爲夏熱衰爲冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息麤又寒水爲陰主乎遲緩熱火爲陽主乎急數故寒則息遲氣微熱則息數氣麤而爲喘也

元李杲十書

喘論

此當以經言邪氣盛則實斷之華佗云盛則爲喘減則爲枯故活人亦云發喘者氣有餘也凡看文字須會得本意盛則爲喘者非肺氣盛也喘爲肺氣有餘者亦非氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又爲有餘則當清肅下行而不喘以其火入於肺衰與不足而爲喘焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也

瀉肺中之火實補肺氣也平居則氣和行動則氣喘者屬衝脉之火滋腎丸主之

朱震亨心法

喘病證治

喘病氣虛陰虛有痰

凡久喘之證未發宜扶正氣爲主已發用攻邪爲主氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加千緡湯有痰亦短氣而喘陰虛者自小腹下火氣衝於上喘者宜降心火補陰有火痰者宜降心火清肺金有痰者用降痰下氣爲主

上氣喘而躁者爲肺脹欲作風水證宜發汗則愈有喘急風痰上逆者大全方千緡湯佳或導痰湯加千緡湯

有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火諸喘不止者用劫藥一二服則止劫後因痰治痰因火治火劫藥以椒目研極細末一二錢生薑湯調下氣虛不用又法蘿蔔子蒸熟爲君皂角燒灰等分爲末生薑汁煉蜜丸如小豆子大服五七十丸噙化止之

氣虛者用人參蜜炙黃蘗麥門冬地骨之類

氣實人因服黃芪過多而喘者用三拗湯以瀉氣

若喘者須用阿膠

若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子補之

若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

肺以清陽上升之氣居五臟之上通榮衞合陰陽升降往來無過不及六淫七情之所感傷飽食動作臟氣不和呼吸之息不得宣暢而爲喘急亦有脾腎俱虛體弱之人皆能發喘又或調攝失宜爲風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而爲喘又因痰氣皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱即調順之脾腎虛者溫理之又當於各類而求凡此證脉滑而手足溫者生脉澀而四肢寒者死

風寒傷者必上氣急不得臥喉中有聲或聲不出以三拗湯華蓋散九寶湯神祕湯皆可選用

若痰喘以四磨湯或蘇子降氣湯

若虛喘脉微色青黑四肢厥小便多以活人書五味子湯或四磨湯治嗽與喘用五味子爲多但五味有

南北若生津止渴潤肺益腎治勞嗽宜用北五味若風邪在肺宜用南五味

哮病治法

哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者一法用二陳湯加蒼朮黃芩作湯下小胃丹看虛實用

明戴思恭證治要訣

哮喘證治

喘氣之病哮吼如水鷄之聲牽引胷背氣不得息坐臥不安此謂嗽而氣喘或宿有此根如遇寒暄則發一時暴感並於嗽藥方中加桑白皮則仍吞養正丹間進清金丹風寒喘嗽宜九寶湯若乾喘不嗽不分久遠近發宜蘇子降氣湯或神祕湯吞養正丹重則四磨飲或六磨飲吞靈砂丹或應夢觀音散吞養正丹尤宜喘而服藥不效者利導之宜神保丸大便已溏者不可用

不嗽而氣自急有二證須用分別有外邪迫肺而氣

急者病初得氣即急必兼外證此謂之喘若用耗氣除邪之藥則元氣愈脫而氣愈上奔矣宜於氣急痰證求之氣急而膈間更有刺痛處宜分氣飲

樓英醫學綱目

哮喘證治

凡治喘正發時無痰將愈時却吐痰者乃痰於正發之時閉塞不通而喘甚當於其時開其痰路則易安也宜單桔梗方之類及枳殼苦蔞實杏仁蘇葉前胡等引出其痰候痰出喘退却調其虛實虛者補以參芪歸朮實者瀉以沉香滾痰丸之類是也

哮喘遇冷則發者有二證其一屬中外皆寒治法乃東垣參蘇溫肺湯調中益氣加茱萸湯及紫金丹刼寒痰者是也

其二屬寒包熱治法乃仲景丹溪用越婢加半夏湯等發表諸方及預於八九月未寒之時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包自不發者是也

平居則氣平和行動則氣促而喘者亦衝脈之火予族兄六旬有餘素有喘證或唾吐血痰平居時則不

喘稍行動則氣促喘急以黃蘗知母滋腎丸空心服七八十丸其證大減此黃蘗知母能泄衝脉之火者如此效也

凡喘而臥不得其脉浮按之虛而濇者爲陰虛去死不遠愼勿下之下之必死宜四物加童便竹瀝青黛門冬五味枳殼蘇葉服之

王綸明醫雜著

喘脹證治

喘與脹二證相同必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失下降之令故小便漸短以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘爲本而脹爲標治當淸金降火爲主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不

得降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之苟肺證而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治二證但知實脾行水而不知分別脾肺二證乎故爲發明之

註 按前證若肺中伏熱不能生水而喘且渴者用黃芩清肺飲以治肺用五苓散以清小便若脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚味脾肺積熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎丸以利小便若心火尅肺金而不能生腎水者用人參平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土若脾氣虛弱不能相制而喘者用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以生腎水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元氣六味地黃丸以補腎水若脾胃虛寒不能相制而脹者用八味丸以補脾肺生

腎水若脾肺虛寒不能通調水道而脹者宜用金匱加減腎氣丸補脾肺生腎水若酒色過度虧損足三陰而致喘脹痰涌二便不調或大小便道相牵作痛者亦宜用此丸多有生者

李梴醫學入門

辯喘

呼吸急促者謂之喘喉中有響聲者謂之哮虛者氣乏身涼冷痰如氷實者氣壯胷滿身熱便鞕

火證經曰諸逆衝上皆屬火虛火宜滋補降氣實火宜清肺瀉胃火炎肺胃喘者乍進乍退得食則墜下稠痰則止食已入胃反助火痰上喘反大作宜降火清金導痰湯加芩連山梔杏仁苦葽如胃有實火膈上稠痰者導水丸

痰喘必有痰聲風痰千緡湯或合導痰湯痰氣蘇子降氣湯四磨湯食積痰宜二母散神保丸大蘿皂丸驚憂氣鬱喉中闢闢引息鼻張氣喘呼吸氣促而無痰聲者四七湯枳桔湯分氣紫蘇飲四磨湯因服補藥喘者三拗湯

外感表邪傳裏裏實不受則氣逆上詳見傷寒喘促
條

尋常感冒風寒相干肺脹逆而喘者隨時令祛散風
喘金沸草散麻黃杏仁飲風喘加減三拗湯藿香正
氣散加五味子杏仁或蘇沉九寶飲暑月香葛湯熱
證小柴胡湯凉膈散

水喘者水氣轆轆有聲怔忡小青龍湯古葶棗散白
前湯

水腫水氣脹肺而喘然喘必生脹脹必生喘二證相
因皆小便不利肺主氣先喘而後脹者宜清金降火
而行水次之脾主濕先脹而後喘者宜燥脾行水而
清金次之

陰虛喘者血虛則陽無所依附而上奔宜四物湯倍
芍藥加人參五味子以收之有小腹下火起衝上而
喘者宜降心火補眞陰二物二陳湯加知蘗枳殼黃
芩

久病氣短不能接續似喘非喘者單人參湯扶脾生
脉散調中益氣湯勞涉過者杏參散飲食熱者葶藶

散痰阻短氣者導痰湯濁陰在上清陽陷下欬喘嘔吐者加味瀉白散

下元虛冷腎氣不得歸元者九味安腎丸八味丸甚者黑錫丹以鎭墜之煩躁無脉身冷神昏者死

胃虛極則氣上逆擡肩擷肚生脉散加杏仁陳皮白朮或理中丸加胡椒救之

仲景云髮汗如油汗出如珠不流擡肩擷肚喘而不休及胷前高起脉絡散張手足厥冷脉散及數者皆死但婦人喘病尤亟產後榮竭衞氣無依獨聚於肺發喘者死速

治法

血虛補血氣虛補氣兼以清金降火順氣化痰

喘非風寒乘肺則痰火脹肺風寒袪散痰火疎導但火急甚者亦不可純用苦藥宜溫以刼之用椒目五七錢爲末薑湯下喘止後因痰治痰因火治火諸喘不止者小蘿皂丸定息餅子含奇丸定喘化痰散久者人參清肺飲倍粟殼澀之

傷寒喘促

氣喘惟有太陽陽明二證太陽證無汗而喘宜汗陽明證汗多而喘宜下太陽陽明合病胷滿而喘惡寒者亦只宜汗而不宜下也故曰微喘言表之未解喘滿不惡寒者當下而痊又有汗後停水喘者有汗下後喘者有陰虛喘息甚急者返陰丹脉伏者加味生脉散如脉伏汗出髮潤者肺絕不治

李中梓醫宗必讀

喘病證治

喘者促促氣急喝喝痰聲張口擡肩搖身擷肚短氣者呼吸雖急而不能接續似喘而無痰聲亦不擡肩但肺壅而不下哮者與喘相類但不似喘開口出氣之多而有呀呷之音呷者口開呀者口閉開口閉口盡有音聲呷呀二音合成哮字以痰結喉間與氣相繫故呷呀作聲三證極當詳辯

按內經論喘其因衆多究不越乎火逆上而氣不降也挾虛者亦有數條非子母情牽卽仇讎肆虐害乎肺金之氣使天道不能下濟而光明者孰非火之咎耶雖然火則一而虛實則分丹溪曰虛火可補參芪

之屬實火可瀉芩連之屬每見世俗一遇喘家純行破氣於太過者當矣不及者可乎余嘗論此證因虛而死者十九因實而死者十一治實者攻之卽效無所難也治虛者補之未必卽效須悠久成功其間轉摺進退良非易也故辯證不可不急而辯喘證爲尤急也巢氏嚴氏止言實熱獨王海藏云肺氣果盛則清肅下行豈復爲喘皆以火爍眞氣氣衰而喘所謂盛者非肺氣也肺中之火也斯言高出前古惜乎但舉其端未能縷悉請得而詳之氣虛而火入於肺者補氣爲先六君子湯補中益氣湯陰虛而火來乘金者壯水爲亟六味地黃丸風寒者解其邪三拗湯華蓋散濕氣者利其水滲濕湯暑邪者滌其煩白虎湯香薷湯肺熱者清其上二冬二母甘桔梔芩痰壅者消之二陳湯氣鬱者疎之四七湯飲停者吐之吐之不愈木防己湯主之火實者淸之白虎湯加苦蔞仁枳殼黃芩神效肺癰而喘保金化毒薏仁甘草節桔梗貝母防風金銀花橘紅門冬肺脹而喘利水散邪肺脹之狀欬而上氣喘而煩躁目如脫狀脈浮大

者越婢加半夏湯脉浮者心下有水小青龍湯加石膏主之腎虛火不歸經導龍入海八味丸主之腎虛水邪泛溢逐水下流金匱腎氣丸別有哮證似喘而非呼吸有聲呀呷不已良由痰火鬱於內風寒束其外或因坐臥寒濕或因酸醎過食或因積火熏蒸病根深久難以卒除避風寒節厚味禁用凉劑恐風邪難解禁用熱劑恐痰火易升理氣疎風勿忘根本爲善治也宜蘇子枳殼桔梗防風半夏苦蔞茯苓甘草如冬月風甚加麻黃夏月痰多加石膏挾寒者多用生薑哮證發於冬初者多先於八九月未寒之時用大承氣下其熱至冬寒時無熱可包此爲妙法如上諸款皆其大綱若五藏六腑七情六氣何在非致喘之由須知舉一隅即以三隅反方不愧爲明通可以司人之命矣

右寸沉實而緊爲肺感寒邪亦有六部俱伏者宜發散則熱退而喘定

傷寒太陽無汗而喘太陽陽明合病胷滿而喘俱麻黃湯邪氣壅盛而喘雖汗而喘不已宜再發之麻黃

杏子石膏誤下太陽利不止喘而有汗脉促葛根黃連黃芩湯太陽汗後飲多水停而喘小青龍去麻黃加杏仁小腹滿加茯苓太陽下之微喘表未解也桂枝湯加厚朴杏仁水停心下腎氣乘心爲悸爲喘五苓散陰喘脉伏而逆理中湯四逆湯喘而氣促腹滿大柴胡湯

趙獻可醫貫

喘論

余按喘與氣短有分則短氣是虛喘是實然而喘多有不足者短氣間亦有有餘者新病亦有本虛者不可執論也

金匱云實喘者氣實肺盛呼吸不利肺竅壅塞若寸沉實宜瀉肺虛喘者腎虛先覺呼吸短氣兩脅脹滿左尺大而虛宜補腎此腎虛證非新病虛者乎

邪喘者由肺受邪伏於肺中關竅不通呼吸不利若寸浮而緊此外感也亦有六部俱伏者宜發散則身熱退而喘定此鬱證人所難知非短氣中之有餘乎

論人之五臟皆有上氣而肺爲之主居於上而爲五

臟之華蓋通榮衛合陰陽升降往來無過不及何病之有若爲風寒暑濕所侵則肺氣脹滿而爲喘呼吸迫促坐臥不安或七情內傷鬱而生痰或脾胃俱虛不能攝養一身之痰皆能令人喘

眞知其風寒也則用仲景青龍湯眞知其暑也則用白虎湯眞知其濕也則用勝濕湯眞知其七情鬱結也則用四磨四七湯又有木鬱火鬱土鬱金鬱水鬱皆能致喘治者審之（以上俱屬有餘之證）

東垣云病機云諸痿喘嘔皆屬於上辯云傷寒家論喘以爲火熱者是明有餘之邪中於表寒變爲熱心火太旺攻肺故屬於上又云膏粱之人奉養太過及過愛小兒亦能積熱於上而成喘宜以甘寒之劑治之飲食不節喜怒勞役不時水穀之寒熱感則害人六腑皆由中氣不足其䐜脹腹滿欬喘嘔食不下宜以大甘辛熱之劑治之脈經云肺盛有餘則欬嗽上氣渴煩心胷滿短氣皆衝脈之火行於胷中而作係在下焦非屬上也觀東垣之辯可見起於有餘者病機之邪雜病者不足之邪自是標本判然條析如遇

標病或汗或吐或下一藥而痰去喘定奏功如神粗工以其奏功如神也執而概施之不足之證豈不殆哉樓全善云凡下痰定喘諸方施之形實有痰者神效若虛而脉浮大按之濇者不可下之下之必反劇而死

經云諸喘皆屬於上又謂諸逆衝上皆屬於火故河間叙喘病在於熱條下華佗云肺氣盛爲喘活人書云氣有餘則喘後代集證類方不過遵此而已獨王海藏辯云氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣

果盛與有餘則淸肅下行豈復爲喘以其火入於肺炎爍眞陰衰與不足而爲喘焉所言盛與有餘者非肺之氣也肺中之火也海藏之辯超出前人發千古之精奧惜乎起其端末竟其火之所由來愚謂火之有餘水之不足也陽之有餘陰之不足也凡諸衝逆之火皆下焦衝任相火出於肝腎者也故曰衝逆腎水虛衰相火偏勝壯火食氣消鑠肺金烏得而不喘焉丹溪云喘有陰虛自小腹下火起而上宜四物湯加青黛竹瀝陳皮入童便煎服如挾痰喘者四物加

枳殼半夏補陰以化痰夫謂陰虛發喘丹溪實發前人之所未發但如此治法實流弊於後人蓋陰虛者腎中之眞陰虛也豈四物陰血之謂乎其火起者下焦龍雷之火也豈寒涼所能降乎其間有有痰者有無痰者水挾木火而上也豈竹瀝枳半之能化乎須用六味地黃加門冬五味大劑煎飲以壯水之主則水升火降而喘自定矣蓋緣陰水虛故有火有火則有痰有痰則欬嗽欬嗽之甚則喘當與前陰虛相火論參看

又有一等似火而非火似喘而非喘者經曰少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依歸故上氣喘也黃帝針經云胃絡不和喘出於陽明之氣逆陽明之氣下行今逆而上行故喘眞元耗損喘出於腎氣之上奔其人平日若無病但覺氣喘非氣喘也乃氣不歸元也視其外證四肢厥逆面赤而煩躁惡熱似火非火也乃命門眞元之火離其宮而不歸也察其脉兩寸雖浮大而數兩尺微而無力或似有而無爲辯耳不知者以其有火也少用涼

藥以清之以其喘急難禁也佐以四磨之類以寬之下咽之後似覺稍快少頃依然豈知寬一分更耗一分甚有見其稍快誤認藥力欠到倍進寒凉快氣之劑立見其斃矣何也蓋陰虛至喘去死不遠矣幸幾希一線牽帶在命門之根尚爾留連善治者能求其緒而以助元接眞鎭墜之藥俾其返本歸原或可囘生然亦不可峻驟也且先以八味丸安腎丸養正丹之類煎人參生脈散送下覺氣若稍定然後以大劑參芪補劑加破故紙阿膠牛膝等以鎭於下又以八味丸加河車爲丸日夜遇饑則吞服方可然猶未也須遠房幃絕色慾經年積月方可保全不守此禁終亦必亡而已矣論至此可爲寒心聰明男子當自治未病毋蹈此危機

又有一等火鬱之證六脉俱濇甚至沉伏四肢悉寒甚至厥逆拂拂氣促而喘却似有餘而脉不緊數欲作陰虛而按尺鼓指知爲畜鬱已久陽氣拂遏不能營運於表以致身冷脉微而悶亂喘急當此之時不可以寒藥下之又不可以熱藥投之惟逍遙散加茱

連之類宣散畜熱得汗而愈愈後乃以六味地黃養陰和陽方佳此謂火鬱則發之木鬱則達之即金匱所云六脉沉伏宜發散則熱退而喘定是也經曰火鬱之發民病少氣治以諸凉或問喘者多不能臥何也素問逆調論云夫不得臥臥則喘者水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也東垣云病人不得臥臥則喘者水氣逆行乘於肺肺得水而浮使氣不得流通也仲景云短氣皆屬飲已上詳論陰虛發喘之證治若陽虛致喘東垣已詳盡矣外感發喘仲景已詳盡矣茲爲補天立論故加意於八味六味云

景岳全書

臣張介賓著

論證

氣喘之病最爲危候治失其要鮮不悞人欲辯之者亦惟二證而已所謂二證者一曰實喘一曰虛喘也此二證相反不可混也然則何以辯之蓋實喘者有邪邪氣實也虛喘者無邪元氣虛也實喘者氣長而有餘虛喘者氣短而不續實喘者胷脹氣粗聲高息

湧膨膨然若不能容惟呼出爲快也虛喘慌張氣怯聲低息短皇皇然若氣欲斷提之若不能升吞之若不相及勞動則甚而惟急促似喘但得引長一息爲快也此其一爲眞喘一爲似喘眞喘者其責在肺似喘者其責在腎何也蓋肺爲氣之主腎爲氣之根肺主皮毛而居上焦故邪氣犯之則上焦氣壅而爲喘氣之壅滯者宜清宜破也腎主精髓而在下焦若眞陰虧損精不化氣則下不上交而爲促促者斷之基也氣旣短促而再加消散如壓卵矣且氣盛有邪之脉必滑數有力而氣虛無邪之脉必微弱無神此脉候之有不同也其有外見浮洪或芤大至極而稍按卽無者此正無根之脉也或往來弦甚而極大極數全無和緩者此正胃氣之敗也俱爲大虛之候但脉之微弱者其眞虛易知而脉之浮空弦搏者其假實難辯然而輕重之分亦惟於此而可察矣蓋其微弱者猶順而易醫浮空者最險而多變若弦強之甚則爲眞臟已見不可爲也

論治

凡虛喘之證無非由氣虛耳氣虛之喘十居七八但察其外無風邪內無實熱而喘者卽皆虛喘之證若脾肺氣虛者不過在中上二焦化源未虧其病猶淺若肝腎氣虛則病出下焦而本末俱病其病則深此當速救其根以接助眞氣庶可回生也其有病久而加以喘者或久服消痰散氣等劑而反加喘者或上爲喘欬而下爲泄瀉者或婦人產後亡血過多則營氣暴竭孤陽無依而爲喘者此名孤陽絕陰剝極之候已爲難治更毋蹈剝膚之戒也

虛喘證其人別無風寒欬嗽等疾而忽見氣短似喘或但經微勞或饑時卽見喘促或於精泄之後或於大汗之後或於大小便之後或大病之後或婦人月期之後而喘促愈甚或氣道噎塞上下若不相續勢劇垂危者但察其表裏無邪脉息微弱無力而諸病若此悉宜以貞元飲主之加減如本方其效如神此外如小營煎大營煎大補元煎之類俱可擇用經曰肝苦急急食甘以緩之卽此之類若大便溏泄兼下寒者宜右歸飲右歸丸聖术煎之類主之脾肺氣虛

上焦微熱微渴而作喘者宜生脉散主之或但以氣虛而無熱者惟獨參湯爲宜若火爍肺金上焦熱甚煩渴多汗氣虛作喘者宜人參白虎湯主之若火在陰分宜玉女煎主之然惟夏月或有此證若陰虛自小腹火氣上衝而喘者宜補陰降火以六味地黃湯加黃蘗知母之類主之

水病爲喘者以腎邪干肺也然水不能化而子病及母使非精氣之敗何以至此此其虛者十九而間乎虛中挾實則或有之耳故凡治水喘者不宜妄用攻擊之藥當求腫脹門諸法治之腫退而喘自定古法治心下有水氣上乘於肺喘而不得臥者以直指神祕湯主之但此湯性用多主氣分若水因氣滯者用之則可若水因氣虛者當以加減金匱腎氣湯主之

老弱人久病氣虛發喘者但當以養肺爲主凡陰盛者宜溫養之如人參當歸薑桂甘草或加以芪朮之屬陽勝者宜滋養之如人參熟地麥冬阿膠五味子梨漿牛乳之屬

關格之證爲喘者如六節臟象論曰人迎四盛已上

爲格陽寸口四盛已上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格此關格之證以脈言不以病言也今人之患此者頗多而人多不知且近時察脈者不論人迎惟在寸口但其兩手之脈浮弦至極大至四倍以上者便是此證其病必虛里跳動而氣喘不已此之喘狀多無欬嗽但覺胷膈舂舂似脹非脹似短非短微勞則喘甚多言亦喘甚甚至通身振振慌張不寧此必情慾傷陰以致元氣無根孤陽離劇之候也多不可治

凡病喘促但察其脈息微弱細濇者必陰中之陽虛也或浮大弦芤按之空虛者必陽中之陰虛也大凡喘息不得臥而脈見如此者皆元氣大虛去死不遠之候若妄加消伐必增劇而危若用苦寒或攻下之無不卽死

實喘之證以邪實在肺也肺之實邪非風寒則火邪耳蓋風寒之邪必受自皮毛所以入肺而爲喘火之熾盛金必受傷故亦以病肺而爲喘治風寒之實喘宜以溫散治火熱之實喘宜以寒涼又有痰喘之說

前人皆曰治痰不知痰豈能喘而必有所以生痰者此當求其本而治之凡風寒外感邪實於肺而欬喘並作者宜六安煎加細辛或蘇葉主之若冬月風寒感甚者於本方加麻黃亦可或用小青龍湯華蓋散三拗湯之類主之外有風寒內兼微火而喘者宜黃芩半夏湯主之兼陽明火盛而以寒包熱者宜涼而兼散以大青龍湯或五虎湯越婢加半夏湯之類主之外無風寒而惟火盛作喘或雖有微寒而所重在火者宜桑白皮湯或抽薪飲之類主之

痰盛作喘者雖宜治痰如二陳湯六安煎導痰湯千緡湯滾痰丸抱龍丸之類皆可治實痰之喘也六君子湯金水六君煎之類皆可治虛痰之喘也然痰之爲病亦惟爲病之標耳猶必有生痰之本故凡痰因火動者必須先治其火痰因寒生者必須先去其寒至於或因氣逆或因風邪或因濕滯或因脾腎虛弱有一於此皆能生痰使欲治痰而不治其所以痰則痰終不能治而喘何以愈哉

氣分受邪上焦氣實作喘或怒氣鬱結傷肝而人壯

力强脹滿脈實者但破其氣而喘自愈宜廓清飲四磨飲四七湯蘿蔔子湯蘇子降氣湯之類主之或陽明氣祕不通而脹滿者可微利之

哮證治

喘有夙根遇寒卽發或遇勞卽發者亦名哮喘未發時以扶正氣爲主旣發時以攻邪氣爲主扶正氣者須辯陰陽陰虛者補其陰陽虛者補其陽攻邪氣須分微甚或散其風或溫其寒或清其痰火然發久者氣無不虛故於消散中宜酌加溫補或於溫補中宜量加消散此等證候當惓惓以元氣爲念必使元氣漸充庶可望其漸愈若攻之太過未有不致日甚而危者

石室祕籙

臣陳士鐸著

喘病治法

急治者不可須臾緩也如人忽感風邪寒入乎肺經以致一時喘急擡肩大喘氣逆痰吐不出又不能臥是也方用柴胡當歸黃芩甘草半夏射干各一錢桔梗麥冬茯苓各二錢水煎服此方妙在用柴胡射干

桔梗以舒發肺金之氣用半夏以祛痰用黃芩以去火蓋外感寒邪則內必變爲熱證今用黃芩以清解之然徒用黃芩雖曰清火轉足以抑遏其火氣妙在用桔梗射干柴胡一派辛散之品轉足以消火滅邪此急治之一法

凡人有氣喘不得臥吐痰如泉湧者舌不燥而喘不甚一臥則喘如此非外感之風邪乃腎中之寒氣也蓋腎中無火則水無所養乃上泛而爲痰將胃中之水盡助其洶湧之勢而不可止遏矣法當用六味丸湯加附子肉桂大劑飲之則腎宮火熱而水有所歸水既歸宮喘逆之氣亦下安而可臥蓋人之臥必得腎氣與肺氣相交而後河車之路平安無奔逆也方中補其腎火何以安然能臥不知腎爲肺之子子安則母亦寧肺金之氣可歸於腎宮以養其耗散之氣矣此所以補腎火正所以養肺金也況六味丸全是補腎水之神劑乎水火同補而肺金更安肺腎相安有不臥之而甚適者乎

喘證不同有虛喘有實喘實喘看其證若重而實輕

用黃芩二錢麥冬三錢甘草五分柴胡蘇葉山豆根半夏烏藥各一錢水煎服一劑喘止不必再服也然實證之喘氣太急喉必作聲肩必擡起非若虛喘氣少急而喉無聲肩不擡也虛喘乃腎氣大虛而脾氣又復將絕故奔冲而上欲絕尚未絕也方用救絕止喘湯人參熟地各一兩山茱萸白芥子各三錢麥冬五錢五味子牛膝各一錢水煎服一劑輕二劑喘止十劑全愈此病實死證也幸幾微之氣留連於上下之間若用涼藥以平火是速其亡也然用桂附以補火亦速其亡蓋氣將絕之時宜緩續而不宜驟續譬如爐中火絕止存星星之火宜用薪炭引之若遽投之以硫黃之類反滅其火矣更以寒涼之物動之鮮有生氣矣方中妙在一派補腎補肺之藥與人參同用則直入於至陰之中而生其氣腎氣生而肺氣亦生自能接續於無何有之鄉況人參又上生肺以助腎之母子母相生更能救絕也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四卷目錄

醫部彙考二百八十四

哮喘門二

方

越婢加半夏湯　小青龍湯　小青龍加石膏湯　平氣散　木防己湯　木防己加茯苓芒硝湯　葶藶大棗瀉肺湯　千緡湯半夏丸　定喘餅子　麥門冬湯　人參平肺散　加減瀉白散　壓掌散　定喘奇方　人參定喘湯　團參散　五味子湯　九寶湯　皺肺丸　經驗祕方　三因神祕湯　桂苓五味甘草湯　眞應散　簡易黃丸子　清金丹　又方　治齁嗽方　定喘湯　見晛丸　加味三拗湯　九味理中湯　五虎湯　止喘丸

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四卷目錄

醫部彙考二百八十四

哮喘門二

方
越婢加半夏湯　小青龍湯　小青龍加石
膏湯　平氣散　木防己湯　木防己加茯
苓芒硝湯　葶藶大棗瀉肺湯　千緡湯半
夏丸　定喘餅子　麥門冬湯　人參平肺散
加減瀉白散　壓掌散　定喘奇方　人參
定喘湯　團參散　五味子湯　九寶湯　皺
肺丸　經驗祕方　三因神祕湯　桂苓五味
甘草湯　眞應散　簡易黃丸子　清金丹
又方　治齁嗽方　定喘湯　見晛丸　加味
三拗湯　九味理中湯　五虎湯　止喘丸

千緡導痰湯　加減三奇湯　貝母散　平肺
散　紫蘇半夏湯　定喘化痰湯　潤肺膏
蘇子導痰降氣湯　大蘿皂丸　祛痰丸　四
磨湯　清金湯　定肺湯　杏蘇飲　加味四
君子湯　雙玉散　加味生脈散　瀉火清肺
湯　神秘湯　平肺湯　單人參湯　小蘿皂
丸　紫金丹　紫金丹　紫金丹　奪命丹
立定散　大百勞散　小百勞散　內金丸
喘息方　又方　橘皮湯　又方　瀉肺散
麻黃引氣湯　厚朴湯　華蓋散　二黃丸
人參胡桃湯　杏仁煎　暴喘欲死方　黃芩
半夏湯　星半苦蔞丸　神應丹　大利膈丸
又方　又方　又方　三拗湯　導水丸
大補元煎　右歸飲　右歸丸　大營煎　小
營煎　貞元飲　金水六君煎　六安煎　廓
清飲　玉女煎

單方

藝術典第三百四卷

醫部彙考二百八十四

哮喘門二

方

越婢加半夏湯（仲景下同）

治哮喘

麻黃六兩　石膏　半夏各半斤　甘草一兩
生薑三兩　大棗十五枚

右六味以水六升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取

三升分溫三服

小青龍湯

治水氣發喘尤捷

麻黃去節　芍藥　甘草炙　肉桂　乾薑炮

細辛各三兩　五味二兩　半夏泡七次二兩半

右㕮咀每三錢煎七分食後服

小青龍加石膏湯

治哮喘

石膏二兩　麻黃　芍藥　桂枝　細辛　甘草

乾薑各三錢　五味子　半夏各半升

右九味以水一斗先煎麻黃去上沫內諸藥煑取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

平氣散（東垣下同）

治喘

白牽牛二兩半生半炒取頭末一半　青皮去白

雞心檳榔各三錢　陳皮去白半兩　大黃七錢

右爲細末每服三錢生薑湯一盞調下無時內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之白牽牛苦寒瀉氣

分濕熱上攻喘滿故以爲君陳皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣故以爲臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以爲使也

木防己湯（仲景　下同）

治喘

木防己三兩　石膏雞子大一塊　桂枝二兩

人參四兩

右四味以水六升煎取二升分溫再服

木防己加茯苓芒硝湯

治喘

木防己　桂枝各二兩　人參　茯苓各四錢

芒硝三合

右五味以水六升煑取二升去查內芒硝再微煎分溫再服微利則愈

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰胷膈脹滿上氣喘急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

葶藶不以多少炒令黃

右件細研丸如彈子大水三盞棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服法令先投小青龍湯三服乃進此藥卽濟生葶藶散湯使不同濟生方炒甜葶藶桔梗苦蔞子薏苡仁升麻桑皮葛根各一兩炙甘草半兩

千緡湯（婦人大全）

治喘急有風痰者

半夏七箇炮製四片破之　皂角去皮弦子　甘草炙各一寸　生薑如指大

右以水一碗煮去半頓服一方無甘草但用半夏末一兩皂角半兩生薑七片同入紗袋中水三升煎至一盞五分以手揉洗取清汁分作三服併服二服效

半夏丸（保命集）

治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒

半夏一兩　檳榔　雄黃各三錢

右爲細末薑汁蒸餅爲丸如桐子大每服三五十

丸薑湯下小兒丸如米大

定喘餅子（寶鑑）

芫花酢浸一宿炒　桑白皮炒　吳茱萸炒
馬兜鈴　陳皮去白各一兩　寒食麪三兩
白牽牛三兩半生半炒取頭末二兩

右爲末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熱灰半碗在碗內同炒餅子熱每夜服一餅嚼爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上一餅或二餅至微明利下神效婦人有胎者不可服

麥門冬湯（仲景）

治虛喘

麥冬七升　半夏一升　人參四兩　甘草二兩
粳米三合　大棗十二枚

右六味以水一斗二升煎取六升溫服一升日三夜一服

人參平肺散（東垣）

治肺受熱而喘

桑白皮炒二錢　知母一錢半　甘草炙　茯苓

人參　地骨皮　天門冬去心各一錢　青皮

陳皮各六分　五味子三十粒搥碎

水二鍾生薑五片煎一鍾食遠溫服如熱甚加黃

芩薄荷葉各一錢

加減瀉白散（發明）

治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘促

桑白皮一兩　茯苓三錢　地骨皮七錢　甘草

陳皮　青皮去白　五味子　人參去蘆各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半入粳米數十粒同煎

溫服食後

壓掌散

治男女哮喘痰嗽

麻黃去節二錢半　炙甘草二錢　白果五箇打碎

右水煎臨臥服

定喘奇方

治稠痰壅盛體肥實而喘者

橘紅二兩用明礬五錢同炒香去礬不用　半夏

杏仁麩炒　苦葽仁去油各一兩　炙甘草七錢

黃芩酒拌曬五錢　皂角去皮弦子燒存性三錢
右爲末蒸餅用淡薑湯打糊爲丸如菉豆大每食後白湯送下一錢日二次服三五日大便下稠痰而愈虛弱人每服七分

人參定喘湯

治肺氣上逆喘喉中有聲坐臥不安胷膈緊痛及治肺感寒邪欬嗽聲重

人參　麻黃去節　阿膠蛤粉炒　半夏麯
五味子　罌粟殼去蒂蜜炙　甘草各一錢
桑白皮二錢
右作一服用水二鍾薑三片煎至一鍾食後服

團參散

治肺氣不利欬嗽上喘

紫團參　紫菀茸各三錢　款冬花二錢
右作一服水二鍾烏梅一枚煎一鍾食遠服

五味子湯

治喘促脈伏而數者

五味子二錢　人參　麥門冬　杏仁去皮尖

橘皮去白各二錢半

右作一服用水二鍾薑三片紅棗三枚煎至一鍾

去查不拘時溫服

九寶湯

治經年喘嗽通用

麻黃去節　陳皮　桂枝　紫蘇　桑皮炒

杏仁去皮尖并雙仁炒　大腹皮　薄荷葉

甘草炙各一錢六分

右作二服每服用水二盞生薑五片烏梅一枚食

遠煎服

皺肺丸

治喘

款冬花　知母　秦艽　百部　紫菀茸　貝母

阿膠　糯米炒各一兩　杏仁去皮尖別研四兩

右爲末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少

卽以許水更添些煎杏仁令沸濾過灌入肺中繫

定以糯米泔煎熟研細成膏搜和前藥末杵數千

下丸桐子大每五十丸食前用桑白皮煎湯下

經驗祕方（正傳）

治遠年喘息

桑木內蠹蟲糞一升炒　杏仁不去皮尖炒

蘿蔔子炒各半斤　甘草二兩生

右共爲極細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五七十丸淡薑湯送下

三因神祕湯（發明）

治喘不得臥

蘇葉　橘紅　生薑　桑白皮炒　人參各五錢

白茯苓　木香各三錢

右㕮咀以水三升煎至一升去查大溫分三服一本只陳皮桔梗紫蘇各錢半人參一錢五味子十五粒

桂苓五味甘草湯（仲景）

治喘

桂枝　茯苓各四兩　甘草炙三兩　五味子半升

右四味以水八升煎取三升分三溫服

眞應散（三因方）

治遠年喘急不能眠百藥不效者

白石英四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一具將前項藥入內縫定煮熟取藥出再換猪肚一具如前法煑三次煑了取藥出曬乾用研

右爲末以官局款冬花散二錢入藥末二錢再加桑白皮二寸生薑三片棗子一枚水一盞半煎至七分通口服猪肚亦可食只不得用酢醬鹽椒薑等調和款冬花散方用款冬花一錢貝母知母桑葉杏仁半夏阿膠甘草各二錢麻黃去節四錢爲麤末是也

簡易黃丸子

消痰定喘及齁鮯

雄黃細研　雌黃細研各一錢　山梔仁七枚

菉豆四十九粒　明礬一字研細並生用

右爲末稀糊丸菉豆大每服一二丸薄荷茶清冷下臨卧服

清金丹

治食積痰壅哮喘欬嗽遇厚味發者用之

蘿蔔子淘淨蒸曬爲末一兩　牙皂角燒存性三錢

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服三五十丸嚥下刼喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服七八十丸噙下止之

又方

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退去足　輕粉研　馬兜鈴各一兩　雄黃生

五靈脂生　杏仁去皮尖幷雙仁　砒生各五錢

淡豆豉四十九粒

右爲末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥爲丸小彈子大每服一丸細嚼臨卧薑湯下

治齁嗽方

蘇子二錢　麻黃去節　款冬花　桑葉蜜炙

半夏各三錢　杏仁去皮尖　甘草各一錢半

白菓二十一枚去殼衣炒黃色

水三鍾不用生薑煎二鍾徐徐頻服

定喘湯

止一切喘

白菓二十一枚去殼切碎炒黄色　甘草一錢
蘇子二錢　麻黄去節　款冬花　桑皮蜜炙
法製半夏如無以甘草湯泡七次去皮用各三錢
杏仁　黄芩炒各一錢半
水三鍾煎二鍾分二服不用薑徐徐服無時

見晛丸

治傷鹹冷飲食而哮喘者

薑黄　三稜　華澄茄　陳皮　良薑　人參
蓬术各等分

右爲細末用蘿蔔浸煑爛研細將汁麵糊丸如桐子大蘿蔔子湯下

加味三拗湯（得效方）

治寒喘

麻黄二錢　陳皮一錢半　桂皮一錢　杏仁
五味子各一錢二分　甘草五分
右剉作一貼薑三片水煎服

九味理中湯（回春）

治寒喘寒喘者手足冷脈沉細也

縮砂研　乾薑炮　蘇子　厚朴　桂皮　陳皮
甘草炙各一錢　沉香　木香各五分並水磨汁
右剉作一貼薑三片水煎入沉香木香汁調服

五虎湯（醫鑑）

治傷寒喘急

麻黃三錢　石膏五錢　杏仁二錢　甘草一錢
細茶一撮　桑白皮一錢半
右剉作一貼入薑三片葱白一莖水煎服

止喘丸（類聚）

治冷喘

蓽茇　胡椒　人參　胡桃肉各等分
右爲末蜜和每兩作三十丸每一丸細嚼溫水下

千緡導痰湯（醫鑑）

治痰喘不能臥一服卽安

半夏七枚炮切作四片　南星　陳皮　赤茯苓
枳殼各一錢　牙皀角　甘草各一寸並炙
右剉作一貼入生薑五片水煎服

加減三奇湯（東垣）

治欬喘上氣痰涎不利

半夏二錢　桔梗　陳皮　青皮　人參　杏仁
桑白皮　紫蘇葉　五味子各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑三片水煎服

貝母散（入門）

治痰喘

知母　貝母各一兩　巴豆十粒取霜

右爲末每服一字薑三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其喘卽定

平肺散（丹溪下同）

治喘嗽痰盛寒熱往來咽乾口燥

陳皮一錢　半夏　罌粟殼　薄荷　紫蘇葉
烏梅肉　紫菀茸　知母　桑白皮　五味子
杏仁　桔梗各七分　甘草五分

右剉作一貼薑三片水煎服

紫蘇半夏湯

治喘嗽寒熱痰盛往來

桑白皮二錢　杏仁一錢半　半夏　紫蘇葉

陳皮　五味子　紫菀各一錢

右剉作一貼薑三片水煎服

定喘化痰湯

治欬嗽痰喘

陳皮　杏仁各二錢　半夏　南星並製各錢半

五味子　甘草各八分　款冬花　人參各七分

右剉作一貼薑五片水煎服

潤肺膏

治同上

紫菀　杏仁　款冬花　胡桃肉各一兩　麻黃

桔梗　訶子　細辛各五錢　枯白礬一錢

清油八兩　生薑二兩取汁　蜜一斤

右先將油煉熟次入蜜煉去沫却下藥末攪勻每服二三匙白湯調下臨臥時服

蘇子導痰降氣湯

治痰喘上氣

蘇子二錢　半夏製　當歸各一錢半　南星製

陳皮各一錢　甘草五分　前胡　厚朴　枳實

赤茯苓各七分

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

大蘿皂丸（入門）

治氣喘痰喘風痰食痰酒痰麵毒等證

蘿蔔子炒二兩　皂角燒存性一兩　南星製

半夏製　杏仁　苦蔞仁　香附便製　青黛

陳皮各五錢

右爲末神麯糊和丸梧子大薑湯吞下六七十丸

祛痰丸（丹溪）

治風痰喘嗽

人參　木香　天麻　陳皮　青皮　赤茯苓

白朮各一兩　牙皂角去皮弦子九錢　槐角子

半夏各七錢半

右爲末薑汁糊和丸梧子大每五七十丸溫酒或

薑湯吞下

四磨湯（東垣）

治七情鬱結上氣喘急

人參　檳榔　沉香　烏藥各等分

右濃磨水取七分盞煎三五沸微溫服不拘時加木香枳殼等分名六磨湯治證同

清金湯（綱目）

治欬嗽喘急胷滿逆氣坐臥不安

陳皮　赤茯苓　杏仁　阿膠珠　五味子
桑白皮　薏苡仁　紫蘇葉　百合　貝母
半夏麴　款冬花各七分　罌粟殼　人參
甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一箇同煎服

定肺湯（直指方）

治上氣喘嗽

紫菀茸　五味子　橘皮　蘇子　杏仁去皮尖
桑白皮　半夏　枳殼　甘草各一錢

右剉作一貼入薑五片紫蘇五葉水煎服

杏蘇飲（丹溪）

治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二錢　紫菀　甘草各一錢　陳皮
桔梗　麻黃　桑白皮　阿膠珠各十分半

五味子　大腹皮　烏梅肉　杏仁各五分

右剉作一貼入薑三片水煎服

加味四君子湯（同春）

治氣喘

人參　白朮各一錢三分　甘草一錢　赤茯苓

陳皮　厚朴　縮砂仁　蘇子　桑白皮各六分

當歸八分　木香　沉香各五分二味並磨取汁

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎和二香汁服

雙玉散（河間）

治熱喘痰涌如泉

寒水石　石膏各等分

右爲細末每取三錢人參湯調下

加味生脈散（入門）

治脈浮喘促手足厥逆用此救之

五味三錢　人參　麥冬　杏仁　陳皮各二錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服氣虛喘盛者單人參湯頻服之喘定者生不定者死或元氣素虛傷寒汗下後氣短氣促氣喘目反脈微精神

困急者危以此救之

瀉火清肺湯（同春）

治火喘

片芩一錢　枳實　梔子　桑白皮　麥門冬

陳皮　杏仁　赤茯苓　蘇子　貝母各八分

沉香五分水磨取汁　朱砂五分水飛

右剉作一貼水煎入沉香汁朱砂末竹瀝調服

神祕湯（綱目下同）

治上氣喘急不得臥臥則喘者水氣逆行上乘於肺肺得水而浮使氣不得流通其脈沉大宜服此

紫蘇葉　橘紅　桑白皮各一錢半　赤茯苓

人參　半夏各一錢　木香五分

右剉作一貼入生薑五片水煎服日二

平肺湯（直指方）

肺與腎皆以至陰積水喘急欬嗽蓋水乘之也

葶藶子炒二錢　桑白皮炒　桔梗　枳殼

半夏　蘇葉各一錢　麻黃七分半　甘草五分

右剉作一貼入薑五片水煎服

單人參湯（入門）

治氣虛喘急

人參一兩

右剉水煎頻服之

小蘿皂丸（綱目）

治久喘最妙

蘿蔔子蒸一兩　皂角煅五錢　苦蔞仁研

南星以白礬水浸曬　海粉各一兩

右爲末薑汁入蜜和勻搗作丸櫻桃大含化嚥下

紫金丹（本事方）

治多年肺氣喘急哮嗽夕不得臥

淡豆豉好者二錢用水略潤少時以紙挹乾研膏

砒水飛半錢

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服五丸至十丸量大小與之並用臘茶清極冷吞下臨臥以知爲度

紫金丹（入門）

治哮喘不得臥須三年後者可服

砒末一錢　淡豆豉搗爛一兩　精猪血細切四兩
三味拌和分作三分用紙筋泥包裹烘令泥乾却
用炭火煅青烟出盡爲度於地上一宿出火毒取
爲末湯浸蒸餅和丸菉豆大食後冷茶清下大人
二十丸小兒七丸忌一應醎物湯水之類

紫金丹（回春）

凡遇天氣欲作雨便發齁喘甚至坐臥不得飲食
不進此乃肺竅中積有冷痰乘天陰寒氣從背口
鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身者亦有子
母相傳者每發卽服不過七八次覺痰腥臭吐出
白色是絕其根本也

白砒一錢生用另研　白礬煅枯三錢另研
淡豆豉一兩水潤去皮蒸研如泥
右末和合撚作丸如菉豆大冷茶送下五丸甚者
九丸以不喘爲愈不必多服久久服之奏效必矣

奪命丹（丹溪）

治齁鮯喘嗽上氣

砒一錢　白礬二錢　白附子三錢　南星四錢

半夏五錢

右先將砒礬於石器內火煅紅出火黃色爲度切不可犯鐵器却入餘藥末和勻薑汁麪糊和丸如黍米大朱砂爲衣每服七丸小兒三丸井水吞下忌食熱毒物此方治痰喘劫劑也病安之後卽用知母茯苓湯人參五味散寧肺湯以補虛可也

立定散（醫鑑下同）

治哮喘祕方

大皂角一箇劈開去子入巴豆肉鐵線紮緊炙焦黃色末每一錢用半夏杏仁各一錢香油煮黃

右爲細末每柹餅一枚入一錢細嚼服之溫水下

大百勞散（河間下同）

治一切勞疾肌劣喘息不臥痰涎不食

蛤蚧一對蜜炙　鼈甲一個去裙酢炙　附子

人參　柴胡　乾薑　白茯苓　白朮　茴香

青皮去白　杏仁去皮尖　知母　貝母　官桂

甘草炙　半夏生薑製　蒼朮湯浸各一兩

蘇木　龍膽草各半兩

右爲末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵煎

小百勞散

治勞喘嗽不已自汗者

御米殼不拘多少炒

右爲末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

內金丸（良方）

治哮喘

雞內金二十一個　信石二錢半　黃丹半兩

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半兩半夏末二錢半共研勻用蒸棗肉爲丸如麻子大露星二宿以硃砂末爲衣每服七丸臨睡用冷茶清送下

喘息方（千金方下同）

治肺實熱胷憑仰息泄氣除熱

石膏八兩　白前　杏仁各三兩　赤蜜七合

橘皮　白朮各五兩　枸杞根皮切二升

右七味㕮咀以水七升煑取二升去滓下蜜煑三沸分三服

又方

治肺熱言音喘息短氣好唾膿血

生地黃切二升　石膏八兩　麻黃五兩　升麻

羚羊角　芒硝各三兩　杏仁四兩　赤蜜一升

淡竹茹雞子大一枚

右九味㕮咀以水七升煑取二升去滓下蜜煑兩沸分三服

橘皮湯

治肺熱氣上欬息奔喘

橘皮　麻黃各三兩　柴胡　乾紫蘇各三兩

宿麥　杏仁各四兩　石膏八兩

右七味㕮咀以水九升煑麻黃兩沸去沫下諸藥煑取三升去滓分三服不瘥與兩劑删繁乾紫蘇作乾藍

又方

治肺熱喘息鼻衄血

羚羊角　元參　射干　雞蘇　芍藥　升麻
蘗皮各三兩　生地黃切二升　梔子仁四兩
淡竹茹雞子大一枚

右十味㕮咀以水九升煑取三升分三服須利者下芒硝三兩更煑三沸

瀉肺散

治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黃腫起卽頭眩欬嗽喘氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或吐膿血胷痛引背支滿欲嘔

五味子　百部各二兩半　茯苓　附子　蓯蓉
當歸　石斛　遠志　續斷各一兩　細辛
甘草各七分　防風　蜀椒　紫菀　桂心
款冬花　乾薑各一兩半　桃仁去皮尖六十枚
杏仁去皮尖三十枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三後稍加至二七

麻黃引氣湯

治肺勞實氣喘鼻張面目苦腫

麻黃　杏仁　生薑　半夏各五分　紫蘇四分

白前　細辛　桂心各三分　廣橘皮二分

石膏八兩　竹葉切一升

右十一味㕮咀以水一斗煑取三升去滓分三服

厚朴湯

治肺勞風虛冷痰澼水氣晝夜不得臥頭不得近枕上氣胷滿喘息氣絕此痰水盛溢

厚朴　麻黃　桂心　黃芩　石膏　大戟

橘皮各二兩　枳實　甘草　秦艽　杏仁

白茯苓各三兩　細辛一兩　半夏製一升

生薑十兩　大棗十五枚

右十六味㕮咀以水一斗三升煑取四升分五服

華蓋散（濟生方下同）

治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡臥或聲音不出者

杏仁去皮尖炒　紫蘇子微炒　麻黃去根節

赤茯苓　橘紅　桑白皮炙各一兩　甘草炙半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分食後溫服

二黃丸

治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃一錢　雄黃一兩

右二味研羅極細鎔黃蠟爲丸如彈子大每服一丸於夜半時熟煑糯米粥乘熱以藥投在內攪轉和粥吃

人參胡桃湯

治胷滿喘急不能睡臥

人參寸許切片　胡桃五箇取肉切片

右件作一服用水一小盞生薑五片煎至七分去滓臨臥溫服

杏仁煎

治久患肺喘欬嗽不已睡臥不得服之即定

杏仁去皮尖　胡桃肉等分

右研爲膏入煉蜜少許丸如彈子大每服一丸或二丸細嚼用薑湯嚥下食後及臨臥服

暴喘欲死方（中藏經）

大黃一兩濕紙裹煨　牽牛二兩炒

右爲末蜜水調二錢立止此方治上熱痰喘若肺虛寒胃冷不可用

黃芩半夏湯（大旨下同）

專治寒包熱兼治表裏

半夏　枳殼　黃芩酒炒　桔梗　紫蘇　麻黃

杏仁　甘草等分

右水二盞薑三片棗一枚煎八分食遠服天寒加桂枝

星半苦蔞丸

治痰喘

南星　半夏　苦蔞仁　香附子　蘿蔔子炒

橘皮　杏仁　皂角灰

右爲末神麯糊丸梧桐子大每服六七十丸薑湯下

神應丹（醫林下同）

治齁哮喘嗽

萊豆一合　人言一錢

右二味入沙鍋內水煑豆爛熟研爲糊焙乾再研爲末神麯糊丸麻子大大人服三十丸小兒十五丸七歲以下六七丸冷茶臨臥送下忌熱物一日

此方神效

大利膈丸

治風痰壅實喘滿欬嗽風氣上攻

牽牛末二兩　青皮　檳榔　皂角炙去皮弦子

半夏泡各一兩　木香二錢半　槐角炒五錢

右爲末薑汁糊丸梧桐子大每服五十丸食後薑湯下

又方

治寒包熱而喘

半夏　枳殼炒　桔梗　片芩炒　紫蘇　麻黃

杏仁　甘草

右水煎服天寒加桂枝

又方

治痰喘

南星　半夏　杏仁　苦蔞子　香附　皂角灰

陳皮去白　蘿蔔子

右爲末神麴糊丸每六七十丸薑湯下

又方

治痰喘

蘿蔔子蒸　皂角各半兩　海粉　南星各一兩

白礬一錢薑汁浸曬乾

右用苦蔞仁薑蜜丸噙化

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急

生甘草不去節　杏仁不去皮尖　麻黃不去節

右各等分每服五錢水一鍾半薑五片煎服

導水丸（子和）

治胃中有實火膈上有稠痰得食則減食已則喘

大黃　黃芩各二兩　生牽牛另研取頭末

滑石各四兩

右爲細末滴水丸梧桐子大每服五十丸臨臥溫

水下

大補元煎（景岳全書下同）

治男婦血氣大壞精神失守喘息危劇等證

人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢

熟地少則二三錢多則二三兩　當歸（泄瀉者去之）

枸杞各二三錢　山茱萸一錢（畏酸者去之）　山藥炒

杜仲各二錢

水二鍾煎七分溫服

右歸飲

凡命門之陽衰陰盛而喘息者宜此方加減主之

山茱萸一錢　製附子一二三錢　山藥炒

枸杞子　杜仲薑製去絲各二錢　炙甘草

肉桂各一二錢　熟地二三錢或加至一二兩

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸丸

治元陽不足或先天稟衰喘息等證

枸杞微炒　菟絲子製　山藥炒　杜仲薑汁炒

鹿膠炒珠各四兩　肉桂二兩漸可加至四兩

大熟地八兩　當歸（便溏勿用）　山萸肉炒各三兩

製附子自二兩漸可加至五六兩

右先將熟地蒸爛杵膏煉蜜爲丸如彈子大每嚼服二三丸以滚白湯送下其效尤速

大營煎

治眞陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛或氣血虛寒心腹疼痛以致喘息等證

當歸二三錢或五錢　枸杞　杜仲各二錢
熟地三五七錢　炙甘草　肉桂各一二錢
牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛喘息此性味平和之方也

當歸　芍藥酒炒　山藥炒　枸杞各二錢
熟地二三錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

貞元飲

治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣道噎塞勢劇垂危者常人但知爲氣急其病在上而不知元海無根虧損肝腎此子午不交氣脫證也

尤爲婦人血海常虧者最多此證宜急用此飲以濟之挽之敢云神劑凡診此證脈必微細無神若微而兼緊尤爲可畏倘庸衆不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危

熟地黃七八錢甚者至一二兩　當歸二三錢

炙甘草一二三錢

水二鍾煎八分溫服

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急等證神效

當歸　半夏　茯苓各二錢　熟地三五錢

陳皮一錢半　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

六安煎

治風寒喘欬及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　杏仁

甘草各一錢　白芥子五七分（老年氣弱不用）

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服若寒

氣盛者多不易散宜加北細莘七八分或一錢

廓清飲

治三焦壅滯喘滿氣道不清小水不利年力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非水等證

枳殼二錢　蘿蔔子生（脹不甚能食者去之）　陳皮各一錢

茯苓連皮　澤瀉各二三錢　大腹皮一二錢

白芥子五七分或一二錢　厚朴一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

玉女煎

治水虧火盛六脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼喘息失血等證如神若大便溏泄者乃非所宜

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　知母

牛膝各錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

單方

傷水喘急因年少飲冷水驚恐所致者大文錢七文洗淨白梅七箇水一鍾同浸三宿空心一呷良久得吐效（仁存方）

肺虛喘急連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯甑內蒸熟研丸梧子大每溫水下一丸（聖濟總錄）

陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭運人參五錢熟附子一兩分作四服每貼以生薑十片流水二盞煎一盞食遠溫服（濟生方）

喘急欲絕上氣鳴息者人參末湯服方寸匕日五六服效（肘後方）

定喘下氣補心腎神祕散用白仙茅半兩米泔浸三宿曬炒團參二錢半阿膠一兩半炒雞䏶胵一兩燒爲末每服二錢糯米飲空心下日二（三因方）

肺熱氣喘生茅根一握㕮咀水二盞煎一盞食後溫服甚者三服止名如神湯（聖惠方）

痰氣哮喘馬蹄香焙研每服二三錢正發時淡醋調下少頃吐出痰涎爲驗（普濟方）

傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升煮一升稍稍飲之（肘後方）

肺濕痰喘甜葶藶炒爲末棗肉丸服（摘元方）

齁喘痰嗽用九尖蓖麻葉三錢飛過白礬二錢以猪肉四兩薄批摻藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以白湯送下名九仙散（子和）

欬嗽痰喘不問年深日近用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩爲末蜜丸彈子大每服一丸白湯化下日一服名無憂丸（普濟方）

肺氣喘急馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盌內拌勻慢火炒乾甘草炙一兩爲末每服一錢水一盞煎六分溫呷或噙之（簡要濟衆方）

痰喘氣急苦蔞二箇明礬一棗大同燒存性研末以熟蘿蔔蘸食藥盡病除（普濟方）

治喘神祕方以猪爪甲二枚燒灰研細入麝香當門子一枚同研細用蠟茶清調下（良方下同）

定喘化涎用猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令烟出火煅赤去火細研入麝香用糯米飮下一錢小兒服半錢

遠年近日喘嗽用皂角不蛀者三大莖刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉一粒合就以麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃爲度劈開去巴豆不用又以好明礬一兩枯過蓖麻子七粒生薑汁和蜜再塗炙前皂角三味同爲末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻每服一錢用柿子乾炙過候冷點入藥內細嚼臨睡服忌熱毒魚鮓鮭鯗油麪酒米酢煎煿熱物

肺經久受寒邪喘急初發則寒從背起冷如氷霜漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐臥不得莫可支吾兩肩聳監曲背努目困憊欲死宜服或未效再服即愈其效如神用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一空入信石一錢令深入在內却以魚入竹筒內外以靑蒿鹽泥固濟候乾火煅竹筒通紅候冷去泥取魚去燒不過者研細入蛤粉三錢研和得所丸如菉豆大朱砂爲衣每服三五丸臨臥用冷沙糖水送下忌熱物一方正喘急時宜服不可多過丸數欲試此藥用猪肺一枚吹脹入此藥數丸於肺脘內頃刻漸瘻方表其功

治喘嗽上氣一切肺喘喘劇甚者效如神用蒲頹葉焙碾爲細末米飲調服二錢上併服取差氣味淸香其實酸澀夏紅可食核如棗核類山茱萸揀葉背白者用江西謂之盧都子（中藏經）

寒痰齁喘用野芫荽汁和酒服即住（集簡方）

喘急欲絕用韭汁飲一升效

久嗽痰喘用蘿蔔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸

蔴子大每服三五十丸時時津燕（集成）

高年氣喘蘿蔔子炒研末蜜丸梧子大每服五十丸白湯下（濟生祕覽）

上氣喘急杏仁桃仁各半兩去皮尖炒研水調生麪和丸梧子大每服十丸薑蜜湯下微利爲度（聖濟總錄）

喘促浮腫小便淋漓用杏仁二兩去皮尖熬研和米煑粥空心吃二合妙（心鏡）

肺熱喘急寒熱往來欲死不堪服藥者用桃皮芫花各一升以水四升煑取一升以故布納汁中取薄胷口溫四肢盈數刻卽止（圖經）

痰喘氣急梨剜空納小黑豆令滿留蓋合住繫定糠火煨熟搗作餅每日食之效（摘元）

上氣喘氣時有欬嗽茶子百合等分爲末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下（聖惠方）

喘嗽齁鮯不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次絕根屢驗（經驗良方）

齁喘痰氣苦丁香三箇爲末水調服吐痰卽止（集驗方）

上氣喘嗽煩熱食卽吐逆用沙糖薑汁等分相和慢煎二十沸每嚥半匙取效

肺病喘息喉中水雞鳴用肥皂莢兩挺酥炙取肉爲末蜜丸豆大每服一丸取微利爲度不利更服一日一服（必效方）

鹽齁痰喘柏樹皮去粗搗汁和飛麪作餅烙熟早辰與兒吃三四箇待吐下鹽涎乃佳如不行熱茶催之（摘元方）

痰喘欬嗽用白蜆殼多年陳者燒過存性爲極細末以米飲調服一錢日三服（急效方）

年深哮喘雞子略敲損浸尿缸中三四日煮食能去風痰（集成）

水氣喘促小便澀用泮牛尿一斗訶黎皮末半斤先以銅器熬尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每茶下二十丸日三服當下水及惡物爲效（普濟方）

痰齁發喘猫頭骨燒灰酒服三錢便止（正傳）

齁哮痰欬猫糞燒灰砂糖湯服一錢（摘要）

上氣喘急故錦一寸燒灰茶服神效（普濟方）

刼喘藥好銅青研細號丹少許炒轉色爲末每服半錢酢調空心服（丹溪）

肺氣喘急用薤白擣汁飲之（聖惠方）

痰喘用桔梗一兩童便半升煎四合去滓溫服

腹脹喘滿用山豆根爲末一錢滾湯調服

喘嗽用殭蠶細茶爲末等分臨臥調服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五卷目錄

醫部彙考二百八十五

哮喘門三

鍼灸

導引

醫案

疸門一

黃帝素問（陰陽應象大論　玉機眞臟論　平人氣象論　通評虛實論）

靈樞經（經脈篇　論疾診尺篇）
張機金匱要略（疸脈證治）
傷寒論（黃疸）
孫思邈千金方（論證）
朱肱活人書（疸病證治）
劉完素六書（論證）
成無己明理論（總論）
李杲十書（病因治病必當求責　兼證用茵陳蒿湯加減例）
朱震亨心法（疸病證治）
羅天益衛生寶鑑（陽證　陰證）
危亦林得效方（論酒疸）
戴思恭證治要訣（五疸證治）
樓英醫學綱目（辨諸黃疸　續法）
李梴醫學入門（疸病證治）
李中梓醫宗必讀（發黃）

藝術典第三百五卷

醫部彙考二百八十五

哮喘門三

鍼灸

素問曰肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太陽之外厥陰內血者

腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者

肺熱病者熱爭則喘欬痛走胷膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

腰痛中熱而喘刺足少陰刺郄中出血

邪客於手陽明之絡令人氣滿胷中喘息而支胠胷中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痏左取右右取左如食項已

靈樞經曰腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背三節五臟之旁以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

氣滿胷中喘息取足太陰大指之端去爪中如韭葉寒則留之熱則疾之氣下乃止

中熱而喘取足少陰膕中血絡

腹滿大便不利腹大亦上走胷嗌喘息喝喝然取足少陰

振埃者陽氣大逆上滿於胷中憤䐜肩息大氣逆上

喘喝坐伏病惡埃烟餲不得息取之天容取天容者無過一里

甲乙經曰頭項痛重暫起僵仆鼻窒鼽衄喘息不得通通天主之

腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通承靈主之

喘逆鼽衄肩甲內廉痛不可俛仰眇季脅引少腹而痛脹噫嘻主之

熱病煩心而汗不止肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胷中熱苦不樂太息喉痹嗌乾

喘逆身熱如火頭痛如破短氣胷痛太陵主之

氣喘熱病衄不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得臥氣滿胷中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐不欲食飲隱白主之

手足寒至節喘息者死

足厥喘逆足下清至膝湧泉主之

寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言頭維主之

肺氣熱呼吸不得臥上氣嘔沫喘氣相追逐胷滿脅

膺急息難振慄脈鼓氣膈胷中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊痛肺俞主之

寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下賁痛心如懸下引臍少腹急痛熱面急目䀮䀮久喘欬少氣溺濁赤腎俞主之

欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫青脈頸有大氣喉痹咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱項腫肩痛胷滿腹皮熱衄氣短哽心痛隱疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁天突主之

肺系急胷中痛惡寒胷滿悒悒然喜嘔膽胷中熱喘逆氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫鬲中食饐不下食喉痹肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿中府主之

欬脅下積聚喘逆臥不安席時寒熱期門主之

胷中彭彭然甚則交兩手而瞀暴痹喘逆刺經渠及天府此謂之大俞

欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通水突主之

欬逆上氣喘不能言華蓋主之

欬逆上氣唾喘短氣不得息口不能言亶中主之

欬逆上氣喘不得息嘔吐胷滿不得飲食俞府主之

欬逆上氣羨出多唾呼吸哮坐臥不安彧中主之

胷滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食神藏主之

胷脅榰滿欬逆上氣呼吸多喘濁沫膿血庫房主之

欬喘不得臥不得坐呼吸氣索嚥不得胷中熱雲門主之

胷中滿不得息脅痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心玉堂主之

胷脅榰滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步郎主之

胷脅榰滿喘滿上氣呼吸肩息不知食味氣戶主之

腹中腸鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱中不嗜食胷脅榰滿喘息而衝鬲嘔心痛及傷飽身黃疾骨羸瘦章門主之

風汗出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺天府主之在腋下三寸臂內動脈之中

消癉善喘氣是喉咽而不能言手足清溺黃大便難

嗌中腫痛吐血口中熱唾如膠太谿主之

欬逆上氣咽喉鳴喝喘息扶突主之

欬逆上氣舌乾脅痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘尺澤主之

欬逆上氣喘不得息暴痹內逆肝肺相傳鼻口出血身脹逆息不得臥天府主之

厥四逆喘氣滿風身汗出而淸髖髀中痛不可得行足外皮痛臨泣主之

千金方曰肺風氣痿絕四肢滿脹喘逆胷滿灸肺腧各二壯肺腧對乳引繩度之在第三椎下兩旁相去各一寸五分

醫學綱目曰哮喘取天突鍼入向下五分瀉五吸亶中三分三呼璇璣三分瀉三吸氣海腧府一分沿皮向外一寸半瀉六吸乳根一分沿皮向外一寸半瀉一吸

五膈氣喘息不止取中脘八分又取期門凡刺腹部氣虛人內息六七口下入丹田閉氣刺之

哮喘灸刺上穴不愈者可選用之膏肓關元中脘三

里百勞胃腧各灸之支溝大陵各刺之
哮喘諸穴選用之天容譩譆氣舍扶突太白以上刺
魄戶中府大包域中雲門石門期門各灸之
氣喘取乳中在乳下肋中針入一分沿皮向後一寸半瀉之

哮喘取興隆三寸半

喘滿痰實口中如膠取太谿

氣促喘取天牢

古今醫統曰氣喘取璇璣在天突下一寸氣海在臍下一寸半

又法取膻中在兩乳折中期門背中骨節第七椎下穴灸三壯立已喘氣神效

導引

保生祕要曰哮喘導引法用手法於十一椎下脊中穴掐之六十四度擦亦如數兼行後功喘自然安

運功以手摩擦兩乳下數遍後擦背擦兩肩定心咽津降氣以伏其喘

氣喘導引法先從中念次以神定之再通散四肢手指而出顧本源爲主

醫案

儒門事親曰一人上喘中滿酢心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢先用獨聖散吐之吐訖次用導水丸禹攻散輕瀉三四行不愈更以利膈丸瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散三和散分理陰陽利水道之藥遂愈

丹溪心法曰予治一婦人五十餘歲素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗如油脈浮而洪似命絕之狀予適在彼速用麥門冬四錢人參二錢五味一錢五

分煎服一貼喘定汗止三貼後痰亦漸少再與前方內加苦蔞仁一錢五分白朮當歸芍藥黃芩各一錢服二十餘貼而安此實麥門冬五味人參之功也如自汗兼腹滿脈沉實而喘者裏實也宜下之

一童年一十四歲哮十日則發一遍此疾在上焦不得汗洩正當九月十月之交宜溫散與小胃丹愈

一人六七月喘不得臥主於肺用麻黃石膏各二錢柴胡桑白皮黃芩各一錢甘草五分服之一汗而愈後以人參五味子桑白皮黃芩甘草遂安

一人痰多喘急用白朮半夏蒼朮香附子各一兩黃芩杏仁各半兩薑汁麪糊丸服愈

衛生寶鑑曰己未歲初秋越三日奉詔至六盤山至八月中霖雨不止時承上命治不鄰吉歹元帥夫人年踰五旬身體肥盛因飲酒吃湩乳過度遂病腹脹喘滿聲聞舍外不得安臥大小便澀滯氣口脈大兩倍於人迎關脈沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱太盛上攻於肺神氣躁亂故爲喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制平氣散以下之一服減半再

服喘愈止有胷膈不利煩熱口乾時時欬嗽以加減瀉白散治之

眞定王君用年一十九歲病積臍左連脅如覆杯腹脹如鼓多青絡脈喘不能臥時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗以危急來求予往視之脈得浮數按之無力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脈虛弱如此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而清便自調雜以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以削劑不月餘良愈先師嘗曰潔古老人云養正積自除譬之滿坐皆君子縱有一小人自無容地而出今令眞氣實胃氣强積自消矣潔古之言豈欺我哉經云大積大聚消其大半而止滿實中有積氣大毒之劑尚不可過況虛中有積者乎此亦治積之一端也邪正虛實宜精審焉

醫學正傳曰東陽一羽士年五十餘素有喘病九月間得發熱惡寒證喘甚脈洪盛似實一醫作傷寒治用小柴胡湯加枳殼陳皮等藥六日後欲行大承氣一醫曰不可當作傷食治宜用枳實導滯丸爭不決

名予視之二醫皆曰脈實氣盛當瀉予爲診後曉之曰此火盛之脈非眞實也觀其短氣不足以息當作虛治用補中益氣湯加麥門冬五味子入附子三分煎服二貼脈收斂四貼而病輕減六貼病痊安

醫學綱目曰有武臣爲寇執置舟中艎板下數日得脫乘饑恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而膈不利一醫作傷食而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高予診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漐漐汗出至晚身凉脈已和矣醫曰某平生不會用仲景方不知其神捷如此

醫宗必讀曰太學朱寧宇在監時喘急多痰可以坐不可以臥可以俯不可以仰惶急求治余曰兩尺獨大而軟爲上盛下虛遂以地黃丸一兩用桔梗三錢枳殼二錢甘草一錢半夏一錢煎湯送下不數劑而安

給諫黃健庵中氣大虛發熱自汗喘急余診之脈大

而數按之如無此內有眞寒外見假熱當以理中湯冷飲舉家無主不能信從惟用清火化痰之劑遂致不起

方伯葉震瀛夫人喘急痞悶肌膚如灼汗出如洗目不得瞑余診之六脈皆大正所謂汗出如油喘而不休絕證見矣辭不治越三日而歿

社友宋敬夫令愛中氣素虛食少神倦至春初忽然喘急悶絕不知人手足俱冷咸謂立斃矣余曰氣虛極而金不清肅不能下行非大劑溫補絕無生理遂以人參一兩乾薑三錢熟附子三錢白朮五錢一服即甦後服人參七斤餘薑附各二斤遂全愈不發

社友孫芳其令愛久嗽而喘凡順氣化痰清金降火之劑幾於遍嘗絕不取效一日喘甚煩躁余視其目則脹出鼻則鼓扇脈則浮而且大肺脹無疑矣遂以越婢加半夏湯投之一劑而減再劑而愈余曰今雖愈未可恃也當以參朮補元助養金氣使清肅令行竟因循月許終不調補再發而不可救藥矣

文學顧明華十年哮嗽百藥無功診其兩寸數而濇

余曰濇者痰火風寒久久盤踞根深蔕固矣須補養月餘行吐下之法半年之間凡吐下十次服補劑百餘遂愈更以補中益氣爲丸加雞子秋石服年許永不復發

本草綱目曰溧陽洪輯幼子病痰喘凡五晝夜不乳食醫以危告其妻夜夢觀音授方令服人參胡桃湯輯急取新羅人參寸許胡桃肉一枚煎湯一蜆殼許灌之喘即定明日以湯剝去胡桃皮用之喘復作仍連皮用信宿而瘳此方不載書册蓋人參定喘胡桃連皮能斂肺故也

薛己醫按曰一武職體魁梧素不闉鑪不喜熱食行則喘促自爲氣實老痰服碑記丸攻之其脈洪數重按全無余謂命門火衰脾肺虛寒與八味丸一服痰喘稍止數服全止遂能親火喜熱飲食蓋碑記丸出自西域人所製者經云西域水土剛强其民不衣而褐薦華邑而脂肥故邪不能傷其形體其病生於內其治宜毒藥由此觀之恐不可槩用也

職方盧抑齋飲食素少忽痰壅氣喘頭搖目劄揚手

擲足難以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土如小兒慢驚之證先用六君柴胡升麻而安以補中益氣加半夏而痊

一儒者體肥仲夏患痰喘用二陳芩連桔梗痰喘益甚加桑皮杏仁苦蔞盜汗氣促加貝母枳殼不時發熱飲食漸減脈大而無力余以爲脾肺虛寒用八味地黃丸以補土母用補中益氣湯以接中氣而愈

疸門一

黃帝素問

陰陽應象大論

中央生濕濕生土土生甘甘生脾在色爲黃

註　黃中央土色也

玉機眞臟論

風者百病之長也今風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱當是之時可汗而發也或痹不仁腫痛當是之時可湯熨及火灸刺而去之弗治肝傳之脾

病名曰脾風發癉腹中熱煩心出黃

註 發癉濕熱發外也腹中熱煩心出黃熱在內也

平人氣象論

溺黃赤安臥者黃疸已食如饑者胃疸目黃者曰黃疸

註 此以視疾而知其病也

通評虛實論

黃帝曰黃疸暴痛癲疾厥狂久逆之所生也

註 黃疸者濕熱內鬱而色病見於外皆陰陽五行之氣久逆不和之所生也

靈樞經

經脈篇

脾足太陰之脈是主脾所生病者溏瘕泄水閉黃疸

註 脾家實也

腎足少陰之脈是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸

註 夫腎主藏精如主腎所生之病則精液不能上滋而爲口熱舌乾嗌痛煩心心痛黃疸諸證蓋水

不上濟則火盛於上矣

論疾診尺篇

身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也安臥小便黃赤脈小而濇者不嗜食

註 土灌於四臟身痛病見於肉也色黃病見於皮也齒垢黃病見於骨也爪甲上黃病見於筋也黃疸脾家病也脾病故解㑊安臥小腸爲赤腸心之腑也心主血脈小便赤黃脈小而澀病見於脈也小便赤黃下焦熱也不嗜食者上焦虛也

漢張機金匱要略

疸脈證治

疸病篇曰寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行

趺陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲滿尺脈浮爲傷腎趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞

疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之

酒疸心中熱欲吐者吐之愈

酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

師曰病黃疸發熱煩喘胷滿口燥者以病發時火刼其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之

脉沈渴欲飲水小便不利者皆發黃

腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家

黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上瘥反劇

爲難治

疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也

穀疸之爲病寒熱不食食卽頭眩心胷不安久久發黃爲穀疸茵陳蒿湯主之

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之

酒黃疸心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之

諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加黃芪湯主之

諸黃猪膏髮煎主之

黃疸病茵陳五苓散主之

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃硝石湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

諸勞腹痛而嘔者宜柴胡湯當爲小柴胡湯男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

水氣篇曰裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加术湯主之

傷寒論

黃疸

太陽篇曰太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

太陽病中風以火刼發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軺赤小豆湯主之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

陽明篇曰脉浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者爲陽明病也傷寒轉繫陽明者其人濈然微汗出也

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來

大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤脈多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便淸穀熱多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之小便難者爲危殆

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

唐孫思邈千金方

論證

疸有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗者身體四肢微腫胷滿不渴汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱以冷水洗之熱因流胃中食生黃瓜熏上所致若成黑疸者多死穀疸者食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣衝熏所致酒疸者心中懊憹足脛滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風而致女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接竟入水所致

濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如豘肝狀其小腹滿者急下之

宋朱肱活人書

疸病證治

問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快曰此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕流關節須身體煩痛其脈沉緩爲中濕主一身盡痛發熱身黃小便自利者朮附湯若小便不利大便反快當利其小便宜甘草附子湯五苓散主之

病人寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃然發黃與瘀血外證及脈俱相似但小便不利爲黃小便自利爲瘀血要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脈必浮滑而緊數若瘀血證即如狂大便必黑此爲異耳凡病人身體發熱頭面汗出身無汗劑頸而止渴飲水漿小便不利如此必發黃茵陳蒿湯加五苓散也病人服湯得小便利如皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也

古人云治濕不利小便非其治也梔子蘗皮湯麻黃連翹赤小豆湯可選而用之又方傷寒欲發黃者急用瓜蔕末口含水搐一字許入鼻中出黃水甚驗即用茵陳蒿湯調五苓散服之最良

又問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱越白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也

又問太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何曰此太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

又問病人脈弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時欬嗽者何也曰此少陽中風也小柴胡湯主之

金劉完素六書

論證

食已如饑胃熱能消穀陽明脈絡心火上行心憎煩

面黃小便赤澀也茯苓加減湯主之

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如杯久不愈令人四肢不收發黃疸食不爲肌膚

按仲景云但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者身必發黃也此爲怫熱在表燥而無汗濕熱在裏氣甚不能散越於外則濕熱之氣鬱甚而上行以至頭面陽極之分則濕熱蒸爲微汗而頸下無汗然濕熱不能自然宣通散越於周身故濕熱鬱之極甚而面目徧身發黃色也故白虎湯證徧身自汗者仲景謂之散越不發黃也小便不利者濕熱發黃之證也或小便自利或狂或大便黑者瘀血證也發黃亦有讝妄者本所不言以黃證未明故不須言也世俗有傳烙黃而或愈者此强實之人素本中氣不衰而及濕熱鬱之微者烙之而誤中强刦開發得開氣血宣通卽作汗而愈或體質本虛濕熱結甚則刦發不開而反致死者不爲少矣莫若仲景法對證以藥治之則免致强刦不開而反悞人生命也及夫近世妄傳有寒極陰黃而內外極救其陽爲害多矣設

若病微而悞中開發得愈亦已鮮矣而傷生者不可勝言也大抵凡諸黃者有二一則濕熱氣鬱而黃萬物皆然又如麥秀而雲雨濕熱過極則黃疸者也及水潦而天氣濕熱則草木將死而色變黃者也或病血液衰則虛燥熱太甚而身面痿黃者猶亢旱而草木痿黃也夫病燥熱而黃者當退熱潤燥而已此傷寒濕熱極甚而發黃者開結退熱雙利大小腑以除水濕則利和而愈也

結胷而發黃者茵陳同陷胷湯各半服下之或悞服巴豆熱毒丸藥下之反損陰氣遂協熱利不止而發黃者同大承氣各半服下之亦有協熱利不止更或結胷而發黃者用茵陳五分同陷胷湯三分大承氣二分以下之或兩感發黃者本方加黃連解毒湯一服急下之或頭微汗小便利而微黃者濕熱微也宜梔子蘗皮湯發黃甚者茵陳合三一承氣湯

陽明病表熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身體發黃其候但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者身體發黃宜茵陳湯調下五苓

散

寒濕搏而發黃者色如苔膏也本傷寒失下或誤汗之温之灸之熨之或服銀粉巴豆大毒熱藥下之反以亡液損其陰氣邪熱轉甚或下太早熱入以成結胷但發黃者或失下寒涼調治或熱極本惡雖按法治之而不能退其熱勢之甚者或下後熱不退皆能爲發黃也大抵本因熱鬱極甚者留飲不散濕熱相搏而以术附湯主之悞矣

成無己明理論

總論

傷寒發黃何以明之經曰濕熱相交民當病癉癉者黃也單陽而無陰者也傷寒至於發黃爲疾之甚濕熱盛者則發黃內熱已盛復被火者亦發黃也邪風被火熱兩陽相熏灼其身必發黃陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃是由內有熱而被火致發黃者也陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃是由陽明熱盛致發黃者也傷寒發汗已身目爲黃所以然者寒濕在裏不解故也以爲不可下也於

寒濕中求之是由寒濕致發黃者也濕亦令黃熱亦令黃其能辨之乎二者非止根本有異而色澤亦自不同濕家之黃身黃如烟熏黃雖黃而色暗不明至於濕盛之黃必身黃如橘子色甚者勃勃出染著衣正黃如蘗汁是其正黃色也由此觀之濕之與熱豈不異哉大抵黃家屬太陰太陰者脾之經也脾者土黃爲土色脾經爲濕熱蒸之則色見於外必發身黃也經曰傷寒脉浮緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰當發身黃者是矣熱雖內盛若已自汗出小便利者則不能發黃必也頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃黃家爲熱盛而治法亦自有殊傷寒八九日身如橘子色小便不利少腹滿者茵陳蒿湯主之此欲泄滌其熱也傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之此欲解散其熱也傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之此欲解散其熱也此數者泄滌解散乃爲之不同亦皆析火徹熱之劑也一或身黃脈沉結少腹鞕而小便自利其人如狂者又爲畜血在下焦使之黃也必

須抵當湯下之而愈黃家既是病之已極是以有不治之者多矣非止寸口近掌無脈鼻氣出冷爲不治之疾又若形體如烟熏直視摇頭者是爲心絕環口黧黑柔汗發黃是爲脾絕皆不治之診

元李杲十書

病因

其證爲風寒所傷陽氣下陷入於內而排寒水上行於經絡之間本當發汗因以徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合而生黃也

問五苓散當服不服則生何證答曰當服不服則穀消水去形亡必就陽明燥火聚胃發黃故有調胃湯證此太陽入本失下也由不曾服五苓散若熱在中焦未入太陽之本小便自利而清是津液已行若與五苓散利之是重涸腎水也不惟重涸腎水酒毒之熱亦不能去故上下不通而溺澀則爲發黃也若入血室則爲畜血也

治病必當求責

假令治病無問傷寒畜血結胷發黃等證并一切雜

證各當於六經中求責之如發黃證或頭痛腰脊强惡寒卽太陽證也或身熱目疼鼻乾不得臥卽有陽明證也餘皆倣此

兼證用茵陳蒿湯加減例

小便不利煩躁而渴加茯苓猪苓滑石當歸官桂（韓氏名茵陳茯苓湯）

煩躁喘嘔不渴加陳皮白朮半夏生薑茯苓（韓氏名茵陳陳皮湯）

四肢徧身冷者加附子甘草（韓氏名茵陳附子湯）

肢體逆冷腰上自汗加附子乾薑甘草（韓氏名茵陳薑附湯）

身冷汗不止者加附子乾薑（韓氏名茵陳附子湯）

前藥服已脉尚伏加吳茱萸附子乾薑木通當歸（韓氏名茵陳茱萸湯）

韓氏立名爲茵陳茯苓湯茵陳橘皮湯小茵陳湯茵陳四逆湯茵陳附子湯茵陳茱萸湯大抵只是仲景陰證藥內加茵陳也用者要當識之

朱震亨心法

疸病證治

疸不分其五同是濕熱如盦麴相似輕者小溫中丸重者大溫中丸熱多加芩連濕多者茵陳五苓散加食積藥濕熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪加山梔茵陳甘草

戴云五疸者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量其虛實下其食積其餘但利小便爲先小便利白其黃則自退矣

黃疸乃脾胃經有熱所致當究其所因分利爲先解毒次之諸疸口淡怔忡耳鳴腳軟微寒發熱小便白濁此爲虛證治宜四君子湯吞八味丸不可過用凉劑強通小便恐腎水枯竭久而面黑黃色及有渴者不治不渴者可治

黃疸通身面目悉黃宜生料五苓散加茵陳又宜小柴胡加茵陳茯苓枳實加少朴硝濟生茵陳湯千金方東引桃根細者煎空心服

穀疸食已頭眩心中怫鬱不安饑飽所致胃氣蒸衝而黃宜小柴胡加穀芽枳實厚朴山梔大黃濟生穀疸丸

酒疸身目黃心中懊憹足脛滿尿黃面黃而赤斑酒過胃熱醉臥當風水濕得之小柴胡加茵陳豆豉大黃黃連葛粉脈微數面目青黑或大便黑三因白朮散脈弦澀三因當歸白朮散濟生五苓加葛根湯

女勞疸因房事後爲水濕所搏故額黑身黃少腹滿急小便不利以大麥一撮同滑石石膏末各一錢煎服

黃汗者因脾胃有熱汗出入水澡浴所致故汗出黃染衣而不渴濟生方黃芪散茵陳湯又以苦丁香如豆大深吸鼻中出黃水差

發黃脈沉細遲四肢逆冷自汗不止宜茵陳四逆湯

羅天益衛生寶鑑

陽證

身熱不大便發黃者治用仲景茵陳蒿湯身熱大便如常小便不利而發黃者治用茵陳五苓散身熱大小便如常而發黃者治用仲景梔子蘗皮湯加茵陳

陰證

皮膚凉又煩熱欲臥水中喘嘔脈沉細遲無力而發

黃者治用茵陳四逆湯皮膚冷心下硬按之痛身體重背惡寒目不欲開懶言語自汗小便利大便了而不了脈緊細而發黃者治用茵陳四逆湯遍身冷面如桃李枝色腹滿小便澀關尺脈沉細遲而發黃者治法先用茵陳茯苓湯以利其小便次用茵陳四逆湯加當歸木通

危亦林得效方

論酒疸

五疸之中惟酒疸變證最多蓋酒之爲物隨人性量不同有盈石而不醉者有濡脣而輒亂者以醞釀而成有人熱毒滲入百脈不止發黃而已溢於皮膚爲黑爲腫流於淸氣道中則眼黃鼻鼽種種不同也

明戴思恭證治要訣

五疸證治（附面黃）

黃疸大略有五黃脾土色也脾臟受傷故病見於外通身面目悉黃並宜生料五苓散加茵陳或五苓散平胃散各半貼名胃苓散黃汗因脾胃有熱汗出入水澡浴所致故汗黃色染衣只宜前藥黃疸因酒食

過度臟腑極熱復爲風濕所搏結滯不散濕熱鬱蒸故通身眼目俱黃或發寒熱亦宜前藥酒疸因飲酒過傷而黃俗名爲酒黃宜乾葛煎湯或梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓飲加乾葛一錢

飲酒即睡酒毒熏肺脾土生肺金肺爲脾之子子移病而尅於母故黃又肺主身之皮膚肺爲酒毒熏蒸故外發於皮而黃此二說故通法當合脾肺而治宜藿枇飲

穀疸因傷饑飽胃氣熏蒸而黃食即眩運宜紅丸子傷脾致疸已見之前黃疸證下有暑毒傷脾小便不利亦能成疸煎茆花湯調五苓散

諸失血後多令面黃蓋血爲榮面色紅潤者血榮之也血去則面見黃色譬之草木春夏葉綠遇秋葉黃潤與燥之別也宜養榮湯枳歸湯十全大補湯妨食者四君子湯加黃芪扁豆各一錢或異攻散加此二味亦得亦有偏身黃者但黃不及耳目

病瘧後多黃蓋瘧謂之脾寒脾受病故色見於面宜理脾爲先異攻散加黃芪扁豆各半錢諸病後黃者

亦宜

農民黃疸病因飽作勞脾氣不舒宜楊法師勝金丸

樓英醫學綱目

辨諸黃疸

內傷黃疸因勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只用建中理中大建中足矣

食勞疳黃一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日爲期食勞黃者宿病也至有久不愈者

目黃經云目黃者曰黃疸然亦有目黃而身不黃者風氣自陽明入胃循脈而上至目眥其人肥風氣不得外泄則爲熱中而目黃

黑疸面痝然浮腫脊痛不能正立其色炲黑多汗惡風者屬風

辨色法色如烟熏黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病也一身不痛

續法

傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵

之多變此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳橘皮湯加薑朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳薑附湯六則茵陳吳茱萸湯傷冷中寒脈弱氣虛變爲陰黃仲景理中湯加茵陳服之往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之結胸發黃太陽附本也以結胸法治之痞氣發黃太陰附本也以痞法治之

李梴醫學入門

疸病證治

濕疸濕卽水也東南窳下風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕在經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛在臟腑則清濁混而大便濡泄小便反澀腹或脹滿濕熱搏則遍身黃如熏色輕者面目微黃而已誤下則爲喘噦誤汗則發痓而死惟利小便爲佳五苓散除濕湯主之小便不利大便反快者甘草附子湯二便利不發黃者朮附湯身痛鼻塞者黃芪建中湯中氣堅滿癃閉者枳朮湯加葶藶發黃見後

黃證俱口渴而頭汗畜熱發者則溺澀而大腹膨脹

畜血發者則溺清而小腹急結經曰濕熱相交民病癉癉卽黃也單陽而無陰也傷寒發黃雖不一皆因內熱而誤用溫藥或被火攻太甚或失汗下與滲以致陽明經中血熱而見眞色於肌膚謂之瘀熱發黃

頭汗作渴小便不利色黃而明茵陳湯茵陳三物湯陶氏茵陳湯

有濕熱鬱而發黃者身痛發熱色黃而晦茵陳五苓散有寒濕發黃者太陽病寒濕在裏發汗過則寒去而濕在麻黃連軺赤小豆湯

身痛鼻塞者急用後瓜蒂搐鼻法內服茵陳五苓散

頭痛甚者神术散加茵陳

有中濕發黃者一身盡痛誤汗則眼目俱黃茵陳五苓散梔子蘗皮湯防己黃芪湯

身體煩疼者麻黃湯加蒼术

有傷風發黃者易飢鼻乾腹痛潮熱欬嗽小柴胡加茵陳如噦加茯苓甚者用大柴胡下之

往來寒熱者小柴胡加山梔茵陳

有內傷中寒發黃者脾胃素虛或傷冷物停滯不散

或嘔逆腹滿或大便自利理中湯加茵陳枳實青皮腹脹食不敢飽欲作穀疸者五苓散加茵陳

有陰證發黃者四肢逆冷脈沈或陰盛發躁四逆湯加茵陳

有結胷發黃者心胷滿鞕按之痛不可近大陷胷湯加茵陳

有痞氣發黃者心下滿鞕按之不痛半夏瀉心湯加茵陳痞結消則黃自愈

大抵發黃與治濕相似輕則滲利和解重則大下水利黃自退矣非但寸口無脈鼻氣冷爲不治形變烟熏黑色搖頭直視環口黧黑柔汗發黃脾臟氣絕也

凡初發黃先以口含水用瓜蔕末一字搐入鼻中吐出黃水內服茵陳五苓散或酒蒸黃連丸外用生薑同茵陳搗爛遍身擦之

諸發黃皆小便不利惟瘀血發黃小便自利且瘀血與瘀熱外證俱頭汗作渴脈浮數但熱結下焦則熱耗津液而小便不利血結下焦則熱但耗血而不耗津液故小便自利治詳血門瘀血證中

治疸表證小柴胡湯微汗之表少裏多者茵陳五苓散滲之半表裏者梔子蘗皮湯茵陳三物湯一清飲子和之裏急者茵陳湯下之就中尤以滲利爲妙通用五苓散濕多倍茵陳食積加三稜莪朮砂仁神麯熱加芩連草龍膽小便不利加山梔胃弱合平胃散去厚朴加茵陳黃連山梔防己枳實

李中梓醫宗必讀

發黃

發熱一身盡痛面目俱黃太陽中濕連翹赤小豆湯熱不去瘀血在裏而黃小便微利麻黃連翹赤小豆湯往來寒熱一身盡痛發黃小柴胡加梔子湯發熱頭汗渴欲飲水小便利大便快發黃五苓散加茵陳湯小便不利四肢沉重似瘧不欲飲茵陳五苓散傷冷脈虛小便如常變爲陰黃理中加茵陳湯下之太過脾虛津竭飲水自傷此陰濕變黃茵陳茯苓湯茵陳四逆湯

按黃者中央戊己之色故黃疸多屬太陰脾經脾不能勝濕復挾火熱則鬱而生黃譬之盦麴相似以濕

物而當暑月又加覆蓋濕熱相搏其黃乃成然濕與熱又自有別濕家之黃色暗不明熱家之黃色光而潤亦有脾腎虛寒脈沉而細身冷自汗瀉利溺白此名陰黃茵陳薑附湯理中湯八味丸汗出染衣色如蘗汁此名黃汗黃芪湯芪芍桂苦酒湯挾表者脈浮汗之而愈桂枝加黃芪湯挾裏者腹脹下之而安大黃硝石湯食傷有穀疸之名茯苓茵陳梔子湯酒傷有酒疸之名葛花解酲湯加茵陳葉若夫御女勞傷則膀胱急而小便自利微汗出而額上色黑手足心熱發以薄暮加味四君子湯東垣腎疸湯統言疸證清熱導濕爲之主方茯苓滲濕湯假令病久脾衰胃薄必以補中參术健脾湯

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六卷目錄

醫部彙考二百八十六

疸門二

喩昌醫門法律　黃癉　律三條

張介賓景岳全書　論證　論治

陳士鐸石室祕籙　黃疸

方

猪膏髮煎　小建中湯　小半夏湯　小柴胡湯　越婢加朮湯　抵當湯　麻黃連軺赤小豆湯　麻黃湯　五苓散　大黃硝石湯　大陷胷湯　茵陳蒿湯　大建中湯　茋芎

桂苦酒湯　桂枝加黃芪湯　黃芪湯　茵陳
五苓散　加減五苓散　穀疸丸　茯苓茵陳
梔子湯　陶氏茵陳湯　梔子大黃湯　葛根
湯　藿枇飲　當歸白朮湯　白朮湯　硝石
散　加味四君子湯　滑石散　腎疸湯　茯
苓滲濕湯　參朮健脾湯　當歸秦艽散　麻
黃醇酒湯　黃連散　搐鼻瓜蔕散　茵陳附
子乾薑湯　秦艽湯　鍼砂丸　梔子蘗皮湯
　大茵陳湯　茵陳梔子黃連三物湯　山茵
陳散　小溫中丸　大溫中丸　煖中丸　石
膏散　秦艽飲子　茵陳大黃湯　茵陳梔子
湯　茵陳茯苓湯　茵陳橘皮湯　茵陳附子
湯　茵陳四逆湯　茵陳薑附湯　茵陳吳茱
萸湯　瘴疸丸　茵陳瀉黃湯　濟生茵陳湯
　退黃散　退黃丸　褪金丸　綠礬丸　疸
方　又方　四寶丹　逍遙散　紅丸子　六
味地黃丸　異攻散　葛花解醒湯　如神散
　石膏茵陳散　必效散　茯苓加減湯　棗

子綠礬丸　五疸搐鼻方　大黃丸　五疸方
　三黃散　秦椒散　又方　黃疸湯　黃疸
丸　大黃黃蘗湯　茵陳丸　急黃方　風疸
方　梔子枳實豉大黃湯　凝水石散　茯苓
丸　半夏湯　牛膽丸　大茵陳湯　茵陳丸
　犀角散　養勞湯　穀芽枳實小柴胡湯
紫金丹　小茵陳湯　五福飲　柴苓煎　柴
苓湯　左歸飲　右歸飲　大分清飲　茵陳
飲　理陰散　溫胃飲　壽脾煎　五君子煎

藝術典第三百六卷

醫部彙考二百八十六

疸門二

醫門法律（臣喻昌著）

黃癉

經言溺黃赤安臥者癉病溺黃赤者熱之徵也安靜嗜臥者濕之徵也所以有開鬼門潔淨府之法開鬼門者從汗而泄其熱於肌表也潔淨府者從下而泄其濕於小便也此特辨明定治之大端而精微要妙

惟金匱有獨晣焉要知外感發黃一證傷寒陽明篇中已悉金匱雖舉外感內傷諸黃一一發其底蘊其所重尤在內傷茲特詳加表章爲後學法程焉

金匱論外感熱鬱於內而發黃之證云寸口脈浮而緩浮則爲風緩則爲痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行其義取傷寒風濕相搏之變證爲言見風性雖善行纔與濕相合其風卽痺而不行但鬱爲瘀熱而已及鬱之之極風性乃發風發遂挾其瘀熱以行於四肢而四肢爲之苦煩顯其風淫末疾之象挾其瘀熱以行於肌膚而肌膚爲之色黃顯其濕淫外漬之象其脈以因風生熱故浮因濕成痺故緩此而行內經開鬼門潔淨府之法俾風挾之熱從肌表出濕蒸之黃從小便出而表裏分消爲有據也

金匱重出傷寒陽明病不解後成穀癉一證云陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀癉雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也此因外感陽明胃中之餘熱未除故食難用飽飽則食復生熱兩熱相合而發煩頭眩小便難腹滿勢所必至

在陽明證本當下陽明而至腹滿尤當急下獨此一證下之腹滿必如故非但無益反增困耳以其脈遲而胃氣空虛津液不充其滿不過虛熱內壅非結熱當下之比金匱重出此條原有深意見脈遲胃虛下之既無益而開鬼門潔淨府之法用之無益不待言矣嘗憶一友問仲景云下之腹滿如故何不立一治法予曰仲景必用和法先和其中後乃下之友曰何以知之予曰仲景云脉遲尚未可攻味一尚字其當攻之旨躍然金匱又云諸黃腹痛而嘔者用小柴胡湯觀此仍是治傷寒邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之之法是以知之耳陳無擇治穀癉用穀芽枳實小柴胡湯差識此意但半消半和半下三法並用漫無先後較諸仲景之絲絲必貫相去遠矣

金匱又云趺陽脈緊而數數則爲熱熱即消穀緊則爲寒食即爲滿尺脈浮爲傷腎趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀癉此論內傷發黃直是開天闢地未有之奇東垣脾胃論

彷彿什一後世樂宗金匱奧義置之不講殊可慨也請細陳之人身脾胃居於中土脾之土體陰而用則陽胃之土體陽而用則陰兩者和同則不剛不柔胃納穀食脾行穀氣通調水道灌注百脈相得益彰其用大矣惟七情饑飽房勞過於內傷致令脾胃之陰陽不相協和胃偏於陽無脾陰以和之如造化之有夏無冬獨聚其熱而消穀脾偏於陰無胃陽以和之如造化之有冬無夏獨聚其寒而腹滿其人趺陽之脉緊寒數熱必有明徵診其或緊或數而知脾胃分主其病診其緊而且數而知脾胃合受其病法云精矣然更有精焉診其兩尺脈浮又知並傷其腎夫腎脈本沉也胡以反浮蓋腎藏精者也而精生於穀脾不運胃中穀氣入腎則精無裨而腎傷故沉脈反浮也知尺脈浮爲傷腎則知趺陽脈緊卽爲傷脾然緊乃肝脈正仲景所謂緊乃弦狀若弓弦之義脾脈舒緩受肝木之尅賊則變緊肝之風氣乘脾聚之寒氣兩相搏擊食穀卽眩是穀入不能長氣於胃陽而反動風於脾陰卽胃之聚其熱而消穀者亦不過蒸爲

腐敗之濁氣而非精華之清氣矣濁氣由胃熱而下流入膀胱則膀胱受其熱氣化不行小便不通一身盡黃濁氣繇脾寒而下流入腎則腎被其寒而尅賊之餘其腹必滿矣究竟穀癉由胃熱傷其膀胱者多由脾寒傷其腎者十中二三耳若飲食傷脾加以房勞傷腎其證必腹滿而難治矣仲景於女勞癉下重申其義曰腹如水狀不治豈不深切著明乎

女勞癉額上黑謂身黃加以額黑也黑爲北方陰晦之色乃加於南方離明之位此必先有胃熱脾寒之濁氣下流入腎益以女勞無度而後成之其繇來自非一日肘後謂因交接入水所致或有所驗然火炎薪燼額色轉黑雖不入水其能免乎故脾中之濁氣下趨入腎水土互顯之色但於黃中見黑滯耳若相火從水中上炎而合於心之君火其勢燎原烟焰之色先透於額乃至微汗亦隨火而出於額心之液且外亡矣手足心熱內傷皆然日暮陽明用事陽明主闔收斂一身之濕熱疾趨而下膀胱因而告急其小便自利大便黑時溏又是膀胱畜血之驗腹如水狀

實非水也正指畜血而言也故不治

酒癉心中懊憹而熱不能食時欲吐酒爲濕熱之最氣歸於心肺味歸於脾胃久積之熱不下行而上觸則生懊憹痞塞中焦則不能食其濕熱之氣不下行而上觸則爲嘔嘔則勢轉橫逆遍積周身也傷寒論謂陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃是知熱甚於內者皆足致此非獨酒矣

金匱治酒癉用或吐或下之法云酒黃癉必小便不利其候心中熱足下熱是其證也又云或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之又云心中熱欲嘔者吐之愈又云心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之又云下之久久爲黑癉言雖錯出義實一貫蓋酒之積熱入膀胱則氣化不行必小便不利積於上焦則心中熱積於下焦則足下熱其無心中足下熱者則靖言了了而神不昏但見腹滿欲吐鼻燥三證可知其膈上與腹中陰陽交病須分先後治之當辯脈之浮沉以定吐下之先後脈浮病在膈上陽分居多先吐上焦而後治其中滿脈沉弦

病在腹中陰分居多先下其中滿而後治其上焦若但心中熱欲嘔則病全在上焦吐之卽愈何取下爲哉其酒熱內結心神昏亂而作懊憹及痛楚者則不可不下但下法乃刼病之法不可久用久下之必脾肺之陽氣盡傷不能統領其陰血其血有日趨於敗而變黑耳曾謂下法可瀆用乎仲景於一酒癉臚列先後次第以盡其治其精而且詳若此

酒癉之黑與女勞癉之黑殊不相同女勞癉之黑爲腎氣所發酒癉之黑乃榮血腐敗之色榮者水穀之精氣爲濕熱所瘀而不行其光華之色轉爲晦黯心胷嘈雜如噉蒜虀狀其芳甘之味變爲酸辣乃至肌膚抓之不仁大便正黑脈見浮弱皆肺金節治之氣不行而血瘀也必復肺中清肅之氣乃可驅榮中瘀濁之血較女勞癉之難治特一間耳方書但用白朮湯理脾氣解酒熱以言治抑何庸陋之甚耶

黃癉由於火土之熱濕若合於手陽明之燥金則濕熱燥三氣相摶成黃其人必渴而飲水有此則去濕熱藥中必加潤燥乃得三焦氣化行津液通渴解而

黃退渴不解者燥有未除耳然非死候也何又云癉而渴者難治則更慮其下泉之竭不獨云在中之津液矣

律三條

黃癉病得之外感者誤用補法是謂實實醫之罪也

黃癉病得之內傷者誤用攻法是謂虛虛醫之罪也

陰癉病誤從陽治襲用苦寒倒行逆施以致極重不返者醫殺之也

陰癉無熱惡寒小便自利脈遲而微誤開鬼門則肌膚冷鞕自汗不止誤潔淨府則膀胱不約小便如奔死期且在旦暮況於吐下之大謬乎即以平善之藥遷延亦爲待斃之術耳在半陰半陽之證其始必先退陰伏陽陰退乃從陽治若以附子黃連合用必且有害奈何純陰無陽輒用苦寒耶

景岳全書

臣張介賓著

論證

黃疸證古人多言爲濕熱及有五疸之分皆未足以盡之而不知黃之大要有四曰陽黃曰陰黃曰表邪

發黃曰膽黃也知此四者則黃疸之證無餘義矣丹溪曰疸不必分五種同是濕熱如盦麴相似豈果皆如盦麴悉可謂之濕熱耶弗足憑也愚列如左

陽黃證因濕多成熱熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其證必有身熱有煩渴或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澀或大便祕結其脈必洪滑有力此證不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致之但察其元氣尚強脾胃無損而濕熱果盛者直宜清火邪利小便濕熱去而黃自退治此者本無難也

陰黃證則全非濕熱而總由血氣之敗蓋氣不生血所以血敗血不華色所以色敗凡病黃疸而絕無陽證陽脈者便是陰黃陰黃之病何以致之蓋必以七情傷臟或勞倦傷形因致中氣大傷脾不化血故脾土之色自見於外其爲病也必喜靜而惡動喜暗而畏明凡神思困倦言語輕微或怔忡眩運畏寒少食四肢無力或大便不實小水如膏及脈息無力等證悉皆陽虛之候此與濕熱發黃者反如冰炭使非速救元氣大補脾腎則終無復元之理且此證最多若

或但見色黃不察脈證遂云黃疸同是濕熱而治以茵陳梔子瀉火利水等劑則無有不隨藥而斃者表邪發黃卽傷寒證也凡傷寒汗不能透而風濕在表者有黃證或表邪不解自表傳裏而濕熱鬱於陽明者亦有黃證表邪未解者必發熱身痛脈浮少汗宜從汗散濕熱內鬱者必煩熱脈緩滑多汗宜從分消清利若陽明實邪內鬱而痞結脹滿者宜先下之然後清其餘熱則自無不愈

膽黃證凡大驚大恐及鬬毆傷者皆有之嘗見有虎狼之驚突然喪膽而病黃者其病則驟有酷吏之遭或禍害之慮恐怖不已而病黃者其病則徐如南北朝齊永明十一年有太學生魏準者因惶懼而死舉體皆青時人以爲膽破卽此之類又嘗見有鬬毆之後日漸病黃者因傷膽而然其證則無火無濕其人則昏沉困倦其色則正黃如染凡此數證皆因傷膽蓋膽傷則膽氣敗而膽液泄故爲此證經曰膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽義猶此也且膽附於肝主少陽春生之氣有生則生無生則死故經曰

凡十一臟皆取決於膽者正以膽中生氣爲萬化之元也若此諸證皆以膽傷膽傷則生氣敗生氣既敗其能生乎所以凡患此者多致不救然當察其氣之微甚速救其本猶可挽囘而煉石補天之權則操之醫之明者

黃疸大法古有五疸之辨曰黃汗曰黃疸曰穀疸曰酒疸曰女勞疸總之汗出染衣色如蘗汁者曰黃汗身面眼目黃如金色小便黃而無汗者曰黃疸因飲食傷脾而得者曰穀疸因酒後傷濕而得者曰酒疸因色慾傷陰而得者曰女勞疸雖其名目如此然總不出陰陽二證大都陽證多實陰證多虛虛實弗失得其要矣

黃疸難治證凡寸口無脈鼻出冷汗形如烟熏搖頭直視環口黧黑油汗發黃久之變黑者皆難治

論治

陽黃疸多以脾濕不流鬱熱所致必須清火邪利小水火清則溺自清溺清則黃自退輕者宜茵陳飲大分清飲梔子蘗皮湯之類主之若閉結熱甚小便不

利腹滿者宜茵陳蒿湯梔子大黃湯之類主之

陰黃證多由內傷不足不可以黃爲意專用清利但宜調補心脾腎之虛以培血氣血氣復則黃必盡退如四君子湯五君子煎壽脾煎溫胃飲之類皆心脾之要藥也若六味丸八味丸五福飲理陰煎及左歸右歸六味回陽等飲皆陰中之陽虛者所宜也若元氣虛不至甚而兼多寒濕者則以五苓散四苓散或茵陳五苓散之屬加減用之亦可

傷寒發黃凡表邪未清而濕熱又盛者其證必表裏兼見治宜雙解宜柴苓湯或茵陳五苓散主之或內熱甚而表邪仍在者宜柴苓煎主之若但有濕熱內實脹閉等證而外無表邪者宜茵陳蒿湯主之若因內傷勞倦致染傷寒者亦多有發黃之證但察其本無濕熱實邪等證即當以陰黃之法調補治之或用韓祗和法亦可若但知攻邪則未有不敗故孫眞人曰黃疸脈浮者當以汗解之宜桂枝加黃芪湯此即補虛散邪之法也外傷寒門別有正條所當並察

膽黃證皆因傷膽而然膽既受傷則臟氣之損敗可

知使非修葺培補則必致決裂故凡遇此等證候務宜大用甘溫速救元氣然必察其所因之本或兼酸以收其散亡或兼澀以固其虛脫或兼重以鎮其失守之神魂或與開道利害以釋其不解之疑畏凡諸用藥大都宜同陰黃證治法當必有得生者若治此證而再加尅伐分利則眞如壓卵矣

治黃之法本宜清濕利小便然亦多有不宜利者說詳濕證門論治條中

韓祗和曰病人三五日服下藥太過虛其脾胃亡其津液渴飲水漿脾土爲陰濕所加與邪熱相會發黃此陰黃也當以溫藥治之如兩手脈沉細遲肢體逆冷皮膚有粟起或嘔吐舌上有胎徧身發黃煩躁欲於泥水中臥小便赤少皆陰候也故陰黃多以熱湯溫之或湯漬布搭其胷腹或以湯盛瓢中坐於臍下熨之其病愈者曾治趙顯宗病傷寒至六七日因服下藥太過致發黃其脈沉細遲無力皮膚涼發躁欲於泥中臥喘嘔小便赤澀先投茵陳橘皮湯喘嘔止次服小茵陳湯半劑脈微出不欲於泥中臥次日又

服茵陳附子湯半劑四肢發熱小便二三升當日中大汗而愈似此治愈者不一一錄凡傷寒病黃每遇太陽或太陰司天歲若下之太過往往變成陰黃蓋辰戌太陽寒水司天水來犯土丑未太陰濕土司天土氣不足卽脾胃虛弱亦水來侵犯多變此證也

傷寒發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹滿不痛或大便實而渴甚脈來沉實有力皆濕熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃自退矣然黃有陰證及諸治法俱詳於前宜參用之

石室祕籙（臣陳士鐸著）

黃疸

黃疸之證一身盡黃兩目亦黃却是死證倘初起卽治之亦未必卽死也我有奇方名爲消黃去癉湯茵陳三錢薏仁車前子各三兩茯苓二兩肉桂三分水煎服一連四劑黃去癉消矣黃疸雖成於濕熱畢竟脾虛不能分消水濕以致鬱而成黃吾用茯苓薏仁車前大劑爲君分消水濕仍是健脾固氣之藥少用

茵陳以解濕熱用肉桂引入膀胱盡從小便而出無事張皇而暗解其濕熱之橫此方之澹而妙簡而神也四劑之後減半加白朮一兩煎湯飲之再用四劑則全愈而無後患矣

黃疸之證原不宜死然治之不得法往往生變爲死蓋黃疸外感之濕易治內傷之濕難醫外感單治濕而疸隨愈內傷單治濕而疸難痊瀉水則氣愈消發汗則精愈泄又何能黃疸之速愈哉我有方單治內傷而得黃疸者名治內消疸湯白朮茯苓薏仁各一

兩茵陳炒梔子各二錢陳皮五分水煎服此方妙在用白朮茯苓薏仁之多使健脾又復利水助茵陳梔子以消濕熱盡從膀胱內消不必又去退皮膚之濕而皮膚之濕自消大約此方用之十劑無不消者不必十劑之外服十劑減半去梔子再服五劑則全愈人亦健旺矣至妙至神之方有益無損可爲治內傷而感濕者之法

方

猪膏髮煎（仲景下同）

治諸黃

猪膏半斤　亂髮如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

小建中湯

治黃疸小便自利

桂枝去皮　甘草炙　生薑各三兩　芍藥六兩

大棗十二枚　膠飴一升

右六味以水七升煑取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

小半夏湯

治黃疸喘滿而噦

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煑取一升半分溫再服

小柴胡湯

治黃疸諸勞復而嘔者

柴胡半斤　黃芩　人參　甘草　生薑各三兩

半夏半斤　大棗十二枚

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

越婢加朮湯

治裏水一身面目黃腫者

麻黃六兩　石膏半斤　白朮四兩　生薑三兩

甘草二兩　大棗十五枚

右六味以水六升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取

三升分溫三服惡風加附子一枚炮

抵當湯

治黃疸屬血證者

桃仁二十箇去皮尖　大黃三兩酒浸　水蛭熬

䖟蟲各三十箇熬去翅足

右四味爲末水五升煑取三升去滓溫服一升不可再服

麻黃連軺赤小豆湯

治黃疸瘀熱在裏者

麻黃去節　連翹根　生薑切各二兩　赤小豆

生梓白皮各一升　甘草炙一兩　大棗十二枚

杏仁四十箇去皮尖

已上八味以潦水一斗先煑麻黃再沸去上沫內諸藥煑取三升分溫三服半

麻黃湯

治陽明中風黃疸脈浮無餘證者

麻黃去節三兩　桂枝去皮二兩　甘草炙一兩

杏仁湯泡去皮尖七十箇

右四味以水九升先煑麻黃減二升去上沫內諸藥煑取二升半去滓溫服八合覆取微汗不須啜粥餘如桂枝湯法

五苓散

治黃疸小便不利

澤瀉一兩一分　猪苓去黑　白茯苓去皮

白术各三分　桂枝去皮半兩

右擣篩爲散拌和每服抄三錢白湯調下去桂名四苓散

大黃硝石湯

治表和裏實疸病

大黃　黃蘗　硝石各四兩（一作滑石）　梔子十五枚

右四味以水六升煑取二升去滓內硝石更煑取一升頓服

大陷胷湯

治結胷發黃者

大黃　芒硝各三錢　甘遂末三字匕

右剉如麻豆大一劑分作二服每服用水一盞煑

大黃至六分內硝煎一二沸絞汁一字七半溫服未快利再服熱惡不利者以意加服

茵陳蒿湯（仲景）

治寒熱不食食卽頭眩心胸不安久久發黃名爲穀疸

茵陳蒿六兩　梔子十四枚　大黃二兩

右三味以水一斗先煑茵陳減六升內三味煑取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

大建中湯

治胷中大寒不能飲食腹中寒氣上衝上下疼痛不可觸近并陰黃等證

人參二兩　蜀椒二合炒去汗　乾薑四兩

右三味以水四升煑取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之

芪芍桂苦酒湯

治黃汗汗出沾衣如黃蘗汁

黃芪五兩　白芍藥　桂枝各三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煑取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

桂枝加黃芪湯

治黃疸脈浮而腹中和者宜汗之若腹滿欲嘔吐懊憹而不和者宜吐之不宜汗

桂枝　白芍藥　生薑各三兩　大棗十二枚

黃芪　甘草各二兩

右六味以水八升煑取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗若不汗更服

黃芪湯（濟生方）

治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪蜜炙　赤芍藥　茵陳各二兩　石膏四兩

麥門冬　淡豆豉各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分去滓食前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草

茵陳五苓散

治濕疸小便不利

茵陳末十分　五苓散五分

二物和先食飲方寸匕日二服

加減五苓散

治飲食伏暑鬱發爲黃疸口渴多飲小便不利

茵陳　猪苓　白朮　赤茯苓　澤瀉各二錢

水二鍾煎一鍾不拘時服一方有桂心

穀疸丸（濟生）

治穀疸

苦參三兩　龍膽草一兩　牛膽一枚取汁

右爲細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如桐子大每服五十丸空心熟水或生薑甘草煎湯送下兼紅丸子服亦可

茯苓茵陳梔子湯（寶鑑）

治穀疸

茵陳葉一錢　茯苓五分　梔子仁　蒼朮炒

白朮各三錢　黃芩生六分　黃連　枳殼麩炒

猪苓　澤瀉　陳皮　防己各二分　青皮一分

右作一服用長流水三盞煎至一盞去滓溫服食前一服減半二服良愈

陶氏茵陳湯（入門）

治黃疸熱盛大便不利

茵陳二錢　大黃　梔子仁　厚朴　枳實

黃芩　甘草各一錢

右剉作一貼薑二片燈心一握水煎服小便不利合五苓散服

梔子大黃湯

治酒疸心中懊憹或熱痛

山梔十四枚　大黃一兩　枳實五枚　豆豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

葛根湯（濟生方）

治酒疸

葛根二錢　梔子仁　枳實麩炒　豆豉各一錢

甘草炙五分

水一鍾煎至七分不拘時溫服

藿枇飲（戴氏）

治酒疸

藿香葉　枇杷葉去毛　桑白皮　陳皮　葛根

白茯苓　鷄距子各等分

水煎下酒煑黃連丸

當歸白朮湯（三因方下同）

治酒疸

當歸　黃芩　茵陳　甘草炙各一錢　茯苓

白朮各二錢　半夏湯泡　杏仁去皮尖麩炒

枳實麩炒　前胡各一錢半

水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

白朮湯

治酒疸因下後變爲黑疸目青面黑心中如啖蒜

虀狀大便黑皮膚不仁其脈微而數

白朮　桂心各一錢　枳實麩炒　豆豉　乾葛

杏仁　甘草炙各五分

水一鍾煎至七分食前服

硝石散（仲景）

治黑疸

硝石　礬石各等分燒

右二味爲末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

加味四君子湯

治色疸

人參　白朮　白茯苓　白芍藥　黃芪炙

白扁豆炒各二錢　甘草炙一錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

滑石散

治女勞疸

滑石一兩半　白礬一兩枯

右爲細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水爲度按此即前硝石方硝與滑字形相近未知孰是兩存之

腎疸湯（東垣）

治腎疸目黃渾身金色小便赤澀

升麻根半兩　蒼朮一錢　防風根　獨活根

白朮　柴胡根　羌活根　乾葛根各半錢

白茯苓　猪苓　澤瀉　甘草根各三錢　人參
神麴各六分　黃蘗二分
分作二貼水煎食前稍熱服

茯苓滲濕湯（寶鑑）

治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面目俱黃小便
不利不食不得臥
茵陳七分　白茯苓六分　木猪苓　澤瀉
白朮　陳皮　蒼朮米泔浸炒　黃連各五分
山梔炒　秦艽　防己　葛根各四分
水二鍾煎七分食前服

參朮健脾湯

治發黃日久脾胃虛弱飲食少思
人參　白朮各一錢五分　白茯苓　陳皮
白芍藥煨　當歸酒洗各一錢　炙甘草七分
水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黃芪炒白
扁豆各一錢

當歸秦艽散

治五疸口淡咽乾倦怠發熱微寒

白朮　茯苓　秦艽　當歸　川芎　白芍藥

熟地黃酒蒸　陳皮留白各一錢　半夏麴

炙甘草各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服濟生有肉桂小草

名秦艽飲子

麻黃醇酒湯（仲景）

治黃疸

麻黃三兩

以好清酒五斤煮取二升五合頓服盡冬月用酒

煮春月用水煮

黃連散（寶鑑下同）

治黃疸大小便閉澀壅熱累效

黃連　大黃酢炒各二兩　黃芩　甘草炙各一兩

右爲細末食後溫水調下二錢日三服先用瓜蔕

散搐鼻滴出黃水却服此藥

搐鼻瓜蔕散

治黃疸渾身如金色

瓜蔕二錢　母丁香一錢　黍米四十九粒

赤小豆五分

右爲細末每服臨臥時先含水一口却於兩鼻孔嗃上半字便睡至明日取下黃水便服黃連散病輕者五日效重者半月效

茵陳附子乾薑湯

治寒濕相合陰證發黃

茵陳一錢二分　附子炮去皮臍　白茯苓　橘紅各三錢　乾薑炮二錢　草豆蔻煨一兩　白朮四分　枳實麩炒　半夏製　澤瀉各半錢

右生薑五片水煎去滓凉服

秦艽湯

一名秦艽散治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽一兩　旋覆花　赤茯苓　炙甘草剉各半兩

右㕮咀每服四錢以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

鍼砂丸（正傳）

治穀疸酒疸濕熱發黃等證

鍼砂炒紅醋淬八兩　香附子童便製　蒼朮各四

兩　神麴炒　茵陳薑汁炒　麥芽炒各二兩

芍藥　當歸　生地黃　川芎　青皮各一兩半

三稜　蓬朮並醋煑　陳皮各一兩　梔子炒

薑黃　升麻　乾漆炒各五錢

右爲末醋糊和爲丸梧子大薑湯下六七十丸

梔子蘗皮湯

治傷寒及濕家發黃

梔子十五枚　甘草一兩　黃蘗二兩

水四升煑取一升半去滓分溫再服

大茵陳湯

治黃疸及頭汗出欲發黃

茵陳蒿半兩　大黃三錢　肥梔子三枚半

水三升三合半先煑茵陳減一半內二味煑取一升去滓分三服小便利如皂角汁一宿腹減黃從小便中出也

茵陳梔子黃連三物湯

治大便自利而黃

茵陳蒿三錢　梔子　黃連各二錢

水二盞煎八分去滓服

山茵陳散

治疸證發熱大小便祕澀

山茵陳　梔子各二錢　赤茯　枳實各一錢半

葶藶　甘草各一錢

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾食前服

小溫中丸（丹溪下同）

治黃胖宜草野貧賤人服蓋其飲食無積但補陰燥濕而已

針砂一斤以酢炒爲末入糯米一斤炒極黃

右爲末酢糊丸如桐子大每米飲下四五十丸忌口輕者服五兩重者不過七兩愈

大溫中丸

治黃胖丹溪晩年定者

香附童便浸春夏一宿秋冬三宿　針砂炒紅酢淬三次各一斤　苦參春夏二兩秋冬一兩　芍藥

厚朴薑製黑　山楂　蒼朮泔浸各五兩　白朮

陳皮　茯苓各三兩　青皮六兩　甘草二兩

右爲細末酢糊丸如桐子大面黑筋骨露氣實者米飲下五六十丸面肥白與氣虛羸弱者白朮湯下三四十丸忌一切生冷油膩鷄鵝羊鴨生硬併餈粽難化之物服過七日後便覺手掌心凉口脣內有紅暈起調理半月愈

煖中丸

治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

香附一斤　甘草二兩　針砂十兩炒紅酢淬

陳皮　蒼朮　厚朴　三稜　白朮　青皮各五錢

右爲末酢糊丸空心鹽薑湯下五十丸晚食前酒下亦可忌狗肉

石膏散（千金方）

治女勞疸身黃額黑日晡發熱小腹急足下熱

石膏煆　滑石各等分

右爲末每二錢大麥粥飲調下

秦艽飲子（得效）

治女勞疸

秦艽　當歸　芍藥　白朮　桂皮　赤茯苓

陳皮　熟地黃　川芎　小草各一錢　半夏

甘草各五分

右剉作一貼薑五片水煎服

茵陳大黃湯（活人書下同）

治傷寒大熱發黃疸

茵陳　梔子　柴胡　黃蘗　黃芩　升麻

大黃各一錢　草龍膽五分

右水煎服

茵陳梔子湯

治穀疸

茵陳三錢　大黃二錢　梔子　枳實各一錢

右水煎服

茵陳茯苓湯

治陰黃小便不利煩躁而渴

茵陳三錢　白茯苓　猪苓　滑石水飛　當歸

官桂各一錢

右水煎服

茵陳橘皮湯

治陰黃煩躁喘嘔不渴

茵陳　陳皮　白朮　生薑　半夏　茯苓各一錢

右水煎服

茵陳附子湯

治陰黃遍身冷

茵陳　附子炮　甘草炙各一錢

右水煎服

茵陳四逆湯

治陰黃肢體逆冷自汗

茵陳　附子炮　甘草炙　乾薑炮各一錢

右水煎服

茵陳薑附湯

治陰黃冷汗不止

茵陳　附子炮　乾薑炮各一錢

右水煎服

茵陳吳茱萸湯

治陰黃曾服薑附諸藥未愈脉尚遲者

茵陳　吳茱萸　附子炮　乾薑炮　木通

當歸各一錢

右水煎服

瘴疸丸（入門）

治天行病急黃及瘴瘧發黃

茵陳　梔子　大黃　芒硝各一兩　杏仁六錢

常山　鼈甲　巴豆霜各四錢　豆豉二錢

右爲末蒸餅和丸梧子大每三丸或五丸溫水吞下以吐利爲效得效方梔子丸同卽今茵陳丸也

茵陳瀉黃湯（丹溪下同）

治時氣發熱變爲黃疸所謂瘟黃

葛根一錢半　木香七分　茵陳　黃連薑汁炒

梔子炒　白朮　赤茯苓　芍藥　厚朴　木通

人參各一錢

右剉作一貼入薑三片水煎服

濟生茵陳湯

治時行熱鬱通身發黃

茵陳四錢　大黃二錢　梔子一錢

右剉作一貼水煎服

退黃散（醫鑑）

治黃疸身面如金小便如黃蘗汁

柴胡　升麻　草龍膽　茵陳　黃連　黃芩

梔子　黃蘗　木通　滑石各一錢　甘草五分

右剉作一貼燈心一握水煎服

退黃丸（入門）

治黃疸水腫腹脹溏泄等證

青礬二兩鍋內鎔化入陳黃米四升用酢拌勻慢火炒令烟盡入平胃散六兩同炒少頃去火毒右爲末酢糊丸梧子大每七十丸空心臨臥米飲下忌糯米油麪生冷硬物此方即周益公陰騭丸蓋青礬乃銅之精液用酢製以平肝愈於鍼砂如服鍼砂不忌鹽後復發青礬則不忌鹽不復發

褪金丸（正傳）

治黃腫絕妙

鍼砂煅紅酢淬　香附子便浸各六兩　蒼朮

白朮各二兩半　陳皮　神麴　麥芽各一兩半

厚朴　甘草各一兩

右爲末麴糊和丸梧子大米飲下五七十丸忌魚腥濕麵生冷有塊加三稜蓬朮並酢煑各兩半

綠礬丸（正傳）

治黃胖病最捷

五倍炒黑　神麴炒黃各八兩　鍼砂炒紅酢淬

綠礬薑汁炒白各四兩

右爲末薑汁煮棗肉搗丸梧子大溫酒下六七十丸不飲酒米飲下終身忌食蕎麥犯之再發難治

疸方（入門下同）

治黃疸愛喫茶葉者

蒼朮　白朮各三兩　石膏　白芍藥　黃芩

南星　陳皮各一兩　薄荷七錢

右爲末砂糖水煮神麴作糊和丸梧子大砂糖水空心吞下五七十丸

又方

治黃疸喜喫生米者

白朮一錢半　蒼朮一錢三分　白芍藥　陳皮

神麴　麥芽　山楂肉　白茯苓　石膏各一錢

厚朴七分　藿香五分　甘草三分

右剉作一貼水煎臨熟入砂糖末一匙調服

四寶丹

治疸癖愛喫土炭生米茶葉逼用者

使君子肉二兩　南星薑製　檳榔各一兩

如喫生米加麥芽一斤炒過喫茶葉加茶葉一斤炒過喫土加壁土一斤炒過喫炭加黑炭一斤炒過共爲末蜜丸梧子大空心砂糖水下五十丸

逍遙散（元戎）

治濕鬱發黃

當歸　芍藥　白朮　茯神　甘草　柴胡各等分

右薑三片水煎服

紅丸子（和劑）

治穀疸

京三稜浸軟切片　蓬莪朮煨　青皮去白

陳皮去白各五斤　乾薑炮　胡椒各三斤

右爲末用酢麪糊丸如梧桐子大礬紅爲衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減與服

六味地黃丸

治一切腎水虧損兼治陰虛發黃

熟地黃八兩蒸搗　山茱萸　山藥炒各四兩

丹皮　澤瀉　白茯苓各三兩

右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心食前滾白湯或淡鹽湯任下加肉桂製附子各一兩名八味丸治陰陽虛等證

異攻散

治脾胃虛寒飲食少思嘔吐面黃或欬嗽面浮氣逆腹滿等證

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草　陳皮各一錢

右加薑棗水煎服

葛花解酲湯（東垣）

治酒疸

人參　白朮　白茯苓　縮砂仁　白豆蔻

葛花各一錢　神麯　木香各五分　青皮

陳皮　猪苓　澤瀉各七分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒

病去矣或爲末薑酢湯調服二三錢亦可

如神散（得效下同）

治酒毒發黃

苦匏子　苦葫蘆子各三七箇　黃黍米三百粒

安息香二皂子大

右爲末取一字搐入鼻中滴盡黃水若過多則以黍穰燒灰麝香末各少許搐入鼻中立止

石膏茵陳散

治黃疸一身皆黃食已即饑

石膏二錢　甘草五分　梔子仁　茵陳　木通

大黃各一錢　苦蔞實一箇

右剉作一貼入薑五片葱白二莖水煎服

必效散（直指）

黃疸通用

葶藶子炒　草龍膽　梔子　黃芩各一錢

茵陳二錢

右剉作一貼水煎服

茯苓加減湯

治胃疸積熱食已輒饑面黃瘦胷滿脅脹小便祕赤

赤茯苓　陳皮去白　桑白皮各三兩　赤芍藥　白朮各四兩　人參　官桂各二兩　石膏八兩　半夏六兩湯洗生薑製焙

右爲末每服三錢水一盞生薑十片同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黃朴硝各二兩

棗子綠礬丸（同春）

治黃疸胖病

鍼砂煅紅酢淬　綠礬炒　蒼朮　厚朴　陳皮　神麴各一兩　甘草五錢

右爲末蒸棗肉和丸梧子大米飲下五七十丸切忌蕎麥羊肉母猪肉食之急死無醫

五疸搐鼻方（千金下同）

通治五疸

瓜蔕　秫米　赤小豆各二七枚

右三味治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則

愈病輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人吹鼻中無不死大慎之删繁療天時毒熱通貫臟腑沉伏骨髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等病喘息須臾不絕也

大黃丸

治前證

大黃　葶藶子各二兩

右爲末蜜和丸如梧子大每服十九日三病瘥止

五疸方

大黃二兩　黃連三兩　黃蘗　黃芩各一兩

麴衣五合

右五味爲末蜜和丸如梧子大先食服三九日三不知加至五九

三黃散

治黃疸身體面目盡黃

大黃　黃連　黃芩各四兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可爲九

秦椒散

治黃疸飲少溺多

秦椒六銖　瓜蔕半兩

右二味治下篩水服方寸匕日三

又方

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮蘗汁衆醫不能療者

茵陳　梔子各四兩　黃芩　大黃　柴胡　升麻各三兩　龍膽二兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸者大黃加梔子五六兩生地黃一升如黃發已久變作桃皮色心下有堅嘔逆不下飲食小便急赤色少四肢逆冷脈深沉極微細遲者不宜服此方服下必變噦也宜與大茵陳湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脈小浮出形小見不甚沉微便可治也脈浮見者黃當明不復作桃皮色心下自寬也

黃疸湯

治發黃

茵陳　黃蘗　梔子　大黃各三兩　黃連

右五味㕮咀以水九升煑取三升分三服先服湯後服後丸

黃疸丸

治見上

大黃五兩　茵陳　梔子各三兩　黃芩　黃蘗黃連各二兩

右六味爲末以蜜丸如梧子大白飲服二十九令微利

大黃黃蘗湯

治發黃腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之

大黃三兩　黃蘗　芒硝各四兩　梔子十五枚

右四味㕮咀以水六升煑取二升去查內芒硝復煎取一升先食頓飲之

茵陳丸

治時行病急黃幷瘴癘疫氣及痎瘧

茵陳　梔子　芒硝　杏仁各三兩　巴豆一兩

常山　鼈甲各二兩　豆豉　大黃各五兩

右九味爲末以餳爲丸如梧子大飲服三丸以吐利爲佳不知加一丸初覺體氣有異急服之卽瘥神效

急黃方

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脉

芒硝一兩　大黃末兩半　生地黃汁八合

右三味合和一服五合日二以利爲度不須二服

風疸方

治風疸小便或黃或白洒洒寒熱好臥不欲動

三月生艾一束搗汁銅器中煎如漆密封之

苦參　大黃　黃連　凝水石研　苦蔞根

葶藶各六銖

右七味爲末以艾煎和丸如梧子大先食服五丸日二可至二十丸有熱加苦參渴加苦蔞小便澀加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

梔子枳實豉大黃湯

又名枳實大黃湯治傷寒食少飲多痰結發黃酒疸心中懊憹而不甚熱或乾嘔

枳實五枚　大黃三兩　豆豉半升　梔子七枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服心中熱疼懊憹皆主之

凝水石散

治肉疸飲少小便多如白泔色此病得之縱酒

凝水石　白石脂　苦蔞根　桂心各三十銖

菟絲子　知母各十八銖

右六味治下篩麥粥飲服五錢匕日三服五日知十日瘥

茯苓丸

治心下縱橫堅而小便赤是酒疸

半夏　杏仁各十八銖　蜀椒　當歸各十二銖

甘遂六銖　茯苓　茵陳　乾薑各一兩　枳實

白术熬各三十銖

右十味爲末蜜和丸如梧子大空腹服三丸日三稍稍加以小便利爲度千金翼加黃連二兩大黃

十八銖名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澀

半夏湯

治酒澼陰黃胷心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食冲心由脾胃內痰所致

半夏一升　生薑　黃芩　茵陳　當歸　前胡

枳實　甘草　大戟各二兩　茯苓　白朮各三兩

右十一味㕮咀以水一斗煑取三升分作三服

牛膽丸

治酒疸身黃麴塵出

牛膽一枚　芫花一升　蕘花　大黃各半斤

瓜蔕三兩

右五味㕮咀以清酒一斗漬一宿煑減半去滓內牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺不知復一丸至八丸膈上吐膈下下或不吐而自愈

大茵陳湯

治內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數者

夫發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱者故黃如金色

茵陳　黃蘗　大黃　白朮各三兩　黃芩

甘草　茯苓　苦蔞根　前胡　枳實各二兩

梔子二十枚

右十一味㕮咀以水九升煑取三升分三服得快下消息三四日更治之

茵陳丸

治氣淋臚脹腹大身體面目悉黃及酒疸短氣不得息

茵陳　天門冬　梔子各四兩　半夏半升

大黃　桂心各三兩　通草　石膏各二兩

右八味蒸大黃通草天門冬半夏梔子曝令乾合擣篩蜜丸如大豆服三丸日三忌生魚以豆羮服不得用酒一方去石膏內滑石二兩不知加至十丸

犀角散（良方）

治急黃心膈煩躁而渴者

犀角　黃連　升麻　梔子仁各一兩　茵陳

右㕮咀每服四錢薑三片水二鍾煎至六分溫服

養勞湯（綱目）

治五疸脚弱心忪口淡耳聾微寒發熱氣急小便白濁當作虛勞治之

黃芪　當歸　桂心　甘草炙　陳皮　白朮

人參各一兩　白芍藥三兩　熟地　五味子

茯苓各三錢　遠志去心半兩

右每服四錢薑棗煎空心服

穀芽枳實小柴胡湯（良方下同）

治穀疸食已即饑而頭眩心中怫鬱不安饑飽所致蒸熏而黃

穀芽　枳實　厚朴各一錢　山梔　大黃

柴胡　黃芩各六分　陳皮　半夏　人參

炙甘草各五分

右水二盞薑三片棗一枚煎八分不拘時服

紫金丹

治黃疸久不愈胃強者

膽礬　黃蠟各二兩　大棗五十枚

右以砂鍋或銀石器內用好醋三椀先下礬棗慢火熬半日取出棗去皮核次下蠟再熬一二時如膏入蠟茶二兩同和丸桐子大每服三十丸茶酒任下酒入下血色黃日黃色有餘者亦效

小茵陳湯（韓氏）

治發黃脉沉細四肢及徧身冷

附子一箇炮作八片　炙甘草一兩　茵陳二兩

右用水二升煑一升分作三服

五福飲（景岳全書下同）

凡五臟血氣虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參　熟地黃俱隨宜　白朮炒一錢五分

當歸二三錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

柴芩煎

治內熱兼表邪發黃

柴胡二錢　黃芩　梔子　澤瀉　木通各二錢

枳殼一錢五分

水二鍾煎八分溫服

柴苓湯

治身熱發黃煩渴泄瀉

白朮　茯苓　澤瀉　柴胡　豬苓　黃芩

右水煎服

左歸飲

治命門之陰衰陽勝黃疸諸證

熟地二三錢或至一二兩　山藥　枸杞各二錢

炙甘草一錢　茯苓一錢半　山茱萸一二錢（畏酸少用）

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

治命門之陽衰陰盛黃疸諸證

熟地二三錢或加至一二兩　山藥　枸杞

杜仲薑製各二錢　山茱萸肉一錢　肉桂

甘草炙各一二錢　製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

大分清飲

治濕熱黃疸

茯苓　澤瀉　木通各二錢　梔子或倍之

猪苓　枳殼　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

茵陳飲

治前證

茵陳　梔子　澤瀉　青皮各三錢　菊花二錢

甘草一錢

用水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之

理陰煎

治眞陰虛弱黃疸

熟地三五錢或一二兩　當歸二三錢或五七錢

炙甘草一二錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治陰疸

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　陳皮（或不用）　炙甘草各一錢

乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

壽脾煎

一名攝營煎治脾虛陰黃中氣虧弱等證

白朮二三錢　當歸　山藥各二錢　棗仁錢半

炙甘草一錢　遠志製三五分　乾薑炮一二錢

蓮肉炒二十粒　人參一二錢急者用一兩

水二鍾煎服

五君子煎

治脾胃虛寒陰黃兼濕

人參二三錢　白朮黃土炒　白茯苓各二錢

炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七卷目錄

醫部彙考二百八十七

疸門三
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百七卷

醫部彙考二百八十七

疸門三

單方

食勞黃病身目俱黃青礬隔鍋煆赤米醋拌爲末棗肉和丸梧子大每服二三十丸食後薑湯下（救急方）

酒疸黃疾心下懊憹足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃蘗三兩木蘭一兩爲末酒服方寸匕日三服（肘后方）

五種黃疸崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脈益憔悴或面赤惡心者是也用秦艽一兩剉作兩貼每貼用酒半斤浸絞取汁空腹服或利便止就中飲食人易治屢用得力

黃病內外皆黃小便赤心煩口乾秦艽三兩牛乳一大升煑取七合分溫再服千金方加芒硝六錢（廣利方）

濕熱黃疸柴胡一兩甘草二錢半作一劑以水一盞白茅根一握煎至七分任意時時服之（祕寶方）

五種黃病黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致身體微腫汗出如黃蘗汁用生茅根一把細切以猪肉一斤合作羮食（肘后）

穀疸因食而得勞疸因勞而得用龍膽一兩苦參三兩爲末牛膽汁和丸梧子大先食以麥飲服五丸日三服不止稍增勞疸加龍膽一兩梔子仁三七枚以猪膽和丸服之（刪繁）

白黃色枯舌縮恍惚語亂者死當歸白术一兩水煎入生地汁蜜和服（三十六黃方）

遍身黃疸茵陳蒿一把同生薑一塊搗爛於胷前四肢日日擦之

男子酒疸用茵陳蒿四根梔子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞冲汁飲之祕方也

濕熱黃疸燈草根四兩酒水各半入瓶內煑半日露一夜溫服（集元）

酒疸黃色遍身者鹿葱根搗汁服

黃疸漆草一把搗汁和酒服不過三五次卽愈（肘后）

熱黃疸疾萹蓄搗汁頓服一升多年者日再服之（藥性）

論

黃疸內熱地丁末酒服三錢（乾坤祕韞）

黃疸腫疾藜蘆灰中炮爲末水服五分小吐不過數服效

黃疸喘滿小便自利不可除熱半夏生薑各半斤水七升煑二升五合分溫再服有人氣結而死心下煖以此少許入口遂活（仲景）

黑黃面黑黃身如土色不妨食脉沉若青脉入口者死宜烙口中黑脉耳會玉泉章門心俞用生鬼臼搗

汁一小盞服乾者爲末水服（三十六黃方）

酒疸眼黃脾熱用青苦蔓焙研每服一錢水半盞煎七分臥時服五更瀉下黃物立可名逐黃散（普濟）

黑疸危疾苦蔞根一片搗汁六合頓服隨有黃水從小便出如不出再服

黃疸變黑醫所不能治用王瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服

五般急黃山豆根末水服二錢若帶蠱氣以酒下

脾勞黃疸如聖丸用草血竭羊羶草桔梗蒼朮各一兩甘草五錢爲末先以陳酢二杯入鍋用皂礬四兩煎熬良久下藥末再入白麪不拘多少和成一塊丸如小豆大每服三五十丸空腹酢湯下一日二服數日面色復舊也（乾坤祕韞）

黃疸如金薏苡根煎湯頓服

黃汗染衣涕唾皆黃用蔓菁子搗末平旦以井華水服一匙日再服加至兩匙以上爲度每夜以帛浸小便逐日看之漸白則瘥不過服五升

黃疸如金睛黃小便赤用生蔓菁子末熟水調方寸

七日三服（孫眞人食忌）

急黃黃疸及內黃腹結不通用蔓菁子搗末水絞汁服二三錢當得嚏鼻中出黃水及下利則愈以子壓油每服一盞更佳（拾遺）

熱黃便結用蕪菁子搗末水和絞汁服少頃當瀉一切惡物沙石髮草並出（食療）

急黃病苦瓠一枚開孔以水煑之絞取汁滴入鼻中去黃水（本草）

黃疸腫滿苦壺盧瓤如大棗許以童子小便二合浸一時取兩酸棗大納兩鼻中深吸氣待黃水出良

又方用瓠瓤熬黃爲末每服半錢日一服十日愈然有吐者當詳之（傷寒類要）

食積黃疸絲瓜連子燒存性爲末每服二錢因麪得病麪湯下因酒得病溫酒下連進數服愈（易簡）

黃疸如金睛明時侵晨勿令鷄犬婦人見取東引桃根細如筯若釵股者一握細切以水一大升煎一小升空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散開百日方平復也黃散後可時時飲淸酒一杯則眼中易散

否則散遲忌食熱麪猪魚等物（必效）

急黃喘息心上堅硬欲得水吃者瓜蔕二小合赤小豆一合研末煖漿水五合服方寸匕一炊久當吐不吐再服吹鼻取水亦可（傷寒類要）

遍身如金瓜蔕丁香各四十九枚砂鍋內燒存性爲末每用一字吹鼻取出黃水亦可指牙追涎

黃疸陰黃並取瓜蔕丁香赤小豆各七枚爲末吹豆許入鼻少時黃水流出隔日一用瘥乃止（食療）

黃疸初起柳枝煑濃汁半升頓服（外臺祕要）

五種疸疾黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗如黃蘗汁用猪脂一斤溫熱服日三當利乃愈（肘后）

婦人黃疸經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳橘皮三錢爲末化蠟丸梧子大每服五十丸以滋血湯或調經湯下（濟陰）

血證黃腫綠礬四兩百草霜一升炒麪半升爲末砂糖和丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下（鄭時舉傳）

又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃爲末黑棗肉半斤搗勻米酢糊爲丸梧子大薑湯下八九十丸一

日三服（簡便方）

脾病黃腫青礬四兩煆成赤珠子當歸四兩酒醉浸七日焙百草霜三兩爲末以浸藥酒打糊爲丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳七世

又方綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木香一錢爲末酒煎飛麪丸梧子大每空心酒下五丸

酒黃水腫黃腫積痛青礬半斤醋一大盞和勻瓦盆內煆乾爲度平胃散烏藥順氣散各半兩爲末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯下二三十丸不忌口加鍋灰（濟急方）

火黃身熱午後却凉身有赤點或黑黯者不可治宜烙手足心背心百會下廉內服紫草湯紫草吳藍木香黃連各一兩水煎服（三十六黃方）

穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃由失饑太飽胃氣衝熏所致苦參三兩龍膽一合爲末牛膽丸梧子大生大麥苗汁服五丸日三服（肘后方）

癎黃如金好眠吐涎茵陳蒿白蘚皮等分水二鍾煎

服日二服（三十六黃方）

傷寒黃疸表熱者麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹美酒五升煑取半升頓服取小汗春月用水煎（千金方）

酒疸尿黃發黃心懊痛足脛滿芫花椒目等分燒末水服半錢日二服（肘后方）

酒疸脾黃木鼈子磨酢服一二盞見利效（濟急方）

偏身黃腫掘新鮮百條根洗搗罨臍上以糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以帛包住待一二日後口內作酒氣則水從小便中出腫自消也百條根一名野天門冬一名百奶狀如葱頭其苗葉柔細一根下有百餘箇數（經驗方）

傷寒發黃生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和攪服盡（外臺）

婦人血黃黃茄子竹刀切陰乾爲末每服二錢溫酒調下（摘元方）

腹脹黃腫用亞腰壺盧連子燒存性每服一箇食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效（簡便方）

酒疸咸平樹根白皮擣碎米酢浸一宿平旦空腹溫服一二升（開寶）

食氣黃腫氣喘胷滿用不蛀皂角去皮子酢塗炙焦爲末一錢巴豆七枚去油膜以淡酢研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以愈爲度（經驗方）

時行發黃竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煑取七升細服盡劑愈（肘后方）

房勞黃疸體重不眠眼赤如硃心下塊起若瘕十死一生宜烙舌下灸心俞關元二七壯以婦人內衣燒灰酒服二錢（三十六黃方）

濕熱黃疸蟹燒存性研末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸白湯下日服二次（集簡方）

酒疸諸疸用田螺將水養數日去泥取出生擣爛入好酒內用布帛擄過將汁飲之日三服效（壽域）

黃疸酒疸小螺螄養去泥土日日煑食飲汁有效（永類鈐方）

吐血病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十箇

水漂去泥搗爛露一夜五更取清飲二三次血止即愈一人病此用之經驗（怪證方）

時行發黃用金色脚黃雌雞治如食法煑熟食之并飲汁令盡不過再作亦可少下鹽豉（肘後方）

黃疸困篤用半斤大雄雞背上破開不去毛帶熱血合患人胷前冷則換之日換數雞拔去積毒即愈此雞有毒人不可食犬亦不食也（經驗方）

面目黃疸雞矢白小豆秫米各二分爲末分作三服水下當有黃汗出也（肘後方）

三十六黃急救方用雞子一顆連殼燒灰研酢一合和之溫服鼻中蟲出爲效身體極黃者不過三枚神效（外臺祕要）

時行發黃酢酒浸雞子一宿吞其白數枚（肘後方）

酒積黃腫五靈脂末一兩入麝香少許飯丸小豆大每米飲下一丸（普濟方）

酒積面黃腹脹不消猪腰子一箇批開七刀葛根粉一錢摻上合定每邊灸三徧半手扯作六塊空心喫之米湯送下（聖濟總錄）

濕熱黃病黃牛糞日乾爲末麪糊丸梧子大每食前白湯下七十九（簡便方）

傷寒黃病髮髲燒研水服一寸匕日三（傷寒類要）

女勞黃疸氣短聲沉用女人月經和血衣燒灰酒服方寸匕一日再服三日瘥（必效方）

黃疸尿赤亂髮灰水服一錢日三次祕方也（肘後方）

穀疸食黃用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩爲末和少蜜丸如梧子大每薑湯下五十丸

又方鮒魚作膾和五味食之又取活者置水中常常看之日一易最效（俗方下同）

又方鯉魚如鮒魚法用之

酒疸取鼈烹熟如常法作羹食數箇愈（種杏）

黃疸徧身如金色瓜蔕一十四箇母丁香一箇黍米四十九粒先搗瓜蔕爲末次入二味同爲細末每用半字夜臥令病人先噙水一口兩鼻內各半字吐了水令病人便睡至夜或明日取下黃水旋用熟帛搵了直候水定便服黃連散病輕者五日重者半月

黃疸取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜二次飲

三四日便愈無小麥穬麥亦得用之（千金方下同）

黃疸變成黑疸醫所不能治者土瓜根搗汁一小升頓服日一平旦服至食時病從小便出先須量病人力不得多服力衰則起不得

治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗爲末水服半錢匕小便不利數服瘥（百一）

脾勞黃病鍼砂四兩酢炒七次乾漆燒存性二錢香附三錢平胃散五錢爲末蒸餅丸梧子大任湯使下（摘元方）

又方車前子搗取汁服之（直指）

通身發黃小便赤以茵陳蒿水濃煎服生食亦良（本草下同）

黃疸臘雪水微溫飲之

酒疸小便赤澀取葛根一兩水煎服

黃疸酸漿草根搗取汁飲之多效

酒疸萱草根搗取汁飲又嫩苗煑食之

熱黃心痛青蒿搗取汁飲之

黃疸黃蘗水煎服之

胃熱食疸梔子水煎飲之

酒疸小麥苗搗取汁服或煑食之

黃疸大麥苗取汁服

五種黃病取水芹搗汁飲之作虀葅或煑食或生食並得宜常食

傷寒發黃目不識人生葱火煨熟去粗皮取心批出汁醮香油點兩目大小眥立明種杏方用燒酒口噙令病人開口噴之其眼自明

熱疸絲蓴作羹作虀常食佳

時行黃病冬葵煮汁飲或作羹作虀常食

天行黃疸取熊膽少許和水服

又方猪糞漬水取清頓服

五疸及胃中有乾屎發黃煎猪脂取三合日三服大便乾屎下乃愈

黃病穀芒爲末酒服（日華）

又方薏苡仁擣汁和酒服效（時珍）

熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸取苜蓿擣服一升令人吐利便愈（蘇恭）

五種黃病野蠶豆搗汁服之以瘥爲度（藏器下同）

黃疸病柞木燒末水服方寸匕日三

傷寒發黃昏悶不省死在須臾白烏骨雄雞一隻去毛及腸屎以刀擱切鋪心頭上少頃卽活（醫鑑下同）

酒疸茵陳蒿一兩清酒煎服名酒煑茵陳湯

鍼灸

甲乙經曰黃疸刺脊中

黃疸善欠脅下滿欲吐脾俞主之

黃疸目黃勞宮主之

嗜臥四肢不欲動搖身體黃灸手五里左取右右取左

黃疸熱中善渴太衝主之

身黃時有微熱不嗜食膝內內踝前痛少氣身體重中封主之

消渴黃疸足一寒一熱舌縱煩滿然谷主之

千金方曰章門主傷飽身黃

中封五里主身黃時有微熱

脊中主黃疸腹滿不能食

脾俞胃管主黃疸

疸病正面所取諸穴寅門上斷上齶俠人中俠承漿舌下脣裏顳顬巨闕上脘陰縫

寅門穴從鼻頭直入髮際度取通繩分爲三斷繩取一分入髮際當繩頭鍼是穴治馬黃黃疸等病

上斷裏穴正當人中及脣鍼三鋥治馬黃黃疸等病

上齶穴入口裏邊在上縫赤白脉是鍼三鋥治馬黃黃疸四時等病

舌下穴俠舌兩邊鍼治黃疸等病

脣裏穴正當承漿裏邊逼齒斷鍼三鋥治馬黃黃疸寒暑溫疫等病

顳顬穴在眉眼尾中間上下有來去絡脉是鍼灸之治四時寒暑所苦疸氣溫病等

俠人中穴火鍼治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不

轉者

俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

上脘穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病若女人玉門是穴男女鍼灸無在

治疸病覆面所取諸穴風府熱府肺腧心腧肝腧脾腧腎腧脚後根

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸鍼之治頭中百病馬黃黃疸等病

熱府穴在第二節下兩旁相去各一寸五分鍼灸無在治馬黃黃疸等病

肺腧穴從大椎數第三椎兩旁相去各一寸五分灸主黃疸通治百毒病

心腧穴從肺腧數第二椎兩旁相去各一寸五分

肝腧穴從心腧數第四椎兩旁相去各一寸五分

脾腧穴從肝腧數第二椎兩旁相去各一寸五分

腎腧穴從脾腧數第三椎兩旁相去各一寸五分

脚後跟穴在白肉後際鍼灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒等病

治疸病側面所取諸穴耳中頰裏手太陽臂石子頭錢孔太冲

耳中穴在耳門孔上橫梁是鍼灸之治馬黃黃疸寒暑疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸鍼主治馬黃黃疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

臂石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太淵文向上一夫橫白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

太冲穴鍼灸隨便治馬黃黃溫疫毒等病

醫學綱目曰黃疸腕骨三分灸七壯中脘補

黃疸發虛傷寒飲食過多取腕骨一分湧泉三分灸百勞三里中脘膏肓

黃疸久久變爲黑疸身黃額黑或身面俱黃是也若身不黃口面黑於章門主之鍼灸經云神門亦治疸

導引

保生祕要曰黃疸乃濕氣氤氳於內脉絡膠固不通致有此病先捻背數次復行通關法以導其血脉通其內外後用兩手心按兩乳下揉擦數十偏其丹田氣海處至瀝瀝有聲方止

中濕病色有黃黑腫用火燒丹田數圈幾偏次行通關法其汗自出而濕自消

醫案

儒門事親曰蔡寨成家一童子年十五歲病疸一年面黃如金遍身浮腫乏力惟食鹽與焦物戴人以茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以舟車丸七八十粒通經散三錢下四五行待六七日又以舟車丸濬川散下四五行鹽與焦物見而惡之面色變紅後再以茶調散涌之出痰二升方能愈矣

又有一男子作贅偶病疸善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣

更適他乎婦翁本農者招婿意欲作勞見其病甚每日辱詬人教之餌膽礬丸三稜丸了不關涉鍼灸祈禳百無一濟戴人見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以泄水丸通經散下四五十行不止戴人命以氷水一盂飲之立止次服平胃散等間服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾疸之證濕熱與宿穀相搏故也俗謂之食勞黃

朱葛周黃劉三家各有僕病黃疸戴人曰僕役之職飲食寒熱風暑濕寒尋常觸冒也恐難調攝虛費治功其二家留僕於戴人所從其飲餌其一僕不離主人執役三人同服苦參散以涌之又服三花神祐丸下之五日之間果二僕愈而一僕不愈如其言

安喜趙君玉爲掾省日病發遍身黃往問醫者醫云君乃陽明證公等與麻知已皆受訓於張戴人是商議吃大黃者難與論病君玉不悅自揣無別病乃取三花神祐丸八十粒服之不動乃悟曰予之濕熱甚矣此藥尚不動以舟車丸濬川散作劑大下一斗糞多結者一夕退黃君玉由此益信戴人之言

蔡寨一女病黃徧身浮腫面如金色困乏無力不思飲餌惟喜食生物泥煤之屬先以苦劑蒸餅爲丸湧痰一椀又舟車丸通經散下五七行如墨汁更以導飲丸磨食散氣不數日肌肉如初

丹溪心法曰一婦人四月內產發黃四肢倦怠食少經事不來時發熱脈弦用白朮一兩人參秦艽丹皮生地木通柴胡芍藥各半兩川芎黃芩乾葛各一錢甘草三分十二貼水煎食前熱服而愈

衛生鑑寶曰元顏正卿丙寅二月間因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體痲木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癃閉而赤黑辰巳間發熱日暮則止至四月尤盛其子以危急求請治之具說其事診其脈浮而緩金匱要略云寸口脈浮爲風緩爲痹痹非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃

名曰穀疸宜茯苓梔子茵陳湯主之

至元丙寅六月時雨霖霪人多病瘟疫眞定韓君祥因勞役過度渴飲凉茶及食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沉重胷滿不食自以爲外感傷用通聖散兩服藥後添身體困甚方命醫治之醫以百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩熱躁渴又六日以三一承氣湯下之躁渴尤甚又投白虎加人參柴胡飲子之類病愈增又易醫用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹之類至十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之而痛眼澀不欲開目睛不了了懶言語自汗小便利大便了而不了命予治之診其脉緊細按之虛空兩寸脉短不及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒凉藥過度肝木乘心反來侮土先困其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝也時値霖雨乃寒濕相合此爲陰證發黃明也予以茵陳附子乾薑湯主之內經云寒淫於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以

爲主半夏草豆蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故以爲臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒泄其痞滿茵陳苦微寒其氣輕浮佐以薑附能去膚腠間寒濕而退其黃故爲佐使也煎服一兩前證減半再服悉去又與理中湯服之數日氣得平復或者難曰發黃皆以爲熱今暑隆盛之時又以熱藥治之何也予曰理所當然不得不然成無己云陰證有二一者外傷寒邪陰經受之或因食冷物傷太陰經也二者始得陽證以寒治之寒凉過度變陽爲陰也今君祥因時令暑熱冷物傷脾過服寒涼陰氣大勝陽氣欲絕又值霖雨寒濕相合發而爲黃也仲景所謂當於寒濕中求之李思順云解之而寒涼過劑瀉之而逐寇傷君正以此也聖賢之制豈敢越哉

或者曰潔古之學有自來矣

醫學綱目曰一婦人年六十歲病振寒戰慄足太陽寒水也呵欠噴嚏足少陽膽也口中乏津液足陽明不足也心中急痛而痞手少陰受寒足少陰血滯也身熱又欲近火熱在皮膚寒在骨髓也臍下惡寒丹

田有寒也渾身黃及睛黃皆寒濕也餘證驗之知其爲寒溺黃赤而黑又頻數者寒濕勝也病來身重如山便著牀枕者陰濕盛也其脉右手關尺命門弦細按之洪而弦弦急爲寒加之細者北方寒水雜以緩甚者濕盛出黃色脉洪大者心火受制也左手又按之至骨舉手來實者壬癸腎旺也六脉按之俱空虛者下焦無陽也用藥法先宜以輕劑去其寒濕兼退其洪大之脉以理中加茯苓湯投之水煎熟以冰冷與之此熱因寒用以假寒對足太陽之假熱以乾薑辛熱瀉膀胱之眞氣故曰眞對眞假對假若不愈當以朮附湯與之按此證雖小便黃赤亦作寒治者蓋以餘證及脉別之也

一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常予診之脉大而虛鼻塞而煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥方此方見外臺删繁證云治

天行熱病蓋通貫臟腑寒濕沉於骨髓之間或爲黃疸宜瓜蔕散卽此方也

一舟梢病傷寒發黃鼻瘦通身與目如金色小便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓予曰非其治也小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻額痛是病在淸道中淸道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹爲逆亦用瓜蔕散先含水次搐之鼻中黃水盡乃愈

趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無力海藏次第用藥至茵陳附子湯大效按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵陳陳皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第倣此

趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵陳四逆湯大效

一僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用茵陳梔子各三分秦艽升麻各四錢

末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以和爲度

醫學正傳曰一男年三十餘得穀疸證求予治以胃苓湯去桂加茵陳數十貼黃退自以爲安不服藥十數日後至晚目盲不見物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用豶豬肝煑熟和夜明砂作丸服之目遂明如故來謝予曰未也不早服制肝補脾消痰之劑必轉蠱脹伊不信半月後腹漸脹痞滿復求治予仍以胃苓湯倍二朮加木通麥門冬煎湯下褪金丸一月平安

薛氏醫案曰大司徒李蒲汀南吏部少宰時患黃疸當用淡滲之劑公尙無嗣猶豫不決余曰有是病而用是藥以茵陳五苓散加芩連山梔二劑而愈至辛卯得子公執余手而笑曰醫方猶公案也設君避毀語殘喘安得享餘年而遂付託之望哉由是禮遇益厚

應天王治中偏身發黃妄言如狂苦於胷痛手不可近此中焦畜血爲患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而

愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第三百八卷目錄

醫部彙考二百八十八

瘧門一

黃帝素問（瘧論　四時調神大論　生氣通天論　金匱眞言論　氣交變大論）
（五常政大論　六元正紀大論　至眞要大論）
靈樞經（歲露論）
張機金匱要略（瘧脈證治　食忌）
華佗中藏經（寒熱論　上下不寧　死候）

孫思邈千金方（治法　屬五臟）
劉完素六書（總論　治法）
張從政儒門事親（瘧非脾寒及鬼神辨　治法　呪果法）
李杲十書（夏傷於暑秋必痎瘧　治當順時　素問五臟瘧　素問六經瘧）
朱震亨心法（瘧病證治）
格致餘論（痎瘧論）
戴思恭證治要訣（瘧病證治）
王綸明醫雜著（瘧病證治）

藝術典第三百八卷

醫部彙考二百八十八

瘧門一

黃帝素問

瘧論

黃帝問曰夫痎瘧皆生於風其蓄作有時者何也

註（夜病者謂之痎晝病者謂之瘧）

岐伯對曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷

飲

註　衛氣同邪將入於陰表氣虛故起於毫毛伸欠

帝曰何氣使然願聞其道岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也

註　邪正陰陽之氣上下出入交爭於上下併於陰則陰實而陽虛并於陽則陽實而陰虛

陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛

註　三陽之氣同併於陰則陰實於內而陽虛於外陽明之氣主肌肉而經脉交於頷下是以寒慄鼓頷太陽之氣主表而上升於頭下循背膂故腰背頭項俱痛

三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也

註　陽虛於外則陰勝於裏是以骨寒而痛而寒生於內也陰氣逆極則復出之陽并於陽則陰虛而陽盛陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱是以喘

渴而欲冷飲也

此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也

註　舍卽經隧所歷之界分

此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衞氣幷居衞氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作

註　畱舍之暑能令汗空疎腠理開風遂乘之以入或得之沐浴水氣舍於皮膚之間與衞氣幷居得陽隨衞而外出得陰隨衞而內薄是以日作

帝曰其間日而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也

註　邪氣舍深內薄於裏陰之分陽氣獨發於外裏陰之邪畱著於內陰邪與陽氣交爭而不得皆出於外是以間日而作也

帝曰善其作日晏與其日早者何氣使然岐伯曰邪

氣客於風府循膂而下衞氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也

註　此邪先客於脊背而與衞氣相遇故也

每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於風府日下一節二十一日下至骶骨

註　衞氣每至於風府則腠理開開則客於脊背之邪還入風府與衞氣相遇則病作衞氣出於風府日下一節則上會於風府稍晏故病作稍晏二十一日下至骶骨則上會於風府益晏故病作益晏也

二十二日入於脊內注於伏膂之脈其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也

註　衞氣外循督脈而下內循衝脈而上行九日出缺盆其氣日高則會於風府日早故作日益早

其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原也其道遠其氣深其行遲不能與衞氣俱行不得皆出故間日乃作也

註不得與衛氣皆出故間日作也

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何

註邪有不從風府而入其病亦以日作者何也

岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病

註客於頭項者客於風府也邪入於風府循膂而下留其處者有虛實之不同若邪中異所則無有早晏矣衛氣虛而日下則其發日晏衛氣實而日上則其發日早此邪從風府而留於脊膂之間者也若邪中異所則不得當其風府矣如邪中於頭項腰背手足之間衛氣亦行至頭項腰背手足與所舍之邪相遇而病作

衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也

註　衛氣之所在謂衛氣行至邪氣所在之處相合而病作非定客於風府也衛氣之行至所在之處而發必開其腠理然後邪正相合之處卽其府也

帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也

註　痎瘧生於風然病風者常在其處病瘧者休作有時故帝有此問

岐伯曰風氣畱其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作

註　風則傷衛故病風者留於肌腠筋骨間而不移瘧則舍於榮故隨經絡以內薄與衛氣相應乃作

帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣

註　夏時暑熱溽蒸腠理開發或汗濕從風或得之於沐浴水寒藏於腠理皮膚之中至秋時復傷於風風寒兩感是以寒熱之病成矣

夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風

故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧

註先受之寒先從陰而病寒後受之風復從陽而病熱病以時作者應時而作無早晏也

帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧

註天之陰陽病人之陰陽陰陽兩感故寒熱交作

其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧

註但熱不寒者邪藏於髓而腎陰之氣先與骨氣相絕是外邪不及於裏陰而獨發於陽也熱傷氣故少氣心惡熱故煩寃手足爲諸陽之本故手足熱癉單也謂單發於陽而病熱也

帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱爲有餘寒爲不足夫瘧者之寒湯火不能溫也及其熱冰水不能寒也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗故其爲病逆未可刺也

註　言當此之時病邪甚而正氣逆故未可刺也

夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴

註　寒熱始盛之時乃陰陽之氣交并正氣錯亂未分故未可刺

夫瘧氣者并於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱

註　陰陽未和而邪氣方盛故未可刺

瘧者風寒之氣不常也病極復則至

註　如病風而爲熱極則陰邪之寒氣復至病寒而爲寒極則風邪之陽熱復至

病之發也如火之熱如風雨不可當也故經言曰方其盛時必毀因其衰也事必大昌此之謂也

註　此承上文言邪氣方盛不可刺也

夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之眞氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發爲其氣逆也

註　邪氣未發則正氣未亂因而調之眞氣得安邪

氣乃去所謂治未病也若待其已發雖良工弗能爲爲其氣逆也

帝曰善攻之奈何早晏何如

註 早謂病之未發晏謂病之已衰

岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此眞往而未得并者也

註 瘧之將發陰陽之將移必從四末始蓋三陰三陽之氣從手足之并榮而更移也如病在陽而陽已傷則陰經將從而受之故當先其未發之時堅束其四末令邪在此經者不得入於彼經彼經之氣不得出而并於此經審其證而候其脈見其經絡盛堅而血者皆取而去之此陰陽眞氣往來和平而未得交并者也

帝曰瘧不發其應何如

註 瘧病未發之時其脈候證候何如而應

岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽

則熱而脈躁在陰則寒而脈靜

註 瘧有陰陽更并之盛虛皆當氣之所在如病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈靜欲知脈與病之相應但審證之寒熱脈之靜躁則知病在陰在陽

極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也

註 衛氣者行陰而行陽者也是以衛氣相離其病得休衛氣集則復病也

帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也

註 相失者不與衛氣相遇也蓋六腑之募原其道更遠氣有所不到故有時相失不能相得其邪故或間二日或數日乃作也

瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

註 陽熱甚則渴不甚則不渴矣

帝曰論言夏傷於暑秋必病瘧今瘧不必應者何也

註 言有不必夏傷於暑而爲病瘧者也

岐伯曰此應四時者也其病異形者反四時也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗

註　應四時者隨四時陰陽之氣升降出入而爲病也反四時者非留畜之邪乃感四時之氣而爲病也秋時陽氣下降天氣新涼故感秋涼之氣而爲病者寒甚冬時陽氣伏藏於內卽受時行之寒得陽氣以化熱故寒不甚春時陽氣始出天氣尚寒故惡風夏時陽氣外泄腠理空疎故多汗

帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何臟岐伯曰溫瘧者得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反而入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

註　至春陽氣大發而邪不能自出者邪藏於骨髓之中而氣行骨外故也腦爲精髓之海腦髓爍者

暑氣盛而精髓爍熱也肌肉消者腠理開而肌肉消疎也汗乃腎臟精髓之所化或有所用力則傷動其腎氣是以所藏之邪得與汗共併而出矣夫骨氣與腎氣相合故病氣藏於腎其氣先從內出之外也從內出外則陰虛而陽盛陽盛則熱矣氣從內出之外故病復反入之陰

帝曰癉瘧何如岐伯曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不反於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消爍脫肉故命曰癉瘧帝曰善

註　肺主周身之氣肺素有熱故氣盛於身其氣厥逆上衝故不泄於外而但實於中此外內皆實矣氣止實於外則邪不能外侵故因有所用力腠理開而後邪舍於皮膚之內中氣實則邪不能內入故其氣單發於陽也氣內藏於心者謂邪藏於血脈之中而氣內通於心也內藏於血脈之裏外舍

於分肉之間陽氣盛而無陰氣以和之是以陽熱不衰而令人消爍脫肉也若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍脫肉是陰氣絕而陽氣獨發者名曰癉瘧若但熱不寒者亦名癉瘧是癉瘧之有二證也

四時調神大論

夏三月此爲蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起無厭於日使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在外此夏氣之應養長之道也逆之則傷心秋爲痎瘧奉收者少冬至重病

註　夏氣浮長故欲其疎洩氣洩則膚腠宣通時氣疎暢有若好樂之在外也春生於上夏長於外秋收於內冬藏於下今夏逆於上秋無以收收機有碍則冬無所藏陽不歸原是根氣已損至冬時寒水當令無陽熱溫配故冬時爲病甚危險也

生氣通天論

陽氣者精則養神柔則養筋魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發爲風瘧

註　魄汗未盡表邪未去也形弱肌腠虛也腠理空踈則表陽邪氣同陷於其間寒邪在表則隨陽而化熱故氣爍也邪雖陷於肌腠而表氣不入於經是以穴俞以閉風瘧但熱不寒之瘧也

夏傷於暑秋爲痎瘧

註　夏傷於暑暑汗不泄炎氣伏藏秋時陰氣外出與熱相遇發爲痎瘧

金匱眞言論

秋善病風瘧長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧

註　夏時陽氣在外裏氣虛寒長夏濕土主氣風入於經俞卽內薄而爲洞泄風木乘虛而勝土也脾爲陰中之至陰不能化熱而爲寒中也長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧者甚言其陽氣之不可傷也

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧

註　火勝則尅金故肺受邪瘧暑熱病也

五常政大論

火太過曰赫曦赫曦之紀其病瘧

六元正紀大論

火鬱之發民病溫瘧

註 火熱盛也

至眞要大論

少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘧

註 少陽之火在天爲暑故爲此諸證淫於肺也

陽明司天燥淫所勝民病左胠脅痛寒清於中感而瘧

註 左胠脅痛者燥金淫勝於上肝木乃病也感寒清而成瘧者秋成痎瘧也

太陽之勝凝慄且至痔瘧發

註 痔瘧發乃太陽寒熱之邪也

帝曰火熱復惡寒發熱有如瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節瘧亦同法

註 火熱傷氣此言病在氣而不在經也復惡寒發

熱有如瘧狀者此陰陽外內之相乘也夫陽在外陰往乘之則惡寒陰在內陽往乘之則發熱也或一日發或間數日發者此陰陽勝復之氣會遇之時有多少也如陰氣多而陽氣少則火熱留於陰久故其發日遠如陽氣多而陰氣少則熱隨陽氣而常盛於外故其發日近此陰陽勝復之作盛衰之有節耳

靈樞經

歲露論

黃帝問於岐伯曰經言夏日傷暑秋病瘧瘧之發以時其故何也岐伯對曰邪客於風府病循膂而下衞氣一日一夜常大會於風府其明日日下一節故其日作晏此其先客於脊背也故每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作尚晏也衞氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內注於伏衝之脈其行九日出於缺盆之中其氣上行故其病稍益至其內搏於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故次日乃

畜積而作焉黃帝曰衞氣每至於風府腠理乃發發則邪入焉其衞氣日下一節則不當風府奈何岐伯曰風府無常衞氣之所應必開其腠理氣之所舍節則其府也黃帝曰善夫風之與瘧也相與同類而風常在而瘧特以時依何也岐伯曰風氣留其處瘧氣隨經絡沉以內搏故衞氣應乃作也帝曰善

漢張機金匱要略

瘧脈證治

瘧病篇曰師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗鍼灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結爲癥瘕名曰瘧母急治之宜鼈甲煎圓

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍肌肉

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之

瘧多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之

食忌

十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼或發心瘧瘧發時手足十指爪皆青困瘦

華佗中藏經

寒熱論

人之寒熱往來者其病何也此乃陰陽相勝也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒又上盛則發熱下盛則發寒皮寒而燥者陽不足皮熱而燥者陰不足皮寒而寒者陰盛也皮熱而熱者陽盛也熱發於下則陰中之陽邪也熱發於上則陽中之陽邪也寒起於上則陽中之陰邪也寒起於下則陰中之陰邪也寒而頰赤多言者陽中之陰邪也熱而面青多言者陰中之陽邪也寒而面青多言者陰中之陰邪也若不言者不可治也陰中之陰者一生九死陽中之陽者九生一死陰病難治陽病易醫診其脈候數在

上則陽中之陽也數在下則陰中之陽也遲在上則陽中之陰也遲在下則陰中之陰也數在中則中熱遲在中則中寒用熱取熱以寒攻逆順之法從乎天地本乎陰陽也天地者人之父母也陰陽者人之根本也未有不從天地陰陽者也從者生逆者死寒之又寒熱之又熱者生金匱大要論云夜發寒者從夜發熱者逆晝發熱者從晝發寒者逆從逆之兆亦在乎審明

肝之積氣在脅久不去發欬逆或爲痎瘧也肝虛冷則脅下堅痛目盲臂痛發熱如瘧不欲食

上下不寧

脾病者上下不寧何謂也脾上有心母下有肺子心者血也屬陰肺者氣也屬陽脾病則上母不寧母不寧則爲陰不足也陰不足則發熱又脾病則下子不寧子不寧則爲陽不足也陽不足則發寒脾病則血氣俱不寧血氣不寧則寒熱往來無有休息故病如瘧謂脾者土也心者火也肺者金也火生土土生金故曰上有心母下有肺子脾居其中病則如斯

死候

病瘧腰脊強急瘈瘲者死

唐孫思邈千金方

治法

夫瘧之且發也陰陽之且移也必從四肢始也陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脅下有痞也治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利卽愈瘧者病人形瘦皮上必粟起也

屬五臟

肝病爲瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之

心病爲瘧者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱若其人本來心性和而忽弊急反於常白术酒主之

脾病爲瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出恆山丸主之

肺病爲瘧者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所見者恆山湯主之

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒恆山湯主之

金劉完素六書

總論

經曰夏傷於暑秋必痎瘧蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而緩痎瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄於外故邪氣內行至秋而發爲瘧也

初不知何經受之隨其動而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其證各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風熱瘧治多汗之此三陽經受病皆謂之暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂之濕瘧當從太陰經則不分其病發在處暑後冬至前此乃傷之重也遠而爲痎瘧者老也故謂之久瘧氣居西方宜毒藥療之瘧之爲疾因內積暑熱之氣不能宣泄於外而爲瘧也當盛夏之時

能食寒凉之物而助陰氣者縱使有暑熱之氣微者自消矣更時復以藥疎利臟腑使邪氣自下內經曰春食凉夏食寒秋食溫冬食熱是謂春夏養陽秋冬養陰人能於飲食起居之間順四時之氣而行之邪氣何由得生也

治法

瘧病處暑前頭痛項强脈浮惡風有汗桂枝羌活湯迎而服之如吐者加半夏麴等分

若頭痛項强脈浮惡風無汗者麻黃羌活湯

若發瘧如前證而夜發者麻黃黃芩湯蓋桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

瘧病身熱目痛熱多寒少脈長睡臥不安先以大柴胡湯下之微利爲度如下過外有微邪未盡者宜服白芷湯以盡其邪

瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯蓋間日者邪氣所舍深也

瘧寒熱大作不論先後皆太陽陽明合病也謂之大爭寒作則必戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知爲熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治必傳入陰經也當用桂枝芍藥湯主之如服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯和之服藥已如外邪已罷內邪未已再詮下藥從卯至午時發者宜以大柴胡承氣湯主之從午至酉發者知邪在內也宜大承氣湯下之從酉至子發者或至寅時發者知邪在血也宜桃仁承氣湯下之

前項大柴胡承氣等下藥微利爲度以小柴胡湯徹其微邪之氣立秋之後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之痎瘧此邪深遠而中陰經爲久瘧也治久瘧不能飲食胷中鬱鬱欲吐不能者宜吐則已當以藜蘆散雄黃散吐之

秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘧氣入腹宜蒼朮湯主之迎發而服

元張從政儒門事親

瘧非脾寒及鬼神辨

夫瘧猶酷虐之虐也以夏傷酷暑而成痎瘧也又有痎瘧連歲不已此肝經肥氣之積多在左脅之下狀如覆杯是爲痻瘧猶痎也久而不已令人瘦內經既以夏傷於暑而爲瘧何後世之醫者皆以脾寒治之世醫既不知邪熱蓄積之深爲寒戰遂爲寒戰所惑又不悟邪熱入而後出於表發爲躁渴遂爲交爭所惑相傳以薑附硫黃平胃異攻散交加飲子治之百千之中幸其一效執以爲是至使父子弟兄相傳及其瘧之甚者則歸之祟怪豈不大可笑耶內經拘於鬼神者不可與言至德何世俗之愚而難化也又或因夏日飲冷過常傷食生硬瓜果梨棗之屬指爲食瘧此又非也豈知內經之論則不然夏傷於暑遇秋之風因勞而汗元府受風復遇淒滄之水風閉而不出舍於腸胃之外與榮衞並行晝行於陽夜行於陰邪熱淺則連日而作邪熱深則間日而作併入於裏則熱併入於表則寒若此而論了不干於脾後世論藥如此之差互也以時言之治平之時常瘧病少擾

擾之時常瘧病多治平之時雖用砒石辰砂有毒之藥治之亦能取效緣治平之時其民夷靜故雖以熱攻熱亦少後患至於擾攘之時其民勞苦不可遽用大毒大熱之藥若以熱攻熱熱甚則轉爲吐血泄血癰疽瘡瘍嘔吐之疾蓋擾攘之時政令煩亂徭役紛冗朝戈暮戟略無少暇內火與外火俱動在侯伯官吏尤甚豈可與夷靜之人同法而治哉余親見泰和六年丙寅征南師旅大舉至明年軍廻是歲瘴癘殺人莫知其數昏瞀懊憹十死八九皆火之化也次歲瘧病大作侯王官吏上下皆病輕者旬月甚者彌年夫富貴之人勞心役智不可驟用砒石大毒之藥止宜先以白虎湯加人參小柴胡湯五苓散之類頓服立解或不愈者可服神佑丸減用神芎等甚者可大小承氣湯下之五七行或十餘行峻泄夏月積熱暑毒之氣此藥雖泄而無損於臟腑乃所以安臟腑也次以桂苓甘露散石膏知母湯大小柴胡湯人參柴胡飲子量虛實加減而用之此藥能治寒熱往來日晡發作與治傷寒其法頗同更不愈者以常山散吐

之無不愈者余嘗用張長沙汗下吐三法愈瘧極多大忌錯作脾寒用暴熱之藥治之縱有愈者後必發瘡疽下血之病不死亦危余自先世授以醫方至今五十餘年矣苟不識練豈敢如是決也又嘗觀刺瘧論五十九刺一刺則衰再刺則去三刺則已會陳下有病瘧二年不愈者止服溫熱之劑漸至衰羸命予藥之余見其羸亦不敢便投寒凉之劑乃取內經刺瘧論詳之曰諸瘧不已刺十指間出血正當發時余刺其十指出血血止而寒熱立止咸駭其神余非衒術竊見晚學之人不攷誥典謬說鬼疾妄求符籙祈禱辟匿法外旁尋以致病人遷延危殆瘧病除嵐瘴一二發必死其餘五臟六腑瘧皆不死如有死者皆方士誤殺之也或曰汝言瘧因於暑者春發之瘧亦傷暑乎余曰此瘧最深何哉暑伏於秋冬而不發至春始發此瘧之深者內經氣交變大論歲火太過炎暑流行金肺受邪啓元子云火不以德邪害於肺金也故肺金先病以金氣不及故爲病又經曰歲火太過大熱先發故民病瘧少氣欬喘血溢血泄嗌燥耳

聾中熱肩背熱上應熒惑星見則山澤燔燎雨乃不降爍石銷金涸泉焦草火星大而明見注曰火無德令縱熱害金水復制心故心火自病熒惑見則酷法大故瘧常與酷吏之政並行或酷政行於先而瘧氣應於後或瘧氣行於先而酷政應於後昔人有詩云大暑去酷吏此言雖不爲醫設亦於醫旨暗相符者也以前人論瘧者未嘗及於此故予發之乃知聖人立瘧之名必有所謂云

治法

夫富貴膏粱之人病瘧或間日或頻日發或作熱或作寒或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之下過三五行次服白虎湯玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積熱太甚宜以神芎丸藏用丸三花神佑丸調胃承氣湯等藥大作劑料下之下訖以長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可如不愈復以常山散吐之後服凉膈散白虎湯之類必愈矣大忌熱麪及羊肉雞猪魚兔等物如食之瘧疾復作以至不救

貧賤芻蕘之人病瘧以飲食疎糲衣服寒薄勞力動作不可與膏粱之人同法而治臨發日可用野夫多效方溫脾散治之如不愈用辰砂丹治之則愈矣如服藥訖宜以長流水煎白虎湯五苓散服之不宜食熱物及燥熱之藥以瘧疾是傷暑伏熱之故也內經曰夏傷於暑秋必痎瘧可不信哉忌物同前

呪果法

夫瘧疾連歲不愈者可用呪果法治之果者謂桃杏棗梨栗是也呪曰吾從東方來路逢一池水水裏一條龍九頭十八尾問伊食甚的只喫瘧病鬼右念一遍吹在果子上念七遍吹七遍在上令病人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於淨室中安困忌食瓜果葷肉熱物此法十治八九無藥處可救人

李杲十書

夏傷於暑秋必痎瘧

暑者季夏也季夏者濕土也君火持權不與之子暑濕之令不行也濕令不行則土虧矣所勝妄行木氣太過少陽王也所生者受病則肺金不足所不勝者

侮之故水得以乘之土分土者坤也坤土申之分申爲相火水入於土則水火相干而陰陽交爭故爲寒熱兼木氣終見三焦是二少陽相合也少陽在濕土之分故爲寒熱肺金不足灑淅寒熱此皆往來未定之氣也故爲痎瘧久而不愈瘧不發於夏而發於秋者以濕熱在西之分方得其權故發於大暑已後也瘧之爲病以暑舍於榮衞之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑感冒風寒而得之者邪幷於陽則發熱氷水不能涼邪幷於陰則發寒湯火不能溫幷則病作離則病止作止故有時在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽一也或在四肢者風淫之所及隨所傷而作不必盡當風府也先寒而後熱者謂之寒瘧先熱而後寒者謂之溫瘧二者不當治水火當從乎中治中治者少陽也渴者燥勝也不渴者濕勝也瘧雖傷暑遇秋而發其不應也秋病寒甚太陽多也冬寒不甚陽不爭也春病則惡風夏病則多汗汗者皆少陽虛也其病隨四時而作異形如

此又有得之於冬而發之於暑邪舍於腎足少陰也有藏之於心內熱熏於肺手太陰也至於少氣煩寃手足熱而嘔但熱而不寒謂之癉瘧足陽明也治之奈何方其盛也勿取必毀因其衰也事必大昌治法易老瘧論備矣

治當順時

夏天氣上行秋天氣下行治者當順天道謂如先寒後熱太陽陽明病白虎加桂也此天氣上行宜用之若天氣下行則不宜瀉肺宜瀉命門相火則可矣亦有內傷冷物而作者當先調中後定瘧形治隨應見乃得康寧亦有久而不差者當求虛實以脈爲期虛補實瀉可使却疾此之謂也

素問五臟瘧

肝瘧令人色蒼蒼然太息其狀若死者四逆湯通脈四逆湯胃瘧令人且病善饑而不能食食而支滿腹痛大理中湯丸心瘧令人煩心甚欲得清水寒多不甚熱桂枝黃芩湯脾瘧令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出小建中湯芍藥甘草湯肺瘧令人心寒寒

甚則熱熱則善驚如有見者桂枝加芍藥湯腎瘧令人灑淅腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒桂枝加當歸芍藥湯

素問六經瘧

足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已羌活加生地黃湯小柴胡加桂湯足少陽瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚小柴胡湯足陽明瘧令人先寒灑淅灑淅寒甚久乃熱熱去汗出喜日月光火氣乃快然桂枝二白虎黃芩芍藥加桂湯足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰小建中湯異功散足少陰瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已小柴胡半夏湯足厥陰瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃伏非癃也數便意恐懼氣不足腹中悒悒四物元胡苦楝附子湯

朱震亨心法

瘧病證治

瘧疾有風暑食痰老瘧瘧母大法風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也惡飲食者必自飲食上得之

無汗者要有汗散邪爲主帶補有汗者要無汗養正氣爲主帶散

一日一發者受病一月間日一發者受病半年三日一發者受病一年二日連發住一日者氣血俱病

瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服

久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮白朮一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截

老瘧病此係風暑干於陰分用血藥引出陽分則散方宜川芎撫芎紅花當歸炒蘗蒼朮白朮甘草白芷露一宿次早服

治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

程充云按瘧在陰分須掣起陽分者即格致論中

云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而爲補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用蒼朮乾葛升麻柴胡川芎之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

世用砒霜等毒不可輕用俗謂脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎其在陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅爲主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰溫瘧此言誠是但三陰經說不明作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

瘧脈多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

瘧又名痁疾者其證不一素問又有五臟瘧六腑瘧詳矣初得病勢正熾一二發間未宜遽截不問寒熱多少宜用清脾飲或草果飲或二陳湯加草果半錢或平胃加草果半錢柴胡半錢又或養胃湯加川芎

草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯服後寒仍多者養胃湯加附子桂枝各半錢獨寒尤宜不效則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚者則以五苓散入辰砂少許獨熱無寒亦與小柴胡湯熱雖劇不甚渴者本方加桂四分或以柴胡桂枝湯候可截則截之

瘧母久不愈者宜四獸飲間服山甲湯

痎瘧論

內經謂夏傷於暑秋傷於風必有痎瘧痎瘧老瘧也以其隔兩日一作纏綿不休故有是名前賢具有治法然皆峻劑有非稟受性弱與居養太厚者所宜用也惟許學士方有用參芪等補劑而又不曾深論後學難於推測因見近年以來五十歲以下之人多是怯弱者況嗜慾縱恣十倍於前以弱質而得深病最難爲藥始悟常山烏梅砒丹等爲劫痰之劑若悞用之輕病爲重重病必死何者夫三日一作陰受病也作於子午卯酉日少陰瘧也作於寅申巳亥日厥陰

瘧也作於辰戌丑未日太陰瘧也瘧得於暑當以汗解或凉臺水閣陰木冷地他人揮扇泉水澡浴汗不得泄鬱而成痰其初感也胃氣尚強全不自覺至於再感懵然無知又復恣意飲食過分勞動竭力房事胃氣大傷其病乃作深根固蒂宜其難愈病者欲速愈甘心峻劑醫者欲急利遽便妄投殊不知感風感暑皆外邪也當以汗解所感既深決非微汗可除亦有胃氣少回已自得汗不守禁忌又復觸冒舊邪未去新邪又感展轉沉滯其病愈深況來求治者率皆輕試速效劫病之藥胃氣重傷吾知其難免於禍矣由是甘爲遲鈍範我馳驅必先以參朮陳皮芍藥等補劑輔以本經之藥佐其取汗若得汗而體虛又須重用補劑以助之俟汗出通身下過委中方是佳兆仍教以淡飲食省出入避風就溫遠去帷幕謹密調養無有不安若感病極深雖有大汗所感之邪必自臟傳出至腑其發也必亂而失期亦豈是佳兆故治此病春夏爲易秋冬爲難非有他也以汗之難易爲優劣也或曰古方用砒丹烏梅常山得效者不爲少

子以爲不可用乎予曰腑受病者淺一日一作間一日一作者是胃氣尚强猶可與也彼三日一作者病已在臟矣在臟者難治以其外感猶可治也而可用刼藥以求速效乎憲僉詹公病案可據也

明戴思恭證治要訣

瘧病證治

瘧證不一其名亦殊初得之病勢正熾一二發間未宜遽截不問寒熱多少且用清脾飲草果飲或二陳湯加草果半錢或生料平胃散加草果半錢前胡半錢亦有非瘧非勞等疾而自成寒熱乃是痰飲爲之不可不審去痰行飲則愈

初發之際風寒在表雖寒熱過後而身體常自疼常自畏風宜草果飲或養胃湯每服加川芎草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯或養胃湯每服加草果半錢服藥後寒仍多者養胃湯每服加熟附官桂各半錢獨寒者尤宜不效則七棗湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚則佐以五苓散入辰砂少許獨熱無

寒宜小柴胡湯熱雖劇不甚渴者於本方加桂四分熱多而脾氣怯者柴朴湯寒熱俱等者常服宜如上項二陳湯平胃散加料之法發日進柴胡桂薑湯候可截則截之有獨熱用清脾飲效者內煩加參作一錢重然恐非特可治獨熱也

食瘧是飲食傷脾得之或瘧已成不忌口或寒熱正作時吃食其人噫氣吞酸胷膈不利宜生料平胃散每服加草果砂仁各半錢仍佐以紅丸子七香散

暑瘧其人面垢口渴雖熱已退後無事之時亦常有汗宜養胃湯一貼香薷飲一貼和勻作二服渴甚汗出多者加味香薷飲間進辰砂五苓散不問未發其人嘔吐痰食俱出宜多進二陳湯每服草果加之半錢又恐伏暑蘊結爲痰宜消暑丸更於暑證中求之

有四五發已後一應諸證並可截瘧丹未愈再進

久瘧經年累月名曰瘧母又名勞瘧不宜十分攻之所謂久瘧不治者是也進四獸飲間山甲丸瘧愈後調理宜生料平胃散每服加人參茯苓各半錢或用四君子湯加陳皮一錢半即異功散

外有傷寒往來寒熱亦如瘧勞病往來寒熱亦如瘧謂之如瘧非眞瘧也然傷寒寒熱如瘧初必惡風寒發熱頭痛體疼自太陽經而來勞病寒熱如瘧初必五心發煩熱勞倦欬嗽久乃成寒熱與正瘧自不同諸病皆有寒熱如失血痰飲癥瘕積聚小腸癩氣風寒暑濕食傷發勞勞瘵瘡毒脚氣已各見本證其餘不能盡舉亦有不如發瘧之傳爲寒熱者須問其元有何病而生寒熱則隨病施治寒熱發作有期者瘧也無期者諸病也

近世因寒熱發作見其指甲青黑遂名曰沙或戛或挑或灌以油茶且禁其服藥此病卽是南方瘴氣生料平胃散加草果檳榔正宜所治豈有病而無藥哉

王綸明醫雜著

瘧病證治

瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣爲本又須分别陽分

陰分而用藥邪瘧及新發者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不愈矣方用柴胡白朮各一錢半蒼朮泔浸一錢已上三味瘧疾必用之藥乾葛一錢二分陳皮七分甘草炙五分

註　按前證若熱多寒少心煩少睡者屬心名曰溫瘧用柴苓湯但寒少熱腰疼足冷者屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯先寒而後大熱欬嗽者屬肺名曰癉瘧用參蘇飲熱長寒短筋脈揪縮者屬肝名曰風瘧用小柴胡加烏藥香附寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘧用清脾飲瘧愈之後陰陽兩虛夢遺欬嗽不善保養遂成勞瘵若能清心養體節食避風如此調治無不愈矣

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯芩茯苓半夏各一錢熱甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢口乾加石膏知母麥門冬各一錢

註　按劉宗厚先生云從卯至午發者邪在大腸小腸也宜大柴胡湯下之從午至酉發者邪在心與

腎也宜大承氣湯下之此皆邪入於內也從酉至子發者邪在心與膽也或至寅發者此邪在氣在血也宜用桃仁承氣湯微下之更以小柴胡湯徹其餘邪若身熱目痛熱多寒少其脈實長者先以大柴胡湯下之餘熱不盡再用白芷湯若甚寒微熱或但寒不熱者名曰牝瘧用柴胡桂枝湯以解表

若間日或三日發或午後或夜發者邪入陰分加川芎當歸芍藥酒炒熟地黃知母酒炒各一錢紅花酒洗黃蘗酒炒升麻各四分提起陽分可截之

註 按仲景云瘧無他證但隔日發而先寒後熱寒多熱少用桂枝石膏湯發於夜麻黃黃芩湯竊謂前證若中氣虛而間日發者用補中益氣湯若氣血俱虛而三日一發者用十全大補湯

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎當歸芍藥熟地黃各一錢以補血

註 按此條治法當以前後論叅看用藥調治

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

註 按仲景云處暑以前瘧發而頭項痛脈浮惡風有汗者桂枝羌活湯若惡風無汗者麻黃羌活湯若久而汗多腠理開泄陽不能固必補斂之無汗則腠理緻密邪不能解必發散之若屬飲食所傷用六君湯爲主勞傷元氣用補中益氣湯爲主

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃連黃蘗黃芪以斂之無汗柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗扶正爲主無汗者要有汗散邪爲主

註 按前證若寒熱大作不論先後此太陽陽明合病寒熱作則必戰經曰熱勝而動也發熱則必汗泄又曰汗出不愈知內熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治恐久而傳陰經也宜用桂枝芍藥湯

若病久須大補脾胃爲主蓋養正邪自除也

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參一錢五分芍藥酒炒大麥芽各一錢

註 按前證若用寒凉止截脾胃傷損必致連綿不

已若非培養元氣決不能愈然芍藥麥芽善損脾腎不宜多用

若傷食痞悶或有食積者加神麯麥芽枳實炒各一錢黃連炒五分

註　按前證若脾胃無虧飲食過多或暴怒胷膈痞悶者宜此方以消導宿滯若飲食既消而胷膈痞悶者宜六君子以調補脾胃若勞傷元氣兼停飲食用補中益氣加半夏茯苓以升補脾胃若感怒兼食用二陳參朮木香香附山梔以補脾平肝

若痰盛加半夏薑製南星枳實各一錢黃芩炒黃連各六分

註　按前方非膏粱積熱實火爲痰者不宜用若中氣虛而痰甚用補中益氣湯加茯苓半夏如未應用一味薑汁尤好

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各一錢烏梅肉三箇

註　按前證若血氣俱虛用人參生薑各一兩煎服頓止不問新久並效若嚥酸口酸且節飲食其病

潮作時雖大渴只與薑湯乘熱飲之此亦截瘧之良法每見飲啖生冷物者病或少愈多致脾虛胃損反爲難治若病勢正熾一二發間未宜遽截恐邪氣不去正氣反傷耳此法有益無害

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而微熱者邪氣已無用四君子合四物湯加柴胡黃芩陳皮以補氣血

註　按前證若因胃氣虛用四君加升麻當歸若脾血虛用四君加川芎當歸若因中氣下陷用補中益氣湯加茯苓半夏大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足逆冷皆脾胃虛弱但補中益氣其諸證悉愈矣

瘴瘧時瘧寒熱往來方用柴胡知母各一錢五分炒蒼朮泔浸黃芩酒炒乾葛陳皮半夏湯洗川芎各一錢甘草七分炙薑三片烏梅二箇水煎侵晨午前服

註　按前證若因外邪未解而寒熱往來者宜用原方解散之若因脾氣素弱或服前藥外邪既去而寒熱不止或欲嘔少食者脾氣虧損也宜用補中

益氣湯加半夏乾葛茯苓調補之若午前寒熱屬氣虛用四君子加當歸升麻若午後寒熱屬血虛用八珍湯加柴胡升麻大凡病久氣虛而血弱者必發熱須用四君之類調補脾胃脾胃一健氣血自生若誤認爲血虛而用四物沉陰之劑徑生其血則脾土復傷諸臟皆病虛證蜂起反爲難治

瘧久者加人參一錢五分當歸一錢汗多者去蒼术換白术加白芍藥酒炒一錢五分

（註）按瘧久不愈屬中氣虛不能滋養諸臟但調補脾胃諸病自退其汗自出者乃陽氣虛而不能衞固於腠理也用四君加歸芪陳皮未應加薑桂手足逆冷急加附子盜汗者陰虛而腠理不密也宜用八珍加肉桂五味子煩熱作渴暫用當歸六黃湯其中三黃俱炒黑倍加參芪汗既止仍用八珍散之類若腎氣素虛發熱作渴宜六味丸手足逆冷或痰氣上攻宜用八味丸若邪氣既散而寒熱仍作此眞氣虛也卽用補中益氣湯若氣血虛而寒熱者用八珍湯若治失其宜則元氣虧損變證

百出不但久瘧而已矣

瘧後變成痢疾宜從虛治故用補脾胃藥方用黃連炒木香縮砂黃芩炒橘皮白朮當歸酒洗各一錢白芍藥二錢炒甘草炙五分薑水煎食前服

註　按前證乃病氣有餘形氣不足而變證也宜用原方以清解脾胃邪熱若病氣形氣俱不足而不能愈宜補中益氣湯滋養諸臟自愈

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九卷目錄

醫部彙考二百八十九

瘧門二

李梴醫學入門（分陰陽　辨寒熱　明六經　感異端　汗吐下和　虛勞　瘧因　食積　瘧母　兼痢　變證　似瘧　熱多寒少　往來寒熱　搏鬬升降　治法）

李中梓醫宗必讀（總論　證治　截法）

薛氏醫按（治法）

趙獻可醫貫（總論　證治）

喩昌醫門法律（瘧論 論金匱奥義 論經義 律三條）

張介賓景岳全書（瘧論證 論治 論汗 論標本 厭瘧 截瘧 似瘧非瘧 溫瘧 癉瘧 瘴瘧 辨古）

陳士鐸石室祕籙（瘧病治法）

藝術典第三百九卷

醫部彙考二百八十九

瘧門二

明李梴醫學入門

分陰陽

陽爲外感邪氣實爲風暑有汗陰爲內傷正氣虛爲寒濕無汗陽爲氣虛陰爲血虛陽爲升發在春夏陰爲降發在秋冬陽爲腑邪淺與榮衛並行一日一發陰爲臟邪深横連募原不能與正氣併行故間日畜

積乃發或三四日一發久則必有瘧母陽爲日發邪淺榮衛晝行背與脊故也陰爲夜發邪深榮衛夜行胃與腹故也又有二日連發住一日者及日夜各一發者乃氣血俱受病也陽爲子時至巳陰爲午時至亥如發寅卯而退於未申或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須隨證用藥趲早或移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升散今俗以似瘧誤治變成溫瘧爲分陰陽謬矣殊不知瘧有凌虐之狀在傷寒久則爲壞證在內傷久則爲勞瘵豈輕疾哉凡陽瘧易治陰瘧難愈

辨寒熱

陽邪與榮爭而邪火發於外則爲熱陰邪與衛爭而正氣退於內則爲寒衛虛則先寒榮虛則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等諸瘧惟食積挾火寒已復熱熱已復寒謂之寒熱相併又暑瘧單熱濕瘧單寒寒瘧先寒後熱風瘧先熱後寒餘皆先寒後熱陰陽寒熱明而治瘧知本矣

明六經

寒瘧腰背頭項俱痛屬太陽寒多熱少汗出難已者柴胡加桂湯單寒無汗者五積散古果附湯

熱瘧目痛鼻燥鼓頷屬陽明熱多寒少煩渴尿赤者柴苓湯暑月黃連香薷飲熱傷氣分單熱而渴者白虎加人參湯或黃芩湯加桂少許

風瘧口苦嘔吐惡心脅痛屬少陽寒熱相等者柴胡桂枝湯風盛筋脉抽搐者烏藥順氣散加柴胡黃芩身疼者敗毒散欬嗽參蘇飲

已上三陽氣分受病發在處暑之前者俱謂之暴瘧乃傷之淺者

少陰瘧發於子午卯酉四正之日舌乾口燥嘔吐欲閉戶牖輕者小柴胡湯倍半夏重者合四物湯

厥陰瘧發於寅申巳亥四隅日小腹痛引陰如淋輕者小建中湯重者四物湯加延胡索金鈴子附子

太陰瘧腹滿自利善嘔嘔已乃衰輕者異功散重者理中湯如濕偏陰分單寒氣虛作泄者古棗附湯附子理中湯身重腹脹者五苓散朮附湯浮腫退黃丸

已上三陰血分受病發在處暑後者俱謂之溫瘧乃

隔冬感溫氣藏於腎與骨髓至夏秋重感新邪觸發自臟而達之腑乃傷之重者

感異氣

瘴瘧山溪蒸毒令人迷困發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無者涼膈散加柴胡檳榔不伏水土者人參養胃湯

疫瘧一方長幼相似須叅運氣寒熱用藥大概不換金正氣散五積交加散加減如意丹最妙

鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖言動異常宐辟邪丹雄硃丹或用燒人塲上土爲丸塞男左女右耳中

汗吐下和

外感寒多非草果厚朴不能溫散熱多非柴胡黃芩不能清解陽瘧無汗須加柴胡蒼朮葛根甚則加麻黃陰瘧無汗須加柴胡升麻川芎有汗須加白朮烏梅以和之

陽瘧初起痰在上者祛邪丸然亦三五發後移時乃可用之早則延緜稍久不敢吐者勝金丹

三陰瘧便閉者宜下以截之暑瘧黃連香薷散加大黃烏梅青皮煎服寒瘧二陳湯加青皮良薑煎吞神保丸五粒痰熱胷滿便閉者大柴胡湯瘀血發狂好忘者桃仁承氣湯虛閉麻子仁丸俱清晨一服取下惡水即止

虛勞

內傷瘧皆不食惟七情善食多汗五臟之氣不和略被外邪動痰宜四獸飲量體虛實加各經開鬱行氣之藥

勞瘧微微惡寒發熱寒中有熱熱中有寒最難調理或半月十日小勞復來經久不瘥者芎歸鼈甲散主之熱多者生犀散有痞者鼈甲丸

氣虛汗多無力飲食不進者六君子湯因勞役昏倦少食者補中益氣湯加黃芩半夏

血虛夜發者小柴胡湯合四物湯加升麻紅花知母黃蘗水煎露服趲早不愈用勝金丹截之有痞者陰瘧丸如陰虛火動午後寒熱至晚微汗乃解似瘧非瘧也宜加味逍遙散加地骨皮若誤用瘧藥必死

氣血俱虛溺頻食少或遺精欬嗽者人參養榮湯加地骨皮烏梅麥門冬或仆厥不省者十全大補湯加柴胡黃芩陽虛去柴芩加附子吞黑錫丹有痞者橘皮煎丸

痰因

痰瘧外感內傷鬱聚成痰熱多頭痛肉跳吐食嘔沫甚則昏迷卒倒宜柴陳湯加草果嘔吐者二陳湯倍白豆蔻流行三焦嘔瘧自止氣虛嘔者單人參湯或用常山炒過久不止者露薑飲截之

食積

食瘧因飲食蘊成痰火寒已復熱熱已復寒寒熱交併苦饑不食食則吐痰胷滿腹脹者二陳湯合小柴胡湯或平胃散俱加枳實白术山楂神麯青皮熱多者清脾飲寒多者人參養胃湯腹痛者紅丸子腹脹因濕痰或瘧氣歸腹者古龍虎丹用杏仁煎湯迎發時下久不愈者用辰砂阿魏等分糊丸皂子大每一丸人參煎湯下截之

瘧母

凡瘧經年不瘥謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脅作脹且痛乃瘧母也雖內虛者非常山檳榔決不能除俱須製熟則不損胃老瘧丸是也血虛者鼈甲丸體盛有水癖者暫用芫花丸仍須以補脾化痰湯藥輔之老瘧飲宜量氣血虛實加減

兼痢

或瘧後痢痢後瘧或瘧痢併作俱以柴苓湯六和湯清脾飲加減分利虛者補脾和血三白湯加黃連木香當歸砂仁或四獸飲補中益氣湯

傷寒變證

傷寒汗吐下餘熱未盡重感於寒而變瘧或過經舊熱未解新感六淫之氣而變瘧皆曰溫瘧者俱先熱後寒故也寒多熱少或單寒者太陽邪變也柴胡桂薑湯熱多寒少或單熱骨節煩疼者陽明邪變也白虎湯加桂寒熱相等或先熱者少陽邪變也小柴胡湯渴者去半夏加天花粉知母寒熱大作戰慄汗出不散者太陽陽明合病也桂枝石膏湯服此後瘧愈甚者三陽合病也恐傳入陰經須急用桂枝黃芩湯

如傳入陰分從卯至午發而嘔吐大便閉者大柴胡湯下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑者桃仁承氣湯微利之不敢下者梔子升麻湯傷寒與雜病瘧不同在此間有挾痰與食積嘔吐不食者二陳湯對金飲子尿澀煩渴或因瘴氣不伏水土者五苓散俱加黃芩柴胡此等瘧與雜病無大異見其勢發少緩則截之痰飲在上膈欲吐不吐者瓜蔕赤小豆雄黃等分爲末水調五分服之以吐爲度或祛邪丸亦好久不愈者勝金丹老瘧丸以消之

似瘧

似瘧非瘧作止有時或日再發或二三日一發非似潮而無寒亦非若寒熱往來之無定也太陽證二三日似瘧寒多脈浮洪者桂枝湯或桂枝二麻黃一湯陽明證似瘧汗出日晡發熱脈浮者桂枝湯脈實者承氣湯熱入血室似瘧小柴胡湯主之厥陰證似瘧一日二三發脈浮緩者爲裏和自汗而愈凡感冒之人或覺毛寒股慄筋節拘攣百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者皆似瘧狀不必脈弦

隨所見證與脉而以小柴胡湯和解此卽溫瘧也

熱多寒少

一證脉弱者亡陽也不可正汗及吐下桂枝二越婢一湯以微汗之一證脉遲者血少也先以黃芪建中湯養血俟脉不遲乃以小柴胡湯和之一證脉陰陽同等微浮微緩不嘔清便自調此不待藥汗而自愈也若面赤身痒脉濇者桂麻各半湯必待微汗而後愈通用柴陳湯熱多加川芎前胡寒多加川芎草果若寒多熱少不煩躁而脉浮緩者乃傷寒見傷風脉也或面色不澤兩手無脉者乃麻黃附子細辛湯之證也

往來寒熱

經曰陰氣上入陽中則惡寒陽氣下陷入陰中則發熱此陰陽相乘之病也若大下陰微發熱大汗陽微惡寒乃醫之誤也大要陽不足則陰邪出於表而與陽爭則陰反勝而爲寒陰不足則陽邪入於裏而與陰爭則陽反勝而爲熱若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪

多則寒多裏邪多則熱多半表半裏寒熱相等乍往乍來而間作也若不嘔淸便脉浮者猶當解表口渴尿赤脉實者大柴胡湯心煩喜嘔胷脅滿而不欲食者小柴胡湯熱多者加柴胡寒多者加桂枝汗下後柴胡證不除者柴胡桂薑湯寒熱往來脅滿小便不利嘔渴頭汗者最宜如寒熱勢盛當遲一二日少定方可圖之所謂盛者可待衰而已若寒熱勢定或早移於晏晏移於早邪無可容之地病將解矣

搏鬬升降

夫病機言搏者舊有痰痞相火之類偶然新氣加之則搏動而發此理易明言爭者乃彼此相搏相鬬久而後可和解之謂不過邪正氣相引結而未遽散非實有所爭競也血氣盛者雖風寒之邪乘間而入終不能動其眞氣而與之鬬惟血氣弱者則邪入必鬬鬬則便有勝負須正氣復而後邪可退也若邪愈勝而正氣愈負非藥餌大扶持之必不可救此爭與搏之義也至於頭面上病皆百邪上攻胷膈間病皆百邪上衝腸胃間病皆百邪下流而傳入不然則血氣

失升降之常或陽當升而不升陰當降而不降精宜升而不升氣宜降而不降血宜順而不順火宜靜而不靜識病機括盡於此矣

治法

外感汗吐下解祛邪爲主內傷斂補養正爲主內外相兼又當參酌而論經曰夏傷於暑秋必痎瘧又曰諸瘧皆生於風局方主於傷食丹溪主於痰其實因夏傷暑秋感風濕遇七情飲食鬱痰而後發雖三因雜至錯亂氣血然始於暑成於痰故捷徑以祛暑消痰爲要

通用二陳湯外感無汗去茯苓加柴胡梢川芎葛根蒼朮太陽加羌活防風藁本陽明加葛根升麻白芷少陽加柴胡黃芩青皮少陰加歸芎黃連黃蘗太陰加二朮柴胡此三味瘧家必用厥陰加桂枝薑附渴加知母麥門冬大便閉加大黃桃仁小便赤加澤瀉山梔瘴瘧加檳榔截瘧加常山檳榔貝母內傷無汗加柴胡川芎氣虛合四君子湯血虛合四物湯汗多加黃芪有食加山楂麥芽勞瘧加地骨皮鼈甲七情

加紫蘇香附痰加南星薑汁食積加莪朮久瘧倍參朮寒甚加桂附草果夜瘧加升麻柴胡以提之停水倍半夏瘀血加桃仁紅花吐瀉不食腫脹者不治瘧無痰不成內傷脾胃虛寒宜清利濕痰爲主內傷瘧皆汗多陽瘧斂以參朮黃芪陰瘧斂以歸地知蘗芍藥大抵有汗要止汗以補其虛無汗要發汗以散其邪稍久者一補一發丹久虛補中益氣湯加山楂麥芽扶脾自止極忌吐截

李中梓醫宗必讀

總論

按經言夏傷於暑秋爲痎瘧又言痎瘧皆生於風又言風寒之氣不常又言汗出遇風及得之以浴此皆以風寒暑濕爲言也語溫瘧則曰風寒中腎語癉瘧則曰肺素有熱夫冬寒既可以中腎則心肝脾肺四臟獨無令氣之邪可以入客乎肺熱既可以成瘧則肝脾心腎之氣鬱而爲熱者獨不可以成瘧乎然語六氣者道其常語五臟者盡其變也須知風與暑陽邪也寒與水陰邪也風者陽中之涼氣也暑者熱中

之陰邪也由是則四者皆屬於寒夫夏傷於暑汗出腠開當風浴水淒滄之寒伏於皮膚及遇秋風新凉束之表邪不能外越陰欲入而陽拒之陽欲出而陰遏之陰陽相薄而瘧作矣淺者病在三陽隨衞氣以爲出入而一日一作深者病在三陰邪氣不能與衞氣並出或間日或三四日而作作愈遲者病愈深也經之論瘧無漏義矣而仁齋丹溪又分痰與食飲與血瘴與勞與牝此不過瘧之兼證耳非因而成瘧者也故治瘧者察其邪之淺深證之陰陽令其自藏而腑散而越之邪去則安古法有汗欲其無汗養正爲先無汗欲其有汗散邪爲急然邪在陽者取汗易邪在陰者取汗難必使由陰而陽由晏而早乃得之也又熱多者凉藥爲君寒多者溫藥爲主至於痰食血飲瘴勞與牝之七證各隨其甚者而兼理之世俗又有鬼瘧之名此爲時行疫氣投平胃散無不截者總之脉實證實者攻邪以治標脉虛證虛者補正以治本久瘧必虛惟人參生薑各一兩連投二服於未發之前莫不應手取效貧困者白术可代血虧者當歸

可代近世不明表裏虛實輒用知母石膏芩連梔蘗若表未解而得此寒凉則寒邪愈固或用常山草果巴豆砒雄若正已虛而得此尅伐則元氣轉虛致夫綿延不已者皆醫之罪耳豈病之咎耶

證治

瘧疾多因風寒暑濕天之邪氣所傷當分經絡而發汗其七情痰食水血皆兼見之候隨證治之

風瘧必惡寒自汗煩躁頭疼必先熱後寒宜柴胡蘇葉細辛白芷羌活生薑之類

溫瘧乃受冬月之寒復因暑風而發亦先熱後寒如熱多者小柴胡湯寒多者小柴胡湯加桂

寒瘧乃納凉之風寒沐浴之水寒先受於腠中復因秋風凉肅而發先寒後熱宜羌活紫蘇生薑之類散其太陽之邪次用柴胡湯近來不問何經俱用柴胡者非也

癉瘧者肺素有熱陰氣先絕陽氣獨發少氣煩冤手足熱而嘔此但熱而不寒盛暑發者人參白虎湯秋凉發者小柴胡湯

濕瘧乃汗出澡浴或冒雨或濕襲其證身體重而痛嘔逆脹滿胃苓湯加羌活紫蘇

牝瘧者其人必陽氣素虛當盛暑時乘凉飲冷陽虛陰盛故但寒而不熱也柴胡桂薑湯

食瘧者必肥甘無度或生冷受傷食滯痰生其證饑而不能食食則脹滿嘔吐腹痛青皮草果豆蔻砂仁神麯山楂之類

瘴瘧由嶺南地方天氣炎山氣濕多有嵐瘴之毒發時迷悶甚則狂妄亦有不能言者皆由血瘀於心涎聚於脾須疎通六腑凉膈散或小柴胡加大黃木香

勞瘧必素有弱證或因瘧成勞十全大補湯有熱者去桂

瘧母由治之失宜榮衛虧損邪伏肝經脅下有塊此證當以補虛爲主每見急於攻塊者多致不救六君子湯加木香肉桂蓬朮鼈甲

鬼瘧者俗以夜發者爲鬼瘧非也邪入陰分發於六陰宜四物湯加知母紅花升麻柴胡提起陽分方可截之惟時行不正之氣眞鬼瘧也宜平胃散加雄黃

桃仁

截法

瘧發四五徧後曾經發散者方可截之何首烏散常山飲獨蒜丸久瘧大虛者人參一兩生薑二兩連進三服若病邪初起未經發散遽用酸收刼止之劑必致綿延難愈或變成他證不可不謹也

薛氏醫按

治法

大凡停食之證必因於脾弱宜用六君枳實厚朴山楂神麴若食已消而不愈用六君子湯若內傷外感用藿香正氣散若內傷多而外感少用人參養胃湯若勞傷元氣兼外感用補中益氣加川芎若勞傷元氣兼停食補中益氣加陳皮神麯甚者加山楂若氣惱兼食用六君加香附山梔若噯酸或食後口酸多是飲食當節飲食病作時大熱躁渴以薑湯乘熱飲之此截瘧之良法也每見發時飲啖生冷物者病或少愈多致脾虛胃損往往不治大抵內傷飲食者必惡食外感風寒者不惡食審係勞傷元氣雖有百證

但用補中益氣湯其病自愈其屬外感者主以補養佐以解散其邪自退若外邪既退卽補中益氣以實其表若邪去而不實其表或過用發表虧損脾胃皆致綿延難治凡此不問陰陽日夜所發皆宜補中益氣此不截之截也夫人以脾胃爲主未有脾胃實而患瘧痢者若專主發表攻裏降火導痰是治其末而忘其本則輕者變重而重者變危矣前所云乃瘧之大略如不應當分六經表裏而治之

凡截瘧余常以參朮各一兩生薑四兩煨熟煎服卽止或以大劑補中益氣加煨薑尤效生薑一味亦效

趙獻可醫貫

總論證治

或問曰經云夏傷於暑秋必病瘧前人雖備言之旨殊未暢盍明示諸曰不發於夏而發於秋此亢則害承迺制子來救母之義蓋暑當權君火用事肺金必受傷尅火位之下水氣承之腎水爲肺之子因母受火傷子來承之以制火救母於是水火相戰陰陽交爭大勝則大復小勝則小復此陰陽勝復之常理瘧

之所由作也然而有病有不病者蓋邪之所湊其氣必虛故其人元氣不固者暑邪得以承之所以治瘧以扶元氣爲主

凡治瘧必先問其寒熱多寡而參之脈證有寒多熱少者有熱多寒少者大抵寒熱往來皆屬少陽經證治法當以小柴胡爲主若寒多者小柴胡加桂枝有但熱不寒者名曰癉瘧有但寒不熱者名曰牝瘧金匱云陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧邪氣內藏於心肺外舍於分肉之間令人消爍脫肉又云溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時時嘔逆以白虎加桂枝湯主之但寒者名曰牝瘧蜀漆散主之此寒熱多寡之定法也然亦有不可執者當察其脈之虛實何如若但寒者其脈或洪實或滑當作實熱治之若但熱者其脈或空虛或微弱當作虛寒治之

凡瘧將發之時與正發之際愼勿施治治亦無效必待陰陽升極而退過此邪留所客之地然後治之且當病未發二三時前迎而奪之可也古今治瘧證候

有風寒暑濕不同治療有汗吐下各異方術無慮千百不能盡述獨無痰不成瘧無食不成瘧深得致瘧之因無汗要有汗散邪爲主有汗要無汗扶正氣爲主深得治瘧之法以青皮飲一方治秋時正瘧隨證加減屢用屢效若胃中有鬱痰伏結者以草果飲一服即愈服前方不應當以補中益氣湯倍柴胡加半夏生薑養正而邪自除

仁齋云有人臟腑久虛大便常滑忽得瘧疾嘔吐異常以二陳加人參白豆蔻進一二服病人自覺氣脈頓平寒熱不作蓋白豆蔻流行三焦元氣榮衛一轉寒熱自平繼今遇有嘔吐發瘧之證或其人素虛者慎勿用常山等藥以上專論秋時正瘧之法也世間似瘧非瘧者多世人一見寒熱往來便以截瘧丹施治一截不止則再截再截而止止而復發復截以致委頓甚或因而致斃者有之是不可不辨也經曰陽虛則惡寒陰虛則惡熱陰氣上入於陽中則惡寒陽氣下陷於陰中則惡熱凡傷寒後大病後產後勞瘵等證俱有往來寒熱似瘧或一日二三度發並作虛

治但有陽虛陰虛之別陽虛者補陽如理中湯六君子湯補中益氣湯加薑桂甚則加附子諸方中必用升麻柴胡以提出陰中之陽水升火降而愈醫書中有論及之者至於陰虛之寒熱亦與正瘧無異而陰虛中又有眞陰眞陽之分人所不知經曰晝見夜伏夜見晝止按時而發是無水也晝見夜伏夜見晝止倏忽往來時作時止是無火也無水者壯水之主以鎭陽光六味湯主之無火者益火之原以消陰翳八味湯主之世人患久瘧而不愈者非瘧不可愈乃治之不如法也丹溪云夜發者邪入陰分宜用血藥引出陽分當歸川芎紅花生地黃蘗治之亦未及眞陰眞陽之至理徧考諸書瘧論並未能露其意且余嘗試有神驗故特表而出焉余見發瘧有面赤口渴者俱作腎中眞陰虛治無不立應凡見患者寒來如冰熱來如烙惟面赤如脂渴欲飮水者以六味地黃加柴胡芍藥肉桂五味大劑一服便愈

有渴甚者每發時飮湯不絕必得五六大壺方可余以六味丸一料內肉桂一兩水十碗作四沙鍋煎五

六碗以水探冷連進代茶遂熟睡渴止而熱愈

又有惡寒惡熱與瘧無異面赤如脂口渴不甚吐痰如湧身以上熱如烙膝以下自覺冷此眞陽泛上腎虛之極急以附子八味地黃湯大劑冷飲而熱退繼以人參建中湯調理

又有一等鬱證似瘧者其寒熱與正瘧無異但其人口苦嘔吐清水或苦水面青脅痛耳鳴脉濇須以逍遙散加茱連貝母倍柴胡作一服繼以六味地黃加柴胡芍藥調理而安

至於三陰瘧者惟太陰瘧當用理中湯必加肉桂若少陰厥陰非八味地黃不效

世有瘧後痢痢後瘧者夫旣爲瘧後發洩已盡必無暑熱之毒復爲痢疾此是元氣下陷脾氣不能升舉似痢非痢也旣爲痢後下多則亡血氣又隨痢散陰陽兩虛陽虛則惡寒陰虛則惡熱故寒熱交戰似瘧非瘧也俱作虛論用補中益氣加溫補其病自愈

凡秋月患瘧此病原於濕痰初起卽問有汗無汗無汗者以敗毒散發之若有汗敗毒散加桂枝待服二

三劑後分辨陰陽一瘧陰瘧柴平湯加山樝肉升麻倍下桂枝極妙陽瘧只以柴苓湯爲主多加知母更妙

若發自上晝是陽瘧初用芎蘇五苓散二用清脾湯三用加味敗毒散柴苓湯多加知母若用截藥用青蒿丸

若發自下午面青寒多吐是陰瘧初用人參羌活散二用草果飲三用加味敗毒散若用截藥用不二丸

斷瘧如神丹

醫門法律

臣喻昌著

瘧論

瘧之一病無如內經論之最詳最徹隨其病之所形按法刺之莫不應手而愈蓋九鍼之用通於神明不可有微芒之差忒故內經論瘧不得不詳也後世惡於鍼石不可與言至巧乃以藥劑攻邪存正調榮衛之偏和陰陽之逆於是種種聖法不適於用矣如張子和見羸人病瘧二年不敢輒投寒凉取刺瘧論之法刺其十指出血立愈此正內經所謂瘧之且發也

陰陽之且移也必從四末始也堅束其處決去其血則邪往而不得併故立愈也以子和之久諳鍼法且檢鍼經致其詳愼鍼其可以瀆用哉舍鍼而求內經用藥之捷法茫然無可下手矣予之所以心折仲景稱爲百世之師者每遇一證必出一法以緯內經之不逮一言當千百言而居其要也夫人四體安然外邪得以入而瘧之每伏藏於半表半裏入而與陰爭則寒出而與陽爭則熱半表半裏者少陽也所以寒熱往來亦少陽所主謂少陽而兼他經之證則有之謂他經而全不涉少陽則不成其爲瘧矣所以仲景曰瘧脈多弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗鍼灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之只此七言而少陽一經汗吐下和溫之法具備其他癉瘧溫瘧牡瘧瘧母四證要不外少陽求治耳出傷寒論之緒餘以補內經下手之法非聖人而能之乎謹將金匱奧義一一發明於左

論金匱奧義

少陽乃東方甲木之象故其脈主弦此不但初病之脈乃爾卽久瘧正虛脈不鼓指而弦象亦隱然在內所以仲景云瘧脈自弦由首及尾脈之屢遷縱有不同而弦之一字貫貫徹之瘧邪之舍於榮衛正屬少陽半表半裏始之似瘧非瘧與後之經年不解總一少陽主之蓋瘧發必有寒有熱其寒熱之往來適在少陽所主之界偏陰則多寒偏陽則多熱卽其純熱無寒而爲癉瘧溫瘧純寒無熱而爲牡瘧要皆自少陽而造其極補偏救敝亦必返還少陽之界陰陽兩協於和而後愈也施汗吐下之法以治實熱施和溫之法以治虛寒無非欲致其和平耳瘧邪如傀儡少陽則提傀儡之線索操縱進退一惟少陽主張寧不恢恢乎游刃空虛也耶

弦數者風發也以飲食消息止之仲景旣云弦數者多熱矣而復申一義云弦數者風發見多熱不已必至於極熱熱極則生風風生則肝木侮土而傳其熱於胃坐耗津液陽愈偏而不返此未可徒求之於藥也須以飲食消息而止其熾熱卽梨汁蔗漿生津止

渴之屬正內經風淫於內治以甘寒之旨也陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍肌肉內經謂其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧仲景之重引其文另有妙義蓋從上條弦數者風發也以飲食消息止之抽絲引絮而出其證謂弦數之脉熱盛生風必侮土而傷其津液由少陽而入陽明兩經合邪其熱倍熾倘不能飲食消息急止其熱則熱之移於胃者必上熏心肺少氣煩寃而心肺病手心熱欲嘔而胃自病所以繼之曰邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍肌肉蓋傷寒病三陽合邪其來如風雨如霹靂令人莫當而瘧之在少陽苟不入於陰而但出於陽迨至兩陽合邪亦豈能堪之耶故知消息而止入胃之熱邪眞聖法也然仲景之法亦從內經而得內經謂瘧脉緩大虛便宜用藥不宜用鍼又謂虛者不宜用鍼以甘藥調之昌知意中在用甘寒也

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節煩疼時嘔白虎加桂枝湯主之內經言溫瘧有二俱先熱後寒仲景所名溫瘧則但熱不寒有似癉瘧而實不同也癉瘧兩陽合邪上熏心肺肺主氣者少氣煩冤則心主脈者陽盛脈促津虧脈促從可推矣溫瘧脈如平人則邪未合而津未傷其所以但熱而不寒者則以其人素有痹氣營衞不通故瘧之發於陽不入於陰卽入而陰亦不受所以骨節煩疼時嘔邪氣扞格之狀有如此者惟用白虎湯以治陽邪而加桂枝以通營衞斯陰陽和血脈通得汗而愈矣在傷寒病衞強榮弱衞氣不共榮氣和諧者用桂枝湯復發其汗立愈此瘧邪偏著於陽桂枝陽藥卽不可用但用白虎湯大淸氣分之熱少加桂枝合陰陽而兩和之乃知仲景之法絲絲入扣也

其內經所稱先熱後寒之溫瘧一者先傷於風後傷於寒風爲陽邪寒爲陰邪瘧發時先陽後陰故先熱後寒也此以風寒兩傷榮衞之法治之初無難也其一爲冬感風寒深藏骨髓內舍於腎至春夏時令大

熱而始發其發也瘧邪從腎出之於外而大熱則其內先已如焚水中火發雖非眞火亦可畏也俟其瘧勢外衰復返於腎而陰精與之相持乃始爲寒設不知壯水之主以急救其陰十數發而陰精盡矣陰精盡則眞火自焚灑灑時驚目亂無精頃之死矣所以傷寒偏死下虛之人謂邪入少陰無陰精以禦之也而溫瘧之慘寧有異哉此亦仲景意中之隱旨特比例陳情以爲來學之助

瘧多寒者名牡瘧蜀漆散主之瘧多寒者寒多於熱如三七二八之分非純寒無熱也純寒無熱則爲陰證而非瘧證矣此條又抽絲引絮即上條兩陽合邪上熏心肺證中復指出多寒少熱一證蓋邪之伏於心下適在膻中心包之位心爲陽中之陽陽邪從陽尤爲易入邪入則心虛經曰心虛者熱收於內內收其熱并其邪亦收之不易外出此寒多之一因也邪入心胞都城震動周身精液悉力內援重重裹擷胞內之邪爲外所拒而不易出又寒多之一因也心者牡臟故卽以寒多熱少之瘧名曰牡瘧用蜀漆散和

漿水吐其心下結伏之邪則內陷之邪亦隨之俱出一舉而蕩逐無餘矣豈不快哉蜀漆常山苗也常山善吐何以不用常山而用蜀漆取苗性之輕揚者入重陽之界引拔其邪合之龍骨鎮心寧神蠲除伏氣雲母安臟補虛媚茲君王仲景補天浴日之方每多若此至如溫瘧亦用此方更加蜀漆以吐去其心下結伏之邪蓋一吐則周身之痹者通而榮衞並可藉以無忤則又以吐法爲和法者也其附外臺祕要牡蠣湯一方同治牡瘧者又初感病時風寒未清傳變爲瘧結伏心下故方中用麻黃以散風寒幷藉之以通陽氣耳可見病之途原不一學者於此一證二方比而參之以求生心之變化則幾矣

論金匱柴胡去半夏加苦蔞湯方治瘧病發渴者亦治勞瘧此仲景治少陽病全體大用之一方也仲景謂瘧邪盛衰出入必在少陽表裏之間小柴胡湯乃傷寒少陽經天然不易之法渴者去半夏加苦蔞實亦天然不易之法而施之於少陽邪傳陽明傷耗津液之證亦爲天然不易之法蓋渴雖陽明津竭而所

以致陽明津竭者全本少陽之邪觀內經刺法瀉者取之少陽非以其木火之勢刼奪胃津而然耶故瘧邪進退於少陽即以此方進退而施其巧柴胡黄芩對治木火人參甘草扶助胃土苦蔞生津潤燥薑棗發越榮衛若夫勞瘧之病其木火盛榮衛衰津液竭亦不待言故并可施此方以治之也

論柴胡薑桂湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神此瘧之寒多熱少或但寒不熱非不似於牡瘧而微甚則大不同仲景不立論止附一方且云服一劑如神其邪之輕而且淺從可識矣葢以衛即表也榮即裏也胷中之陽氣散行於分肉之間今以邪氣痹之則外衛之陽反鬱伏於內守之陰而血之痹者愈瘀結而不散遇衛氣行陽二十五度而病發其邪之入榮者旣無外出之勢而榮之素痹者亦不出而與陽爭所以多寒少熱或但有寒無熱也小柴胡湯本陰陽兩停之方可隨瘧邪之進退以爲進退者加桂枝乾薑則進而從陽痹著之邪可以開矣更加牡蠣以耎其堅壘則陰陽豁然貫通而大汗解矣所

以服一劑如神也其加芩連以退陽而從陰即可類推

論經義

病瘧以月一日發當十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結爲癥瘕名曰瘧母急治之宜鼈甲煎丸此見瘧邪不能久據少陽即或少陽經氣衰弱不能送邪外出而天氣半月一更天氣更則人身之氣亦更瘧邪自無可容矣不則天人之氣再更其瘧邪縱盛亦强弩之末不能復振矣設仍不解以爲元氣未生耶而月已生魄矣元氣何以不生以爲邪氣不盡耶而月已由滿而空矣邪氣何以不盡此必少陽所主之脅肋外邪盤踞其間依山傍險結爲窠巢縣官當一指可撲之時曾不加意漸至滋蔓難圖矣言及此不覺涕泗交流乃知仲景急治之法眞經世宰物之大法也

再按譚醫者當以靈素爲經金匱爲緯讀靈素而不了了者求之金匱矩矱森森但旨深詞約味如嚼蠟不若內經之芻豢悅口所以古今注內經者不下百

家而注金匱者率罕其人即間有之其胷中渾是疑團擇顯明之句發揮一二隨竟其說觀者會何賴焉歷代名賢屈指不過數人咸以仲景之學爲絕學存而不論論而不議其所以卓冠億兆人千百年者各從內經分頭證入如瘧病一門巢氏病源妄分五臟後人謂其發明內經深信不疑而不知瘧邪不從臟發內經所無之理巢氏臆言之耳陳無擇三因之說躂矣乃謂夏傷於暑秋爲痎瘧者不可專以此論何其甘悖聖言耶至論內因勦襲巢氏心肝脾肺腎五瘧立言仍是巴人下里之音矣張子和治瘧喜用汗吐下三法自誇本於長沙詎知仲景所爲汗下者但從少陽之和法而進退其間不從傷寒之汗下起見也其可吐者或用瓜蔕或用常山苗各有深義亦豈漫然而吐之耶且子和謂治平之時其民夷靜雖用砒石辰砂有毒之藥以熱治熱亦能取效是何言歟至東垣丹溪確遵內經夏傷於暑秋必痎瘧之論多所發明而謂吳楚閩廣之人患瘧至多陽氣素盛之處其地卑濕長夏之時人多患暍瘧霍亂瀉痢傷濕

熱也此語誠爲聰明絕世矣然於內經之旨尚隔一層內經運氣暑與濕同推不分彼此曾何分南北乎內經本謂夏傷於暑長夏傷於濕秋必痎瘧脫落五字遂謂秋傷於濕冬生欬嗽而傷燥一氣古今絕無一人起而颺言此等大綱不正亦何貴於識大之賢哉且丹溪所論十二經皆能爲病固即刺瘧篇之旨曷不遵金匱推足少陽一經爲主坐令多岐亡羊耶方書俱以溫瘧爲傷寒壞病與風瘧大同此言出於何典至於牡瘧總無其名統括於寒瘧之內誤指寒瘧爲臟寒之極故無熱有寒用薑桂附子溫之又有更其名爲牡瘧者云久受寒濕陰盛陽虛不能制陰所以寒多不熱悽愴振振亦行溫熱之法直是殺人不轉睫矣又謂暑瘧即癉瘧嘔者用縮脾等藥從無有救少陽木火之邪如救焚者適燕而南其指亦何生民之不幸耶

逆夏氣則太陽不長心氣內洞又秋爲痎瘧此陽氣不能條暢而外茂內薄於心燠熱內消故心中洞然而空也心虛內洞則諸陽之病作矣心傷則暑氣乘

之至秋而金氣收斂暑邪內鬱於是陰欲入而陽拒之故爲寒火欲出而陰束之故爲熱金火相爭故寒熱往來而爲痎瘧

律三條

凡治瘧不求邪之所在輒行大汗大下傷人正氣者醫之罪也蓋瘧邪在於半表半裏故有寒有熱若大汗以傷其表大下以傷其裏是藥反增瘧矣倘瘧邪伏而未盡藥過再發更將何法以處之

凡用吐法妄施惡劣之藥并各種丸藥傷人藏府者醫之罪也夫吐法止可用清芬之氣透入經絡引出瘧邪如酒浸常山不用火煎之類其膽礬信石等丸吞入腹中粘著不行攪亂腸胃臟腑究竟無益戒之戒之

凡用截瘧之法不俟藥勢稍衰輒求速止者醫之罪也夫截者堵截也兵精餉足寇至方可堵截若兵微城孤不可截也在壯盛之體三四發後瘧勢少減可以截之其虛弱之人始終不可截也誤截因致腹脹者每多壞事即服藥亦有避忌瘧將來可服藥阻其

來將退可服藥追其去若瘧勢正盛服藥與之混戰徒自苦耳但瘧之去來既遠藥不相及五不當一故服藥妙在將來將去之時

景岳全書（臣張介賓著）

論證

瘧疾本由外感故內經論瘧無非曰風曰寒其義甚明而後世之論則泛濫不一總不過約言其末而反失其本所以議論愈多則病情愈昧矣有辨在後所當丼察

凡瘧因於暑人皆知之不知夏令炎熱此自正氣之宜然而人有畏熱者每多避暑就陰貪凉過度此因暑受寒所以致瘧經曰夏暑汗不出者秋成風瘧義可知也然又惟稟質薄弱或勞倦過傷者尤易感邪此所以受邪有淺深而爲病有輕重也但以病因暑致故曰受暑而不知暑有陰陽瘧惟陰暑爲病耳至其病變則有爲寒證者有爲熱證者有宜散者有宜斂者有宜溫者有宜清者其要在標本虛實四字知此四者而因證制宜斯盡善矣其有云傷暑而認暑

爲火者有云脾寒而執以爲寒者皆一偏之見不足憑也

凡瘧發在夏至後秋分前者病在陽分其病淺發在秋分後冬至前者病在陰分其病深

發在子之後午之前者此陽分病也易愈發在午之後子之前者此陰分病也難愈

病淺者日作病深者間日作若三日四日者以受邪日久而邪氣居於陰分其病尤深

凡瘧病自陰而漸陽自遲而漸早者由重而輕也自陽而漸陰自早而漸遲由輕而重也凡感邪極深者其發必遲而多致隔日必使漸早漸近方是佳兆故治此疾者春夏爲易秋冬爲難

論治

凡瘧疾初作必多寒熱大抵皆屬少陽經病其於初起當專以散邪爲主果若形氣無傷而脉證別無他故者但宜正柴胡飲或三柴胡飲主之少者一二劑多者三四劑無有不愈若氣體本弱而感邪爲瘧即宜四柴胡飲爲最妙勿以初起而畏之弗之用也

治瘧疾當辨寒熱寒勝者卽爲陰證熱勝者卽爲陽證蓋有素稟之寒熱有染觸之寒熱然必其表裏俱有熱邪方是火證若瘧至則熱瘧止則退而內無煩熱閉結等證則不得以火證論治若內外俱有火證而邪有不散者一柴胡飲主之若邪入陽明內熱之甚而邪有未散者宜柴胡白虎煎若邪入肝腎而熱極動血者宜柴芩煎

瘧有寒證如無虛邪而但以寒邪不能散或多中寒者宜二柴胡飲若以寒勝而兼氣虛邪有不解者宜四柴胡飲或補中益氣湯加乾薑官桂若寒甚熱少脉遲而兼背惡寒或多嘔惡泄瀉者必用麻桂飲或大溫中飲

中氣虛弱不能勝邪而邪不能解者病在脾肺氣分宜補中益氣湯五柴胡飲若陰虛血液不充而邪不能解者病在肝腎精分宜補陰益氣煎歸柴飲此證極多其效尤捷若發時其寒如冰其熱如烙而面赤如脂渴欲飲水而熱退卽不渴者以六味地黃湯加柴胡芍藥肉桂大劑一服卽可愈若元氣虛寒之甚

陽不勝陰而邪不能解者大溫中飲若元氣虛甚衰老積弱者則不必兼用攻邪只當以扶正氣爲主但使元氣不敗則邪氣無有不服宜大補元煎或十全大補湯之類主之而又惟休瘧飲爲最妙

瘧疾屢散之後取汗既多而病不能止者必以過傷正氣而正不勝邪則雖止微邪猶然不息但使元氣之虛者一振散者一收則無不頓然愈矣宜三陰煎五福飲或小營煎休瘧飲主之若有微寒者宜大營煎或理中湯若微有火者宜一陰煎若多汗不收者宜五陰煎之類主之

瘧疾久不能愈者必其脾腎俱虛元氣不復而然但察其脉證尚有微邪不解者當專以補中益氣湯爲主若邪氣已盡而瘧有不止者則當專補元氣以八珍湯十全大補湯或大補元煎之類主之若腎陰不足而精不化氣者宜理陰煎最效若陰邪凝滯而久不愈者宜於前藥加薑桂附子

瘧作而嘔吐惡食者雖曰少陽之邪爲嘔吐然實由木邪乘胃所致但解去外邪嘔當自止宜柴陳煎或

正柴胡飲加半夏主之若脾胃氣虛而寒邪乘之則最多嘔惡之證宜溫胃飲理中湯養中煎之類主之若虛寒連及命門火不生土而作嘔者宜理陰煎右歸飲之類主之若兼食滯而作嘔者必多脹滿宜加陳皮砂仁山楂厚朴之類爲佐若兼火邪者必多熱渴躁煩祕結宜以黃連黃芩之類爲佐若火在陽明甚者加石膏若兼寒者必胃口怕寒或吞酸噯腐或惡心得熱稍可宜以薑桂附子吳茱萸之類爲佐

瘧疾因勞輒復連綿不已者此亦脾腎虛證蓋腎主骨肝主筋脾主四肢氣弱不勝勞苦所以卽發但補肝腎使其氣强則愈如十全大補湯八珍湯補中益氣湯皆可酌用

瘧疾發散已多每致陰虛水虧而煩熱多渴者宜以西瓜汁或雪梨漿或冷參湯俱可滋陰截瘧無熱者不可强用

瘧痢並作而臟平邪淺者宜胃苓湯加柴胡一二錢若寒濕傷脾而瘧痢並作者宜溫胃飲加柴胡或胃關煎加柴胡亦妙若濕熱傷脾下及肝腎而暴注熱

渴或下純鮮血者宜柴苓煎

瘧邪未清而過食傷脾以致痞滿連綿不已者宜大小和中飲加柴胡若因食而成瘧痞者宜芍藥枳朮丸及大小和中飲之類調之

古云治瘧之法凡將發之時與正發之際愼毋勉強施治卽治亦無效必待陰陽併極勢平氣退之後然後察而治之或於未發二三時之先迎而奪之可也經曰夫瘧之未發也陰未併陽陽未併陰因而調之眞氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發爲其氣逆也按此古法殊似不然予近治瘧每迎其銳而擊之最捷最效是可見古法之有不必泥者

論汗

凡古人治瘧之法若其久而汗多腠理開泄陽不能固者必補斂之無汗則腠理緻密邪不能解必發散之故曰有汗者要無汗扶正爲主無汗者要有汗散邪爲主此大法也蓋瘧本外邪非汗不能解若不知善解其邪而妄用刼劑多致胃氣受傷邪不能解必反難愈此宜以補劑爲主加減取汗汗後再加補養

可也若邪在陰分則下體最難得汗補藥力到自然汗出至足方是佳兆凡病此而邪有未解者大忌飽食亦以汗之難易爲優劣也

凡寒邪之自外而入者得汗卽解如傷寒之類皆是也而惟時瘟時瘧之病則病有淺深不同卽如病瘟者雖有大汗而熱仍不退病瘧者屢發屢汗而瘧猶不止此其所感最深故不能以一二汗而卽愈或通身如洗而猶不能透若此者但當察其强弱仍漸次再汗之方得邪解故不可謂汗後必無邪也此但當以脉之緊與不緊及頭身之痛與不痛寒熱之甚與不甚爲辨耳然又有雖已得汗邪氣將解而不守禁忌或因於勞或因於慾或受生冷微邪或胃氣未清因而過食隨觸隨發此其舊邪未盡而新邪又至纏綿深固因致留連者亦必宜仍從汗解但其病固宜散則猶當以酌虛實爲首務

論標本

凡治瘧當知標本予嘗曰有標則治標無標則治本此最爲治瘧之肯綮何以言之蓋標以邪氣言本以

正氣言也夫邪正相爭所以病瘧凡瘧之初起本由邪盛此當治邪固無疑也若或表散已過或久而不愈則於邪正之間有不可不辨矣蓋有邪者證必猖熾脉必弦緊或頭疼雖減而未除或汗雖出而未透凡屬形證有餘者卽其病雖已久亦必有表邪之未清也但覺有微邪此猶宜兼標爲治若汗出已多邪解已透別無實證實脉可據而猶然不愈者必由正氣全虛或以質弱或以年衰故餘氣有未能却而眞陰有未能靜耳此當專治其本但使元氣旣復則無有不愈設或不明標本無論有邪無邪而但知攻瘧則害者多矣予爲此說雖因瘧而發然諸病皆同此理明者當心志之

厭瘧

凡厭瘧之法今世俗相傳多用之但其有效有不效人每疑之而其所以然者自有的確之妙則從來人所未知也蓋瘧以邪正相爭其感之淺者乃少陽膽經病也惟其邪本不甚則邪正互爲勝負當此時也亦猶楚漢相持之勢但得一助之者爲楚則楚勝爲

漢則漢勝故不論何物皆可用以爲厭但使由之勿使知之其人恃有所助則膽氣略壯而邪卽敗矣此卽內經移精變氣之意也然必勢均力敵者乃可以一助而勝之正勝則愈也若果彼强我弱勢不易制者則厭必無益故惟邪輕日作者可厭而邪深間日者則不能厭此自理勢之使然無庸惑也

截瘧

凡截瘧之法方固不少然亦無必效之方若以愚見并及治驗則未嘗藉於截也蓋有邪者去邪則愈若散邪既透解表已過則但收拾元氣而氣復卽愈惟能於邪正之間得其攻補之宜則無不自愈此截之最善者也至如截瘧諸方雖不可執亦不可無但有效於此而不效於彼者亦以人之氣血陰陽各有不同故耳故凡用截藥者亦當察人之强弱而酌以用之庶乎得效然亦惟輕者易截而重者不易截也兹錄諸方於後亦可備於酌用

截瘧常山飲氣血强壯者可用截瘧飲氣分不足者可用牛膝煎血分不足者可用截瘧丹時氣多濕者

可用木賊煎濕痰邪實者可用何人飲休瘧飲血氣大虛欲急濟者可用小柴胡湯加常山二錢截瘧如神追瘧飲凡氣血未衰或屢散之後用之最效

似瘧非瘧

凡似瘧非瘧之病雖有往來寒熱而時作時止本非瘧之類也凡大病後或產後或虛損俱有此證經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陰氣上入陽中則惡寒陽氣下入陰中則惡熱故凡無外邪而病爲寒熱者必屬虛證但虛有陰陽之異而陽虛者必多寒陰虛者必多熱陽虛者宜補其陽如理中湯十全大補湯加薑桂附子之類此皆人所易知也惟陰虛之證則最不易辨蓋陰中之水虛者陰虛也陰中之火虛者亦陰虛也如其津液枯燥精血耗傷表裏上下俱多煩熱等證此陰中之水虛也治宜壯水以配陽如一陰煎六味地黃湯或加減一陰煎之類主之其有倏熱往來或面赤如脂而腹喜熱飲或上熱如烙而下冷如冰或喉口大熱而大便不實此其證雖若熱而脈必細微或雖洪大而浮空無力者是皆陽氣無根而

孤浮於上此陰中之火虛也治宜益火之本使之歸源如海藏八味地黃丸或右歸飲之類主之假熱退則眞寒見自可因證而治之也其寒熱門論治尤詳所當並察

溫瘧

溫瘧一證在內經曰溫瘧者得之冬中於風寒至春夏陽氣大發而爲病此卽正傷寒之屬也故仲景傷寒論有溫瘧一證卽此是也此與夏傷暑而秋爲瘧者本自不同當於傷寒門酌而治之

癉瘧

癉瘧一證在內經曰肺素有熱氣盛於身發則陽氣盛陽氣盛而不衰故致消爍脫肉者命曰癉瘧蓋此以陽臟而病陽證也自與諸瘧不同而治此之法有三如熱邪內畜而表邪未解者則當散以苦涼如熱因邪致表雖解而火獨盛者則當淸以苦寒此皆治其有餘也若邪火雖盛而氣血已衰眞陰日耗者急宜壯水固元若但知瀉火則陰日以亡必致不救

瘴瘧

瘴瘧一證惟嶺南烟瘴之地有之蓋南方嵐濕不常人受其邪而致病者因名瘴瘧然瘴出地氣瘧由天氣但使內知調攝而外不受邪則雖居瘴地何病之有是可見瘴以地言而瘧即風寒外感之病也但其甚者則或至迷困瘖啞乃與常瘧爲稍異耳凡治此者亦總不離寒熱虛實及有邪無邪如前治瘧諸法而盡之矣外如大梁李待詔瘴瘧等論既明且確詳列瘴氣門不可不察

辨古

陳無擇三因方云夫瘧備三因外則感四氣內則動七情飲食饑飽房室勞逸皆能致之經所謂夏傷暑秋痎瘧者此則因時而敘耳不可專以此論

外所因證有寒瘧有溫瘧有癉瘧並同素問也有濕瘧者寒熱身重骨節煩疼脹滿自汗善嘔因汗出復浴濕舍皮膚及冒雨濕也有牝瘧者寒多不熱但慘戚振慄病以時作此則多感陰濕陽不能制陰也此五種瘧疾以外感風寒暑濕與衛氣相幷而成除癉瘧獨熱溫瘧先熱牝瘧無熱外諸瘧皆先寒後熱

內所因證病者以畜怒傷肝氣鬱所致名曰肝瘧以喜傷心心氣耗散所致名曰心瘧以思傷脾氣鬱涎結所致名曰脾瘧以憂傷肺肺氣凝痰所致名曰肺瘧以失志傷腎所致名曰腎瘧所致之證並同素問此五種瘧疾以感氣不和鬱結痰飲所致

不內外因有疫瘧者一歲之間長幼相似也有鬼瘧者夢寐不祥多生恐怖也有瘴瘧者乍熱乍寒乍有乍無南方多病也有胃瘧者飲食饑飽傷胃而成世謂食瘧也有勞瘧者經年不瘥前後復發微勞不任也亦有數年不瘥結成癥癖在腹脅名曰老瘧亦曰母瘧以上諸證各有方治宜推而用之

愚謂瘧疾一證內經言已詳盡無可加矣而後世議論煩多反資疑貳茲舉陳氏三因之說以見其概如所云濕瘧者因汗出復浴濕舍皮膚固一說也然浴以熱湯避彼風處則斷不致瘧惟冷水相加瘧斯成矣若然則仍是寒氣即內經所云夏遇淒滄水寒之證也然此猶近似但宜辨明寒熱耳至若牝瘧無熱則內經並無此說惟金匱要略曰瘧多寒者名曰牡

瘧蜀漆散主之亦非曰無熱也若果全無發熱而止見寒慄此自眞寒陽虛證耳別有本門又安得謂之瘧耶再如內因五臟之瘧在內經刺瘧論所言六經五臟之證不過爲邪在何經之辨原非謂七情所傷便能成瘧而此云所致之證並同素問則素問無此說也且既云七情所傷則其虛實大有不同又豈皆痰飲所致也耶再若不內外因凡鬼瘧夢寐之說此或以瘧邪亂神因致狂言似鬼者有之豈鬼祟果能爲瘧乎至若胃瘧既云飲食則明是內傷且凡先因於瘧而後滯於食者有之未有不因外邪而單有食瘧者也夫病情必有標本標本誤認治豈無差竊計陳氏之言既以三因立論故不得不敷演其說而煥然若有可觀不知影響之談不但無益於病而且亂人意見致令臨證狐疑莫知所從而每至於害者皆此之類

瘧疾之作本由風寒水濕之邪感而致病亦或有非風非水而衣薄受凉凡體怯者皆能爲瘧及其病深則未免因經及臟因表及裏故有不愼飲食而更甚

者有不愼勞役而增病者總之無非外邪爲之本豈果因食因痰而能成瘧者耶今觀朱丹溪之言亦以痰食並列嚴用和則悉歸之痰蓋皆因陳氏之說而殊失內經之正意矣故張子和亦以祟怪爲笑以食瘧爲非而云治平擾攘時當分治是皆有理確見也獨怪其以暑爲火而且謂擾攘之時其民勞苦大忌錯作脾寒治之而又用吐汗下三法恐此言亦屬偏見也但勞苦過傷之人其虛更甚又豈無三陽疲損等證而可俱謂之火及可盡用三法乎甚哉立言之難於此可見時中之不易得也如此

石室祕籙 臣陳士鐸著

瘧病治法

日治者病重於日間而發寒發熱較夜尤重此等證必須從天未明而先截之方用柴胡當歸各三錢黃芪白朮各五錢人參陳皮半夏青皮枳殼甘草各一錢乾薑五分水煎服此方妙在加柴胡於參芪歸朮之中蓋邪之感在日間作祟者欺正氣之衰也今用祛邪之品同補正之藥共相攻邪則正氣有餘邪自

退舍譬如賊人白晝操戈入室明欺主人軟弱故肆無忌憚倘主人退縮潛形則賊勢更張必大恣摽掠席卷資囊而去正氣日消病安能愈也妙在全用補正爲君則主人無懼指揮如意號名家人奮勇格鬬前後左右無不執耒而來負鋤而至爭先捍禦賊人自然膽落惟恐去之不速矣況方中有柴胡半夏之類各各消邪譬如主人既勇奴僕無非勇士則賊不奔逃必被擒獲此方之用於日間實有妙用也

一法治日間之證尤易奏功方用白朮五錢柴胡二錢熟地一兩甘草陳皮白芥子人參各一錢水煎服前方乃治陽虛之證此方乃治陽虛而兼陰虛之證二方彼此參用何愁日間之病棘手哉

夜治者病重於夜間而發熱者也或寒少而熱多或熱少而寒多一到天明便覺精爽一到黃昏便覺沉困此陰氣甚虛故行陽分則病減行陰分則病重也方用熟地一兩山茱萸四錢當歸白芍柴胡白芥子麥冬生何首烏各三錢鼈甲茯苓各五錢陳皮北五味各一錢水煎服此方妙在鼈甲同柴胡並用又以

諸補陰之藥合而攻之也蓋鼈甲乃至陰之物逢陰則入遇陽則轉卽此二味原是治陰經之邪熱况又用於純陰同隊之中有不去陰邪而迅散哉生何首烏直入陰經亦能攻邪加以白芥子去臟腑之滯痰又不耗其眞陰之氣有不奏功如響者乎譬如人家主婦一旦被賊人所執刀火相逼倘箱櫃空虛則賊人失望勢必因羞變怒愈將主婦施刑今用熟地山茱萸當歸芍藥純是補正之品同羣共投猶賊在房中盡將金玉散傾則賊喜出望外必且棄主婦而取貲財飽則揚去又有鼈甲何首烏芥子之類力能戰邪則堂外聲揚奪門攻擊邪自張皇更思早遁倘止用鼈甲首烏則又勢單力薄無物餌賊豈肯甘心反走必致相爭相戰彼此敗衄而後去更有妙論人多未知如此等證必須在黃昏之前以此藥先與之則陰氣固而邪不敢入又譬如人家門戶謹防鎖鑰嚴整司更值宿之僕俱各精健絕倫則賊必望風而退却又何至越牆上壁而至主婦知覺呼名家人綑縛而獻哉此皆日間不治而以夜間先治之法也

陰邪之盛必發夜夜間無疑然亦有陰邪而兼帶陽邪亦發於夜間其病亦發寒發熱無異純陰邪氣之證但少少煩躁耳不比陰證之常靜也法當於補陰之中少雜陽藥一二味使陰長陽消自然奏功如響方用熟地一兩山茱萸四錢當歸柴胡白芥子生何首烏麥冬各三錢鼈甲茯苓各五錢陳皮北五味各一錢余再加人參二錢白朮三錢即可治陰邪而兼治陽邪之證

瘧疾本是常證只可以平常消導而發散之今忽爲下利等證則變輕爲重欲發汗則身已亡陰欲祛邪則下已便物顧上則慮下顧下則碍上倘仍以常法治之奏功實少今用人參鼈甲茯苓當歸各一兩白朮白芍各三兩柴胡枳殼檳榔各一錢水煎服此方奇在用人參白朮蓋瘧病則亡陽若不急補其陽氣則下多亡陰勢必立亡惟急補其陽氣之不足陽生陰長始有生機尤妙白芍當歸之多以滋潤其腸中之陰蓋下利多則陰亡亦多今用補陰之劑則陰生陽降自然春意融和氷泮化水分消水道汚穢全無

況方中又加枳殼檳榔仍然去積又妙少用柴胡微舒肝氣使木氣相安不來尅土自然土尅水之多水潤木之下內氣既生外邪亦散此治下利而瘧病同除此種治變之法何可不知

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十卷目錄

醫部彙考二百九十

瘧門三

方一

二虎丹　柴胡去半夏加苦蔞湯　清中驅瘧飲　六丁散　加減調中益氣湯　白朮散　正氣散　柴葛二陳湯　二朮柴葛湯　香薷飲　沃雪湯　香椿散　破塊丸　桂附二陳湯　二十四味斷瘧飲　鼈甲烏梅丸　浸酒藥　斬鬼丹　祕方鬼哭丹　煮藥豆法　瘧疾方　桂枝羌活湯　麻黃羌活湯　麻黃桂枝湯　白芷湯　桂枝芍藥湯　桂枝黃芩湯　麻黃黃芩湯　桂枝石膏湯　大柴胡湯　柴胡桂薑湯　白虎加桂枝湯　蜀

漆散　牡蠣湯　人參柴胡飲子　對金飲子
　人參養胃湯　四獸湯　治瘴木香丸　觀
音丸　清脾飲　七棗湯　驅瘴飲　柴朴湯
　加味香薷飲　交加雙解飲子　雄黃散
鼈甲煎丸　瘧母丸　鼈甲飲子　消癖丸
碧霞丹　芎歸鼈甲飲　四將軍飲　祛瘧飲
　又方　柴胡桂枝湯　柴胡加桂湯　麻黃
白朮湯　柴胡四物湯　柴胡知母湯　爭功
散　龍虎湯　柴陳湯　冷附湯　露薑飲
平陳湯　常山飲　五勞丸　六和湯　烏頭
七棗湯　地龍飲　十將軍丸　一補一發丹
　辰砂丸　養胃丹　老瘧飲　祕方清脾丸
　黃甲丸　草果平胃散　截瘧常山飲　截
瘧七寶飲　截瘧飲子　人參截瘧飲　鬼哭
丹　不二飲　勝金丸　玉露散　溫脾散
萬安散　紅丸子　孤膽丸　果附湯　截瘧
方　又方　又方　截瘧青蒿丸　又方　草
果飲子　參蘇飲　小柴胡湯　小柴胡加桂
湯　桂枝加黃茋知母石膏湯　白芷石膏三
物湯　趕鬼丹　蒼朮湯　尅效餅子　伏翼
丸　蟾仰丸　三聖丸　定齋草果飲子　虎
頭骨丸　五行神驗丸　神聖藥師餅　截瘧
散

藝術典第三百十卷

醫部彙考二百九十

瘧門三

方一

二虎丹（中藏經）

治瘧

辰砂　硫黃

右熱多加辰砂寒多加硫黃並研細棗肉爲丸如龍眼大當發日新水七分一盞化下

柴胡去半夏加苦蔞湯（金匱要略）

治瘧病發渴者亦治勞瘧

人參　黃芩　甘草各三兩　苦蔞根四兩

柴胡八兩　生薑二兩　大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

清中驅瘧飲（張三錫下同）

治瘧初起先寒後熱胷膈飽悶或戰後大渴

半夏　橘紅　柴胡　黃芩　檳榔　草果

山楂　青皮　厚朴　蒼朮

右薑棗煎口乾熱多加花粉黃連瀉加五苓

六丁散

治瘧氣壯脈有力者量輕重虛實增減

檳榔一錢二分　貝母一錢五分　丁香　草果

知母　常山各一錢

右水酒各一椀煎一椀露一宿五更溫服

加減調中益氣湯

治瘧消導仍不止體倦脈弱或脈虛大者

人參　白朮　白茯苓　陳皮　檳榔　山楂

青皮　柴胡　蒼朮　黃芩　升麻　半夏

久瘧在陰分者加芎歸

白朮散

治邪氣留於經絡與衛氣相併日發瘧疾寒熱交作者初受風寒者尤宜

麻黃　白朮　茯苓　桂心各七分　陳皮

青皮　桔梗　白芷　甘草炙　半夏製　紫蘇

烏梅肉各六分

右作一服水二盞薑三片棗一枚煎八分食遠服

正氣散（徐氏）

退寒瘧正胃氣進飲食脾胃虛怯者用之尤宜

藿香　草果各二兩　半夏製　陳皮　厚朴

砂仁　甘草炙各一兩

右爲細末每服三錢匕生薑棗子煎侯瘧未發前和查服

柴葛二陳湯（辨疑）

治一切瘧傷暑濕勞食等證

柴胡　乾葛　白朮　半夏製　黃芩（陰瘧即除之）

陳皮　蒼朮製　川芎　甘草各五分

右㕮咀作一服水二盞生薑三片煎服乾葛川芎蒼朮乃發散外邪之藥久瘧者及發散過者除之

不思飲食加山楂麥芽枳實各五分

痰盛加貝母知母

寒痰停飲加草果仁

陽分汗多加人參黃芪去葛根

陰分加酒芍藥川當歸川芎生地黃各八分或加升麻以提之久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥

欲截加常山檳榔青皮貝母各一錢

二朮柴葛湯

一名驅邪湯治諸瘧必用之劑

白朮　蒼朮　柴胡　葛根　陳皮各七分

甘草五分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯芩茯苓半夏各一錢熱甚頭痛加川芎軟石膏各一錢口

渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各一錢酒黃芩酒紅花各四分提在陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓各一錢以補氣川芎地黃歸芍以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗用柴胡蒼朮白朮黃芩葛根以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍熟地黃芪黃蘗以斂之無汗用柴胡蒼朮川芎紅花升麻以發之

胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而食少者加人參酒芍藥大麥芽各一錢

傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實各一錢黃連五分

痰甚加生薑半夏南星枳實炒各一錢黃連黃芩各六分

若欲截之加檳榔常山青皮黃芩各一錢烏梅肉

三箇

日久虛瘧寒熱不多或無寒但微熱者邪氣已無只八珍湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

香薷飲

治傷暑發瘧

香薷二錢　厚朴　扁豆炒各一錢

右㕮咀水盞半烏梅一箇煎八分臨時入薑汁一匙溫服

沃雪湯

治山嵐瘴瘧

蒼朮炒　甘草鹽浸炙各三兩　防風　白芍藥

厚朴　乾葛各四兩　砂仁兩半研

右㕮咀每服四錢水二盞煎一盞不拘時熱服服畢少時以薑葱作羹或作粥喫了避風坐臥身體潤卽愈兩滓又合煎服

香椿散

治瘴瘧惡心四肢疼痛口吐酸水不思飲食憎寒壯熱發過引飲並啞瘧

香椿嫩葉三兩酒浸炒　向日南壁土　甘草炙
陳芽茶各二兩

右爲細末每服四錢用酒調下如患久者更入甘遂柴胡各半兩空心臨臥服

破塊丸

治瘴瘧結成氣塊腹中不能消散

蓽茇　大黃各一兩俱生用

右爲細末入麝香少許煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心冷酒下日三服

桂附二陳湯

治寒瘧但寒少熱多定腰足冷

附子炮裂　半夏製　陳皮　白茯苓　肉桂
炙甘草

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服

二十四味斷瘧飲

治久瘧

常山酒炒　草果　檳榔　知母酒炒　陳皮
青皮　川芎　枳殼　柴胡　黃芩　荊芥

白芷　人參　紫蘇　蒼朮　白朮　半夏

良薑　茯苓　桂心　葛根　甘草　杏仁

烏梅各等分

右㕮咀每服一兩水二盞薑三片棗一枚煎八分

發日早服

鼈甲烏梅丸

治久瘧不愈

鼈甲酢炙一箇　常山酒炒褐色二兩　知母

貝母　檳榔各兩半　烏梅肉五錢　人參七錢

靑皮去白一兩　草果仁八錢

右爲細末酒糊丸梧桐子大每服七十丸酒下忌

猪羊雞半月

浸酒藥

治久瘧服諸藥不效者

常山炒　蒼朮製各一兩　草果　靑皮　陳皮

貝母　甘草各五錢　烏梅肉　人參各四錢

鼈甲炙一箇

右㕮咀用老酒半鏇入瓶中浸藥每晨服一二杯

忌怒勞冷食

斬鬼丹（發明）

截瘧

人信五錢用明礬五錢蓋罐內火煅微有黑烟出取起放土地上冷定入雄黃三錢明亮者

右共研勻極細五月五日五家粽角爲丸如小豆大未發前面東凉水下三丸嚼破吞之妙小兒一丸以吐爲度

祕方鬼哭丹

治諸瘧疾

菉豆一兩　信石明者三錢

右碾極細以蒸餅爲丸如菉豆大每服三丸發日早五更以新汲水朝東吞下忌濕麪生冷葷腥

煑藥豆法

治久瘧瘧母痞塊者不宜用消痞丸散等破氣并熱藥只宜用製豆法食盡二升自然消愈

大黑豆二升　常山半斤　血竭五錢另研

枳實四兩

右用水一斗先剉常山枳實煑十餘沸入豆候熟去二味再入血竭末用文武火熬盡汁取出曬乾每日食之一二合後可灸章門二穴其痞自消

瘧疾方（醫貫）

不論新久男婦皆可服

白朮土炒　白茯苓　川芎各六分　白芍酒炒
陳皮去白　當歸　山楂蒸取肉　知母鹽水炒
黃蘗鹽水炒各八分　甘草　黃連薑汁炒
青皮各三分　軟柴胡　半夏薑汁煑透曬乾
條芩酒洗各五分　枳殼麩炒二分

薑一片水煎服寒熱退去柴胡加人參三分孕婦不可用枳殼

桂枝羌活湯（河間下同）

桂枝　羌活　防風　甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麴等分

麻黃羌活湯

治瘧病頭痛項強脈浮惡風無汗者

麻黃去節　羌活　防風　甘草炙各半兩

右爲粗末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服如吐者加半夏麴等分

麻黃桂枝湯

治瘧如前病證而夜發者

麻黃一兩去節　甘草炙三錢　黃芩五錢

桃仁三十箇去皮尖　桂枝三錢

右五味同爲細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

治瘧病先以大柴胡湯下過外微邪未盡者

白芷一兩　知母一兩七錢　石膏四兩

右爲粗末同前煎服

桂枝芍藥湯

治瘧發寒熱大爭

桂枝三錢　黃芪　知母　石膏　芍藥各半兩

右爲粗末每服五七錢至一兩水煎如前藥服之

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯寒熱轉大者以此與服

柴胡一兩二錢　黃芩　人參　甘草各四錢半

半夏四錢　石膏　知母各五錢　桂枝二錢

右爲粗末依前服之

麻黃黃芩湯

麻黃一兩去節　桃仁三十枚去皮　黃芩五錢

甘草炙三錢　桂枝二錢半

右爲細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

桂枝石膏湯

桂枝五錢　石膏　知母各一兩半　黃芩一兩

右爲粗末分作三服水一盞同煎服

大柴胡湯

柴胡半斤　黃芩　芍藥各三兩　半夏半升洗

生薑五兩切　枳實四枚炙　大棗十二枚擘

大黃二兩

右七味以水一斗二升煑取六升去查再煎溫服一升日三服

柴胡桂薑湯

柴胡半斤　桂枝三兩去粗皮　苦蔞根四兩

乾薑　黃芩　牡蠣煅各二兩　甘草炙一兩

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

白虎加桂枝湯（仲景下同）

脈經云朝發暮解暮發朝解

知母六兩　甘草炙二兩　桂去粗皮三兩

石膏一斤　粳米二合

右剉散每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

蜀漆散

蜀漆燒去腥　雲母燒三日夜　龍骨等分

右杵爲散未發前以漿水服半錢匕如溫瘧加蜀漆一錢臨發時服一錢匕

牡蠣湯

治牡瘧

牡蠣四兩熬　麻黃　蜀漆各三兩　甘草二兩

以水八升先煑蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煑取二升溫服一升若吐則勿更服

人參柴胡飲子（子和）

人參　柴胡　黃芩　甘草　大黃　當歸

芍藥各等分

右爲粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

對金飲子（局方下同）

治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅炒赤黃色半斤　厚朴薑製　蒼朮製

甘草炙各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

人參養胃湯

加桂治感寒發瘧

草果　茯苓　人參去蘆各半兩　甘草炙七錢
橘紅七錢半　厚朴去粗皮薑製　蒼朮湯洗炒
半夏湯洗各一兩　藿香洗去土五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎至七分去滓熱服脈弱無力或寒多者加乾薑附子如脈洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡朴蒼藿香發散也半果茯橘刦痰也人參惟虛人最宜

四獸湯（簡易方）

治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏製　人參　茯苓　白朮　橘紅　草果
生薑　烏梅　大棗各等分　甘草炙減半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四錢水一椀煎半椀溫服

治瘴木香丸（直指方下同）

牽牛一斤淘去浮者焙搗取末四兩　雞心檳榔
橘紅各二兩　青木香　熟附子　厚朴製
人參　官桂　京三稜　羌活　獨活　乾薑炮
甘草炙　川大黃剉焙　川芎　芍藥各半兩

肉豆蔻六箇

右爲末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共一兩研和煉蜜丸桐子大每服二十丸橘皮煎湯下以通利爲度

觀音丸

取下暑毒瘴毒

半夏生　烏梅肉　母丁香　巴豆不去油各十枚

右爲末薑麪糊丸麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服五丸臨臥冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

淸脾飲（濟生方下同）

治瘴瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮　厚朴薑製　白朮　草果　柴胡　茯苓

黃芩　半夏湯洗七次　甘草炙各等分

每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚未發前服

忌生冷油膩

七棗湯

治五臟氣虛陰陽相勝痎瘧發作無時或寒多熱少或單寒者

附子一枚炮裂以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮臍又方以川烏代附子以水調陳壁土爲糊浸炮七次

右分作二服每服水一椀薑七片棗七枚煎七分臨發日早溫服

驅瘧飲（局方下同）

前胡　柴胡各四兩　桂心　桔梗　厚朴　半夏各三兩　黃芪　乾薑炮　甘草各二兩

每服四錢水一盞半薑三片棗四枚煎七分不拘時溫服

柴朴湯

柴胡　獨活　前胡　黃芩　白茯苓　半夏麴　蒼朮　厚朴　陳皮　藿香各一錢　甘草三分

水二鍾生薑五片煎一鍾發日五更服

氣弱加人參白朮

食不尅化加神麴麥芽山楂

加味香薷飲

香薷二錢　厚朴製　扁豆炒　白术炒　陳皮

白茯苓　白芍藥炒　黃芩各一錢　甘草炙

黃連薑汁炒　猪苓　澤瀉各五分　木瓜七分

右生薑煎服

口渴實者加天花粉葛根知母虛者加五味子麥門冬人參

交加雙解飲子

治瘧疾癖瘴氣神效

肉豆蔻　草豆蔻各二枚一枚麪裹煨一枚生用

厚朴一寸一半用薑汁浸炙一半生用　甘草大者二兩一半炙用一半生用　生薑二塊如棗大一塊濕紙裹煨一塊生用

每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓空心服

雄黃散

雄黃　瓜蒂　赤小豆各等分

右爲細末每服半錢溫水調下以吐爲度

鼈甲煎丸（仲景）

治瘧母

烏扇燒　黃芩　鼠婦熬　大黃　桂枝　石葦

厚朴　紫葳　阿膠各七錢半　乾薑　人參

瞿麥　桃仁各五錢　赤硝　鼈甲炙各三兩

柴胡　蜣螂熬各一兩五錢　蜂窠炙一兩

芍藥　丹皮　䗪蟲炒各一兩二錢半　葶藶炒

半夏各二錢半

右二十三味爲末取煆竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煑令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎爲丸如桐子大空心服七丸日三服千金方用鼈甲十二片又有海藻三分大戟一分䗪蟲五分無鼠婦赤硝二味以鼈甲煎和諸藥爲丸

瘧母丸

青皮　桃仁　紅花　神麴　鼈甲醋煑爲君

三稜　蓬朮　海粉　香附俱用醋煑　麥芽

右爲末神麴糊爲丸如桐子大每服五七十丸白湯下

鱉甲飲子（濟生方）

治瘧疾久不愈脅下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鱉甲醋炙　白朮　黃芪　草果　檳榔　川芎

橘紅　白芍藥　甘草炙　厚朴製各等分

右㕮咀四錢水一盞薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

消癖丸

治瘧母停水結癖腹脅堅痛

芫花炒　辰砂研細等分

右爲細末蜜丸小豆大每服十丸濃棗湯下下後即服養胃湯

碧霞丹（百一選方）

治久瘧不愈

肉桂去粗皮細研（按南方丙丁火）　青黛別細研（按北方壬癸水）

硫黃去沙石細研（按中央戊己土）　白礬別細研（按西方庚辛金）

巴豆肉去油別研（按東方甲乙木）

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依方位排定忌貓犬婦人見之安頓神前端午日午時用

五家粽尖和藥令勻丸梧子大令患人以綿裹一丸塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

芎歸鼈甲飲

治勞瘧表裏俱虛眞元未復疾雖暫止少勞復來

川芎　當歸　鼈甲酢炙　茯苓　青皮　陳皮

半夏　芍藥

右㕮咀各等分每貼二兩用水二鍾生薑五片棗二枚烏梅一枚煎至一鍾食遠服熱多加柴胡熱少加草果

四將軍飲

治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時至急用之有驗

附子炮去皮二錢　訶子二錢半　陳皮三錢

甘草一錢半

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不拘時服

祛瘧飲

三發後可用因其衰而減之立效

知母鹽酒炒五錢　貝母九分　橘紅　山楂肉

枳殼各一錢五分　檳榔八分　柴胡七分

紫蘇一錢　甘草炙三分

用水二鍾煎至一鍾滓亦用水二鍾煎至八分俱露一宿臨發日天明服頭煎未發前一箇時辰服二煎

又方

治瘧乃史崇質得之四明胡君屢試屢驗

黃芪蜜炙一錢六分　人參　白朮　白茯苓

砂仁　草果　陳皮去白　五味子各一錢

甘草七分　烏梅三枚去核

水二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾溫服

柴胡桂枝湯（入門下同）

治少陽瘧寒熱作往作來

柴胡二錢　桂枝　黃芩　人參　白芍藥

半夏各一錢　甘草五分

右剉一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗

柴胡二錢　黃芩　桂枝各二錢　半夏一錢

甘草四分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

麻黃白朮湯（直指方下同）

治風瘧

麻黃　桂皮　青皮　陳皮　川芎　白芷

半夏麴　紫蘇葉　赤茯苓　白朮　桔梗

細辛　檳榔　甘草各七分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者

柴胡　生乾地黃各二錢　人參　半夏　黃芩

甘草　川芎　當歸　赤芍藥各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴胡知母湯（節齋）

治熱瘧及瘴瘧

柴胡　知母各一錢半　蒼朮　黃芩　乾葛
陳皮　半夏　川芎各一錢　甘草炙七分
右剉作一貼入薑三片烏梅二枚水煎清晨服午前又一服久瘧加人參當歸

爭功散（得效方）

治熱瘧多效

知母　貝母　柴胡　常山　梔子　檳榔
地骨皮　甘草各一錢　蟬退二七箇
右剉作一貼入桃柳枝各五寸煎服未效加過路葛藤五寸同煎服

龍虎湯（醫鑑）

治熱瘧火盛舌卷脣焦鼻如煙熏六脈洪緊

石膏二錢半　柴胡　黃連各一錢半　黃芩
知母　黃蘗各一錢　梔子八分　半夏七分
粳米百粒
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

柴陳湯（入門）

治痰瘧

柴胡　半夏各二錢　人參　黃芩　陳皮

赤茯苓各一錢　甘草五分

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

冷附湯（得效方 下同）

瘧疾無過是痰實而脾胃弱停於胸膈所以五更冷服使藥下達壯脾胃去痰實也

大附子一箇炮去皮臍

右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一宿五更初冷服

露薑飲

治痰瘧

生薑四兩連皮搗爛止取自然汁約明日當發隔夜安排將紗片蓋露一宿五更初與童便合飲之或有痰吐出任之卽安

平陳湯（入門 下同）

治食瘧

蒼朮　半夏各二錢　甘草七分　厚朴　陳皮

赤茯苓各一錢二分半

右剉一貼薑三片棗二枚水煎服

常山飲

治勞瘧

常山　知母　草果各一錢半　良薑一錢

烏梅肉　甘草各五分

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

五勞丸（直指方）

治勞瘧及瘴瘧

常山三兩半　桃仁一兩二錢　辣桂七錢半

淡豉　烏梅肉各二兩半

右日乾爲末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十九

六和湯（丹溪）

治瘧久不愈

常山二錢　知母　貝母　人參　草果　白芷

烏梅　檳榔　柴胡各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚酒水相半同煎露

一宿臨發日服之

烏頭七棗湯（直指方）

治勞瘧及寒瘧

大川烏一箇以鹽水浸炮七次去皮臍

右剉分二貼每貼入薑七片棗七枚葱白三莖水煎稍冷先喫棗乃服藥

地龍飲（得效方）

治瘴瘧大熱煩躁

生地龍大者三條研細

用薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下熱熾加龍腦少許

十將軍丸（丹溪）

治久瘧及瘧母

縮砂　檳榔　常山　草果各二兩　三稜

蓬朮　青皮　陳皮　烏梅　半夏各一兩

右先將常山草果酒酢各一椀浸一宿後入八味同浸至晚炭火煑乾爲末酒酢各半打糊和丸梧子大白湯下三四十丸日二服服至八兩即除根

本方常山草果各二兩餘八味各一兩名老瘧丸

治同

一補一發丹（入門）

治久瘧內傷挾外感間發內治痰外發汗

赤茯苓一兩　半夏　陳皮　柴胡　黃芩

蒼朮　葛根各七錢　常山三錢

右爲末麪糊和丸梧子大白湯下七十丸

辰砂丸（得效方）

治久瘧不損元氣

辰砂　阿魏眞者各一兩

右研勻稀米糊和丸皂角子大空心以人參湯化下一丸

養胃丹（醫鑑）

治久瘧二三年不愈者

蒼朮　常山酒蒸各二兩　半夏　陳皮去白

厚朴各一兩半　赤茯苓　藿香　草果各一兩

甘草炙五錢　烏梅肉四十九箇

右爲末薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十丸

老瘧飲（入門）

一名痎瘧飲治老瘧結成癥癖在腹脅諸藥不愈

紫蘇葉　川芎各四分　蒼朮　草果　桔梗
青皮　陳皮　良薑各七分　白芷　赤茯苓
半夏　枳殼　桂心　乾薑　甘草各五分
右剉作一貼入鹽少許水煎空心服

祕方清脾丸（丹溪）

治瘧三日一發或十日一發
白朮一兩半　半夏　青皮　黃芩各一兩
人參　檳榔　草果　蓬朮　厚朴各五錢
薑黃　甘草各三錢
右爲末飯丸梧子大白湯下六七十丸

黃甲丸（醫鑑）

治瘧母成塊久不愈
硃砂　阿魏　穿山甲酥炙　檳榔各五錢
雄黃　木香各二錢半
右爲末泡黑豆去皮搗成泥和丸梧子大空心薑湯下五十丸

草果平胃散（得效方）

治脾虛作瘧不問寒熱先後宜服

蒼朮二錢　厚朴　陳皮　青皮　大腹皮

檳榔　草果各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

截瘧常山飲（正傳下同）

常山　草果　檳榔　知母　烏梅　穿山甲炮

甘草炙各一錢

右剉作一貼酒水相半煎露一宿臨發日早晨溫服得吐爲順一方加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

截瘧七寶飲

一名七寶湯

常山　陳皮　青皮　檳榔　草果　厚朴

甘草各一錢

右剉作一貼酒水相半入薑五片烏梅二枚同煎露一宿早晨溫服必須吐而愈

截瘧飲子

治久瘧不愈一服便差永不發如神

常山一錢半　檳榔一錢　丁香半錢　烏梅一箇

右剉作一貼好酒一盞浸一宿臨發日清晨溫服

人參截瘧飲（萬病回春）

虛人截瘧宜用一切瘧竝可截

人參　白朮　白茯苓　當歸　青皮　厚朴

柴胡　黃芩　知母　常山酒浸　草果仁

鼈甲酢炙各八分　桂枝　甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一枚桃仁七箇水煎露一宿臨發日五更空心服查再煎朝時服糖拌烏梅下藥切忌雞魚豆腐麪食熱物

鬼哭丹（丹溪）

治痎瘧

常山一斤剉酢浸春五夏三秋七冬十日曬乾

檳榔各四兩　半夏　貝母各二兩

右爲末雞子清和麪入藥末拌勻作丸梧子大每三十丸隔夜臨睡冷酒吞下次日早再一服

不二飲（醫鑑下同）

一名止瘧散一名知母散治諸瘧疾一劑截住神效

雞心檳榔要一雌一雄若重二錢則餘藥各二錢

常山　知母　貝母各等分

右剉作一貼酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不效露一宿臨發日五更面東溫服冷服亦可直至巳時食乾物若喫水便吐煎時不得令婦人見

勝金丸

能截一切瘧

常山四兩酒浸一宿曬乾　蒼朮泔浸曬　檳榔　草果各二兩

右爲末將浸常山餘酒煮糊和丸梧子大每服五十丸前一日臨臥時溫酒送下便臥至當發日雞鳴時服七十丸忌生冷熱物一方無蒼朮草果

玉露散（子和下同）

治瘧

寒水石　滑石　石膏　花粉各四兩　甘草一兩

右爲細末每服五錢新水調下

溫脾散

紫河車　菉豆各一兩　甘草半兩　砒一錢另研

右爲細末後入砒研勻每服半錢新水調下如是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷酒魚兎等

萬安散（濟生方下同）

治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮泔水浸去黑皮剉炒　厚朴薑汁炒　檳榔

陳皮去白　常山酒浸一宿　甘草炙

右六味各一錢半重和勻用水二盞酒一盞煎至一盞半去滓夜露一宿當發日分作兩服盪溫早晨進一服俟其發時再進一服忌食熱物片時

紅丸子

專治食瘧

蓬朮　京三稜醋煮各二兩　青皮炒香三兩

阿魏一分醋化　胡椒一兩

右爲末別用陳倉米末同阿魏醋煮糊爲丸如梧桐子大每服五十丸加至百丸用薑湯吞下或因食生果成瘧用麝香湯吞下一方有乾薑礬紅

孤膽丸（聖惠方）

治邪瘧發作無時

孤膽一箇　硃砂　砒霜各半兩　阿魏　麝香

黃丹　菉豆粉各一分

右爲末於五月五日午時粽子尖和丸梧子大空心及發前冷酢湯服二丸忌熱物

果附湯（濟生方）

治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食或大便溏泄小便反多

草果仁　附子炮去皮臍

右等分㕮咀每服半兩水二盞生薑七片棗一枚煎至七分去滓不拘時候溫服

截瘧方（丹溪下同）

柴胡　草果　常山　知母　貝母　檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又方

治瘧寒熱頭痛如破渴飲冰水外多汗出

人參　白术　黃芪　黃芩　黃連　山梔

川芎　蒼朮　半夏　花粉

右㕮咀水二鍾薑三片煎服

又方

治瘧病發渴

生地　麥門冬　天花粉　牛膝　知母　葛根

炒蘗　生甘草

右㕮咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤　冬瓜葉　官桂　馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡一方青蒿一兩冬青葉馬鞭草桂各二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

又方

瘧疾後服之

白朮　半夏各一兩　黃連　陳皮各半兩

白芍三錢

右爲末粥丸梧子大每服六十丸薑湯下

草果飲子

草果　川芎　紫蘇葉　白芷　良薑　炙甘草

青皮去白炒　陳皮去白

右等分爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去查溫服留查兩服併一服當發日進三服不以時

參蘇飲

橘紅　枳殼　桔梗　甘草炙各半兩　半夏

乾葛　蘇葉　前胡　人參　茯苓各七錢半

右剉每服五錢水一盞半生薑七片棗一箇煎微熱服一方有木香半兩

小柴胡湯

柴胡八兩　黃芩　人參　甘草炙各三兩

半夏半升

右剉每五錢水盞半生薑五片棗一枚煎服不拘時

小柴胡加桂湯

小柴胡湯去人參加桂一兩

右服法與本方同

桂枝加黃芪知母石膏湯

桂枝湯加黃芪知母石膏各四錢半

右服法與本方同

白芷石膏三物湯

白芷一兩　知母一兩七錢　石膏四兩

右爲粗末每半兩水一盞半煎一盞溫服

趂鬼丹

治一切瘧疾神效

砒一錢　大豆七錢　甘草七寸　雄黃　輕粉

荷葉各半錢

右爲末滴水爲丸如小豆大重午日未出不見雞犬婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日服忌熱物

蒼朮湯

治秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘧氣入腹

蒼朮　草烏頭一錢　杏仁三十箇

右爲粗末都作一服水三升煎至一半均作三服一日服盡迎發而服

尅效餠子（寶鑑　下同）

治一切瘧疾

定粉　龍腦　麝香各半兩　硃砂一兩一分

荷葉　菉豆粉　炙甘草各五兩　信炙二兩半

右爲細末煉蜜丸每兩作二十丸捏作餠金箔二十五張爲衣每服一餠以新汲水磨化每日發者未發前服間日發者不發夜服隔數日發者一日夜服連日發者夌晨服

伏翼丸（聖惠方）

治久瘧不止

蝙蝠一枚炙　蛇蛻皮一條燒　鼈甲一枚酢炙

蜘蛛一枚去足炙　麝香五分

右爲末五月五日午時研勻入煉蜜和丸麻子大每溫酒下五丸

瞻仰丸（局方）

治一切瘧

常山四兩炒存性　草果二兩炒存性

右爲末薄糊丸梧子大每臥時冷酒服五十丸五

更再服忌鵝羊熱物

三聖丸

治諸瘧不拘遠近大小

恆山　檳榔各一兩　鱉甲煨焦一兩半

右爲末糯粉糊丸菉豆大黃丹爲衣每服三五十丸如上法服

定齋草果飲子（良方下同）

快脾治瘧

草果　厚朴薑製各二錢　蒼朮米泔水浸三錢

半夏麴　陳皮各一錢半　甘草半錢　烏梅一箇

右㕮咀每服半兩水一盞半薑五片棗二枚煎至七分不拘時服寒多者加乾薑附子熱甚者加柴胡瘴瘧加檳榔所加者各等分一方加人參一方熱多者加石膏

虎頭骨丸

治一切瘧疾

虎頭骨酥炙二兩　硃砂細研　牡蠣粉　桂心

川大黃剉炒　知母各一兩　乳香研　甘草炙

烏梅肉炒　附子炮　枳殼麩炒　木香　常山
麝香研各半兩　桃仁三七枚去皮尖雙仁炒
生薑一塊如雞子大半煨半生

右爲末入研藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃枝湯下

五行神驗丸

治一切瘧疾

䶑花二兩（東方）　桂心二兩（南方）　乾薑一兩（西方）
巴豆一兩（北方）　硫黃一兩（中央）　麝香少許

右將五般藥於盤內據五方安排定取四月二十八日夜安桌子上於中庭露以香一爐當虔心如是露七夜至端午日早修合將巴豆去殼湯煑五十沸搗研餘藥爲散入麝香以薄糊調䶑花末爲丸如櫻桃大合時忌女子等見丸子焙乾於盒內盛發日淨手取以綿裹香火炙令熱男左女右預前帶安耳中便利時除却淨手後再安耳中不得女子捻觸女子患男子與安忌一切葷腥果子一方無麝香

神聖藥師餅

治瘧疾等證

砒　雄黃各一錢半　白麪七錢半　乾臙脂一錢

右各研極細和勻滴水和爲餅子如棋子大每服三餅臨臥細嚼冷水送下忌濕麪葷腥生硬冷物分作三十服虛實大小加減服之

截瘧散

雞骨常山　茯神去皮木　肉桂去粗皮各等分

甘草減半熱多加之

右不犯鐵器爲粗散每服半兩用常酒大半椀浸一宿於當發日早晨空心去查冷服服後不可吃熱湯查再浸或略煎近發時再服一方不用肉桂茯神却用檳榔烏梅要在人增損也凡瘧須是發作三五次後却用截之爲妙

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八二二

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十一卷目錄

醫部彙考二百九十一

瘧門四

方二
鼈甲丸　知母湯　木香犀角丸　甘草
湯　麝香丸　朱砂丸　橘皮甘草湯
人參飲　獨蒜丸　良薑丸　人參丸　杏仁
丸　烏梅丸　茯苓丸　升麻湯　犀角湯
柴胡湯　順氣湯　枳殼湯　藥餛飩　大補
元煎　右歸飲　五福飲　一陰煎　加減一
陰煎　三陰煎　五陰煎　大營煎　小營煎
補陰益氣煎　休瘧飲　大和中飲　小和
中飲　一柴胡飲　二柴胡飲　三柴胡飲
四柴胡飲　五柴胡飲　正柴胡飲　麻桂飲

（大溫中飲　柴陳煎　柴苓煎　柴胡白虎煎　歸柴飲　雪梨漿　理陰煎　養中煎）
（溫胃飲　胃關煎　牛膝煎　何人飲　追瘧飲　木賊煎）
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百十一卷

醫部彙考二百九十一

瘧門四

方二

鼈甲丸（良方下同）

治肝瘧色蒼蒼然顫掉氣喘久不瘥者或久熱勞微動如瘧

鼈甲去裙襴醋浸炙　蜀漆葉　烏梅肉炒

常山　知母各一分　甘草炙　苦參　萎蕤

石膏各半兩　香豉一合微炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸未發前米飲下臨發再服

知母湯

治肝瘧上焦壅滯心煩頭疼寒熱不止肌肉消瘦不下食

知母　地骨皮　升麻各一兩　犀角鎊　人參

鼈甲去裙襴酢炙黃　麥門冬去心焙　柴胡

石膏各二兩　生甘草酒拌　虎頭骨酥炙一兩半

右爲粗末搗篩每服四錢水一大盞入香豉五十粒煎至六分去滓不拘時溫服一方無虎頭骨有赤茯苓一兩

木香犀角丸

治肝瘧

木香　羚羊角鎊　犀角鎊各一兩半　升麻

元參　猪苓　檳榔各二兩半　鼈甲酥炙

甘草炙各二兩　豉炒五錢

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸用

溫酒或米飲送下日再服體熱即去一方無甘草檳榔加大黃五兩

甘草湯

治心熱爲瘧不止或止後熱不渴乍來乍去令人煩心甚欲飲淸水反寒多不甚熱者

甘草一兩　蜀漆三兩　常山　鼈甲各四兩
石膏五兩　香豉一合　梔子　烏梅各十三枚
竹葉切二升

右㕮咀以水九升煑取三升分三服

麝香丸

治心瘧

麝香　黃丹炒紫色　砒霜各一分　硃砂一兩
金箔三十片

右細研令勻用粳米飯和丸如梧桐子大男左女右中指節上用緋絹裹繫一丸發前以冷酢湯下一丸忌食熱物

硃砂丸

治心瘧

杏仁十枚去皮尖雙仁麩炒微黃　常山一兩

光明砂半兩細研

右爲末研入硃砂令勻煉蜜和丸如梧桐子大未發前以粥飲下十五丸欲發時再服

橘皮甘草湯

治脾臟不和瀉痢瘧疾腹痛下部無力體重足痿脚下痛飲食中滿四肢不舉等病陸景淵方會以治瘧甚效

橘皮生用　甘草炙　厚朴去皮薑汁製各一兩

羌活　防風　肉豆蔻　白茯苓各二錢五分

川芎半兩　吳茱萸一錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食前服

人參飲（良方下同）

治脾瘧

人參　甘草炙各三兩　陳橘皮湯浸去白半兩

烏梅三枚去核焙　草豆蔻十枚去皮

右剉爲末每服五錢用濕紙裹煨熟用水二盞生

薑一片棗一枚擘碎煎至一盞未發前溫服

獨蒜丸

能截脾寒

大蒜不以多少

右於五月五日擣爛夾入礬紅拌勻爲丸如圓眼大每服一丸大蒜湯嚼下

良薑丸

醒脾治瘧

良薑二兩

右爲末豬膽汁和丸如梧桐子大紫蘇湯空心下二十丸

人參丸

治肺瘧心寒熱善驚如有所見

人參　鼈甲去裙襴醋炙　常山　甘草炙

桃仁去皮尖雙仁炒研　肉蓯蓉酒浸切焙

升麻各三分　桂心去粗皮五錢　烏梅肉炒

龍齒研各一兩　丹砂研　阿魏研各一分

杏仁去皮尖雙仁炒研半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸空心用米飲下未發時併二服

杏仁丸

治肺瘧

杏仁四十枚湯泡去皮尖雙仁炒　常山三分

丹砂別研五錢　甘草一分

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服十五丸未發米飲下日再服之

烏梅丸

治腎瘧令人灑灑然腰脊痛大便難目眴手足寒及諸瘧久不瘥者

烏梅肉炒一兩五錢　常山三分　豉一合炒

麝香別研一錢　虎頭骨酥炙　附子炮去皮臍

肉蓯蓉酒浸焙各五錢　桂心　知母焙各一分

桃仁湯浸去皮尖雙仁炒別研一兩

右搗研爲末拌勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空腹米飲下未發服一方無知母

蓯蓉丸

治腎瘧

肉蓯蓉酒浸切焙　烏梅肉炒　桂心　甘草炙
升麻各五錢　淡豉炒　桃仁湯浸去皮尖炒研
常山各三分

右擣研爲末和勻煉蜜爲丸如梧桐子大未發日空腹溫酒下二十丸米飲亦得至發時更服二十丸

升麻湯

治足少陽瘧身體解㑊見人心惕惕然熱多汗出

升麻　鼈甲去裙襴酢炙　淡竹葉各一兩
常山一兩五錢　犀角屑　麥門冬去心焙
知母各三兩　甘草炙五錢

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓空心日午溫服

犀角湯

治足少陽瘧解㑊熱多汗出

犀角鎊　甘草炙各一兩　麥門冬去心　升麻
知母　鼈甲酢炙去裙襴各一兩半　石膏研一兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓於未發前溫服

柴胡湯

治足太陽瘧寒熱

柴胡　常山　知母焙　鼈甲去裙襴酢炙黃
靑蒿乾者　甘草炙　枳殼麸炒　官桂各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入柳枝心七枚葱白二寸細切同煎至七分去滓空腹溫服發前再服

順氣湯

治足陽明胃瘧胷脅支滿腹大

厚朴薑汁製　橘紅焙　白朮　半夏製各一兩
乾薑炮　柴胡　甘草炙各五錢

右粗搗篩每服三錢水一盞薑五片棗二枚擘破煎七分去滓不拘時溫服

枳殼湯

治胃瘧心腹脹滿不食

枳殼去瓤麸炒三兩　厚朴去皮薑製　人參
白朮　白茯苓各二兩

右粗搗篩每服四錢水一盞半入生薑一棗大切煎至一盞去滓溫服

藥餛飩

治證同前

良薑　吳茱萸　胡椒各一分

右爲細末猪脾一條剉作臛加五味炒之一半滾藥一半不滾藥並作餛飩有藥者以墨點之遇點者吞下無藥者嚼下一服效

大補元煎（景岳全書下同）

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證

人參少則用一二錢多則用一二兩　熟地少則用二三錢多則用二三兩

枸杞　當歸各二三錢（泄瀉者去之）　山藥炒　杜仲各二錢

山茱萸一錢（畏酸吞酸者去之）　炙甘草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

凡命門之陽衰陰勝者宜此

熟地二三錢或加至一二兩　山藥炒　枸杞

杜仲薑製各二錢　山茱萸肉一錢　甘草炙
肉桂各一二錢　製附子一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最
人參隨宜　熟地隨宜　白朮炒一錢五分
當歸二三錢　炙甘草一錢
水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

一陰煎

凡瘧疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此亦汗多傷陰水虧而然也皆宜用此加減主之
熟地黃三五錢　生地黃　白芍藥　麥門冬
丹參各二錢　牛膝一錢五分　甘草一錢
水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方
生地黃　芍藥　麥冬各二錢　熟地黃三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

三陰煎

凡瘧疾汗多邪散而寒熱猶不能止是皆少陽厥陰陰虛血少之病徵有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸二三錢　熟地黃三五錢　炙甘草一錢

芍藥酒炒　棗仁各二錢　人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

五陰煎

凡眞陰虧損脾虛瘧痢等證忌用潤滑宜此主之

熟地五七錢或一兩　山藥炒　芍藥炒各二錢

白朮炒　炙甘草各一二錢　扁豆炒二三錢

茯苓一錢五分　人參隨宜　五味子二十粒

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎

治眞陰精血虧損等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞

杜仲各二錢　炙甘草　肉桂去皮各一二錢
牛膝一錢五分
水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛此性味平和之方也
當歸　芍藥酒炒　山藥炒　枸杞各二錢
熟地二三錢　炙甘草一錢
水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散神效
參人一二三錢　當歸　山藥酒炒各二三錢
熟地三五錢或一二兩　陳皮　炙甘草各一錢
升麻三五分（火浮於上者去之）　柴胡一二錢（無外邪者去之）
水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

休瘧飲

此止瘧最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而瘧有不能止者俱宜用此
人參　白朮炒　當歸各三四錢　炙甘草八分

何首烏製五錢

水一鍾煎七分食遠服查再煎或用陰陽水各一鍾煎一鍾查亦如之俱露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

大和中飲

治飲食留滯積聚等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂

麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢五分

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治瘧病胸膈脹悶

白茯苓　陳皮　厚朴各一錢五分　山楂肉

扁豆炒各二錢　甘草五分

水一鍾半加生薑三五片煎服

一柴胡飲

凡感四時不正之氣以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者宜此主之

柴胡二三錢　芍藥二錢　黃芩　生地黃

陳皮各一錢五分　甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服

二柴胡飲

凡遇四時外感無火者宜此主之

陳皮　厚朴　柴胡各一錢五分　半夏二錢

細辛一二錢　生薑三五七片　甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服

三柴胡飲

凡人素稟陰分不足或有感冒不得不從解散而血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡二三錢　白芍藥一錢五分　炙甘草

陳皮各一錢　當歸二錢（溏泄者以熟地代之）　生薑三五片

水一鍾半煎七八分溫服

四柴胡飲

凡人元氣不足外感風寒宜此主之

柴胡一二三錢　炙甘草一錢　生薑三五七片

當歸二三錢（泄瀉者少用）　人參二三錢或五七錢

水二鍾煎七八分溫服

五柴胡飲

凡中氣不足而外邪有不散者非此不可

柴胡一二三錢　芍藥炒一錢五分　當歸

白朮各二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢

陳皮酌用或不必用

水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

治外感風寒發熱惡寒頭痛身痛痎瘧初起等證

柴胡一二錢　防風　甘草各一錢　芍藥二錢

陳皮一錢五分　生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

麻桂飲

治陰暑瘧疾夏月用之不必厚蓋但取津津微汗

官桂一二錢　當歸三四錢　炙甘草一錢

陳皮隨宜用或不用亦可　麻黃二三錢

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫

不拘時服

大溫中飲

治一切陽虛寒瘧陰暑之證

當歸（泄瀉者以山藥代之） 熟地 白朮土炒各三五錢

甘草炙一錢 人參二三錢甚者一兩或不用

柴胡二三四錢 麻黃 肉桂 乾薑炒各一二錢

（或用煨生薑三五七片）

水二鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

柴陳煎

治傷風兼寒多痰瘧等證

柴胡二三錢 陳皮一錢半 甘草一錢 半夏

茯苓各二錢 生薑三五七片

水一鍾半煎七分食遠溫服

柴芩煎

治傷寒表邪未解外內俱熱瘧痢等證

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉 木通各二錢

枳殼一錢五分

水二鍾煎八分溫服

柴胡白虎煎

治陽明溫瘧表邪不解等證

柴胡　黃芩　麥門冬各二錢　石膏三錢

細甘草七分

水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸柴飲

治營虛不能作汗及眞陰不足外感寒邪難解者

當歸一兩（溏泄代以冬朮）　柴胡五錢　炙甘草八分

水一鍾半煎服或加生薑三五片或加陳皮一錢

或加人參

雪梨漿

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

清香甘美大梨削去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃

水必甘美但頻飲其水勿食其柤退陰火極速也

理陰煎

通治眞陰虛弱等證

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服此方加附子即名附子理陰煎再加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

養中煎

治瘧病中氣虛寒者

人參一二三錢　山藥炒黄　白茯苓各二錢

扁豆炒二三錢　甘草炙一錢　乾薑炒一二錢

水二鍾煎七分食遠服

溫胃飲

治中寒瘧病

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　炙甘草　陳皮各一錢或不用

乾薑炒黑一二三錢　當歸一二錢（滑泄者勿用）

水二鍾煎七分食遠溫服

胃關煎

治脾腎虛寒瘧病

熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢

吳茱萸製五七分　炙甘草一二錢　焦乾薑

白朮炒各一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

牛膝煎

截瘧大效凡邪散已透而血氣微虛宜此主之

牛膝二錢　當歸　陳皮各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分溫服

何人飲

凡氣血俱虛久瘧不止宜此截之

何首烏三錢至一兩隨輕重用之　當歸二三錢

人參三五錢或至一兩　陳皮二三錢（大虛者不用）

煨生薑三片多寒者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服若善飲者以酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

追瘧飲

凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者用此截之

何首烏一兩製　當歸　甘草　半夏　青皮

陳皮　柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾柤亦如之同露一宿次早溫服一鍾食遠再服一鍾

木賊煎

凡瘧疾形實氣强多濕多痰者宐此截之大效

半夏　青皮各五錢　木賊　厚朴各三錢

白朮　蒼朮　檳榔各一錢

酒二鍾煎八分露一宿於未發之先二時溫服

單方

冬霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久亦不壞凡寒熱瘧疾取一錢半熱酒服之（本草下同）

邪瘧取燒尸塲上土同葱搗作丸塞耳或繫膊上卽止男左女右

斷絕熱瘧五月五日午時取蚯蚓屎以麪和丸梧桐子大硃砂爲衣每服三丸無根水下忌生冷卽止皆效或加菖蒲末獨頭蒜同丸（書囊方）

寒熱瘧疾體虛汗多者黃丹百草霜等分爲末發日

空心米飲下三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效（肘后方下同）

又方黃丹飛炒一兩恆山末三兩蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下平旦及未發將發時一服卽效

端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦治痢疾（普濟方）

又方黃丹炒建茶等分爲末溫酒服二錢（三因方）

又方黃丹飛焙麪糊丸芡子大每棗子一枚去核包一丸紙裹煨熟食之

溫瘧不止黃丹炒半兩青蒿童尿浸二兩爲末每服二錢寒多酒服熱多茶服（存仁堂方）

瘧疾寒熱一日一發或二日發或三日一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皀子大每服一丸五更無根水下卽止（集元方）

不二散用砒一錢麪二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三兩爲末每服一錢發日早冷茶下（本草權度）

瘴瘧鬼瘧食瘧蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以琖蓋六一泥固濟煅至藥升在琖刮下爲末米糕糊丸菉豆大雄黃爲衣每服一丸黑豆研水五更送下（摘元下同）

久瘧不止用硫黃硃砂等分爲末每服二錢臘茶清下發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂

又方用硫黃臘茶等分爲末發日早冷水服二錢二服效寒多倍硫熱多倍茶

溫瘧不止當歸一兩水煎飲日一服（聖濟總錄下同）

諸瘧寒熱赤脚馬蘭擣汁入水少許發日早服或入少糖亦可

瘧疾寒熱用青蒿一握水二升擣汁服之（肘后方）

又方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

溫瘧痰甚但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半兩爲末每服二錢白湯調下（仁存方）

瘧疾寒熱齊頭蒿根滴滴金根各一把擂生酒一鍾未發則服以查傅寸口男左女右二日便止（海上名方）

久瘧不瘥蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十丸日二服生者搗汁服亦可（集驗方）

勞瘧積久不止者長牛膝一握生切以水六升煑二升分三服清早一服未發前一服臨發時一服（外臺祕要）

痎瘧邪熱冬葵子陰乾爲末酒服二錢午日取花挼手亦去瘧（聖惠）

瘧疾寒熱馬鞭草搗汁五合酒二合分二服（千金方）

繫臂截瘧旱蓮草搥爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫住良久起小泡謂之天灸其瘧卽止甚效（資生）

瘧疾不止蒴藋一大握炙令赤色以水濃煎一盞欲發前服（斗門方）

瘧疾不止莨若根燒灰水服一合量人强弱用（千金方）

截瘧用常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欲發前頓服取吐或浸酒飲之（外臺祕要）

又方用常山一兩秫米一百粒水六升煑三升分三

服先夜未發臨發時服盡（肘后方）

瘧病數年不瘥兩劑瘥一月以來者一劑瘥名恆山丸恆山二兩研末雞子白和丸梧子大瓦器煮熟曬乾收之每服二十丸竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或不吐即止（千金）

溫瘧熱多恆山一錢小麥三錢淡竹葉二錢水煎五更服甚良（藥性論）

痰瘧積瘧臨發時以酢和附子塗於背上（肘后下同）

寒瘧積瘧巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸丸梧子大清旦先發時各服一丸白湯下

脾寒厥瘧先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧三者並宜服此不蛀草烏頭削去皮沸湯泡二七度以盞蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十丸薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯便不發也（東坡方）

新久瘧疾用葛葎草一握去兩頭秋冬用乾者恆山

末等分以淡漿水二大戔浸藥星月下露一宿五更煎一戔分二服當吐痰愈

脾寒瘧疾石胡荽一把杵汁半椀入酒半椀和服甚效（集簡方）

治瘧不止火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香取起以紙蓋之令出汗盡爲末臨發前用茶或酒下移病人原睡處其狀如醉醒卽愈

又方火麻葉如上法爲末一兩加縮砂丁香陳皮各半兩酒糊丸梧子大每用酒茶任下五七丸能治諸瘧壯元氣（普濟）

諸瘧久瘧用三姓人家寒食麪各一合五月五日午時采青蒿擂自然汁和丸菉豆大臨發日早無根水下一丸一方加炒黃丹少許（德生堂）

瘧疾寒熱煑豉湯飲數升大吐卽愈（肘後方）

虛勞久瘧青蒿擣汁煎過如常釀酒飲

瘧疾寒熱獨頭蒜炭上燒之酒服方寸匕（肘後方）

又方用桃仁半片放內關穴上將獨蒜擣爛罨之縛住男左女右卽止治人屢效（簡便方）

瘧疾寒熱青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服（聖惠）

久瘧用眞阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和丸皂子大每空心人參湯化服一丸卽愈（千金下同）

痎瘧寒熱阿魏胭脂各一豆大研勻以蒜膏和覆虎口上男左女右（聖濟總錄）

食瘧積瘧巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸菉豆大一服一丸冷湯下（肘後方）

瘴瘧寒熱相思子十四枚水研服取吐立瘥（千金）

脾胃聚痰發爲瘧疾生薑四兩搗自然汁一酒杯露一夜於發日五更面北立飲卽止未止再服（易簡方）

瘴瘧發熱連背項者茴香子搗汁服之（千金方）

男女瘧疾馬齒莧搗紮手寸口男左女右

瘧疾寒熱翻白草根五七箇煎酒服之

熱瘧不止翹搖草杵汁服之（廣利方）

斷截瘧疾紫蘵一握搗爛於周身摩擦得汗卽愈臨發前一時用之

勞瘧劣弱烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口

甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服即止（圖經）

鬼瘧寒熱樹上自乾桃子二七枚爲末滴水丸梧子大硃砂爲衣每服一丸侵晨面東井華水下良（聖濟總錄）

五種瘧疾用桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩研勻以冷水和勻丸如梧子大硃砂爲衣發日五更念藥王菩薩七遍井華水下一丸立瘥不過三次妙不可言（養生主論）

瘧疾不已桃花爲末酒服方寸匕良（梅師方）

呪棗治瘧執棗一枚呪曰吾有棗一枚一心歸大道優他或優降或劈火燒之念七遍吹棗上與病人食之即愈（岣嶁神書）

瘧疾不止龜殼燒存性研末酒服方寸匕（海上名方）

老瘧發作無時名痎瘧俚人呼爲妖瘧用瘧龜燒灰頓服二錢當微利用頭彌佳或發時煑湯坐於中或懸於病人臥處（藏器）

老瘧勞瘧鼈甲醋炙研末酒服方寸匕隔夜清早臨時各一服無不斷者入雄黃少許更佳（肘后方）

邪瘧時作生虎睛一枚臘月猪血少許硃砂阿魏各一分爲末端午日取粽尖七枚和丸黍米大每綿包一丸塞耳中男左女右（聖惠）

瘧疾寒熱牡蠣粉杜仲等分爲末蜜丸梧子大每服五十丸溫水下（普濟）

寒熱瘧疾猪膏丸治瘧疾發渴往來不定臘猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭出脚舌拄上齶囘面向北搗一千丸皂子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右（聖惠）

佩禳瘧疾五月五日收大蝦蟆曬乾紙封絳囊貯之男左女右繫臂上勿令知之（家藏方）

鬼瘧經久或發或止野猫肝一具瓶盛熱猪血浸之封口懸乾去血取肝研末猢猻頭骨虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分爲末酢糊丸芡子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指上（聖惠）

鬼瘧寒熱雄狐屎蝙蝠屎各一分爲末酢糊丸芡子大發時男左女右手把一丸嗅之

虛寒瘧疾黃狗肉煑臛入五味食之

勞瘧瘴瘧久不愈用白狗屎燒灰發前冷水服二錢（聖惠方）

瘧疾不止故鞋底去兩頭燒灰井華水服之（千金方）

老瘧不止龍骨末方寸匕先發一時酒一升半煑三沸及熱服盡溫覆取汗即效（肘后方）

久瘧不止用蝙蝠七箇去頭翅足搗千下丸梧子大每服一丸清湯下雞鳴時一丸禺中一丸（范汪方）

五瘧不止用夜明砂末每冷茶服一錢立效（聖惠）

又方治瘧發作無時經久不瘥用蝙蝠糞五十粒朱砂半兩麝香一錢爲末糯米飯丸小豆大未發時白湯下十丸

瘧疾渴甚童便和蜜煎沸頓服（簡便方）

瘴癘諸瘧無問新久童便一升入白蜜二匙攪去白沫頓服吐出碧綠痰爲妙若不然終不除也（聖惠下同）

勞瘧瘴瘧野狐肝一具陰乾重五日五更初北斗下受氣爲末粳米飯丸菉豆大每以一丸緋帛裹繫手中指男左女右

鬼瘧寒熱野狐肝膽一具新瓶內陰乾阿魏一分爲末酢丸芡子大發時男左女右把一丸嗅之仍以緋帛包一丸繫手中指

熱瘧不寒穿山甲一兩乾棗十箇同燒存性爲末每服二錢發日五更井華水服（楊氏家藏）

邪瘧用隔年全曆端午午時燒灰糊丸梧子大發日早用無根水下五十丸（易簡方）

鬼瘧來去畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大爲末寒食麪和丸小豆大每服一丸發時冷水下正月十五日五月五日初五日修合（聖濟總錄）

瘧疾不止不拘久近車軸垢水洗下麪和丸彈子大作燒餅未發時食一枚發時又食一枚（聖惠下同）

鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒研空心溫酒服一錢臨發再服

久瘧不止雄野雞屎熊膽五靈脂恆山等分爲末酢糊丸黑豆大正發時冷水下一丸

邪氣瘧疾黑牛尾燒灰酒服方寸匕日三服（外臺秘要）

又方牯牛陰毛七根黃荊葉七片縛內關上亦效

厭瘧方燕屎方寸匕發日平旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣愼勿入口害人（藏器）

鬼瘧不止用白驢蹄剉炒砒霜各二分大黃四兩菉豆三分雄黃一分硃砂半分共研細末和丸如梧桐子大未發平旦冷水服二丸卽止七日忌油（肘后方）

止截瘧疾用蜘蛛一枚同飯擣丸吞之（葛洪方）

又方用蜘蛛一枚著蘆管中密塞綰項上勿令患人知之（楊氏家藏）

又方用蜘蛛三五枚綿包繫寸口上（海上方）

截瘧五月五日取花蜘蛛曬乾絳囊盛之臨期男左女右繫臂上勿令知之（普濟）

藜蘆散治痎瘧有痰取吐而愈大藜蘆末五分溫漿水調下以吐爲度（綱目）

截瘧用何首烏忌鐵爲末酒調下三錢臨發先服或煎湯服（醫宗必讀下同）

又方桃仁一味去皮尖爛研不犯水加黃丹三錢丸桐子大每服三丸發日面東溫酒吞下如不飲酒井華水下五月五日午時合忌雞犬婦人見

又方常山末二錢酒浸炒透即不發吐烏梅肉四枚研爛爲丸此截瘧必效之方世傳常山發吐不知其有神功但炒透即不吐也

又方生鼈甲不見湯煑者酢炙黃爲末烏梅肉爲丸每服三錢必效

瘧疾寒熱用明礬枯爲末飛羅麪酢打糊丸梧子大每服二三十丸東南桃心七箇煎湯下名白龍丹

瘧疾寒熱半邊蓮同雄黃各二錢搗泥椀內覆之待色青以飯丸梧子大每服九丸空心鹽湯下（壽域方）

溫瘧寒熱作止不定煩渴頭痛心躁杜莖山即土恆取葉杵爛新酒浸絞汁服吐出惡涎甚效（圖經）

勞熱瘴瘧用土紅山即杜莖山之類取根米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃爲末每服一錢水一盞生薑一片同煎服甚效

久瘧有母木鼈子穿山甲炮等分爲末每服三錢空心溫酒下（摘要）

脾寒瘧疾乾薑高良薑等分爲末每服一錢水一盞煎至七分服

又方乾薑炒黑爲末臨發時以溫酒服三錢匕

羊角菜擣酒飲止瘧（本草）

瘧疾黃牛肝酢煮食之（孟詵）

多年老瘧用驢脂和烏梅爲丸於未發時服二十丸

驢皮覆瘧疾人良（日華）

久瘧無定期者水洗驢尾軸垢汁和麪如彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發時食一枚效（蘇恭）

瘴瘧寒熱果然一名仙猴肉同五味煮臛食之併坐其皮取效（藏器）

久瘧雞子黃和常山末爲丸竹葉湯服

溫瘧久病欲死者鷓鴣肉合毛熬酒漬服之或生擣汁服最良

綠毛龜縛置額端能禁邪瘧

鬼瘧日發鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半爲末每以一字發時㗜鼻

又方鬼箭羽末一分砒霜一分五靈脂一兩爲末發時冷水服一錢（聖濟總錄）

瘧疾取兩頭蛇陰乾佩於項上（本草下同）

老瘧久不愈取肥大牛膝一握剉酒水相半煎服三劑差

瘴瘧取茵陳煎湯服之又煑羹作虀並可食之

瘧疾取葛根一兩煎湯服之

溫瘧無汗麻黃煎湯服發汗差

熱瘧知母煎湯服之良

痰瘧取半夏一兩煎湯和薑汁服之

溫瘧松蘿煎湯服可以吐痰

瘧當發日取蛇蛻皮塞兩耳又手持少許良

又方用蛇蛻一條或三五條炭火燒存性研爲細末每服一字無根水下未發前一時服忌雞魚冷物

溫瘧瘴瘧蜈蚣炙爲末溫酒調服半錢

寒熱瘧取鼠婦三枚研和溫酒服小兒尤良

痎瘧取白葵花陰乾搗爲末酒調服一錢

熱瘧煩渴烏梅煑湯飲

久瘧肉積阿魏善化肉積加硃砂等分糊丸桐子大每服二十丸空心白湯下妙久病氣虛人參湯下

鬼瘧狸糞燒灰和酒服又煑肉食之又頭骨亦主瘧

用如虎骨

寒熱瘧取狐五臟及腸治如食法和五味煮食之良

鍼灸

素問曰足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血

足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

足陽明之瘧令人先寒灑淅灑淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上

足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰卽取之

足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

腎瘧者令人灑灑寒腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧者令人且病也善饑而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血

瘧發身方熱刺跗上動脈開其空出其血立寒

瘧方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰

瘧脈滿大急刺背俞用中鍼旁五胠俞各一適肥瘦出其血也

瘧脈小實急灸脛少陰刺指井

瘧脈滿大急刺背俞五胠俞背俞各一適行至於血也

瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼

諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之

十二瘧者其發各不同時察其病形以知其何脈之病也

先其發時如食頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脈出血不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠脊者必已舌下兩脈者廉泉也

刺瘧者必先問其病之所先發者先刺之

先頭痛及重者先刺頭上及兩額兩眉間出血先項背痛者先刺之先腰脊痛者先刺郄中出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間先足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血

風瘧瘧發則汗出惡風刺三陽經背俞之血者胻痠痛甚按之不可名曰胕髓病以鑱鍼鍼絕骨出血立已

身體小痛刺至陰

諸陰之井無出血間日一刺

瘧不渴間日而作刺足太陽渴而間日作刺足少陽

溫瘧汗不出爲五十九刺

甲乙經曰痎瘧上星主之先取譩譆後取天牖風池大杼

痎瘧取完骨及風池大杼心俞上窌譩譆陰都太淵三間合谷陽池少澤前谷後谿腕骨陽谷俠谿至陰通谷京骨皆主之

瘧振寒熱甚狂言天樞主之

瘧熱盛列缺主之

瘧寒厥及熱厥煩心善噦心滿而汗出刺少商出血立已

熱瘧口乾商陽主之

瘧寒甚陽谿主之

風瘧汗不出偏歷主之

瘧面赤腫溫溜主之

痎瘧心下脹滿痛上氣灸手五里左取右右取左

瘧項痛因忽暴逆掖門主之

瘧發有四時面上赤䀮䀮無所見中渚主之

瘧食時發心痛悲傷不樂天井主之

風瘧支正主之

瘧背膂振寒項痛引肘腋腰痛引少腹四肢不舉少海主之

瘧不知所苦大都主之

瘧多寒少熱大鍾主之

瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶牖而處寒厥足熱太谿主之

瘧熱少間寒不能自溫䐜脹切痛引心復溜主之

瘧不嗜食厲兌主之

瘧瘈瘲驚股膝重胻轉筋頭眩痛解谿主之

瘧日西發臨泣主之

瘧振寒腋下腫丘墟主之

瘧從胻起束骨主之

瘧多汗腰痛不能俯仰目如脫項如拔崑崙主之

瘧實腰背痛虛則鼽衄飛揚主之

瘧頭重寒背起先寒後熱渴不止汗乃出委中主之

瘧不渴間日作崑崙主之

濟生方曰瘧疾久不愈不問男女於大椎中第一骨節盡處灸三七壯立效或灸第三骨節亦可

景岳全書曰瘧病痞成難消者須灸章門水道等穴炷宜稍大多灸或連灸二三次方得全愈

導引

保生祕要曰瘧病導引法平身坐定雙手擦掌撫腎囊兩肋靠膝以聲勢向前躬而後仰如此用力起五九之數約汗透身輕爽而自愈慎風邪

運功定艮起念運上風門穴多著功夫蓋風由此入也漸運入內又散出外上泥丸降心頭推開或吐而愈不吐亦愈

又法心頭推開至臍俾脾寒之氣盡吐出來

又法寒時兩手跪指按雙乳下用力揉揉到滿身臭

汗微出便好要初寒而作如單熱不寒散步而呵向東六次如燥結須睡平仰上定其心志舌托上齶嚥津液入肺經即愈

醫案

儒門事親曰故息城一男子病瘧求治於戴人診兩手脈皆沉伏而有力內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳避匿無所不至終不能療戴人曰此痎瘧也以三花神祐丸五七十丸冷水送下過五六行次以冷水止之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓啜之瘧猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎水六七次若飜漿次以柴胡湯和之間

用妙功丸磨之瘧悉除

一書生病瘧間日一作及秋試之日乃瘧之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐涎數升瘀血宿食皆盡同室驚畏至來日入院瘧亦不發此偶得吐法耳

東垣十書曰僉憲詹公禀甚壯形甚強色甚蒼年近六十矣二月得痎瘧予診之知其飫於醲肥者告之曰須遠色食淡調理浹月得大汗乃安公不悅一人從旁曰此易耳數日可安與劫藥三五貼病退旬日後又作又與又退纒綿至冬病猶未除又來求治余知其久得藥痰亦少惟胃氣未完又天寒汗未透遂以白朮粥和丸與二斤令其遇饑時且勿飲食取一二百丸以熱湯下只與白粥調養盡此藥當大汗而安已而果然

予次女形瘦性急體本有熱懷孕三月適當夏暑口渴思水時發小熱遂教以四物湯加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎煑數帖而止其後此子二歲瘡痍徧身忽一日其瘡頓愈數日遂成痎瘧予曰此胎毒也瘡若再作病必自安已而果然若於孕時確守前

方何病之有

丹溪心法曰一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脈無時冬寒認作虛寒治疑誤再診見其梳洗言動如常知果誤也經不行非無血脈爲痰所碍無非血氣虛乃積痰生熱結伏其脈而不見耳當作實熱治與三花丸旬日後食進脈出帶微弦謂胃氣既全瘧當自愈而經行也令淡滋味果應

一婦身材小味厚痎瘧月餘間日發於申酉頭與身痛寒多喜極熱辣湯脈伏面慘晦作實熱治之以十棗湯爲末粥丸黍米大服十粒津嚥日三次令淡飲半月大汗愈

一婦人久痢因哭子變瘧一日五六作汗如雨不止脈微數疲甚無邪可治陰虛陽散死在旦夕且服四獸等熱劑遂用參术各二兩白芍藥一兩黃芪半兩炙甘草二錢作大劑四五服而愈

一人因勞役發嗽得痎瘧又服發散藥變爲發熱舌短語言不正痰吼有聲脈洪實似滑先用獨參湯加竹瀝二蛤殼一服後吐膠痰舌本正後用黃芪人參

湯服半月而愈

衛生寶鑑曰燕南河北道提刑按察司書吏高士謙年踰四十至元戊寅七月間暑氣未退因官事出外勞役又因過飲午後大發熱而渴冰水不能解其病早晨稍輕減服藥不效召予治之診其脈弦數金匱要略云瘧脈自弦弦數者多熱瘧論曰癉瘧脈數素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於寒故但熱而不寒者邪氣內藏於裏而外舍於分肉之間令人消爍脫肉故名曰癉瘧月令云孟秋行夏令民多癉瘧潔古云動而得之名曰中暍以白虎加梔子湯治之士謙遠行勞役又暑氣有傷酒熱相搏午後時助故大熱而渴如在甑中先以柴胡飲子一兩下之後以白虎加梔子湯每服一兩數服而愈

醫學正傳曰予壯年過杭同舟有二男子皆年踰四十五各得痎瘧三年矣俱發於寅申巳亥日一人晝發於巳而退於申一人夜發於亥而退於寅予曰俱

到杭可買藥俱與痓可晝發者乃陰中之陽病宜補氣解表與小柴胡湯倍柴胡人參加白术川芎葛根陳皮靑皮蒼术夜發者爲陰中之陰病宜補血疎肝用小柴胡合四物湯加靑皮各與十貼教其加薑棗煎於未發前二時服每日一貼服至八貼同日得大汗而愈永不再舉

醫學綱目曰一婦人五十餘歲形實喜作勞性急味厚喜火食夏却患惡寒發熱更作無休時衣被雖厚尙凜凜然兩手脈皆濇予作雜合邪治之遂以四物加陳皮以人參白术爲君生甘草黃蘗爲佐多入薑汁呑通神丸三十丸回金柳靑各二十丸阿魏十丸煎三貼而得睡第五貼而身和第七貼通身微汗諸證皆去

本草綱目曰一人作勞發瘧服瘧藥變爲熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰畜胷中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃芪當歸煎服半月而安

醫宗必讀曰太史楊方壺瘧發兩日脈見弦緊兩發

後苦不可支且不能忌口便懇截之余曰邪未盡而強截之未必獲效即使截住必變他證不若治法得所一二劑間令其自止升麻柴胡各二錢提陽氣上升使遠於陰而寒可止黃芩知母各一錢五分引陰氣下降使遠於陽而熱自已以生薑三錢刦邪歸正甘草五分和其陰陽一劑而減半再劑而竟止矣

新安程武修患瘧每日一發自巳午時起直至次日寅卯而熱退不逾一時則又發矣已及一月困頓哀苦命兩郎君叩首無算以求速愈余曰頭痛惡寒脉浮而大表證方張此非失汗必悞截也武修云寒家素有截瘧丸百發百中弟服之病勢增劇何也余曰邪未解而遽止之邪不能伏請以八劑四日服盡決效耳石膏黃芩各三錢抑陽明之熱使其退就太陰白豆蔻三錢生薑五錢救太陰之寒使其退就陽明脾胃爲夫妻使之和合則無陰陽乖亂之愆半夏檳榔各一錢五分去胷中之痰蘇葉二錢發越太陽之邪乾葛一錢斷入陽明之路甫三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服四劑補中益氣服十劑而痊

相國沈銘縝丙辰秋患瘧吐蚘悶不思食六脉沉細余曰瘧傷太陰中寒蚘動也用理中湯加烏梅三箇黃連五分進四劑後胷中豁然寒熱亦減蚘亦不吐去黃連加黃芪二錢生薑五錢五劑而瘧止以手書謝曰早年攻苦即有寒中之患醫者但明疎氣不解扶陽積困於今雖當盛暑寒冷不敢沾脣此獨不肖自知之耳瘧發蚘動幾爲性命之憂幸老年姪隔垣之眎一匕回春豈但超邁庸儔直當上參和扁嗣此有生詎非慈造鐫之焦府與日偕長矣

薛氏醫按曰冬官朱省庵停食感寒而患瘧自用清脾截瘧二藥食後腹脹時或作痛服二陳黃連枳實之類小腹重墜腿足浮腫加白朮山楂吐食未化謂余曰何也余曰食後脹痛乃脾虛不能尅化也小腹重墜乃脾虛不能升舉也腿足浮腫乃脾虛不能運行也吐食不消乃脾胃虛寒無火也治以補中益氣加吳茱萸炮薑木香肉桂一劑諸證頓退飲食頓加不數劑而痊

大尹曹時用患瘧用止截之劑反發熱惡寒飲食少

思神思甚倦其脉浮洪或微細此陽氣虛寒余用補中益氣內參芪歸术各加三錢甘草一錢五分加炮薑附子各一錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

一儒者秋患寒熱至春未愈胷痞腹脹余用人參煨生薑各二兩煎頓服寒熱即止更以調中益氣加半夏茯苓炮薑數劑元氣頓復後任縣尹飲食勞倦疾作服前藥即愈大凡久瘧乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食泄瀉腹痛手足逆冷寒戰如慄若誤投以清脾截瘧二飲多致不起

一上舍每至夏秋非停食作瀉必瘧痢霍亂遇勞吐痰頭眩體倦發熱惡寒用四物二陳芩連枳實山梔之類患瘧服止截之藥前證益甚時或遍身如芒刺然余以補中益氣加茯苓半夏內參芪各用三錢歸术各二錢十餘劑少愈若間斷其藥諸病仍至連服三十餘劑全愈又服還少丹半載形體充實

一婦人瘧久不愈發後口乾倦甚用七味白术散加麥門五味作大劑煎與恣飲再發稍可乃用補中益

氣加茯苓半夏十餘劑而愈

東洞庭馬志卿瘧後形體骨立發熱惡寒食少體倦用補中益氣內參芪歸术各至三錢甘草一錢五分炮薑二錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

一婦人勞役停食患瘧或用消導止截飲食少思體瘦腹脹余以補中益氣倍用參芪歸术甘草加茯苓半夏各一錢五分炮薑五錢一劑頓安又以前藥炮薑用一錢不數劑元氣復而全愈

外祖母虞太孺人年八十餘夏患瘧諸舅以年高不堪懼其再發議欲截之予曰欲一劑愈亦甚易何必截乎乃用柴胡升麻葛根羌活防風之甘辛氣清以升陽氣使離於陰而寒自已以知母石膏黃芩之苦甘寒引陰氣下降使離於陽而熱自已以猪苓之淡滲分利陰陽使不得交併以穿山甲引之以甘草和之果一劑而止

證治準繩曰予弱冠游鄉校時校師蔣先生之內患牝瘧身痛逾月不瘥困甚時予初知醫延予診治告以醫欲用薑附溫之予曰溽暑未衰明係熱邪安得

寒而溫之經云陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒此所云寒乃陰陽交爭互作之寒非眞寒也豈得用桂附溫之乃處一方以柴胡升麻葛根羌活防風補三陽之虛升之也何曰補虛曰虛非眞虛以陷入陰分故謂之虛升之卽補矣以桃仁紅花引入陰分而取陽以出還於陽分以猪苓分隔之使不復下陷一劑而病良已

寓意草曰袁繼明素有房勞內傷偶因小感自煎薑葱湯表汗因而發熱三日變成瘧疾余診其脈豁大空虛且寒不成寒熱不成熱氣急神揚知爲元陽衰脫之候因謂其父曰令郎光景竊慮來日瘧至大汗不止難於救藥倘信吾言今晚急用人參二兩煎濃湯預服防危渠父不以爲意次日五鼓時病者精神便覺恍惚扣門請救及覓參至瘧已先發矣余甚傍徨恐以人參補住瘧邪雖救急無益也只得姑俟瘧勢稍退方與服之服時已汗出沾濡頃之果然大汗

不止昏不知人口流白沫灌藥難入直至日暮白沫轉從大孔遺出余喜曰白沫下行可無恐矣但內虛腸滑獨參不能勝任急以附子理中湯連進四小劑人事方甦能言但對面譚事不淸門外有探病客渠忽先知家人驚以爲祟余曰此正神魂之離舍耳吾以獨參及附子理中駟馬之力追之尚在半返未返之界以故能知宅外之事再與前藥二劑而安

陸六息先生體偉神健氣旺血充從來無病莅任以後適值奇荒巨寇憂勞百倍因而病瘧飲食減少肌肉消瘦形體困倦口中時時噯氣其候一日輕一日重纏綿三月大爲所苦察脈辨證因知先生之瘧乃饑飽勞佚所感受傷在陽明胃之一經夫陽明受病邪氣淺而易愈乃至爲所苦者緣不識病之所在藥與病邪不相值反傷其正耳誠知病邪專在胃則胃爲水穀之海多氣多血之區一調其胃而瘧立止矣故飲食減而大便轉覺艱澀者胃病而運化之機遲也肌肉消瘦者胃主肌肉也形體困倦者胃病而約束之機關不利也口中時時噯氣者胃中不和而

顯晦塞之象也至於一日輕一日重者此人所不經見之證病機之最當發明者其候亦陽明胃經之候也內經陽明脈解篇有曰陽明之病惡人與火聞木聲則惕然而驚及刺瘧篇又曰陽明之證喜見火喜見日月光何經文之自悖謬邪不知此正更實更虛之妙義而與日輕日重之理相通者也夫陽明得病之始則邪氣有餘故惡人惡火惡木音者惡其助邪也及其病久則邪去而正亦虛故喜火喜日月光者喜其助正也若是則時日干支之衰旺其與人身相關之故可類推矣蓋甲丙戊庚壬者天時之陽也乙丁己辛癸者天時之陰也瘧久食減胃中之正已虛而邪去未盡是以值陽日助正而邪不能勝則輕值陰日助邪而正不能勝則重也夫人身之病至於與天時相名亦云亟矣使當日稍知分經用藥何至延緜若是哉迄今喫緊之處全以培養中氣爲主蓋人雖一胃而有三脘之分上脘象天清氣居多下脘象地濁氣居多而其能升清降濁者全賴中脘爲之運用一如天地定位不可無人焉參贊之也先生下脘

之濁氣本當下傳也而傳入腸中則艱不當上升也而升至胷中甚易者無他中脘素受飲食之傷不能阻下脘濁氣上干清道耳試觀天地間有時地氣上而爲雲必得天氣下而爲雨則二氣和而晴爽立至若一味地氣上升天氣不降則太空窒塞而成陰曀之象人之胃中亦猶是也清濁偶有相干頃當自定設有升無降則逼矣故中脘之氣旺則水穀之氣上升於肺而灌輸百脉水穀之濁氣下達於大小腸從便溺而消胷中何窒塞之有哉此所以培養中氣爲亟亟也中氣旺則濁氣不久停於下脘而臍下丹田之眞氣方能上下無礙可以呼之於根吸之於蔕深深其息矣所用六味地黃丸凝滯不行之藥大爲胃病所不宜況於濁氣上干反以陰濁之屬揚波助流乎今訂理中湯一方升清降濁爲合法耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十二卷目錄

醫部彙考二百九十二

脈門一

黃帝素問 四時調神大論 厥論 奇病論 大奇論 脈解篇 調經論 生氣通天論 陰陽別論 脈要精微論 通評虛實論 陽明脈解篇 評熱病論 繆刺論 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 至眞要大論 方盛衰論 解精微論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 五亂篇 逆順肥瘦篇 五色篇 衞氣篇 百病始生篇 刺節眞邪篇

扁鵲難經（厥逆）

張機金匱要略（厥逆）

華佗中藏經（陽厥論　陰厥論　論陰陽否格　當灸不灸成厥逆　死脈）

王叔和脈經（厥法）

朱肱活人書（論陰陽寒熱）

劉完素六書（厥逆）

成無己明理論（厥逆）

張從政儒門親事（論厥逆近世差元說）

藝術典第三百十二卷

醫部彙考二百九十二

厥門一

黃帝素問

四氣調神大論

冬三月此爲閉藏水冰地坼無擾乎陽早臥晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥奉生者少

註　萬物收藏閉塞而成冬也陽氣收藏故勿煩擾以泄陽氣早臥晚起順養閉藏之氣必待日光避寒邪也若伏若匿使志無外也若有私意若已有得神氣內藏也去寒就溫養標陽也無洩皮膚之陽而使急奪其根氣也凡此應冬氣者所以養藏氣之道逆冬藏之氣則傷腎至春爲痿厥之病因奉生者少故也蓋肝木生於冬水主春生之氣而養筋筋失其養則爲痿生氣下逆則爲厥

厥論

黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥

註　氣逆則亂故忽爲眩仆卒不知人此名爲厥與中風不同有寒熱者有陰有陽也陰陽二氣皆從下而上是以寒厥熱厥之因由陰陽之氣衰於下也

帝曰熱厥之爲熱也必起於足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也

註　陽氣勝則陰氣虛而陽往乘之故熱厥起於足下也

帝曰寒厥之爲寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也

註　足三陰之血氣起於五指內側之端集於膝下者三陰交於踝上也聚於膝上者三陰經脈皆循內股而上故其寒也不從外皆從內也

帝曰寒厥何失而然也岐伯曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因於中陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也

註　宗筋根起於胞中內連於腎臟陰陽二氣生於胃腑輸於太陰藏於腎臟太陰陽明合聚於宗筋者中焦之太陰陽明與下焦之少陰太陽中下相

合而會合於前陰之間當秋冬之時陽氣收藏陰氣外盛此寒厥人者因恃其質壯過於作勞則下氣上爭不復藏於下矣陽氣上出則陰臟之精氣亦溢於下矣邪氣者謂陰臟水寒之邪夫陽氣藏於陰臟精陽外出則陰寒之邪因從之而上故中焦所生之陽亦衰不能滲營於經絡中下之氣不能互相資生陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也

帝曰熱厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主爲胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營於四支也此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱偏於身內熱而溺赤也夫酒氣盛而慓悍腎氣日衰陽氣獨勝故手足爲之熱也

註　衛氣者水穀之悍氣酒亦水穀悍熱之液故從衛氣先行於皮膚而充於絡脈是不從脾氣而行於經脈故絡脈滿而經脈虛也不從脾氣通調於

經脉則陰氣虛矣悍熱之氣反從外而內則陽氣入矣陽明乃燥熱之腑藉太陰中見之陰化陰氣虛而陽熱之氣內入則胃氣不和而所生之精氣竭不能營於四支矣飲酒數醉酒氣聚於脾中若飽以入房則穀氣留於胃中脾臟不能轉輸其精液而穀氣聚而不得散酒氣與穀氣交相侵薄則熱盛於中矣中土之熱灌於四旁故熱徧於身入胃之飲食不能游溢精氣下輸膀胱故內熱而溺赤夫爲腎水臟受水穀之精而藏之酒氣熱盛而慓悍則腎臟之精氣日衰陰氣衰於下而陽氣獨勝於中故手足爲之熱也

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人也

註　暴不知人卒然昏憒或仆撲也半日氣周之半一日氣行之周陰氣盛於上謂中焦之陽氣日損陰氣獨盛於上也陰盛於上則下焦之陽氣亦虛

陽虛於下是以腹脹滿也下氣謂下焦之元陽邪氣腎臟水寒之邪也陽氣盛於上謂陰氣虛而陽氣獨勝也陽盛於上則下氣重上下氣上乘則寒邪隨之而上逆逆則陽氣亂於上而卒不知人

帝曰善願聞六經脉之厥狀病能也岐伯曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眴仆

註 足太陽之厥逆於上則爲首腫頭痛厥逆於下則爲足不能行皆太陽之脉病也神氣昏亂則爲眩仆太陽爲諸陽主氣也

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註 癲狂走呼妄言妄見陽明之脉病也經氣厥逆故腹滿胃不和則不得臥陽明乃燥熱之經其經氣上出於面故面赤而熱

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脅痛胻不可以運

註 逆則暴聾頰腫脅痛足胻不可以運行

太陰之厥則腹滿䐜脹後不利不欲食食則嘔不得臥

註　厥則腹滿䐜脹食飲入胃脾爲轉輸逆氣在脾故後便不利脾不轉運則胃亦不和是以食則嘔而不得臥

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

註　經脈厥逆而陰液不能上資是以口乾心痛肺經不能通調於下故溺赤水火陰陽之氣上下不交故腹滿也

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫胻內熱

註　厥則少腹腫痛而腹脹涇溲不利陰縮而腫肝主筋膝者筋之會經脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝厥陰木火主氣榮命厥逆故胻內腫熱也

盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之

註　此厥在經脈故當隨經以治之如經氣盛者用鍼瀉而疎之經氣虛者以鍼補之不盛不虛卽於本經以和調之名曰經刺

太陰厥逆胻急攣心痛引腹治主病者

註　中土之氣主溉四旁足太陰氣厥故胕爲之急攣脾氣逆而不能轉輸其精氣是以心氣虛而痛引於腹也此是主脾所生之病故當治主病之脾氣焉

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

註　少陰之氣上與陽明相合而主化水穀少陰氣厥以致中焦虛滿而變爲嘔逆上下水火之氣不交故下泄清冷也

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫語治主病者

註　攣者肝主筋也腰者肝之表也虛滿者食氣不能散精於肝也前閉者肝主疎泄也肝主語譫語者肝氣鬱也

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

註　三陰俱逆是陰與陽別矣不得前後者陰關於下也諸陽之氣皆生於陰三陰俱逆則生氣絕滅是以手足寒而三日死矣

太陽厥逆僵仆嘔血善衄治主病者

註　太陽之氣厥逆故僵仆陽氣上逆則嘔血陽熱

在上則衄血

少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧

註　少陽主樞是以少陽氣厥而機關爲之不利頸項乃三陽陽維之會腰脊者身之大關節也故機關不利者腰不可以轉行項不可以回顧

發腸癰不可治驚者死

註　少陽相火主氣火逆於內故發爲腸癰腸癰不可治者謂病在氣分而癰腫在內非鍼刺之可能治也若發驚者其毒氣干藏故死

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

註　陽明氣厥則喘上逆則欬陽明主肌肉故厥則身熱陽明乃悍熱之氣厥氣上逆則迫血妄行故嘔血

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

註　手太陰肺主氣逆故虛滿而欬不能通布水津故善嘔沫是主肺所生之病故治主病之肺氣

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治

註　手心主者手厥陰胞絡之氣也手少陰者心臟之氣也胞絡爲君主之相火二火並逆將自焚矣故爲死不可治

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治主病者

註　手太陽所生病者耳聾小腸主液故逆則泣出而不能營養經脉也故項不可以顧腰不可以俛仰蓋腰項乃脉絡經俞之大會也

手陽明少陽厥逆發喉痹嗌腫痓治主病者

註　手陽明者肺之腑也手少陽者手厥陰三焦也陽明主嗌肺主喉兼三焦之火氣並逆是以發喉痹而嗌腫陽明乃燥熱之經三焦屬龍雷之火火熱並逆故發痓

奇病論

帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆帝曰善

註　此下受之寒上逆於巔頂故名曰厥逆

大奇論

二陰急爲癇厥

註二陰少陰也癇厥者昏迷仆撲不知人此水氣乘心是以二陰脉急

脉至如喘名曰暴厥暴厥者不知與人言

註如喘者脉來滑急也此痰水上壅故脉來急滑名曰暴厥暴厥者一時昏厥而不能與人言

脉解篇

太陽所謂入中爲瘖者陽盛已衰故爲瘖也內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也少陰不至者厥也

註入中爲瘖者陽盛已衰入中之氣不足則陰虛而爲瘖矣陽盛於外內奪其所藏之氣則腎虛矣陽受氣於四末陽盛已衰故四支不收而爲痱腎氣不足則爲瘖以致少陰之氣不至則手足厥冷矣

調經論

志有餘則腹脹飧泄不足則厥

註腎者胃之關也不利則聚水而爲腹脹飧泄矣

腎爲生氣之原故不足則厥逆而冷

絡之與孫脈俱輸於經血與氣幷則爲實焉血之與氣幷走於上則爲大厥厥則暴死氣復反則生不反則死

註 夫絡脈之血氣孫絡之血氣俱輸於經是血與氣共幷於血分則爲實也血之與氣幷走於上則爲大逆逆則暴死氣復反則生不反則死

生氣通天論

陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥

註 煩勞則傷陽氣夏時陽浮於外故益虛而煎厥

大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥

註 怒則氣上血隨氣行氣血並逆故令迫厥

陰陽別論

三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥腨痟

註 三陽者太陽也太陽主表邪之中人始於皮毛邪正相搏發爲寒熱之病矣太陽主開病則開闔不得邪氣逆於肉理乃生癰腫太陽爲諸陽主虛而生筋筋傷則爲痿氣傷則爲厥也

脉要精微論

厥成爲巓疾

註　厥者氣上逆也氣惟上逆則變爲巓頂之病

通評虛實論

黄疸暴痛癲疾厥狂久逆之所生也

註　黄疸者濕熱內鬱而色病見於外暴痛者五臟中之氣不平卒然而爲痛也巓疾厥狂陰陽偏勝之爲病也此皆陰陽五行之氣久逆不和之所生也

陽明脉解篇

陽明厥則喘而惋惋則惡人

註　厥氣上逆於肺則喘逆於心則驚經言陽氣入陰陰陽相薄則恐如人將捕之蓋陽明之熱上逆於少陰陰陽相薄則恐而惡人也

評熱病論

帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不爲汗解此爲何病

岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥

註　風爲陽邪開發肌腠津液外泄風熱留之故身熱風熱不去則傷動其腎氣而上逆逆於上則心煩乘於脾土則中滿病名曰風厥謂因風邪而使腎氣之厥逆也

帝曰願卒聞之岐伯曰巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上從之從之則厥也帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之以湯

註　太陽之氣主表風爲陽邪傷人陽氣兩陽相搏則爲病熱少陰與太陽相爲表裏陽熱在上則陰氣從之而爲厥逆矣刺表以瀉風熱之陽邪刺裏以下少陰之逆氣飲之以湯以助水津之汗

繆刺論

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥鬄其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

註　百脉皆始於足少陰腎生於足陽明胃輸於足太陰脾主於手少陰心朝於手太陰肺是以五脉

之氣皆會於耳中絡左角者肝主血而居左其氣直上於巔頂也五絡俱竭則榮衛不行故令人身脈振振而形無知也名曰尸厥蓋人所以生動者藉氣呴而血濡血氣不行則其形若尸矣刺足大指足太陰之隱白刺足心足少陰之湧泉刺足中指足陽明之厲兌刺手大指手太陰之少商刺手心主手少陰之神門使血氣疎通其厥立已如不已用竹管吹其兩耳以通宗脈之氣鬄其左角之髮以通榮血飲以美酒以通衛氣

氣交變大論

歲水太過寒氣流行邪害心火民病陰厥

註 諸丙之歲水運太過陰氣寒甚故厥逆於上

五常政大論

金不及曰從革從革之紀是謂折收其氣揚其用躁切其動鏗禁瞀厥

註 金運不及則收政迺折瞀肺是動病也厥氣上逆也

少陽司天厥逆

註　土位中央中鬲不通則上下厥逆也

太陰司天濕氣下臨腎氣上從厥逆

註　陽氣不起則手足爲之厥逆

六元正紀大論

水鬱之發民善厥逆

註　厥逆者陽氣下藏中氣塞也

至眞要大論

明陽在泉主勝則寒厥於腸上衝胷中甚則喘不能久立

註　寒厥於腸上衝胷中甚則喘者寒氣逆乘陽明之大腸而上及於胷中之肺臟也

太陽之勝寒厥入胃則內生心痛

註　厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛

太陽之復厥氣上行

註　此鬱寒之氣上行而復歲半以前之氣也

諸厥固泄皆屬於下

註　在上之陽氣下逆則爲厥冷

少陰在泉主勝則厥氣上行心痛

註厥氣上行者乃寒水之主氣上乘於在泉之君火也

方盛衰論

雷公請問氣之多少何者爲逆何者爲從黃帝答曰陽從左陰從右老從上少從下是以春夏歸陽爲生歸秋冬爲死反之則歸秋冬爲生是以氣多少逆皆爲厥問曰有餘者厥耶答曰一上不下寒厥到膝少者秋冬死老者秋冬生氣上不下頭痛巔疾求陽不得求陰不審五部隔無徵若居曠野若伏空室綿綿乎屬不滿日是以少氣之厥令人妄夢其極至迷

註陽從左者謂春夏之氣從左而行於右陰從右者謂秋冬之氣從右而行於左老者之氣從上而下猶秋氣之從上而方衰於下少者之氣從下而上猶春氣之從下而方盛於上是以春夏之氣歸於陽之從左而右氣之順也故爲生氣歸於秋冬之從右而左氣之逆也故爲死氣反之謂秋冬之氣歸於陰之從右而左爲生歸於春夏之從左而

右爲逆是以氣之無論多少逆者皆爲厥也一謂一陰之氣一上不下寒厥到膝者陰氣上行秋冬之令也故老者爲順少者爲逆氣謂一陽之氣氣上不下頭痛巔疾者陽氣自下而直上於巔頂也不明天地人參合之道求陽而不得其氣求陰而不能審其徵則隔絕而無徵驗矣少氣之厥氣虛而上逆也

解精微論

厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目眥盲

註腎精不上貫於目故目無見幷者諸陽合并於上諸陰合并於下也心乃陽中之太陽而爲五臟之專精故陽并於上不得陰氣以和之則火獨光於上腎爲水臟受藏五臟之精陰脈集於足下而聚於足心故陰幷於下不得陽氣以和之則足寒足寒則臟寒生滿病也一水謂太陽之水五火謂五臟之陽氣是以陰陽厥逆則目眥盲眥者謂太

陽之兩睛明以應天之日月也

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

心脈微濇爲維厥

註　維四維也心爲陽中之太陽故手足厥冷也

腎脈微急爲沉厥奔豚

註　腎爲生氣之原正氣虛寒則爲沉厥氣虛反逆故爲奔豚

本神篇

腎氣虛則厥

註　腎爲生氣之原故虛則厥

經脈篇

肺手太陰之脈是動甚則交兩手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者臑臂內前廉痛厥

註　交兩手而瞀乃腎氣厥逆所致臑臂痛厥經脈所循之部分爲病也

心手少陰之脈是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者臑臂內後廉痛厥

註　臑臂掌中心脈所循之部分

膀胱足太陽之脈是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結踹如裂是爲踝厥

註　此病在太陽之氣也

腎足少陰之脈是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目䀮䀮而無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者痿厥

註　少陰之上君火主之少陰是動爲病則上下之氣不交故饑不欲食心如懸若饑狀氣不足於下則善恐不足於上心惕惕如人將捕之少陰屬腎腎上連肺而腎爲生氣之原面如漆柴者少陰之氣不升也欬唾則有血喝喝而喘者少陰之生氣不上交於肺而肺氣上逆也坐而欲起者躁動之象少陰之氣厥於下而欲上也骨之精爲瞳子目䀮䀮無所見者精氣不升也此少陰腎臟之生氣厥逆於下而爲此諸病故爲骨厥也

膽足少陽之脈是動則病口苦善太息心脅痛不能

轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥

註　是動則病口苦善太息心脅痛不能轉側少陽之氣不升也少陽主初陽之生氣故膽氣升十一臟腑之氣皆升少陽之動氣爲病則厥逆而不升故甚則面有微塵體無膏澤少陽相火主氣足下反熱者火逆於下也是爲陽氣厥逆之所致也

五亂篇

清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胷中是謂大悗故氣亂於臂脛則爲四厥亂於頭則爲厥逆頭重眩仆

註　清濁相干者循脈之營衛與行陰行陽之營衛相干是以亂於胷及亂於臂胻頭而爲厥逆諸病

逆順肥瘦篇

黃帝曰少陰之脈獨下行何也岐伯曰不然夫衝脈者五臟六腑之海也五臟六腑皆禀焉其上者出於頏顙滲諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街循陰股內廉入膕中伏行胻骨內下至內踝之後屬而別其下者並於少陰之經滲三陰其前者伏行

出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣

註人之血氣充膚熱肉澹滲皮毛而肌肉充滿若怯然少氣則水道不行而形氣消索矣夫五臟六腑之氣皆稟於衝脉而行其上者出於頏顙滲諸陽灌諸陰其下者注少陰之大絡下出於氣街此五臟六腑之血氣皆從衝脉而滲灌於脉外皮膚之間應水隨氣而運行於天表也夫少陰主先天之水火水火者精氣也衝脉並少陰之經滲三陰循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉是少陰之精氣又從衝脉而運行出入於經脉皮膚之外者也故別絡結則少陰之氣不能行於跗上而跗上不動矣不動者乃少陰之氣厥於內故厥則寒矣

五色篇

雷公曰小子聞風者百病之始也厥逆者寒濕之起也別之奈何黃帝曰常候闕中薄澤爲風冲濁爲痺在地爲厥此其常也各以其色言其病

註地地閣也風乃天氣故常候於闕庭寒濕者地

氣故候在地部風乃陽邪故其色薄澤寒濕者陰邪故其色冲濁

衞氣篇

下虛則厥

註　下虛者虛之在本也

百病始生篇

積之始生得寒乃生厥乃成積也

註　積之始生得寒而生清濕之邪厥逆於下而成積也

厥氣生足悗悗生脛寒脛寒則血脈凝濇

註　邪氣厥逆於下則足脛悗而不得疎利矣悗則生寒寒則血脈凝濇

刺節眞邪篇

厥在於足宗氣不下脈中之血凝而畱止弗之火調弗能取之

註　厥在足者少陰之氣厥也寒氣厥逆於下是以宗氣不能下行脈中之血凝而留止弗之火調弗能通之謂下焦之精氣乃陰陽水火得火熱而後

能溫其水寒

扁鵲難經

厥逆

病若譫言妄語身當有熱脈當洪大而反手足厥逆脈沉細而微者死也

漢張機金匱要略

厥逆

臟腑篇曰問曰寸脈沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入臟卽死入腑卽愈此爲卒厥何謂也師曰脣口青身冷爲入臟卽死如身和汗自出爲入腑卽愈

腹滿篇曰腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒緊則不欲食邪正相搏卽爲寒疝寒疝遶臍痛若發則白津出手足厥冷其脈沉緊者大烏頭煎主之

水氣篇曰寸口脈遲而濇遲則爲寒濇爲血不足趺陽脈微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衞不利榮衞不利則腹滿脅鳴相逐氣轉膀胱榮衞俱勞陽氣不通卽身冷陰氣不

通卽骨疼陽前通則惡寒陰前通則痹不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

嘔吐篇曰乾嘔噦若手足厥者橘皮湯主之

下利篇曰夫六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者利不禁下甚者手足不仁

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負趺陽者爲順也

下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生脈不還者死

華佗中藏經

陽厥論

驟風暴熱雲物飛颺晨晦暮晴夜炎晝冷應寒不寒當雨不雨水竭土壞時歲大旱草木枯悴江河乏涸此天地之陽厥也暴壅塞忽喘促四肢不收二腑不利耳聾目盲咽乾口焦喉舌生瘡鼻流清涕頰赤心

煩頭昏腦重雙睛似火一身如燒素不能者乍能素不欲者乍欲登高歌笑棄衣奔走狂言妄語不辨親疎發躁無度飲水不休胷膈膨脹腹脅滿悶背疽肉爛煩潰消中食不入胃水不穿腸驟腫暴滿叫呼昏冒不省人事疼痛不知去處此人之陽厥也陽厥之脉舉按有力者生絕者死

陰厥論

飛霜走雹朝昏暮靄雲雨飄颻風露寒冷當熱不熱未寒而寒時氣霖霪泉生田野山摧地裂土壤河溢月晦日昏此天地之陰厥也暴啞卒寒一身拘急四肢拳攣唇青面黑目直口噤心腹滿痛頭頷搖鼓腰脚沉重語言蹇澀上吐下瀉左右不仁大小便滑吞吐酸淥悲憂慘戚喜怒無常者此人之陰厥也陰厥之脉舉指弱按指大者生舉按俱絕者死一身悉冷額汗自出者亦死陰厥之病過三日勿治

論陰陽否格

陽氣上而不下曰否陰氣下而不上亦曰否陽氣下而不上曰格陰氣上而不下亦曰格否格者謂陰陽

不相從也陽奔於上則燔脾肺生其疸也其色黃赤皆起於陽極也陰走於下則冰腎肝生其厥也其色青黑皆發於陰極也疸爲黃疸也厥爲寒厥也由陰陽否格不通而生焉陽燔則治以水陰厥則助以火乃陰陽相濟之道耳

當灸不灸成厥逆

夫病有宜灸者蓋灸則起陰通陽當灸而不灸則使人冷氣重凝陰毒內聚厥氣上衝分墜不散以致消滅

死脈

病四逆者其脈浮大而短者死

病厥逆呼之不應脈絕者死

病脹滿四逆脈長者死

病厥逆汗出脈虛而緩者死

晉王叔和脈經

脈法

肝膽俱虛右手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言

時時自驚

督之爲病脊彊而厥

入裏乃陽乘陰也其證身涼四肢厥惡熱是外陰而內陽也但寒不熱不渴者是內外皆陰也仲景云厥深熱亦深厥微熱亦微口傷爛赤因發汗得之

宋朱肱活人書

論陰陽寒熱

重陽必陰重陰必陽寒暑之變也假令手足逆冷而大便祕小便赤或大便黑色其脉沉而滑者皆陽證也輕者白虎湯甚者承氣湯

傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速用大承氣加分劑下之汗出立差仲景所謂厥應下之者此也

熱厥與陰厥自不同熱厥者微厥即發熱若陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉而細大小便滑泄

手足逆冷此名厥也厥者逆也陰陽不相順接手足逆冷也陽氣衰陰氣盛陰勝於陽故陽脉爲之逆不通於手足所以逆冷也傷寒熱多厥少者其病當愈

厥多熱少者其病爲進然有冷厥有熱厥當仔細辯認

冷厥者初得病日便四肢逆冷脉沉微而不數足多攣臥而惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調或小便數外證多惺惺而靜脉雖沉實按之遲而弱者知其冷厥也四逆湯理中湯通脉四逆湯當歸四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯白通加猪膽汁湯皆可選用也

熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽證至二三日乃至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深則方能發厥須在二三日後也若微厥即發熱者熱微故也其脉雖沉伏按之而滑爲裏有熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便祕小便赤外證多昏憒者知其熱厥也白虎承氣隨證用之仲景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤又有下證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑

是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脉沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便用承氣湯下之不可拘忌也

諸手足逆冷皆屬厥陰不可下不可汗然有須下有須汗證者謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必暖非正厥逆也當消息之

若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脉或一手無脉者必是有正汗也多用綿衣包手足令溫暖急服五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之晬時必大汗而解矣

邪氣結在胷中亦能令人手足厥但認脉乍結者是也臟厥爲難治

問仲景少陰四逆湯又有四逆散何也答曰大抵少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲景謂之晩發熱用麻黃細辛之類以發汗終不成少陰證便不得發汗耶今少陰病四肢冷亦有內熱者仲景用四逆散是也四逆湯用附子乾薑而四逆散主四逆而其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄

利下重已上病皆熱證耳

金劉完素六書

厥逆

氣逆衝上火氣炎上故也

屈伸不便厥逆禁固陰水主於清淨故病寒則四肢逆冷而禁止堅固舒卷不便利故冬脉沉短以敦病之象也或病寒尚微而未至於厥逆者不可反以爲熱或熱甚而成陽厥者不可反以爲寒然陰厥者原病脉候皆爲陰證身凉不渴脉遲細而微全無陽證其陽厥者原病脉證皆爲陽證熱極而反厥時復反溫雖厥而亦煩渴譫妄身熱而脉數若陽厥極深而至於身冷反見陰脉微欲絕者止爲熱極而欲死俗皆妄謂變成陰病且曰陰陽寒熱反變而不可測仍取陽主於生陰主於死之說急以火艾熱藥溫其表裏助其陽氣十無一生俗因以爲必死之證致使舉世大懼陰證而疑似陰者急以溫之唯恐救之不及而反招暴禍豈知熱病之將死者鮮有逃於此證也殊不知一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾陰陽以

平爲和而偏爲疾萬物皆以負陰抱陽而生故孤陰不長獨陽不成陽氣極盛而陰氣極衰則陽氣怫鬱陰陽偏傾而不能宣行則陽氣畜聚於內而不能營運於四支則手足厥冷謂之陽厥故仲景曰熱深則厥亦深熱微則厥亦微又曰厥當下之下後厥愈爲裏熱已除故病熱甚則厥又以失下則熱甚而反爲陰證非反變爲寒病爾夫病之傳變者謂中外上下經絡臟腑部分而傳變爲病之邪氣非寒熱陰陽之反變也法曰陰陽平則和偏則病假令陽實陰虛爲病熱若果變而爲寒則比之熱氣退去寒欲生時陰陽平而當愈豈能反變之爲寒病歟雖瘧論言陰勝則寒陽勝則熱者謂裏氣與邪熱幷之於表則爲陽勝而發熱表氣與邪熱井之於裏則爲陰勝而寒慄由表氣虛而裏氣熱亢則害承乃制故反戰慄大抵本熱非寒病也或傷寒病寒熱往來者由邪熱在表而淺邪惡其正故惡寒邪熱在裏而深邪甚無畏物惡其極故不惡寒而反惡熱表裏進退不已故爲寒熱往來此氣不井於表裏故異於瘧而寒熱微皆熱

傳於表裏之陰陽而非病氣寒熱之陰陽反變也或病熱而寒攻過極陽氣損虛陰氣暴甚而反爲寒者因藥過度而致之非自然寒熱之反變也夫六氣變亂而爲病者乃相兼而同爲病風熱燥同多兼化也寒濕性同多兼化也性異而兼化者鮮矣或制甚而兼化者乃虛象如火熱甚而水化制之反爲戰慄者大抵熱甚而非寒氣故渴爲熱在裏而寒戰反渴引飲也又如以火煉金熱極而反化爲水雖化爲水止爲熱極而爲金汁也或燥熱太甚而腸胃鬱結飲冷過多而痞隔不通留飲不能傳化浸潤而寒極畜於胃中燥熱太甚鬱於胷腹而䐜脹滿煩渴不已反令胃膈冷痛嘔噦漿水而水漿難下欲止其渴而強飲於水則滿痛嘔噦轉甚而渴亦不已不強飲之則煩渴不可以忍令人煩冤悶絕但欲死若誤治之卽死不治亦爲難已每用大承氣湯熱服下咽而腸胃鬱結痞膈卽得宣通而留飲傳化浸潤則寒濕散去腸胃之外得其潤澤熱退而煩渴滿痛嘔噦遂止須臾得利而已矣然而病諸氣者必有所因病本熱而變

爲寒者實亦鮮矣大凡陽實則脉當實數而身熱煩渴熱甚則爲陽厥至極則身冷脉微而似陰證以至脉絕而死故陽病見陰脉者死謂其脉近乎絕也病雖熱甚而不已則必須厥冷而脉微以至身冷脉絕而死或病本熱勢太甚或按法治之不已者或失其寒藥調治或因失下或誤服熱藥或誤熨烙熏灸以使熱極而爲陽厥者以承氣湯之類寒藥下之熱退而寒得宣通則厥愈矣愼不可用銀粉巴豆性熱大毒丸藥下之而反耗陰氣而衰竭津液使燥熱轉甚而爲懊憹喘滿結胷腹痛下利不止血溢血泄或爲淋閟發黃驚狂譫妄諸熱變證不可勝舉由此爲破癥瘕堅積之藥非下熱養陰之藥也古人謂治傷寒熱病若用銀粉巴豆之類丸藥下之則如刀劍刃人也及嘗有陽厥而尚不下以至身冷脉微而似陰證反誤以熱藥投之病勢轉甚身冷脉微而欲絕唯心胷微煖昏冒不知人事而不能言主病者或欲以煖藥急救其陽恐陽氣絕而死也不知此因熱極失下反又溫補而致之若又以熱藥助其陽氣則陰氣暴

絕陽氣亦竭而死陽氣何由生也或曰何不急下之答曰此陽勝伐陰而陰欲先絕則陽亦將竭於此時而下之則陰陽俱絕而立死不救亦死但及於期則緩而救之則當以寒藥養陰退陽但不令轉瀉若得陰氣漸生則可救也宜用涼膈一服則陰氣可以漸生何以知之蓋以候其心胷溫煖漸多而脈漸生爾終日三服其脈主至沉數而實身表復煖而唯厥逆與水善飲有時應人之問譫妄而舌強難言方以調胃承氣湯下之或獲汗而愈所謂寒藥反能生脈而令身煖者由陽實陰虛欲至於死身冷脈微今以寒藥養陰退陽而復不至於死故也大凡治病必先明其標本標爲上首本乃根元故經言先病爲本後病爲標標本相傳先以治其急者又言六氣爲本三陰三陽爲標故病氣爲本受病經絡臟腑爲標夫標本微甚治之逆從不可不通也故經言知逆與從正行無問明知標本萬舉萬當不知標本是謂妄行陰陽之逆從標本之謂道也斯其理歟

一陽一陰病發驚駭背痛噫欠名風厥蓋胃土肝木

爲木尅土風勝濕不制腎水故令上逆遠志散主之

成無己明理論

厥逆

傷寒四逆何以明之四逆者四肢逆而不溫者是也積凉成寒積溫成熱非一朝一夕之故其所由來者漸矣傷寒始者邪在皮膚當太陽陽明受邪之時則一身手足盡熱當少陰太陰受邪之時則手足自溫是表邪漸緩而欲傳裏也經曰傷寒四五日手足溫而渴者小柴胡湯主之是太陽之受邪傳之少陽也傷寒脉浮手足自溫者是爲繫在太陰是少陽邪傳於太陰也是知邪氣在半表半裏則手足不熱而自溫也至於邪傳少陰爲裏證已深雖未至厥而手足又加之不溫是四逆也若至厥陰則手足厥冷矣經曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆是寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之證也又有四逆諸湯亦治四逆手足寒方用乾薑附子熱藥者厥有旨哉若手足自熱而至

溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之若始得之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之常須識此勿令誤也四逆與厥相近而非也經曰諸四逆厥者不可下是四逆與厥有異也吐利煩躁見四逆者死是惡見其四逆也診視之間熟詳究之

傷寒厥者何以明之厥者冷也甚於四逆也經曰厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也謂陽氣內陷熱氣逆伏而手足爲之冷也經曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微是知內陷者手足爲厥矣少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭亦是言發動其熱也先熱而後厥者熱伏於內也先厥而後熱者陰退而陽氣得復也若始得之便厥者則是陽氣不足而陰氣勝也大抵厥逆爲陰所主寒者多矣而又有進退之別經曰病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈發熱四日厥反三日復厥四日厥少熱

多其病自愈厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也病至厥陰傳經盡也當是之時陽氣勝陰厥少熱多其病則愈若或陰氣反勝陽不得復厥多熱少其病則逆厥爲陰氣至熱爲陽氣復也至於下利則曰先厥後發熱而利必自止見厥復利厥者復爲熱爲陽氣得復而利必自止熱者便爲厥是陰氣還勝也故復下利矣諸陽受氣於胷中邪氣客於胷中鬱鬱留結則陽氣不得敷布而手足爲之厥經曰手足厥冷脉乍緊邪結在胷中心中滿而煩饑不能食病在胷中當吐之者是矣厥爲陰之盛也若更加之惡寒而踡者陰氣盛極難制經曰少陰病惡寒身踡而利手足厥冷者不治是厥冷之逆者神丹其能生乎

元張從政儒門事親

論厥逆近世差元說

厥之爲狀手足及膝下或寒或熱也舉世傳脚氣乃寒濕之病豈知內經中無脚氣之說王太僕亦云本無脚氣後世廣飾方論而立此名古方謂厥者卽今

所謂脚氣也然厥當分二種次分五臟所謂二種者有寒厥又有熱厥陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥爲手足熱也寒厥爲手足寒也陽經起於足指之表陰經起於足心之下陽氣勝足下熱陰氣勝足下寒又曰陽主外而厥在內陰主內而厥在外若此者陰陽之氣逆而上行故也夫春夏則陽多陰少秋冬則陰壯陽衰人或恃賴壯勇縱情嗜慾於秋冬之時則陽奪於內精氣下溢邪氣上行陽氣既衰眞精又竭陽不榮養陰氣獨行故手足寒發爲寒厥也人或醉飽入房氣聚於脾胃主行津液陰氣虛陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則四肢不榮酒氣與穀氣相薄則內熱而溺赤氣壯而慓悍腎氣既衰陽氣獨勝故手足熱發而爲熱厥也厥亦有令人腹暴滿不知人者或一二日稍知人者或卒然悶亂無知覺者皆因邪氣亂陽氣逆是少陰腎脉不至也腎氣微少精血奔逸使氣促迫上入胷膈宗氣反結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相助令身不仁又五絡皆會於耳中五絡俱絕則令人身脉

皆動而形體皆無所知其狀如尸故曰尸厥有涎如曳鋸聲在喉咽中爲痰厥手足搐搦者爲風厥因醉而得之爲酒厥暴怒而得之爲氣厥骨痛爪枯爲骨厥兩足指攣急屈伸不得爪甲枯結爲臂厥身强直如椽者爲肝厥喘而惋者狂走攀登爲陽明厥皆氣逆之所爲也

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十三卷目錄

醫部彙考二百九十三

厥門二

李杲十書（傷寒四逆厥辨）

朱震亨心法（厥逆）

羅天益衛生寶鑑（厥逆）

李梴醫學入門（總論　蚘厥　陰厥　陽厥　外感寒暑　內傷七情　臟厥　酒色所致　尸厥　治法）

李中梓醫宗必讀（傷濕 陰證 陰毒 陰證似陽）

王肯堂證治準繩（總論）

趙獻可醫貫（血厥 諸厥）

張介賓景岳全書（論經義 論證 論治 陰陽二厥 蚘厥）

陳士鐸石室祕錄（厥）

藝術典第三百十三卷

醫部彙考二百九十三

厥門二

元李杲十書

傷寒四逆厥辨

成無己註傷寒論有云四逆者四肢不溫也厥者手足冷也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不溫及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆經曰少陰病四逆其人

或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之證也四逆與厥相近而非經曰諸四逆厥者不可下是四逆與厥有異也吁斯言也所謂彌近理而大亂眞者歟竊嘗考之仲景言四逆與厥者非一或曰四逆或曰厥或曰厥逆或曰厥冷或曰厥寒或曰手足逆冷或曰手足厥逆或曰手足厥冷或曰手足厥逆冷細詳其義俱是言寒冷耳故厥逆二字每每互言未嘗分逆爲不溫厥爲冷也然四肢與手足却有所分其以四字加於逆字之上者是通指手足臂脛以上言也其以手足二字加於厥逆厥冷等之上及無手足二字者是獨指手足言也既曰不溫卽爲冷矣尚何異乎仲景所謂諸四逆厥者不可下蓋以四逆爲四肢通冷厥爲手足獨冷而臂與脛以上不冷耳不謂逆厥有不溫與冷之別也故又曰厥者手足逆冷是也以逆冷二字釋厥字足見逆卽厥厥卽逆也故字書曰厥者逆也雖然逆厥雖俱爲寒冷而却有陰陽之殊

焉熱極而成逆厥者陽極似陰也寒極而成逆厥者獨陰無陽也陽極似陰固用寒藥獨陰無陽固用熱藥仲景以四逆散寒藥治四逆一條此陽極似陰之四逆也其無四逆湯熱藥治四逆之條者安知其非本有而失之乎且四逆湯之名由四肢之冷而立也今以四逆湯治手足厥冷豈非逆厥之不異乎既以四逆爲四肢不溫厥爲手足獨冷何故不名治厥之藥爲四厥湯乎成氏於四逆散治四逆條下謂四逆爲熱邪所爲及於明理論謂四逆非虛寒之證矣至於少陰病死證二條下却謂四逆爲寒甚若此者得不自悖其說乎是知四逆亦猶厥之有寒有熱固不可謂四逆專爲邪熱所作也但四肢通冷比之手足獨冷則有間爾故仲景曰少陰病吐利躁煩四逆者死又曰少陰病四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之此三條者二爲死一爲可治雖通由諸證兼見而然然死者以四逆言可治者以厥冷言則亦可見四逆與手足厥冷之有輕重淺深矣夫四肢通

冷其病爲重手足獨冷其病爲輕雖婦人小子亦能知之成氏乃謂厥甚於逆何邪若能知四逆厥之所以異者在於獨指手足言兼指臂脛以上言則不勞創爲不溫與冷之曲說而自然貫通矣

朱震亨心法

厥逆

厥逆乃手足因氣血逆而冷也因氣虛爲主有因血虛氣虛脈細血虛脈大熱厥脈數外感脈沉實有痰脈弦因痰者用白朮竹瀝氣虛四君子血虛四物熱厥用承氣外感用雙解散加薑汁酒有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰於下則寒者又有手足麻者屬氣虛手足木者有濕痰死血十指麻木是胃中有濕痰死血

厥者甚也短也逆也手足逆冷也其證不一散之方書者甚多今姑撮大概且如寒熱厥逆者則爲陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰證而用熱藥治之精魂絕而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脈沉

四肢逆足踡臥脣口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩仍速灸關元百壯

尸厥飛尸卒厥卽中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋運倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊弔唁入廟登冢多有此病以蘇合丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣平胃散

痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜薑附湯以生附代熟附

蚘厥者乃胃寒所生經曰蚘者長蟲也胃中冷卽吐蚘蟲宜理中湯加炒川椒五粒檳榔半錢吞烏梅丸效蚘見椒則頭伏故也

氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以八味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰湯服之

羅天益衛生寶鑑

厥逆

陽厥手足雖冷有時或溫手足心必煖脉雖沉伏按

之則滑其證或畏熱或渴欲飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便祕小便赤此名熱厥古人所謂陽極發厥也治用白虎湯大承氣湯雙解散涼膈散四方詳證輕重選而用之

陰厥四肢冷身不熱惡心踡足臥或引衣被自覆不渴或下利或大便如常脉沉微不數或雖沉實按之則遲弱此名冷厥治用通脉四逆湯或當歸四逆湯或白通加猪膽汁湯

若病人寒熱而厥面色不澤冒昧兩手忽無脉或一手無脉此是將有好汗宜用麻黃附子甘草湯以助其汗汗出則愈不用藥助亦好汗必自出

雜病厥冷手足冷或身微熱脉皆沉細微弱而煩躁者治用四逆湯加葱白或白通加猪膽汁湯或用人參三白湯加竹茹或無憂散四方選而用之手足冷脉細微而譫語治用四逆湯身涼手足或冷而鄭聲者治用四逆湯身冷手足或冷而吃逆者治用四逆湯加人參嘔而身微熱或厥或煩小便利脉弱者治用四逆湯吐而手足寒或煩躁治用四逆湯

明李梴醫學入門

總論

內經氣厥篇厥者氣逆也凡移寒移熱或伏熱深而振慄或虛寒盛而發躁皆謂之厥不但手足厥冷而已宗筋陰器也厥陰所主脾胃脈皆輔近宗筋寒厥則陰縮而四肢冷熱厥則津乾不榮四肢溺赤而手足熱是六經之厥皆統於肝與脾胃也

傷寒邪在三陽則四肢熱半表半裏及傳太陰則邪漸入內則四肢溫傳至少陰厥陰則邪入深而陷伏於內則四肢厥冷然先由熱而後厥者傳經熱厥也輕則四逆散白虎湯竹葉石膏湯重則大柴胡承氣下之若邪乍結胷中心煩不食而厥者瓜蔕散吐之百問云熱厥與冷厥不同熱厥者微厥却發熱若冷厥則不發熱四肢逆冷脈沉細大小便滑泄惡寒指甲青色又有失下血不通四肢便厥醫者不識疑是陰厥復進四逆之類禍如反掌大抵熱厥脈沉伏而滑頭上有汗手掌溫指梢亦溫便宜下此仲景之妙旨也

蚘厥

蚘即蛔也謂之厥者病屬厥陰又手足厥逆義也其人素有食蛔或因病過饑蟲逆上咽膈而出妄發其汗以致胃冷長蟲上攻咽膈胃氣困乏雖饑不能食食即吐蛔者蟲聞食臭氣而出也外證乍靜乍煩者蟲或上或止也又或下利臟寒則蛔亦上入於膈然上焦熱而中下焦寒故雖煩熱消渴便鞕不可遽投涼藥當先以烏梅丸理中湯安蛔然後隨證調之或煩熱不退小柴胡湯或熱甚昏憒腹脹便閉或蛔不得安從大便而出者大柴胡湯

陰厥

陰厥者未厥前無頭痛無身熱吐利不渴靜踡等證乃陰邪獨勝而然手足盡冷乃厥陰所主陰陽之氣不相順接而然非比傳經四逆之漸冷也太陰厥手足指頭微冷者理中湯少陰厥脛寒足冷甚則手至臂足至膝者四逆湯通脈四逆湯厥陰厥一身盡冷者當歸四逆湯厥逆煩躁者不治百問云冷厥初得病四肢逆冷脈沉細臥多攣足或惡寒指甲青色或

自引衣覆身或下利清穀或清便自調小便數外證惺惺此冷厥也四逆湯三味參萸湯選用凡病熱多厥少者易愈厥多熱少者難已又有血厥四物湯氣厥四君子湯暑厥白虎湯水厥心下怔忡茯苓桂甘湯尸厥卽中惡冒犯不正之氣而然木香勻氣散合平胃散或追魂湯蚘厥見前

陽厥

陽厥者未厥前有頭疼有身熱潮汗閉澀滿渴譫狂證具初邪深入陷伏於內而後發厥微厥半日間却又發熱熱氣下行則腹痛下利後重稠粘黃赤必見膿血若不便血熱氣上行則必喉痹又熱厥傳經七日不退者其後必便膿血若陰厥腹痛下利清白不渴爲陰厥尤的詳前熱厥

外感寒暑

寒泣血發厥脉沉微者理中湯四逆湯暑耗氣發厥脉虛者白虎湯或香薷散加羌活夏月勞役犯房以致陽氣煩擾目盲耳閉內經謂之煎厥言熱氣煎逼損腎與膀胱而成也宜四君子湯加遠志防風赤芍

麥門冬陳皮凡外感發熱者宜解散藥中加薑汁

內傷七情

內因喜怒傷氣傷志氣逆而不下行則血積於心胷內經謂之薄厥言陰陽相薄氣血奔并而成古法暴厥氣逆身冷者蘇合香丸八味順氣散怒氣逆甚嘔血鼽衄發厥者四物湯去地黃加赤茯苓人參桔梗陳皮麥門冬檳榔薑煎服或六鬱湯氣實多怒忽大叫發厥者乃痰閉於上火起於下而上衝用香附五錢川芎七錢生甘草三錢童便薑汁煎服又青黛人中白香附爲丸服稍愈用導痰湯加黃連香附呑當歸龍薈丸因勞役飲水被驚發厥者六君子湯加苓連竹瀝薑汁

內傷痰火發厥脉弦滑者二陳湯加竹瀝挾寒加生附子挾火加芩連山梔竹瀝肥人加人參薑汁凡厥證爲顚爲眴仆爲妄見或腹脹二便不利或嘔或心痛皆痰火鬱氣病也

臟厥

發熱七八日脉微膚冷而躁或吐或瀉無時暫安者

此乃厥陰眞臟氣盡故曰臟厥仲景無治法四逆湯冷飲救之又少陰厥而吐利發躁者亦不治三味參萸湯救之

酒色所致

熱厥因醉飽入房濕熱鬱於脾土不能滲榮四肢陽氣獨盛故手足心熱宜補中益氣湯升陽散火湯火鬱湯

寒厥因多慾奪精元陽大有所損不能滲榮經絡陰氣獨在故手足皆寒宜十全大補湯加附子或當歸四逆湯

尋常氣虛發厥者四君子湯血虛發厥者四物湯有火加知母黃蘗虛寒加附子但厥冷多以不勝乘其所勝如腎移寒於脾則爲寒厥心移熱於腎則爲熱厥六經皆然抑論陽證煩渴譫語身熱陰證不渴靜倦身凉與傷寒陽厥陰厥大同但雜病多因酒色七情痰火所致外感者少故經曰陽衰於上則爲寒厥陰衰於下則爲熱厥陽極似陰陰極似陽與傷寒因雖不同而病狀變化亦相似也

尸厥

凡有弔死問疾或入廟登塚卒中外邪與臟氣相忤氣遏不行經絡脉伏昏不知人忽手足逆冷頭面青黑牙關緊急昏運卒倒或錯言妄語決不可作風治先宜蘇合香丸灌之候醒以木香勻氣散合平胃散調之素虛者用焰硝五錢硫黃二錢爲末作三服用陳酒一盞煎覺焰硝起傾於盞內蓋著溫服如人行五里又進一服如無前藥用古參附湯入薑汁酒煎服外灸百會穴如菉豆大艾九壯氣海百壯身溫者生暴死者追魂湯灌之

治法

陰陽氣不相接則厥熱厥補陰寒厥補陽正經所謂壯水之主以鎮陽光益火之源以消陰翳也

凡卒厥未辨先以蘇合香丸灌醒痰壅口噤者瓜蒂散吐之或搐鼻亦可熱甚者大承氣湯雙解散下之

李中梓醫宗必讀

傷濕

傷濕者感受濕邪身重而痛自汗身不甚熱兩脛逆

冷四肢沉重胷腹滿悶

陰證

身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入二便不禁面如刀刮色青黑或喜向壁臥閉目不欲見人鼻氣自冷脣口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也

陰毒

陰毒者腎本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六脈沉微或尺衰寸盛五日可治六七日不可治

傷寒傳至三陰四肢厥冷腹痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄面如刀刮引衣踡臥脈見遲軟急宜溫之輕者理中湯重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名爲直中陰經亦以二湯主之

陰證似陽

陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脉浮微手足冷大便泄小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛於內眞陽失守也

厥者不可汗

厥逆者不可吐

厥逆脉沉細踡臥惡寒引衣自覆不飲水下利清穀四逆湯脉不至者通脉四逆湯脉遲弱理中湯手足指微冷謂之清理中湯厥而有熱黃芪人參建中湯厥而渴者白虎湯厥而悸先治其水茯苓甘草湯厥而惡熱不眠譫語白虎湯

諸陽受氣於胷邪客則陽氣不施故手足厥逆脉乍緊心滿而煩病在胷中仲景用瓜蔕散吐之

先發熱而後厥者手揚足擲煩躁飲水畏熱大便祕小便赤怫鬱大抵熱深厥亦深脉沉滑頭面有汗指甲溫皆伏熱也大小承氣湯

少陰吐利煩躁四逆者死

厥而下利當不能食反能食者名曰除中死

少陰病厥逆無脉與白通猪膽湯脉暴出者死

醉飽過度或感風寒或著氣惱以致塡塞胷中胃氣不行忽然厥逆昏迷口不能言肢不能舉若悞作中風中氣治之必死宜煎薑鹽湯探吐風寒者藿香正氣散氣滯者八味順氣散吐後别無他證只以蒼朮白朮陳皮厚朴甘草之類調之

王肯堂證治準繩

總論

樓全善曰王太僕云厥者氣上逆也世謬傳爲脚氣讀此始知其病上古稱之爲脚氣也經曰寒厥者手足寒也熱厥者手足熱也痿厥者痿病與厥雜合而足弱痿無力也痹厥者痹病與厥病雜合而脚氣頑痳腫痛也厥逆者卽前寒厥熱厥痿厥痹厥風厥等氣逆上而或嘔吐或迷悶或脹或氣急或小腹不仁或暴不知人世所謂脚氣衝心者是也今人又以忽然昏運不省人事爲厥或問世以手足冷者名爲厥何如曰非也在張仲景論傷寒則以手足熱者爲熱厥手足冷者爲寒厥冷者曰逆謂凡厥者陰陽不相順接便爲厥厥者手足逆冷也是故於陽虛而不接

者則溫之於陽陷而伏深不與陰相順者則下之於邪熱入而未深者則散其傳陰之熱隨其淺深輕重以爲治此乃爲傷寒之邪自表入裏至太陰手足厥者獨歸於二經也蓋自傷寒六經傳邪者論故厥陰是兩陰交盡之經熱傳至此乃極深之時故曰厥陰及內經厥論篇之義則不然蓋以足之三陽起於足五指之表三陰起於足五指之裏故陽氣勝則足下熱陰氣勝則從五指至膝上寒論得寒厥之由則謂前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也此人質壯秋冬陰氣盛陽氣衰之時也奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也論得熱厥之由則謂人必數醉若飽以入房氣聚於脾中腎氣有衰陽氣獨勝故手足爲之熱也觀其微旨殆將爲腎得先天身生之精元氣從此而充二臟相因脈道乃行運陰陽於內外各有所司陽主表其氣溫陰主裏其氣寒表裏之脈循環相接於四肢是故舉此脾胃傷於酒色致陰陽二厥之大者爲例著於篇

首續敘十二經之厥逆者止出本經氣逆病形皆不言手足之厥亦不及受病之由亦非一言而可足既設二例在前於此便可推而及之故不復言也雖然更以諸篇有關於厥者詳陳以明之如太陰陽明論曰陽明者五臟六腑皆稟氣於胃今脾病不能與胃行其津液於三陰胃亦不能行津液於三陽四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生即此而言脾胃有更實更虛互相盛衰衰者不行津液盛者獨行獨行必寒此脾胃之致厥一也又十二經皆稟氣於胃受胃之寒則經氣亦寒受胃之熱則經氣亦熱因之經脉不和比流行相接之際必有所遺寒熱於四末此脾胃之致厥二也更有脾胃是腎之勝臟脾胃有邪必乘於腎腎乃治下主厥者也腎受邪則厥此脾胃之致厥三也靈樞曰衝脉者與少陰大絡同出於腎爲五臟六腑之海故五臟六腑皆稟焉其上者滲諸陽灌諸精其下者並少陰之經滲三陰灌諸絡而溫肌肉其別絡結則胕上不動不動則厥厥則寒矣夫衝脉者是行腎臟治內之陽

者陽卽火也故陽動之以正則爲生物溫養之少火動之以妄則爲炎熾害物之壯火火壯則元眞之陽亦衰東垣謂火與元氣不兩立一勝則一負也如前厥論謂下氣上爭邪氣因從之而上者非别有其邪卽此火所亂陰陽之淫氣起而上逆者也故經以逆氣爲衝脉之病病機亦言諸逆衝上皆屬於火諸厥皆屬於下然而在腎之陰陽和則下治不和則下不治不治則寒熱之厥生矣此腎主厥之道也至於衝脉與胃皆以海名故十二經稟氣而致厥病悉同又若他篇論厥有謂因陽氣煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥者有二陽一陰發病爲風厥者有志不足則厥者有臟厥者有暴不知人之厥者有五絡俱竭而尸厥者凡此諸因上逆之邪皆相火與五火相扇而起起則變亂其經氣所以屬風寒燥濕熱之五氣相從而起五氣多相兼化風燥同熱化濕同寒化病甚則手足經從其所化之寒熱以爲厥蓋所逆之氣自下而上者非得之火炎之勢而能之乎如三焦足少陽衝任督皆自司相火在下者然而統屬乎腎何

則足少陰子與手少陰午對化者寄於其間如是則腎之元氣安於治下若相火妄動須當先救其腎分正治從治折其衝逆辨五氣所從之盛衰者補瀉之雖然亦有不因氣逆而遽冷者如原病式謂陰水主清淨故病寒則四肢冷是也乃謂陽虛而陰獨在故寒即仲景所謂先厥後熱因寒邪外中陽氣未能勝之故先厥也雖邪有內外之分然在溫之則一耳

趙獻可醫貫

血厥

有人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由已汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

諸厥

厥無常病陽厥補陰壯水之主陰厥補陽益火之源此陰厥陽厥與傷寒陰陽二厥不同傷寒陽厥用推

陳致新陰厥用附子理中冰炭殊塗死生反掌

陽氣衰乏者陰必湊之令人五指至膝上皆寒名曰寒厥是寒逆於下也宜六物附子湯主之陰退則陽進故陰氣衰於下則陽往湊之故令人足下熱也熱甚則循三陰而上逆謂之熱厥宜六味地黃丸主之肝藏血而主怒怒則火起於肝載血上行故令血菀於上是血氣亂於胷中相薄而厥逆也謂之薄厥宜蒲黃湯主之諸動屬陽故煩勞則擾乎陽而陽氣張大陽氣張大則勞火亢矣火炎則水乾故令精絕是以遷延辟積至於夏月內外皆熱水益虧而火益亢孤陽厥逆如煎如熬故曰煎厥宜人參固本丸主之五尸之氣暴淫於人亂人陰陽氣血上有絕陽之絡下有破陰之紐形氣相離不相順接故令暴厥如死名曰尸厥宜二十四味流氣飲蘇合香丸主之寒痰迷悶四肢逆冷名曰痰厥宜藿附湯主之胃寒卽吐蚘蟲名曰蚘厥宜烏梅散加理中湯主之氣爲人身之陽一有怫鬱則陽氣不能四達故令手足厥冷與中風相似但中風身溫中氣身冷耳名曰氣厥宜八

味順氣散主之

景岳全書

臣張介賓著

論經義

詳脈解篇之言厥者以其內奪謂奪其五內之精氣也瘖聲不能出也俳肢體偏廢也今人見此必皆謂之中風而不知由於內奪由於腎虛蓋聲出於肺而本乎腎形强在血而本乎精精氣之本皆主於腎故少陰不至則爲厥又調經論曰志不足則厥本神篇曰腎氣虛則厥觀此諸論則非風之義可知矣故凡治此者當以非風證治第三條等法主之

詳調經論謂氣并爲血虛血并爲氣虛此陰陽之偏敗也今其氣血并走於上則陰虛於下而神氣無根是卽陰陽相離之候故致厥脫而暴死復反者輕不反者甚此正時人所謂卒倒暴仆之中風亦卽痰火上壅之中風而不知實由於下虛也然上實者假實也其有甚者亦宜稍爲清理下虛者眞虛也若無實邪可據則速當峻補其下

觀陽明脈解篇之連經連臟本以厥逆爲言何其明

顯平正蓋連經者病在肌表故輕而生連臟者病在根本故重而死既知此爲厥逆則凡卒倒暴仆等證其非風也可知而河間諸公皆以中腑中臟爲言則是風非風始混亂而莫辨矣

詳大奇論解精微論二篇云脉至如喘者謂脉之急促如喘此血氣敗亂之候故致暴厥不言卽今人所謂中風不語之屬也云陽并於上陰并於下此卽上熱下寒水火不交之候故爲目無所見卽中風昏眩之屬也不語者責在肺腎昏眩者責在肝脾暫見者氣復則甦陰敗者最危之候俱當按法如前而救其本

詳終始篇論厥云暴淸卽暴冷也若裂若切謂其懊憹痛楚莫可名狀此卽所謂躁擾煩亂之中風也有火者多溫熱而脉洪大宜淸陰中之火有痰者多喘壅而脉滑實宜開上焦之痰無火無痰多寒凉而脉濇弱宜補其元氣凡證有若此而兼之昏亂不醒者此眞連臟之甚者也多不可治

詳生氣通天論云煎厥者卽熱厥之類其因煩勞而

病積於夏亦今云暑風之屬也若見抽搐痰涎卒倒者當卽以前暑風之法治之

薄厥者急迫相薄之謂因於大怒卽氣厥血厥之屬治法如後

詳通評虛實論云膏粱之疾卽酒色之傷脾腎之病也暴憂之病卽悲憂傷肺之屬也內氣暴薄卽鬱怒傷肝之屬也凡此皆內傷之病其有不從內而外中於風者則必留著經絡故爲消瘦痛痹之病是可見內傷外感之辨其不可混言有如此

詳逆順肥瘦篇衝脈之義則上自頭下自足後自背前自腹凡五臟六腑十二經脈無所不禀故稱爲五臟六腑十二經脈之海夫海爲百川之宗凡諸經發源之處卽皆有會合之義其於通身血氣盛衰皆歸乎此可知也然衝脈起於胞中卽其經絡之所亦卽其聚畜之所故稱爲血海亦稱爲命門此卽所謂根本之宅也若素縱情慾以致精氣之源傷敗於此則厥脫暴仆等病亦因於此不然則何以忽然仆倒而神形俱敗表裏俱殘全無知覺一至於此是豈一經

一臟之病之所致歟於此察之則實由衝脉崩敗必無疑矣故凡治此者欲舍根蔕而求其濟吾知其必無是理也

詳繆刺論尸厥一證乃外邪卒中之惡候凡四時不正之氣及山魔土煞五尸魘魅之屬皆是也犯之者忽然手足厥冷肌膚寒粟面目青黑精神不守或口噤妄言痰涎壅塞或頭旋運倒不省人事卽名飛尸卒厥宜用鍼法具見本經若用艾灸則無如秦承祖灸鬼法及華佗灸陽脫法爲妙凡用藥之法當知邪之所湊必因氣虛故在本經卽以左角之血餘用補五絡之脫竭其義可知若此危急之際非用參附回陽等藥何以挽回若果邪氣壅盛胷膈不清則不得不先爲開通然後調理宜不換金正氣散流氣飲葱薑湯蘇合丸之類酌而主之

詳方盛衰論言氣逆者卽爲厥也凡陰陽之氣陽從左而升陰從右而降故陽病者左爲甚陰病者右爲甚以升者不升降者不降而逆其升降之氣也又人之生氣必自下而升故老人之氣已衰於下而從上

者爲順少壯之氣先盛於下而從下者爲順若以老人而神衰於上其所終之氣可知少壯而形衰於下其所始之氣可知皆逆候也及其爲病而一上不下此其根本已虧故寒厥到膝少年以陽氣方盛而陽衰若此故秋冬當死老人以陽氣本衰而畏寒其常故秋冬無慮凡此厥逆之病謂其陽若非陽謂其陰若非陰五臟膈絕無徵可驗若不能終其日者蓋甚言其凋敝難爲也再若人之妄夢而有至迷亂昏絕者此以心腎不交而精神散越故爲厥逆有如此亦總屬少陰根本之病

詳厥論之寒厥熱厥雖皆以手足爲言而實以陰陽之敗亂爲言也故寒厥言奪於所用熱厥言因於數醉正以陰陽之氣無不起於手足故凡厥之將作則寒熱痲痹必先由手足而起及其甚也則變出百端或五臟六腑各有其證如此然則手足之厥特其形見之徵兆耳而見微知著自當因標而慮本也

詳仲景論厥逆頗與內經有異蓋以手足言之在內經則有寒厥熱厥之分在仲景則單以逆冷者爲厥

再以邪正言之在內經則論在元氣故其變出百端而在氣在血俱有危證在仲景則論在邪氣故單據手足而所畏者則在陰進而陽退也觀成無己曰厥爲陰之盛也義可知矣

論證

厥逆之證危證也蓋厥者盡也逆者亂也卽氣血敗亂之謂也故內經特重而詳言之如云卒厥暴厥者皆厥逆之總名也如云寒厥熱厥者分厥逆之陰陽也如云連經連藏者論厥逆之死生也再若諸經藏腑之辨亦旣詳矣又近世猶有氣厥血厥痰厥酒厥蛔厥等證亦無非本之經義觀內經諸論已極顯明奈何後人猶不能察凡遇此證則悉認之爲中風竟不知厥逆爲何證而通作風治害孰甚焉余深悲之故於前非風門悉力辨正至於治此之法卽當以前非風證治互相參用正所以治厥逆也其有未盡等證仍列於後條

論治

凡寒厥者必四肢清涼脉沉微不數或雖數而無力

或畏寒喜熱引衣自覆或下利淸穀形證多惺惺雖此類皆屬寒證然似熱非熱之證猶多故凡以手足見厥而脈證俱無實熱者悉寒厥之無疑也熱厥者必先多熱證脈沉滑而數畏熱喜冷揚手掉足或煩躁不寧大便祕赤形證多昏冒凡治此二者卽當以非風門治寒治熱之法主之至若傷寒厥證其陰其陽亦當以此法爲辨但傷寒之厥辨在邪氣故寒厥宜溫熱厥宜攻也內經之厥重在元氣故熱厥當補陰寒厥當補陽也二者之治不可不察

氣厥之證有二以氣虛氣實皆能厥也氣虛卒倒者必其形氣索然色淸白身微冷脈微弱此氣脫證也宜參芪歸朮地黃枸杞大補元煎之屬甚者以回陽飮獨參湯之類主之氣實而厥者其形氣憤然勃然脈沉弦而滑胷膈喘滿此氣逆證也大怒則形氣絕而血菀於上卽此類也治宜以排氣飮或四磨飮或八味順氣散蘇合香丸之類先順其氣然後隨其虛實而調理之若因怒傷氣逆氣旋去而眞氣受損者氣本不實也若素多憂鬱恐畏而氣怯氣陷者其虛

尤可知若以此類而用行氣開滯等劑則誤矣

血厥之證有二以血脫血逆皆能厥也血脫者如大崩大吐或產血盡脫則氣亦隨之而脫故致卒仆暴死宜先掐人中或燒醋炭以收其氣急用人參一二兩煎湯灌之但使氣不盡脫必漸甦矣然後因其寒熱徐爲調理此所謂血脫益氣也若不知此而但用血分等藥則幾微之氣忽而散失陰無所主無生機矣其或有用寒凉以止血者必致敗絕陽氣適足以速其死耳血逆者即經所云血之與氣並走於上之謂又曰大怒則形氣絕而血菀於上之類也夫血因氣逆必須先理其氣氣行則血無不行也宜通瘀煎或化肝煎之類主之俟血行氣舒然後隨證調理

凡一時痰涎壅塞氣閉昏憒藥食俱不能通必先宜或吐或開以治其標此不得不先救其急也但覺痰氣稍開便當治其病本如因火生痰者宜清之降之因風寒生痰者宜散之溫之因濕生痰者宜燥之利之因脾虛生痰者自宜補脾因腎虛生痰者自宜補腎此痰之不必治也但治其所以生痰而痰自清矣

然猶有不可治痰者恐愈攻愈虛而痰必愈甚也諸治痰法見前非風門治痰條中

酒厥之證即經所云熱厥之屬也又經云酒風者亦此類也凡縱飲無節之人多有此病方其血氣正盛力能勝之不知酒害之何有及其將衰則酒之侮人斯可畏耳酒病極多莫知所出其爲酒厥則全似中風輕者猶自知人重者卒而運倒忽然昏憒或躁煩或不語或痰涎如湧或氣喘發熱或欬嗽或吐血但察其大便乾燥脈實喜冷者此濕熱上壅之證宜以抽薪飲之類疾降其火火之甚者仍以梨漿飲菉豆飲之屬更迭進之以解其毒此證大忌辛燥等物務使濕熱漸退神氣稍復然後用補陰等劑以善其後其有大便不實或無火證而脈見緩弱者則不宜清火但以二陳湯六君子湯或金水六君煎之類主之若因酒傷陰以致脾腎兩虛而爲厥脫者非速救本源終無濟也凡患此者宜終身忌酒勿使沾脣可也若不知戒再犯必難爲矣

色厥之證有二一曰暴脫一曰動血也凡色厥之暴

脫者必以其人本虛偶因奇遇而悉力勉爲者有之或因相慕日久而縱竭情慾者亦有之故於事後則氣隨精去而暴脫不返宜急掐人中仍令陰人摟定用口相對務使煖氣噓通以接其氣勿令放脫以保其神隨速用獨參湯灌之或速灸氣海數十壯以復陽氣庶可挽回但以臨時慌張焉知料理故每致不救然此以卽病者言所見誠不多也其有不卽病而病此者則甚多也又何以言之以其精去於頻而氣脫於漸故每於房慾二三日之後方見此證但因其病不在卽故不以此爲病兼之人多諱此而不知中年之後多有因此而病者是皆所謂色厥也奈時師不能察而每以中風斃之耳凡治此者單宜培補命門或水或火當以非風門治法第三條者主之

又色厥之動血者以其血氣并走於上亦血厥之屬也但與大怒血逆者不同而治法亦有所異蓋此因慾火上炎故血隨氣上必其情慾動極而慾不能遂者有之或借麴蘗以強遏鬱火者亦有之其證則忽而暴吐或鼻衄不能禁止或厥逆或汗出或氣喘或

欬嗽此皆以陰火上衝而然凡治此者必先制火以抑其勢宜清化飲四陰煎或加減一陰煎之類主之其有陰竭於下火不歸源別無煩熱脉證而血厥不止垂危者非鎮陰煎必不能救待其勢定然後因證酌治之

陰陽二厥

厥有二證陽厥陰厥也陽厥者熱厥也必其先自三陽傳入陰分故其初起必因頭疼發熱自淺入深然後及於三陰變爲四肢逆冷或時乍溫其證必便結躁煩譫語發渴不惡寒反惡熱脉沉有力此以傳經熱證所化外雖手足厥冷內則因於熱邪陽證發厥故爲陽厥乃陽極似陰也其證由邪熱內結或伏陽失下之所致也凡厥微則熱亦微宜四逆散之類厥甚則熱亦甚宜承氣湯之類也陰厥者寒厥也初無三陽傳經實熱等證而眞寒直入三陰則畏寒厥冷腹痛吐瀉戰慄不渴脉沉無力此獨陰無陽也故爲陰厥輕則理中湯重則四逆回陽等湯主之

按陽厥陰厥其辨如前此先哲之大法也然愚則有

所辨如陰厥一證既無陽證陽脉而病寒若此明是陰證今人但曰中寒者卽其病也然犯此者無幾知此者無難治宜溫中無待辨也惟是陽厥一證則有不得不辨者夫厥由三陽所傳是爲陽厥此固然矣卽以傳經者言之又豈盡無陰證乎故凡病眞陽不足者卽陽中之陰厥也脉弱無神者卽陽中之陰厥也攻伐清涼太過者卽陽中之陰厥也四肢爲諸陽之本使非有熱結煩渴脹實等證而見厥逆者皆由陽氣不足也成無己曰大抵厥逆爲陰所主寒者多矣又曰厥爲陰之盛也故凡屬挾虛傷寒則雖自陽經傳入者是亦陽中之陰厥也陰中之陰者宜溫陽中之陰者果宜涼乎學者勿謂先有頭痛發熱但自三陽傳至者便爲陽厥而寒因熱用之則爲害不小矣

蚘厥

成無己曰臟厥者死陽氣絕也蚘厥雖厥而煩吐蚘已則靜不若臟厥而躁無暫安時也病人臟寒胃虛故宜與烏梅丸溫臟安蟲然臟厥蚘厥二證皆傷寒

證也詳見傷寒門

石室祕籙 臣陳士鐸著

厥

偏治法如厥病一時手足厥逆痛不可忍人以爲手足四肢之風證也不知乃心中熱蒸外不能洩故四肢手足則寒而胷腹皮熱如火方用柴胡三錢當歸二錢荊芥一錢黃連二錢炒梔子二錢半夏一錢枳殼一錢水煎服一劑即平二劑即全愈蓋厥證多是火病厥之甚則熱之甚也故舒其內熱而四肢手足自溫矣方中妙在用柴胡爲君用諸寒凉之藥直入心肝之內又不凝滯於胷膈之間蓋柴胡能散半表半裏之邪又善疏洩鬱悶之氣若止治其四肢手足之風而不直搗其中堅則賊首不擒餘黨安息故不治四肢手足而專治其心胷也

厥證雖多是火然亦有非火而亦厥者乃直中陰經也陰寒直入於腎宮則必挾腎水上犯心君之火君弱臣强犯上自所不免若不用大熱之藥急救心君則危亡頃刻方用人參三錢白朮一兩附子肉桂吳

茱萸各一錢水煎服一劑即愈然寒厥與熱厥大相懸絕不可不辨寒厥手足必青飲水必吐腹必痛喜火熨之若熱厥手足雖寒而不青紫飲水不吐熨火則腹必加疼是也能辨證清而用藥當下睺即定便是神醫何必用追魂之符籙哉

開治法如尸厥乃中邪氣閉必須用藥以開之不用瓜蔕散以探吐即用皂角以取嚏也方用瓜蔕七箇水二椀煎湯一椀加鹽少許灌之即大吐濃痰數椀而愈或用皂角刺碾爲細末取鵝翎管盛藥末吹入病人鼻中得打噴嚏口吐濃痰如黃物者即愈蓋厥證多係熱邪然熱邪必然叫號今黯然無語宛似死人明係陰虛之人忽中陰邪不可以治陽厥之法治之而至不救不若先以瓜蔕皂角取吐以去其痰涎聲出後以人參五錢白薇一錢茯苓三錢白朮五錢半夏二錢治之自安此乃開治之一法也

噴嚏之法用生半夏三錢爲末水丸如黃豆大入鼻孔中則必噴嚏不已用水飲之立止通治中風不語尸厥等證中惡中鬼俱妙皆開治之法也

引治法如人病厥逆之證不敢用藥以治之用吳茱萸一兩爲末以麪半兩水調成厚糊一般以布如鍾大攤成膏紙厚半分貼在湧泉穴內則手足不逆矣況上熱下寒之證皆可用此法而治之亦引火歸元之法也

立治者不可坐臥而立治之也如厥證多兩手反張兩足轉逆必須立而飲藥則頃刻立定蓋厥證原是熱病熱深則厥亦深倘令其臥而服藥則藥到胃一遇火氣沸騰冲擊而不相入反致吐出也今立而飲藥則斷斷無吐出之虞方用黃連茯苓白芍各三錢柴胡白芥子木瓜甘草各一錢水煎服此方純是平肝之品去火而又順火之性自宜入口不吐然而火熱炎上吐亦常有令人將病人抱而立之令一人將藥與飲俟其下口久之然後抱臥則藥相順而無吐逆之苦矣

人有忽然發厥口不能言眼閉手撒喉中作酣聲痰氣甚盛有一日即死者有二三日而死者此厥多犯神明然亦因素有痰氣而發也治法自宜攻痰爲要

然徒攻痰而不開心竅亦是徒然方用啓迷丹生半夏人參各五錢菟絲子一兩甘草三分茯神三錢皂角莢生薑各一錢菖蒲二錢水煎服此方人參半夏各用五錢使攻補兼施則痰易消而氣易復尤妙用菟絲子爲君則正氣生而邪氣散更妙用皂莢菖蒲茯神開心竅以清心自然氣回而厥定倘疑厥證是熱而輕用寒凉之藥則去生遠矣半夏用生不用製者取其生氣以救死且製之過熟反掣肘效遲而不能奏功也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十四卷目錄

醫部彙考二百九十四

厥門三

方

茯苓甘草湯
四逆湯
通脈四逆加猪膽汁湯
甘草湯
甘草乾薑湯
白虎湯
烏梅丸
當歸四逆湯
當歸四逆加吳茱萸生薑湯
理中丸
四逆散
白通加猪膽汁湯
大柴胡湯
桂枝麻黃各半湯
麻黃附子甘草湯
益元散
黃連解毒湯
雙解散
八味順氣散
薑附湯
導痰湯
調氣散
平胃散
四七湯
回陽救急湯
熨法
三生飲
追魂湯
甘竹瀝湯
人參湯
三建湯
洞陽丹
接眞湯
四君子湯
四物湯
木香

匀氣散　八味順氣散　蘇合香丸　六鬱湯
二陳湯　補中益氣湯　火鬱湯　當歸龍
薈丸　四磨飲　星香湯　沉香桂附丸　養
正丹　六味回陽飲　鎮陰煎　四味回陽飲
通瘀煎　調氣散　五味子湯　調氣平胃
散　倉公散　白薇湯　返魂湯　人參固本
丸　蒲黃湯　人參散　赤茯苓湯　遠志散
吳茱萸加減湯　升陽洩火湯　還魂丹
二十四味流氣飲

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百十四卷

醫部彙考二百九十四

厥門三

方

茯苓甘草湯（仲景下同）

傷寒厥而心下悸者有水也此治之

茯苓　桂枝各二兩　生薑切三兩　甘草炙一兩

右四味以水四升煑取二升去滓分溫三服

四逆湯

治太陽誤汗復加燒鍼而厥者

乾薑一兩五錢　附子一枚生用去皮破八片

甘草炙二兩

右三味㕮咀以水三升煑取一升二合去滓分溫三服強人可用大附子一枚乾薑三兩凉服

通脉四逆加猪膽汁湯

治吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕

卽四逆湯方中加入猪膽汁半合餘依前法服

甘草乾薑湯

治太陽內眞寒而外假熱因誤汗致厥者

甘草炙四兩　乾薑炮二兩

右㕮咀以水三升煑取一升五合去滓分溫再服

白虎湯

治傷寒裏熱脉滑而厥者

知母六兩　石膏碎一斤　甘草二兩　粳米六合

右四味以水一斗煑熟湯成去滓溫服一升日三服

烏梅丸

治蚘厥吐蚘

烏梅三百箇　乾薑十兩　黃連一斤　附子炮
桂枝　人參　黃蘗各六兩　當歸　細莘
蜀椒去子各四兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之用五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中加蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三服稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等味

當歸四逆湯

治手足厥寒脉細欲絕者

當歸　桂枝　芍藥各三兩　細莘　甘草炙
通草各二兩　大棗三十五枚擘

右七味以水八升煑取三升去滓溫服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

治前證內有久寒者

當歸　桂枝　芍藥各三兩　甘草炙　通草
細莘各二兩　生薑切半斤　大棗二十五枚擘

吳茱萸一升

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓分溫五服一方水酒各四升

理中丸

作煎名理中湯治四肢厥逆脈沉微而不數

乾薑炮　甘草炙　人參（腹痛者倍之）　白朮各一兩

右擣篩煉蜜和丸如鷄子黃許大以湯數合和一丸碾碎溫服之日三夜二服腹中未熱益至三四丸熱粥食之微自溫覆勿揭衣然不及湯

四逆散

治少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者此主之

甘草炙　柴胡　枳實去白穰炒黃　芍藥各一兩

右擣篩爲細散米飲調下二錢日三服

白通加猪膽汁湯

治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

豬膽半合　乾薑炮五錢　附子生去皮半箇

葱白四莖　溺二合半

右以水一盞煎五分去滓內尿膽汁和相得分溫再服

大柴胡湯

治陽厥

柴胡半斤　黃芩　芍藥各三兩　生薑切五兩

半夏洗半升　枳實炙四枚　大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服一方用大黃二兩若不加大黃恐不爲大柴胡也

桂枝麻黃各半湯

治寒熱而厥兩手無脉或一手無脉用綿衣包手者

桂枝二兩十六銖　芍藥　生薑切　甘草炙

麻黃各一兩　杏仁去皮尖及兩仁者二十四箇

大棗四枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥中煑取一升八合去滓溫服六合

麻黃附子甘草湯

治三陰表寒厥逆

麻黃去節　甘草炙各二兩　附子一枚炮去皮

右三味以水七升先煑麻黃一二沸去上沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升

益元散（河間下同）

合三一承氣治熱深厥深脉有力者

滑石白膩好者六兩　甘草一兩

右爲細末每服三錢蜜少許溫水調下或無蜜亦可每日三服或欲冷飲者新井泉調下亦得解利發汗煎葱白豆豉湯下每服水一盞葱白五寸豆豉五十粒煑取汁七分調併三四服以效爲度此藥是寒凉解散熱鬱設病甚不解多服無害但有益耳一名天水散一名太白散一名六一散

黃連解毒湯

治熱厥下後熱少退而未愈者

黃連　黃蘗　黃芩　大梔子各五錢

右剉如麻豆大每服秤五錢水一茶盞煎至四分絞取汁溫服無時日三四以效爲度每一二服效或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚全用厚朴二錢剉茯苓去皮剉水一盞半生薑三片煎至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯或欲急下者本方加大承氣湯一服生薑煎如前法以利爲度一法爲細末水和如小豆大溫水下三十丸治積熱勞欬瀉利甚良

雙解散（活人）

治厥逆兼內外諸邪者

益元散　防風通聖散各七兩

右二味一處相和攪勻每服三錢水一盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服

八味順氣散（丹溪）

治氣厥

白朮　白茯苓　青皮　白芷　橘紅　台烏

人參各一兩　甘草五錢

每服五錢水一鍾半煎七分溫服仍以酒化蘇合

香丸間服

薑附湯（仲景）

治中寒身體強直口噤不語逆冷

乾薑一兩　附子生去皮臍一箇

右剉每服三錢水煎服

挾氣攻刺加木香五分

挾氣不仁加防風一錢

挾濕者加白朮

筋脈牽急加木瓜

肢節痛加肉桂二錢

導痰湯（丹溪下同）

治痰氣厥逆

法製硝同萊菔水煮化去萊菔綿濾令結入臘月牛膽內風化秤五錢或只風化硝亦可又云一兩

青蒙石二兩搥碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鐵線縛定鹽泥固濟曬乾火煅紅候冷取出

右爲末神麴糊丸梧子大每服三五十丸白湯下

一方加蒼朮五錢滑石一兩看病冷熱虛實作湯

使

調氣散

合平胃散服治尸厥

白豆蔻　丁香　檀香　木香各二錢　藿香

甘草炙各八錢　砂仁四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

治證見調氣散下

蒼朮泔浸五斤　厚朴薑製炒　陳皮各三斤

甘草炒三十兩

右爲末每服五錢薑三片棗一箇煎服入鹽一捻

沸湯點服亦得

四七湯

治痰氣厥逆

厚朴二兩　茯苓四兩　半夏五兩　紫蘇二兩

右每服四錢水一鍾薑七片棗一箇煎服

回陽救急湯（醫鑑下同）

治傷寒初起無頭痛無身熱便就惡寒四肢厥冷

或過於肘膝或腹痛吐瀉或口吐白沫冷涎或戰慄面如刀刮引衣踡臥不渴脉來沉遲無力即是直中陰經眞寒證不從陽經傳來者

人參　白朮　茯苓　陳皮　半夏　乾薑

肉桂　附子　五味子　甘草

右剉一劑生薑三片水煎服

熨法

治寒邪直入三陰無頭痛身熱惡寒腹痛下利淸白脣靑面黑吐沫口噤或身痛如被杖四肢厥冷上過乎肘下過乎膝引衣踡臥不渴脉來沉遲無力及一切虛寒並能治之

葱細切　麥麩各三升　鹽一斤

右用水和勻分作二處炒令極熱重絹包之乘熱熨臍冷更易一包其葱包旣冷再用水拌炒熱依前用之如大小便不通亦用此法

三生飲（良方下同）

治痰厥氣厥

南星生用五錢　木香一錢五分　川烏去皮

附子去皮生用各一錢

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾不拘時服

有卒中風不省人事者以蘇合香丸用生薑自然汁化開擦牙

追魂湯

治卒厥暴死及客忤鬼擊蜚尸奄忽氣絕口噤

麻黃六錢　杏仁去皮尖五十粒　甘草炙二錢

右分作二服煎至七分去滓灌之口噤斡開若更不下分病人髮左右提搦肩引之藥下漸甦若脣青身冷爲入臟卽死身和汗出卽愈千金方有桂

甘竹瀝湯

治卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥尸厥死不識人閉目灸鍼不知痛風狂宜服此湯

甘竹瀝一斗　生薑　防風　甘草炙各三兩

防己　麻黃去節　人參　黃芩　細辛

茵芋　秦艽　桂心各一兩　附子一枚大者炮

右㕮咀以湯漬藥令赤合竹瀝煮取四升分爲四服忌海藻菘菜桃李雀肉生葱生菜猪肉冷水

人參湯

治風厥志意不樂身背疼痛多驚善欠噫氣

人參　川芎　枳殼麩炒　芍藥　防風　細莘

附子炮裂去皮臍　甘草炙　桂心各五錢

桔梗炒　茯神去木　木香各一分

右㕮咀每服五錢匕水一盞半生薑半分煎至八分去滓溫服

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大小便滑數凡中風涎潮不省人事傷寒陰證皆可服之

大川烏　附子　天雄俱炮去皮臍各三錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服

自汗加肉桂浮麥各一錢

氣逆者加沉香一錢

胃冷者加丁香胡椒各五分

洞陽丹

治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰證並皆治之

川烏四兩　天雄並炮去皮三兩　鍾乳粉

附子炮去皮臍各二兩　陽起石　朱砂研各一兩

右爲細末酒煑神麴糊丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或鹽湯送下

接眞湯

治陰病手足厥冷臍腹疼痛眞氣不足衰憊欲絕

沉香　丁香各二錢　附子炮去皮臍四錢

麝香一錢

右剉碎用水二鍾生薑七片棗二枚去核煎至七分去滓空心溫服

四君子湯

治氣虛厥逆

人參一錢　白朮　茯苓各二錢　甘草六分

右生薑三片棗子一枚水煎不拘時溫服加半夏陳皮名六君子湯治氣虛痰厥

四物湯

治血虛厥逆

白芍藥　當歸　熟地　川芎各二錢

右水煎溫服

木香勻氣散

一名木香調氣散治氣滯厥逆

木香　丁香　白檀香　白豆蔻　藿香葉

甘草各八錢　砂仁四錢

右爲末每二錢入鹽少許沸湯點服一方有沉香

八味順氣散

治暴厥氣逆身冷者

四君子湯加青皮　陳皮　白芷　烏藥各等分

右薑煎服仍以酒化蘇合香丸兼服妙

蘇合香丸

治證見前凡一切卒暴痰壅氣逆等證並治之

白朮　青木香　朱砂　犀角　沉香　麝香

訶子皮　丁香　安息香　蓽澄茄　白檀香

香附各二兩　龍腦　薰陸香　蘇合香各一兩

右爲末用安息香以酒熬成膏同前合香油和蜜

調每服旋丸桐子大取井水溫冷任意下四九老人小兒酒化下一九

六鬱湯

解諸鬱治厥逆

陳皮　半夏　川芎　蒼朮各一錢　赤茯苓
梔子各七分　香附二錢　砂仁　甘草各五分

右薑三片水煎溫服隨證加減

二陳湯

治痰厥

陳皮二錢　半夏一錢　茯苓八分　甘草四分

右薑三片水煎溫服

補中益氣湯

治濕熱鬱於脾土不能榮於四肢熱厥

黃芪　人參　甘草各一錢　當歸　白朮
陳皮　柴胡　升麻各五分（虛甚者升柴各一分汗多者不用）

右水煎巳午未初時溫服傷之重者連進二服如得微汗即愈忌多言勞役靜養一二時辰久方進美膳以助之常服去升柴加黃蘗三分以滋腎水

紅花二分入心養血多用則破血

火鬱湯

治熱厥

升麻　葛根　柴胡　白芍藥各一錢五分

防風　甘草各一錢

右葱白煎服

當歸龍薈丸

熱厥痰閉於上火鬱於下用導痰湯吞龍薈丸

木香一錢　當歸　膽草　山梔　黃連　黃蘗

黃芩各一兩　大黃　蘆薈　青黛各五錢

右爲末入麝香五分研細煉蜜丸小豆大每二三十丸薑湯下

四磨飲

治諸氣厥逆

沉香　烏藥　枳實　檳榔

右四味以白湯共磨服

星香湯（易簡）

治痰厥氣厥身熱面赤者宜服之

南星八錢　木香一錢

右作二貼水二鍾生薑十片煎七分不拘時服

沉香桂附丸（寶鑑）

治中氣虛寒手足厥冷腰屈不能伸喜熱熨稍緩等證

附子炮去皮臍　川烏炮去皮臍　沉香　肉桂

乾薑炮　良薑炮　茴香炒　吳茱萸炮各一兩

右爲末酢煑麵糊丸桐子大每服五七十丸食前米飲下日二服忌生冷

養正丹

治上盛下虛眩運厥逆此藥升降陰陽

硫黃爲末　黑錫鎔淨　水銀　朱砂碾各一兩

右將錫鎔化入硫黃末漸入漸攪爲末再入水銀同擂如硬再於火上微煆又擂勻放冷碾極細末糯米糊丸菉豆大每服三十丸空心鹽湯下

六味回陽飲（景岳全書下同）

治手足厥逆微陽將脫等證

人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　炮乾薑

製附子各二三錢　當歸身三錢（泄瀉或動血者代以冬朮）
熟地五錢或一兩

水二鍾武火煎七八分溫服

鎮陰煎

治陰虛於下格陽於上厥逆等證

熟地一二兩　炙甘草一錢　澤瀉一錢五分
肉桂一二錢　製附子五七分或一二三錢
牛膝二錢

水二鍾速煎服

四味回陽飲

治手足厥逆元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　製附子二三錢　炙甘草一二錢
炮乾薑二三錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

通瘀煎

治血厥

歸尾三五錢　山楂　香附　紅花炒黃各二錢
烏藥一二錢　澤瀉　青皮各一錢半　木香七分

水二鍾煎七分加酒一二小鍾食前服

調氣散（良方下同）

治卒厥

白豆蔻　丁香　白檀香　木香　藿香葉

甘草炙各八錢　砂仁四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯調下

五味子湯

治陰厥脉伏手足逆冷脉微欲絕氣虛之證

五味子一兩　人參　麥冬　杏仁　陳皮各五錢

右薑一片棗一枚煎服即生脉散加陳皮杏仁

調氣平胃散

治卒暴尸厥觸犯邪氣昏運卒倒無所知

白豆蔻　丁香　檀香　木香各二錢　藿香

砂仁各四錢　甘草六錢

右爲末每服二錢入鹽少許點沸湯調服

倉公散

治血厥

瓜蔕　藜蘆　明礬煅　雄黃等分

右爲細末每用少許吹入鼻中得嚏此藥能起死回生

白薇湯

治證同上

白薇　當歸各二錢　人參一錢半　甘草炙七分

右水盞半煎七分溫服

返魂湯

治血逆卒厥并產後血厥昏運目閉口噤惟婦人多有此病

當歸酒洗　川芎　肉桂　乾薑炮　赤芍藥

甘草　黑豆炒去殼　紫蘇各等分

右水盞半煎或爲細末每服二錢酒調灌下

人參固本丸

治煎厥

人參二兩　天冬　麥冬　生地　熟地各四兩

右爲末作丸服

蒲黃湯

治血菀於上使人薄厥

蒲黃一兩炒褐色

清酒十爵沃之溫服

人參散

治煎厥氣逆頭目昏憒聽不聞目不明七氣善怒

人參　遠志　赤茯苓　防風各二兩　芍藥

麥門冬　陳皮去白　白朮各一兩

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服

赤茯苓湯

治薄厥暴怒怒則傷肝氣逆胷中不和甚則嘔血鼽衄也

赤茯苓　人參　桔梗　陳皮各一兩　芍藥

麥門冬　檳榔各半兩

右爲末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服

遠志散

治風厥多驚背痛善噫善欠志意不樂身背皆痛

遠志　人參　細辛　茯苓　黃芪　桂各兩半

菖蒲　熟地黃焙　白朮　防風各半兩

右爲末每服一錢至二錢溫酒調下空心食前日三服

吳茱萸加減湯

治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於脂膜

吳茱萸二兩洗炒　川烏去皮炮　細辛各三兩

良薑　當歸　乾薑炮　官桂各一兩

右爲末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日進三服

升陽洩火湯（東垣）

治氣虛陷下四肢厥逆

羌活　黃芪　蒼朮米泔浸去皮爆乾剉各一兩

甘草炙　人參　黃芩各七錢　柴胡一兩半

黃連酒製半兩　升麻八錢　石膏長夏用少許

右㕮咀每服秤三錢水二盞煎至一盞去滓大溫服早飯後午飯前間日服

還魂丹

治尸厥不語

朱砂　雄黃並水飛　生玳瑁屑　麝香另研

白芥子各二錢半

右同碾如粉於瓷器中鎔安息香和丸如菉豆大或衝惡不語每服五丸用童便化下小兒熱風只服一丸

二十四味流氣飲（和劑）

治尸厥破陰絕陽形靜如死醫者不知鍼石宜此方主之

陳皮　青皮　炙甘草　厚朴薑製　紫蘇

香附各四兩　大腹皮　丁香皮　檳榔　木香

草果　莪朮炮　桂　藿香各一兩半　人參

麥門冬　白朮　赤茯苓　枳殼炒　石菖蒲

木瓜　白芷　半夏各一兩　木通

右爲末每服五錢

單方

尸厥卒死不知人者燒尸塲土二三錢擂細湯泡灌之卽活如無以竈心土代之（何氏方）

尸厥不醒脉動如故竈墨彈丸漿水和飲仍鍼百會穴足大指中指甲側（千金方）

痰厥氣絕心頭尚溫者千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞煎極滾澄清灌之少頃痰下自省（集元方）

熱厥氣痛元明粉三錢熱童尿調下（集簡方）

陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脉危甚者舶上硫黃爲末艾湯服三錢就得睡汗出而愈（本事方）

熱厥心痛或發或止久不愈身熱足寒者元胡索去皮金鈴子肉等分爲末每溫酒或白湯下二錢（聖惠方）

痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞胷膈炮附子三分金墨四錢冷水調服方寸匕當吐卽愈忌猪肉冷水

腎厥頭痛指南方用大附子一箇炮熟去皮生薑五錢水一升半煎分三服

痰厥頭痛白附子天南星半夏等分生碾爲末生薑自然汁浸蒸餅丸菉豆大每服四十丸食後薑湯下（濟生方）

嘔逆厥逆內有寒痰半夏一升洗滑焙碾小麥麪一升水和作彈丸水煑初吞四五枚日三服稍增至十五枚旋煑旋吞覺病減再作忌羊肉餳糖此乃許仁則方也（外臺祕要）

尸厥之病卒死脉猶動聽其耳目中如微語聲股間暖者是也魘死之病臥忽不寤勿以火照但痛齧其踵及足拇趾甲際唾其面卽甦仍以菖蒲末吹鼻中

桂末納舌下并以菖蒲根汁灌之（肘後方）

斑豆服凉藥多手足厥冷脉微用乾豆炮二錢五分粉甘草炙一錢五分水二鍾煎一鍾服（龐安常傷寒論）

痰厥頭痛如破者烏梅肉三十箇鹽三撮酒三升煑一升頓服取吐卽愈（肘後方下同）

嘔啘厥逆蘡薁藤煎汁呷之

風冷氣血閉手足身體疼痛冷痲五靈脂二兩沒藥一兩乳香五錢川烏頭一兩五錢炮去皮爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服（衍義）

卒死尸厥用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如小豆大白湯灌下二丸須臾再服卽甦（肘後方）

鍼灸

素問曰太陽臟獨至厥喘虛氣逆是陰不足陽有餘也表裏俱當瀉取之下俞

少陽臟獨至是厥氣也蹻前卒大取之下俞

帝曰有病膺腫頸痛胷滿腹脹此爲何病何以得之岐伯曰名厥逆帝曰治之奈何岐伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣并乃可治也帝曰何以然岐伯曰陽氣重上有餘於上灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂須其氣并而治之可使全也

寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痏後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一痏立已不已以竹管吹其兩耳鬄其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

靈樞經曰陰刺者左右卒刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也

刺熱厥者留鍼反爲寒刺寒厥者留鍼反爲熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二刺陰也一陽者一刺陽也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取足少陰於陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然

厥痺者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病也瀉陽補陰經也頸側之動脈人迎人迎足陽明也在嬰筋之前嬰筋之後手陽明也名曰扶突次脈手少陽也名曰天牖次脈足太陽也名曰天柱腋下動脈臂太陰也名曰天府

熱厥取足太陰少陽皆留之寒厥取足陽明少陰於足皆留之

厥逆爲病也足暴清胷將若裂腸若將以刀切之煩而不能食脈大小皆濇煖取足少陰清取足陽明清則補之溫則瀉之

厥逆腹脹滿腸鳴胷滿不得息取之下胷二脅欬而動手者與背腧以手按之立快者是也

熱病頭痛顳顬目瘳脈痛善衄厥熱病也取之以第三鍼視有餘不足寒熱痔

厥挾脊而痛至頂頭沉沉然目䀮䀮然腰脊強取足太陽膕中血絡

厥胷滿面腫脣漯漯然暴言難甚則不能言取足陽明

厥氣走喉而不能言手足凊大便不利取足少陰

厥而腹嚮嚮然多寒氣腹中穀穀便溲難取足太陰

痿厥爲四末束悗乃疾解之日二不仁者十日而知無休病已止

黃帝曰何謂逆而亂岐伯曰清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衞氣逆行清濁相干亂於臂胻則爲四厥亂於頭則爲逆厥頭重眩仆有道以來有道以去審知其道是爲身寶氣在於頭者取諸天柱大杼不知取足太陽滎輸氣在於臂足取之先去血脈後取其陽明少陽之滎輸

寒則地凍水冰人氣在中皮膚緻腠理閉汗不出血氣强肉堅濇當是之時善用鍼者亦不能取四厥血脈凝結堅搏不往來者亦未可卽柔故治厥者必先熨調和其經掌與腋肘與脚項與脊以調之火氣已通血脈乃行然後視其病脈淖澤者刺而平之堅緊者破而散之氣下乃止此所謂以解結者也

甲乙經曰頭重目瞑悽厥寒熱汗不出陶道主之

肩髆間急悽厥惡寒魄戶主之

肩痛胷腹滿悽厥脊背急强神堂主之

寒熱悽厥鼓頷承漿主之

寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕癢腹痛不可以食飲肘攣支滿喉中焦乾渴魚際主之

熱病汗不出且厥手足清暴泄心痛腹脹心尤痛甚此胃心痛也大都主之幷取隱白

陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔三里主之

厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不可得行足外皮痛臨泣主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱（一本作逆冷）脛痛腹脹皮痛善伸數欠惡人與木音振寒嗌中引外痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄齗口噤僻不嗜食內庭主之

足厥喘逆足下清至膝湧泉主之

尸厥死不知人脉動如故隱白及大敦主之

恍惚尸厥煩痛中極及僕參主之

尸厥暴死金門主之

千金方曰跗陽主痿厥風頭重痛

醫學綱目曰身熱如火足冷如水可灸陽輔穴又云胻痠冷絕骨取之

醫學入門曰尸厥百會一穴美更針隱白效昭昭外用筆管吹耳不鍼百會鍼上星亦同

古今醫統曰厥逆灸人中一穴在鼻下灸七壯或鍼入至齒妙又膻中一穴在兩乳間陷中灸二十壯

又法以繩圍臂腕男左女右將繩從大權上度下至脊中繩頭盡處是穴灸二十二壯愈

導引

保生祕要曰手足厥逆法先念臍次湧泉處肋拔上至臍又從臍處肋拔下至湧泉止又從左手肋拔過右手右手肋拔過左手每次行六徧

醫案

儒門事親曰一夫病痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候死而已戴人見之問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調瓜蔕末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中嘓然下咽有聲後灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐噦出膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能動然無瓜蔕亦不可

便用宜消息之大凡中風涎壅往往止斷爲風專求風藥靈寶至寶誤人多矣劉河間治風捨風不論先論二火故將此法實於火形中

西華李政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻服逍遙散十餘劑終無效一日命予診之二人脉皆洪大而無力政之曰我手足之寒時時漬以熱湯漬而不能止吾婦手足之熱終日沃以冷水沃而不能已者何也予曰寒熱之厥也此皆得之貪飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰十年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣予曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分取二藥令服之不輟不旬日政之詣門謝曰寒熱厥者皆愈矣

醫宗必讀曰社友韓茂遠傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷衆皆曰陰證比余診之六脉皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚按其趺陽大而有力乃知腹有燥屎也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟施笠澤耳延

至診之與余言若合符節遂下之得燥屎六七枚口能言體能動矣彼按手不及足者何以救此垂絕之證耶

給諫晏懷泉夫人先患胷腹痛次日卒然運倒手足厥逆時有醫者以牛黃丸磨就將服之余診之六脈皆伏惟氣口稍動此食滿胷中陰陽痞隔升降不通故脈伏而氣口獨見也取陳皮砂仁各一兩薑八錢鹽三錢煎湯以指探吐得宿食五六椀六脈盡見矣左關弦大胷腹痛甚知爲大怒所傷也以木香青皮橘紅白朮香附煎成與服兩劑痛止更以四君子加木香烏藥調理十餘日方瘥此食中兼氣中

吳門周復庵年及五旬荒於酒色忽然頭痛發熱醫以羌活湯散之汗出不止昏運不醒余與之灸關元十壯而醒以四君子加薑桂日服三劑至三日少康又因分析家產勞而且怒復發厥余用好參一兩熟附二錢煨薑十片煎服稍醒但一轉側即厥一日之間計厥七次服參三兩至明日以羊肉羹糯米粥與之尚厥二三次至五日而厥定向余泣曰已蒙再生

不知有全愈之日否余曰脉有根蔕但元氣虛極非三載調攝不能康也幸其恪信余言遵守用藥兩月之間服參四斤三年之內進劑六百貼丸藥七十餘斤方得步履如初親友衆多議論雜出若非病人任之專或久而見疑服藥少怠未有獲生者也

薛氏醫案曰一男子食少胷滿手足逆冷飲食畏寒發熱吐痰時欲作嘔自用清氣化痰及二陳枳實之類胷腹膨脹嘔吐痰食小便淋漓又用四苓連蘗知母車前小便不利諸病益甚余曰此脾胃虛寒無火之證故食入不消而反出遂用八味丸補火以生土用補中益氣加生薑桂培養中宮發陽氣尋愈

大司馬王浚川嘔吐宿滯臍腹痛甚手足俱冷脉微細用附子理中丸一服益甚脉浮大按之而細用參附湯一劑頓愈

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十五卷目錄

醫部彙考二百九十五

癲狂門一

黃帝素問 通評虛實論 奇病論 脈要精微論 陽明脈解篇 厥論 氣交變大論 五常政大論 宣明五氣論 陰陽類論 生氣通天論 至眞要大論 脈解篇 氣厥論 調經論 病能論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇 癲狂篇

扁鵲難經 辨狂癲證

張機金匱要略（癲）
華佗中藏經（癲狂）
王叔和脈訣（狂妄之脈）
孫思邈千金方（癲狂證治）
朱肱活人書（傷寒發狂）
劉完素六書（狂越　罵詈）
成無己明理論（傷寒發狂）
李杲十書（狂言譫語鄭聲辨）
朱震亨心法（癲狂　活套）
虞摶醫學正傳（論癲狂　脈法）
戴思恭證治要訣（癲狂　心風）
樓英醫學綱目（狂癲辨論）
李梴醫學入門（癲屬喜怒無常　狂屬膏粱積熱　重陰者癲重陽者狂　治法　傷寒發狂　如狂）
徐春甫古今醫統（癲狂有同異之分　癲癇辨混同之誤　治法當分　心風證治　貴賤係難易）
王肯堂證治準繩（總論）

藝術典第三百十五卷

醫部彙考二百九十五

癲狂門一

黃帝素問

通評虛實論

帝曰癲疾何如岐伯曰脈搏大滑久自已脈小堅急死不治帝曰癲疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死

（註）脈搏大者氣盛於外小堅急者氣泄於下

奇病論

帝曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名爲胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發爲癲疾也

註 有所大驚則氣暴上而不下夫精以養胎而精氣并居母受驚而氣上則子之精氣亦逆故令子發爲癲疾也

脈要精微論

衣被不斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也

註 語言善惡不避親疎者神亂而譫語也

陽明脈解篇

帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也

註 四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高矣蓋陽盛則升四旁俱盛故能升高

帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣

欲走也

註　陽明之氣主肌肉故熱盛於身身熱故棄衣而走也蓋熱在外故不欲衣

帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

註　胃絡上通於心陽盛則心神昏亂故使人妄言罵詈不避親疎如熱盛於胃則不欲食不欲食故妄走蓋四肢稟氣於胃故也

厥論

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註　癲狂走呼妄言妄見陽明之脉病也經氣厥逆故腹滿胃不和故不得臥陽明乃燥熱之經其經氣上出於面故面赤而熱

氣交變大論

歲火太過上臨少陰少陽病反譫妄狂越

註　上臨少陰少陽火氣更甚譫妄狂越熱極也

五常政大論

赫曦之紀其病笑狂妄

註　心氣實則笑不休狂妄皆火熱之爲病也

宣明五氣論

邪入於陽則狂搏陽則爲癲疾

陰陽類論

二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行癲疾爲狂

註　皆交至者二陰二陽之經氣交并而上至於陽明病在腎者謂腎氣病而精液少其虛氣反上奔也病氣傳於陽明是以罵詈妄行癲疾爲狂

生氣通天論

陰者藏精而起亟也陽者衛外而爲固也陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂

註　陽盛則狂陽盛而自爲病故曰并乃狂

至眞要大論

諸躁狂越皆屬於火

註　火者少陽包絡之相火也

脈解篇

太陽所謂甚則狂巓疾者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂巓疾也

註 狂巓疾者乃陽氣盡甚於上而陰氣從之於下不得與陽氣相和下虛上實故使狂巓疾也

陽明所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故使之棄衣而走也

註 陰陽復爭者謂陰陽之氣上下相薄而復交爭於外內也陰陽之氣外并於陽則陽盛而爲病矣陽盛故使之乘高而歌棄衣而走也

氣厥論

肝移寒於心狂鬲中

註 肝爲陽臟而木火主氣陽并於陽故狂心居膈上肝處膈下母子之氣上下相通肝邪上移於心留於心下故爲鬲中

調經論

血并於陰氣并於陽故爲驚狂

註 血并於陰則陰盛而血實心主血脈故陰盛則驚氣并於陽則陽盛而氣實陽盛則發狂也

病能論

帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰何以治之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也帝曰治之奈何岐伯曰奪其食卽已夫食入於陰長氣於陽故奪其食則已使之服以生鐵洛爲飲生鐵洛者下氣疾也

註巨陽者心之標陽少陽者肝之表氣皆不動者也夫陽明乃胃之悍氣故獨動而不休今不動之氣反動而大疾故使人怒狂食氣入胃散精於肝濁氣歸心淫精於脈毛脈合精行精於腑是食入於陰而長氣於陽也今肝心之氣上逆以致巨陽少陽之動大疾故奪其食則陰氣衰而陽動息矣

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肺脈急甚爲癲疾

註肺主淸金而畏寒寒甚則爲癲疾所謂重陰則

癲也

腎脉急甚爲骨癲疾

註　腎爲陰臟而主骨陰寒太甚故爲骨癲疾

本神篇

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏

註　喜樂心之情也如喜樂無極則傷肺臟之魄魄傷則狂意者心之發蓋喜樂無極則神亦憚散而不存矣肺主皮毛故人皮革焦

經脉篇

胃足陽明之脉是動則病灑灑振寒善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戸塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是爲骭厥

註　陽明者午也陰氣加之故灑灑振寒善呻者陽氣鬱而欲伸出之數欠者陽欲引而上也顏黑者陰氣加於上也病至者病氣而至於經脉也陽明之脉病則惡人與火聞木音則惕然而驚胃絡上

通於心故心欲動陰陽相薄故欲獨閉戶牖而居陽盛則四肢實實則登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽明之脈下鬲屬胃絡脾故貫響腹脹

註 膀胱足太陽之脈是主筋所生病者痔瘧狂癎疾陽氣者柔則養筋故是主筋所生之病則爲痔經絡沉以內薄則爲瘧厥逆於下則爲癲爲狂

癲狂篇

目眥外決於面者爲銳眥在內近鼻者爲內眥上爲外眥下爲內眥

註 太陰之氣主約束目外角爲銳眥內角爲內眥者乃太陰之氣主乎外內之目眥也太陽爲目上綱陽明爲目下綱上爲外眥下爲內眥者乃太陽陽明之氣主於上下之目眥也

骨癲疾者顑齒諸腧分肉皆滿而骨居汗出煩悗嘔多沃沫氣下泄不治

註 齒者骨之餘分肉屬骨是以骨癲疾者顑齒諸分肉皆滿骨居者骨肉不相親也汗出煩悗者病在足少陰腎而上及於手少陰心也嘔多沃沫太

陰陽明之氣上脫也氣下泄少陰之氣下泄也陰陽上下離脫故爲不治

癲疾者疾發如狂者死不治

（註）陰盛者癲陽盛者狂疾發如狂者陰陽之氣並傷故死不治

扁鵲難經

辨狂癲證

二十難曰重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾之始發少臥而不饑自高賢也自辨智也自倨貴也妄笑好歌樂妄行不休是也癲疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也

漢張機金匱要略

癲

五臟篇曰邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者爲癲陽氣衰者爲狂

痰飲篇曰假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之

華佗中藏經

癲狂

病起於六腑者陽之系也陽之發也或上或下或內或外或反在其中行之極也有能歌笑者有能悲泣者有能奔走者有能呻吟者有自委曲者有自高賢者有寤而不寐者有不能言而聲昧者各各不同皆生於六腑也喜其通者因以通之喜其塞者因以塞之喜其水者以水濟之喜其冰者以冰助之病者之樂喜好勿違背亦不可强抑之也如此從隨則十生其十百生其百疾無不愈耳

心風之狀汗自出而好偃仰臥不可轉側語言狂妄者生宜於心俞灸之若脣面青白黃黑赤其色不定眼瞤動不休心絕者不可救過五日卽死矣

晉王叔和脉訣

狂妄之脉

心脉歌曰三部俱數心家熱舌上生瘡脣破裂狂言

滿目見鬼神飲水百杯終不歇

緊脈歌曰緊脈三關數又弦上來風是正根源忽然狂語人驚怕不遇良醫不得痊

雜病生死歌曰恍惚之病定癲狂其脈實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未聞人救得

唐孫思邈千金方

癲狂證治

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究也少來用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論以貽於後云爾夫風眩之病起於心氣不定胷上畜實故有高風面熱之所爲也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒則爲癇其實則一此方療治萬無不愈但恐證候不審或致差違大都忌食十二屬肉而貫豚爲患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也困急時但度灸穴便火鍼

鍼之無不瘥者初得鍼竟便灸最良灸法次列於後余業之以來三十餘年所救活者數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸勿參以餘術焉

凡諸百邪之病源起多途其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是蜚蟲精靈手亂目急如斯種類癲狂之人今鍼灸與方藥並主之凡占風之家亦以風爲鬼斷

風入陽經則狂入陰經則癲

夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成癲病不可不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也治之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸三七壯佳

凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸火灸乃得求瘥耳若或悲泣呻吟者此爲邪非狂自依邪方治之邪入於陽則爲狂邪入於陰則爲血痹邪入於

陽傳卽爲癲狂邪入於陰傳則爲痛痞陽入於陰病靜陰入於陽病怒

心病煩悶少氣大熱熱上湯心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體厥冷其脈當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此是水尅火爲大逆十死不治

言音喘急短氣好唾此爲火尅金陽擊陰陰氣沉陽氣升升則實實則熱熱則狂狂則閉眼悖言非常所說口赤而張飮無時度此熱傷肺肺化爲血不治若面赤而鼻不欬可治也

傷寒病無熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當逼與新汲水一升若二升强飮之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿强與水水停則結心下也當更以餘藥吐之

宋朱肱活人書

傷寒發狂

此名陽毒也傷寒病若陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃脈

洪實或滑促宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣葶藶苦酒湯陽毒升麻湯大黃散梔子仁湯黑奴丸可選而用之太陽病發狂者以熱在下焦少腹硬滿下血乃愈

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脈皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱獨語如見鬼狀此陽毒也病人無表證不發寒熱脣燥但欲漱水不欲入咽其脈微而沉小腹鞕滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證諦也大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化爲血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚者抵當湯抵當丸輕者桃仁承氣湯犀角地黃湯須取盡黑物爲效又有火邪發驚狂者醫以火於臥牀下或周身用火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂臥起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

金劉完素六書

狂越

狂者狂亂而無正定越者乖越禮法而失常也夫外清而內濁動亂參差火之體靜順清朗準則信平水之體由是腎水主志而水火相反故心火旺則腎水衰乃失志而狂越或云重陽者狂重陰者癲則素問之說不同也經注曰多喜爲癲多怒爲狂然喜爲心志故心熱甚則多喜而爲癲怒爲肝志火實制金不能平木故肝實則多怒而爲狂況五志所發皆爲熱故狂者五志間發但怒多爾凡熱於中則多干陽明胃經經曰陽明之厥則癲疾欲走腹滿不得臥面赤而熱妄言又曰陽明病灑灑振寒善伸數欠或惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹罵詈不避親疎又經曰熱中消中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非性緩心和人不可服此二者夫熱氣慓悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾蓋服膏粱芳草石藥則熱氣堅勁疾利而爲熱中消中發爲癲狂之疾夫豈癲爲重陰者歟

罵詈

言爲心之聲也罵詈言之惡也夫水數一道近而善火數二道遠而惡水者內清明而外不彰器之方員物之氣味五臭五色從而不違靜順信平潤下而善利萬物滌洗濁穢以清淨故上善若水水火相反則下愚如火也火者外明耀而內煩濁燔焫萬物爲赤爲熱爲苦爲焦以從其己躁亂參差炎上而烈害萬物熏燎鮮明以爲昏昧水生於金而復潤母燥火生於木而反害母形故易曰潤萬物者莫過乎水又言離火爲戈兵故火上有水制之則爲既濟水在火下不能制火爲未濟也是知水善火惡而今病陽盛陰虛則水弱火强制金不能平木而善去惡發罵詈不避親疎喜笑恚怒而狂本火熱之所生也平人怒罵亦同或本心喜而無怒以爲戲弄之罵亦心火之用也故怒罵者亦兼心喜罵於人也怒而惡發可嗔者內心喜欲怒於人也

傷寒發狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足三一承氣湯加當歸薑棗名當歸承氣湯以利數行倏

微緩以三聖散吐之後用凉膈散洗心散黃連解毒湯調之譺妄發狂踰垣上屋赴井投河皆爲陽熱極甚用三一承氣合解毒下之驚悸癲狂三一承氣湯發狂極甚投河入井者三下不通不可下攻便當涌之以瓜蔕散吐出痰涎宿物一掃而愈後以甘露飲之類調之

成無己明理論

傷寒發狂

傷寒發狂何以明之狂者猖狂也謂其不寧也難經曰狂之始發也少臥而不饑自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂也妄行走不休也狂家所起皆陽盛致然內經曰陰不勝其陽脉留薄疾幷乃狂也又曰邪入於陽則狂邪入於陰則瘖難經曰重陽者狂重陰者癲脉經曰陰附陽則狂陽附陰則癲病源曰陽邪幷於陽則狂陰邪幷於陰則癲卽諸經之狂爲陽盛也明矣又陽明之病惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戸牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走踰垣上屋其所上之處皆非素所能者是謂

陽邪併於陽明也傷寒熱毒在胃併於心臟使神不寧而志不定遂發狂也傷寒至於發狂爲邪熱至極也非大吐下則不能已又有熱在下焦其人如狂者經曰熱入膀胱其人如狂謂之如狂則未至於狂但臥起不安爾其或狂言目反直視又爲腎之絕汗出輙復熱狂言不能食又爲失志死若此則殆非藥石之所及是爲眞病焉

元李杲十書

狂言譫語鄭聲辯

狂言者大開目與人語語所未嘗見之事卽爲狂言也譫語者合目自言言所日用常見常行之事卽爲譫語也鄭聲者聲戰無力不相接續造字出於喉中卽鄭聲也

朱震亨心法

癲狂

癲屬陰狂屬陽癲多喜而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因痰結於心胷間治當鎭心神開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式所論

尤精蓋爲世所謂重陰者癲重陽者狂是也大概是熱

癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是爲眞病如心經畜熱當淸心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癲哭呻吟爲邪所憑非狂也燒蠶紙酒水下方寸匕

風癲引脅痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸匕

癲證春治之入夏自安宜助心氣之藥

陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂狂病宜大吐下則除之

活套

五志之火因七情而起鬱而成痰故爲癲癇狂妄之證宜以人事制之非藥石所能療也須診察其由以平之怒傷於肝者爲狂爲癇以憂勝之以恐解之喜傷於心者爲癲爲癇以恐勝之以怒解之憂傷於肺者爲癇爲癲以喜勝之以怒解之思傷於脾者爲癇爲癲爲狂以怒勝之以喜解之恐傷於腎者爲癲爲

癇以恐勝之以憂解之驚傷於膽者爲癲以憂勝之以恐解之悲傷於心胞者爲癲以恐勝之以怒解之此法惟賢者能之

明虞摶醫學正傳

論癲狂

內經曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結於中而爲之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重陰者癲重陽者狂素問註云多喜爲癲多怒爲狂然則喜屬於心而怒屬於肝乃二臟相火有餘之證難經陰陽之說恐非理也大抵狂爲痰火實盛癲爲心血不足多爲求望高遠不得志者有之狂宜乎下癲則宜乎安神養血兼降痰火雖然此二證者若神脫而目瞪如愚癡者吾末如之何也已矣

或問內經有曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或不食數日而踰垣上屋所上之處皆非素所能也素

非所能因病而不食反能登非常之處豈有是哉曰難經有云重陽者狂重陰者癲又曰癲多喜而狂多怒所謂重陽者三部陰陽脉皆洪盛而牢故病強健而有力故名曰狂謂重陰者三部陰陽脉皆沉伏而細故病罷倦而無力故名曰癲嘗見東陽樓氏一少年病狂一日天風大作忽飛上於邑東之塔巓且歌且哭其塔實無容步之堦衆皆以爲怪予思龍乃純陽之物伏蟄於海內其身止有鱗甲且無羽翼遇陽氣昇騰之日則借風雲之勢而能飛騰卽此義也奚足爲怪哉

脉法

脉大堅疾者癲狂沉數爲痰熱大滑者自已沉小急疾者死虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏入臟則死入腑則愈

戴思恭證治要訣

癲狂

癲狂由七情所鬱遂生痰涎迷塞心竅不省人事目

瞪不瞬妄言叫罵甚則踰垣上屋裸體打人當治痰寧心宜辰砂妙香散加金箔珍珠末雜青州白丸子末濃薑湯調下呑十四丸滑石六一湯加珍珠末白湯調下

有病癲人耑服四七湯而愈蓋痰迷爲癲氣結爲痰故也如健忘如驚悸如怔忡五癇亦宜用此如癲狂不定非身輕劑所能愈者宜太乙膏及抱膽丸

心風

心風者精神恍惚喜怒不常無語時或錯亂有癲之意不如癲之甚亦痰氣所爲也宜星香散加石菖蒲人參各半錢下壽星丸

有心經蘊熱發作不常時煩躁鼻眼有熱氣不能自由有類心風稍定復作參蘇飲加石菖蒲一錢

樓英醫學綱目

狂癲辨論

狂謂妄言妄走也癲謂僵仆不省也各自一證今以狂入脾部癲入肺部然經有言狂癲疾者有言狂互引癲者又言癲疾爲狂者此則又皆狂癲兼病今病

有妄言妄走頃時前後僵仆之類有僵仆後妄見鬼神半日方已之類是以癲狂兼病者也

狂之爲病少臥少臥則衞獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衞得入於陰而陰得衞塡不虛陽無衞助不盛故陰陽均平而愈矣

狂邪癲癇不欲眠臥自賢自智妄行不休此方能安五臟下心氣用白雄鷄一隻煑熟五味調和作羮粥食之

經云悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正此悲哀傷魂而狂當溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類卽是也

經云喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人以喜樂傷魄而狂當用凉藥補魄之陰辰砂鬱金白礬之類是也

李梴醫學入門

癲屬喜怒無常

素問註云多喜爲癲多怒爲狂喜屬心怒屬肝二經皆火有餘之地但喜則氣散畢竟謀爲不遂鬱結不

得志者多有之大概痰迷心竅者葉氏清心丸金箔鎭心丸硃砂安神丸心風癲者牛黃清心丸追風祛痰丸虛者加紫河車一具爲糊怒傷肝者寧神導痰湯瀉清丸當歸龍薈丸因驚者抱膽丸驚氣丸丹溪云五志之火鬱而成痰爲癲爲狂宜以人事制之如喜傷心者以怒解之以恐勝之憂傷肺者以喜勝之以怒解之

狂屬膏粱積熱

陽明發狂見傷寒雜證胃與大腸實熱燥火鬱結於中大便閉者涼膈散加大黃下之

膏粱醉飽後發狂者止用鹽湯吐痰即愈或小調中湯

服芳草石藥熱氣慓悍發狂者三黃石膏湯加黃連甘草青黛藍板根或紫金錠

重陰者癲重陽者狂

難經云重陰者癲重陽者狂河間以癲狂一也皆屬痰火重陰之說非也但世有發狂一番妄言妄語而不成久癲者又有痴迷顚倒縱久而不發狂者故取

河間合一於前難經分析於後

治法

癲者異常也平日能言癲則沉默平日不言癲則呻吟甚則僵仆直視心常不樂此陰虛血少心火不寧大調中湯主之不時暈倒者滋陰寧神湯言語失倫者定志丸悲哭呻吟者燒蠶退故紙酒調二錢蓖麻仁煎湯常服可以斷根

狂者凶狂也輕則自高自是好歌好舞甚則棄衣而走踰垣上屋又甚則披頭大叫不避水火且好殺人此心火獨盛陽氣有餘神不守舍痰火壅成使然小調中湯三黃丸控涎丹單苦參丸狂則專於下痰降火癲則兼乎安神養血經年心經有損者不治

視聽言動俱妄者謂之邪祟甚則能言平生未見聞事及五色神鬼此乃氣血虛極神光不足或挾痰火壅盛神昏不定非眞有妖邪鬼祟大槪內服傷寒瘟疫條中人中黃丸照依氣血痰湯藥爲使或單人中黃服亦好或單石菖蒲末猪心血爲丸服亦可有婦人夜夢鬼來交者定志丸料加赤小豆水煎服有婦

人月水崩漏過多血氣迷心或產後惡露上衝而言語錯亂神志不守者此血虛神耗也宜寧神膏但亦不可純服補心斂神藥血熱者小柴胡湯加生薑生地煎服百餘貼卽安血迷心胞踰牆上屋歌唱無時者逍遙散加遠志桃仁紅花蘇木服後病退用平胃散少用厚朴倍加蒼朮升麻常服以絕病根又男子挾瘀血者陶氏當歸活血湯有卒中尸惡吐利如霍亂狀或狂譫如醉人事起心先知其肇或已死口噤不開者急用傷寒門追魂湯灌之卽醒外用辟邪丹灌鼻法

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心遂使神昏不定言動急速妄辨妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰牆上屋不饑不臥皆因汗下失宜陽氣亢極陰氣暴虛非大吐下不止傷寒四五日身熱煩躁不得汗發狂者表裏俱熱三黃石羔湯雙解散傷寒六七日壯熱胷滿便祕脉實數發狂者大承氣湯加黃連陽毒暴盛發狂多乾嘔面赤發斑咽痛下利黃赤壯熱而不得汗者

葶藶苦酒湯咽痛吐膿血者陽毒升麻湯潮熱甚者梔子仁湯潮熱大便閉者升麻葛根湯加大黃或三黃湯發斑不可下者草龍膽一味水煎服狂走者瓜蔕散吐痰時行熱毒發狂者黑奴丸通用水漬法火劫法王氏元明粉凡發狂見陽證陽脈者順見陰證陰脈及舌卷囊縮者即死

如狂

有陰盛發躁欲坐井地如狂者有火邪驚惕不安如狂者然如狂有三證與陽毒如狂相似故舉言之

如狂屬瘀血者脈沉實多漱水不嚥有無表證但血蓄下焦小便自利如狂者有無表裏證脈數善饑不大便如狂者有太陽初證熱結下焦如狂者血自下者即愈如外未解者桂枝湯陶氏桂苓飲外已解但小腹急結者桃仁承氣湯挾血傳心脾者當歸活血湯有太陰身黃溺澀如狂者五苓散此皆如狂但睡中或欲起行錯言妄語猶知諫阻尚可制禦非若發狂勢凶莫能禦也

徐春甫古今醫統

癲狂有同異之分

癲狂之病總爲心火所乘神不守舍一言盡矣癲者至高也火性炎上正如經云陽氣太上則狂癲狂則孔子所謂狂狷者之狂也靈樞經曰狂病始發少臥不饑自高賢也自辨智也自尊貴也故曰狂者進取志大而言大者也前謂狂言如有所見斯得之矣蓋心火暴熾言語善惡不避親疎此神明之亂也此之所謂狂也蓋謂火熾之甚陽氣太上則病人亦乘陽火之上炎故棄衣而登高由狂而又癲此則聖人命名之義而有同中之異耳

癲癇辨混同之誤

古方每以癲癇並治出方乃大誤也蓋癲爲心病而屬實者多癇爲五臟兼病而屬虛者多蓋因靈樞云癲癇瘛瘲不知所苦後人不察遂認爲一證殊不知靈樞癲癇自以兩證而言不知所苦皆言不能自知其病之所苦也玉機微義始分別之而亦未嘗白靈樞之旨也

治法當分

登高棄衣引重致遠者爲癲乃痰火亢熾之甚而然治宜降下之劑滾痰丸之屬是也自高辨智妄語狂言神明失守爲狂治宜鎮心安神清上之劑牛黃朱砂丸之屬是也

心風證治

心風病諸書鮮有載之而多附癲癇門混同論治心風雖出於世俗之稱深中病情誠爲切當古人謂風善行而數變風痹爲不仁此曰心風者非若外風入中甚言其變常無定恍惚不仁而心之病誠若風之魔也此皆七情五志久逆所生而與癲癇則又不同矣癲狂癇證主於火熾風痰之盛涎及於心屬實者多心風則由七情五志久逆不遂戴人所謂肝屢謀膽屢不決屈無所申怒無所泄心之官則思甚則心血日涸脾液不行痰迷心竅則成心風屬虛者多治法須以七情相勝五志遂心養血豁痰引神歸舍標本兼治此疾可愈矣至若混同癲癇攻治是謂虛虛而速其死也噫

心風初作多屬虛候何則思慮傷脾則穀氣寖少血

液日虧則心神漫散神不守舍卒成心風故知其始皆屬虛也歸脾湯養心湯定志丸之類至於病久則心志變而美惡不知無思無慮飲食如故殺氣頗增病根已固鬱痰不解者可用子和法治之隨證調理無不愈也

貴賤係難易

心風病貴者爲難膏粱素積耗散良多一經病作則正氣虛而邪氣盛所以難賤者爲易素甘淡薄稟受頗厚雖是病此則正氣實而邪氣輕所以易

王肯堂證治準繩

總論

素問止言癲而不及癇靈樞乃有癇瘛癇厥之名諸書有言癲狂者有言癲癇者有言風癇者有言驚癇者有分癲癇爲二門者迄無定論究其獨言癲者祖素問也言癲癇言癲狂者祖靈樞也要之癲癇狂大相徑庭非名殊而實一之謂也靈樞雖編癲狂爲一門而形證兩具取治異途較之於癇又不侔矣徐嗣伯曰大人曰癲小兒曰癇亦不然也素問謂癲爲母

腹中受驚所致今乃曰小兒無癲可乎癇病大人每每有之婦人尤多今據經文分辨於後

癲者或狂或愚或歌或笑或悲或泣如醉如癡言語有頭無尾穢潔不知積年累月不愈俗呼心風此志願高而不遂所欲者多有之

狂者病之發時猖狂剛暴如傷寒陽明大實發狂罵詈不避親疎甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋非力所能或與人語所未嘗見之事如有邪依附者是也

癇病發則昏不知人眩仆倒地不省高下甚而瘛瘲抽掣目上視或口眼喎斜或口作六畜之聲

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十六卷目錄

醫部彙考二百九十六

癲狂門二

張介賓景岳全書 論證 論治 傷寒發狂

陳士鐸石室祕錄 癲病治法 呆病治法 狂病治法

方 芎藭酒 續命風引湯 鴟頭丸 又方 抱膽丸 五邪湯 九精丸 甘遂散 瀉心湯 引神歸舍丹 祕方半夏丸 人參琥珀丸 寧志丸 蘂珠丸 天門冬煎 生鐵落飲 朱砂丸 來甦膏 洗心散 寧志膏 靈苑辰砂散 祛風一醉散 防己地黃湯

心　牛黃膏　人參散　茯神散　金箔丸　鎮
心丸　五苓散　補心丹　控涎丹　牛黃瀉
心湯　薯蕷丸　雄雌丸　又方　白金丸
壽星丸　桃核承氣湯　抵當丸　葶藶苦酒
湯　陽毒升麻湯　大黃散　梔子仁湯　三
一承氣湯　黃連解毒湯　加減小續命湯
一醉膏　當歸承氣湯　鵲石散　防風黃連
湯　調胃承氣湯　乾薑附子湯　二白丸
碧霞丹　牛黃清心丸　寧志化痰湯　清心
養血湯　河車丸　開迷散　防風通聖散
祛風至寶丹　鬱金丸　黃石散　清心湯
抱膽丸　五膽丸　奪命丹　牛黃丸　烏巴
丸　正心湯　清心丸　金銀定志湯　琥珀
茯苓膏　歸神丹　大補元煎　大和中飲
七福飲　二陰煎　六安煎　排氣飲　抽薪
飲　清膈煎　服蠻煎　玉泉散

藝術典第三百十六卷

醫部彙考二百九十六

癲狂門二

景岳全書　臣張介賓著

論證

癲狂之病病本不同狂病之來狂妄以漸而經久難已癲病之至忽然僵仆而時作時止狂病常醒多怒而暴癲病常昏多倦而靜由此觀之則其陰陽寒熱自有冰炭之異故難經曰重陽者狂重陰者癲義可

知也後世諸家有謂癲狂之病大概是熱此則未必然也此其形氣脉氣亦自有據不可不辨察陰陽分而治之

癲即癇也觀內經所言癲證甚詳而癇則無辨即此可知後世有癲癇風癇風癲等名所指不一則徒滋惑亂不必然也又如別錄所載五癇曰馬癇牛癇猪癇羊癇雞癇者即今人之謂羊癲猪癲也此不過因其聲之相似遂立此名可見癲癇無二而諸家於癲證之外又有癇證誠屬牽强無足憑也又千金方有風癇驚癇食癇及陰癇陽癇之說皆所當辨

論治

凡狂病多因於火此或以謀爲失志或以思慮鬱結屈無所伸怒無所洩以致肝膽氣逆木火合邪是誠東方實證也此其邪乘於心則爲神魂不守邪乘於胃則爲暴橫剛强故治此者當以治火爲先而或痰或氣察其甚而兼治之若止因火邪而無脹閉熱結者但當清火宜抽薪飲黃連解毒湯三補丸之類主之若水不制火而兼心腎微虛者宜硃砂安神丸或

服蠻煎二陰煎主之若陽明火盛者宜白虎湯玉泉散之類主之若心脾受熱叫罵失常而微兼閉結者宜清心湯涼膈散三黃丸當歸龍薈丸之類主之若因火致痰者宜清膈飲抱龍丸生鐵落飲主之甚者宜滾痰丸若三焦邪實熱甚者宜大承氣湯下之若痰飲壅閉氣道不通者必須先用吐法并當清其飲食此治狂之要也

癲病多由痰起凡氣有所逆痰有所滯皆能壅閉經絡格塞心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視手足搐搦腰脊強直食頃乃甦此其倏病倏已者正由氣之倏逆倏順也故治此者當察痰察氣因其甚者而先治之若火之有無又當審其脉證而兼爲之治也氣滯者宜排氣飲大和中飲四磨飲或牛黃丸蘇合丸集成潤下丸之類主之痰盛者宜清膈飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾涎丸之類主之兼痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸丹溪潤下丸之類主之痰逆氣滯之甚者必用吐法吐後隨證調理之

癲癇證無火者多若無火邪不得妄用涼藥恐傷脾氣以致變生他證且復有陰盛陽衰及氣血暴脫而絕無痰火氣逆等病者則凡四君四物八珍十全大補等湯或乾薑桂附之類皆所必用不得謂癲癇盡屬實邪而概禁補劑也若眞陰大損氣不歸根而時作時止昏沉難愈者必用紫河車丸方可奏效其有虛中挾實微兼痰火不清而病久不愈者集驗龍腦安神丸最得其宜隨證增減可爲法也

痴獃證凡平素無痰而或以鬱結或以不遂或以思慮或以疑貳或以驚恐而漸致痴獃言辭顛倒舉動不經或多汗或善愁其證則千奇萬怪無所不至脈必或弦或數或大或小變易不常此其逆氣在心或肝膽二經氣有不清而然但察其形體强壯飲食不減別無虛脫等證則悉宜服蠻煎治之最穩最妙然此證有可愈者有不可愈者亦在乎胃氣元氣之强弱待時而復非可急也凡此諸證若以大驚猝恐一時偶傷心膽而致失神昏亂者此當以速扶正氣爲主宜七福飲或大補元煎主之

小兒無狂證惟病癲者常有之凡小兒之病有從胎氣而得者有從産後受驚而得者蓋小兒神氣尚弱驚則肝膽奪氣而神不守舍舍空則正氣不能主而痰邪足以亂之故治小兒之驚癇必先審正氣然後察其病邪酌宜治之諸法俱載小兒門

愚按千金方論小兒風驚食三癇陳無擇論癇病由於三因之說雖若切當然風寒外感自有表證飲食內傷自有裏證俱未必亂神若此而癲癇爲病則忽爾昏厥此其病則專在心經以及肝膽二臟又非風寒飲食所能頓病若此者且風癇之義本以木邪所屬爲言亦非外感之謂卽有外感或有飲食亦無非因驚因恐相兼爲病耳若以三因並列之則有未必然也

傷寒發狂

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂而實非狂此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡實熱之狂本屬陽明蓋陽明爲多氣多血之經陽邪傳入胃腑熱結不解因而發狂內經陽明脉解篇曰

胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其惡火者熱甚則惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋者以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣而走者以熱甚於身也其妄言駡詈不避親疎而歌者以陽盛爲邪也又曰陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂又曰邪入於陽則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令神志昏亂若此此陽狂也然傷寒病至發狂是爲邪熱已極使非峻逐火邪則不能已故但察其大便鞕結或腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承氣或凉膈散六一順氣湯之類下之可也如無脹滿實堅等證而惟胃火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其病自愈

如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胷其人如狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小

便自利者下其血乃愈抵當湯主之按此二條以太陽熱邪不解隨經入腑但未至發狂故曰如狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者盖或由失志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失精而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之氣內無胷腹之結滑實之脉雖或不時躁擾而禁之則止口多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則口無焦渴察其下則便無鞕結是皆精氣受傷神魂不守之證此與陽極爲狂者反如冰炭而時醫不能察但見錯亂便謂陽狂妄行攻瀉必致殺人凡治此者須辨陰陽其有虛而挾邪者邪在陽分則宜補中益氣湯之類邪在陰分則宜補陰益氣煎之類虛而無邪者在陽分則宜四君八珍十全大補湯大補元煎之類在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之類

陰虛挾火者宜加減一陰煎二陰煎之類陽虛挾寒者宜理中湯回陽飲八味湯右歸飲之類等方治之然大略如此而變證之異則有言不能傳者能知意在言表則知所未言矣

凡身有微熱或面赤帶黃或煩躁不寧欲坐臥於泥水中然脈則微弱無力此陰證似陽也名為陰躁蓋以陽虛於下則氣不歸原故浮散於上而發躁如狂速當溫補其下命門煖則火有所歸而病當自愈若醫不識此而誤用寒涼者必死

石室祕籙

臣陳士鐸著

癲病治法

癲癇之證亦累歲經年而未愈乃痰入於心竅之間而不能出喜食炭者蓋心火為痰所迷不得發洩炭乃火之餘與心火氣味相投病人食之其甘如飴也方用人參一兩南星鬼箭柴胡白芍各三錢附子肉桂各一錢半夏菖蒲丹砂末各二錢先將前藥煎湯二碗分作二服將丹砂一半調入藥中與病人服之彼不肯服即以炭給之服了與汝炭吃彼必欣然服

之索炭也不妨仍與之炭第二服亦如前法則彼不若前之欣然當令人急灌之不聽不妨打之以動其怒氣怒則肝木火起以生心反能去痰矣

癲癇之病雖時常食物腸中有水穀之氣可以養生不死亦其心之不死也倘心早死即無病之人食穀亦亡况有癲癇之證吾見其早亡不能待於今日惟其中心不死不過痰邪有碍一時癲癇其脾胃尤有生氣也故用人參以治心加附子菖蒲肉桂溫中以祛邪加柴胡舒肝平木加南星鬼箭半夏逐痰蕩邪加丹砂定魂鎮魄自然邪氣少而正氣多也

別有治癲之方亦奇妙方用柴胡白芥子各五錢白芍半夏牛膽製過南星茯神菖蒲各三錢附子人參各一錢水十椀煎二椀先與一椀服之必倦怠急再灌一椀必熟睡有睡至一二日者切不可驚醒如死人一般任其自醒醒來病如失即索飲食說從前之病不可即與飲食餓半日與之米粥湯內加人參陳皮各五分煎粥與之再用人參三錢白术一兩甘草一錢茯苓白芥子各五錢陳皮五分水煎與之彼必

欣然自服服後再睡亦聽其自醒則永不再發亦奇妙法也

如人病花癲婦人忽然癲癇見男子抱住不肯放此乃思慕男子不可得忽然病如暴風疾雨罔識羞恥見男子則爲情人也此肝木枯槁內火燔盛脉必弦出寸口法當用平肝散鬱祛邪之味用柴胡當歸麥冬白芥子各五錢白芍一兩炒梔子茯神元參各三錢甘草菖蒲各一錢水煎服如不肯服用人灌之彼必罵詈不休久之人倦欲臥臥後醒來自家羞恥緊閉房門者三日少少與之飲食自愈一劑後不必更與之藥也

癲病之生也多生於脾胃之虛寒脾胃虛寒所養水穀不變精而變痰痰凝胷膈之間不得化流於心而癲證生矣苟徒治痰而不補氣未有不速之死者方用祛癲湯人參白芥子各五錢白朮一兩肉桂乾薑陳皮各一錢甘草菖蒲各五分半夏三錢水煎服此方用人參白朮專補脾胃用乾薑以祛寒邪用白芥子半夏以消頑痰用甘草菖蒲以引入心而開竅自

然正氣回而邪痰散一劑神定再劑神旺又何癲病之不能愈哉惟是花癲之證乃女子思想其人而心邪然亦因脾胃之寒而邪入也本方加入白芍一兩柴胡二錢炒梔子三錢去肉桂治之亦最神一劑而癲止矣蓋柴胡白芍炒梔子皆入肝以平木祛火而散鬱故成此奇功也

呆病治法

呆病如癡而默默不言如饑而悠悠如失也意欲癲而不能心欲狂而不敢有時睡數日不醒有時坐數日不眠有時將己身衣服密密縫完有時將他人物件深深藏掩與人言則無語而神遊背人言則低聲而泣訴與之食則厭薄而不吞不與食則吞炭而若快此等證雖有祟憑之實亦胷腹之中無非痰氣故治呆無奇法治痰即治呆也然而痰勢最盛呆氣最深若以尋常二陳湯治之安得獲效方用逐呆仙丹人參白芥子各一兩白朮二兩茯神三兩半夏五錢附子五分白薇丹砂各三錢研末先將各藥煎湯調丹砂末與半碗彼不肯服以炭給之欣然服

矣又給之又服半椀然後聽其自便彼必倦怠欲臥矣乘其睡熟將其衣服被褥盡行火化單留身上所服之衣另用新被蓋之切不可驚醒此一睡有睡至數日者醒來必覓衣而衣無覓被而被非故物彼必大哭然後又以前藥與一劑必不肯服即給之炭亦斷不肯矣不妨以鞭責之動其怒氣用有力之人將前藥執而灌之彼必大怒已而又睡去矣此時斷須預備新鮮衣服被褥等項俟其半日即醒彼見滿房俱是親人心中恍然如悟必又大哭不已諸人當以好言勸之彼必說出鬼神之事親人說幸某人治療已將鬼神盡行祛遣不必再慮彼聽之欣然而病亦全愈矣此方之妙妙在大補心脾以茯神爲君使痰在心者盡祛之而出其餘消痰之藥又得附子引之無經不入將遍身上下之痰盡行祛入膀胱之中而消化矣白薇菟絲子皆是安神妙藥而丹砂鎭魂定魄實多奇功所以用之而奏效也

呆病乃鬱抑不舒憤怒而成者有之羞恚而成者有之方用人參柴胡當歸菖蒲生棗仁半夏各一兩白

芎四兩甘草天南星鬱金神麴各五錢附子一錢茯苓三兩水十椀煎一椀灌之彼必不肯飲以雙手執其頭髮兩人拿其左右手以一人托其下頦一人將羊角去尖插入其口一人以手拿住其頭一人傾藥入羊角內灌之倘或吐出不妨益妙以灌完爲主彼必駡詈少頃人困欲睡聽其自醒切勿驚動使醒自醒來則全愈驚醒來則半愈矣此生治之一法也

狂病治法

痰結在胃中不能吐出狂言如見鬼狀時發時止氣塞胷膛以牛肉五斤水二斗煎湯飲之至不可食而止以鵝翎探吐必大吐必吐至如塊黃色頑痰而後止若不吐出再飲之必以吐盡而止前病頓失後以陳皮茯苓甘草白朮湯徐徐飲之平復如故

傷寒發狂至登高而歌棄衣而走見水而入駡詈呼號不避親疏者去生遠矣仲景以竹葉石膏湯救之妙矣蓋陽明之火其勢最烈一發而不可救非用大劑白虎湯何能止其燎原之勢而世人畏首畏尾往往用之而特少其劑是猶杯水救車薪之焰也故用

石膏必須至三四兩或半斤一劑煎服火勢始能少退狂亦可少止也然石膏性猛雖善退火未免損傷胃氣必須與人參兼用爲妙今有一方用白虎湯之半而另加藥味方名祛熱生胃湯石膏元參麥冬各三兩知母三錢人參車前子各五錢茯苓一兩水煎服此方石膏知母以瀉胃火人參以生胃氣元參去浮游之熱麥冬生肺中之陰茯苓車前引火下行於膀胱從小便而出且火盛者口必渴口渴必多飲水吾用此二味以分濕則水流而火自隨水而散矣方中瀉火又不傷氣似勝於白虎湯一劑而狂定二劑而口渴減半三劑而口渴止火亦息正不必用四劑也凡有火熱而發狂或汗如雨下口渴舌燥或如芒刺者以此方投之立效斷不至於死也

生治者乃人未死而若死者用藥以生之也譬如發狂呆病是也發狂多是熱病登高而歌棄衣而走見水而入罵詈之聲叫喊殺人之語不絕於口舌如芒刺飲水不休痰色光亮面如火腫是也方用石膏半斤元參一斤白芥子半夏各三兩知母人參甘草各

一兩麥冬五兩竹葉數百片先用糯米半升煎湯一鍋去其米粒用湯半鍋將前藥煎之取數椀彼索水時與之飲隨索隨與飲盡必睡急再用元參一斤麥冬半斤煎湯候之一醒呼水即以此湯與之彼必欣然自飲服完又必大睡又將查煎湯候之醒後再與彼即不若從前之肯服亦不必强聽其自然可也後用熟地麥冬各三兩元參六兩山茱萸一兩煎二椀與之一劑必愈不必再與此生治之一法也

凡人發狂而止罵詈人不口渴索飲與之水不飲者乃寒證之狂也此得之氣鬱不舒怒氣不能發洩其人平日必懦弱不振今一旦而狂病發作法宜袪痰爲主而佐以補氣之藥方用人參茯神各一兩白朮五錢半夏南星附子各一錢菖蒲三分水煎服此方之妙全在補氣而不十分袪痰蓋寒證發狂與癇證同治加入附子以消其寒氣菖蒲引入心經自然下喉熟睡病如失也加柴胡一錢以舒其肝木之鬱氣尤易奏效

人有終年狂病而不愈者或拿刀殺人或見官大罵

親戚不認兒女不知見水則喜見食則怒此乃心氣之虛而熱邪乘之痰氣侵之也此等證欲瀉火而火在心之中不可瀉也欲消痰而痰在心之中不易消也惟有補脾胃之氣則心自得養不必祛痰痰自化不必瀉火火自無矣方名化狂丹人參白朮茯神各一兩附子一分半夏菟絲子各三錢菖蒲甘草各一錢水煎服一劑狂定再劑病痊此方妙在補心脾胃之三經而化其痰不去瀉火蓋瀉火則心氣愈傷而痰涎愈盛狂將何止乎尤妙用附子一分引補心消痰之劑直入心中則氣尤易補而痰尤易消也

凡人有病發狂如見鬼狀此乃正氣虛而邪氣犯之也似宜正治邪爲是然而邪之所湊其氣必虛不治其虛安問其餘此所以急宜固其正氣而少佐以祛痰祛邪之藥爲妙如發狂見鬼者乃虛也方用人參白朮各一兩半夏天南星各三錢附子一錢大劑灌之狂自定矣

發狂不郑人而不見鬼者乃熱也不可與前湯此見鬼爲虛而非實熱方用人參同入於祛痰祛邪之藥

內乃因其反而反治之也

方

芎藭酒（千金方下同）

治風乘虛經五臟六腑爲癲狂諸邪病悉主之

芎藭　辛夷　天雄　人參　天門冬　柏子仁

磁石　石膏　茵芋　山茱萸　白頭翁　桂心

秦艽各三兩　松蘿　羚羊角　細辛　薯蕷

菖蒲　甘草各二兩　雲母燒令赤爲粉一兩

防風四兩

右二十一味㕮咀以酒二斗漬七日初服二合漸

加至五合日三

續命風引湯

治中風癲眩不知人狂言舌腫出

麻黃　芎藭　石膏　人參　防風各三兩

桂心　甘草　獨活各二兩　防己　附子

當歸各一兩　杏仁三十枚　陳薑三兩

右十三味㕮咀以酒三升水一斗合煎取四升分

四服日三夜一

鴟頭丸

治風癲

葶藶子　鈆丹　虎掌　烏頭　苦蔞根各三分

甘遂　天雄　蜀椒　大戟各二分　鐵精

藺茹各一兩　鴟頭一枚

右十二味爲末蜜丸如梧子大酒下二丸日三服

又方

治狂邪發無常披髮大叫喚欲殺人不避水火

虎睛　露蜂房　鴟頭各一具　楓上寄生五分

石長生十分　茯苓　桂心　防風各三兩

獨活　甘草　人參　天雄各一兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煑取三升分四服日三夜一

抱膽丸（準繩下同）

治男婦一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心幷室女經脉通行驚邪蘊結累效

水銀二兩　乳香去油細研　硃砂一兩細研

黑鉛一兩半

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂滴乳乘熱用柳木槌研勻丸雞頭大每服一丸空心井華水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一丸可除根

五邪湯

治中風神思昏憒五邪所侵或歌或哭或笑或喜或怒發則無時

防風　桂心　白芍藥　遠志　獨活　甘草炙

白朮　人參　秦艽　牡蠣煅　石膏　禹餘糧醋

淬各二兩　雄黃水飛　防風　石菖蒲　茯神

蛇蛻皮炒各一兩

每服四錢水二盞煎一盞去柤溫服不拘時候日進二服

九精丸

一名九物牛黃丸治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時無休止邪氣不能自絕者

牛黃（土精一云火精）　龍骨（水精）　荊實（人精）　元參（元武精）

赤石脂（朱雀精）　玉屑細研（白虎精）　曾青（蒼龍精）

空青研（天精）　雄黃（地精）無石者炒研各一兩

右九味名九精上通九天下通九地爲細末煉蜜和丸如小豆大每服一丸日三服以知爲度

甘遂散（得效方下同）

一名遂心丹治癲癇及婦女心風血邪

甘遂一錢

右爲末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在內合之線縛外用皮紙裹濕慢火煨熟或令焦取藥細研入辰砂末一錢和

勻分作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下再服用別猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者不治

瀉心湯

治心受積熱譫言發狂踰牆上屋

大黄　黄芩　黄連各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

引神歸舍丹

治心氣亦治心風

生天南星刮去皮取心　硃砂水飛各一兩

附子一枚重七錢已上者炮去皮臍

右爲末用猪心血丸梧子大如不稠黏用麪糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服

祕方半夏丸（集驗方）

治心風狂張德明傳其內人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏一兩用生薑汁煎五十沸取出切作塊更煎令熟焙乾爲細末　麝香一錢研　水銀半錢

生薄荷一大握和水銀研如泥
右件藥入薄荷泥內更研千百下丸如芥子大每
服十五丸金銀湯臨臥下三日再服

人參琥珀丸

治癲狂心風

人參　琥珀研　茯神　茯苓　石菖蒲節密者
遠志各半兩溫酒浸半日去心　乳香另研
酸棗仁溫酒浸半日去殼淨紙上炒令香熟
硃砂另研水飛各二錢半
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後
溫酒送下日再服如不能飲棗湯下可常服

寧志丸（得效方）

治心風

好硃砂一兩將熟絹一小片包裹線紮不用研
豶猪心一枚竹刀切開不犯鐵用紙拭去血入硃砂
包於猪心內再用線縛合
右再用甜笋殼重裹麻皮紮定無灰酒二升入銀
器或砂罐內煮酒盡去包取出硃砂另研將猪心

竹刀細切砂盆內研爛却入後藥末硃砂棗肉爲丸畱少硃砂爲衣藥末須隔日研下棗肉於煮猪心日絕早煮熟去皮核取肉四兩入後藥

人參　白茯苓　當歸洗去土及蘆　石菖蒲　乳香另研　酸棗仁五兩許湯浸去皮淨仁炒令赤香熟爲度各半兩

右爲末和丸如梧子大以畱下硃砂爲衣每服五十丸人參湯下

蘂珠丸

治癲狂

大猪心一枚取血　硃砂一兩爲末　靑靛花一匙

右先將靑靛花猪心血一處同研次以硃砂末共丸如梧子大每服二十丸茶酒任下不拘時

天門冬煎

治風癲

天門冬十斤湯浸去心　生地黃肥淨者三十斤

右二味安木臼內搗一二千杵取其汁再入溫湯更搗又取其汁不論幾次直待二藥無味方止以

文武火熬成膏子盛磁器內每服一匙溫酒化下不拘時日進三服

生鐵落飲

生鐵四十斤入火燒赤砧上鍛之有花出如蘭如蛾紛紛墮地者名鐵落用水二斗煑取一斗入後藥

石膏三兩　龍腦研　白茯苓　防風各一兩半

元參　秦艽各一兩

右爲粗散入鐵汁中煎取五斤去查入竹瀝一升和勻溫服二合無時日五服

硃砂丸

鎭心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉　海金砂　天竺黃各一兩　腦子半錢

金銀箔各二十片　生麝香一錢　人參　輕粉

眞犀角各二錢　硃砂五錢

右爲末水丸硃砂爲衣共丸作六百丸每一丸至五丸痰盛潮熱薄荷砂糖生葛自然汁井水下狂言譫語涎壅膈上地龍三兩薄荷及砂糖水研心神不寧金銀箔薄荷湯化下

來甦膏（瑞竹堂）

治遠年近日風癎心病風狂中風涎沫潮閉牙關不開及破傷風搐

皂角一兩肥大不蛀者去皮弦

右將皂角切碎用漿水一大椀春秋浸三四日冬七日夏一二日揉開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內用文武火熬用新柳條槐枝攪熬似膏藥取出攤於夾紙上陰乾收頓如遇病人取手掌大一片用溫漿化在盞內用小竹管盛藥水將病人扶坐定頭微擡起以藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出爲驗要欲涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止忌鷄魚生硬濕麪

洗心散（河間）

治風壅涎盛心經積熱口苦脣燥眼澀多淚大便祕結小便赤澀

白朮一兩半　麻黃和節　當歸　荊芥穗

芍藥　甘草　大黃麪裹煨去麪切焙各六兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七

片水煎服爲末茶清調亦可

寧志膏（本事方）

治癲狂心恙

人參　酸棗仁各一兩　辰砂五錢　乳香二錢半

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸薄荷湯送下予族弟緣兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊傳去服之皆驗

靈苑辰砂散

治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目魂魄不守

辰砂一兩　酸棗仁微炒　乳香各半兩

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調作一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置牀枕令臥病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒卽神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公少時心病服此一劑寤五日方醒遂

瘥

祛風一醉散

治陽厥氣逆多怒而狂

硃砂水飛半兩　曼陀羅花二錢半

右爲細末每服二錢溫酒調下若醉便臥勿令驚覺爲佳有痰者先服勝金丸一方加乳香二錢依前法服之

防己地黃湯

治病如狂狀妄言獨語不休無寒熱其脈浮

防己一錢　桂枝　防風各三錢　甘草二錢

右四味以水一杯漬一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

牛黃膏（河間下同）

治熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢半　硃砂　鬱金　牡丹皮各三錢

腦子　甘草各一錢

右爲細末煉蜜丸如皂角子大新汲水化下

人參散

治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚

龍齒研一兩　人參　赤茯苓　石菖蒲　鬼箭

犀角屑各七錢半

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至七分去查溫服

不拘時

茯神散

治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸恍惚

茯神　遠志　黃連　砂仁各半兩　石菖蒲

人參　麢羊角屑各七錢半　赤小豆四十九粒

甘草二錢半炙

右㕮咀每服五錢水一中盞煎至七分去查溫服

不拘時候

金箔丸

治心臟風邪恍惚狂言意志不定

金箔二百片　膩粉半兩

右用新小鐺子中先布金箔逐重用粉隔之然後

下牛乳一小盞用文火煎至乳盡金箔如泥即於

火上焙乾研爲末蒸餅和丸如小豆大每服五丸食後新汲水下

鎭心丸

治心風狂言多驚迷悶恍惚

牛黃研　鐵粉研　鉛霜各七錢半研　硃砂飛

龍腦研　龍膽草　天竺黃研　遠志　生乾地黃各半兩　金箔五十片　人參　茯神去木

犀角屑各一兩

右爲細末入另研藥和勻煉蜜丸如小豆大每服七丸煎竹葉湯送下不拘時

五苓散（仲景）

瘦人臍下悸吐涎沫而癲眩此水也以此主之

澤瀉一兩一分　桂枝去皮二分　猪苓去皮

茯苓　白朮各三分

右五味爲末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

補心丹（華佗）

治因驚失心或因思慮過當心氣不寧狂言妄語

叫呼奔走

硃砂　雄黃各一分并研　白附子一錢爲末

右拌勻以猪心血丸如梧桐子大更別以硃砂爲衣每服二九臨臥用人參菖蒲湯下常服一粒能安魂魄補心氣鎮神靈

控涎丹（良方下同）

治痰迷心竅狂言譫語如有所見

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子微炒各等分

右爲末薑糊丸每用薑湯下十九食後臨臥服

牛黃瀉心湯

治心經邪熱狂言妄語心神不安

腦子另研　牛黃另研　硃砂另研各一錢半

大黃生一兩

右各研爲細末和勻再研每服三錢凉生薑蜜水調下

薯蕷丸（千金方下同）

治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲

薯蕷二十八分　生甘草二十分　鹿角膠

大豆黃卷　桂心各七分　乾地黃　神麴

當歸　人參各十分　麥門冬　防風　黃芩

芍藥　白朮各六分　柴胡　桔梗　茯苓

杏仁　芎藭各五分　白蘞　乾薑各三分

大棗一百枚取膏

右二十二味爲末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一丸日三

雄雌丸

治風癲失性顛倒欲死

雄黃　雌黃　眞珠各一兩　鉛二兩熬令成屑

丹砂一分　水銀八分

右六味爲末以蜜搗三萬杵丸如胡豆先食服二丸日二稍加以知爲度

又方

治百二十種風癲癎驚狂發卽吐沫不識人者四月五月宜服之

紫石英　芍藥　龍骨（一作黃芩）　青石脂　白蘚皮

麻黃去節　當歸　甘草　苦蔞根　桂心

人參各二兩　牡蠣三兩　大黃五兩

右十三味治下篩爲粗散分作七顆每以大棗十枚水三升煮取二升半去滓下一顆大棗汁中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖卽瘥

白金丸

治癲狂因憂鬱而得痰涎包絡心竅者

白礬三兩　鬱金七兩

米糊爲丸每服五十丸水送下

壽星丸（濟生方）

治因病驚憂涎留心胞精神不守譫言妄語不得安臥

生天南星一斤　琥珀別研一兩　硃砂水飛二兩

右爲細末和勻用生薑自然汁打麪糊爲丸如菉豆大每服四十丸不拘時候用人參石菖蒲煎湯送下淡薑湯亦得若心氣狂甚入鐵艷粉一兩

桃核承氣湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹

結者乃可攻之宜用此藥

大黃四兩　桂枝去皮　甘草炙　芒硝各二兩

桃仁去皮尖雙仁者五十箇搥碎

右剉如麻豆大每服五錢匕以水二大盞煎至八分去滓下硝煎化溫服以微利爲度未利再服

抵當丸

治畜血如狂

水蛭熬去子杵碎（水蛭再生爲害尤甚須剉斷以石灰同炒過再熬）

蝱蟲去翅足熬各五箇　桃仁四箇去皮尖

大黃三分去皮淨

右搗篩只爲一丸以水一大白盞煎至七分頓服晬時當下血不下更作之或剉如麻豆大作二服以水二盞煎至七分去滓溫服名抵當湯

葶藶苦酒湯

治傷寒七八日內熱不解陽毒發狂

苦酒一升半（米醋也）　生艾汁半升（無生艾煑熟艾汁或艾根搗汁）

葶藶杵熬膏一合

右煎取七合作三服

陽毒升麻湯

治傷寒一二日變成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利脉浮大數面赤斑斑如錦紋喉咽痛下膿血五日可治七日不可治也

升麻二分　犀角屑　射干　人參　黃芩

甘草各一分

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓飲一盞食頃再服溫覆手足出汗汗出則解不解重作

大黃散

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

川大黃一兩半切　桂心三分　甘草炙微赤

木通切　大腹皮切各一兩　川芒硝二兩

桃仁二十一枚湯浸去皮尖雙仁麸炒令微黃

右件搗爲粗末每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服以通利爲度

梔子仁湯

治陽毒發狂

梔子仁　大青　知母　赤芍藥各一兩　升麻
黃芩　石膏　杏仁浸去皮尖麩炒微黃各二兩
柴胡一兩半　甘草半兩炙赤剉
右件搗爲粗末每服抄四錢以水一中盞入生薑半分豉一百粒煎至六分去滓不拘時候溫服

三一承氣湯

治傷寒雜證腹滿咽乾煩渴譫妄狂癲一切實熱
大黃　芒硝　厚朴　枳實各半兩　甘草一兩
右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝煎數沸去滓服

黃連解毒湯

治傷寒雜病狂躁熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳爲陰毒者
黃連　黃蘗　黃芩　大梔子各半兩
右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞去滓溫服

加減小續命湯（綱目下同）

治中風或歌或哭或笑語無所不及

麻黃三兩　人參　白朮土炒　桂枝各二兩
當歸一兩　杏仁去皮尖炒研　芎藭酒洗
白芍酒炒　甘草炙　黃芩酒炒　防己各八錢
右爲末每三錢水煎服

一醉膏

治心恙

無灰酒二椀　香油四兩
和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下卽安矣

當歸承氣湯

治陽厥狂癲

當歸　大黃各一兩　甘草半兩　芒硝七錢
右剉如麻豆大每二兩水一大椀薑五片棗十枚煎至一半去查熱溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加薑棗者胃屬土此引入胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大

利爲度徹緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之

鵲石散

治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋

黃連　寒水石各等分

右爲細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

防風黃連湯

治傷寒心風狂妄者

黃連　大黃　防風　遠志　茯神各半兩

右爲細末每服一兩水煎服

調胃承氣湯（仲景下同）

治傷寒陽證發狂

大黃三兩清酒浸去皮　甘草二兩炙　芒硝半斤

右三味㕮咀以水三升煑取一升去滓內芒硝更上火微煑令沸少少溫服

乾薑附子湯

治傷寒陰證發狂

乾薑一兩　附子一枚生用去皮破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

二白丸（元戎）

治痰涎爲病患以致癲癇狂妄驚悸等證

白礬一兩　輕粉一字或半錢量虛實加減

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐子大每服二三十九生薑湯下小兒如黍米大

碧霞丹（局方下同）

治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癲癇狂妄等證

石綠半兩水飛九度　附子尖　川烏頭尖

蠍梢各二十箇

右爲末入石綠合勻麪糊爲丸如雞頭實大每服一丸薄荷湯化下更以溫酒半合飲之須臾吐出痰涎然後隨證以他藥治之如口噤者斡開灌之

牛黃清心丸

治心氣不足神志不定驚恐癲狂語言讝妄虛煩少睡甚至棄衣而走登高而歌踰垣上屋等證

羚羊角　麝香　龍腦各一兩　人參　神麴炒

蒲黃炒各二兩半　白茯苓　牛黃研　柴胡
桔梗各一兩二錢　川芎　杏仁去皮尖及雙仁麩
炒黃另研各一兩二錢半　防風　白朮　白芍
麥門冬　黃芩　當歸去頭各一兩半　阿膠炒
乾薑炒　白蘞各七錢半　雄黃水飛八錢
甘草剉五兩　山藥炒七兩　大豆黃卷炒
肉桂去皮各一兩七錢半　金箔一千四百片
大棗一百箇蒸黑去皮核研膏　犀角末二兩
右除棗杏仁金箔外牛黃龍腦麝香雄黃四味研爲細末入餘藥和勻煉蜜入棗膏爲丸每兩作十丸金箔爲衣每服一丸食後溫水化下

寧志化痰湯（陳白埜方）

治癲狂心虛痰盛之證

膽星　半夏製　陳皮　茯苓　天麻　人參
黃連薑汁炒　酸棗仁　石菖蒲各一錢
右剉一劑生薑五片水煎服再服清心養血湯

清心養血湯

治心虛癲狂

人參　白朮　茯神　遠志　棗仁炒　川芎

生地黃各一錢　當歸一錢五分　甘草五分

右剉一劑加龍眼五箇水二盞煎八分空心服

河車丸（醫鑑下同）

治久患心風癲氣血兩虛之證

紫河車不拘幾箇焙極乾

右爲末煉蜜爲丸梧子大每七十丸空心酒下

開迷散

治婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋乃營血逆於心胞所致

當歸　白朮炒　白芍藥　蘇木　紅花各一錢

柴胡　白茯苓各八分　甘草炙七錢　桃仁

遠志　生地黃各一錢五分

右剉生薑煎服或用此方煉蜜爲丸辰砂爲衣

防風通聖散

治一切癲狂風疾暴發之證

防風　川芎　當歸　白芍藥　大黃　芒硝

連翹　麻黃不去節　薄荷各四分　石膏

桔梗　黃芩各八分　滑石二錢四分　白朮
山梔仁　荆芥各二分　甘草炙一錢

右㕮咀生薑三片水二盞煎一盞溫服

祛風至寶丹

治癲癇

防風　薄荷葉　荆芥穗　羌活　獨活　連翹
黃芩　黃蘗　黃連　梔子仁　全蠍　天麻
細辛　枳實　桔梗　大黃　芒硝　生地黃
石膏　甘草各一兩　鹽梅肉五十箇　赤芍
乾葛　細茶各一兩半　麻黃三錢（臨證酌用）

右藥俱用溫水洗火焙乾爲末煉蜜爲丸彈子大硃砂爲衣每服二丸無時細嚼併臥時茶酒任下

如血虛加芎歸各一兩

氣虛加人參白朮各一兩

鬱金丸（良方）

治失心及心恙風

鬱金七兩　白礬三兩

右爲細末薄糊爲丸如梧桐子大每服六十丸湯

水任下不拘時服有患癲狂數年者服之皆愈至人授此初服心胷間有物脫去神氣洒然再服而甦此經憂戚痰絡於心竅所致也

黃石散（楊氏家藏）

治心風發狂

狗肝一具批開　黃丹　硝石各二錢半

右二味研勻摻在肝內用麻縛定水一升煮熟細嚼以本汁送下

清心湯（醫統下同）

治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃連　黃芩　薄荷　連翹　梔子仁　甘草
大黃　芒硝各等分

右水盞半竹葉十箇煎八分溫服

抱膽丸

治男女一切癲狂風癇及婦人產後驚風入心室女經行驚氣蘊結頓服此藥屢效

硃砂二兩　黑鉛兩半　乳香細研　水銀各一兩

右將鉛入銚內下水銀結成砂子下乳香乘熱用

柳木槌擂勻丸如雞頭子大每服一丸空心井華水下得睡切莫驚動覺來則安再進一丸除根

五膽丸

治癲狂風癇妄走

羊膽　猪膽　狗膽　雞膽　鯉魚膽各一枚傾汁作一處　蛇黃五兩煅紅食膽汁盡爲度

右爲末另以膽汁和丸菉豆大硃砂爲衣每服十五丸食後以磨刀汁吞下或用末以磨刀水調服

奪命丹

治癲癇痰盛

青蒙石每兩用火硝一兩和同煉如金色

研末每服一錢薄荷自然汁加蜜調下良久其藥自裹痰下墜甚者三服愈

牛黃丸

治癲狂風癲心風邪氣驚心神不守舍時發無常仆地吐涎不自知覺

牛黃　珍珠　麝香　水銀各五分　硃砂

龍齒各另研　犀角　琥珀各二錢　人參

茯苓　天門冬　麥門冬去心各四錢　防風
黃芩　知母　龍膽草　石菖蒲　全蠍　芍藥
甘草各半兩　露蜂房三錢　金銀箔各七十片
右除另研藥外餘爲細末共和勻入煉蜜和搗千杵丸桐子大每服十五丸食後臨夜新竹葉湯下

烏巴丸

治癲狂熱結亂叫不止
烏梅五箇　巴豆五粒去油成粉
二味同研粥丸如黍米大硃砂爲衣大人三五丸臨臥白湯送諒下三四行白粥止之

正心湯

治七情五志久逆心風妄言妄笑不知所苦
人參　茯神　當歸酒洗　生地黃酒洗各一錢
羚羊角鎊　甘草炙　棗仁炒研　遠志各八分
右㕮咀水二盞蓮子七枚煎七分去查入羚羊角末麝香一分和勻食後臨臥服

清心丸

治心受邪氣精神恍惚狂言呼叫睡臥不安

人參　生地黃酒洗　鬱金　天麻各一錢

硃砂　牛膽南星各二錢

右爲末蒸餅丸黍米大硃砂爲衣每服三十丸人參湯下

金銀定志湯

治心風失志妄行妄語

當歸酒浸　人參　益智各一錢　甘草　茯神

石菖蒲各七分　五味子十五粒　琥珀另研

羚羊角鎊各五分

右以琥珀羚羊角另放餘水二盞金銀各一兩同煎至八分去滓入珀角二末調勻服

琥珀茯苓膏

治精神失守漸成心風

人參一兩　陳皮半兩　當歸二兩酒浸剉三味熬稀膏一椀　白茯苓二兩爲末　琥珀半兩另爲末

右將人參膏加琥珀茯苓末調勻如稠甚加蜜汁調之得所每服二三匙嚼嚥下不時臨臥服亦妙

歸神丹（百一選方）

治一切驚憂思慮多忘心氣不足癲癇狂亂

豶猪心二箇切　入大硃砂二兩　燈心三兩在內麻紮石器煑一伏時

取砂爲末以茯神末二兩酒打薄糊丸桐子大每服九丸至十五丸至二十五丸麥門冬湯下甚者乳香人參湯下

大補元煎（景岳全書下同）

治氣血大壞精神失守癲狂等證

人參少則一二錢多則一二兩　山茱萸一錢　山藥炒　杜仲各二錢　當歸　枸杞各二三錢　熟地少則二三錢多則二三兩　炙甘草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

大和中飲

治飲食留滯積聚癲狂等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂　麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

七福飲

凡癲狂氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　杏仁二錢

白朮炒一錢半　炙甘草一錢　遠志三五分製

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

二陰煎

治心經有熱驚狂失志多言多笑等證宜此主之

生地　麥冬各二三錢　棗仁炒二錢　白茯苓

元參　木通各一錢半　黃連一二錢　甘草一錢

水二鍾燈草二十根竹葉亦可煎七分食遠服

六安煎

治痰滯氣逆癲狂等證

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草

杏仁去皮尖各一錢　白芥子五七分（老弱不用）

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠服

排氣飲

治氣逆癲狂等證

陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　厚朴一錢

木香七分或一錢　香附　澤瀉　烏藥各二錢

水一鍾半煎七分熱服

抽薪飲

治諸凡癲狂火熾盛而不宜補者

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢

枳殼　澤瀉各錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

清膈煎

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴癲狂等證

陳皮錢半　貝母二三錢微敲破　膽星一二錢

海石二錢　白芥子五七分　木通二錢

水一鍾半煎七分溫服

服蠻煎

此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地　麥門冬　芍藥　石菖蒲　石斛　丹皮

茯神各二錢　陳皮一錢　木通　知母各一錢半

水一鍾半煎七分食遠服

玉泉散

一名一六甘露散治陽明內熱癲狂等證

生石膏六兩　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下此方加硃砂三錢亦妙

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六八六五

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十七卷目錄

醫部彙考二百九十七

癲狂門三

單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百十七卷

醫部彙考二百九十七

癲狂門三

單方

凡狂癲謬亂不識人伏龍肝末水服方寸匕每日三服（千金方）

失心風疾水銀一兩藕節八箇研成砂子丸如芡子大每服二丸磨刀水下一二服（經驗方）

病笑不休滄鹽煅赤研入河水煎沸啜之探吐熱痰

數升即愈（儒門事親）

卒發癲狂葶藶一升擣三千杵取白犬血和丸麻子大酒服一丸三服取瘥（肘后方）

風癲發作則吐耳如蟬鳴引脇牽痛天門冬去心皮暴擣爲末酒服方寸匕日三服久服良（外臺祕要）

癲癇風疾九節菖蒲不聞雞犬聲者去毛木臼擣末以黑豮猪心一箇批開砂罐煮湯調服三錢每日三服（正傳）

風癲百病麻子四升水一升猛火煮令芽生去查煎取二升空心服之或發或不發或多言語勿怪之但令人摩手足須臾即定凡進三劑無不愈（千金方）

風痰癲疾茶芽梔子各一兩煎濃汁一椀服良久即吐（摘元方）

風癲用地黃三十斤天門冬十斤二味擣取汁作煎服之瘥（千金方下同）

又方莨菪子三升擣篩酒一斗漬半日絞去滓湯中煎令可丸先食服如小豆二丸加至如梧子二丸以知爲度額上手中從文理中赤起是知也無此候更

服病日發者三日愈間日發者十日愈五日發者二十日愈半歲發者一月愈

狂邪風癲不避水火苦參五斤蜜和丸如酸棗大每服十九薄荷湯化下（綱目）

又方令患人著地仰臥以冷水終日淋其面良

癲癇瘈瘲飛鴟頭二枚鉛丹一斤為末蜜丸梧子大先食服三九日三劇者夜一稍加之（千金方）

風狂歌笑行走不休用豭猪肉一斤煮熟切膾和醬食或羹粥炒任服之（心鏡）

風疾恍惚心煩腹痛或時悶絕復甦以青羖羊角屑微炒為末無時溫酒服一錢（聖惠方）

凡狂發欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此為邪祟以蠶紙燒灰酒水任下方寸匕亦可治風癲（肘后方）

久癲失志氣血虛弱者用河車治淨爛煮食之（經驗方）

傷寒發狂踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢為末煎甘草冷服名鵲石散（本事方）

風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土壅起經宿取出入甘草末

天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下（集驗方）

傷寒發狂驚怖恍惚用撒法郎二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳（醫林集要）

癲狂邪疾防葵研末溫酒服一刀圭至二三服身瞤及小不仁爲效（肘后方）

卒發狂癲燒自經死繩末水服三指撮陳蒲煮汁服亦佳（藏器）

傷寒發狂煩躁熱極吞生鷄子一枚效（食鑑）

傷寒時氣溫病六七日熱氣發狂見鬼欲走取白狗從背破取血乘熱攤胷上冷乃去之此治垂死者亦活無白犬但純色者亦可（肘后方）

熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以泥固濟煅半日去火毒研末新汲水服三錢未退再服（斗門方）

大熱狂渴乾陳人屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清細細與飲卽解世俗謂之地清（寇宗奭衍義）

人魄鎭心安神魄定驚怖癲狂磨水服之（時珍）

胞衣水主治狂言妄語頭上無故髮豎虛痞等證天行熱病飲之立效（藏器）

烏頭附子尖爲末茶服半錢吐風痰癲癇（時珍）

狐肉羹治驚癇恍惚語言錯謬歌笑無度及五臟積冷蠱毒寒熱諸病用狐肉一片及五臟治淨入豉汁煮熟入五味作羹或作粥食京中以羊骨汁鯽魚代豉汁亦妙（心鏡）

銀屑主治熱狂驚悸發癇水磨服之功勝紫雪（開寶）

吐癲狂方此方可代瓜蔕三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不通等證皆可以此吐之用蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃卽當吐出卽有吐不盡者亦必從下行矣

又法蘿蔔子爲末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

又法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入以水煑至將滾未滾之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之每用半椀漸次增飲自然發吐以去病爲度而止

癲風用鯉魚一尾製淨切成塊以明礬四兩爲末醃

二日煎吃其疾必愈

又方以鐵漿服之

癲狂大叫奔走用蝦蟆一隻去腹中物洗淨將腸胃復入腹中入罐固濟煅紅土掩定隔夜取出入麝香一分同研極細每服一錢新汲水下

暴狂以硃砂末酒調服方寸匕日三次

鍼灸

素問曰病在諸陽脈且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脈視分盡熱病已止

病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病刺諸分諸脈其無寒者以鍼調之病已止

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脈引衝頭也

靈樞曰足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘖實則狂癲虛則足不收脛枯取之所別也

癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而止

癲疾始作而引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強者攻其左血變而止

癲疾始作先反僵因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而止

治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視其有過者瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骶骨也

筋癲疾者身倦攣急大刺項大經之大杼脉嘔多沃沫氣下泄不治

脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿灸之挾項太陽灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多沃沫氣下泄不治

狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑治之取手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明

狂始發少臥不饑自高賢也自辨志也自尊貴也善罵詈日夜不休治之取手陽明太陽太陰舌下少陰視之盛者皆取之不盛釋之也

狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐治之取手陽明太陽太陰

狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也治之取手太陽太陰陽明足太陰頭兩顑

狂者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜治之取足太陰太陽陽明後取手太陰太陽陽明

狂而新發未應如此者先取曲泉左右動脉及甚者見血有頃已不已以法取之灸骶骨二十壯

熱病數驚瘛瘲而狂取之脉以第四鍼急瀉有餘者

癲疾毛髮去索血於心不得索之水水者腎也

大熱徧身狂而妄見妄聞妄言視足陽明及大絡取之虛者補之血而實者瀉之因其偃臥居其頭前以

兩手四指挾按頸動脈久持之卷而切之下至缺盆中而復止如前熱去乃止此所謂推而散之者也

甲乙經曰癲疾嘔沫神庭及兌端承漿主之其不嘔沫本神及百會後頂玉枕天衝大杼曲骨尺澤陽谿外丘當上脘旁五分通谷金門承筋合陽主之合陽在委中下二寸

癲疾上星主之先取譩譆後取天牖風池

癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫顖會主之

癲疾狂走瘛瘲搖頭口喎戾頸強強間主之

癲疾瘛瘲狂走頸項痛後頂主之後頂在項後一寸五分

癲疾骨痠眩狂瘛瘲口噤（千金作喉噤）羊鳴刺腦戶

癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘛瘲絡却主之

癲疾大瘦腦空主之

癲疾僵仆狂瘧完骨及風池主之

癲疾互引天柱主之

癲疾怒欲殺人身柱主之（千金又云瘛瘲身熱狂走譫語見鬼）

狂走癲疾脊急強目轉上揷筋俞主之

癲疾發如狂走者面皮厚敦敦不治虛則頭重洞泄淋癃大小便難腰尻重難起居長強主之

癲疾憎風時振寒不得言得寒益甚身熱狂走欲自殺目反妄見瘛瘲泣出死不知人肺俞主之

癲疾膈俞及肝俞主之

癲疾互引水溝及齗交主之

癲疾狂瘛瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出聽宮主之

癲疾互引口喎喘悸者大迎主之及取陽明太陰候手足變血而止

狂癲疾吐舌太乙及滑肉門主之

癲疾多言耳鳴口僻頰腫實則聾齲喉痹不能言齒痛鼻鼽衄虛則痹鬲俞偏歷主之

癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼溫溜主之在腕後五寸

目不明腕急身熱驚狂躄痿痹瘛瘲曲池主之

癲疾吐舌曲池主之

熱病汗不出狂互引頸嗌外腫肩臂痠重脅腋急痛不舉痂疥項不可顧支溝主之

癲疾吐血沫出羊鳴戾頸天井主之在肘後

熱病汗不出狂互引癲疾前谷主之

狂互癲疾數發後谿主之

狂癲疾陽谷及築賓通谷主之

癲疾狂多善食善笑不發於外煩心渴商丘主之

癲疾短氣嘔血胷背痛行間主之

痿厥癲疾洞泄然谷主之

狂癲陰谷主之

癲疾發寒熱欠煩滿悲泣出解谷主之

癲疾互引僵仆申脈主之先取陰蹻後取京骨頭上五行目反上視若赤痛從內背始復下半寸各三痏左取右右取左

寒厥癲疾噤吩瘛瘲驚狂陽交主之

癲疾狂妄行振寒京骨主之

身痛狂善行癲疾束骨主之補諸陽

癲疾僵仆轉筋僕參主之

癲疾目䀮䀮鼽衄崑崙主之

癲狂疾體痛飛揚主之

癲疾反折委中主之

短氣心痹悲怒逆氣怒狂易魚際主之

狂易多言不休及狂走欲自殺及目妄見刺風府

身熱狂走讝語見鬼瘛瘲身柱主之

狂妄言怒惡火善罵詈巨闕主之

狂歌妄言怒惡人與火罵詈三里主之

狂易魚際合谷腕骨支正少海崑崙主之

狂言太淵主之

狂言笑見鬼取之陽谿及手足陽明太陰

狂疾掖門主之又俠谿丘墟光明主之

狂互引頭痛耳鳴目痹中渚主之

狂仆溫溜主之

狂妄走善欠巨虛上廉主之

狂易見鬼與火解谿主之

千金方曰解谿陽蹻主癲疾

腦戶聽會風府聽宮翳風主骨痠眩狂瘛瘲口噤喉鳴沫出瘖不能言

臑會申脈主癲疾湊氣

五處身柱委中委陽崑崙主脊强反折瘛瘲癲疾頭痛

尺澤然谷主癲疾手臂不得上頭

曲池少澤主瘛瘲癲疾

飛揚太乙滑肉門主癲疾狂吐舌

溫畱僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼

筋縮曲骨陰谷行間主驚癇狂走癲疾

完骨主癲疾僵仆狂瘧

天井小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸

天衝主頭痛癲疾互引數驚悸

風池聽會復畱主寒熱癲仆

腦空束骨主癲疾大瘦頭痛

風府崑崙束骨主癲疾大瘦頭痛

攢竹小海後頂强間主癇發瘛瘲狂走不得臥心中煩

大人癲小兒驚癇灸背第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折令各等而叅合如△字以一角挂中央灸下二

角俠脊兩邊便灸之凡五處也故畫圖扗以丹扗所灸五處各百壯削竹皮爲度勝繩也

卒癲灸陰莖上宛宛中三壯得小便通卽瘥（千金翼云當尿孔上是穴）

又法灸陰莖頭三壯

又法灸足大趾上聚毛中七壯

又法灸囊下縫中二七壯

又法灸兩乳頭三壯

又法灸督脉三十壯三報穴在直鼻中上入髮際

又法灸天窻百會各漸灸三百壯炷惟小作

又法灸耳上髮際各五十壯

倉公法狂癎不識人癲病眩亂灸百會九壯

狂走掣瘲灸玉枕上三寸一法項後一寸灸百壯

狂走癲疾灸項後二寸十二壯

狂邪鬼語灸天窻九壯

狂走癲疾灸大幽百壯

狂言恍惚灸天樞百壯

狂走癲癎灸季肋端三十壯

狂癇哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後六寸

狂走驚癇灸河口五十壯穴在腕後陷中動脈是

狂癲風癇吐舌灸胃脘百壯不針

狂邪發無常披髮大呼欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使三十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間

狂走喜怒悲泣灸巨覺（亦作巨攢）隨年壯穴在背上甲內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也（骨芒疑膏肓）

狂邪鬼語灸伏兔百壯（前作天窻九壯）

悲泣鬼語灸天府五十壯

悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯

狂邪驚癇病灸承命三十壯穴在內踝後上行三寸動脈上亦灸驚狂走也

狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯

狂癲鬼語灸足太陽四十壯

狂走驚恍惚灸足陽明三十壯

狂癲癇易疾灸足少陽隨年壯

狂走癲厥如死人灸足大趾三毛中九壯（千金翼云灸大敦）

狂走易罵灸八會隨年壯穴在陽明下五分

狂癲驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭鬼語悉灸腦戶風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟皆隨年壯

狂風罵詈撾斫人名爲熱陽風灸兩吻邊燕口處赤白際各一壯

又法灸陰囊縫三十壯令人立以筆正抵當下已臥核卵上灸之勿令近前中卵核恐害陽氣也

狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白際一壯

又法灸兩肘內屈中五壯

又法灸背胛中間三壯報灸之倉公法神效

卒狂言鬼語以甑帶急合縛兩手大指便灸左右脅下對屈肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手

風府肺腧主狂走欲自殺

絡却聽會身柱主狂走瘛瘲

天柱臨泣主狂易多言不休目上反

支正魚際合谷少海曲池腕骨主狂言驚恐

溫畱掖門京骨主狂仆

神門陽谷主笑若狂

陽谿陽谷主吐舌戾頸妄言

巨闕築賓主狂易妄言怒罵

衝陽豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉丘墟主狂言非常

勞宮太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止

風府崑崙束骨主狂易多言不休

丹溪心法曰卒狂言鬼語針大拇指甲下即止

醫學綱目曰秦承祖灸鬼法孤魅神邪癲狂諸病并小兒驚癇兩手大拇指用軟繩急縛之灸三壯艾炷著四處半在甲半在肉上四處盡燒一處不著其疾不愈神效難量此法累用累效

狂發怒欲殺人見鬼灸明堂身柱後谿身柱在三椎節下間

呆痴灸神門一穴沿皮向前三分先補後瀉又後谿補生瀉成

又法太鍾

失志呆痴取神門中衝鬼服鳩尾百會

心悶不已取支溝

傷寒發熱不識尊卑取曲池絕骨百勞湧泉

本草綱目曰癲癇諸風熟艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

導引

保生祕要曰風病導引法先念背而通至四肢又從四肢轉骨輪處想火燒之瘋氣結處折開環轉推散

癲狂導引法先將手把他手尺部拿住又將手把他手中指之脉通心者以指甲掐之後又把他心頭推開痰出至神定時敎他念臍守之久久復心頭推開分兩邊下穀道去

醫案

千金方曰唐相國寺僧允惠患癲疾失心經半年徧服名醫藥不效僧俗兄潘氏家富召孫思邈療之孫曰今夜睡著明後日便愈也潘曰但告投藥報恩不忘孫曰有鹹物但與師吃待渴却來道夜分僧果渴孫至遂求溫酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法孫曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸棗仁乳香散也人不能用耳又

正肅吳公少時心病服前方一劑五日方寤遂瘥

儒門事親曰一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如蟲行兩手爬搔數年不已戴人診其兩手脈皆洪大如絙繩斷之曰口爲飛門胃爲賁門曰口者胃之上源也鼻者足陽明經起於鼻交頞之中旁約太陽下循鼻柱交人中環脣下交承漿故其病如是夫徭役煩擾便屬火化火乘陽明經故發狂故經言陽明之病登高而歌棄衣而走駡詈不避親疎又況肝主謀膽主決徭役迫遽而財不能支則肝屢謀而膽屢不能決屈無所伸怒無所泄心火磅礴遂乘陽明經然胃本屬土而肝屬木膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂乃命置燠室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水與瘀血相雜而下數升取之乃康以通聖散調其後

項關令之妻病饑不欲食常好叫呼怒駡欲殺左右惡言不輟衆醫皆處藥幾半載尚爾戴人曰此難以

藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其婦人大笑次日又作角觝又大笑常以兩箇能食之婦誇其食美病婦索其食而一嘗之數日怒減食增不藥而瘥後得一子夫醫貴有才無才何足應變無窮

一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疎棄衣而走罵詈涌出氣力加倍三五人不能執縛燒符作醮問鬼跳巫殊不知顧丹砂牛黃犀珠腦麝備嘗貲財散去室中蕭然不遠二百里而求戴人一往戴人以車輪埋之地中約高二丈許上安之中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛狂病人於其上使之伏臥以軟裀襯之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝病人曰我不能任可解我下從其言而解之索凉水與之氷水飲數升狂方罷矣

一狂人陰不勝其陽則脈流薄厥陽并乃狂難經曰重陽者狂重陰者癲陽爲腑陰爲臟非陽熱而陰寒也熱并於陽則狂狂則生寒并於陰則癲癲則死內經曰足陽明實則狂故登高而歌棄衣而走無所不

爲是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五五六十日下百餘行吐亦七八度如吐時暖室置火以助其熱而汗少解數汗方平

丹溪心法曰外弟歲一日醉飽後亂言妄語妄見詢之係伊亡兄附體言生前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪食腥與酒太過痰所爲耳灌鹽湯一大椀吐痰一二升汗因大作困睡一宵而安

金氏婦壯年暑月赴筵婦乃姑詢其坐次失序遂赧然自愧因成此病言語失倫其中又多問一句曰奴奴不是脉皆數而弦余曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而呪之旬餘而死或問曰病非邪而邪治之何遽至於死余曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而況舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺是驚其神而血不寧也噴以法水是實其體密其膚使汗不得泄也汗不泄則蒸熱內燔血不得寧則陰消而陽不能獨立也不死何俟或曰外臺祕

要有禁呪一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪外有實邪當用正大之法自有成式昭然可考然符水惟膈上熱痰一呷凉水胃熱得之豈不淸快亦可取安若內傷而虛與冬受嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在裏熱邪在表須以汗解卒得淸冷膚腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖爭去死爲近

衞生寶鑑曰甲寅歲四月予隨斡耳朶行至界河裏住醜厮兀閭病五七日發狂亂棄衣而走呼叫不避親疎手執潼乳與人飲時人皆言風魔了巫師禱之不愈反劇上聞命予治之脈得六至數日不得大便渴飲潼乳予思北地高寒腠理緻密少病傷寒者然北地此時乍寒乍熱因此觸冒寒邪失於解利因轉屬陽明證胃實譫語又食羊肉以助其熱兩熱相合是謂重陽者狂陽勝宜下急以大承氣湯一兩半加黃連二錢水煎服之是夜下利數行燥屎二十餘塊得汗而解翌日再往視之身凉脈靜衆人皆喜曰羅謙甫醫好風魔也由此見用傷寒非雜病之比六經

不同傳變各異診之而疑不知病源互相侮謗嗚呼嗜利貪名恥於學問此病何日而愈耶

醫學綱目曰浙江一婦人癲狂不止醫以瓜蔕半兩爲末每一錢重井華水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自此無恙

許氏病陽厥狂怒罵詈不避親疎或哭或歌六脉舉按無力身表如冰若發卽叫呼聲高潔古云奪食則已因不與之食予用大承氣湯下之得臟腑查穢數升狂稍寧數日復發復下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脉生良愈此易老奪食之法也

戊申年一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如痴予與驚氣丸一丸服訖而寐及覺病已失矣

提轄張載陽其妻因避寇失心已數年予授驚氣丸方不終劑而愈

黃彥奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授驚氣丸方去附子加鐵粉亦不終劑而愈

古今醫鑑曰一女子年十五因氣惱患語言顚倒欲咬人打物偷藏東西時哭時笑心怕膽小飲食不知

饑飽身體發熱以防風通聖散加生地黃牡丹皮二服即安

萬病回春曰一婦人發狂棄衣而走踰垣上屋不識親疎狂言妄語人拿不住諸醫措手余令家人將凉水亂潑不記數須臾倒仆診其脉六部俱弦數有力乃熱極生風也用防風通聖散加生地黃黃連桃仁紅花牡丹皮三劑而安後服祛風至寶丹全愈

薛氏醫按曰一僕人五月間病熱口乾脣乾讝語診其脉細而遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脉如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣

應天王治中遍身發黃妄言如狂苦於胷痛手不可近此中焦畜血爲患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而愈

太守朱陽山弟下部畜血發狂用抵當湯而愈

證治準繩曰滑伯仁治一僧病發狂譫妄視人皆爲鬼診其脉累累如薏苡子且喘且搏曰此得之陽明胃實素問云陽明主內其經血氣俱多甚則棄衣升

高踰垣妄罵遂以三化湯三四下復進以清火之劑即愈

一人方飯間坐甫定即搦爐中火雜飯猛噬且喃喃罵人令左右掖而脈之皆弦直上下行而左手寸口尤浮滑蓋風痰留心胞證也法當湧其痰而凝其神湧出痰沫四五升即熟睡次日乃寤寤則病已去矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十八卷目錄

醫部彙考二百九十八

　癎門

黃帝素問（大奇論）

靈樞經（經脈篇）

孫思邈千金方（癎）

嚴用和濟生方（癎病論證）

張從政儒門事親（癎）

朱震亨心法（證治）
虞摶醫學正傳（癇證　脈法）
樓英醫學綱目（證治）
李梴醫學入門（與癲狂不同　癇只一痰　名分五種　痰火與驚　治法）
龔信古今醫鑑（證治）
張三錫醫學準繩六要（總論）
王肯堂證治準繩（證治）
張介賓景岳全書（癇病論證　論治　癡獃證治）
陳士鐸石室祕籙（治法）

方
千金治癇方　虎睛丸　又方　雄雌丸　又方　龍腦安神丸　龍齒丹　三聖散　楊氏五癇丸　犀角丸　參硃丸　琥珀壽星丸　升陽湯　妙功丸　風引湯　又方　神應丹　珠子辰砂丹　五生丸　勝金丸　虎睛丸　控涎丸　抵住丸　又方　醫癇無雙丸　又方　鴟頭丸　蛇黃丸　惺神散　乳硃丹　防風通聖散　安神丸　烏龍丸　神應丹　墜痰丸　沉香天麻湯　錢氏五色丸　礬丹丸　朱砂滾涎丸　碧霞丹　加減壽星湯　清神丹　壯膽星硃丹　丑寶丸　追風祛痰丸　清心滾痰丸　祛風至寶丹　遂心丹　大補元煎　七福飲　六安煎　清膈煎　排氣飲　大和中飲
單方
鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百十八卷

醫部彙考二百九十八

癇門（此當與癲狂門互參）

黃帝素問

大奇論

二陰急爲癇厥

註　二陰少陰也癇厥乃水氣乘心故二陰脉急

心脉滿大癇瘛筋攣肝脉小急癇瘛筋攣

註　此肝臟虛寒而不能榮養於筋故爲攣瘛之病

靈樞經

經脉篇

膀胱足太陽之脉是主筋所生病者痔瘧狂癎疾

（註）經絡厥逆於下則爲癎爲狂也

唐孫思邈千金方

癎

癲病有五一曰陽癲發時如死人遺溺有頃乃解二曰陰癲坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反急强羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因以房室過度醉飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之（按此乃癎病前人咸列於癲證中蓋癲癎之病狀異而病因則同今分之爲是）

宋嚴用和濟生方

癎病論證

夫癎病者考之諸方所說名證不同難於備載觀別錄有五癎之證一曰馬癎作馬嘶鳴應乎心二曰羊

癇作羊叫聲應乎脾三曰雞癇作雞叫聲應乎胃四曰猪癇作猪叫聲應乎腎五曰牛癇作牛吼聲應乎肺此五癇應乎五畜五畜應乎五臟者也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搐搦背脊强直食頃迺醒原其所自皆由驚動臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經故有是證或在母腹中受驚或幼小受風寒暑濕或因饑飽失宜逆於臟氣而得之者各隨所感施以治法

夫癇病者十歲以下爲癇大抵其發之原皆因三種風癇驚癇食癇是也因此三種變作諸癇若不早治久成痼疾其發之狀卒然口眼相引或目睛上搖或手足掣縱或背脊强直頸項反折或搖頭弄舌或數齧齒皆其證也但正發搐掣之時勿捉持之捉之則曲捩不隨也

元張從政儒門事親

癇

夫癇病不至於目瞪如愚者用三聖散投之更用大盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖散

百餘日則愈矣至於目瞪愚者不可治內經曰神不得守謂神亂也

大凡風癇病發項强直視不省人事此乃肝經有熱也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後可服瀉青丸下之次服加減通聖散顯咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬蒙石代赭石發過米飲調之經云重劑以鎮之

朱震亨心法

證治

驚與痰宜吐大率行痰爲主用黃連南星苦蔞半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者

分痰與熱有熱者以凉藥清其心有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸

大法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍薈丸正宜服之

且如癇因驚而得驚則神不守舍舍空而痰聚也

癇證有五馬牛雞猪羊且如馬癇張口搖頭馬鳴牛癇目正直視腹脹雞癇搖頭反折喜驚羊癇喜揚目

吐舌猪癇喜吐沫以其病狀偶類之耳無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胷背强直叫吼吐沫食頃乃甦宜星香散加全蠍三箇

明虞摶醫學正傳

癇證

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眩仆是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也癇病獨存乎痰因火動之所作也治法癇宜乎吐若神脫而目瞪如愚痴者吾末如之何也已矣

脈法

虛弦爲驚爲風癇沉數爲痰熱滑大者自已沉小急疾者死虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏入臟則死入腑則愈

樓英醫學綱目

證治

癲癇即頭眩也痰在膈間則眩微不仆痰溢膈上則

眩甚仆倒於地而不知人名之曰癲癇徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癇其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癲癇仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫省後不復再發間有發者亦非如癲癇之常發也

治長洪伏三脈風癇驚癇發狂惡人與火者灸第三椎第九椎服局方妙香丸以針穿一眼子納冷水內浸少時服之如本方若治弦細緩三脈諸癇似狂者

李河南五生丸

治風癇病久不能愈者從厚朴丸春秋加添外又於每一料中加人參菖蒲茯苓各一兩五錢和劑服之

凡癲癇及中風中寒中暑中濕氣厥尸厥而昏眩倒仆不省人事者皆由邪氣逆上合陽而亂於頭中也癲癇者痰邪逆上也中風寒暑濕及氣厥尸厥者亦風寒暑濕等邪氣逆上也邪氣逆上則頭中氣亂頭中氣亂則脈道閉塞孔竅不通故耳不聞聲目不識人而昏眩無知仆倒於地也以其病在頭巔故曰癲

疾治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑發散上焦或針灸頭中脈絡而導其氣皆可使頭巔脈道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癲癇之癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王太僕誤分癲爲二疾獨孫眞人始能一之今特冠此氣亂頭巔等經文於癲癇篇首使人知疾有所歸而治有所據也

李梴醫學入門

與癲狂不同

癇與癲狂相似但癇病時發時止邪流五臟癲狂經久不愈邪全歸心

病只一痰

內傷最多外感極少蓋傷飲食積爲痰火上迷心竅驚恐憂怒則火盛神不守舍舍空痰塞丹溪云癇因痰塞心竅發則頭旋卒倒手足搐搦口眼相引胷背强直叫吼吐涎食頃乃醒病先身熱脈浮在表者陽癇屬六腑易治病先身冷脈沉在裏者陰癇屬五臟

難治若神脫目瞪如愚痴者不治

名分五種

癇久必歸於五臟肝癇面靑搖頭喜驚作鷄鳴狀心癇面赤口張搖頭馬嘶脾癇面黃下利吐舌羊吼肺癇面白吐沫腹脹牛吼腎癇面黑直視如尸猪叫此五癇病狀偶類之耳其實痰火與驚三者而已

痰火與驚

肥人多痰動則有聲沫出風痰星香散加全蠍三枚薑煎服或追風祛痰丸五生丸驚痰紫石散驚氣丸抱龍丸三癇丸引神歸舍丹壽星丸因怒者順氣導痰湯加菖蒲辰砂因憂思者妙香散食痰醒脾散

瘦人火盛面赤者防風當歸飲或小調中湯加南星或滾痰丸瀉靑丸牛黃淸心丸龍腦安神丸千金龍膽湯

痰火俱盛者猪心丸溫酒下上吐下利去頑痰老痰爲妙

通用斷癇丹活虎丹蝙蝠散四涎丸紫金錠

治法

癇本痰熱挾驚宜寒藥清心降火化痰爲主故古法用二陳湯加苦蔞南星黃連探吐吐後必服硃砂安神丸以降南方之火當歸龍薈丸以平東方之木但化痰必先順氣順氣必先調中頑痰膠固非辛溫熱藥爲佐何以開導故古方治驚癇皆用溫劑如錢仲陽治小兒癇已經吐瀉及服凉藥過多身冷閉目不食後用益黃散補中能食次服腎氣丸補北方腎水能語此須從權以救癇之壞證可以爲成法

龔信古今醫鑑

證治

夫癇者有五等而類五畜以應五臟發則卒然倒仆口眼相引手足搐搦背脊强直口吐涎沫聲類畜叫食頃乃甦原其所由或因七情之氣鬱結或爲六淫之邪所干或因受大驚恐神氣不守或自幼受驚感觸而成皆是痰迷心竅如癡如愚治之不須分五俱宜豁痰順氣清火平肝而以黃連苦蔞南星半夏之類尋火尋痰分多分少治之無有不愈有熱者以凉

藥清其心有痰必用吐法吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類

脉虛弦爲驚爲風癇

張三錫醫學準繩六要

總論

大抵癲癇之發由腎中陰火上逆而肝從之故作搐搦搐搦則徧身之脂液促迫而氣上逆吐出於口也然腎間動氣乃生氣之原腎傷則志不足故神躁擾火逆上攻動其痰而厥也或經脈引入外邪內傷深入傷其生氣之原邪正混亂天樞不發衛氣固留於陰而不行不行則陰氣畜滿鬱極乃發發則命門之相火自下逆上塡塞其竅惟迫出其如羊鳴者一二聲而已徧身之脂液胼之涎沫皆迫而上胷臆流出於口五臟六腑十二經脉皆不勝其衝逆故卒倒而不知也食頃火氣退散乃醒若生氣未復則餘邪漸熾而復作也然所謂生氣之原者乃有生之初先生此而外通於臍而係胞隨母呼吸若母受驚氣混於其中久之乃成命門卽臍下腎間一點眞陽是也復

被外邪則發作也如此則生命之原爲邪所害自小目瞪質弱必不長壽

王肯堂證治準繩

證治

癇病與卒中痓病相同但癇病仆時口中作聲將醒時吐涎沫醒後又復發有連日發者有一日三五發者中風中寒中暑之類則仆時無聲醒時無涎沫醒後不復再發痓病雖亦時發時止然身强直反張如弓不如癇之身軟或如猪犬牛羊之鳴也原病式以由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胷膈燥爍而瘛瘲昏冒僵仆也三因以驚動臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母腹中受驚或感六氣或飲食不節逆於臟氣而成蓋忤氣得之外驚恐得之內飲食屬不內外所因不同治法亦異如驚者安神丸以平之痰者三聖散以吐之火者清神湯以涼之可下則以承氣湯下之

平旦發者足少陽晨朝發者足厥陰日中發者足太陽黃昏發者足太陰人定發者足陽明半夜發者足

少陰煎藥中各加引經藥

劉宗厚曰陰陽癇猶急慢驚陽癇不因吐下由其有痰有熱客於心胃之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之陰癇亦本於痰熱所作醫以寒凉攻下太過損傷脾胃變而成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞證而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟腑淺深而言癇病豈本自有陰寒者哉

景岳全書（臣張介賓著）

癇病論證

癲即癇也觀內經言癲甚詳而癇則無辨即此可知後世有癲癇風癇風癲等名所指不一則徒滋惑亂不必然也又如別錄所載五癇曰馬癇牛癇猪癇羊癇雞癇者即今人之謂羊癲猪癲也此不過因其聲之相似遂立此名可見癲癇無二而諸家於癲證之外又有癇證誠屬牽强無足憑也又千金方有風癇驚癇食癇及陰癇陽癇之說皆所當辨并列後條

癲病多由痰氣凡氣有所逆痰有所滯皆能壅閉經

絡格塞心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視手足搐搦腰脊强直食頃乃甦此倏病倏已者由氣之倏逆倏順也故治此當察痰察氣之甚者而先治之至若火之有無又當審其脉證而兼爲之治也

論治

氣滯者宜排氣飲大和中飲四磨飲或牛黃丸蘇合丸集成潤下丸之類主之

痰盛者宜清膈飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾痰丸之類主之

痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸丹溪潤下丸之類主之痰逆氣滯甚者必用吐法吐後隨證調理之

癲癇證無火者多若無火邪不得妄用凉藥恐傷脾氣以致變生他證且復有陰盛陽衰及氣血暴脫而絕無痰火氣逆等病者則凡四君四物八珍十全大補等湯或乾薑桂附之類皆所必用不得謂癲癇盡屬實邪而概禁補劑也若眞陰大損氣不歸根而時作時止昏沉難愈者必用紫河車丸方可奏效

其有虛中挾實微兼痰火不清而病久不愈者集驗

龍腦安神丸最得其宜隨證增減可爲法也

痴獃證治

痴獃證凡平素無痰而或以鬱結或以不遂或以思慮或以疑貳或以驚恐而漸致痴獃言辭顛倒舉動不經或多汗或善愁其證則千奇萬怪無所不至脉必或弦或數或大或小變易不常此其逆氣在心或肝膽二經氣有不清而然但察其形體强壯飲食不減別無虛脫等證則悉宜服蠻煎治之最穩最妙然此證有可愈者有不可愈者亦在乎胃氣元氣之强弱待時而復非可急也

凡此諸證若以大驚猝恐一時偶傷心膽而致失神昏亂者此當以速扶正氣爲主宜七福飲或大補元煎主之

石室祕籙

臣陳士鐸著

治法

癲癇之證多因氣虛有痰一時如暴風疾雨猝然而倒口吐白沫作牛羊馬聲種種不同治之不得法往往有死者吾今留一方名祛痰定癲湯人參茯神半

夏各三錢白朮白芍各五錢甘草附子陳皮菖蒲各一錢水煎服此方參朮茯芍皆健脾平肝之聖藥陳皮半夏甘草不過消痰和中妙在用附子菖蒲以起心之迷引各藥直入心竅之中心淸則痰自散而癲癇自除矣旣不耗氣又能開竅安有死法哉

更有羊癲之證忽然臥倒作羊馬之聲口中吐痰如湧者痰迷心竅因寒而成感寒則發也方用人參半夏山藥各三錢白朮一兩茯神薏仁各五錢肉桂附子各一錢水煎服此方助其正氣以生心血又加桂附以祛寒邪加半夏以消痰逐去其水自然氣回而癲止也一劑全愈永不再發幸珍視之毋忽羊癲證得之小兒之時居多內傷脾胃外感風寒結成在胷膈之中所以一遇風寒便發舊痰今純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也若作風痰治之雖亦奏功終不能止而不發也

治牛馬之癲雖與羊癲同治而證實各異方用人參三兩白朮五兩陳皮三錢生南星半夏甘草各一兩附子一錢爲末蜜爲丸須病發前服之永不再發蓋

健其胃氣自不生痰況又佐之袪痰斬關之將乎若羊癲之人亦先以此方治之亦自愈人病來如作牛馬聲卽牛馬癲也大約羊癲小兒居多牛馬癲大人居半也

方

千金治癇方

治五癲

銅靑　雄黃　空靑另研　東門土（鷄頭）　水銀
茯苓　猪苓　人參　白芷　石長生　白蘞
白薇各一兩　卷柏　烏扇各半兩　硫黃一兩半

右十五味爲末以靑牛膽和著銅器中於甑中五斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十丸日再夜一

虎睛丸

治濕癲掣瘲口眼張大口出白沫或作聲或死不知人

虎睛一具酒浸一宿炙　鬼箭羽　露蜂房二分
獨活　遠志　細辛　貫衆　麝香　白蘞（一作白薇）
升麻　白蘚皮各三兩　牛黃　防風　秦艽
防葵　龍齒　黃芩　雄黃　山茱萸　防己
白茯苓　鐵精　鬼臼　乾地黃（一作乾薑）　人參
大黃　銀屑各四分　蛇蛻一尺　茯神　石膏
天雄各五分　寒水石六分

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至二十五丸神方

又方

凡癲發之候其狀多端口邊白沫動無常者

秦艽　人參　防葵　茯神　甘草各二兩
鉛丹一兩　貫衆一枚

右七味㕮咀以水九升煑取三升半分三服一方有防風牡丹無防葵茯神

雄雌丸

治風癲失性顛倒欲死五癲驚癇

雄黃　雌黃　眞珠各一兩　鉛二兩熬令成屑

丹砂一分　水銀八分

右六味爲末以蜜擣三萬杵丸如胡豆先食服二

丸日二稍加以知爲度

又方

治癲癇厥時發作

白蘞四分　蚱蟬十四枚　防葵　代赭　人參

鉛丹　鉤藤　茯神　雷丸　虎骨　生猪齒

遠志　桂心　白殭蠶　防風各六兩　莨菪子

升麻　附子　卷柏　牡丹　龍齒　光明砂各一

分　牛黃二分　蛇蛻皮　白馬眼睛各一具

右二十五味治下篩酒服方寸匕日二亦可爲丸

良驗

龍腦安神丸（方）（集驗）

治男婦小兒五積癲癇無問遠年近日發作無時

但服此藥無不痊愈

龍腦研　麝香研　牛黃各三錢研　犀角屑
茯神去木　人參　麥門冬　硃砂水飛各二兩
甘草炙　地骨皮　桑皮炒各一兩　馬牙硝二錢
右爲細末煉蜜和丸如彈子大金箔三十五片爲衣如有風癇病歲久冬月用溫水化下夏月用冷水化下不拘時候如病二三年日進三服小兒一丸分作二服

龍齒丹

治因驚神志恍惚久而成癇時發時止

龍腦研　白殭蠶炒　白花蛇肉酒浸　硃砂飛
鐵粉研　石菖蒲　遠志　木香　橘紅去白
麻黃去節　天麻　天南星薑製　人參各半兩
紫蘇子一兩　龍腦研半錢　全蠍三錢半炒
麝香一錢另研
右爲細末次入研藥和勻煉蜜爲丸每一兩作十五丸每一丸空心薄荷湯下

三聖散

瓜蒂炒微黃　防風各三兩　藜蘆一兩或三五錢

右爲粗末每服約半兩以虀汁三茶盞先用二盞煎三五沸去虀汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放溫徐徐服之以吐爲度不必盡劑

楊氏五癇丸

治癲癇潮發不問新久

白附子半兩炮　半夏湯洗　皂角搥碎用水二升揉汁去柤與白礬一處熬乾爲度細研各二兩

天南星薑製　白礬生　烏蛇酒浸各一兩

全蠍炒二錢　蜈蚣半條　白殭蠶炒一兩半

麝香三字研　硃砂飛二錢半　雄黃飛一錢半

右爲細末生薑汁煮麪糊爲丸如梧桐子大每服二三十丸溫生薑湯送下食後服

犀角丸（河間六書）

治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事仆倒屈伸

犀角末半兩　赤石脂三兩　朴硝二兩　殭蠶

薄荷葉各一兩

右爲末麪糊丸如梧桐子大每服二三十丸溫水下日三服不拘時如覺痰多卽減數忌油膩炙煿

參硃丸

治風癇大有神效

人參　蛤粉　硃砂各等分

右爲細末積猪心血爲丸如梧子大每服三十丸金銀煎湯下食遠服

琥珀壽星丸

治癇

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨用好酒一斤澆之將南星趁熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一宿取出再焙乾爲末

琥珀四兩另研　硃砂一兩飛留一半爲衣

右和勻猪心血三箇生薑汁打麪糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如梧桐子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服局方用南星一斤硃砂二兩琥珀一兩無猪心血

升陽湯

治陽蹻癇足太陽下行宜升陽氣

麻黃不去節　防風根各八錢　羌活一兩半

炙甘草五錢

每服三錢水五大盞煎至一盞去查稍熱服宿食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃效

妙功丸

治諸癇無不愈者

丁香　木香　沉香　雄黃研　青皮去白

黃芩　胡黃連各半兩　乳香研　麝香研

熊膽各二錢半　白丁香三百粒　輕粉四錢半

黃連　黑牽牛炒　荊三稜煨　甘草炙　莪朮

陳皮去白　雷丸　鶴虱各一兩　大黃一兩半

赤小豆三百粒　巴豆七粒去皮心膜油

右爲細末蕎麪一兩半作糊和勻每兩作十九硃砂水飛一兩爲衣陰乾每服一丸用溫水浸一宿去水再用溫水化開空心服之小兒加減服十年病一服卽愈若未愈三五日再服重者不過三服

風引湯

除熱癲癇

大黃　乾薑　龍骨各四兩　桂枝去皮三兩

甘草炙　牡蠣煅各二兩　凝水石　滑石

赤石脂　石膏　紫石英　白石脂各六兩

右十二味杵粗末篩以韋囊盛之取三指撮井華水三升煮三沸去柤溫服一升深師云大人風強少水驚癇瘛瘲日數十發醫所不治除熱方效宜風引也

又方

治癇疾

川芎二兩　蜈蚣黃脚赤脚各一條　防風

猪牙皂角　鬱金　明礬各一兩

右六味爲細末蒸餅丸如梧子大空心茶清下十五九一月除根

神應丹

治諸癇

好辰砂不以多少

右細研猪心血調勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出

丸如桐子大每服一丸人參湯下食後臨臥

珠子辰砂丹

治風癇久不愈

山藥　人參　遠志　防風　紫石英　茯神

虎骨　虎睛　龍齒　五味子　石菖蒲　丹參

細辛各二錢半　眞珠末四分　辰砂二錢研

右爲末麪糊丸如桐子大以前硃砂爲衣每服三五十丸煎金銀湯送下日進三服忌魚肉濕麪動風之物

五生丸

治風癇

川烏生　附子生炙去皮臍　南星生　半夏生

乾薑生各半兩

右爲細末酢煮大豆汁作糊和丸如梧桐子大每服五丸冷酒送下不拘時一方有大豆無乾薑

勝金丸

治風癇有驚駭不時旋暈潮搐口吐痰沫忽然仆地不省人事

天南星薑製　皂角去皮弦子　川烏生　細辛
桔梗　威靈仙　何首烏　白礬枯　白殭蠶炒
烏蛇酒浸各一兩　荊芥穗　川芎各二兩

右爲細末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸食後溫酒送下日二服

虎睛丸

治癇疾潮搐精神恍惚煩亂不寧口乾喜水或時譫語

虎睛一對　犀角屑　遠志去心　梔子仁
大黃各一兩

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服二十丸溫酒送下食後服

控涎丸

治諸癇久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏生用　半夏湯洗　白殭蠶炒剉碎生薑汁浸一宿各半兩　全蠍七枚炒　鐵粉三錢研
甘遂二錢半麵裹煨

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如菉豆大硃砂

爲衣每服五十丸食後薑湯送下忌食甘草

抵住丸（永類方）

治風邪癇疾

皂莢去弦子燒存性　蒼耳根莖葉曬乾各四兩

蜜陀僧一兩

右爲細末蜜丸如梧桐子大硃砂爲衣每服三四十丸棗湯下日二服稍退只服二十丸

又方（乾坤祕韞）

治大人小兒癇疾

初生胞衣一具長流水洗淨以水浸春三夏一秋五冬七日焙乾爲末　羌活　天麻　防風各半兩

殭蠶　白附子各一兩　南星二兩　川烏一個

全蠍二十一個

右爲細末糊丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十丸好酒下

醫癇無雙丸（身經通考下同）

治五癇

南星　半夏二味俱用白礬皂角生薑煎湯浸一日

夜透切片湯查共陰乾去礬皂薑不用　歸身
生地　軟石羔各一兩　天麻七錢　白殭蠶
荆芥穗　獨活　烏犀角屑　白茯苓　遠志
麥冬　棗仁炒　辰砂　人參　白朮　陳皮
黃連各五錢　白附子煨　甘草各三錢　牛黃
珍珠　川芎　黃芩各量用

右爲末好酒打稀糊爲丸梧子大金箔爲衣每五十丸空心白湯下最能祛風化痰降火養血理脾寧心定志輕者半料效重者一料效

又方

治大人小兒忽然昏暈倒地五癇之證

硃砂水飛用猪心一個剖開入砂末五錢濕紙包裹慢火炙熟取淨砂　巴豆五錢用石灰一椀炒紅入仁在內灰冷取仁將灰又炒又以仁入內取出用草紙搥去油灰不用　南星沸湯浸三次薑製二兩
全蠍去頭足尾炙　龍膽草各二錢

右爲末共前砂麪糊丸如桐子大每空心薑湯下十五丸

鴟頭丸

治風癇不問長幼發作漸頻嘔涎沫

飛鴟頭一枚燒灰　號丹五錢研　皂角五挺酥炙

右爲細末用糯米糊爲丸如菉豆大每服十五丸加至二十丸以粥飲送下不拘時候

蛇黃丸

治五癇因積風熱風痰攻心所致

蛇黃小者二十枚以薑汁拌入火煆通紅取出地上出火毒研令極細

右用狗膽一枚取汁和粟米飯丸如菉豆大每服十五丸溫酒送下不拘時候吐涎乃效長幼皆可服

惺神散

治驚癇潮作仆地不省口吐涎沫

雄鴟鴞一枚用磁罐盛以黃泥固濟炭火煆令紅

右爲細末每服二錢入麝香少許溫酒調服熟水亦得不拘時候

乳硃丹

治癲癇

乳香別研　硃砂細研水飛

右用乳香鎔化拌和硃砂爲劑丸如龍眼大每服一丸側柏葉浸酒磨化盪溫服不拘時候

防風通聖散

治癇病

防風　當歸　川芎　白芍藥　大黃　薄荷葉　麻黃去根不去節　連翹　芒硝各半兩　石膏　黃芩　甘草　桔梗各二兩　滑石三錢　荊芥　白朮　山梔子各一兩

右爲粗末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如痰涎加半夏五錢生薑製過

安神丸（東垣下同）

黃連一錢五分酒洗　硃砂一錢水飛　酒生地　酒歸身　炙甘草各五分

右除硃砂水飛外四味搗爲末和勻湯浸蒸餅丸如黍米大每服十五丸食後津嚥下

烏龍丸（寶鑑下同）

治五風癇病

川烏頭　草烏頭　天仙子　五靈脂各二兩

黑豆一升

右爲末水丸桐子大每服五七丸溫湯下如中風

加附子半兩

神應丹

治諸風心癇病

狐肝一具　烏鴉一隻　鴟梟一箇　生白礬

生犀角各二兩　野狸一箇去腸肚皮毛入新罐內

黃泥固濟炭火煨令焦黃

右爲末酒打糊丸如皂角子大硃砂爲衣每服二

十九溫酒送下無時

墜痰丸

治風癇

天南星九蒸九曬

右爲末薑糊丸桐子大每服二十九人參湯下菖

蒲麥門冬湯亦得

沉香天麻湯

治陽癇陰癇

沉香　川烏炮去皮　益智各二錢　甘草炙

薑屑　當歸各一錢半　獨活四錢　羌活五錢

天麻　黑附子炮去皮　半夏炮　防風各三錢

右十二味㕮咀每服五錢水一盞薑三片煎一盞溫服食前忌生冷硬物寒處坐臥

錢氏五色丸（正傳）

治諸癇

硃砂半兩另研　水銀二錢　雄黃熬　珍珠各一兩另研末　鉛三兩用水同熬

右和勻再研極細麪糊爲丸如麻子大每服三四丸別煎金銀薄荷湯送下

礬丹丸

治五癲百癇無問陰陽冷熱

虢丹　晉礬各一兩

用塼鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬在上以炭五斤熾令炭盡取出細研以不經水猪心血爲丸菉豆大每服十丸至二十丸橘皮湯下

硃砂滾涎丸（儒門事親）

治五癇等證

硃砂　白礬生用　赤石脂　硝石各等分

右爲細末研蒜膏爲丸如菉豆大每服三十丸食後荆芥湯下

碧霞丹（局方）

治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視癲癇狂妄等證

石綠半兩研九度水飛　附子尖　烏頭尖　蠍梢各二十箇

右爲末入石綠令勻麵糊爲丸如雞頭實大每服一丸薄荷湯化下更以溫酒半合飲之須臾吐出痰涎然後隨證以他藥治之如口噤者擀開灌之

加減壽星湯（吳都堂傳）

治癇證

膽南星四兩　半夏二兩　防風　天麻　皂莢

香附　青皮　猪苓　澤瀉　赤茯苓　茯神

白朮　麥冬各一兩　荆芥　細辛各七錢

右剉每劑一兩薑水煎服

清神丹（祕方）

治證同前

石菖蒲去毛二兩　辰砂六錢研細水飛一半爲衣

右爲末猪心血打麪糊爲丸如桐子大每服七八十丸空心白湯送下服前育魂丹除根

壯膽星硃丹

治驚癎

硃砂一兩水飛　膽南星　石菖蒲各二兩

牛黃研五錢　麝香研五分　猪心七具用血

右爲細末竹瀝猪心血和丸如梧桐子大每服七八十丸空心白湯送下

丑寶丸

治一切怔忡癎證

牛黃　蒙石煅　天麻薑製　蟬蛻去足各五錢

琥珀　雄黃各一錢　牛膽南星　黃芩酒炒

石菖蒲各一兩　沉香　犀角屑各一錢五分

大黃二兩酒蒸　殭蠶七錢薑汁炒

右爲末竹瀝猪心二具用血和丸如菉豆大辰砂

一錢爲衣每服六七十丸臨卧薄荷湯下

追風祛痰丸（回春下同）

治諸風癇暗風世之患此病者甚多余用此藥效者甚廣幸試之

防風　天麻　殭蠶洗去絲炒　白附子麪包煨　牙皂各一兩　全蠍去毒微炒　木香　白礬枯各五錢　南星三兩一半白礬水一半皂角水各浸一宿　半夏湯泡七次研爲細末秤六兩分作二分一分用皂角浸漿作麴一分用生薑汁作麴

右爲細末薑汁打稀糊爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服七八十丸食遠臨卧用淡薑湯送下或薄荷湯下病人氣血虛者加人參當歸胃虛加白朮有火加薑汁炒黃連各一兩

清心滾痰丸

治癲癇驚狂一切怪證神效

大黃酒蒸　黃芩各四兩　沉香二錢半　犀角　青礞石硝煅　皂角　麝香　硃砂各五錢

右爲細末水丸如梧桐子大硃砂爲衣每服七十

丸溫水下

祛風至寶丹

治癲癇

防風　薄荷　荆芥穗　羌活　獨活　連翹

黃芩去朽　黃蘗　黃連　梔子　全蠍　天麻

細辛　枳實　桔梗　大黃　芒硝　生地黃

石膏　甘草各一兩　鹽梅五十箇去核　乾葛

赤芍　細茶各一兩半　麻黃三錢（臨證酌用）

右藥俱用溫水洗火焙乾爲末煉蜜爲丸彈子大硃砂爲衣每服二丸無時細嚼併臥時茶酒任下

如血虛加芎歸各一兩氣虛加人參白朮各一兩

遂心丹（濟生方）

治風痰迷心癲癇及婦人心風血邪

甘遂二錢

右爲末以猪心取三管血和藥入猪心內縛定紙裹煨熟取末入辰砂末一錢分作四丸每服一丸將心煎湯調下大便下惡物爲效不下再服

大補元煎（景岳全書下同）

治大驚猝恐有傷心膽而致失神昏亂痴獃者

人參一二錢至一二兩　山藥炒　杜仲各二錢

熟地二三錢至二三兩　山茰肉一錢（畏酸吞酸者去之）

當歸（泄瀉者去之）　枸杞各二三錢　炙甘草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

七福飲

治前證

人參　熟地並隨宜　當歸二三錢　棗仁二錢

白朮炒一錢半　遠志製三五分　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服溫或加生薑三五片

六安煎

治癲癇痰盛者

半夏二三錢　茯苓二錢　陳皮一錢半　甘草

杏仁去皮尖各一錢　白芥子五七分（年老氣弱不用）

水一鍾加生薑三五七片煎七分食遠服

清膈煎

治癲癇兼有火者

陳皮錢半　貝母二三錢　海石　木通各二錢

膽星一二錢　白芥子五七分

水一鍾半煎七分溫服

排氣飲

治氣滯成癲癇者

陳皮　藿香　枳殼各一錢五分　香附　澤瀉

烏藥各二錢　厚朴一錢　木香七分

水一鍾半煎七分熱服

大和中飲

治食滯癲狂

陳皮一二錢　山楂　麥芽各二錢　枳實一錢

厚朴　澤瀉各錢半　砂仁五分

水一鍾半煎七八分食遠溫服

單方

癇證羊頭瘋上好松蘿茶一斤晉礬一斤爲末煉蜜丸桐子大每服四十丸滾湯下（身經通考）

風痰癇疾金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥日中時以茶調下卽臥日中良久吐出雞子大物永不發如不吐以熱茶投之（良方）

暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煆酢淬七次爲末每服酒調二錢數服愈年深者亦效（得效方）

風痰癇病化痰丸生白礬一兩細茶五錢爲末煉蜜丸如梧子大一歲十丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷病根

暗風癇疾用臘月烏鴉一個鹽泥固濟於瓶中煆過放冷取出爲末入硃砂末半兩每服一錢酒下日三服不過十日愈

又方用渾烏鴉一箇瓶固煆研胡桃七枚蒼耳子心七枚爲末每服一錢空心熱酒下

黑犬齒磨汁治犬癇（時珍）

小兒牛癇白牛屎中豆日日服之良（總微論）

驚癇嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研和蜜水灌（廣利方）

野馬肉主治人病馬癇筋脈不能自收周痹肌肉不仁用肉一斤豉汁煑熟入五味葱白作醃腊及羹粥頻食之白煑亦可（千金方）

銀屑主治熱狂驚悸發癇水磨服之功勝紫霜（開寶）

卒得癇疾鉤藤甘草炙各二錢水五合煎一合每用棗許日三五度（聖惠方）

風癇諸痰五癇膏取痰如神大皂角半斤去皮子以

蜜四兩塗上慢火炙透搥碎以熱水浸一時挼取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在夾綿紙上曬乾剪作紙花每用三四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃脂麻餅一箇涎盡即愈立效方（普濟）

烏頭附子尖爲末茶服半錢吐風痰癲癇（時珍）

癲癇風疾九節菖蒲不聞雞犬聲者去毛木臼擣末以黑豶豬心一箇批開砂罐煮湯調服三錢一日一服（正傳）

癇病心風病用天南星九蒸九曝爲末生薑汁打糊爲丸如梧子大每服二十九煎人參麥門冬菖蒲湯下亦可

驚風癇疾喉閉牙緊鉛白霜一字蟾酥少許爲末烏梅肉蘸藥於齦上揩之仍吹通關藥良久便開方（普濟）

鳳凰臺即鳳凰脚下白物如石者治驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之（藏器）

鍼灸

千金方曰攢竹小海後頂強間主癇發瘈瘲狂走不得臥心中煩

金門僕參主癲疾馬癇

絲竹空通谷主風癇癲疾涎沫狂煩滿

列缺主熱癇驚而有所見

天井小海主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸

懸釐束骨主癲疾互引善驚羊鳴

醫學綱目曰晝發治陽蹻申脈二穴在足外踝下陷

中容甲白肉際是也夜發治陰蹻照海二穴在足內踝下陷中是也先灸兩蹻各二七壯然後服藥

凡灸癎必先下之乃可灸不然則氣不通能殺人針不拘

又法取鳩尾必高手乃可下針但宜灸亦不可多壯多則令人健忘

又法取後谿陽交三里太衝間使

風癎熱病心風驚癎取上脘三里

天弔取巨闕三寸百會顖門

心癎面赤心下熱短氣喘息灸巨缺三壯

肝癎面青反視手足搖動灸坵墟中封各三壯

脾癎面黃腹大善利灸胃脘井脘旁一寸各三壯又取衝陽隱白

肺癎面白口吐沫灸肺腧少商少陽各三壯

腎癎面黑直視身不搖如尸厥取金戶少海至陰湧泉各二分刺一分

膈癎四肢不舉灸風府七壯刺一分又灸百會人中承漿各隨年壯

腸癇都無動靜如尸厥狀灸承山湧泉勞宮翳風各隨年壯刺入一分

馬癇目張搖頭馬鳴欲反折灸風府三壯刺一分又灸神闕

牛癇目直視腹滿灸鳩尾尖三壯大椎三壯

羊癇揚目吐舌灸大椎三壯刺一分

猪癇吐濁沫口動搖灸浮白三壯刺一分

犬癇手屈拳攣灸勞宮一壯刺一分又灸絲竹空肋戸各一壯

雞癇搖頭反折善驚目搖至陰竅陰厲兌各灸三壯刺一分

右針灸癲法內經但取手足太陽陽明太陰六經而已今甲乙經等書又多取督經手足太陽足少陰厥陰蓋隨證取之然學者當以內經爲主也

本草綱目曰癲癇諸風熟艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

導引

保生祕要曰羊暈風導引法念臍穿過腎旋轉想腎水直上頂門下臍念

羊遂風導引法念臍卽散四肢如通關狀次兩目再看臍中念至熱時卽左旋右轉由小而大散於四肢二十七遍

醫案

丹溪心法曰一婦人四十五歲生子多觸胎時有腹痛每夜喜飲酒三盞即睡其夫性暴而詰詬所以借酒解怒忽九月望後癇病大作目上視揚手擲足甚强健舉體大筋皆動喉嚮如鋸涎沫流口兩角如此一時辰許諸證皆靜狀如熟寢全不知人半時小腹漸痛上至心痛大作汗如雨自頭至乳而止如此半時痛漸減汗亦收痛作時却自言其痛其餘言語皆謬誤問亦不答亦不知人痛定又熟寢如前癇與痛

間作晝夜不息經兩宿方召予脈之痛作時脈四至半似弦非弦左弱於右予未敢與藥候癇作時再看形脈後作時六脈皆隱但有大筋轉於指下眼白青而面不青手之動三倍於足予問之痛作時必欲重按比癇作時汗必不出其夫言果然予曰此非死證若尚能噏藥則易治試調香附子末灌之適癇勢稍定却噏得半盞令急燒竹瀝未就時痛大作余以肝有怒邪因血少而氣獨行所以脾受病肺胃之間舊有酒痰爲肝氣所抑鬱而爲痛然酒喜動可以出入升降入內則痛出外則癇當乘其入內之時急爲點大敦行間中脘三處穴令分頭同時下火灸之足上艾火少灸先了腹上痛漸下至腰而止熟寢少時癇作如前證減半又以竹瀝入少薑汁灌下大半鍾灌時適値癇定但熟寐如前自是不省人事一晝二夜皆已棄之余曉之曰身不發熱因痛則汗出大便不通者五六日自予來亦未見其小水非死證當是血少無神而昏耳爾爲痛掐人中俄而呻吟急以人參湯同竹瀝灌之又昏睡如前余教以作人參白朮膏

入竹瀝調下如此二晝夜凡用人參一斤白朮二斤眼忽能開手能舉自言胸膈滿而舉身皆痛耳目仍未有聞見忽自溺牀甚多余聞之甚喜且得癇與痛皆不作但教令用陳皮芍藥甘草川芎湯調參朮膏又加竹瀝飲之余欲往他處且與脈之聞其作聲余自知謬拙不教以粥與藥間服急令作稀粥與之止嚥得三四匙牙噤不受余遂以木楔斡開以稀粥入藥湯又與竹瀝同灌一大鍾蓋是粥多而藥居三之一予遂出門教令粥藥相間與之予在二十里外未申間天大風作予料此婦癇必作特往視之癇不作而痛作脈去來急無次急爲灸然谷太衝巨闕灸罷痛定問其要粥否答曰我正饑其夫飲之以粥嚥兩鍾予乃往他處仍教以藥湯調參朮膏竹瀝與粥間與之如前第二夜半時召予甚急往視之癇病大作奪手不能診脈令人扶定兩時予捉其中指强而脈之四至半粗大有力左右同而右少緩口妄言而無次又怒駡人眼上視不瞬而嘔又欲起走其狀若有所憑然予捉定兩手爲灸兩大指背半甲半肉際各

三壯怒狀稍殺求覔索燭視之耳目仍未有聞見昏寐至夜半狂怒大作且言鬼怪之事而師巫至大罵巫者予靜思之氣因血虛亦從而虛邪因入理或有之且與補藥血氣若充邪當自退仍與前藥又恐痰涎佐以荊瀝又以秦承祖灸鬼法灸之哀告我自去昏睡一晝夜忽自起坐索粥其夫與之方問夫你面垢如許怪牀上有香氣繼又無所知識惟開眼不睡手足雖能運動却作尋摸態如此又二晝夜粥食稍加又溺牀多如前予益喜仍守前藥予又往他處次日晚忽來召予急往視之病人自言渾身皆痛脈之皆五至左右均而和曰參朮膏俱盡遂教令就與前藥中加參朮煎去荊瀝加香附末與一服覺甚快余且令守此藥至次夜半又來告急曰前痛大作往視之坐桶上叫聲甚高予思之此虛病亦多汗腸燥而糞難耳痛當在小腹與腰急烘琥珀膏大者貼小腹仍教以熱手摩腰腎間連得下氣而痛減就睡少時又起如是者五六次一醫者勸令用通利藥予曰痛與死孰爲輕重且堅忍至夜半後當自通又往他處

至四更來告急往視之痛大作予令坐以溫湯中當自下換湯痛定覺甚快第二桶湯下結糞二塊就睡天明予又往他處至晚又告急予視痛大作連及兩脅手不可近予思之此痛無因若結糞未盡痛當在下今痛在上必因食多問之果然醫者欲用感應丸予教勿與粥藥病者力索藥遂以香附末令舐之至夜半痛漸減天明覺略饑索粥予曰非饑也乃嘈耳勿與而自安其家又自與粥至辰巳間予往他處至晚痛又作而病者索香附末不已遂以湯調半碗與之探令吐猶有宿食痛遂止予又往他處至夜半又告痛復作詢之以酢拌蘿蔔苗吃粥又以香附末探吐之痛定教令一晝夜勿與食至次日少與淡粥覺饑時以陳皮湯下白朮丸如此調理自安

儒門事親曰一婦病風癇從六七歲因驚風得之自後二三年間一二作至五七年五七作逮三十餘歲至四十歲日作或一日十餘作以至昏癡健忘求死而已會與定歲大饑遂採百草而食於水瀕採一種草狀若葱屬泡蒸而食之食訖向五更覺心中不安

吐涎如膠連日不止約一二斗汗出如洗初昏困後三日輕健非曩之比病去食進百脈皆和省其所食不知何物訪問諸人乃憨葱苗也憨葱苗者本草所謂藜蘆苗是也圖經云藜蘆苗吐風病此亦偶得吐法耳

萬病回春曰王大叅嗣君年十八歲患癇每發即仆地吐涎不省人事少頃復甦或一月一發或兩月發四五次者七年遍醫弗効余診六脈滑數人迎緊盛此氣血虛而有風痰壅併也以追風祛痰丸加人參當歸黃連各一兩安神丸二藥兼服未及半年而痊後有數人俱同此治皆愈

一小兒十五歲御女後復勞役考試失意患癇證三年遇勞則發用十全大補加味歸脾之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米飯爲丸如梧桐子大每服百丸日三五服而痊後患遺精盜汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此方治癇不拘男女老幼皆效

薛氏醫按曰鴻臚王繼之室素有癇證遇勞役及怒氣則發良久自省一日因飲食後勞役失宜發而半

日方省不能言語或以爲風中於臟用袪風化痰順氣之劑及牛黃清心丸病益甚六脉浮大兩寸虛而不及本部且進飲食余曰此脾胃之氣傷也若風中於臟禍在反掌彼不信仍用風藥後果卒

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百十九卷目錄

醫部彙考二百九十九

瘟疫門一

黃帝素問 陰陽應象大論　水熱穴論

華佗中藏經 死脈

朱肱活人書 溫疫　溫病

張從政儒門事親 立諸時氣解利禁忌式

朱震亨心法 瘟疫證治

陶華全生集（大頭傷風　時氣　瘟疫　寒疫）
李梴醫學入門（疫癘　寒疫　溫疫）
趙獻可醫貫（溫病論）
張介賓景岳全書（論證　脈候　治法　六要
汗有六要五忌　汗散法
補虛法　溫補法　清利法　吐法　下法
瘟疫熱毒辨治　大頭瘟證治　初感治法
飲食宜忌　避疫法）
陳士鐸石室祕籙（瘟疫治法）

藝術典第三百十九卷

醫部彙考二百九十九

瘟疫門一

黃帝素問

陰陽應象大論

冬傷於寒春必病溫

註　乃重陰而變陽病也

夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

註　能藏其精則血氣內固邪不外侵故春不病溫

水熱穴論

帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒甚則爲熱也

（註）熱極生寒寒極生熱也

漢華佗中藏經

死脈

溫病三四日未汗脈大疾者死

溫病脈細微而往來不快胷中閉者死

溫病發熱甚脈反小者死

溫病甚脈往來不調者死

溫病腹中痛下痢者死

溫病汗不出出不至足者死

宋朱肱活人書

溫疫

一歲之中長幼疾狀多相似此名溫疫也四時皆有不正之氣春夏亦有寒清時秋冬或有暄暑時人感疫厲之氣故一歲之中病無長少率相似者此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火

圓聖散子敗毒散若春應暖而淸氣折之則責邪在肝夏應暑而寒氣折之則責邪在心秋應涼而反大熱抑之則責邪在肺冬應寒而反大溫抑之則責邪在腎仲景云冬溫之毒與傷寒大異蓋傷寒者傷寒氣而作冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異不可拘以日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒溫而行之治溫以清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以溫熱而行之以平爲期不可以過此爲大法

溫病

夏至已前發熱惡寒頭疼身體痛其脈浮緊此名溫病也冬傷於寒輕者夏至已前發爲溫病蓋因春溫暖之氣而發也治溫病與冬月傷寒夏月熱病不同蓋熱輕故也升麻湯解肌湯柴胡桂枝湯最良熱多者小柴胡湯主之不渴外有微熱者小柴胡加桂枝也嗽者小柴胡加五味子也或煩渴發熱不惡寒與虛煩者並竹葉石膏湯次第服之麻黃桂枝大青龍唯西北二方四時行之無有不驗若江淮間地偏暖

處惟冬月及正初乃可用正方自春末至夏至已前桂枝麻黄大青龍內宜加減也

元張從政儒門事親

立諸時氣解利禁忌式

春之溫病夏之熱病秋之瘧及痢冬之寒氣及欬嗽皆四時不正之氣也總名之曰傷寒人之勞役辛苦者觸冒此四時風寒暑濕不正之氣遂成此疾人之傷於寒也熱鬱於內淺則發早爲春溫若春不發而重感於暑則夏爲熱病若夏不發而重感於濕則秋變爲瘧痢若秋不發而重感於寒則冬爲傷寒故傷寒之氣最深然而傷寒及溫熱但發必先發熱惡寒頭項痛腰脊强者一日在太陽經故也內經中雖言一日太陽者傳受常也亦有太陽證至了不傳者止可汗之如升麻湯解肌湯敗毒散五積散之類發散則愈也蓋病人熱甚更以辛溫則病必轉加今代劉河間先生自製辛涼之劑以通聖益元散相合各五七錢水一中椀入生薑十餘片葱鬚頭二十餘根豆豉一撮同煎至五七沸去滓分作二服先以多半服

之頃以釵股於喉中探引盡吐前藥因其一涌腠理開發汗出周身復將餘藥溫熱而服之仍以酸酢辛辣漿粥投之可以立愈解利傷寒濕溫熱病治法有二天下少事之時人多靜逸樂而不勞諸靜屬陰雖用溫劑解表發汗亦可獲愈及天下多故之時熒惑失常師旅數興饑饉相繼賦役既多火化大擾屬陽內火又侵醫者不達時變猶用辛溫茲不近於人情也止可用劉河間辛涼之劑三日以裏之證十痊八九予用此藥四十餘年解利傷寒溫熱中暑伏熱莫知其數非爲衍也將以證後人之誤用藥者也予嘗見世醫用升麻五積解利傷寒溫疫等病往往發狂譫語衄血泄血喘滿昏瞀懊憹悶亂勞復此數證非傷寒便有此狀皆由辛溫之劑解之不愈而熱增劇以致然也凡解利傷寒時氣疫疾當先推天地寒暑之理以人參之南陲之地多熱宜辛涼之劑解之朔方之地多寒宜辛溫之劑解之午未之月多暑宐辛涼解之子丑之月多凍宐辛溫解之少壯氣實之人宜辛涼解之老耄氣衰之人宐辛溫解之病人因冒

寒食冷而得者宜辛溫解之因勞役冒暑而得者宜辛涼解之病人稟性怒急者可辛涼解之病人稟性和緩者可辛溫解之病人兩手脈浮大者可辛涼解之兩手脈遲緩者可辛溫解之如是之病不可一概而用偏熱寒涼及與辛溫皆不知變通者夫地有南北時有寒暑人有衰旺脈有浮沉劑有溫涼服有多少不可差元病人禁忌不可不知昔有人春月病瘟三日之內以驢車載百餘里比及下車昏瞀不知人數日而殂又有人飲酒過傷內外感邪頭痛身熱狀如傷寒三四日間以馬馱還家六七十里到家百骨節皆痛昏憒而死此余親覩若此之類不容更述假如瘟病傷寒熱病中暑冒風傷酒愼勿車載馬馱搖撼頓挫大忌夫動者火之化靜者水之化也靜爲陰動爲陽陽爲熱陰爲寒病已內擾又復外擾是爲重擾奈人之神詎能當之故遠行得疾者宜舟泛牀擡無使外擾故病不致增劇又若傷寒時氣瘟病嘗六七日之間不大便心下堅硬腹脅緊滿止可大小承氣湯下之其腸胃積熱愼勿用巴豆杏仁性熱大毒

之藥雖用一二丸下之利五七行必反損陰氣涸枯津液燥熱轉增發黃譫語狂走斑毒血泄悶亂輕者爲勞復重者或至死間有愈者幸矣不可以爲法故傷寒新愈之人愼勿食猪魚雜果釅酒濕麵及沐浴房室事如犯病必再發愛其身者不可不愼又如正二三月人氣在上瘟疫大作必先頭痛或骨節疼與傷寒時氣冒暑風濕及中酒之人其狀皆相類愼勿便用巴豆大毒之藥治之元光春京師翰林應奉李屏山得瘟疫證頭痛身熱口乾小便赤澀渠素嗜飲

醫者便與酒癥丸犯巴豆利十餘行次日頭痛諸病仍存醫者不識復以辛溫之劑解之加之臥於暖炕强食葱酢湯圖獲一汗豈知種種客熱疊發併作目黃斑生潮熱血泄大喘大滿後雖有承氣下之者已無及矣至今議者紛紛終不知熱藥之過往往獨歸罪於承氣湯用承氣湯者不知其病已危猶復用藥學經不明故也良可罪也然議者不歸罪於酒癥丸者亦可責也夫瘟證在表不可下況巴豆之丸乎巴豆不已況復發以辛溫之劑乎必有仲尼方明公治

長之非罪微生高之非直終不肯以數年之功苦讀內經但隨衆好惡爲之毀譽若此者皆妄議者也不眞知其理遽加毀譽君子之所不取以予論之凡傷寒之氣有六禁初病之時甚似中酒傷食者禁大下之一禁也當汗之時宜詳時之寒暑用衾衣之厚薄禁沐浴之火炕重被熱粥燔針二禁也當汗之時宜詳解脉之遲數用辛凉之劑禁妄用熱藥三禁也當下之時宜審詳證下之藥禁巴豆銀粉丸方四禁也遠來之病人禁車載馬馱五禁也大汗之後禁雜食嗜慾憂思作勞六禁也故凡有此者宜淸房凉榻使不受客熱之邪明牕皓室使易見斑出黃生之變病者喜食凉則從其凉喜食溫則從其溫淸之而勿擾休之而勿勞可辛溫則辛溫解之可辛凉則辛凉解之所察甚微無拘彼此欲水之人愼勿禁水但飮之後頻與按摩其腹則心下自動若按摩其中脘久則必痛病人獲痛復若有水結則不敢按矣正當禁而不禁者輕則危重則死不當禁而禁者亦然

朱震亨心法

瘟疫證治

瘟疫衆人一般病者是又謂之天行時疫治有三法宜補宜散宜降熱甚者加童便三酒鍾

大頭天行病此爲濕氣在高巔之上切勿用降藥

冬溫爲病非其時而有其氣也冬時嚴寒君子當閉藏而反發泄於外專用補藥而帶表藥如補中益氣之類

明陶華全生集

大頭傷風

大頭者一曰時毒一曰疫毒蓋天行疫毒之氣人感之而爲大頭傷風也若先發於鼻額紅腫以至面目盛腫不開并額上面部焮赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利脉來數大者普濟消毒飲主之內熱甚者通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日晡潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脅滿宜小柴胡加天花粉羌活荆芥連翹芩連主之若發於項上幷腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荆防敗毒散

主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒飲外用清涼救苦散敷之大抵治法不宜太峻峻攻則邪氣不伏而反攻內必傷人也且頭面空虛之分既著空處則無所不至也治法當先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃氣弱食少者兼助胃氣候其大便熱結以大黃下之拔其毒根此先緩之法也蓋此毒先腫鼻次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必成膿也

時氣

時氣者乃天時暴厲之氣流行人間凡四時之令不正者則有此氣行也若春應溫而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫此時行不正之氣也邪傷眞氣若近穢氣而傷眞氣正如牆壁不固賊乃敢入若正氣既盛邪氣難侵矣其病勢與傷寒相類蓋傷寒因寒而得之時氣乃感疫厲之氣而得之不可與傷寒同治惟發散之藥則同矣凡發散湯劑春感寒邪在肝升麻葛根湯夏感涼邪在心調中湯秋感熱邪在肺蒼朮白虎湯冬感溫邪在腎葳蕤湯

其瘟疫敗毒散若表不愈者用羌活冲和湯正氣散冲和羌活散芎蘇散選而用之

瘟疫

經曰陽脈濡弱陰脈弦緊更遇瘟氣變爲瘟疫也此先因傷寒前熱未除更感時行瘟氣而爲瘟疫治之當與瘟瘧同也

寒疫

寒疫者乃天之暴寒爲病也四時之中天令忽有暴寒之作若感冒卽病者名曰寒疫也其證與正傷寒同但暴寒爲輕耳若病初起頭疼發熱憎寒拘急或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發熱者十味芎蘇散汗之若身痛骨節疼發熱者羌活冲和湯加紫蘇主之若有汗不可再發汗宜加減冲和湯主之若邪熱不解傳入裏變證者宜從正傷寒條內治之

李梴醫學入門

疫癘

疫疾如有鬼癘相似故曰疫癘又曰時氣春應暖而反清夏應熱而反凉秋應凉而反大熱冬應寒而反大溫非其時而有其氣凡感之者卽發頭疼身痛寒熱一方長幼病皆相似治與傷寒微異者春淸責肝升麻葛根湯夏熱責心二香散調中湯秋濕責肺白虎加蒼朮湯茵陳五苓散冬寒責腎萎蕤湯甘桔湯土旺四季隨經取之治與傷寒同者表證敗毒散半表證小柴胡湯裏證大柴胡湯挾內傷者宜補宜散宜降人中黃丸是也經曰疫氣不拘於診更當於運氣求之凡入疫家用麻油服之或紙撚醮麻油幷雄黃硃砂末探入耳鼻內最能避穢毒之氣徧滿鄉村兼用如意丹亦妙

經曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣淸凉冬氣冷冽以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也其有傷於四氣留在何經而發何病大槪春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必瘧痢秋傷於濕冬必欬嗽冬傷於寒夏必痎瘧痎者二日一發瘧者一日一發秋傷於濕病欬嗽者及冬風寒相搏痰涎生而爲欬嗽冬傷於寒病痎

瘧者及春溫氣相搏變爲溫病是四時正氣亦能感期而發皆因發動之時逆推致病之源非受傷之時預擬今日之病故有久而消散不成病者豈可執一論哉但稍覺氣淫於內心腹不快者不換金正氣散加減以正胃氣

寒疫

春分至秋分暴寒曰寒疫非冬月傷寒比也三月四月或有暴寒陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微傷之者其病與溫暑相似而治則殊者蓋溫暑伏寒自內而發寒疫自外而入宜調中湯爲主隨時氣候寒熱輕重而以辛涼辛溫之藥加減蓋折者折抑陽氣鬱而爲熱也感之輕而陽氣不爲所折未至發熱者當於感冒藥中求之

溫疫

春三四月間暴熱傷之者亦名溫病傷寒汗下過經不解者亦名溫病但當隨各經見證治之皆不宜汗下暴溫梔子升麻湯九味羌活湯過經和解參胡芍

藥湯

趙獻可醫貫

溫病論

夫傷寒二字蓋冬時嚴寒而成殺厲之氣觸冒之而卽時病者乃名傷寒不卽發者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也旣變爲溫則不得復言其爲寒不惡寒而渴者是也此仲景經文也其麻黃桂枝爲卽病之傷寒設與溫熱何與受病之源雖同所發之時則異仲景治之當別有方緣皆遺失而無徵是以各家議論紛紛至今未明劉守眞謂欲用麻黃桂枝必加凉藥於其中以免發黃之病張子和六神通解散以石膏寒藥中加麻黃蒼朮皆非也蓋麻黃桂枝辛熱乃冬月表散寒邪所宜之藥不宜用於春夏之時陶氏欲以九味羌活湯謂一方可代三方亦非也羌活湯易老所制之方乃治感四時不正之氣如春宜溫而反寒夏宜熱而反溫秋宜凉而反熱冬宜寒而反溫又有春夏秋三時爲暴寒所折雖有惡寒發熱之證不若冬時肅殺

之氣爲甚故不必麻黃桂枝以散寒惟宜辛凉之藥通內外而解之況此方須按六經加減之法不可全用也不若逍遙散爲尤妙眞可一方代三方也然則欲治瘟病者將如何余有一法請申而明之經曰不惡寒而渴者是也不惡寒則知其表無寒邪矣曰渴則知腎水乾枯矣蓋緣其人素有火者冬時觸冒寒氣雖傷而亦不甚惟其有火在內寒亦不能深入所以不卽發而寒氣伏藏於肌膚自冬至三四月歷時既久火爲寒鬱於中亦久將腎水熬煎枯竭蓋甲木陽木也藉癸水而生腎水既枯至此時强木旺無以爲發生滋潤之本故發熱而渴非有所感冒也海藏謂新邪喚出舊邪非也若復有所感表又當惡寒矣予以六味地黃滋其水以柴胡辛凉之藥舒其木鬱隨手而應此方活人者多矣予又因此而推廣之凡冬時傷寒者亦是鬱火證若其人無火則爲直中矣惟其有火故由皮毛而肌肉肌肉而腑臟今人皆曰寒邪傳裏寒變爲熱既曰寒邪何故入內而反爲熱又何爲而能變熱耶不知卽是本身中之火爲寒所

鬱而不得泄一步反歸一步日久則純熱而無寒矣所以用三黃解毒解其火也升麻葛根即火鬱發之也三承氣即土鬱則奪之小柴胡湯木鬱達之也此理甚簡而易只多了傳經六經諸語支離多岐凡雜證有發熱者皆有頭疼項强目痛鼻乾脅痛口苦等證何必拘爲傷寒局傷寒方以治之也予於冬月正傷寒獨麻黃桂枝二方作寒鬱治其餘俱不惡寒者作鬱火治此不佞之創論也聞之者孰不駭然吐舌及閱虞天民醫學正傳傷寒篇云有至人傳曰傳經傷寒是鬱病余見之不覺竊喜以爲先得我心之同然及考之內經帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰寒氣外凝內鬱之理腠理堅緻元府閉密則氣不宣通濕氣內結中外相薄寒盛熱生故人傷於寒轉而爲熱汗之則愈則外凝內鬱之理可知觀此而予以傷寒爲鬱火者不爲無據矣

景岳全書　臣張介賓著

論證

經曰冬傷於寒春必病溫是溫病即傷寒也然傷寒

有四時之不同如冬感寒邪而卽病者爲眞傷寒其有寒毒內侵而未至卽病者必待春溫氣動眞陰外越再觸寒邪其病則發故至春犯寒則發爲溫病至夏犯寒則發爲熱病亦猶傷氣者遇氣則作傷食者遇食則發其義一也然而傷寒瘟疫多起於冬不藏精及辛苦饑餓之人蓋冬不藏精則邪氣乘虛易入而饑餓勞倦之流則受傷尤甚故大荒之後必有大疫正爲此也但此輩疫氣旣盛勢必傳染又必於體質虛濁者先受其氣以漸徧傳則又有不待冬寒而病者矣然此以冬寒主氣之爲病也至於客氣變遷歲時不同故有冬行春令則應冷反溫夏行冬令則應熱反冷春秋皆然是則非其時而有其氣壯者無恙怯者受傷是又不止冬寒而運氣不正之害所當察而愼避者有如此

瘟疫本卽傷寒無非外邪之病但染時氣而病無少長率相似者是卽瘟疫之謂古人有云瘟證因春時溫氣而發乃因鬱熱自內而發於外初非寒傷於表也故宜用辛平之劑治與正傷寒用麻黃者不同也

此說固若近理而實有未必然者蓋瘟疫若非表證則何以必汗而後解故余於前論中謂其先受寒邪再觸則發誠理勢之確然也但其時有寒熱證有陰陽治陽證熱證者即冬時亦可清解治陰證寒證者即春夏亦可溫散謂宜因證因時者則可謂非寒傷於表也則不可

脉候

凡病傷寒瘟疫脉洪大滑數而數中兼緩者可治脉洪大而緊數甚者危脉雖浮大而按之無力者宜補兼表身雖熱而脉弱者當以純補爲主或微兼溫散身大熱而脉見沉澀細小足冷者難治瘟病四五日身熱腹滿而吐脉來細而弦强者十二日死瘟病二三日頭痛腹滿脉直而疾者八日死瘟病八九日頭身不痛色不變而利不止心下堅脉不鼓時或大者十七日死瘟病汗不出或出不至下部者死瘟病下利腹中痛甚者死以上死證言其略耳諸所未盡當於傷寒門叅閱

治法六要

自古傷寒治法苦於浩渺余自考索以來留心既久每臨編得其法未必見其病臨病見其證未必合其方可見病多變態執滯難行惟貴圓通而知其要耳故余註類經所列傷寒治要有六曰汗補溫清吐下然亦但言其概而未及其詳今悉諸法於此用補傷寒之未備者倘欲求仲景心法仍當閱傷寒本門使能彼此參證則綱舉目張自有包羅貫串之妙既約且盡而活人之要當無出此

汗有六要五忌

治傷寒之法余已析其六要而六要之外又有五忌者何也蓋六法之中惟汗爲主正以傷寒之愈未有不從汗解者故法雖有六汗實統之而汗外五法亦無非取汗之法也然取汗以辛散此固其常也而何以五法皆能取汗六要則已又何以有五忌之辯也蓋汗由液化其出自陽其源自陰若肌膚閉密營衛不行非用辛散則元府不開而汗不出此其一也又若火邪內燔血乾液涸非用清凉則陰氣不滋而汗不出此其二也又若陰邪固閉陽氣不達非用辛溫

則凝結不開而汗不出此其三也又若營衞不足根本內虧非用峻補則血氣不充而汗不出此其四也又若邪在上焦隔遮陽道不施吐涌則清氣不升而汗不出此其五也又若邪入陽明胃氣壅塞不以通下則濁氣不解而汗不出此其六也凡此者皆取汗之道是卽所謂六要也何謂五忌蓋一曰熱在表者內非實火大忌寒凉寒則陰邪凝滯不散邪必日深陽必日敗而汗不得出者死二曰元氣本弱正不勝邪者大忌消耗尤忌畏補消耗則正氣日消不補則邪氣日強消者日消甚者日甚而必不能汗者死三曰實邪內結伏火內炎者大忌溫補溫則愈燥補則愈堅而汗不得出者死四曰中虛氣弱幷忌汗諸條者大忌發散散則氣脫氣脫而汗不能出氣脫而汗不能收者死五曰病非陽明實邪幷忌下諸條者大忌通瀉瀉則亡陰陰虛則陽邪深陷而汗不得出者死是卽所謂五忌也能知六要而避五忌傷寒治法盡於是矣但假熱者多眞熱者少能察秋毫於疑似非有過人之見者不能也余之諄諄其亦顒望於潛

心者耳

汗散法

凡傷寒瘟疫表證初感速宜取汗不可遲也故仲景曰凡發汗服湯藥其方雖言日三服若病劇不解當半日中盡三服如服一劑病證猶在當復作本湯服之至有不肯汗出者服三劑乃解若汗不能出者死病也此所謂汗不宜遲也然取汗之法又當察其元氣病氣之虛實若忽爾暴病表證已具而元氣未虧者但以辛平之劑直散之若兼雜證則當察其寒熱溫涼酌宜而治不得但知發散也又若身雖大熱表證全具而脉見虛弱者必不易汗此卽當詳察補虛法酌而治之若不知標本而概行強散營竭則死

傷寒之宜平散者以其但有外證內無寒熱而且元氣無虧也宜以正柴胡飲爲主治此外如十神湯參蘇飲皆可酌用若病在陽明者宜升麻葛根湯若感四時瘟疫而身痛發熱及煙瘴之氣者宜敗毒散或荊防敗毒散若病在三陽而頭痛鼻塞項強身痛欬嗽者宜神朮散若傷風兼寒而發熱欬嗽者宜柴陳

煎或金沸草散甚者小青龍湯

傷寒之宜溫散者以其寒邪外盛而內無熱證及元氣無虧而氣清受寒者皆可從溫直散之宜二柴胡飲爲最當若寒甚表實者惟麻桂飲爲最妙毋疑畏也此外如五積散麻黃湯桂枝湯小青龍湯葛根湯聖散子之類皆可酌用

傷寒之宜凉散者以其外熱裏亦熱必脉證俱陽而煩渴喜冷及元氣强實者乃可兼凉兼散宜一柴胡飲爲先或九味羌活湯柴葛解肌湯甚者六神通解散皆可酌用若內外俱熱而或爲熱瀉者宜柴芩煎若表裏俱熱而兼斑疹者宜柴葛煎

傷寒之宜兼補兼散者以營衛不足血氣不充也用藥如用兵兵進而糧餉不繼則兵覆攻病而元氣不繼則病覆故治虛邪之宜散者必當先本後末此其最要者也若寒邪在營肝脾血少而邪熱不退者宜三柴胡飲或歸柴飲若寒邪在衛脾肺氣虛而表邪不解者宜四柴胡飲若脾胃氣血不足而邪熱不解者宜五柴胡飲若邪在半表半裏往來寒熱而微見

氣虛者宜小柴胡湯若溫暑大熱大渴津枯液涸陰虛不能作汗者宜歸葛飲若寒邪深入而陰中陽氣不足或背惡寒者必難散解非理陰煎不可若中氣大虛大寒身熱惡寒或大便溏泄而表邪不能解者非大溫中飲不可

補虛法

傷寒瘟疫俱外侮之證惟內實者能拒之即有所感而邪不勝正雖病無害最畏者惟內虛之人正不勝邪邪必乘虛深入害莫大矣故曰傷寒偏死下虛人且今人虛弱者多強實者少設遇挾虛傷寒而不知速救根本則百無一生故傷寒書曰陽證得陰脈者死正以陰脈即虛證也此欲辨之惟脈爲主而參以形證自無失矣蓋凡遇傷寒外熱等證而脈見微弱浮空舉按無力者即是虛證最不易解最不宜攻雖欲發汗汗亦難出即有微汗亦不過強逼膚腠之汗而必非營衛通達之所化若不顧虛實而逼之太甚則中氣竭而危亡立至矣然治虛之法須察虛實之微甚若半虛者必用補爲主而兼散其邪若太虛者

則全然不可治邪而單顧其本顧本則專以保命命得不死則元氣必漸復或於七日之後或十四日甚者二十日之後元氣一勝邪將不攻自潰大汗至而解矣欲知其兆亦察其脉但得弱者漸強小者漸大弦者漸滑緊者漸緩則大汗將通吉期近矣凡用補之法但當察其胷膈何如若胷腹多滯者未可補年壯氣實者未可補若氣本不實而胷腹無滯則放膽用之又若內無熱邪而素宜用溫其或氣有難行者則必兼煖胃而後可蓋補得煖而愈行邪得煖而速散切不可雜用消耗寒凉以分溫補之力其或初感寒邪但見脉證眞虛邪不易散等證則人參熟地之類開手便當速用愈早愈妙若或遲疑則縱寇深入反成難制此治虛邪最善之法也余用此法活人多矣嘗聞昧者有傷寒忌補之說不知補者所以補中是即托裏之意亦以寒邪如盜其來在外元氣如民其守在中足民正所以強中強中正所以禦外保命元機惟此一著何爲補住邪氣庸妄誤人莫此爲甚余因再悉於此用補傷寒治法之未備漸用漸熟方

知其妙自今而後知必有不惑余言而受余之生者將無窮矣

傷寒精血素弱或陰中陽氣不足脉細弱而惡寒者必須大助眞陰則陽從陰出而表邪自可速解惟理陰煎加柴胡麻黃之類或隨證加減用之爲最妙若傷寒於七八日之後脉數無力神昏氣倦或躁擾不寧散之不可淸之不可而邪不能解者只宜理陰煎大劑與之眞回生神劑也若氣血俱虛而邪不能解只宜平補者以五福飲爲主而隨證加減用之或大補元煎或六物煎或十全大補湯皆可用若脾胃中氣虛弱而邪不能解者宜四君子湯加減用之若中氣虛弱脾寒或兼嘔惡而邪不解者宜五君子煎溫胃飲若勞倦傷脾寒邪內陷身熱不退當升散者宜補中益氣湯若寒邪陷入陰分血虛不能外達而當升散者宜補陰益氣煎若陰虛發熱面赤口渴煩躁脉浮洪無力者宜六味地黃湯大劑與之一服可愈凡中氣虛寒表邪不解或日久畏藥或諸藥不效者只宜獨參湯或濃或淡或冷或熱隨其所好時時代

茶與之連日勿間使其營氣漸復則邪氣漸退大有囘生之妙毋忽之也

傷寒用補之法與用攻用散者不同蓋攻散所以去實邪其力峻其效速故凡用柴胡麻黄之類取效在一二三劑之間用大黄芒硝之類取效在一劑之間此而不效必其用之不善不可多也至若用補者所以補虛其力柔其功緩雖於一二劑見效者亦多有之若積勞積損氣血虛甚者欲其復元誠不易也但察其服補無礙或於脈證間略見相投便是得補之力故輕者二三劑重者十餘劑方得見功而汗出邪退以愈也若不知此理而但於一二劑間未見速效則必致庸讒起惑亂生而全功盡棄矣此不可不深察也

溫補法

凡治傷寒瘟疫宜溫補者爲其寒邪凝滯陽不勝陰非溫不能行非溫不能復也如寒氣在經者以邪在表也宜用溫散法具如前寒氣在臟者以陽氣虛也或宜溫補或止溫中然用溫之法但察其外雖熱而

內無熱者便是假熱宜溫不宜涼也病雖熱而元氣虛者亦是假熱宜溫不宜涼也眞熱者誰不得而知之惟假熱爲難辨耳病假熱者非用甘溫熱必不退矧眞寒者又在不言可知大都實證多眞熱虛證多假熱故治實者多宜用涼治虛者多宜用溫眞假不識誤人不淺矣又眞寒假熱之辨則實亦有寒實亦有熱虛亦有寒虛亦有熱若謂實者皆熱虛者皆寒則鑿而謬矣但實而寒者只宜溫散不必滋補虛而熱者只宜調補最畏寒涼蓋寒涼無生意而善敗元氣若以寒涼治虛證則熱未必退且暫用則或可久則無不敗脾而危者既已病熱又不宜寒則總云假熱本非過也

傷寒發熱而命門陽虛或惡寒或身痛或嘔或痢脈弱氣虛而表不能解者必用大溫中飲或理陰煎若傷寒身熱心肺有寒或嘔噦而欬或腹滿而喘止有寒邪而無虛者宜小青龍湯若陰證傷寒自利脈沉身痛發熱腹痛厥逆但有寒邪而元氣無虛者當用溫藥宜四逆湯若寒在太陰腹痛吐利或脹滿厥逆

脾胃虛寒而邪有不解者宜溫胃飲或理中湯若傷寒一二日邪在太陽或在少陰背惡寒而表不解者宜附子理陰煎在仲景則用附子湯若風寒在表陰寒在裏外爲身熱而內則瀉利不能止或見嘔惡或腹因利痛者此其中氣下泄則外邪益陷必不能解宜速用胃關煎或大溫中飲凡患傷寒有陰陽大虛元氣將敗而邪不能解者非六味囘陽飲不可然但有大虛大寒之意卽當用此若待其敗恐無及矣凡陰盛隔陽內眞寒而外假熱者其證必頭紅面赤或乾渴舌焦或口瘡喉痛或煩喘狂躁或身熱如火或見虛斑而蚊迹徧身或發陰黃而溺如金汁雖其外有此證而脈則微弱不鼓且或爲嘔惡或爲泄瀉或背腹畏寒或氣短似喘或昏睡無知或驚惶懼怯或雖熱不渴或言雖譫妄而氣促聲微或身雖躁狂而舉動無力禁之則止是皆內虛外實眞寒假熱之證須用理陰煎或六味囘陽飲大溫中飲八味地黃湯之類大劑與之庶可保全若虛火上浮喉痛舌燥不能熱飲者用井水浸藥冷與飲之此用假寒之味以

解上焦之假熱眞熱之性以救下焦之眞寒回陽起死眞神妙之法也其有血氣本虛用補相便然溫補旣多而病日昏憒且見煩熱難愈者此其陽邪獨亢陰氣不至而虛中有熱也但改滋陰以犀角地黃湯加黃芩麥冬或一柴胡飲加知母之類此十補一清之法一劑即效其妙如神醫中圓活最宜知此

清利法

凡治傷寒瘟疫宜清利者非止一端蓋火實者宜清火氣實者宜行氣食滯者宜消食痰盛者宜化痰皆所謂清利也凡此數者滯去則氣行而表邪自解然此宜用於邪實等證而本非虛證之所宜其有虛中挾實者不妨少爲兼用此中權度自有其宜若病在危急則毫不容謬設不當清而妄用之亦與撲殘燈者無異也

傷寒火盛者治宜清解若熱入陽明煩渴躁熱脉洪便實而邪有不解者宜柴胡白虎煎或單用白虎湯太清飲或玉泉散若汗後仍熱者亦宜用之若傷寒口渴煩熱赤斑脉洪大而無力者宜人參白虎湯若

傷寒邪在太陽發熱頭痛脉洪大表邪未解而內熱又甚者宜一柴胡飲或三黃石膏飲或六神通解散若六經通熱火邪不解或狂斑煩躁或頭紅面赤口乾舌黑脉洪邪實者宜抽薪飲或黃連解毒湯或加柴胡若傷寒熱入血室吐衄斑黃及血熱血燥不能作汗而邪不解者宜局方犀角地黃湯熱甚者宜良方犀角地黃湯若熱邪閉結血分大便不通而邪不能解者宜拔萃犀角地黃湯若少陰水虧陽明火盛熱渴失血牙痛便結脉空作喘而邪不能解者宜玉女煎若傷寒陽邪亢盛血脉不通而四肢厥逆者謂之熱厥宜四逆散若暑月時行瘟疫表裏俱熱宜清宜解者羌活升麻湯若傷寒熱結膀胱而小水不利火邪不退或挾熱泄瀉者宜大分清飲或柴苓煎或益元散若傷寒實熱內畜小水不利而口渴煩熱發黃者宜茵陳飲或大分清飲凡瘟疫熱甚而煩渴不寧者宜雪梨漿時時與之解渴退火最妙大勝於益元散至於冷水稟天一之性甘而不苦故大能清熱解煩滋陰壯水凡火盛水涸大渴便結營衛熱閉不

能作汗者最宜用之雖虛證不可用然亦有當用者但察其喉口熱極脣舌乾焦大便閉結不通而大渴喜冷者此陰虛水虧證也不妨與人參熟地桂附乾薑之屬相間並用藉以滋陰其功不小惟大便不結及微熱微渴勞倦陽虛等證最不宜用若妄用之則多致寒顫而敗

傷寒兼雜證者治宜調和清利凡傷寒兼風發熱欬嗽多痰者宜柴陳煎若食滯氣實邪結胃脘而表不解者宜大和中飲加柴胡若感四時寒濕之氣以致脾胃不和或嘔吐泄瀉脹滿者宜平胃散或寒盛多吐者宜和胃飲若外感風寒內停飲食頭痛寒熱或爲吐瀉脹滿者宜藿香正氣散若感四時寒濕發熱發黃身痛脈緊中寒泄瀉小水不利者宜柴苓飲若中無寒而多火者宜柴苓湯若外傷暑熱霍亂泄瀉小水不利腹痛脹滿內陰外陽者宜五苓散若外傷寒濕一身盡痛者羌活勝濕湯

吐法

凡傷寒宜吐者必其上焦有滯或食或痰結聚胷膈

而邪不得散者當吐也或寒邪濁氣內陷膈間而爲痞爲痛者當吐也蓋吐中自有發散之意若中氣虛寒脉弱無力及氣短虛煩不寧者皆不可吐凡用吐藥中病卽止不必盡劑

古方吐法多用獨聖散及茶調散凡上焦邪滯皆可用之然不若新吐法爲更捷也又凡諸藥皆可吐只隨證用藥煎湯服少頃探而吐之則輕重可酌標本可兼尤其善也

下法

凡傷寒瘟疫宜下者必陽明邪實於腑而祕結腹滿者乃可下之或元氣素强胃氣素實者亦可下之若大便雖數日不行而腹無脹滿及大便無壅滯不通之狀或連日不食而臍腹坦然軟而無碍者此其陽明胃腑本無實邪切不可妄下妄導以泄中氣又如傷寒門忌下諸條必當加意詳察不可誤用蓋諸誤之害下爲尤甚不可忽也今見時醫有妄下而亦不致死者必其元氣之素强能勝攻下者也若概引爲證必致殺人

傷寒邪入陽明便祕譫語腹滿煩熱脉證俱實者宜大承氣湯或調胃承氣湯若傷寒表證未除裏證又急表裏俱實者宜大柴胡湯若三焦六經邪火壅結大便不通而表邪不解者宜局方凉膈散若傷寒熱邪傳裏當下而氣血俱虛者宜陶氏黃龍湯若傷寒熱邪傳裏而血虛閉結腹脹作痛邪不能解者宜玉燭散若時氣瘟疫偏行火邪內畜三焦實熱大便祕結而邪不能退者宜五瘟丹若時行瘟疫發熱火浮於上胷膈結熱者宜大淸丸凡諸有宜通宜下者但隨證作引送百順九一二三錢最捷最妙

瘟疫熱毒辨治

瘟疫本卽傷寒然亦有稍異以其多發於春夏且因時氣偏行大小相似必待日數足然後得汗而解者是爲瘟疫之證雖古法云瘟病在三陽者多三陰者少然亦不可拘泥若見陰證陰脉是卽三陰病也大宜辨而治之

瘟疫之在三陽者當辨其經如脉浮頭疼發熱身痛者太陽證也宜九味羌活湯加減治之若脉長鼻乾

不眠而躁者陽明病也宜葛根解肌湯或十味參蘇飲加減治之若脉弦而數胷脅痛而耳聾少陽證也宜小柴胡湯加減治之按此三陽之治乃古方治瘟之大略然此證寒熱虛實無所不有仍當察治如前不可拘也

瘟疫初起而頭疼身痛憎寒發熱脉緊數洪滑而別無他證先宜正柴胡飲或敗毒散或十神湯若瘟疫初起多陰少陽脉證無虛者宜神朮散若瘟疫胷膈滿悶小柴胡加枳實橘紅熱在內者仍加黃連若暑月時行瘟疫表裏俱熱甚宜清火解毒者羌活升麻湯若瘟疫火盛脉洪大而熱躁甚者三黃石膏湯若瘟疫熱毒上浮頭面俱腫目不能開口乾舌燥咽喉不利者普濟消毒飲若瘟疫脉洪大煩躁熱渴者白虎湯或兼嘔吐者仲景竹葉石膏湯若瘟疫發狂譫語脉洪大滑實而大便祕結不通者大承氣湯或雞子清飲若瘟疫內外俱有實邪大便不通當表裏雙解者防風通聖散若瘟疫病八九日不退而發斑發黃但脉不虛不浮緊而腹見痞滿者率可以承氣五

苓合服而下之若瘟疫頭身紅赤肢體熱甚煩躁不能當者宜用解瘟疫熱毒法及內飲雪梨漿或用井華水調玉泉散俱妙按以上諸法乃因時因證皆陽證實邪之所宜若瘟疫脉弱無力或外雖實而內則虛或口不喜冷大便不結之類卽非陽證不得以身熱脉數俱認爲火雖在暑月如理中湯理陰煎大溫中飲大補元煎及前溫補諸法皆當隨證必用此舍時從證之妙法也矧夏月尤多伏陰故凡臨此證者必先察陰陽次辨虛實則其要也宜切識之

徐東皐曰瘟疫六七日不解以至熱入血室發黃身如煙熏目如金色口燥而熱結以砭鍼刺曲池出惡血仍以通聖散兼散兼下得汗如黃水糞如黑膏而卽愈按此卽北方之所謂打寒也其法用手捋上膊使血聚於臂以帛縛定乃用筯夾磁鋒擊刺肘中曲澤旁之大絡使邪毒隨惡血而出亦最捷之法窮人用之極效然非曲池穴也

大頭瘟證治

大頭瘟者以天行邪毒客於三陽之經所以憎寒發

熱頭目頸項或咽喉俱腫甚至腮面紅赤肩背斑腫狀如蝦蟆故又名爲蝦蟆瘟大都此證多屬風熱然亦有表裏虛實之辨又外科有時毒證亦即此也

一大頭蝦蟆瘟治法凡病在頭目內火未盛者先當解散宜正柴胡飲或敗毒散若時毒咽喉腫痛內火不甚而便利調和者葛根牛蒡湯時毒表裏俱熱頭目俱腫宜清宜散者柴葛煎若毒在陽明表裏俱熱多頭痛鼻乾宜散者柴葛解肌湯若時毒三陽熱極狂躁咽喉腫痛宜清兼散者梔子仁湯若時毒徧行邪熱上浮頭面俱腫咽喉不利者普濟消毒飲若時毒風熱上聚頭面宜升散者犀角升麻湯若時氣盛行宜清火解毒者羌活升麻湯若時毒血熱煩躁兼赤斑者犀角散人參白虎湯若時毒內外俱實當雙解者防風通聖散若時毒焮腫作痛脈實便祕宜下者五利大黃湯或漏蘆升麻湯或連翹消毒散若時毒雖盛而外實內虛脈弱神困凡諸虛證有據者必當救裏內托宜參芪托裏散或托裏消毒散其有陽虛假熱而兼嘔惡泄瀉者如六味回陽飲之類皆所

必用不可疑也若頭項腫甚疼痛難忍者宜用清涼救苦散敷之或取側柏葉自然汁調蚯蚓泥敷之

初感治法

凡病傷寒瘟疫者無不發熱然初感之時其邪在表未經傳裏未至鬱熱雖身表有熱不過膚腠之寒邪而內未有火豈卽陽證斯時也但用溫散或兼托散藥對其證無不卽愈奈何時俗之醫一見發熱便認爲火而芩連知蘗開手便用不知內無實熱何以當此以寒邪得寒藥而表裏俱寒勾連不解則日以內傳寒涼妄用則元陽日敗凡受斯害死者多矣此理不明則旣不知表裏又不知先後終身不省每至悞人而且敢侈口談醫其心果亦安乎

飲食宜忌

凡飲食有宜忌者有不宜忌者若病傷寒而食不斷者以邪猶在表未深入也及其稍深而在半表半裏之間則食漸減矣再入胷膈胃口則全不食矣邪旣在胃則胃口不饑所以傷寒不食者或十日或二十日皆無足慮者亦以胃氣不餒則不敗也但不欲食

者不可強食强食則助邪或新愈之後胃氣初醒尤不可縱食縱食則食復此皆大忌也至有不宜忌者則如勞倦內傷之人偶感寒邪亦必發熱此多以勞傷中氣本非眞正傷寒外邪內陷之病所以外雖發熱而內則饑餒每多思食奈何庸昧之輩但見發熱則曰餓不死傷寒不論虛實一概禁之常見欲食者索之不得而且加以尅伐寒凉之藥嗟嗟饑腸受剝虛者益虛內外夾攻苦無所訴及胃氣既脫反不欲食矣卽欲救之已無可及予常治此證每借食爲藥所活多人而見禁食受斃者亦已不少故詳言之若病人時時覺饑而索食者此其邪不在臟胃中空虛而然必不可禁但不宜縱耳且因此可察虛實關係非小不可忽也

巢氏曰凡瘟疫病新瘥脾胃尚虛穀氣未復若作勞妄動傷力并食猪羊雞犬魚膾炙煿肥膩生果麪食硬澀難消之物停積腸胃膈悶腹脹便祕或大吐大下重復發熱病作不可救矣

避疫法

瘟疫乃天地之邪氣若人身正氣內固則邪不可干自不相染故避之之法惟在節慾節勞或於房室勞倦之後尤不可近仍勿忍饑以受其氣皆要法也至於却邪之法則如刺法論所云天牝從來復得其往氣出於腦卽不干邪蓋天牝者鼻也鼻受天之氣故曰天牝氣自空虛而來亦欲其自空虛而去卽天牝從來復得其往也正以氣通於鼻鼻通於腦毒入腦中則流布諸經令人相染矣氣出於腦謂嚏之或張鼻以泄之或受氣於室則泄氣於外而大吸精氣以易之則邪從鼻出而毒氣自散此却邪於外之法也又如想心如日等法蓋膽屬少陽爲中正之官少陽氣壯則臟氣賴以俱壯而邪不能入此強中禦邪之法也凡探親診疾事有不容已者但知此諸法則雖入最穢之地自可保其無慮一方治天行時氣宅舍怪異用降眞香燒焚大解邪穢小兒帶之能解諸邪最驗一法以福建香茶餅不時噙口中大辟傷寒瘴氣穢惡

石室祕錄 臣陳士鐸著

瘟疫治法

瘟疫之證其來無方然而名之亦有其故或人事之錯亂或天時之乖違或尸氣之纏染或毒氣之變蒸皆能成瘟疫之病也證既不同治難畫一然而瘟疫之人大多火熱之氣蘊畜於房戶則一家俱病蘊畜於村落則一鄉俱病蘊畜於市廛則一城俱病蘊畜於道路則千里皆病故證雖多但去其火熱之氣而少加祛邪逐穢之品未有不奏功效者也方用元參五錢大黃麥冬白芍滑石花粉各三錢石膏二錢柴胡荊芥各一錢水煎服此方可通治瘟疫之病出入加減無不奏功此方之妙用大黃以蕩滌胷腹之邪用荊芥柴胡以散其半表半裏之邪氣用天花粉以消痰去結用石膏以逐其胃中之火用芍藥以平肝木不使來尅脾土則正氣自存而邪氣自出此方最妥最神治瘟疫者以此爲枕中祕

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十卷目錄

醫部彙考三百

瘟疫門二

方

屠蘇酒
太乙流金散
雄黃散
粉身散
殺鬼燒藥方
虎頭殺鬼圓
辟溫殺鬼圓
雄黃圓
赤散
又方
又方
肝溫方
又方
心溫方
脾溫方
肺溫方
腎溫方
萎蕤湯
治瘟方
又方
漏蘆湯
消毒丸
潔古雄黃丸
升麻葛根湯
柴胡升麻湯
十神湯
不換金正氣散
大青四物湯
老君神明散
務成子螢火丸
聖散子
大補元煎
五福飲
補陰益氣煎
和胃飲
大和中飲
百順丸
一柴胡飲
二柴胡飲

三柴胡飲　四柴胡飲　五柴胡飲　正柴胡
飲　柴麻桂飲　大溫中飲　柴陳煎　柴芩煎
歸葛飲　歸柴飲　太清飲　玉女煎　玉
泉散　雪梨漿　六味回陽飲　理陰煎　溫
胃飲　五君子煎　胃關煎　柴葛煎
單方
導引

藝術典第三百二十卷

醫部彙考三百

瘟疫門二

方

屠蘇酒（千金方下同）

辟疫氣令人不染溫病及傷寒歲旦之方

大黃十五銖　白朮　桂心各十八銖　桔梗
蜀椒各五十銖　菝葜十二銖　烏頭六兩

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中

令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也又一方有防風一兩赤小豆

太乙流金散

辟溫氣

雄黃三兩　雌黃　羚羊角燒各二兩　礬石

鬼箭羽各一兩半

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

雄黃散

辟溫氣

雄黃五兩　硃砂（一作赤木）　菖蒲　鬼臼各二兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

粉身散

辟溫病常用

芎藭　白芷　藁本各等分

右三味治下篩內米粉中以粉身

殺鬼燒藥方

辟溫氣

雄黃　丹砂　雌黃各一斤　羚羊角（羖羊角亦可）

虎骨　鬼臼　鬼箭羽　野丈人　石長生

蕪荑　猳猪屎　馬懸蹄各三兩　青羊脂

菖蒲　白朮各八兩　蜜蠟八斤

右十六味末之以蜜蠟和爲丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓

辟溫

虎頭五兩　硃砂　雄黃　雌黃各一兩半

鬼臼　皂莢　蕪荑各一兩

右七味末之以蜜蠟和爲丸如彈子大絳袋盛繫臂男左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓

辟溫殺鬼圓

熏百鬼惡氣

羖羊角　虎骨各七兩　雄黃　雌黃　龍骨
龜甲　鯪鯉甲　蝟皮各二兩　樗雞十五枚
芎藭　珍珠各五兩　東門上雞頭　空青各一兩
右十三味末之烊蠟二十兩丼手圓如梧子正旦門戶前燒一圓男左女右辟百惡獨宿弔喪問病各吞一圓小豆大天陰大霧日燒一圓於戶牖前佳

雄黃圓

漢建炎二年太歲在酉疫氣流行死者極衆即有書生丁季迴從蜀青城山來東過南陽從西市門入見患疫癘者頗多遂於囊中出藥人各惠之一圓靈藥霑脣疾無不瘥市中疫鬼數百餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃有鬼王見書生謂有道法兼自施藥感衆鬼等奔走若是遂詣書生欲求受其道法書生曰吾無道法乃囊中之藥呈於鬼王鬼王覩藥驚惶叩頭乞命而走此方藥帶之入山能辟虎狼蛇蟲入水能除水怪蛟蜃

雄黃　雌黃　曾青　鬼督郵　珍珠　虎頭骨

丹砂　桔梗　白朮　芎藭　白芷　鬼箭羽

蕪荑　女青　鬼臼　藜蘆　菖蒲　皂莢各一兩

右十八味末之蜜丸如彈子大絹袋盛男左女右帶之卒中惡病及時疫吞如梧子一丸燒一丸彈子戶內

赤散

辟溫疫氣傷寒熱病

藜蘆　藺茹各一兩　丹皮　皂莢各一兩六銖

附子　桂　珍珠各六兩　細辛　乾薑各十八銖

右九味末之內珍珠合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便以粟米大內著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方

斷瘟疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者

赤小豆　鬼箭羽　鬼臼　雄黃各二兩

右四味末之蜜和服如小豆一丸可與病人同牀

肝溫方

治肝腑臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰强急縮目中生花

桂心一兩　白朮　芒硝　大青　梔子各三兩

柴胡五兩　石膏　生薑各八兩　生地黃

香豉各一升

右十味㕮咀水九升煑取三升分三服

又方

治肝腑臟溫病陰陽毒先寒後熱頸筋攣牽面目赤黃身中直强

元參　細辛各二兩　石膏八兩　梔子　黃芩

升麻　芒硝各三兩　竹葉切五升　車前草二升

右九味㕮咀以水一斗半煑竹葉車前取七升去滓下諸藥煎至三升內芒硝分三服

心溫方

治心腑臟溫病陰陽毒戰掉不安驚動

大青　黃芩　梔子　知母　芒硝各三兩

麻黃四兩　元參六兩　生地黃切一升　石膏

生葛根各八兩

右十味㕮咀以水九升煑取三升去滓下芒硝分三服

脾溫方

治脾腑臟溫病陰陽毒頭重頸直皮肉痹結核隱起

大青　羚羊角　升麻　射干　芒硝各三兩

梔子四兩　寒水石五兩　元參八兩

右八味㕮咀以水七升煑取三升分三服

肺溫方

治肺腑臟溫病陰陽毒欬嗽連續聲不絕嘔逆

杏仁　前胡各四兩　麻黃　梔子　紫菀

大青　元參　葛根各三兩　桂　甘草各二兩

石膏

右十一味㕮咀以水九升煑取三升分作三服

腎溫方

治腎腑臟溫病身面如刺腰中欲折熱毒內傷

葱白　豉各一升　茵陳　梔子　芒硝各二兩

苦參　生葛各四兩　生地黃　石膏各八兩

右九味㕮咀以水九升煑取二升半下芒硝分三服

萎蕤湯

治風溫之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此疾者宜服之

萎蕤　白薇　麻黃　獨活　杏仁　芎藭

甘草　青木香　石膏各二兩

右九味㕮咀以水八升煑取三升去滓分三服取汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分

治瘟方（丹溪下同）

大黃　黃連　黃芩　人參　桔梗　防風

蒼朮　滑石　香附　人中黃

右爲末神麴糊丸每服六七十丸分氣血與痰作湯使氣虛者四君子湯血虛者四物湯痰多者二陳湯送下熱甚者童便下

又方

半夏　川芎　茯苓　陳皮　山楂　白朮

蒼朮（君）　甘草

如頭痛加酒芩

口渴加乾葛

身痛加羌活薄桂防風芍藥

漏蘆湯

治臟腑積熱發爲腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌填塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆　升麻　大黃　黃芩　藍葉　元參各等分

右㕮咀每服二錢水煎服腫熱甚加芒硝二錢

消毒丸

治時毒疙瘩惡證

大黃　牡蠣　殭蠶炒各等分

右爲末煉蜜丸如彈子大新水化一丸內加桔梗大力子尤妙

潔古雄黃丸

辟時疾可與病人同牀傳著衣服亦不相染

雄黃研一兩　赤小豆炒　丹參　鬼箭羽各二兩

右爲細末蜜丸每服五丸空心溫水下

升麻葛根湯（良方下同）

治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱

升麻　芍藥　甘草各二錢半　乾葛三錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

柴胡升麻湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾欬嗽涕唾稠粘

柴胡　乾葛　荊芥　赤芍藥　石膏各一錢半

前胡　升麻　桑皮　黃芩各一錢

右作一服水二鍾生薑三片豆豉二十粒煎至一鍾不拘時服

十神湯

治傷寒時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹不問陰陽兩感風寒並皆治之

川芎　麻黃　赤芍藥　葛根　紫蘇　升麻

白芷　陳皮　甘草炙　香附各一錢半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服
發熱頭疼加連鬚葱白二根中滿氣實加枳殼煎

不換金正氣散

治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服之

蒼朮　橘皮　半夏麴　厚朴製　藿香各二錢
甘草炙一錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎至一鍾
食前服

大青四物湯（活人書下同）

治熱病發斑赤色煩痛

大青一兩　阿膠　甘草各二錢半　豉二合

右分三服每用水一盞半煎一盞入膠烊化服

老君神明散

治天行瘟疫

附子炮去皮　白朮各二兩　烏頭炮去皮四兩
桔梗　細辛各一兩

右五味擣粗篩縫絹囊盛帶之居閭里皆無病若

有疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐即差若經三四日抄三寸匕以水二椀煑令大沸分三服

務成子螢火丸

主辟瘟疫惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火　鬼箭削取皮羽　蒺藜各一兩　雄黃
雌黃　礬石燒汁盡各二兩　羖羊角　鍛竈灰
鐵錘柄入鐵處燒焦各一兩半

右九味搗篩爲散以雞子黃并丹雄雞冠一具和之如杏仁大作三角絹囊盛五丸帶左臂仍更掛戶上

聖散子

蘇內翰云昔嘗覽千金三建散方於病無所不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不拘常制至理開惑智不能知今予所謂聖散子者殆此類也自古論病惟傷寒爲至危急表裏虛實日數證候應汗下之類差之毫釐輒至不救若時毒流行

用聖散子者一切不問陰陽之感連服取差不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一大盞即時不入其間平居無病能空腹一服則飲食快美百病不生濟世衞家之寶也其方不知其所從出而故人巢君世寶之以治瘟疫百不失一余既得之謫居黃州連年大疫所全活者不可勝數巢君初甚惜此方指江水爲盟約不傳人余切隘之以傳蘄水道人龐安常龐以醫聞於世又善著書故以授之且使巢君之名與此方聞不朽

草豆蔻十枚去皮麪裹炮　木猪苓去皮　茯苓

附子炮去皮臍　獨活去蘆頭　石菖蒲　芍藥

厚朴去皮薑汁炙　麻黃去根節　藁本去沙土

枳殼去穰麩炒　柴胡去蘆頭　澤瀉　藿香葉

高良薑　華陰細辛　防風去蘆頭　白术炒

半夏薑製各半兩　甘草炙一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取八分去滓熱服餘滓兩服合爲一服重煎空心服之

大補元煎

治氣血大壞精神失守危劇等證

人參一二錢至一二兩　山藥炒　杜仲各二錢

熟地二三錢至二三兩　山萸一錢（畏酸吞酸者去之）

炙甘草一二錢　枸杞　當歸各二三錢（泄瀉者去之）

水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

治五臟虧損者

人參　熟地俱隨宜　當歸二三錢　炙草一錢

白朮炒一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

治陰虛外感不解便結不通等證

人參一二三錢　山藥酒炒　當歸各二三錢

熟地三五錢或一二兩　陳皮　炙甘草各一錢

升麻三五分（火浮於上者不用）　柴胡一二錢（無外邪者不用）

水二鍾加薑三五七片煎八分食遠溫服

和胃飲

治痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛等證

陳皮　厚朴各錢半　乾薑炮一二錢　炙草一錢

水一鍾半煎七分溫服

大和中飲

治飲食畱滯積聚等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂

麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

百順丸

治一切陽邪積滯傷寒實熱祕結等證

川大黃錦紋者一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅搗丸菉豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜爲丸亦可

一柴胡飲

治感四時不正之氣寒熱如瘧

柴胡二三錢　芍藥二錢　甘草八分　黃芩

生地　陳皮各一錢五分

水一鍾半煎七八分溫服

二柴胡飲

治四時外感本無內熱不無妄用涼藥者

柴胡一錢半或二三錢　陳皮　厚朴各一錢半

半夏二錢　細辛一二錢　甘草八分

加生薑三五片水一鍾半煎七八分溫服

三柴胡飲

治四時外感陰分不足者

柴胡二三錢　芍藥一錢五分　生薑三五片

炙甘草　陳皮各一錢　當歸二錢（泄瀉者易以熟地）

水一鍾半煎七八分溫服

四柴胡飲

治元氣不足外感風寒六脉緊數微細正不勝邪

柴胡一二三錢　人參二三錢或五七錢酌用

炙甘草一錢　生薑三五片　當歸二三錢（瀉者勿用）

水二鍾煎七八分溫服

五柴胡飲

治中氣不足外邪不散兼培血氣以逐寒邪

柴胡一二三錢　熟地三五錢　芍藥炒一錢半

當歸　白朮各二三錢　炙甘草一錢　陳皮酌用

水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

治外感初起血氣和平者

柴胡一二三錢　芍藥二錢　陳皮一錢五分

防風　甘草各一錢　生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

麻桂飲

治瘟疫陰寒氣勝夏月不必厚蓋津津透徹爲度

官桂一二錢　當歸三四錢　陳皮隨宜或不用

麻黃二三錢　炙甘草一錢

水一鍾半加薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服

大溫中飲

治四時寒疫元陽大虛正不勝邪之證

熟地三五七錢　白朮　當歸各三五錢（泄瀉者山藥代）

人參二三錢甚者一兩或不用　炙甘草一錢

柴胡二三四錢　麻黃一二三錢　肉桂一二錢

乾薑炒熟一二錢或用煨生薑三五七片亦可

水二鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

柴陳煎

治外感欬嗽多痰等證

柴胡二三錢　陳皮一錢半　生薑三五七片

半夏　茯苓各二錢　甘草一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服

柴芩煎

治表邪未解外內俱熱脉滑數者

柴胡二三錢　枳殼一錢五分　黃芩　梔子

澤瀉　木通各二錢

水二鍾煎七分溫服

歸葛飲

治陽明溫暑時證熱渴津竭陰虛不能作汗

當歸三五錢　乾葛二三錢

水二鍾煎一鍾以冷水浸涼徐徐服之得汗即解

歸柴飲

治外感營虛不能作汗神方

當歸一兩　柴胡五錢　炙甘草八分

水一鍾半煎服

太清飲

治胃火煩熱發斑嘔吐

知母　石斛　木通各一錢半　生石膏五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

玉女煎

治水虧火盛脈浮洪滑大

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　知母

牛膝各錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

玉泉散

一名甘露散治陽明內熱溫疫斑黃

生石膏六兩　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下加硃砂三錢亦妙

雪梨漿

解煩熱退陰火生津止渴

清香甘美大梨削去皮

別用大椀盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃

水必甘美但頻飲其水勿食其柤退陰火極速也

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子

炮乾薑各二三錢　歸身三錢（泄瀉或血動者代以冬朮多多益善）

熟地五錢或一兩

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治眞陰不足忽感寒邪服此不攻自散

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治寒疫嘔吐泄瀉

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

當歸一二錢（泄瀉者勿用）　扁豆炒二錢　炙甘草
陳皮各一錢或不用　乾薑炒焦一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

治脾胃虛寒兼濕者
人參二三錢　白朮　茯苓各二錢　甘草一錢
乾薑炒黃一二錢
水一鍾半煎服

胃關煎

治脾腎虛寒等證
熟地三五錢或一兩　炙甘草一二錢　山藥炒
白扁豆炒各二錢　吳茱萸製五七分　焦乾薑
白朮炒各一二三錢
水二鍾煎七分食遠溫服

柴葛煎

治瘟疫表裏俱熱
柴胡　乾葛　黃芩　連翹　芍藥　甘草
水一鍾半煎服

單方

天氣不和疫病流行預備一物柏枝散取南向社中柏東南枝曝令乾搗末酒服方寸匕神良（千金方下同）

又方正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之

斷溫病不相染著方汲水瓶一長七寸盜著病人臥席下良

又方以繩度所住戶中壁屈繩卽斷之

治溫病不相染方以桃樹蠹屎末之水服方寸匕

又方朮豉等分酒漬服之妙

又方正旦吞麻子赤小豆各二七粒又以二七粒投井中

又方新布袋盛赤豆一升內井中三日出舉家服二十七枚

又方松葉末之酒服方寸匕日三服

又方常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大小並服不限多少

治溫令不相染新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚

溫疫用白藥子二枚爲末水服之

又方白蜜和上色硃砂粉一兩以太歲日平旦大小勿食向東方立吞服三七丸如麻子大勿令齒近之井吞赤小豆七枚投井泉中終身勿忘此法

又方凡時行疫厲常以月望日細剉東引桃枝煑湯

浴之

瘴癘氣方蒜五子并皮碎之豉心一升二味以三歲男兒尿二升煑五六沸去滓服之良

又方青竹茹二升以水四升煑取三升分作三服

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩欲倒身微熱戰掉不安時復憎寒心中欲吐吐時無物方用新猪尿二升半內好酒一升攪令散以生布絞取汁更以綿濾頓服之取盡即地鋪煖臥覆蓋鋪前著火當汗出若得汗當細細去上衣勿使心寒寒即不差看汗自乾乃起慎風冷

辟禳時疫半天河水飲之（醫林集要）

時氣欲死大錢百文水一斗煑八升入麝香末三分稍飲至盡或吐或下愈（肘后方下同）

時氣溫病頭痛壯熱脉大始得一日者比輪錢一百五十七文水一斗煑取七升服汁須臾復以水五升更煑一升以水二升投中合得三升出錢飲汁當吐毒出也

溫病熱甚飲水成暴冷啘者茅根切枇杷葉拭去毛

炙香各半斤水四升煎二升去滓稍稍飲之（龐安常傷寒卒病論下同）

溫病伏熱在胃令人胷滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦致噦也茅根切葛根切各半斤水三升煎一升半每溫飲一䑲噦止卽停

傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升水一斗煑一升頓服取汗（肘后方）

疫病不染五月五日午時多采蒼耳嫩葉陰乾收之臨時爲末冷水服二錢或水煎舉家皆服能辟邪惡（千金方）

天行熱狂芭蕉根搗汁飲之（日華）

時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用牛蒡根搗汁服一小盞效（聖惠方）

天行時疾生牛蒡根搗汁五合空腹分爲二服服訖取桑葉一把炙黃以水一升煑取五合頓服取汗無葉用枝（千金方）

天行熱病初起一二日者麻黃一大兩去節以水四升煑去沫取二升去滓著米一匙及豉爲稀粥先以

湯浴後乃食粥厚覆取汗卽愈（必用方）

溫毒發斑嘔逆名黑膏生地黄二兩六錢二字半好豆豉一兩六錢二字半以猪膏十兩合之露一夜煎減三分之一絞去滓入雄黄麝香如豆大攪匀分作三服毒從皮中出則愈忌蕪荑（千金方）

辟禳瘟疫正月上寅日搗女青末三角絳囊盛繫帳中大吉（肘后方）（下同）

時疫流毒攻手足腫痛欲斷用虎杖根剉煑汁漬之良

天行毒病七八日熱積胞中煩亂欲死凝雪湯用芫花一斤水三升煑取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也（千金方）

時疾發黄狂悶煩熱不識人者大苦蔞實黄者一枚以新汲水九合浸淘取汁入蜜半合朴硝八分盡分再服便瘥（圖經）

時氣頭痛壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去滓分服汗出卽瘥未汗再服若心熱加梔子仁十枚（聖惠方）

釣樟置門上辟天行時氣（蕭炳）

天行餘毒手足腫痛欲斷作坑深三尺燒煎灌酒著屐居坑上以衣壅之勿令泄氣（類要）

時疾頭痛發熱者以連根葱白二十根和米煑粥入酢少許熱食取汗卽解（濟生祕覽）

時氣溫病初得頭痛壯熱脉大卽以小蒜一升杵汁三合頓服不過再作便愈（肘后方）

禳解疫氣六月六日采馬齒莧曬乾元日煑熟同鹽酢食之可解疫癘氣（經驗方）

溫病食勞杏仁五兩酢二升煎取一升服之取汗瘥（類要）

預辟瘴癘桃仁一斤吳茱萸青鹽各四兩同炒熟以新瓶密封一七取出揀去茱鹽將桃仁去皮尖每嚼一二十枚山居尤宜之（選奇方）

傷寒溫疫已發未發用梨木皮大甘草各一兩黃秫穀一合爲末鍋底煤一錢每服三錢白湯下日二服取愈（簡易方）

溫病發噦因飲水多者枇杷葉去毛炙香茅根各半

斤水四升煎二升稍稍飲之（龐安常方）

時氣煩渴生藕汁一盞生蜜一合和勻細服（聖惠方）

天行溫疫松葉細切酒服方寸匕日三服能辟五年瘟（傷寒類要）

辟禳瘟疫每臘月二十四日五更取第一汲井水浸乳香至元旦五更溫熱從小至大每人以乳一塊飲水三呷則一年無時災孔平仲云此乃宣聖之方孔氏七十餘代用之也

時氣溫病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥（肘後方下同）

時行發黃竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煑取七升細服盡劑愈

風熱邪病蝦蟇燒灰硃砂等分爲末每服一錢酒服日三甚有神驗（外臺祕要）

熱病下痢欲死者龍骨半斤研水一升煮取五升候極冷稍飲得汗取愈效（肘後方）

熱病目暗因差後食五辛而致用鯽魚作臛食之（集驗）

方

預辟溫疫鮑魚頭燒灰方寸匕合小豆末七枚米飲服之令瘟疫氣不相染也（肘后方下同）

辟禳瘟疫冬至日取赤雄雞作腊至立春日煑食至盡勿分他人

時行發黃用金色脚黃雌雞治如食法煑熟食之幷飲汁令盡不過再作亦可少下鹽豉

天行不解已汗者用新生雞子五枚傾盞中入水一雞子攪渾以水一升煑沸投入納少醬啜之令汗出愈（許仁則方）

天行嘔逆食入卽吐雞子一枚水煑三五沸冷水浸少頃吞之（外臺）

時行發黃酢酒浸雞子一宿吞其白數枚（肘后方下同）

傷寒時氣豬膏如彈丸溫水化服日三次

天行勞復合頭垢棗核大服一枚良（類要）

熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以泥固濟煅半日去火毒研末新汲水服三錢未退再服（斗門方）

大頭天行羌活酒黃芩酒蒸大黃水煎服（東垣）

又方歌曰人間治疫有仙方一兩殭蠶二大黃薑汁爲丸如彈子井華調蜜便清凉（丹溪）

瘟疫熱病上焦邪實或痰食氣逆不通用蘿蔔子搗碎溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃當吐有吐不盡者必從下行或爲末溫水調服一匙亦妙（景岳全書下同）

又方用鹽少許於鍋中炒紅色入水煮至將滚未滚之際攪勻試其滋味稍淡每飲半椀漸次增飲自吐以病去爲度

又方諸藥皆可取吐但隨證作湯劑探吐之

天行瘟疫取初病人衣於甑上蒸過則一家不染（時珍）

又方桃蠹蟲糞爲末水服方寸匕令不相染（子母秘錄）

又方五月一日取土或磚石入瓦器中埋著門外階下合家不患時氣（藏器下同）

又方正旦取古塚磚呪懸大門上一年無疫疾

導引

素問刺法論入疫室辟傳染法帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦卽不干邪氣出於腦卽先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次

想黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身之畢以想頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六八二七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十一卷目錄

醫部彙考三百一

癱瘓門一

黃帝素問（四氣調神大論　生氣通天論　陰陽別論　痿論　脈解篇　氣交變大論　五常政大論　六元正紀大論　至眞要大論）

靈樞經（邪氣臟腑病形篇　本神篇　經脈篇　陰陽二十五人篇）

張機金匱要略（骨痿）

傷寒論（傷寒吐下後成痿）

張從政儒門事親　指風痺痿厥近世差元說
李杲十書　濕熱成痿肺金受邪論　暑傷胃氣則痿論
朱震亨心法　痿證證治
樓英醫學綱目　總論　痿病風病異治辨
王綸明醫雜著　痿證不可作風治
李中梓醫宗必讀　總論　治法
王肯堂證治準繩　總論
張介賓景岳全書　論證　論治
陳士鐸石室祕籙　痿病治法

藝術典第三百二十一卷

醫部彙考三百一

癱痿門一

黃帝素問

四氣調神大論

冬三月此爲閉藏水氷地坼無擾乎陽早臥晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥奉生者少

註腎王於冬逆冬藏之氣則傷腎至春爲痿厥之病因奉生者少故也蓋肝木生於冬水主春生之氣而養筋筋失其養則爲痿生氣下逆則爲厥

生氣通天論

因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿

註陰濕上干陽氣而冒明故首如裹陽氣柔則養筋陽氣傷而不能榮筋故大筋緛短小筋弛長蓋大筋連於小筋絡骨節之內故鬱熱而緛短於骨肉之外故因濕而弛長短則爲拘攣長則爲痿棄

陰陽別論

三陽爲病發寒熱下爲癰腫及爲痿厥腨痟

註三陽者太陽也太陽爲諸陽主氣而主筋筋傷則痿氣傷則厥

三陽三陰發病爲偏枯痿易四支不舉

註三陽三陰者太陽太陰也太陽虛則爲偏枯陽虛而不養筋則爲痿脾屬四支故不舉也

痿論

黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脈肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄也

註 形身之所以能舉止動靜者由臟氣之呴養於筋脈骨肉也使臟病於內則形痿於外矣肺熱則金燥葉焦而皮毛虛薄五臟之皮肉筋骨皆由於肺以資養今皮膚薄著則精液不能轉輸故五臟皆熱而生痿躄矣

心氣熱則下脈厥而上上則下脈虛虛則生脈痿樞折挈脛縱而不任地也

註 心氣熱則氣惟上炎心主脈故脈氣亦厥而上上則身半以下之脈虛而成脈痿經脈虛則樞折於下樞折故筋骨懸挈不收足脛緩縱而不能任地也

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發爲筋痿

註 膽附於肝肝氣熱則膽汁泄而口苦矣膽汁泄

則筋膜無以營養而乾燥故攣急發爲筋痿也

脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿

註　脾胃之氣並主肌肉陽明津液不生太陰之氣不至故肌肉不仁而發爲肉痿也

腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發爲骨痿

註　腎熱則津液竭腰者腎之腑故腰脊不能伸舉髓減骨枯而發爲骨痿也

帝曰何以得之岐伯曰肺者臟之長也爲心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦故曰五臟因肺熱葉焦發爲痿躄此之謂也

註　有所失亡所求不得則心志靡寧而火氣炎上肺乃心之蓋金受火刑即發喘鳴而肺熱葉焦則津液無從舒布而五臟皆熱矣

悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發爲肌痹傳爲脈痿思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也有漸於濕以水爲事若有所畱居處相濕肌肉

濡漬痹而不仁發爲肉痿故下經曰肉痿者得之濕地也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也

註胞絡卽衝脈也衝脈起於胞中爲十二經脈之海心主血脈是以胞絡絕則心氣虛而內動心氣動則心下崩數溲血也脈外之血少則爲肌痹脈內之血少則爲脈痿溲崩之血從大經而傷皮膚氣分經脈之血故曰大經空虛思想無窮所願不得則肝氣傷矣白淫者欲火盛而淫精自出也若有濕濁之所留而居處又兼卑下外內相濕以致肌肉濡漬痹而不仁發爲肉痿也遠行勞倦則傷腎逢大熱則暑暍傷陰渴則陰液內竭是以陽熱之氣內伐其陰而熱舍於腎矣今陽盛陰消水不勝火以致骨枯髓虛足不任用於身而發爲骨痿也

帝曰何以別之岐伯曰肺熱者色白而毛敗心熱者

色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉蠕動腎熱者色黑而齒槁

註 痿病皆緣五臟熱而精液竭不能榮養於筋脉骨肉是以所因不同皆當診之於形色也

帝曰如夫子言可矣論言治痿者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長皆屬於帶脉而絡於督脉故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也

註 五臟六腑皆受氣於陽明故爲臟腑之海前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合爲諸筋之會陽明所生之血氣爲之潤養故諸痿獨取於陽明衝脉起於胞中上循背裏爲經絡之海其浮而外者滲灌於谿谷之間與陽明合於宗筋而少陰太陰陽明衝任督脉總會於宗筋循腹上行而復會於氣街乃陽明之所主故陽明爲之長三陰三陽十二經脉與奇經之任督衝維經循於上下皆屬帶

脈之所約束督脈起於會陰分三岐爲任衝而上行腹背是以衝任少陰陽明與督脈皆爲連絡陽明爲水穀之海主潤宗筋虛則宗筋縱弛不能束骨而利機關則成痿躄帶脈不能延引則在下之筋脈縱弛而足痿不用此諸痿所以獨取於陽明也

帝曰治之奈何岐伯曰各補其滎而通其俞調其虛實和其逆順筋脈骨肉各以其時受月則病已矣帝曰善

註各補其滎者補五臟之眞氣也通其俞者通利五臟之熱也調其虛實者氣虛則補之熱盛則瀉之也和其順逆者和其氣之往來也筋脈骨肉內合五臟五臟之氣外應四時各以其四時受氣之月隨其淺深而取之其病已矣

脈解篇

病偏虛爲跛者正月陽氣凍解地氣而出也所謂偏虛者冬寒頗有不足者故偏虛爲跛也

註正月陽氣解凍從地氣而上則陽氣當自次而

盛矣所謂偏虛爲跛者又緣冬令寒水之氣頗有不足以致所生之陽氣偏虛而爲經脈作病

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病足萎不收行善瘛脚下痛

註　四支脾土之所主也

歲火不及寒乃大行復則病痿痹足不任身

註　痿痹足不任身皆寒濕之證也

五常政大論

陽明司天筋痿不能久立

註　肝木之病

六元正紀大論

太陽司天之政民病寒濕發肌肉萎足痿不收

註　皆寒濕之氣發而爲病也

太陽司天四之氣肌肉萎足痿

註　肉萎足痿者濕土之氣也

至眞要大論

太陰在泉客勝則足痿下重

註 足痿下重者在泉之濕氣客於太陰之經也

諸痿喘嘔皆屬於上

註 從下而上也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

脾脉緩甚爲痿厥微緩爲風痿四肢不用心慧然若無病

註 痿厥風痿皆四肢癱瘓而不爲所用甚則從中而病見於外微則病在外而不及於中故心慧然若無病也

肺脉微緩爲痿瘻偏風頭以下汗出不可止

註 緩則熱甚故多汗肺熱葉焦則爲痿也

腎脉微滑爲骨痿坐不能起起則目無所見

註 骨痿不起熱傷腎氣也目無所見熱傷骨精也

本神篇

恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下

註 恐傷腎腎主骨故精傷則骨痠痿厥精時自下者臟氣傷而不能藏也

經脈篇

腎足少陰之脈是主腎所生病者痿厥嗜臥足下熱而痛盛者寸口大再部於人迎虛者寸口反小於人迎也

註 氣逆於下則爲痿厥諸證矣

陰陽二十五人篇

足陽明之下血少氣多則肉而善瘃善痿厥足痹

註 痿厥足痹者血氣少而不能榮養筋骨也

漢張機金匱要略

骨痿

味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便爲歷節也

傷寒論

傷寒吐下後成痿

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者久而成痿

元張從政儒門事親

指風痹痿厥近世差元說

風痹痿厥四論內經言之詳矣今余又爲之說不亦贅乎曰非贅也爲近世不讀內經者指其差元也夫風痹痿厥四證本自不同而近世不能辨一槩作風冷治之下虛補之此所以曠日彌年而不愈者也夫四末之疾動而或勁者爲風不仁或痛者爲痹弱而不用者爲痿逆而寒熱者爲厥此其狀未嘗同也故其本源又復大異風者必風熱相兼痹者必風濕寒相合痿者必火乘金厥者或寒或熱皆從下起今之治者不察其源見其手足嚲曳便謂之風然左傳謂風淫末疾豈不知風暑燥濕火寒六氣皆能爲四末之疾也哉敢詳條於左有意於救物者試擇焉可也

痿之爲狀兩足痿弱不能行用由腎水不能勝心火心火上爍肺金肺金受火制六葉皆焦皮毛虛弱急而薄者則生痿躄躄者足不能伸而行步難蓋腎乃肺金之子也今腎水衰少隨火上炎腎主髓火熾則髓竭由使內太過而致然至眞要大論云諸痿喘嘔

皆屬於上者上焦也三焦者手少陽相火也痿喘嘔三病皆在膈上屬肺金之部分也故肌痹傳爲脉痿濕痹不仁傳爲肉痿髓竭足躄傳爲骨痿房室太過傳爲筋痿傳爲白淫大抵痿之爲病皆因客熱而成好淫貪色强力過極漸成痿疾故痿躄屬肺脉痿屬心筋痿屬肝肉痿屬脾骨痿屬腎總因肺受火熱葉焦之故相傳於四臟痿病成矣直斷曰痿病無寒故痿之作也五月六月七月皆其時也午者少陰君火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痿發此三月之內以爲熱也故病痿之人其脉浮而大今之用藥者凡見脚膝痿弱難於行步或一足不伸便作寒濕脚氣治之驟用烏附乳沒自然銅威靈仙之類燔針艾火湯煮袋蒸痿弱轉加如此而死豈亦天乎夫治痿與治痹其治頗異風寒濕痹猶可蒸湯灸燔時或一效惟痿用之轉甚者何也蓋痿以肺熱爲本葉焦而成以此傳於五臟豈有寒者歟若痿作寒治是不刃而殺之也夫痿病不死死者用藥之誤也陳下一武弁宋子玉因駐軍息城五六月間

暴得痿病腰胯兩足皆不任用躄而不行求治於予察其兩手脉俱滑數而有力予憑內經火淫於內治以鹹寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰新者爲熱舊者爲寒或宿食宿飲在上脘者皆可用之宿痰既盡因而下之節次數十行覺神志日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸心降腎升便繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯凉膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之經曰治心肺之病最近用藥劑不厭頻而少治腎肝之病最遠用藥劑不厭頓而多此法人皆怪之然余治痿尋常用之如拾遺物余若以此誑人其如獲罪於天何此宋子玉之證所以不得不書也且示信於來世故內經謂治痿之法獨取陽明經陽明經者胃脉也五臟六腑之海也主潤養宗筋宗筋主束骨束骨在臍下陰毛際上是也又主大利機關機關者身中大關節也以司曲伸是以陽明虛則宗脉縱宗脉縱則大脉不伸兩足痿弱然取陽明者則胃脉也胃爲水穀之海人之四季以胃氣爲本本固則精化精化則髓充髓充則足能履也陰陽應象論曰形不

足者溫之以氣精不足者補之以味味者五味也五味調和則可補精益氣也五味五穀五菜五果五肉五味貴和不可偏勝又曰恬淡虛無眞氣從之精神內守病安從來若用金石草木補之者必久而增氣物化之常氣增而久夭之由也所以久服黃連苦參者而反化爲熱久服熱藥之人可不爲寒心哉

李杲十書

濕熱成痿肺金受邪論

六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故用寒凉以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側以淸燥湯主之

暑傷胃氣論

刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論云有所遠行勞倦逢大熱而渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也

此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胷滿氣促肢節沉痛或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黃而少大便溏而頻或痢出黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之名之曰清暑益氣湯

如濕熱乘其腎肝行步不正脚膝痿弱兩脚攲側已中痿邪加酒炒黃蘗知母各五分令兩足湧出氣力矣

夫痿者濕熱乘於腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩寃而不止也若身重減氣不短小便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉猪苓茯苓黃蘗知母蒼术白术之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃蘗二分或三分

朱震亨心法

痿躄證治

痿證斷不可作風治而用風藥

痿證有濕熱濕痰氣虛血虛瘀血

濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火蒼朮黃芩黃蘗牛膝之類

濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃蘗竹瀝薑汁

氣虛四君子湯加黃芩黃蘗蒼朮之類

血虛四物湯加黃蘗蒼朮煎送補陰丸

亦有食積死血妨碍不得下降者大率屬熱用參朮四物湯黃蘗之類

按五痿等證特立篇目所論至詳後代諸方獨於此證蓋多缺略攷其由皆因混入中風條內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者多誤於庸醫之手有志之士必當究其心焉夫陳無擇謂痿因內臟不足所致誠得之矣然痿之所不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實實虛虛之患乎且無擇以三因立方可謂諸方之冠其於此證猶且未明況他乎

明樓英醫學綱目

總論

或問曰治痿之法獨取陽明一經此引而未發之言願明以告我予曰諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經曰東方實則西方虛瀉南方補北方此固就生剋言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五方之中惟火有二腎雖有兩水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然金體燥而居上主氣畏火者也土性溫而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪則熱矣木性剛急肺受熱則失所養木寡於畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能爲用而諸痿之病作瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱龍吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取蘗皮爲君黃芪等補

藥輔佐以治諸痿而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病制方其善於治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜醫不治也天產作陽氣厚發熱先哲格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安也

心熱盛則火獨光火炎上腎之脉常下行今火盛而上炎用事故腎脉亦隨火炎爍而逆上行陰氣厥逆火復內焰陰上隔陽下不守位心氣通脉故生脉痿膝腕樞如折去而不相提挈經筋縱緩而不任地故也可下數百行而愈

痿病風病異治辨

按丹溪痿病與風病異治諸論蓋因局方治中風孟浪用發表行濕之藥戕賊血氣誅伐根本不知補養之法故引痿病以救局方之失而其言如此然局方所述中風手足不隨起便須人神魂恍惚不語語澀等證卽內經熱病相同至於異處不得不察鍼經刺節眞邪云眞氣去邪獨留發爲偏枯痿論云陽明虛則宗筋縱帶脉不引而足痿不用由是知手足不隨

者在偏枯手足爲邪氣阻塞脉道而然在痿病則陽明虛宗筋縱帶脉不引而然也痱病有言變志亂之證痿病則無之也痱病又名風痱而內傷外感兼備痿病獨得於內傷也痱病發於擊仆之暴痿病發於怠惰之漸也凡此皆明痱與痿明是兩疾也

王綸明醫雜著

痿證不可作風治

癱瘓痿軟之病此是無血及兼痰火濕熱耳古人云不可作風治而用風藥謂小續命湯西州續命湯排風湯等藥如羌活防風麻黃桂枝烏頭細辛等劑皆發散風邪開通腠理之藥若誤用之陰血愈燥也

（註）按前證江南之人所致者多屬陰虛氣虛濕熱相火其癱瘓痿軟多屬手足陽明等經陰虛濕熱治者審之

李中梓醫宗必讀

總論

按痿者重疾也故內經疊出諸篇而前哲之集方論者或附見於虛癆或附見於風濕大失經旨賴丹溪

特表而出之惜乎言之未備也經言病本雖五臟各有而獨重太陰肺經經言治法雖諸經各調而獨重陽明胃經此其說何居乎肺金體燥居上而主氣化以行令於一身畏火者也五臟之熱火熏蒸則金被尅而肺熱葉焦故致疾有五臟之殊而手太陰之地未有不傷者也胃土體濕居中而受水穀以灌溉於四肢畏木者也肺經之受邪失正則木無制而侮其所勝故治法有五臟之分而足陽明之地未有或遺者也夫既曰肺傷則治之亦宜在肺矣而岐伯獨取陽明又何也靈樞所謂眞氣所受於天與穀氣幷而充身陽明虛則五臟無所稟不能行血氣濡筋骨利關節故百體中隨其不得受水穀處不用而爲痿不獨取陽明而何取哉所以丹溪云瀉南方則肺金淸而東方不實何胃傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有斯言當矣若胃虛減食者當以芳香辛溫之劑治之若拘於瀉南之說則胃愈傷矣誠能本此施治其於痿也思過半矣至於七情六淫挾有多端臨病製方非筆舌所能罄耳

治法

心火盛者凉膈散肝火動者小柴胡湯水虛火炎者六味地黃丸痰多者貝母苦蔞散

心氣熱則脉痿鐵粉銀箔黃連苦參龍膽草石蜜牛黃龍齒秦艽白蘚皮牡丹皮地骨皮雷丸犀角之屬

肝氣熱則筋痿生地黃天門冬百合紫葳白蒺藜杜仲萆薢菟絲子川牛膝防風黃芩黃連之屬

脾氣熱則肉痿二术二陳霞天膏之屬

腎氣熱則骨痿金剛丸牛膝丸加味四斤丸煨腎丸

肺熱痿黃芪天麥門冬石斛百合山藥犀角通草桔梗枯芩山梔杏仁秦艽之屬

挾濕熱健步丸加黃蘗蒼术黃芩或淸燥湯

濕痰二陳二妙竹瀝薑汁

血虛四物湯二妙散補陰丸

氣虛四君子湯合二妙散

氣血俱虛十全大補湯

食積木香檳榔丸

死血桃仁紅花蓬术穿山甲四物湯

實而有積三化湯承氣湯下數十遍而愈

腎肝下虛補益腎肝丸神龜滋陰丸補益丸虎潛丸

王肯堂證治準繩

總論

痿者手足痿軟而無力百節緩縱而不收也聖人以痿病在諸證爲切要故特著篇目分五臟之熱名病其所屬皮脈筋肉骨之痿致足不任於地及敘五臟得熱之邪則以一臟因一邪所傷觀其微旨是用五志五勞六淫從臟氣所要者各舉其一以爲例耳若會通八十一篇而言便見五勞五志六淫盡得成五臟之熱以爲痿也何則言肺氣熱則皮痿因有所失亡所求不得者與他篇之謂始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲攣者同是一於七情之不揚若病機之謂諸痿喘嘔諸氣憤鬱皆屬於上者言之即此可推何熱而不爲痿何脈而不爲熱也如言心氣熱爲脈痿因得之悲哀太甚陽氣內動而血崩大經空虛乃爲脈痿此以心爲神明之官主脈爲要者言也及乎推之五臟各有神各有志若怒則氣上逆甚則嘔

血之類亦五志所動以熱傷血血逆行於經脈亦必空虛有若形樂志苦病生於脈則是五志皆得以痿其脈不獨悲哀一因也且五志之在各臟自傷其所屬若怒甚筋縱其若不容與形樂志樂病生於肉形苦志樂病生於筋又若憂恐喜怒因太虛則五臟相乘故病有五五二十五變皆至於大骨枯槁大肉陷下之病其神志在五臟之爲熱病者不可勝計如言肝臟氣熱因思想無窮所願不得猶肺之所求不得也其入房太甚宗筋弛縱亦猶腎之遠行勞倦也即此可見五勞各得傷其五臟所合之皮肉筋骨矣如言脾臟氣熱因得之有漸於濕以水爲事者若歲運太陰濕土司天在泉之濕皆致肌肉痿足痿不收此是從五臟中舉外感者爲例耳諸臟皆然少陰之復爲骨痿少陽之復爲脈痿陽明司天之政四之氣亦爲骨痿厥陰司天風氣下臨脾氣上從而爲肌肉痿有因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿靈樞有八風之變或傷筋或傷肉或傷骨與邪客筋骨間者熱多則筋弛骨消肉爍夫

其外淫而生五臟痿病者如此然有不言邪止從經臟之虛而論者謂脾病者身重肌肉痿足痿不收行善瘛謂腎虛者爲跛爲痱謂三陽有餘三陰不足爲偏枯謂足少陽之別虛則痿躄坐不能起足陽明之別虛則足不收脛枯又有飲食所傷味過於鹹則大骨氣勞味過於辛則筋脉沮弛與夫膏粱之人病偏枯痿厥已上所陳止就本條足痿不用者言耳至若五臟盡熱神昏仆倒手足俱不用世俗所謂癱瘓者豈非亦是痿之大者也又若下條肺痿之爲臟病者而經又有心氣痿者死則是五臟盡有其痿蓋可知矣原病式論小便遺失謂肺熱客於腎部干於足厥陰之經而氣血不得宣通則痿痹故神無所用而不遂其機因致溲便遺失由是論之凡神機氣血或劣弱或閉塞卽臟腑經絡四屬若內若外隨處而不用故內經重其事疊出諸篇後之覽者竟失其旨集方論者或并見虛勞證或并見風門賴丹溪始發揮千餘年之悞表而出之而復語焉不詳可惜也曰痿論陽明衝脉合宗筋會於氣街因陽明虛故宗筋縱帶

脉不引而足痿所以獨取陽明今子歷陳受病之邪及諸痿證又將若何治之曰聖人凡語其一推之而可十可百豈惟足痿而已乎所謂各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順者則治邪之法盡在其中矣所云筋脉骨肉各以其時受月則病已者治四屬內外諸痿之法亦在其中矣然而諸痿之病未有不因陽明虛而得者何以言之按靈樞有謂眞氣所受於天與穀氣并而充身也又謂穀始入於胃之兩焦以漑五臟別出兩行榮衛之道其大氣之摶而不行者積於胷中命曰氣海素問則謂足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太陰爲之行氣於三陰陽明者表也五臟六腑之海也亦爲之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣於陽明故爲胃行其津液四肢不得禀水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉而衝脉者出於腎下與任脉起於胞中治血海亦云爲五臟六腑之海也五臟六腑皆禀焉其上行者滲三陽灌諸精其下行者滲三陰灌諸絡而溫肌肉與陽明宗筋會於氣衝因言陽明虛則宗筋

縱帶脉不引故足痿不用也卽此而觀眞氣者天之道也穀氣者地之道也地非天不生天非地不成是故眞氣與穀氣幷而後生成形氣之道立矣故陽明虛於五臟無所禀則不能行血氣營陰陽濡筋骨利關節氣海無所受則衛氣不能溫分肉充皮膚肥腠理司開闔血海無所受則上下內外之絡脉空虛於是精神氣血之奉生身周於性命者劣弱矣故百體中隨其不得受水穀氣處則不用而爲痿治痿不獨取陽明而何哉

景岳全書　臣張介賓著

論證

痿證之義內經言之詳矣觀所列五臟之證皆言爲熱而五臟之證又總由肺熱葉焦以致金燥水虧乃成痿證如丹溪之論治誠得之矣然細察經文又曰悲哀太甚則胞絡絕傳爲脉痿思想無窮所願不得發爲筋痿有漸於濕以水爲事發爲肉痿之類則又非盡爲火證此其有餘不盡之意猶有可知故因此而生火者有之因此而敗傷元氣者亦有之元氣敗

傷則精虛不能灌溉血虛不能營養者亦不少矣若概從火論則恐眞陽虧敗及土衰水涸者有不能堪故當酌寒熱之淺深審虛實之緩急以施治療庶得治痿之全矣

經曰濕熱不攘則大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿此內經言筋病之概乃舉隅之談以啓人之自反耳非謂大筋必無弛長小筋必無緛短也卽如痿弱必由於弛長豈大筋果無涉乎此經言之意從可知矣故於痿證之外凡遇瘛瘲等病當知拘攣者必由緛短癱弱者必由弛長斯得內經之意而於寒熱燥濕之辨亦可得其據矣

論治

凡痿由濕熱脈洪滑而證多煩熱者必當先去其火宜二妙散隨證加減用之若陰虛兼熱者宜正傳加味四物湯虎脛骨丸或丹溪補陰丸滋陰八味丸之類主之若絕無火證而止因水虧於腎血虧於肝者則不宜兼用凉藥以伐生氣惟鹿角膠丸爲最善或加味四斤丸八味地黃丸金剛丸之類俱可擇用若

陰虛無濕或多汗者俱不宜輕用蒼术蓋痿證最忌散表亦恐傷陰也

東垣取黃蘗爲君黃芪等補藥輔佐以治諸痿無一定之方有兼痰積者有濕多熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其亦治痿之良法也

纂要云濕熱東垣健步丸加燥濕降火之劑黃蘗黃芩蒼术濕痰二陳湯加蒼术白术黃芩黃蘗之類入竹瀝薑汁血虛四物加蒼术黃蘗下補陰丸氣虛四君子加蒼术黃芩黃蘗蓋黃蘗蒼术治痿要藥也已

上方治雖所主有不同而降火清金所謂治法之大要無不同也

陳無擇曰人身有皮毛血脈筋膜肌肉骨髓以成其形內則有肝心脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚以致內臟精血虛耗使血脈筋骨肌肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風腳氣相類柔風腳氣皆外因風寒正氣與邪氣相搏故作腫苦痛爲邪實痿由內臟不足之所致但不任用亦無痛楚此血氣之虛也

石室祕籙

臣陳士鐸著

痿病治法

人有氣血全虧一身多病或頭痛未已而身骨痛或腹痛未已而四肢盡痛雖此等病乃痿證居多自宜專治陽明胃火然而胃火既盛一身上下四肢盡行消瘦又不可專治胃經也方用人參黃芪白芍茯苓白芥子當歸各三錢薏苡仁元參各五錢甘菊花一錢麥冬熟地各一兩陳皮神麴各五分水三大椀煎一椀服之蓋陽明火盛理宜用竹葉石膏湯矣而反用參苓芪熟爲君補其氣血者何也胃火過盛已爍氣血再用白虎湯雖一時解其火毒之燎原然而焦頭爛額必致重亡其津液不若用補氣血之藥大劑煎飲便水足而火自息方中宜用元參麥冬甘菊之品純是退陽明火勢之燎原況又重加當歸之類生血以滋化源乎但諸藥若小其劑則不特無益而反助火勢之飛揚此大治法之所以妙也大約大治之法施之於虛證初起胃火有餘卽以大劑與之可以轉敗爲勝若因循時日畏首畏尾初時不敢用大劑

及至胃氣已衰而後悔悟始用大劑遲矣

痿證終年不能起牀面色光鮮足弱無力不能舉步者乃陽明火盛不必去治兩足止平其胃火則火息而足自堅凝若不平胃火而徒用補陰之劑則飲食愈多而兩足益弱法當用元參三兩麥冬熟地各一兩甘菊花三錢人參菟絲子各一錢水數椀煎湯四椀恣其吞飲則胃火漸平而兩足自然生力此不治足而正所以治足也

痿證中有不是陽明之痿不可不辨其證亦不能起牀亦能善飯亦骨無力不能起立人以爲此痿證也而不知非痿證也此腎寒極而火沸騰似痿而非痿也初起之時未嘗不是陽明火熾而來用寒凉折服之則胃火息矣而腎水熬乾夜必咳嗽吐痰而日間轉覺少輕呻吟牀蓐飲食少遲更覺難堪方用元參一兩麥冬三兩熟地二兩水煎服若有肝火者加白芍五錢水煎服四劑可以起牀後用六味湯大劑煎飲加麥冬熟地各一兩五味一錢山茱萸四錢山藥丹皮各三錢澤瀉茯苓各二錢水煎服此方妙在用

元參麥冬滋肺金而去心間之遊火又妙在用熟地以補腎水則水足而胃火自堅矣肺金自然下生腎水則腎水藏於腎宮不上冲咽門不必止嗽而嗽自除矣

兩足之弱不能步履人以爲腎水之虧不知非也蓋氣虛不能運用耳方用補中益氣湯加人參牛膝各三錢金釵石斛五錢黃芪一兩治之二劑即足生力四劑可以步履矣蓋人參芪朮皆補氣之聖藥而牛膝石斛亦健足之神劑所以兩用之而功成

痿病必久臥牀蓆不能輒起其故何也蓋諸痿之證盡屬陽明胃火胃火鑠盡腎水則骨中空虛無滋潤則不能起立矣然則止治陽明而骨中之髓何日充滿欲其雙足有力難矣方用元參麥冬各一兩熟地二兩牛膝二錢水煎服此方之妙全在不去治陽明而直治腎經以補其匱乏之腎水一生則胃火自然息焰况又有麥冬以清肺氣牛膝以堅膝脛故以此方長治之則廢痿之狀可免若徒以石膏知母之類降其胃中之火火降矣腎水益乾又將何物以充足其

骨髓乎無怪經年累月愈治而愈憊也

痿廢之證乃陽明火證腎水不足以滋之則骨空不能立方用元參熟地山茱萸各三兩麥冬一兩水煎服此方妙在熟地山茱全去滋水而元參去浮游之火麥冬生肺金之陰陰長陽消陽明自然息焰火焰既息金水又生臟腑有津骨髓自滿而兩足有不能步履者乎

痿證奇方用薏仁熟地各三兩麥冬一兩北五味一錢牛膝五錢水煎服此方之妙在薏仁用至三兩則熟地不患太濕麥冬不患太寒牛膝不患太走轉能得三味之益可以久服而成功也

痿證久不效者陽明火燒盡腎水也然能不死長存者何蓋腎水雖涸而肺金終得胃氣以生之肺金有氣必下生腎水腎雖乾枯終有露氣夜潤腎經常有生機故存而不死也方用麥冬半斤熟地一斤元參七兩五味子一兩水二十椀煎六椀早晨服三椀下午服二椀半夜服一椀一連二日必能坐起後改用熟地八兩元參三兩麥冬四兩北五味三錢山茱萸

四錢牛膝一兩水十椀煎二椀早晨一椀晚服一椀十日卽能行步一月卽平復如舊矣蓋大滋其肺腎之水則陽明之火不消而自消矣

痿證久不死雖是肺經之潤亦由腎經之有根也倘腎水無根總肺金有夜氣之生從何處生起吾見立槁而已矣惟其有根所以不死故用大劑補腎之品因之而病愈亦因其有根可救而救之也

痿證方亦不同方用元參山茱萸各一兩熟地沙參各三兩麥冬四兩五味子五錢水煎服十日卽可起牀予會親試之神驗

痿證不起牀蓆已成廢人者內火熾盛以熬乾腎水也苟不補腎惟圖降火亦無生機雖治痿獨取陽明是胃火不可不降而腎水尤不可不補也我今傳一奇方補水於火中降火於水內合胃與腎而兩治之自然骨髓增添燔熱盡散不治痿而痿自愈方名降補丹人參三錢熟地元參麥冬各一兩甘菊花生地沙參地骨皮各五錢車前子二錢水煎服此方補中有降降中有補所以爲妙胃火不生自不耗腎中之

陰腎水既足自能制胃中之熱兩相濟而兩相成起痿之方孰有過於此者乎

凡人有兩足無力不能起立而口又健飯如少忍饑餓即頭面皆熱有欬嗽不已者此亦痿證乃陽明胃火上冲於肺金而肺金爲火所逼不能傳清肅之氣於下焦而腎水鑠乾骨中髓少故不能起立而胃火又焚燒故能食善饑久則水盡髓乾而死矣可不急瀉其胃中之火哉然而瀉火不補水則胃火無所制未易息也方用起痿至神湯熟地山藥元參甘菊花各一兩人參當歸白芍各五錢白芥子三錢神麴二錢水煎服一劑火減二劑火退十劑而痿有起色三十劑可全愈也此方奇在甘菊花爲君瀉陽明之火而又不損胃氣其餘不過補腎水生肝血健脾氣消痰涎而已蓋治痿以陽明爲主瀉陽明然後佐之諸藥自易成功耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十二卷目錄

醫部彙考三百二

癱瘻門二

方

地黃飲子　清燥湯　清暑益氣湯　補陰
丸　健步丸　祖傳經驗方　經驗鹿角膠
丸　五獸三匱丸　補益丸　龍虎丹　虎潛
丸　神龜滋陰丸　續補益腎肝丸　續骨丹
養血壯筋健步丸　三妙丸　加味二妙丸
加味四物湯　滋血養筋湯　四製蒼蘗丸
加減四斤丸　鹿角霜丸　藿香養胃湯
溫腎湯　龍骨丸　起瘻丹　又方　金剛丸
牛膝丸　煨腎丸　滋腎丸　虎脛骨丸
補肝丸　敗毒散　小續命湯　追毒湯　二

妙散　續斷丸　酒浸牛膝丸　調元健步丸　八
勝駿丸　四物湯　金匱六味地黃丸　八
味丸　滋陰大補丸　鹿茸丸　還少丹　虎
骨四斤丸　加味四斤丸　滋陰八味丸
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百二十二卷

醫部彙考三百二

癱瘓門二

方

地黃飲子（河間）

治瘖痱腎虛弱厥逆語聲不出足廢不用

熟地黃　巴戟　山茱萸　石斛　肉蓯蓉酒焙

附子炮　五味　官桂　白茯苓　麥冬　菖蒲

遠志等分

右爲末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄荷同煎至八分不計時候

清燥湯（東垣下同）

治夏月濕熱成痿腰以下癱瘓不能動行走不正兩足欹側

黃連　酒黃蘗　柴胡各一分　麥冬　猪苓

當歸身　生地　炙甘草　神麴各二分　人參

茯苓　升麻各三分　蒼朮一錢　橘皮　白朮

澤瀉各五分　黃芪一錢五分　五味子九粒

右㕮咀如麻豆大每服半兩水二盞半煎至一盞去滓稍熱空心服於本方減柴胡黃連猪苓澤瀉名減味清燥湯治骨痿

清暑益氣湯

治暑傷胃氣成痿

黃芪　蒼朮泔浸去皮各一錢半　升麻一錢

人參　白朮　橘皮　神麴炒　澤瀉各五分

甘草炙　黃蘗酒浸　當歸身　麥冬去心

青皮去白　葛根各二分　五味子九粒

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠如汗少黃芪只用五分

補陰丸

治陰虛足痿

側柏　黃蘗　烏藥葉各二兩　龜板酒炙五兩

苦參三兩　黃連半兩

右爲末地黃膏丸梧子大冬加乾薑夏加縮砂

健步丸

治風濕足痿

防己酒洗一兩　羌活　柴胡　滑石　甘草炙

苦蔞根酒洗各半兩　澤瀉　防風各三錢

苦參酒洗　川烏各一錢　肉桂五分

右爲末酒糊爲丸梧桐子大每服七十丸葱白煎愈風湯下

祖傳經驗方（正傳下同）

治兩足痿弱軟痛或如火焙從足踝下上衝腿膝等證因濕熱所成者

蒼朮米泔浸一二宿　黃蘗酒浸日曬各四兩

牛膝去蘆　當歸尾各二兩　虎脛骨酥炙

龜板酥炙　防己各一兩

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸或一百丸空心薑鹽湯下一方加炮附子五錢

經驗鹿角膠丸

治血氣虛弱兩足痿軟不能行動久臥牀褥之證神效

鹿角膠一斤　鹿角霜　熟地黃各半斤　白朮

杜仲各二兩　牛膝　白茯苓　菟絲子　人參

虎脛骨酥炙　龜板酥炙各一兩　當歸身四兩

右爲細末另將鹿角膠用無灰酒烊化丸梧桐子大每服一百丸空心薑鹽湯下

五獸三匱丸（澹寮）

治肝腎不足兩脚痿軟

鹿茸酥炙　血竭　虎脛骨酥炙　牛膝酒浸

金毛狗脊燎去毛各一兩

右爲末即五獸也另用附子一箇去皮剜去中心入辰砂細末一兩塡滿又用木瓜一枚去皮剜去

中心入附子於內以附子末蓋口即三匱也却以三匱正坐於磁缸內重湯蒸至極爛取出和五獸末搗丸芡實大木瓜酒化下

補益丸（丹溪下同）

治瘻

龜板　瑣陽　歸身　杜牛膝　芍藥上俱酒浸
陳皮各一兩　生地酒浸一兩半　白朮二兩
黃蘗　虎脛骨酒炙　茯苓各半兩　炙草一錢
五味子二錢　乾薑七錢半　菟絲子酒蒸熟研

諸藥共研曬乾爲末紫河車爲丸如無紫河車豬腦骨髓亦得

龍虎丹

治瘻

敗龜板　虎骨　黃蘗並酒炙　乾薑各二錢半
瑣陽七錢半　金箔十片　神麴

右爲末糯粉糊爲丸空心白湯服如懶言語加山藥末七錢

虎潛丸

治痿

龜板　黃蘗各四兩　知母　熟地各二兩

牛膝三兩半　瑣陽　虎骨炙　當歸各一兩

芍藥兩半　陳皮七錢半　乾薑半兩

右爲末酒糊丸加附子治痿厥如神

神龜滋陰丸（蕭炳）

治足痿

龜板炙四兩　知母酒炒　黃蘗炒赤各二兩

瑣陽酒洗　枸杞　五味各一兩　乾薑炮半兩

右爲末水丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

續補益腎肝丸（東垣下同）

治後生丈夫酒色過多下焦虛憊足膝軟乏小便滑數外腎濕癢

菟絲子製研　五味子各五兩　石蓮肉　山藥

茴香各二兩　白茯苓一兩

右爲末糊丸如桐子大每服四十丸溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力者木瓜酒空心下五十丸晚食前再服立效

續骨丹

治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻明淨者酒浸焙　白附子　牛膝　川羌活

木鼈子各半兩　朱砂　烏頭炮各一錢　乳香

沒藥各二錢　地龍去土一分

右以生南星末一兩無灰酒煮糊爲丸如雞頭大

朱砂爲衣薄荷湯磨一丸食前服

養血壯筋健步丸（醫鑑）

治氣血兩虛兩脚痿軟不能行動

熟地四兩　牛膝酒浸　杜仲薑汁炒　酒當歸

蒼朮　黃蘗鹽水炒各二兩　白芍酒炒一兩半

黃芪鹽水炒　山藥　五味子　破故紙鹽水炒

人參　枸杞　菟絲子　白朮炒　虎脛骨酥炙

龜板酥炙各一兩　防風六錢　防己酒洗五錢

羌活酒洗三錢

右爲末猪脊髓七條入煉蜜和丸梧子大鹽湯下

百丸

三妙丸（正傳下同）

治濕熱下流兩脚痳木痿弱或如火烙之熱

蒼术米泔浸六兩　黃蘗酒炒四兩　牛膝二兩

右爲末麪糊和丸梧子大薑鹽湯下五七十丸

加味二妙丸

治兩足如火燎從足跗熱起漸至腰胯痳痹痿軟皆是濕熱爲病

蒼术泔浸四兩　黃蘗酒浸二兩　當歸尾酒洗

牛膝　萆薢　防己　龜板酥炙各一兩

右爲末酒麪糊和丸梧子大空心薑湯下百丸

加味四物湯

治濕熱兩脚痿軟無力

熟地黃二錢　當歸身　麥門冬　黃蘗酒浸

蒼术各一錢　白芍藥　川芎　杜仲各七分

人參　黃連各五分　知母　牛膝各三分

五味子九粒

右剉作一貼水煎空心服

滋血養筋湯（醫鑑）

治氣血兩虛兩足痿軟不能行動

熟地一錢半　芍藥　當歸　麥冬　黃蘗酒炒
牛膝酒浸　杜仲酒炒　蒼朮　薏苡仁各八分
人參　川芎　防風　知母各五分　羌活
甘草各三分　五味子九粒

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

四製蒼蘗丸（入門）

治濕熱盛腳膝痿弱能滋陰降火

黃蘗二斤以乳汁童便米泔各浸八兩酥炙八兩浸炙各宜十三次　蒼朮八兩用川椒破故紙五味子川芎各炒二兩揀去炒藥只取蘗朮

右將蘗朮爲末蜜丸梧子大早酒午茶晚白湯呑下三五十丸

加減四斤丸

治肝腎虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　菟絲子酒浸另研
木瓜　鹿茸燎去毛切酥炙　熟地　天麻

五味子酒浸各等分

右爲末蜜丸如桐子大每服五十丸溫酒米湯食前下

鹿角霜丸（醫鑑）

治血氣虛弱兩足痿軟不能行動久臥牀褥之證

黃芪蜜炙　人參　白朮　白茯　當歸身酒洗　熟地　芍藥酒炒　破故紙酒炒　蒼朮泔水浸　杜仲薑汁炒去絲各二兩　川芎　肉桂　羌活　茴香炒　獨活　檳榔　附子童便和麪包煨各一兩　牛膝　木瓜　川烏　肉蓯蓉酒洗　防風　烏藥炒　續斷　虎脛骨酥炙各一兩五錢　木香一錢　甘草五錢　鹿角霜一斤

右爲極細末酒丸梧子大空心米湯送下百丸

藿香養胃湯（良方下同）

治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗筋無所養遂成痿躄

藿香　白朮　神麴炒　白茯苓　烏藥　縮砂　半夏麴　薏苡仁　人參各一錢半　蓽澄茄

甘草炒各一兩

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾不拘時服

溫腎湯

治面色痿黃脚痿弱無力陰汗出

麻黃　茈胡各六分　白朮炒　酒黃蘗　猪苓

白茯苓　升麻各一錢　防風　蒼朮各一錢半

澤瀉二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前熱服候一時纔飮食

龍骨丸

治膀胱腎冷坐起欲倒目䀮䀮氣不足骨痿

龍骨　柏子仁　防風　乾地黃　甘草各五分

禹餘糧　桂心　白石英　茯苓　黃芪各七分

五味子　羌活　附子　人參各六分　山茱萸

元參　芎藭各四分　杜仲　磁石　乾薑各八分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸加至四五十丸空心溫酒送下日二服

起痿丹

陽明主胃爲五臟六腑之海主潤宗筋束骨而利機關衝脉者諸經之海主滲灌谿谷與陽明合養於宗筋會於氣衝屬於帶脉絡於督脉故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也治之各補其榮而通其輸調其虛實和其逆順至筋脉骨肉各得其時病乃已矣腎經虛憊遂成骨痿腰脚難舉日加困乏

附子炮去皮臍　沉香不見火　朱砂研　枸杞母丁香　木香不見火　陽起石煆　熟地黃　肉蓯蓉酒浸焙　麝香研　天雄炮去皮臍（鹿茸亦可）　官桂　硫黃各一兩　膩粉半兩　白丁香少許

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每用一丸以薑汁火上入藥鎔化却用手點藥於腰眼上摩擦至藥盡用至二十九大有神效若有他處癱瘓風疾加皂角一片去筋搥爛薑汁浸一宿瓦上焙乾爲末入前藥內依前法用

又方

治筋痿兩手握固無力兩腿行動無力急饑食少此名筋痿其證候口舌生瘡忽生痰涎忽然睡中涎溢身上躁熱忽時憎寒頸項强急小便赤白不定大腑忽冷忽熱不調

連翹　防風　荊芥穗　蔓荊子　羌活　獨活

丹皮　梔子　秦艽　麻黃去根　木香各等分

右爲細末每服一錢食後用白湯調下

金剛丸

治腎損骨痿不能起於牀宜服此益精

萆薢　杜仲炒去絲　肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒浸

右等分爲細末酒煑猪腰子搗和爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下

牛膝丸

治腎肝損骨痿不能起於牀筋弱不能收持宜益精緩其中

牛膝酒浸　萆薢　杜仲炒去絲　菟絲子酒炒

白蒺藜　防風　蓯蓉酒浸等分　官桂減半

右爲細末酒煑猪腰子搗和丸如梧桐子大每服

五七十丸空心用溫酒送下

煨腎丸

治腎肝損及脾損穀不化痿躄宜益精緩中消穀

牛膝　萆薢　杜仲炒去絲　白蒺藜　防風

菟絲子酒浸　蓯蓉酒浸　胡盧巴　破故紙酒炒

等分　官桂減半

右爲細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和杵丸如梧桐子大每服五七十丸空心用溫酒送下如腰痛不起甚效

滋腎丸

治熱在氣分不渴而小便不利或腎虛足熱腿膝無力不能履地

知母酒炒　黃蘗酒炒各二兩　肉桂二錢

右各另爲末水丸桐子大每服二百丸空心白滾湯下

虎脛骨丸

治兩足痿弱痠痛或如火焙從足踝下上冲腿胯證因濕熱所成者

蒼朮製　黃蘗製各四兩　牛膝　歸尾各二兩

龜板酥炙　虎骨酥炙　防己各一兩

右爲細末麪糊爲丸梧桐子大每服七十丸或一百丸空心鹽湯送下神效

補肝丸

治腎虛骨痿陰冷如氷并陰汗兩脚瘦弱無力

黃芪蜜水炙　人參　葛根　白茯苓　猪苓

升麻各一錢　柴胡　當歸身　羌活　連翹

黃蘗　澤瀉　陳皮　神麴炒　知母　防風

蒼朮　甘草炙各五分

右水二盞煎一盞空心熱服忌酒溼麪

敗毒散

一名人參敗毒散治處卑溼脚氣痿弱等證此藥不可缺日三服以效爲度

人參　茯苓　枳殼　甘草　川芎　羌活

獨活　前胡　柴胡　桔梗各等分

右水一鍾半薑三片煎服或爲細末沸湯點服

小續命湯（千金方下同）

通治八風五痹痿厥等證又於六經分別隨證加減通之

麻黃去節　人參　黃芩　芍藥　川芎　防己
杏仁去皮尖雙仁炒　甘草炙　官桂各一兩
防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

右㕮咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥隨證增減諸藥用

追毒湯

治肝脾腎三經爲風寒熱濕毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便祕濇心熱煩悶遍身浮腫脚弱不能行步

半夏湯泡七次　黃芪　甘草炙　當歸　人參
厚朴薑製　獨活　橘紅各一兩　枳實麩炒
芍藥　熟地黃　麻黃去節各二兩　桂心三兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎八分食前溫服日三夜一

二妙散（丹溪）

治濕熱在經筋骨疼痛如有氣加氣藥如血虛加補血藥如痛甚加薑汁熱辣服之

黃蘗炒　蒼朮去皮製等分

右爲末搗生薑煎沸湯調服此二物皆有雄壯之氣如氣實者加少酒佐之此卽集要二神湯各三錢半用水煎空心服一方以二妙爲君加甘草羌活各二錢陳皮芍藥各一錢威靈仙酒炒五分爲末服之佳

續斷丸（本事方下同）

治肝腎風寒氣弱脚不可踐地足踔疼痛風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中益氣凉血強筋骨

杜仲五兩　五加皮　防風　薏仁　牛膝酒浸

續斷　羌活各三兩　萆薢四兩　生地黃五兩

右爲末用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以前鹽酒煑成膏和藥爲丸梧子大每服五七十丸空心食前溫酒鹽湯任下

酒浸牛膝丸

治腰脚筋骨痠軟無力

川椒去目并合口者　虎骨眞者酢炙黃各半兩

附子一枚炮去皮臍　牛膝三兩炙黃

右㕮咀用生絹作袋盛藥以煑酒一斗春秋浸十日夏七日冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥爲末酢糊丸每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

調元健步丸

治陰虛血少濕熱相兼足履無力

牛膝鹽酒浸三兩　當歸酒洗　黃蘗鹽酒炒

枸杞各二兩　白芍藥微炒　白茯苓　白朮炒

蒼朮　陳皮各一兩　木瓜　五加皮各八錢

續斷七錢　澤瀉　防己各五錢　炙甘草三錢

右蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十丸或百丸

勝駿丸（三因方）

治元氣不足爲寒濕之氣所襲腰足攣拳或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益眞氣壯筋骨

附子炮　當歸　天麻　牛膝　木香　棗仁炒

熟地酒蒸　防風各二兩　木瓜四兩　羌活

乳香各半兩　全蠍炒　甘草炙　沒藥各一兩

麝香二錢

右爲末用生地黃三斤以無灰酒四升煑乾曬二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨臥酒下作小丸服亦可

四物湯（局方）

治血虛營弱一切血病當以此爲主

熟地黃　當歸各三錢　川芎一錢　芍藥二錢

右水二鍾煎服

金匱六味地黃丸（錢氏）

一名金匱腎氣丸治腎水虧損小便淋閉頭目眩運腰腿痠軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛爲痰病爲腫脹壯水制火之劑也

熟地黃八兩蒸搗　山茱萸　山藥炒各四兩

丹皮　澤瀉　白茯苓各三兩

右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心食前滾白湯或淡鹽湯任下此方用水煎湯卽名六味地黃湯下八味丸亦同

八味丸（崔氏）

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等證王太僕曰益火之源以消陰翳卽此謂也

卽前六味地黃丸加肉桂製附子各一兩

滋陰大補丸（丹溪）

治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元陽益腎水

熟地二兩　山藥炒　牛膝各兩半　山茱萸

杜仲　巴戟肉　白茯苓　五味子　小茴香炒

肉蓯蓉酒洗去甲焙乾　遠志用甘草湯煮曬乾各一兩　石菖蒲　枸杞各五錢

右爲末紅棗肉和或煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯或溫酒任下

鹿茸丸

治脚氣腿腕生瘡及陰虛下元瘦弱欬嗽等證

鹿茸酥炙擣泥　五味子　當歸　熟地各等分
酒糊和丸桐子大每服四五十丸溫酒或鹽湯任
下

還少丹（楊氏）

治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁眞氣
虧損肌體瘦弱足痿等證

熟地黃　枸杞各二兩　山藥　山茱萸　五味
杜仲薑汁炒　牛膝酒浸　遠志薑汁炒　續斷
肉蓯蓉酒浸　楮實子　舶茴香　菟絲子製
巴戟肉各一兩
右爲細末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心鹽湯
下

虎骨四斤丸（局方下同）

木瓜　天麻　肉蓯蓉洗淨　牛膝焙乾各一斤
附子炮去皮臍二兩　虎骨酥炙一兩
右將前四味用無灰酒五升浸春秋五日夏三日
冬十日取出焙乾入附子虎骨共爲末用前浸藥
酒打麪糊丸梧子大每服五十丸食前鹽湯下

加味四斤丸

治肝腎二經氣血不足足膝痠痛步履不隨如受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脛骨一兩酥炙　乳香研　沒藥研各五錢

川烏炮去皮　天麻各一兩　木瓜一斤去穰蒸

肉蓯蓉　牛膝各一兩半

右各爲末先將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和杵丸桐子大每服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下

滋陰八味丸

治陰虛火盛下焦濕熱成痿此方變丸爲湯卽名滋陰八味煎

山藥　山茱萸肉各四兩　丹皮　白茯苓

澤瀉　黃蘗鹽水炒　知母鹽水炒各三兩

熟地黃八兩蒸搗

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滚白湯或淡鹽湯送下百餘丸

單方

人參酒浸服之治風軟脚弱可逐奔馬故曰奔馬草曾用有效（丹溪）

脚軟用商陸根細切如小豆大煑令熟更入菉豆同爛煑爲飯每日煑食以瘥爲度其功最效（斗門方）

癱緩用大豆炒黑投酒中飲之（唐本草）

風氣脚弱孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服（肘後方）

濕氣脚軟樟柳根切小豆大煑熟更以菉豆同煑爲飯每日食之以瘥爲度最效（斗門方）

脚膝痿弱不可屈伸牛膝煎服丸服或浸酒服並佳

腰腿之疾必用藥也（本草下同）

脚膝冷弱石斛煎服丸服並佳

八月斷大槐枝候生嫩蘖煑汁釀酒療大風痿痹甚效（別錄）

足躄筋急桂末白酒和塗之一日一上（甲乙經）

腰脚痹軟行履不穩者萆薢二十四分杜仲八分搗篩每日溫酒服三錢匕禁牛肉（廣利方）

痿躄脚弱五加皮釀酒服或水煎如茶飲之（本草）

鍼灸

靈樞經曰春取絡脈諸榮大筋分肉之間甚者深取之間者淺取之夏取諸腧孫絡肌肉皮膚之上秋取諸合餘如春法冬取諸井諸腧之分故深而留之此四時之序氣之所處病之所合臟之所宜轉筋者立而取之可令遂已痿厥者張而刺之可令立快也

太陽根於至陰結於命門命門者目也陽明根於厲兌結於顙大顙大者鉗耳也少陽根於竅陰結於窻籠窻籠者耳中也太陰爲開陽明爲闔少陽爲樞故

樞折則肉節瀆而暴疾起矣故暴病者取之太陽視有餘不足瀆者皮膚宛焦而弱也闔折則氣無所止息而痿疾起矣故痿疾者取之陽明視有餘不足無所止息者眞氣稽畱邪氣居之也樞折卽骨繇而不安於地故骨繇者取之少陽視有餘不足骨繇者節緩而不收也所謂骨繇者搖故也當窮其本也

足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄坐不能起取之所別也

痿厥爲四末束悗乃疾解之日二不仁者十日而知無休病已止

熱病面靑腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆筋躄目浸索筋於肝不得索之金金者肺也

凡此十二邪者皆奇邪之走空竅者也故邪之所在皆爲不足故上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之苦傾目爲之眩中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則乃爲痿厥心悗補足外踝下畱之

痿厥心悗刺足大指間上二寸畱之一曰足外踝下畱之

甲乙經曰足緩不收痿不能行不能言語手足痿躄不能行地倉主之

痿不相知太白主之

痿厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絕骨皆瀉之

痿厥寒足腕不收躄坐不能起髀樞脚痛丘墟主之

虛則痿躄坐不能起實則厥脛熱時痛身體不仁手足偏小善嚙頰光明主之

千金方曰浮白主足緩不收

天柱行間主足不任身

然谷主足不能安脛痠不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痹不能行

衝陽三里僕參飛揚復留完骨主足痿失履不收

地倉太泉主足痿躄不能行

光明主痿躄坐不能起

條口三里承山承筋主足下熱不能久立

風市主兩膝攣痛引脅拘急嚲躄或青或焦或枯或黧如腐木

曲泉附陽天池大巨支溝小海絕骨前谷主四肢不
舉

醫學綱目曰刺痿概舉其略肺熱葉焦則肺喘鳴生痿躄色白而毛敗者補其滎魚際通其俞太淵至秋病已

心熱生脈痿數溲血樞折不相提挈脛縱不能任用於地色赤而絡脈溢者補其滎勞宮通其俞太陵至夏病已

肝熱生筋痿下白淫口苦筋急攣色蒼而爪枯者補其滎行間通其俞太衝至春病已

脾熱生肉痿乾渴肌肉不仁色黃而蠕動者補其滎大都通其俞太白至長夏病已

腎熱生骨痿足不任身腰脊不舉骨枯髓減色黑而齒槁者補其滎然谷通其俞太谿至冬病已

脚弱無力行步艱難灸太衝厲兌補之又灸風市

又法取太衝五分瀉八吸忌灸又取中封五分瀉八吸三里一寸瀉十吸

又法公孫灸半寸又取三里絕骨申脈不已取崑崙

陽輔

兩足癱瘓兩腿無力灸鶴頂七壯在膝蓋骨尖上

導引

保生祕要曰世所苦者四大之證癱瘓蠱膈語云定做閻羅特客何也爲患至極醫家藥餌莫能拯者其證因六慾七情日感月深本元虧陷眞氣匱竭而時醫無非以土石草木之藥何能補接先天之命哉所以素問首卷論曰恬淡無爲斂神內守蓋以靜功調養眞氣其次靈樞言鍼灸乃行氣之法能起膏肓之痼疾八法運動頓甦沉疴乃見上古醫經惟從理氣攻患取效彰然按鍼灸有補瀉之功元門運氣有呼

吸之法其熊經鳥舉能攻表裏運用二者代鍼總歸於身合乎天地斡旋同一炁也審能行之則大患者皆可不藥而愈所謂卽以其人之道還治其人之身也導引之法初意欲專以坐功貫之而刪去導引但初學之士或功夫未純或未能行功者病時學此亦可不藥而愈

導引法如患右手以右手指右囘頭目左而視左患亦如之各運氣二十四口如患左足坐平凳子上以左足踏右膝上左手托脚跟右手扳脚尖轉頭向左患右亦如之用力扳之能除風寒暑濕遠年近日癱瘓之證無不應驗

運功三提三咽返念歸元氣積一九斡旋周天左邊氣不通於左手行功著意引在左手右亦如之各運五口專氣須百日候到氣脉全

醫案

霏雪錄曰葛可久同郡富人家女子年可十七八歲四肢痿痹不能自食目瞪衆醫莫能治迎可久可久視之笑曰此不難治乃命悉去其房中香匳流蘇之屬發籍地板掘土爲坎舁女子其中扃其扉戒家人候其手足動而作聲當報我久之手足果動而呼投藥一丸明日自坎中出矣蓋此女平日嗜香而脾爲香氣所蝕故也

儒門事親曰宛丘營軍校三人皆病痿積年不瘥腰

已下腫痛不舉遍身瘡赤兩目昏瞎唇乾舌燥求療於戴人戴人欲投瀉劑二人不從爲他醫溫補之藥所惑皆死其同病有宋子玉者俄省曰彼已熱死我其改之敬邀戴人戴人曰公之疾服熱藥久矣先去其藥邪然後及病邪可下三百行子玉曰敬從教先以舟車丸濬川散大下一盆許明日減三分兩足舊不仁是日覺痛痒累至三百行始安戴人曰諸痿獨取陽明陽明者胃與大腸也此言不止謂鍼鍼與藥同也

陳下一武卒宋子玉因駐軍息城六月間暴得痿病腰膝兩足皆不任用躄而不行求治於予予察其兩手脉皆滑大而有力予思內經火淫於內治以鹹寒以鹽水越其膈間寒熱宿痰或宿食宿飲在上脘者可以湧之宿痰既盡因而下之節次間行覺神思日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸心降腎升又繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心湯凉膈散柴胡飲子大作煎劑時時呷之

東垣十書曰司丞叔平生脚自踝以下常覺熱冬〻不

可加綿於上常自言曰我稟質壯不怕冷予曰此足三陰之虛宜早斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年方五十患痿半年而死

丹溪心法曰東陽吳子萬年五十形肥味厚且多憂怒脈常沉濇自春來病痰氣醫認爲虛寒率與燥熱香竄之劑至四月兩足弱氣上冲飲食減召予治之予曰此熱鬱而脾虛痿厥之證作矣形肥而脈沉未是死證但藥邪火盛當此火旺實難求生且與竹瀝下白朮膏盡二斤氣降食進一月後大汗而死書此以爲諸賢覆轍之戒云

薛己醫按曰舉人于尚之素腎虛積勞足痿不能步履後舌瘖不能言面色黧黑余謂腎氣虛寒不能運及所發用地黃飲子治之而愈後不慎調攝而復作或用牛黃清心丸之類發熱痰甚誠似中風用祛風化痰之類小便祕澀口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸漸愈又用補中益氣湯而痊

寓意草曰徐嶽生軀盛氣充昔年因食指微傷見血以冷水濯之遂至血凝不散腫潰出膿血數升小筋

脫出三節指廢不伸邇來兩足間纔至秋月便覺畏冷重綿蔽之外拊仍熱內腨獨覺其寒近日從踵至膝後筋痛不便遠行雲間老醫令服八味丸深中其意及僕診自云平素脈難摸索乃肝肺二部反見洪大大爲病進況在冬月木落金寒時尤爲不宜方來之勢將有不可嚮邇者八味丸之桂附未可輕服也何也筋者肝之合也附筋之血旣經食指之挹取存畱無幾不能榮養筋脈加以忿怒數動肝火傳熱於筋足跗之大筋得熱而短是以牽强不便於行也然肝之所主者惟肺木性畏金稟令擁戴若君主然故必肺氣先清週身氣乃下行今肺脈大則肺氣又爲心主所傷壅窒不清是以陽氣不能下達而足寒也然則所患雖微已犯三逆平素脈細而今脈大一逆也肝脈大而熱下傳二逆也肺脈大而氣上壅三逆也設悞以桂附治之熱者愈熱而壅者愈壅即日便成痿痺矣此際用藥淵乎微乎有尋常不能測識者蓋筋脈短勁肝氣內錮須亟講於金伐木榮之道以金伐木而木反榮筋反舒匪深通元造者其孰能知

之然非金氣自壅則木且奉令不暇何敢內拒惟金失其剛轉而爲柔是以木失其柔轉而爲剛故治此患先以清金爲第一義也然清金先以清胃爲第一義不清其胃則飮酒焉而熱氣輸於肺矣厚味焉而濁氣輸於肺矣藥力幾何能勝清金之任哉金不清如大敵在前主將懦弱已不能望其成功况舍清金而更加以助火爍金倒行逆施以爲治耶必不得之數矣翁見藥石之言漫無忌諱反疑爲張大其說而莫之信竟服八味丸一月後痿痹之情悉著不幸所言果驗乃臥牀一載必不令僕一見聞最後陽道盡縮小水全無乃肺金之氣先絕於上所以致此明明言之而竟蹈之奈何奈何

二八二八

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十三卷目錄

醫部彙考三百三

虛勞門一

黃帝素問（上古天眞論　陰陽應象大論　脈要精微論　玉機眞藏論　經脈別論　宣明五氣篇　通評虛實論　評熱病論　逆調論　奇病論　脈解篇　刺志論　調經論）

靈樞經　決氣篇　海論　五癃津液別篇

扁鵲難經　虛損

張機金匱要略（虛勞證治）

華佗中藏經（虛病大要論　勞傷論　傳尸論　虛勞死證　臟腑虛勞證脈）

孫思邈千金方（臟腑虛勞證脈）

嚴用和濟生方（總論證治）

劉完素六書（虛損論）

李杲十書（脾胃虛弱隨時爲病隨病制方　脾胃虛不可妄用吐藥論　脾胃虛則九竅不通論　胃虛則臟腑經絡皆無所受氣而俱病論　胃虛元氣不足諸病所生論）

朱震亨心法（勞瘵　葛可久勞證十藥神書內摘七方）

戴思恭證治要訣（五勞）

王綸明醫雜著（勞瘵）

虞摶醫學正傳（虛損　勞極）

藝術典第三百二十三卷

醫部彙考三百三

虛勞門一

黃帝素問

上古天眞論

今時之人以酒爲漿以妄爲常醉以入房以欲竭其精以耗散其眞不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也

註 酒能傷脾脾氣傷則不能宣五穀味而生氣傷

醉以入房則傷精矣故半百而衰也

陰陽應象大論

味傷形氣傷精寒傷形熱傷氣氣傷痛形傷腫

註飲食之氣味太過反能傷其精形陰寒甚故傷形陽熱盛故傷氣氣無形故痛陰有形故腫

喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽

註情由內發故傷氣邪由外入故傷形喜屬陽而怒屬陰故卒暴則傷其陰陽也

年四十而陰氣自半也起居衰矣

註男子以八爲期至四十而居半腎陰漸虛故起居自倦

脉要精微論

言而微終日乃復言者此奪氣也

註氣虛而不接續也

玉機眞臟論

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六月死眞臟脉見乃予之期日

註此心病傳肺也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項期一月死眞臟見乃予之期日

註　此肝病至肺而死也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不便內痛引肩項身熱脫肉破䐃眞臟見十日之內死

註　此肺病至心而死也

大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰眞臟來見期一歲死見其眞臟乃予之期日

註　此脾病而終一歲也

大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱破䐃脫肉目眶陷眞臟見目不見人立死其見人者至其所不勝之時則死

註　此腎病而死於脾也

五虛死脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五虛漿粥入胃泄注止則虛者活

註　脈細心氣虛皮寒肺氣虛氣少肝氣虛泄利前後腎氣虛飲食不入脾氣虛故死若漿粥入胃泄注止胃氣復也故生

經脈別論

勇者氣行則已怯者則著而爲病也

註　勇者逆氣已過正氣復順怯者則畱著爲病

宣明五氣篇

五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋是謂五勞所傷

註　此五勞而傷五臟所主之血氣筋骨也

通評虛實論

邪氣盛則實精氣奪則虛

註　邪氣乃風寒暑濕精氣乃榮衛之氣也

評熱病論

邪之所凑其氣必虛陰虛者陽必凑之

逆調論

榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有者死

註　榮衛不和則兩者皆虛不仁且不用而肉苛如故者不和而致虛也

奇病論

有癃者一日數十溲太陰脈細如髮者此不足也

註　地氣不能上升而爲下泄此太陰之不足也

脈解篇

內奪而厥則爲瘖俳此腎虛矣

註　陽盛於外內奪其所藏之氣則腎虛也

刺志論

氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反此者病脈實血實脈虛血虛此其常也反此者病氣虛身熱此謂反也穀入多而氣少此謂反也穀不入而氣多此謂反也脈盛血少此謂反也脈少血多此謂反也

註　如形氣穀氣之相反血脈虛實之變常皆緣志意不和以致邪氣從之

夫實者氣入也虛者氣出也氣實者熱也氣虛者寒也

註　虛者須其實氣入則實矣實者須其虛氣出則虛矣此言氣之開闔也

調經論

心藏神神有餘則笑不休神不足則悲

註　心在志爲喜在聲爲笑故有餘則笑不休不足則金氣反勝而爲悲

肺藏氣氣有餘則喘欬上氣不足則息利少氣

註　肺主氣而司呼吸故有餘則喘欬上逆不足則呼吸不利而少氣也

肝藏血血有餘則怒不足則恐

註　肝志怒腎志恐故血有餘則肝氣盛而主怒不足則母氣衰而并於脾故恐

脾藏肉形有餘則腹脹涇溲不利不足則四肢不用

註　腹乃脾土之郛郭故有餘則脹土氣實則制水不流脾主四肢故虛則不用

腎藏志志有餘則腹脹飧泄不足則厥

註　腎者胃之關關門不利則聚水而爲腹脹飧泄腎爲生氣之原故不足則厥逆也

氣之所并爲血虛血之所并爲氣虛

註　氣并則無血血并則無氣也

有者爲實無者爲虛故氣并則無血血并則無氣今

血與氣相失故爲虛焉

註　如血并於陰則陰寒盛而血中之氣亦無氣并於陽則陽熱盛而氣分之血亦消血與氣相失而不能相和故皆爲虛焉

帝曰陰之生實奈何岐伯曰喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣帝曰陰之生虛奈何岐伯曰喜則氣下悲則氣消消則脈虛空因寒飲食寒氣熏滿則血泣氣去故曰虛矣

註　喜怒不節則陰氣上逆逆則下虛虛則陽氣相乘而下走之故爲實喜則神氣散而下悲則傷肺而氣消神氣消而脈空虛者脈隨氣而消長也兼之寒飲食致寒氣滿胷中則血泣而氣去故曰虛

陽虛則外寒陰虛則內熱

註　表陽之氣有虛之寒裏陰之氣有虛之熱

靈樞經

決氣篇

精脫者耳聾氣脫者目不明津脫者腠理開汗大泄液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠耳數鳴血

脫者色白夭然不澤其脉空虛此其候也

海論

氣海不足則氣少不足以言

註 氣海不足則氣少故不足於言

血海不足亦常想其身小狹然不知其所病

註 衝脉之血充實於周身故不足則覺其身小狹然不知其爲何病

水穀之海不足則饑不受穀食

註 胃氣不足故饑而不受穀食

髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥

註 髓海不足則精液竭精液者所以濡空竅者也故耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥

五癃津液別篇

陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠

註 陰陽之氣不和則液與精不合使液溢於骨外

而下流於陰矣液溢於外則髓液皆減而下是不能爲高矣下流過度則骨虛而腰痛脛痠矣

扁鵲難經

虛損

六難曰脉有陰盛陽虛陽盛陰虛何謂也然浮之損小沉之實大故曰陰盛陽虛沉之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也

八難曰寸口脉平而死者何謂也然諸十二經脉者皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五臟六腑之本十二經脉之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神故氣者人之根本也根絕則莖葉枯矣寸口脉平而死者生氣獨絕於內也

十一難曰經言脉不滿五十動而一止一臟無氣者何臟也然人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還故知一臟無氣者腎氣先盡也

十二難曰經言五臟脉已絕於內用鍼者反實其外五臟脉已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以

別之然五臟脉已絕於內者腎肝氣已絕於內也而醫反補其心肺五臟脉已絕於外者其心肺脉已絕於外也而醫反補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳

十四難曰脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脉也何謂損一呼一至曰離經再呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脉也至脉從下上損脉從上下也

損脉之爲病奈何然一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能爲肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死

治損之法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法也

然脉來一呼一至一吸一至名曰損人雖能行猶當著牀所以然者血氣皆不足故也再呼一至再吸一至呼吸再至名曰無魂無魂者當死也人雖能行名曰行尸

二十四難曰手足三陰三陽氣已絶何以爲候可知其吉凶不然足少陰氣絶卽骨枯少陰者冬脉也伏行而溫於骨髓故骨髓不溫卽肉不著骨骨肉不相親卽肉濡而却肉濡而却故齒長而枯髮無潤澤無潤澤者骨先死戊日篤己日死

足太陰氣絶則脉不營其口脣口脣者肌肉之本也脉不營則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則脣反脣反則肉先死甲日篤乙日死

足厥陰氣絶卽筋縮引卵與舌卷厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不營則筋縮急筋縮急卽引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日篤辛日死

手太陰氣絶卽皮毛焦太陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去卽

皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日死

手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故面色黑如黧此血先死壬日篤癸日死

三陰氣俱絕者則目眩轉目瞑目瞑者爲失志失志者則志先死死即目瞑也

六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則腠理泄絕汗乃出大如貫珠轉出不流即氣先死旦占夕死夕占旦死

四十八難曰人有三虛三實何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實也脉之虛實者濡者爲虛緊牢者爲實病之虛實者出者爲虛入者爲實言者爲虛不言者爲實緩者爲虛急者爲實診之虛實者濡者爲虛牢者爲實癢者爲虛痛者爲實外痛內快爲外實內虛內痛外快爲內實外虛故曰虛實也

八十一難曰經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脉耶將病自有虛實耶其損益奈何然是病非謂寸口脉也謂病自有虛實也假令肝實而肺虛肝

者木也肺者金也金木當更相平當知金平木假令肺實而肝虛微少氣用針不補其肝而反重實其肺故曰實實虛虛損不足而益有餘此者中工之所害也

漢張機金匱要略

虛勞證治

夫男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也

男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然

勞之爲病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行

男子脉浮弱而濇爲無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩（一作目眶痛）髮落脉極虛芤遲爲清穀亡血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

男子平人脉虛弱細微者喜盜汗也

人年五六十其病脉大者痹俠背行若腸鳴馬刀俠

瘦者皆爲勞得之

脉沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也

脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

虛勞裏急諸不足黃芪建中湯主之

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣圓主之

虛勞諸不足風氣百疾薯蕷圓主之

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衞氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃蟅蟲圓主之

華佗中藏經

虛病大要論

病有藏虛腑虛上虛下虛狀各不同宜深消息腸鳴

氣走足冷手寒食不入胃吐逆無時皮毛憔悴肌肉皺皺耳目昏塞語聲破散行步喘促精神不收此五臟之虛也診其脈舉指而活按之而微看在何部以斷其臟也又按之沉小弱微短濇軟濡俱爲臟虛也虛則補益治之常情耳皮膚搔癢肌肉䐜脹食飲不化大便滑而不止診其脈輕手按之得滑重手按之得平此乃腑虛也看在何經而正其時也頰赤心忪舉動顫慄語聲嘶嗄脣焦口乾喘乏無力面少顏色頤頷腫滿診其左右寸脈弱而微者上虛也大小便難飲食進退腰脚沉重如坐水中行步艱難氣上奔衝夢寐危嶮診其左右尺中脈滑而濇者下虛也病人脈微濇短小俱屬下虛也

勞傷論

勞者勞於神氣傷者傷於形容饑飽過度則傷脾思慮過度則傷心色欲過度則傷腎起居過度則傷肝喜怒悲愁過度則傷肺又風寒暑濕則傷於外饑飽勞役則敗於內晝感之則病榮夜感之則病衞榮衞經行內外交運而各從其晝夜始勞於一一起於二

二傳於三三通於四四干其五五復犯一一至於五邪氣乃深眞氣自失使人肌肉消神氣弱飲食減行步難及其如此則雖有命亦不能生也故調神氣論曰調神氣戒酒色節起居少思慮薄滋味者長生之大端耳診其脉甚數甚急甚細甚弱甚微甚濇甚滑甚短甚長甚浮甚沉甚緊甚弦甚洪甚實皆生於勞而傷也

傳尸論

傳尸者非爲一門相染而成也人之血氣衰弱臟腑羸虛中於鬼氣因感其邪遂成其疾其候欬嗽不止或胷膈脹悶或肢體疼重或肌膚消瘦或飲食不入或吐利不定或吐膿血或嗜水漿或好歌哮或愛悲愁或顛風發歌或便溺艱難或因酒食而遇或因風雨而來或問病弔喪而得或朝走暮遊而得或因氣聚或因血行或露臥於田野或偶會於園林鍾此病死之氣染而爲疾故曰傳尸也

虛勞死證

榮衛耗散面目浮腫者死

心絕於腎肩息回眄目直者一日死

肺絕則氣去不反口如魚口者三日死

骨絕腰脊痛腎中重不可反側足膝後平者五日死

腎絕大便赤澀下血耳乾脚浮舌腫者六日死

又曰足腫者九日死

脾絕口冷足腫脹泄不覺者十二日死

筋絕魂驚虛恐手足爪甲青呼罵不休者八九日死

肝絕汗出如水恐懼不安伏臥目直面青者八日死

又曰即時死

胃絕齒落面黃者七日死又曰十日死

臟腑虛勞證脉

肝脉弦長曰平若實而微則爲不足病在內不及則令人胷脅脹滿如人將捕之虛則夢花草茸茸又身熱惡寒四肢不舉脉當弦長而急反短澀乃金尅木十日死不治

膽虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨臥關上脉陽微者膽虛陽虛者膽絕也

心脉來盛去衰如連珠如循瑯玕曰平若來衰去盛

爲不足病在內令人煩躁上爲欬唾下爲氣泄心虛則畏人瞑目欲眠精神不倚魂魄妄亂恐懼多驚憂思不樂胷腹中若痛言語戰慄惡寒恍惚面赤目黃喜衄診其脉左右寸口兩虛而微者是也

小腸虛則傷寒寒則泄膿血或泄黑水左寸口脉浮而微軟弱不禁按病驚狂無所守下空空然不能語者是也

脾虛則多癖喜呑酸痢不已精不勝元氣之失溺不能自持其脉如鳥之距曰不及病在內令人中滿不食乏力手足緩弱不遂涎引口中四肢腫脹溏泄不時夢中飲食脾氣虛則大便活小便不利汗出不止五液注下爲五色注下利夢飲食不足也

胃虛則腸鳴脹滿引出滑泄不足則多饑不消食脉浮大者虛也浮而微滑者亦虛也

肺虛則寒生欬息利下少氣力多悲慼其脉來毛而微曰不及病在內令人喘呼而欬上氣見血下聞病音又欬而遺小便者上虛不能制下故也又虛則力乏之喘促右脅脹語言氣短者是也

大腸虛寒則滑泄不定又虛則喜滿欬喘咽中如核妨矣

腎脉沉濡曰平若其去如數者爲不及病在內令人心如懸小腸腹滿小便滑變黃色虛則胷中痛夢船溺人腎乏之精徹背與腰相引而疼饑見飽減又喉鳴坐而喘欬血出爲腎虛寒氣欲絶也

膀胱虛則引起氣入肺

三焦者人三元之氣也上焦虛則不能制下遺便溺頭面腫中焦虛則腸鳴膨脹下焦虛寒則大小便泄下不止

唐孫思邈千金方

臟腑虛勞證脉

肝傷其人脫肉又臥口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛此爲肝臟傷所致也

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也

病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

肝勞病者補心氣以益之心旺則感於肝人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱當臍跳診其脉弦此爲心臟傷所致也

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄不能起僵仆目黃失精䀮䀮名曰膽虛寒也

邪哭使魂魄不安者血氣少者屬於心心氣虛者其人卽畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者卽爲癲陽氣衰者卽爲狂五臟者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟空虛也卽邪神居之神靈所使鬼而下之脉短而微其臟不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液卽爲涕泣出肺氣衰者卽泣出肝氣衰者魂不安肝主善怒其聲呼

左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顱際偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱病也病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛也

心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃癉心煩不得臥腸鳴名曰脾虛冷也

右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴（外臺作耳虛鳴）時寒時熱脣口乾面目浮腫名曰胃虛冷也

右手關上脉陰陽俱虛者足太陰與陽明俱虛也病

苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已名曰脾胃俱虛也

脾勞病者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本矣肝心爲陽脾肺腎爲陰逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之終始也

右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液名曰肺虛冷也

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胷中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明中情不樂或如恐怖名曰肺與大腸俱虛也

肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是爲關格病則生矣

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心

中悶下重足腫不可以按地名曰腎虛寒也

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡寒脉代絕時不至足寒上重下輕行不按地小腹脹滿上搶胷痛引脅下名曰腎虛寒也

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收篡反出時時洞泄寒中泄腎心俱病名曰腎膀胱俱虛也

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛冷也

腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之則死順

之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣

補方通治五勞六極七傷虛損五勞五臟病六極六腑病七傷表裏受病五勞者一曰志勞二曰思勞三曰憂勞四曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四曰肺傷善痿五曰腎傷善唾六曰骨傷善饑七曰脉傷善嗽凡遠思强慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人慼慼所患傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷也

宋嚴用和濟生方

總論證治

夫勞瘵一證爲人之大患凡受此病者傳變不一積年疰易甚至滅門可勝嘆哉大抵合而言之曰傳屍別而言之曰骨蒸殗殜復連屍疰勞疰蠱疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰是也夫疰者注也自上注下病源無異是之謂疰又其變則有二十二種或三十六種或九十九種又有所謂五屍者曰蜚屍遁屍寒屍喪

屍屍注是也其名不同傳變尤不一感此疾而獲安者十無一二也大凡五臟所傳皆令人憎寒發熱其證狀各異有如傳之於肝則面白目枯口苦自汗心煩驚怪傳之於心則面黑鼻乾口瘡喜忘大便或祕或泄傳之於脾則面青脣黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味傳之於肺則面赤鼻白痰吐咯血喘嗽毛枯傳之於腎則面黃耳枯胷滿胻痛白濁遺瀝又有二十四種勞蒸者亦可因證驗之蒸在心也少氣煩悶舌必焦黑蒸在小腸也腹內雷鳴大腸或祕或泄蒸在肝也目昏眩運躁怒無時蒸在膽也耳聾口苦脅下堅痛蒸在腎也耳輪焦枯腰脚痠痛蒸在右腎也情意不定泄精白絮蒸在肺也喘嗽咯血聲音嘶遠蒸在大腸也右鼻乾疼大腸隱痛蒸在脾也脣口乾燥腹脅脹滿畏寒不食蒸在胃也鼻口乾燥腹膨自汗睡臥不寧蒸在膀胱也小便黃赤凝濁如膏蒸在三焦也或寒或熱中脘膻中時覺煩悶蒸在膈也心胷噎塞疼痛不舒蒸在宗筋也筋脈縱緩小腹隱痛陰器自强蒸在回腸也肛門祕澀傳道之時裏急後

重蒸在玉房也男子遺精女子白淫蒸在腦也眼眵頭眩口吐濁涎蒸在皮也肌膚鱗起毛折髮黑蒸在骨也版齒黑燥大杼痠疼蒸在髓也肩背疼倦胻骨痠痛蒸在筋也眼昏脅痛爪甲焦枯蒸在脈也心煩體熱痛刺如針蒸在內也自覺身熱多不奈何四肢瞤動蒸在血也毛髮焦枯有時鼻衄或復尿血詳諸病證大略如斯若究其根惟心肺受蟲嚙禍之甚也治法先宜去根次須攝養調治亦有早灸膏肓俞崔氏穴而得愈者若待其根深蔕固而治之則無及矣

論五勞六極證治

醫經載五勞六極之證非傳尸骨蒸之比多由不能衞生施於過用逆於陰陽傷於榮衞遂成五勞六極之病焉蓋勞力謀慮成肝勞應乎筋極曲運神機成心勞應乎脉極意外過思成脾勞應乎肉極預事而憂成肺勞應乎氣極矜持志節成腎勞應乎骨極此五勞應乎五極者也然精極者五臟六腑之氣衰形體皆極眼視無明齒焦髮落體重耳聾行履不正邪氣逆於六腑厥於五臟故成精極大抵勞極之脉多

弦治療之法隨其虛實冷熱而調之精極者當補其精也素問所謂形不足者溫之以氣精不足者補之以味大略如此

金劉完素六書

虛損論

虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損損於肺皮聚而毛落二損損於心血脈虛少不能榮於臟腑婦人月水不通三損損於胃飲食不爲肌膚自下而損者一損損於腎骨痿不能起於牀二損損於肝筋緩不能自收持三損損於脾飲食不能消尅論曰心肺損而色蔽腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也漸漬之深皆虛勞之疾也

元李杲十書

脾胃虛弱隨時爲病隨病制方

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷

元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿輭遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物䀮䀮無所見小便頻數大便難而結祕胃脘當心而痛兩脅痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胷中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背胛眼皆痛頭痛時作食不下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金爲熱所乘而作當先助元氣理治庚辛之不足黃芪人參湯主之

脾胃虛不可妄用吐藥論

六元正紀論云木鬱則達之者蓋木性當動蕩軒舉是其本體今乃鬱於地中無所施爲即是風失其性人身有木鬱之證者當開通之乃可用吐法以助風木是木鬱則達之之義也又說木鬱達之者蓋謂木初失其性鬱於地中今旣開發行於天上是發而不鬱也是木復其性而有餘也有餘則兼其所勝脾土

受邪見之於木鬱達之條下不止此一驗也又厥陰司天亦風木旺也厥陰之勝亦風木旺也俱是脾胃受邪見於上條其說一同或者不悟木鬱達之四字之義反作木鬱治之重實其實脾胃又受木制又復其木正謂補有餘而損不足也既脾胃之氣先已不足豈不因此而重絕乎再明胷中窒塞當吐氣口三倍大於人迎是食傷太陰上部有脉下部無脉其人當吐不吐則死以其下部無脉知其木鬱在下也塞道不行而肝氣下絕矣兼肺金主塞而不降爲物所隔金能剋木肝木受邪食塞胷咽故曰在下者因而越之仲景云實煩以瓜蒂散吐之如經汗下謂之虛煩又名懊憹煩躁不得眠知其木鬱也以梔子豉湯吐之昧者將鬲咽不通上支兩脅腹脹胃虛不足乃濁氣在上則生䐜脹之病吐之況胃虛必怒風木已來乘陵胃中內經以鐵洛鎮墜之豈可反吐助其風木之邪不主吐而吐其差舛如天地之懸隔大抵胷中窒塞煩悶不止者宜吐之耳

脾胃虛則九竅不通論

眞氣又名元氣乃先身生之精氣也非胃氣不能滋之胃氣者穀氣也榮氣也運氣也生氣也淸氣也衞氣也陽氣也又天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之則異其實一也不當作異名異論而觀之飲食勞役所傷自汗小便數陰火乘土位淸氣不生陽道不行乃陰血伏火況陽明胃土右燥左熱故化燥火而津液不能停且小便與汗皆亡津液津液至中宮變化爲血也脈者血之腑也血亡則七神何依百脈皆從此中變來也人之百病莫大於中風有汗則風邪客之無汗則陽氣固密腠理閉塞諸邪不能傷也或曰經言陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重強又五臟不和則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不通利腸胃之所生也請析而解之答曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃稟乃能熏蒸腐熟五穀者也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化安病則

眞氣又名元氣乃先身生之精氣也非胃氣不能滋之胃氣者穀氣也榮氣也運氣也生氣也清氣也衛氣也陽氣也又天氣人氣地氣乃三焦之氣分而言之則異其實一也不當作異名異論而觀之飲食勞役所傷自汗小便數陰火乘土位清氣不生陽道不行乃陰血伏火況陽明胃土右燥左熱故化燥火而津液不能停且小便與汗皆亡津液津液至中宮變化爲血也脈者血之腑也血亡則七神何依百脈皆從此中變來也人之百病莫大於中風有汗則風邪客之無汗則陽氣固密腠理閉拒諸邪不能傷也或曰經言陽不勝其陰則五臟氣爭九竅不通又脾不及則令人九竅不通名曰重強又五臟不和則九竅不通又頭痛耳鳴九竅不通利腸胃之所生也請析而解之答曰夫脾者陰土也至陰之氣主靜而不動胃者陽土也主動而不息陽氣在於地下乃能生化萬物故五運在上六氣在下其脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口也脾受胃稟乃能熏蒸腐熟五穀者也胃者十二經之源水穀之海也平則萬化安病則

萬化危五臟之氣上通九竅五臟稟受氣於六腑六腑受氣於胃六腑者在天爲風寒暑濕燥火此無形之氣也胃氣和平榮氣上升始生溫熱溫熱者春夏也行陽二十五度六陽升散之極下而生陰陰降則下行爲秋冬行陰道爲寒涼也胃既受病不能滋養故六腑之氣已絕致陽道不行陰火上行五臟之氣各受一腑之化乃能滋養皮膚血脈筋骨故言五臟之氣已絕於外是六腑生氣先絕五臟無所稟受而氣後絕矣肺本收下又主五氣氣絕則下流與脾土疊於下焦故曰重強胃氣既病則下溜經云濕從下受之脾爲至陰本乎地也有形之土下塡九竅之源便不能上通於天故曰五臟不和則九竅不通胃者行清氣而上卽地之陽氣也積陽成天曰清陽出上竅曰清陽實四肢曰清陽發腠理者也脾胃既爲陰火所乘穀氣閉塞而下流卽清氣不升九竅爲之不利胃之一腑病則十二經元氣皆不足也氣少則津液不行津液不行則血虧故筋骨皮肉血脈皆弱是氣血俱羸弱矣勞役動作飲食饑飽可不愼乎凡有

此病者雖不變易他疾已損其天年更加之鍼灸用藥差悞欲不夭枉得乎

胃虛則臟腑經絡皆無所受氣而俱病論

夫脾胃虛則濕土之氣溜於臍下腎與膀胱受邪膀胱主寒腎爲陰火二者俱弱潤澤之氣不行大腸者庚也燥氣也主津小腸者丙也熱氣也主液此皆屬胃胃虛則無所受氣而亦虛津液不濡睡覺口燥咽乾而皮毛不澤也甲膽風也溫也主生化周身之血氣丙小腸熱也主長養周身之陽氣亦皆稟氣於胃則能浮散也升發也胃虛則膽及小腸溫熱生長之氣俱不足伏畱於有形血脈之中爲熱病爲中風其爲病不可勝紀青赤黃白黑五臟皆滯三焦者乃下焦元氣生發之根蔕爲火乘之是六腑之氣俱衰也腑者府庫之府包含五臟及形質之物而藏焉且六腑之氣外無所主內有所受感天之風氣而生甲膽感暑氣而生丙小腸感濕化而生戊胃感燥氣而生庚大腸感寒氣而生壬膀胱感天一之氣而生三焦此實父氣無形也風寒暑濕燥火乃溫熱寒涼之別

稱也行陽二十五度右遷而升浮降沉之化也其虛也皆由脾胃之弱以五臟論之心火亢盛乘其脾土曰熱中脉洪大而煩悶難經云脾病當臍有動氣按之牢若痛動氣築築然堅牢如有積而硬若似痛也甚則亦大痛有是則脾虛病也無則非也更有一辯食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虧弱也且心火大盛左遷入於肝木之分風濕相搏一身盡痛其脉洪大而弦時緩或爲眩運戰搖或爲痲木不仁此皆風也脾病體重節痛爲痛痹爲寒痹爲諸濕痹爲痿輭失力爲大癰大疽若以辛熱助邪則爲熱病爲中風其變不可勝紀木旺運行北越左遷入地助其腎水水得子助入脾爲痰涎自入爲唾入肝爲淚入肺爲涕乘肝木而反尅脾土明矣當先於陰分補其陽氣升騰行其陽道而走空竅次加寒水之藥降其陰火黃蘗黃連之類是也先補其陽後瀉其陰脾胃俱旺而復於中焦之本位則陰陽氣平矣火曰炎上水曰潤下今言腎主五液上至頭出於空竅俱作泣涕汗涎唾者何也曰病癎者涎沫出於口冷汗出於身

清涕出於鼻皆陽蹻陰蹻督衝四脉之邪上行腎水不任煎熬沸騰上行爲之也此奇邪爲病不繫五行陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴中奇邪之法治之

胃虛元氣不足諸病所生論

夫飲食勞役皆自汗乃足陽明化燥火津液不能停故汗出小便數也邪之大者莫若中風風者百病之長善行而數變雖然無虛邪則風雨寒不能獨傷人必先中虛邪然後賊邪得入矣至於痿厥逆皆由汗出而得之也且冬陽氣伏藏於水土之下如非常泄精陽氣已竭則春令從何而得萬化俱失所矣在人則飲食勞役汗下時出諸病遂生予所以諄諄如此者蓋亦欲人知所慎也

朱震亨心法

勞瘵

勞瘵主乎陰虛痰與血病

虛勞漸瘦屬火陰火銷鑠卽是積熱做成始健可用子和法後若羸瘦四物湯加減送消積丸不做陽虛

蒸蒸發熱積病最多勞病四物湯加炒蘗竹瀝人尿薑汁大補爲上肉脫熱甚者難治

勞瘵之證非止一端其始也未有不因氣體虛弱勞傷心腎而得之以心主血腎主精精竭血燥則勞生焉故傳變不同骨蒸殗殜復連尸疰夫疰者注也自上至下相傳骨肉乃至滅門者有之其證臟中有蟲嚙心肺間名曰瘵疾難以醫治

傳屍勞瘵寒熱交攻久嗽咯血日見羸瘦先以三拗湯與蓮心散煎萬不失一

葛可久勞證十藥神書內摘七方

夫人之生也稟天地氤氳之氣在乎保養眞元固其根本則萬病不生四體康健若曰不養眞元不固根本疾病由是生焉且眞元根本則氣血精液也余嘗聞先師有言曰萬病莫若勞證最爲難治蓋勞之由因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命酒色是貪日夜躭嗜無有休息以致耗散眞元虛敗精液則嘔血吐痰以致骨蒸體熱腎虛精竭面白頰紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無

謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡況醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以大熱之藥妄爲施治絕不取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第於後用藥之法如嘔吐咯嗽血者先以十灰散遏住如甚者須以花蕊石散止之

大抵血熱則行血冷則凝見黑必止理之必然止血之後其人必體倦次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五六分後服諸藥

保和湯止嗽寧肺保眞湯補虛除熱太平丸潤肺除痿消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之保眞湯內分驚悸淋濁便澀遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加用服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次噙一丸緩緩溶化至上牀時亦如此用之夜則肺竅開藥必流入竅中此訣要緊如痰壅却先用飴糖拌消

化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面臥而睡服前七藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有餘暇煮此服之亦可續煮白鳳膏食之固其根源完其根本病可之後方可合十珍丸服之此爲收功起生之妙用也

明戴思恭證治要訣

五勞

五勞者五臟之勞也皆因不量才力勉強運爲憂思過度嗜飲無節或病失調理將積久成勞其病頭旋

眼運身疼脚弱心怯氣短自汗盜汗或發寒熱或五心常熱或往來潮熱或骨蒸作熱夜多惡夢晝少精神耳內蟬鳴口苦無味飲食減少此皆勞傷之證五臟雖皆有勞心腎爲多心主血腎主精精竭血燥則勞生治勞之法當以調心補腎爲先不當用峻烈之劑惟當溫養滋補以久取效天雄附子之類投之太多適足以發其虛陽緣內無精血不足當此猛劑不可因有熱純用甜冷之藥以傷腎氣獨用熱藥者猶釜中無水而進火也過用冷藥者猶釜下無火而添

水也非徒無益又害之耳宜十全大補湯或雙和散養榮湯七珍散樂令建中湯皆可選用間進雙補圓若有無故身體瘦軟絕無力氣別無他證此平日作勞太過血氣虛而筋失養宜劫勞散或和氣湯倍芎歸又有言語讀誦過耗神氣致成虛損是爲叫呼走氣宜於十全大補湯等藥選用

虛人老人病中忽一旦語言不出抑之不應此不是啞風久欠藥力到補調功成自復應矣

氣虛人多不得寢亦有痰多膽經伏涎欲寐不得者不可例作虛治妄補則痰愈盛

有於坐臥之中似欲得人按捻意方始安者此亦虛證也諸發熱及有寒熱者已各見本門審知因虛勞得之並宜用前藥未效用十四味建中湯而不勝熱藥者七珍散加木香五味子各七分熱多黃芪鱉甲散或人參散獨五心發熱將欲成勞者茯苓補心湯外雖惡熱內自畏寒盛夏不可單衣大建中湯十四味建中湯正元飲參附湯

飲食減少畏食而嘔者難獨用前滯甜藥須斟酌用

前快脾之劑縮砂陳皮藥却不可少如樂令建中湯內有陳皮半夏細辛却可用仍下鹿茸橘皮煎圓如不嘔不畏食用前十全大補湯雙和散等藥亦當少加快脾之劑以爲之防

有患精血不足明知當補腎方欲一求之歸芪等藥其人素減食又恐不利於脾方欲理脾氣則不免用踈刷之藥又恐愈耗腎水全一舉而兩得之功莫若鹿茸橘皮煎圓爲第一故曰精不足補之以味又曰補腎不如補脾以脾上交於心下交於腎故也道家交姤心腎以脾爲黃婆者卽此意若腎元大段虛損病勢困篤則腎不容少緩又不拘於此說要知於滋腎之中佐以砂仁澄茄之類於壯脾之中叅以北五味黃芪之屬此又臨時審病用藥之活法勞疾久而嗽血咽疼無聲此病自下而傳上若不嗽不痛久而溺濁脫精此爲自上傳下皆死證也

有面色如故肌體自充外看如無病內實虛損俗呼爲桃花蛀宜看其何證於前藥審而用之

有傳尸勞骨肉相傳甚至滅門此其五臟中皆有勞

蟲名曰瘵疾難以醫治

外有因動作勞力或發寒熱或身疼氣短或勞倦嗜臥乃一時發勞却非五勞者比宜和氣飲

有欬嗽痰多者名曰勞嗽與風寒壅熱之嗽不同此乃有本有標本在腎而標在肺可與前方選用加五味杏仁阿膠貝母款冬花之屬嗽而加以喘者於前藥更加磨沉香仍呑靈砂丹或三炒丹

王綸明醫雜著

勞瘵

男子二十前後色慾過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈欬嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯吐出血或欬血吐血衄血身熱脈沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者必用藥數十服重者期以歲年然必須病人愛命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥亦無用也此病治之於早則易若到肌肉消鑠沉困著牀脈沉伏細數則難爲矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治今製一方治色慾證

先見潮熱盜汗欬嗽倦怠趂早服之生地黃酒洗甘草炙乾薑炮各五分川芎熟地知母蜜水浸拌炒天門冬去心皮各一錢白芍藥炒當歸白朮各一錢三分陳皮黃蘗蜜水浸炙各七分生薑三片水煎空心溫服

註 按前方治火盛陰虛之法也大抵此證屬足三陰虧損虛熱無火之證故晝發夜止夜發晝止不時而作當用六味地黃丸爲主以補中益氣湯調補脾胃若脾胃先損者當以補中益氣爲主以六味地黃丸溫存肝腎多有得生者若悞用黃蘗知母之類則復傷脾胃飲食日少諸臟愈虛元氣下陷腹痞作瀉則不可救矣夫衄血吐血之類因虛火妄動血隨火而泛行或陽氣虛不能攝血歸經而妄行其脉弦洪乃無根之火浮於外也大抵此證多因四五六月爲火土大旺金水衰涸之際不行獨宿淡味保養二臟及十一二月火氣潛藏不遠帷幕戕賊眞元故至春末夏初患頭疼脚軟食少體熱注夏之病或少有老態不耐寒暑不勝勞

役四時迭病皆因氣血方長而勞心虧損或精血未滿而早斲喪故其見證難以名狀若左尺脉虛弱或細數是左腎之眞陰不足也用六味丸右尺脉遲輭或沉細而數欲絕是命門之相火不足也用八味丸至於兩尺微弱是陰陽俱虛也用十補丸此皆滋其化源也仍叅前發熱及後欬嗽諸證治法用之

虞摶醫學正傳

虛損

或問虛損之疾世俗例用局方十全大補湯以補之其方實爲諸虛之關鎻也用參芪苓术甘草以補氣虛用芎歸芍藥地黃肉桂以補血少吾子將何以議之乎曰此藥乃氣血兩虛之劑或血虛而氣尚實或氣虛而血尚充者其可一例施乎內經曰毒藥以治暴病蓋藥性各有能毒然中病者藉其能以獲安不中病者徒惹其毒以增病耳假如心脾二經虛損當以茯苓補之虛而無汗及小水短少者服之有功虛而小便數者多服則令人目盲虛而多汗者久服損

其氣天人天年以其味淡而利竅也又如肺氣弱及元陽虛者當以黃芪補之然肥白人及氣虛而多汗者服之有功若蒼黑人腎氣有餘而未甚虛者服之必滿悶不安以其性寒而閉氣也甘草爲健脾補中及瀉火除煩之良劑然嘔吐與中滿及嗜酒之人多服必斂膈不行而嘔滿增劇以其氣味之甘緩也川芎爲補血行血清利頭目之聖藥然骨蒸多汗及氣弱人久服則眞氣走散而陰愈虛甚以其氣味之辛散也生地黃能生血脉然胃氣弱者服之防損胃不食熟地黃養血補血然痰火盛者恐泥膈不行人參爲潤肺健脾之藥若元氣虛損者不可缺然久嗽勞嗽咯血鬱火在肺者服之必加嗽增喘不寧以其氣味之甘溫滯氣也白芍藥爲凉血益血之劑若血虛腹痛者豈可缺然形瘦氣弱稟賦素虛寒者服之恐伐發生之氣以其氣味之酸寒也藥性能毒未易悉舉學者宜究本草之詳不可妄施以殺人也

勞極

內經曰陰虛生內熱又曰陰氣者靜則神藏躁則消

亡飲食自倍腸胃乃傷又曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣熏胷中故內熱是故欲養陰而延生者心神宜恬靜而毋躁擾飲食宜適中而無過傷風寒暑濕之謹避行立坐臥之有常何勞怯之有哉今也嗜慾無節起居不時七情六慾之火時動乎中飲食勞倦之過屢傷乎體漸而至於眞水枯竭陰火上炎而發蒸蒸之燥熱或寒熱進退似瘧非瘧古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同證亦少異大抵不過欬嗽發熱咯血吐痰白濁白淫遺精盜汗或心神恍惚夢與鬼交婦人則月閉不通日漸虧羸漸成勞極之候夫病此者始多懈怠姑息日久直至發熱不休形體瘦甚眞元已脫然後求醫治療雖倉扁復生莫能救其萬一良可嘆哉雖然一人未足憐也況其侍奉親密之人或同氣連枝之屬熏陶日久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍曰飛屍曰遁屍曰殗殜曰屍注曰鬼注蓋表其傳注酷虐而神妙莫能以測之名也雖然未有不由氣體虛弱勞傷心腎而得之者初起

於一人不謹而後傳注數十百人甚而至於滅門滅族者誠有之矣然此病最爲可惡其熱毒鬱積之久則生異物惡蟲食人臟腑精華變生諸般奇狀誠可驚駭是以勞傷於肝膽者則爲毛蟲如刺蝟瓦蛆之屬食人筋膜勞傷於心與小腸者則爲羽蟲如燈蛾蚊蟲禽鳥之形食人血脉勞傷於脾胃者則爲倮蟲如嬰孩蚯蚓之類食人肌肉勞傷於肺與大腸者則爲介蟲如龜鼈蝦蟹之狀食人膚膏勞傷於腎與膀胱者則爲鱗蟲如魚龍鮫鯉之形食人骨髓或挾相火之勢亦如羽蟲之酷者鴟鴞之類爲狀不一不可勝紀凡人覺有此證便宜早治緩則不及事矣治之之法一則殺其蟲以絕其根本一則補其虛以復其眞元分經用藥各有條理務如庖丁解牛動中肯綮無有不安者若待病勢已劇元氣已脫雖依古法取蟲滋補患者百無一生但亦可絕後人之傳疰耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十四卷目錄

醫部彙考三百四

虛勞門二

李梴醫學入門（諸虛　癆瘵）
樓英醫學綱目（虛勞）
李中梓醫宗必讀（虛勞證治）
徐春甫古今醫統（論五勞六極七傷之由久則生蟲　蟲候有九　附上青紫庭追勞方論　第一代蟲狀病證遊食日治法　第二代蟲狀病證遊食日治法　第三

代蟲狀病證遊遊食日治法　第四代蟲狀病證遊食日治法　第五代蟲狀病證遊食日治法　第六代蟲狀病證遊遊食日治法　蘇遊論

趙獻可醫貫（陰虛發熱論）

喻昌醫門法律（總論　論脈　雜論　論方　附陳藏器用藥凡例）

藝術典第三百二十四卷

醫部彙考三百四

虛勞門二

明李梴醫學入門

諸虛

血陰而氣陽也有暴虛而無傷損者易復有虛而虧損者亦可補益惟久虛而傷壞者必保養僅可半愈大概虛脈多弦弦濡大而無力者爲氣虛脈沉微無力爲氣虛甚脈弦而微爲血虛脈濇而微爲血虛甚

或寸微尺大而緊者血虛有火多汗又形肥而面浮白者陽虛形瘦而面蒼黑者陰虛食少神昏精不藏腰背胸脅筋骨痠痛潮汗痰嗽此虛證也但見一二便是

外因感寒久則損陽自上而下一損於肺則皮聚毛落二損於心則血脈虛少不榮臟腑婦人月水不通三損於胃則飲食不爲肌膚治宜辛甘若淡過於胃則不可治矣感熱久則損陰自下而上一損於腎則骨痿不能起於牀者死二損於肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消尅治宜酸苦若鹹過於脾則不可治矣又不內外因驚而奪精汗出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗出於脾則損肉飲食飽甚汗出於胃則損腸持重遠行汗出於腎則損骨治宜酸苦辛散於心則不可治矣

抑論心肺損而色憊汗多者爲陽虛肝腎損而形痿汗多者爲陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損證見四君子

湯心損證見四物湯心肺俱損者八物湯心肺及脾胃俱損者十全大補湯肝腎俱損者牛膝丸雜證新虛夢遺者桂枝湯加龍骨牡蠣四肢煩重酸疼心悸腹痛者小建中湯汗多力少筋骨拘急者黃芪建中湯汗多脈暴結者炙甘草湯暴損氣虛有汗潮熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參清肌散暴損血虛有汗潮熱者人參養榮湯血虛無汗潮熱者茯苓補心湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加半夏大病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸

內因五勞六極七傷積虛成損積損成傷經年不愈者謂之久虛五勞應五臟六極即六慾應六腑蓋心勞曲運神機則血脈虛而面無色驚悸夢遺盜汗極則心痛咽腫肝勞盡力謀慮則筋骨拘攣極則頭目昏眩脾勞意外過思則脹滿少食極則吐瀉肉削四肢倦怠關節肩背強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹冷胸背痛極則毛焦津枯欬嗽閧熱腎勞矜持志節則腰骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五

極者也若原因腑虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰精極令人精濁莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者推原勞極之由久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰血虛勞役饑飽傷胃腑則陽氣虛此傷證之至要也

陰虛四物湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃蘗或滋陰降火湯丸加味逍遙散補陰丸火燥甚者大補陰丸單天門冬膏

陽虛四君子湯保元湯火衰中寒身冷者鹿茸大補湯茯苓散加減內固丸三仙丹溫腎丸膃肭補天丸斑龍丸

陰陽俱虛八物湯固眞飲子或丸人參養榮湯或十全大補湯加茯苓附子半夏麥門冬或八味丸有火者二至丸異類有情丸

心虛人參固本丸夢授天王補心丹朱子讀書丸肝虛天麻丸鹿茸四斤丸脾虛參苓白朮散橘皮煎丸蒼朮膏白朮膏參苓造化糕太和羹肺虛單人參膏

單五味子膏腎虛小菟絲子丸元兎固本丸三味安腎丸太極丸

不論陰陽損傷皆因水火不濟火降則血脈和暢水升則精神充滿或心腎俱虛或心脾俱虛或心肝俱虛或肺腎俱虛或五臟俱虛但以調和心腎爲主兼補脾胃則飲食進而精神氣血自生

調和心腎虛中有熱者古庵心腎丸虛中有寒者究源心腎丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸兼補脾胃二神交濟丹還少丹天眞丸返本丸

虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正氣虛邪氣實也心勞邪熱則口舌生瘡語澀肌瘦肝勞邪熱則脅痛關格不通脾勞邪熱則氣急肌痹多汗肺勞邪熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞邪熱則尿赤陰瘡耳鳴溺閉三白湯主之心熱加黃連木通麥門冬生地肝熱加黃芩防風當歸龍膽草赤芍脾熱加山梔石斛升麻肺熱加知母桑白皮秦艽葶藶腎熱加元參赤茯車前子生地更叅積熱門虛炎治法

挾氣者交感丹古庵云心腎主血心惡熱而腎惡燥

則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉肺脾也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是補肺脾而瀉心腎也局方概用辛香燥劑以能健脾進食然陰血消而心腎損以致虛極火炎面紅發喘痰多身熱如火跗腫溏泄脉緊不食者死噫凡虛皆陰血陰氣虛也若眞陽虛亦不可治

經云形不足者溫之以氣溫存以養使氣自充非溫藥峻補之謂也精不足者補之以味乃天地自然之味非膏粱之謂也今人無病貪補而致病者有之有病貪補而不依證用藥反增痰火者有之非唯不足却疾延年亦非養心養性之道且少年慾火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體寧從緩治不可責效目前反致苛疾大概腎虛者瓊玉膏還元秋石丸延年益壽不老丹耳目衰者還元丹四聖不老丹松柏實丸腎虛無火者何首烏丸却老烏鬚健陽丹腎虛有火者八仙添壽丹羸瘦者大造丸紫河車丹血疾者女貞丹柏葉煎柏脂丸秤金丹風疾胃火者松脂丸松梅丸風疾無火者仙人飯痰火

溺澀者茯苓煎氣弱者單人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

癆瘵

熱癆陽病口乾舌瘡咽痛涕唾稠粘手足心煩疼小便黃赤大便燥結虛勞陰病唾痰白色胃逆嘔惡飲食難化小便多遺精白濁大便溏泄又有嗽痰仰臥不得者必陰陽兼病也多因十五六歲或二十前後血氣未定之時酒色虧損精血而成全屬陰虛間有因外感久瘧久嗽而成者多屬陽虛熱勞咽瘡失音者死虛勞泄不止者死

不問陰病陽病日久皆能傳變男子自腎傳心肺肝脾女子自心傳肺肝脾腎五臟復傳六腑而死亦有始終只傳一經者有專著心腎而不傳者大要以脈爲證驗

潮汗欬嗽或見血或遺精便濁或泄瀉輕者六證間作重者六證兼作蓋火蒸於上則爲欬血爲潮熱火動於下則爲精濁爲泄瀉若先見血止血爲先其餘

流傳變證雖多亦必歸重於一經假如現有精濁又加之脛酸腰背拘急知其邪在腎也現有咯血多汗加之驚惕口舌生瘡知其邪在心也現有喘欬嗽血加之皮枯鼻塞聲沉知其邪在肺也現有夢遺加之脅痛多怒頸核知其邪在肝也現有泄瀉加之腹痛痞塊飲食無味四肢倦怠知其邪在脾也當隨其邪之所在調之

勞熱清骨散內熱保眞湯晡熱黃芪鼈甲湯

勞血咯血太平丸嗽吐欬咯保和湯血去多三黃補血湯血不止十灰散單花蕊石散

勞嗽乾欬人參潤肺丸保和湯太平丸寧肺湯肺痿知母茯苓湯肺癰桔梗湯單白芨散

勞泄白朮膏八珍湯腎氣丸

勞汗黃芪散更當於各病本條參究

勞者倦也氣血勞倦不運則凝滯疎漏邪氣得以相乘又飲食勞倦所傷則上焦不行下脘不通熱熏胷中而生內熱凡頸上有核腹中有塊或當臍冰冷或無力言動皆痰涎結聚氣血凝滯之所致也故以開

關起胃爲先蓋關脉閉則氣血乾枯胃氣弱則藥無由行但陽虛不可偏用辛香丁附之類陰虛不可偏用苦寒知蘗之類東垣有開關散定胃散今亦難用宜竊其意推之

陽病開關清熱利便宜瀉白散加銀柴胡秦艽桔梗木通澤瀉當歸芍藥木香以小便多爲病去

陰病開關行痰利氣宜二陳湯加便製香附貝母牡丹皮當歸山楂蘇梗及生地木香少許以氣清痰少爲病減

陰陽俱用參苓白朮散三白湯或二陳湯加白朮神麯麥芽以起脾胃如有泄者尤宜多服久服俟胃氣轉然後依證用藥

古方以生犀散防風當歸飲或三補丸單黄連丸治熱勞證然必初起體實而後敢用之也

久虛積損成勞陽虛刧勞散十全大補湯人參養榮湯補中益氣湯單人參湯

陰虛加味逍遙散滋陰降火湯節齋四物湯補陰丸大造丸補天丸虛甚者瓊玉膏白鳳膏

古云服凉藥百無一生飲溲溺萬無一死惟脾胃虛及氣血弱者必以滋補藥中量入童便以代降火之藥今俗非偏用知蘗生地滯脾則又偏用人參桂附助火治欬輒用兜鈴紫菀款冬靑黛牡蠣收澀肝經治血輒用京墨金石寒凉傷其氣血退潮輒用銀柴胡胡黃連消其肌肉遺精輒用龍骨石脂澀燥其精皆不治其本耳

蟲亦氣血凝滯痰與瘀血化成但平補氣血爲主加以烏梅靑蒿硃砂之類而蟲自亡矣紫河車丹紫河車丸靑蒿膏蛤蚧散天靈蓋散選用

傳尸之說不必深泥歷觀勞瘵皆因酒色財氣損傷心血以致虛火妄動醫者不分陰陽用藥病家不思疾由自取往往歸咎前人積惡甚則疑及房屋器皿墳墓且冤業飛屍遞相傳疰古人亦云勞瘵三十六種惟陰德可以斷之不幸患此疾者或入山林或居靜室淸心靜坐常焚香叩齒專意保養節食戒慾庶乎病可斷根若不遵此禁忌服藥不效

樓英醫學綱目

虚勞

虚者皮毛肌肉筋爪骨髓氣血津液不足也若男女終日勞役神耗力倦饑飽越常喜怒憂思形寒飲冷縱欲恣情素問曰今人未及半百而衰者以酒爲漿以妄爲常醉以入房以慾竭其精以耗散其眞根源從此而虚竭矣五臟六腑如何不弱五勞六極七傷從此而始何謂五勞心勞血損肝勞神損脾勞食損肺勞氣損腎勞精損六極謂筋脉肉皮毛骨瘁損是謂六極七傷難經言之甚詳傷形與氣謂之七傷總而言之爲虚是也大抵五行六氣水特五之一耳夫一水既虧豈能勝五火哉虚勞等證蜂起矣其體虚者最易感於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之次則調之醫者不知邪氣加之於身而未除便行補劑邪氣得補遂入經絡致死不治如此誤者何啻千萬艮可悲哉內經中本無勞證之說其曰勞者溫之溫者溫存之義不足者補之以味穀肉菜果百味珍羞無非補也今之醫者不逼其法唯知熱補之道輕則當歸鹿茸雄附重則乳石丹砂加之以灼艾

補燥其水水得熱愈涸生火轉甚小而成嗽痰血潮熱煩渴喜冷此則熱證明矣重則失音斷不可救猶且峻補不已如此死者醫殺之耳及遇良工治驗而以清劑解之不合病人之意反行怪責及聞發表攻裏之說畏而不從甘死於庸工熱補之手雖死不悔深可憫也夫凉劑能養水清火熱劑能燥水補火天下之事無出乎理理既明何患疾之不安勞爲熱證明矣還可補乎惟無邪無熱無積之人脉舉按無力而弱者方可補之又必察其胃中及右腎二火虧而用之心虛則動悸恍惚憂煩少色舌强宜養榮湯琥珀定神丸之類以益其心血脾虛面黄肌瘦吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食不進宜快胃湯進食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脉拘攣面青恐懼如人將捕之狀宜牛膝益中湯虎骨丹之類以養助其筋脉肺虛呼吸少氣喘乏欬嗽嗌乾宜枳實湯加人參黄芪阿膠蘇子以調其氣腎虛腰背脊膝厥逆而痛神困耳鳴小便頻數精漏宜八味丸加五味子鹿茸去附子用山藥等丸以生其精

勞瘵兼痰積其證腹脅常熱手足頭面則於寅卯時分作有涼時者是也若頑痰膠固難治者必以吐法吐之或沉香滚痰丸透膈丹之類下之又甚者或用倒倉法若痰積閉塞經脉則太衝脉與衝陽寸口脉數而不相應者極難治

虛損復受邪熱皆宜用柴胡衍義云柴胡本經並無一字治勞今人方中治勞鮮有不用者誤人甚多常原病勞有一種眞臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當斟酌之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正宜服之無不效熱去即須急已若無邪熱得此愈甚雖至死人亦不怨王海藏云苟無實熱醫取用之不死何待用之者宜審諸又大忌芩連蘗驟用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加瀉陰火之藥是也

葛洪云鬼疰者是五尸之一疰又按諸鬼邪爲害其變動乃有三十六種至九十九種大略使人淋瀝沉沉默默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死傳於旁人乃至滅門覺知是候者急

治獺肝一具陰乾取末水服方寸匕日三服效未知再服此方神良天慶觀一法師行考校極精嚴時一婦人投狀述患人有所附須臾乃附語云非我所禍別是一鬼亦自病人命衰爲祟耳今已成形在患人肺中爲蟲食其肺系故令吐血聲嘶師掠之曰此蟲還得長生否久而無語再掠之良久云唯畏獺爪屑爲末以酒服之則去矣患家如其言得愈此予所目見也究其患亦相似獺爪者獺肝之類歟

傳尸蠱瘵之證父子兄弟互相傳染甚者絕戶此乃祖父冤債或風水所係雖有符文法水下蟲之法然蟲去人亡亦未爲全美若能平素保養則自愈矣

李中梓醫宗必讀

虛勞證治

按內經之言虛勞惟是氣血兩端至巢氏病源始分五臟之勞七情之傷甚而分氣血筋骨肌精之六極又分腦髓玉房胞絡骨血筋脉肝心脾肺腎膀胱膽胃三焦大小腸肉膚皮氣之二十三蒸本事方更分傳屍鬼疰至於九十九種其鑿空附合重出複見固

無論矣使學者惑於多岐用方錯雜伊誰之咎乎蓋以內經爲式但於脾腎分主氣血約而該確而可守也夫人之虛不屬於氣卽屬於血五臟六腑莫能外焉而獨舉脾腎者水爲萬物之元土爲萬物之母二臟安和一身皆治百疾不生夫脾具土德脾安則土爲金母金實水源且土不凌水水安其位故脾安則腎愈安也腎兼水火腎安則水不挾肝上泛而凌土濕火能益土運行而化精微故腎安則脾愈安也孫思邈云補脾不如補腎許學士云補腎不如補脾兩先生深知二臟爲生人之根本又知二臟有相贊之功能故其說似背其旨實同也救腎者必本於陰血血主濡之血屬陰主下降虛則上升當斂而抑六味丸是也救脾者必本於陽氣氣主煦之氣爲陽主上升虛則下陷當升而舉補中益氣湯是也近世治勞專以四物湯加黃蘗知母不知四物皆陰行秋冬之氣非所以生萬物者也且血藥常滯非痰多食少者所宜血藥常潤久行必致滑腸黃蘗知母其性苦寒能瀉實火名曰滋陰其實燥而損血名曰降火其實

苦先入心久而增氣反能助火至其敗胃所不待言丹溪有言實火可瀉虛火可補勞證之火虛乎實乎瀉之可乎矯其偏者輒以桂附爲家常茶飯此惟火衰者宜之若血氣燥熱之人能無助火爲害哉大抵虛勞之證疑難不少如補脾保肺法當兼行然脾喜溫燥肺喜清潤保肺則礙脾補脾則礙肺惟燥熱而甚能食而不瀉者潤肺當急而補脾之藥亦不可缺也倘虛羸而甚食少瀉多雖喘嗽不寧但以補脾爲急而清潤之品宜戒矣脾有生肺之能肺無扶脾之力故補脾之藥尤要於保肺也嘗見勞證之死多死於泄瀉泄瀉之因多因於清潤司命者能不爲之兢兢耶又補腎理脾法當兼行然方欲以甘寒補腎其人減食又恐不利於脾方欲以辛溫快脾其人陰傷又恐愈耗其水兩者並衡而較重脾者以脾土上交於心下交於腎故也若腎大虛而勢困篤者又不可拘要知滋腎之中佐以砂仁沉香壯脾之中參以五味肉桂隨時活法可耳又如無陽則陰無以生無陰則陽無以化宜不可偏也然東垣曰甘溫能除大熱

又曰血脫補氣又曰獨陰不長春夏之溫可以發育秋冬之寒不能生長虛者必補以人參之甘溫陽生陰長之理也且虛勞證受補者可治不受補者不治故葛可久治勞神良素著所垂十方用參者七丹溪專主滋陰所述治勞方案用參者亦十之七不用參者非其新傷必其輕淺者耳自好古肺熱傷肺節齋服參必死之說印定後人眼目甘用苦寒直至上嘔下泄猶不悔悟良可悲已幸李瀕湖汪石山詳爲之辨而宿習難返貽禍未已不知肺經自有熱者肺脈按之而實與參誠不相宜若火來乘金者肺脈按之而虛金氣大傷非參不保前哲有言曰土旺而金生勿拘拘於保肺水壯而火熄毋汲汲於清心可謂洞達內經之旨深窺根本之治者也

虛勞熱毒積久則生惡蟲食人臟腑其證蒸熱欬嗽胷悶背痛兩目不明四肢無力腰膝痠疼臥而不寐或面色脫白或兩頰時紅常懷忿怒夢與鬼交同氣連枝多遭傳染甚而滅門大可畏也法當補虛以復其元殺蟲以絕其根能殺其蟲雖病者不生亦可絕

其傳疰耳凡近視此病者不宜饑餓虛者須服補藥宜佩安息香及麝香則蟲鬼不敢侵也

徐春甫古今醫統

論五勞六極七傷之由

五勞者心肝脾肺腎也勞於心者則神耗而血衰驚悸之疾亦因之而作矣勞於肝者則怒多而火盛淚外泄而目昏或脅肋刺痛筋憊不能久立遠行勞於肺者因過憂而耗氣則燥勝而液枯乾欬聲啞二便祕澀皆由此而作也勞於脾者勞倦傷脾發熱惡寒嘔吐不食四肢無力好臥倦言漸而致於腎憊陰虛則成怯證勞於腎者色慾過度淋濁遺精陰不上升陽不下降腎水既不升榮心肺皆無所麼欬嗽吐紅咯血之證作也今世之所謂勞者皆無出於此六極者風寒暑濕燥火靡不冒觸極甚而即病之重而不可救者有矣或有醫之愈而終爲淫氣所傷元氣有損莫之能完復也致爲終身之損者蓋多矣七傷者喜怒憂思悲恐驚七情過傷是也惟過於思者寖成勞瘵今之勞瘵而多起於脾腎之勞憂思之過者也

先哲所謂五勞六極七傷蓋因證而言也

久則生蟲

虛勞熱毒積久則生異物惡蟲食人臟腑精華變生諸般奇狀誠可驚駭勞傷肝膽者則爲毛蟲如刺蝟瓦蛆之狀食人筋膜勞傷心與小腸者則爲羽蟲如燈蛾蚊蝱禽鳥之形食人血脉勞傷脾胃者則爲倮蟲或如嬰兒蚯蚓之類食人肌肉勞傷肺與大腸者則爲介蟲如龜鼈蝦蟹之屬食人膚膏勞傷腎與膀胱者則爲鱗蟲如魚龍蛟鯉之形食人骨髓或挾相火之勢亦如羽蟲之酷鴟梟之類爲狀不一不可勝紀凡人有此證便宜早治緩則不及事矣治之之法一則補其虛以復其眞元一則殺其蟲以絕其根本能殺其蟲則雖不生亦可以絕後人之傳疰耳

蟲候有九

勞瘵九蟲者一曰伏蟲長四寸爲羣蟲之長二曰蚘蟲長一尺貫人心則殺人三曰寸白蟲長一寸子孫繁生長至四五尺亦能殺人四曰肉蟲狀若爛杏令人煩滿五曰肺蟲狀如蠶令人欬嗽六曰胃蟲狀如

蝦蟇令人嘔逆吐噦七曰弱蟲又名鬲蟲狀如瓜瓣令人多唾八曰赤蟲狀若生肉令人腸鳴九曰蟯蟲至微細形似菜蟲居回腸多則爲痔極則爲痢及生癰疽癬疥瘻癘齲齒無不爲也凡此諸蟲依人腸胃之間臟腑實則害人臟腑臟腑虛則蝕人臟腑血髓變成諸患至於不療人將氣絕則從九竅膚腠飛梭而出著於怯弱之人日久亦成勞瘵之證此所謂傳屍也凡人平素保養元氣愛惜精血瘵不可得而傳惟夫縱慾多淫苦不自覺精血內耗邪氣外乘是不特男子有傷女人亦不免矣然而氣虛血痿最不可入勞瘵之門弔喪問疾衣服器用中皆能乘虛而染觸間有婦人入患者之房患人見之思想則其勞氣隨入染患日久莫不化而爲蟲故凡親近之人不能廻避須要飲食適宜不可著餓體若虛者可服補藥身邊可帶安息香大能殺勞蟲內有麝香尤能辟惡醫者不可須臾無也

附上清紫庭追勞方論

傳屍勞瘵皆心受病氣血凝結故有成蟲者蓋由飲

食酒色憂思喪眞遂至於此凡蟲以血凝而氣養之氣血在胞卽爲正氣氣凝卽爲瘕塊凝在心部卽爲蟲悉由不正其心憂思業緣所致三尸九蟲之爲害治者不可不知其詳九蟲之內而六蟲傳於六代三蟲不傳者蝟蛔寸白也其六蟲或臟種毒而生或親屬習染而傳疾之初覺精神恍惚氣候不調切在戒忌酒色調節飲食如或不然五心煩熱寢汗忪悸如此十日頓成骨瘦面黃光潤此其證也妄信邪師祈禳求福庸醫用藥延蔓歲時方知病重苟非警戒禍福反掌此人死後兄弟子孫骨肉親屬綿綿相傳以至滅族大抵六蟲一旬之中遍行四穴週而復始病經遇木氣而生立春一日後方食起三日一食五日一退方其作苦百節皆痛蟲之食也退卽還穴醉睡一醉五日其病乍靜俟其退醉時乃可投符用藥不然蟲熟睡於符藥之後不能治也一蟲在身中占十二穴六蟲共占七十二穴一月之中上十日蟲頭向上從心至頭遊四穴中十日蟲頭向內從心至臍遊四穴下十日蟲頭向下從臍至足遊四穴蓋蟲性已

通靈切在精審其或取蟲不補卽學淺妄行徒費貲財終無去病之理可不悲哉師曰治傳尸勞者先須知正氣與毒氣並行故臟腑有凝卽成蟲狀遇陽日長雄陰日長雌其先食臟腑脂膏故其色白五臟六腑一經食損卽皮聚毛脫婦人卽月信不行血脉皆損不能榮五臟六腑也七十日後食人血肉盡故其蟲黃赤損於肌肉故變瘦劣飲食不能爲肌膚筋緩不能收持一百二十日外血肉食盡故其蟲紫卽食精髓傳於腎中食精故其蟲色黑食髓卽骨痿不能起於牀諸蟲久卽生毛毛色雜花鍾孕五臟五行之氣傳之三人卽自能飛其狀如禽亦多品類傳入腎經不可救治法之所載者利藥下蟲後其蟲色白可三十日服藥補其蟲黃赤可六十日服藥補其蟲紫黑此病已極可百二十日服藥補又云蟲頭赤者食患人肉可治頭口白者食患人髓其病難治只宜斷後故經曰六十日內治者十得七八八十日內治者十得三四過此以往未知生全但可爲子孫除害耳

今以六代所傳蟲狀病證詳著於後

第一代蟲狀病證遊食日治法

其蟲形如嬰兒長三寸背有毛或形如鬼狀動走臟腑或形如蝦蟆變動臟腑之中凡人受病之後頓覺憔悴令人夢寐顛倒魂魄飛揚精神離散飲食減少形容漸瘦四肢百節疼痛憎寒壯熱背膊拘急口苦舌乾面無顏色鼻流清涕虛汗常多其蟲遇丙丁日食起醉歸心俞穴中四穴輪轉周而復始候蟲大醉方可醫治取出蟲後用藥補心宜服守靈散

第二代蟲狀病證遊食日治法

其蟲形如亂髮長三寸許或形如蜈蚣或似守宮或形如蝦蟹俱在人臟腑之中凡勞瘵若患此蟲令人神色如醉夜夢不祥夢與亡人爲侶心胷飽悶四體不和骨節枯槁日漸瘦弱酢心嘔酸咽乾鼻塞背脊痠疼腰膝無力唾吐膿血頭目不利胷膈多痰盜汗發熱等證其蟲遇庚申日食起醉歸肺俞穴中候蟲大醉可方醫治取出蟲後補肺則瘥宜服虛成散

第三代蟲狀病證遊食日治法

其蟲形如蚊螘類或如螳螂或如碎血片或如刺蝟

或如毛蟲俱在人臟腑之中勞證若有此蟲令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦汁或吐清水黏涎腹脹腸鳴口鼻生瘡脣黑面青日漸消瘦精神恍惚口燥咽乾目多昏淚其蟲庚寅日食起醉歸厥陰穴中四穴俟蟲大醉方可治之取蟲之後補氣卽愈

第四代蟲狀病證遊食日治法

其蟲形如亂絲或如蠐螬蟲或如猪肝肺或如蝸蟬或如蚱虵往來五臟之中凡病此蟲令人臟腑虛鳴嘔逆腸中痃癖氣塊憎寒壯熱肚大筋青欬嗽氣促口苦舌乾要喫酸鹹之物其蟲遇戊己日食起醉歸脾俞穴中四穴俟蟲大醉方可治之取蟲後補脾卽愈宜服魂停散

第五代蟲狀病證遊食日治法

其蟲形如鼠無毛或有頭無足或有足無頭或如精血片凡患此蟲入肝經而歸腎得血而更變也令人多怒氣逆四肢解散飲食減少或面紅潤如平人或時通靈而言未來事或著牀枕不起有似中風肢體頑痲腹內多痛其蟲遇壬癸日食起醉歸肝俞穴中

四穴俟蟲大醉方可治之取蟲後補肝即愈宜服金明散

第六代蟲狀病證遊食日治法

其蟲有翅足全者千里傳疰所謂飛屍形如馬尾或有兩條一雌一雄或如龜鼈在人五臟之中或如爛麪或如飛禽或長或短凡患此蟲令人思食百物身體尫羸腰膝無力眼暗耳鳴喘嗽不定心腹悶亂其蟲遇丑亥日食起醉歸腎俞穴四穴俟蟲大醉方可治之取蟲出補腎填髓愈宜服育嬰散

蘇遊論

論曰大抵傳尸之候在心胷脅滿悶臂膊煩疼兩目不明四肢無力雖欲寢臥睡常不寐脊膂急痛腰膝酸疼多臥少起狀如佯病每至旦精神尚存有如無病日午之後四體微熱面無顏色喜見人過常懷忿怒終不稱意卽多嗔恚行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚怖有時氣息有時欬嗽雖思飲食不能多餐死在須臾精神尚存或時微利兩脅虛脹口燥鼻乾常多粘唾有時欲睡漸覺沉羸猶如

涸魚不覺死也

又曰傳尸之候本起無端莫問老少男女皆有此疾大抵五行相尅而生先內傳毒氣周遍五臟漸熱羸瘦以至於死死訖又傳家親一人故曰傳尸亦名傳疰以其初傳半臥半起號曰殗殜氣息欬者名曰肺痿疾骨髓疼身中熱稱爲骨蒸內傳五臟名曰伏連不解療者乃至滅門假如男女虛損得之名曰勞極吳楚乃名淋瀝巴蜀亦名勞極其源先從腎起初受之氣兩脛酸疼腰背拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼直似風聲夜臥遺泄陰汗痿弱腎既受訖次傳於心心初受氣夜臥心驚或多恐悸心懸乏氣吸吸欲盡夢見先亡有時盜汗飲食無味口內生瘡心氣煩熱惟欲眠臥朝輕夕重兩頰口脣悉皆紅赤如傳臙脂或時手足五心煩熱心受已訖次傳於肺肺初受氣欬嗽氣力微痛有時氣喘臥則更甚鼻口乾燥不聞香臭如或忽聞惟覺朽腐惡氣有時惡心憒憒欲吐肌膚枯燥時或疼痛或似蟲行乾皮細起狀若麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目䀮䀮面無

血色常欲顰眉眼視不遠目常乾澀又時赤痛或復睛黃朝昏暮憒常欲合眼及時睡臥常睡不著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩脅虛脹食不消化又時瀉痢水穀生蟲有時肚痛腹脹雷鳴脣口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或時上氣撐肩喘息痢赤黑汁見此證者則不治也

夫骨蒸殗殜復連屍疰蟲疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰等皆曰傳尸者以疰者注也病自上疰也與人相似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聳或腹內有塊或腦後兩邊有小結復連數箇或聚或散沉沉默默欬嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或腹下痢羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死復傳疰易傳親人乃至滅門者是也更有蜚蟲遁尸寒尸喪尸尸疰等謂之五尸及大小附著等證不的知其所苦無處不惡乃挾諸鬼邪而害人其證多端傳變推遷難以推測故自古及今愈此病者十不一得所謂狸骨獺肝天靈蓋銅鏡鼻徒有其說未嘗

取效惟膏肓俞崔氏穴法若早灸之可否幾半晚亦不濟也

趙獻可醫貫

陰虛發熱論

世間發熱類傷寒者數種治各不同傷寒傷風及寒疫也則用仲景法溫病及瘟疫也則用河間法此皆論外感者也今人一見發熱皆認作傷寒率用汗藥以發其表汗後不解又用表藥以凉其肌柴胡凉膈白虎雙解等湯雜然並進若是虛證豈不殆哉自東垣出而發內傷補中益氣之論此用氣藥以補氣之不足者也至於勞心好色內傷眞陰眞陰旣傷則陽無所附故亦發熱其人必面赤煩躁口渴引飲骨痛脈數而大或尺數而無力者是也惟丹溪發明補陰之說以四物湯加黃蘗知母此用血藥以補血之不足者也世俗相因屢用不效何耶蓋因陰字認不眞誤以血爲陰耳當作腎中之眞陰卽先天也內經曰諸寒之而熱者取之陰諸熱之而寒者取之陽所謂求其屬也王太僕先生註云大寒而盛熱之不熱是

無火也大熱而盛寒之不寒是無水也又云倏忽往來時發時止是無火也晝見夜伏夜見晝止時節而動是無水也當求其屬而主之無火者宜益火之源以消陰翳無水者宜壯水之主以鎮陽光必須六味八味二丸出入增減以補眞陰屢用屢效若泥黃蘗知母苦寒之說必致損傷脾陰而斃者不可勝舉大抵病熱作渴飲冷便祕此屬實熱人皆知之或惡寒發熱引衣踡臥四肢逆冷大便清利此屬眞寒人亦易知至於煩擾狂越不欲近衣欲坐臥泥水中此屬假熱之證其甚者煩極發躁渴飲不絕舌如芒刺兩腎燥裂血如塗朱身如焚燎足心如烙吐痰如湧喘急大便祕結小便淋瀝三部脈洪大而無倫當是時也却似承氣證承氣入口卽斃却似白虎證白虎下咽卽亡若用二丸緩不濟事急以加減八味丸料一斤內肉桂一兩以水頓煎五六椀冰冷與飲諸證自退翊日必畏寒脈脫是無火也當補其陽急以附子八味丸料煎服自愈此證與脈俱變其常而不以常法治之者也若有產後及大失血後陰血暴傷必大

發熱亦名陰虛發熱此陰字正謂氣血之陰若以凉藥正治立斃正所謂象白虎湯證悞服白虎湯必死當此之時偏不用四物湯蓋有形之血不能速化幾希之氣所宜急固須用獨參湯或當歸補血湯使無形生出有形來此陽生陰長之妙用不可不知也或問曰子之論則詳矣氣虛血虛均是內傷何以辨之予曰悉乎子之問也蓋陰虛者面必赤無根之火戴於上也若是陽證火入於內面必不赤其口渴者腎水乾枯引水自救也但口雖渴而舌必滑脉雖數而尺必無力甚者尺雖洪數而按之必不鼓此爲辨耳雖然若問其人曾服過凉藥脉亦有力而鼓指矣戴復菴云服凉藥而脉反加數者火鬱也宜升宜補切忌寒凉犯之必死臨證之工更宜詳辨毫釐之差枉人性命慎哉慎哉

醫門法律

臣喻昌著

總論

虛勞之證金匱敘於血痺之下可見勞則必勞其精血也營血傷則內熱起五心常熱目中生花見火耳

內蛙聒蟬鳴口舌糜爛不知正味鼻孔乾燥呼吸不利乃至飲食不爲肌膚怠惰嗜臥骨軟足酸營行日遲衛行日疾營血爲衛氣所迫不能內守而脫出於外或吐或衄或出二陰之竅血出既多火熱迸入逼迫煎熬漫無休止營血有立盡而已不死何待耶更有勞之之極而血痹不行者血不脫於外而但畜於內畜之日久周身血走之隧道悉痹不流惟就乾涸皮鮮滑澤面無榮潤於是氣之所過血不爲動徒蒸血爲熱或日晡或子午始必乾熱俟蒸氣散微汗而熱解熱蒸不已瘵病成焉不死又何待耶亦有始因脫血後遂血痹者血虛血少艱於流布發熱致痹尤易易也內經凡言虛病不及於勞然於大肉枯槁大骨陷下胷中氣高五臟各見危證則固已言之未有勞之之極而眞臟脈不見者也然枯槁已極即眞臟脈不見亦寧有不死者乎秦越人始發虛損之論謂虛而感寒則損其陽陽虛則陰盛損則自上而下一損損於肺皮聚而毛落二損損於心血脈不能榮養臟腑三損損於胃飲食不爲肌膚虛而感熱則損其

陰陰虛則陽盛損則自下而上一損損於腎骨痿不起於牀二損損於肝筋緩不能自收持三損損於脾飲食不能消化自上而下者過於胃則不可治自下而上者過於脾則不可治葢飲食多自能生血飲食少則血不生血不生則陰不足以配陽勢必五臟齊損越人歸重脾胃旨哉言矣至仲景金匱之文昌細會其大意謂精生於穀穀入少而不生其血血自不能化精內經於精不足者必補之以味味者五穀之味也補以味而節其勞則積貯漸富大命不傾設以鷄口之入爲牛後之出欲其不成虛勢寧可得乎所以垂訓十則皆以無病男子精血兩虛爲言而虛勞之候煥若指掌矣夫男子平人但知縱慾勞精抑孰知陰精日損飲食無味轉勞轉虛轉虛轉勞脉從內變色不外華津液衰而口渴小便少甚則目瞑衄血陰精不交自走盜汗淋漓身體振搖心膽驚怯者比比然也故血不化精則血痹矣血痹則新血不生并素有之血亦瘀積不行血瘀則營虛營虛則發熱熱久則蒸其所瘀之血化而爲蟲遂成傳尸瘵證窮凶

極厲竭人之神氣養蟲之神氣人死則蟲亦死其遊魂之不死者傳親近之一脈附入血隧似有如無其後蟲曰榮長人日凋悴閱三傳而蟲之爲靈非符藥所能制矣醫和視晉平公疾曰是近女室晦而生內熱惑蠱之疾非鬼非食不可爲也惑即下脣有瘡蟲食其肛其名爲惑之惑蠱字取義三蟲共載一器非鬼非食明指蟲之爲厲不爲尊者諱也以故狐惑之證聲啞嗄勞瘵之證亦聲啞嗄是則聲啞者氣管爲蟲所蝕明矣男子前車之覆古今不知幾千億人矣

巢氏病源不察謂有虛勞有蒸病有注病勞有五勞六極七傷蒸有五蒸二十四蒸注有三十六種九十九種另各分門異治後人以岐路之多茫然莫知所適且諱其名曰痰火而夢夢者遂謂痰火有虛有實乃至充棟諸方妄云肺虛用某藥肺實用某藥以及心肝脾腎咸出虛實兩治之法是於虛損虛勞中添出實損實勞矣鄙陋何至是耶仲景於男子平人諄諄致戒無非謂榮衛之道納穀爲寶居常調榮衛以安其穀壽命之本積精自剛居常節嗜慾以生其精

至病之甫成脉纔見端惟恃建中復脉爲主治夫建中復脉皆稼穡作甘之善藥一遵精不足者補之以味之旨也豈有泉之竭矣不云自中之理哉後人補腎諸方千蹊萬徑以治虛勞何反十無一全豈非依樣壺盧徒資話柄耶及其血痹不行仲景亟驅其舊生其新幾希於勞瘵將成未成之間誠有一無二之聖法但牵常者不能用耳試觀童子臟腑脆嫩纔有寒熱積滯易於結癖成疳待其血痹不行氣蒸發熱卽不可爲女子血乾經閉發熱不止勞瘵之候更多待其勢成縱有良法治之無及倘能服膺仲景幾先之哲喫力於男子童子女子瘵病將成未成之界其活人之功皆是起白骨而予以生全爲彼蒼所眷注矣

論脉

虛勞之脉皆不足之候爲精氣內奪與邪氣外入之實脉常相反也黃帝問何謂重虛岐伯對以脉氣上虛尺虛是謂重虛謂其上下皆虛也氣虛者言無常也謂其脉之無常也尺虛者行步恇然謂其步履之

不正也脈虛者不象陰也謂其脈全不似手太陰脈之充盛也皆易明也獨脈之無常從來謂是上焦陽氣虛故其脈無常果爾則下焦陰氣虛脈更無常矣觀下文云如此者滑則生濇則死濇脈且主死而寸脈之無常寧復有人理哉故氣虛者言無常也此一語明謂上氣之虛由胷中宗氣之虛故其動之應手者無常耳乃知無常之脈指左乳下之動脈爲言有常則宗氣不虛無常則宗氣大虛而上焦之氣始厭厭不足也後之論脈者失此一段精微但宗越人所述損脈而引伸觸類曰脈來耎者爲虛緩者爲虛滯爲虛芤爲中虛弦爲中虛脈來細而微者血氣俱虛脈小者血氣俱少脈沉小遲者脫氣虛損之脈似可一言而畢實未足以盡其底裏賴仲景更其名爲虛勞虛勞之脈多兼浮大當於前人論脈合參浮大與否所以謂男子平人脈大爲勞極虛亦爲勞又謂脈浮者裏虛又謂勞之爲病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘥男子脈浮弱而濇爲無子脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交脈極虛芤遲爲淸穀亡血失精

脉虛弱細微者善盜汗而總結其義曰脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精可見浮大弦緊外象有餘其實中藏不足不顧泥遲緩微弱一端以驗脉而脉之情狀莫能逃於指下卽病之疑似莫不炫於胷中仲景之承前啓後豈苟焉而已哉昌不揣愚陋已著大氣論於卷首發明胷中大氣宗氣所關之重因辨岐伯所指脉氣上虛爲宗氣之虛以見重虛之脉乳下宗氣在所當診固堂下指陳未必堂上首肯然不可謂門外漢也

雜論

鍼經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之重不足重不足則陰陽俱竭氣血皆虛五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣按形者形骸也氣者口鼻呼吸之氣也形骸消滅視壯盛者迴殊氣息喘促或短而不足以息視勞役形體氣不急促者迴殊病氣不足懶語困弱是正氣內虧視外邪瘖助精神反增者迴殊此不可刺宜補之以甘藥甘

藥正稼穡作甘培補中央以灌輸臟腑百脉之良藥此法惟仲景遵之其次則東垣丹溪亦宗之但東垣引以證內傷而不及外感丹溪引以證陰虛而不及陽損此聖域賢關之分量也

秦越人發明虛損一證優入聖域雖無方可考然其論治損之法損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精卽此便是正法眼藏使八十一難俱倣此言治何患後人無具耶

原氣虛與虛損不同原氣虛可復虛損難復也至虛損病亦有易復難復兩候因病致虛者緩調自復因虛致損者虛上加虛卒難復也故因病致虛東垣丹溪法在所必用若虛上加虛而至於損原氣索然丹溪每用人參膏至十餘斤多有得生者其見似出東垣之右然則丹溪補陰之論不過救世人偏於補陽之弊耳豈遇陽虛之病而不捷於轉環耶

飲食勞倦爲內傷元氣眞陽下陷內生虛熱東垣發補中益氣之論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣

而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也若勞心好色內傷眞陰陰血既傷則陽氣偏盛而變爲火矣是謂陰虛火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物加知母黃蘗補其陰而火自降此用血藥以補血之不足也益氣補陰一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同亦醫學之兩大法門不可不究悉之也

丹溪論勞瘵主乎陰虛者蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前寤屬陽寐屬陰陰虛則汗從寐時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則氣不降氣不降則痰涎上逆而連緜不絕也脉浮屬陽沉屬陰陰虛則浮之洪大沉之空虛也此皆陰虛之證用四物湯加黃蘗知母主之然用之多不效何哉蓋陰既虛矣火必上炎而當歸川芎皆氣辛味大溫非滋陰降火之藥又川芎上竄尤非虛炎短乏者所宜地黃泥膈非胃熱食少痰多者所宜黃蘗知母苦辛大寒雖曰滋陰其實燥而損血雖曰降火其實苦先入

心久而增氣反能助火至其敗胃所不待言不若用薏苡仁百合天冬麥冬桑白皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地黃汁藕汁人乳汁童便等如欬嗽則多用桑白皮枇杷葉有痰則增貝母有血則多用薏苡仁百合增阿膠熱盛則多用地骨皮食少則用薏苡仁至七八錢而麥冬常爲之主以保肺金而滋生化之源往往應手而效蓋諸藥皆稟燥降收之氣氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒凉是也以施於陰虛火動之證猶當溽暑伊鬱之時而商飈一動炎歊如失矣與治暑熱用白虎湯同意然彼是外感外感爲有餘故用寒沉藏之藥而後能補其偏此是內傷內傷爲不足但用燥降收之劑而已得其平矣此用藥之權輿也

虛勞之疾百脉空虛非粘膩之物塡之不能實也精血枯涸非滋濕之物濡之不能潤也宜用人參黃芪地黃二冬枸杞五味之屬各煎膏另用青蒿以童便熬膏及生地汁白蓮藕汁乳汁薄荷汁隔湯煉過酌定多少幷麋角膠霞天膏合和成劑每用一匙湯化

服之如欲行瘀血加入酢製大黃末元明粉桃仁泥韭汁之屬欲止血加入京墨之屬欲行痰加入竹瀝之屬欲降火加入童便之屬

凡虛勞之證大抵心下引脅俱疼蓋滯血不消新血無以養之尤宜用膏子加韭汁桃仁泥

呼吸少氣懶言語無力動作目無精光面色㿠白皆兼氣虛用麥冬人參各二錢陳皮桔梗炙甘草各半兩五味子二十一粒爲極細末水浸蒸餅爲丸如雞頭子大每服一丸細嚼津唾嚥下名補氣丸

氣虛則生脈散不言白术血虛則三才丸不言四物前言薏苡仁之屬治肺虛後言參芪地黃膏子之類治腎虛蓋肝心屬陽肺腎屬陰陰虛則肺腎虛矣故補肺腎即是補陰非四物黃蘗知母之謂也

勞瘵兼痰積其證腹脅常熱頭面手足則於寅卯時分乍有凉時宜以霞天膏入竹瀝加少薑汁調元明粉行之若頑痰在膈上膠固難治者必以吐法吐之或沉香滾痰丸透膈丹之類下之甚則用倒倉法若肝有積痰瘀血結熱而勞瘵者其太衝脈必與衝陽

脉不相應宜以補陰藥吞當歸龍薈丸

古方柴胡飲子防風當歸飲子麥煎散皆用大黃蓋能折炎上之勢而引之下行莫速乎此然惟大便實者乃可若溏泄則雖地黃之屬亦不宜况大黃乎

病勞有一種眞臟虛損復受邪熱者如經驗方中治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳熱去即須急已若無邪熱不死何待又大忌苓連蘖驟用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加瀉陰火之藥是也

有重陰覆其陽火不得伸或洒洒惡寒或志意不樂或脉弦數四肢五心煩熱者火鬱湯柴胡升麻湯病去即已不可過劑

服寒凉藥證雖大減脉反加數者陽鬱也宜升宜補大忌寒凉犯之必死

治法當以脾腎二臟爲要腎乃繫元氣者也脾乃養形體者也經曰形不足者溫之以氣氣謂眞氣有少火之溫以生育形體然此火不可使之熱熱則壯壯則反耗眞氣也候其火之少壯皆在兩腎間經又曰

精不足者補之以味五味入胃各從所喜之臟而歸之以生津液輸納於腎者若五味一有過節反成其臟有餘勝尅之禍起矣候其五味之寒熱初在脾胃次在其所歸之臟卽當補其不足瀉其有餘謹守精氣調其陰陽夫是故天樞開發而胃和脉生矣

勞疾久而嗽血咽疼無聲此爲下傳上若不嗽不疼久而溺濁脫精此爲上傳下皆死證也

夫傳尸勞者男子自腎傳心心而肺肺而肝肝而脾女子自心傳肺肺而肝肝而脾脾而腎五臟復傳六腑而死矣雖有諸候其實不離乎心陽腎陰也若明陰陽用藥可以起死回生

蘇遊論曰傳尸之候先從腎起初受之兩脛痠疼腰背拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼直似風聲夜臥遺泄陰汗痿弱腎旣受訖次傳於心心初受氣夜臥心驚或多恐怖心懸懸氣吸吸欲盡夢見先亡有時盜汗飲食無味口內生瘡心氣煩熱惟欲眠臥朝輕夕重兩頰口脣悉皆紋赤如傅臙脂有時手足五心煩熱心既受已次傳於肺肺初受氣欬嗽上氣喘

臥益甚鼻口乾燥不聞香臭如或忽聞惟覺朽腐氣有時惡心欲吐肌膚枯燥時或疼痛或似蟲行乾皮細起狀如麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目䀮䀮面無血色常欲顰眉視不能遠目常乾澀又時赤痛或復睛黃常欲合眼及時睡臥不著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩脅虛脹食不消化又時瀉利水穀生蟲有時肚痛腹脹雷鳴脣口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或時上氣撐肩喘息利赤黑汁見此證者乃不治也

論方

按天雄散一方用桂枝湯調其榮衛羈遲脈道虛衰加龍骨牡蠣濇止其清穀亡血失精一方而兩扼其要誠足寶也小品又云虛羸浮熱汗出者除桂加白薇附子各三分故曰二加龍骨湯得此一加減法後之用是方者更思過半矣可見桂枝雖調榮衛所首重倘其人虛陽浮越於外即當加附子白薇以回陽而助其收濇桂枝又在所不取也後一方以上中二焦之陽虛須用天雄以補其上白朮以固其中用桂

枝領藥行榮衛上焦並建回陽之功方下雖未述證其治法指掌易見然則去桂枝加白薇附子得非倣此以治中下二焦之陽虛欲脫耶精矣

按虛勞病而至於亡血失精消耗精液枯槁四出難爲力矣內經於鍼藥所莫治者調以甘藥金匱遵之而用小建中湯黃芪建中湯急建其中氣俾飲食增而津液旺以至充血生精而復其眞陰之不足但取稼穡作甘之本味而酸辛鹹苦在所不用蓋舍此別無良法也然用法者貴立於無過之地寧但嘔苦不可用建中之甘即服甘藥微覺氣阻氣滯更當慮甘藥太過令人中滿蚤用橘皮砂仁以行之可也不然甘藥又不可恃更將何所恃哉後人多用樂令建中湯十四味建中湯雖無過甘之弊然樂令方中前胡細辛爲君意在退熱而陰虛之熱則不可退十四味方中用附桂蓯蓉意在復陽而陰虛之陽未必可復又在用方者之善爲裁酌矣

金匱之用八味腎氣丸屢發於前矣消渴之關門大開水病之關門不開用此方蒸動腎氣則關門有開

有閫如晨門者與陽俱開與陰俱闔環城內外賴以安堵也其治腳氣上入少腹不仁則藉以培眞陰眞陽根本之地而令濁陰潛消不得上干清陽耳今虛勞病桂附本在所不用而腰痛少腹拘急小便不利三證皆由腎中眞陽內微所致其病較陰虛發熱諸證迥乎不同又不可不求其有而反責其無矣

按虛勞不足之病最易生風生氣倘風氣不除外證日見有餘中臟日見虛耗神頭鬼臉不可方物有速斃而已故用薯蕷丸方除去其風氣兼培補其空虛也

按素問云陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥已詳論卷首問答條矣可見虛勞虛煩爲心腎不交之病腎水不上交心火心火無制故煩而不得眠不獨夏月爲然矣方用酸棗仁湯以棗仁爲君而兼知母之滋腎爲佐茯苓甘草調和其間芎藭入血分而解心火之躁煩也

按七傷金匱明謂食傷憂傷飲食傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷及房勞傷但居其一後人不知何

見謂七傷者陰寒陰痿裏急精速精少陰下濕精滑小便苦數臨事不舉似乎顓主腎傷爲言豈有五勞分主五臟而七傷獨主一臟之理雖人生恣逞傷腎者恆多要不可爲一定之名也所以虛勞證凡本之內傷者有此七者之分故虛勞發熱未有不由瘀血者而瘀血若無內傷則榮衞運行不失其次瘀從何起是必飲食起居過時失節榮衞凝泣先成內傷然後隨其氣所阻塞之處血爲瘀積瘀積之久牢不可拔新生之血不得周灌與日俱積其人尚有生理乎仲景施活人手眼以大黃䗪蟲丸之潤劑潤其血之乾以蠕動啖血之物行死血名之曰緩中補虛豈非以行血去瘀爲安中補虛上著耶然此特世俗所稱乾血勞之良治也血結在內手足脈相失者宜之兼入瓊玉膏潤補之藥同用尤妙昌細參其證肌膚甲錯面目黯黑及羸瘦不能飲食全是營血瘀積胃中而發見於肌膚面目所以五臟失中土之灌溉而虛極也此與五神臟之本病不同故可用其方而導去其胃中之血以內穀而流通榮衞耳許州陳大夫傳

仲景百勞丸方云治一切勞瘵積滯不經藥壞證者宜服與世俗所稱乾血勞亦何以異大夫其長於謀國歟方用當歸乳香沒藥各一錢人參二錢大黃四錢蝱蟲水蛭桃仁各十四箇浸去皮尖右爲細末煉蜜爲丸桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物爲度服白粥十日百勞水卽仲景甘爛水以杓揚百遍者也

按復脈湯仲景治傷寒脈代結心動悸邪少虛多之聖方也金匱不載以千金翼常用此方治虛勞則實可徵信是以得名爲千金之方也虛勞之體多有表熱夾其陰虛所以其證汗出而悶表之固非卽治其陰虛亦非惟用此方得汗而脈出熱解俾其人快然眞聖法也但虛勞之人胃中津液素虛匪傷寒暴病邪少虛多之比桂枝生薑分兩之多服之津液每隨熱勢外越津液既外越難以復收多有淋漓沾濡一晝夜者透此一關亟以本方去桂枝生薑二味三倍加入人參隨繼其後庶幾津液復生乃致榮衞盛而諸虛盡復豈小補哉

按許叔微本事方云葛稚川言鬼疰者是五尸之一疰諸鬼邪爲害其變動不一大約使人淋漓沉沉默默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死傳於旁人乃至滅門覺知是證者急治獺肝一具陰乾取末水服方寸匕日三服效未知再服此方神良再按長桑君所授越人禁方各傳其徒一人者至華元化斃獄其傳遂泯仲景醫中之聖諸禁方詎不盡窺底蘊然而有其理無其事者不足尚也有其事無其理者不足尚也即有其理有其事矣而用意罕幾先之哲亦不足尚也如獺肝散非不可以殺蟲而未可以行血逐瘀所以製緩中補虛大黃䗪蟲丸一方自出手眼而授陳大夫百勞丸一方加入人參只作一服以取頓快蓋於此時而用力可圖十全其五也迨至束手無策而取用獺肝以去其蟲蟲去其人可獨存乎然蟲亦不可不去也金匱之附肘後一方豈無意哉

按東垣所謂飲食勞倦內傷元氣則胃脘之陽不能升舉并心肺之氣陷入於中焦而用補中益氣治之

方中佐以柴胡升麻二味一從左旋一從右旋旋轉於胃之左右升舉其上焦所陷之氣非自腹中而升舉之也其清氣下入腹中久爲飱泄并可多用升柴從腹中而升舉之矣若陽氣未必陷下反升舉其陰氣干犯陽位爲變豈小哉更有陰氣素慣上干清陽而胷中之肉隆聳爲䐜胷間之氣漫散爲脹者而悞施此法天翻地覆九道皆塞有瀕於死而坐困耳後人相傳謂此方能升清降濁有識者亦咸信之醫事尚可言哉夫補其中氣以聽中氣之自爲升降不用升柴可也用之亦可也若以升清之藥責其降濁之能豈不痴乎

按虛勞之證陰虛者十常八九陽虛者十之一二而已丹谿著陽有餘陰不足之論而定大補陰丸四物加黃蘗知母湯二方與東垣補中益氣之法旗鼓相當氣下陷而不能升則用東垣火上升而不能降則用丹谿二老入理深譚各造其極無容議也前論補中益氣能升清陽設誤用之反升濁陰故致其叮嚀矣而丹谿之法用之多不效者可不深維其故哉昌

謂立法者無過而用法者不得法中之奧過端四出蓋於陽常有餘陰常不足二語未常細心推辨耳夫陽之有餘得十之七陰之不足得十之三此所謂眞有餘眞不足也陽眞有餘一切補陰之藥直受之而無恐多用之亦無害是則補陰在所必需矣若陰之不足者十存其三而陽之有餘者十存四五亦名有餘而實則非眞有餘也究亦同歸不足而已補陰寒凉之藥尚敢恣用乎不知此義而恣用之豈但不效其後轉成陰盛陽虛淸穀盜汗等患究竟陰基已壞於前即欲更補其氣其如味之不能載何故再致叮嚀俾用昔人法如持衡在手較量於輕重之間可矣

虛勞之屬陽虛者十中豈無一二嚴氏芪附湯參附湯二方似不可少其方從金匱朮附湯生出投之得當通於神明其虛勞失血宜之者尤多以其善治龍雷之陰火耳但以參芪爲君附子爲佐雖每服一兩不嫌其多方中止用芪附各半人參五錢附子一兩分三服能無倒乎

附陳藏器用藥凡例

虛勞頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸川芎乾薑虛而損加鍾乳棘刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天冬虛而多忘加茯苓遠志虛而口乾加麥冬知母虛而吸吸加胡麻覆葢子柏子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若客熱則用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而身强腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮黃芪虛而冷加黃芪虛而痠復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨鷄肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴髓竭不足加地黃當歸肺氣不足加二冬五味子心氣不足加人參茯苓菖蒲肝氣不足加天麻川芎脾氣不足加白朮白芍益智腎氣不足加熟地遠志丹皮膽氣不足加細辛酸棗仁地楡神昏不足加硃砂預知子茯神

二八二九

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十五卷目錄

醫部彙考三百五

虛勞門三

張介賓景岳全書（論虛損病源　論脈　辨爪　論治　辨似損非損　辨虛
損危候　論難經損證）

方一（桂枝加龍骨牡蠣湯　天雄散　薯蕷丸　酸棗湯　大黃䗪蟲丸　千金翼炙甘
草湯　肘後獺肝散　天靈明月丹　地黃煎
丸　補肝湯　千里流水湯　梔子湯　巴戟
天酒　五加酒　天門冬大煎　塡骨萬金煎
又方　小鹿骨煎　地黃小煎　陸抗膏）

又方　補虛方　乾地黃圓　茯苓補心湯
牛髓圓　大補心湯　溫脾圓　麻豆散　又
方　補肺湯　又方　又方　又方　建中湯
又方　大建中湯　小建中湯　前胡建中
湯　黃芪建中湯　黃芪湯　樂令黃芪湯
腎瀝湯　增損腎瀝湯　五補湯　人參湯
內補散　腎瀝散　鍾乳散　石葦圓　五補
圓　無比薯蕷圓　大薯蕷圓　腎氣圓　八
味腎氣圓　黃芪圓　神化圓　三仁九子圓
塡骨圓　通明圓　補虛益精大通圓　乾
地黃圓　崔平世方　石英煎

藝術典第三百二十五卷

醫部彙考三百五

虛勞門三

景岳全書　臣張介賓著

論虛損病源

凡勞傷虛損五臟各有所主而惟心臟最多且心爲君主之官一身生氣所係最不可傷而人多忽之而不知何也夫五臟之神皆稟於心故憂生於心肺必應之憂之不已而戚戚幽幽則陽氣日索營衛日消

勞傷及肺弗亡弗已如經曰嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所并暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮故貴脫勢雖不中邪精神內傷身必敗亡之類無非慮竭將來追窮已往而二陽並傷但其潛消暗爍於冥冥之中人所不覺而不知五臟之傷惟心爲本凡値此者速宜舒情知命力挽先天要知人生在世喜一日則得一日憂一日則失一日但使靈明常醒尚何塵魔敢犯哉及其既病而用參芪歸朮益氣湯之類亦不過後天之末著耳知者當知所先也

喜因欲遂而發若乎無傷而經曰喜傷心又曰暴喜傷陽又曰喜樂者神憚散而不藏又曰肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏蓋心藏神肺藏氣二陽臟也故暴喜過甚則傷陽而神氣因以耗散或縱喜無節則淫蕩流亡以致精神疲竭不可救藥或偶爾得志則氣盈載滿每多驕恣傲慢自取敗亡而莫知其然者多矣然則喜爲人所忽而猶有不可忽者如此

思本乎心經曰心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭死於冬此傷心則然也然思生於心脾必應之故思之不已則勞傷在脾經曰思傷脾又曰思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣凡此爲病脾氣結則爲噎膈爲嘔吐而飲食不能運食不運則血氣日消肌肉日削精神日減四肢不爲用而生脹滿泄瀉等證此傷心脾之陽也夫人孰無思而苦思難釋則勞傷至此此養生者所當戒也然思本傷脾而憂亦傷脾經曰脾愁憂而不解則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛悴色夭死於春蓋人之憂思本多兼用而心脾肺所以並傷故致傷上焦陽氣而二陽之病發自心脾以漸成虛勞之證者斷由乎此

淫慾邪思又與憂思不同而損惟在腎蓋心躭慾念腎必應之凡君火動於上則相火應於下夫相火者水中之火也靜而守位則爲陽氣熾而無制則爲龍雷而涸澤燎原無所不至故其在腎則爲遺淋帶濁而水液漸以乾枯炎上入肝則逼血妄行而爲吐爲

衄或爲營虛筋骨疼痛又上入脾則脾陰受傷或爲發熱而飲食悉化痰涎再上至肺則皮毛無以扃固而亡陽喘嗽甚至喑啞聲嘶是皆無根虛火陽不守舍而光燄詣天自下而上由腎而肺本源漸槁上實下虛是誠剝極之象也凡師尼室女失偶之輩雖非房室之勞而私情繫戀思想無窮或對面千里所願不得則慾火搖心眞陰日削遂致虛損不救凡五勞之中莫此爲甚苟知重命愼毋蹈之

七情傷腎恐亦居多蓋恐畏在心腎則受之故經曰恐傷腎又曰恐則精却又曰恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下余嘗診一在官少年因恐而致病病稍愈而陽痿及其病復終不可療又嘗見猝恐者必陰縮或遺尿是皆傷腎之徵也然恐固傷腎而怒亦傷腎經曰腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰背不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏是知盛怒不惟傷肝而腎亦受其害也

怒生於心肝必應之怒不知節則勞傷在肝經曰怒傷肝又曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣蓋

肝爲陰中之陽臟故肝之爲病有在陰者有在陽者如火因怒動而逼血妄行以致氣逆於上而脹痛喘急者此傷其陰者也又或氣以怒傷而木鬱無伸以致侵脾氣陷而爲嘔脹泄痛食飲不行者此傷其陽者也然隨怒隨消者未必致病臟氣堅固者未必致病惟先天稟弱而三陰易損者使不知節則東方之實多致西方之敗也然怒本傷肝而悲哀亦最傷肝經曰肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當人陰縮而筋攣兩脅骨不舉毛悴色夭死於秋蓋怒盛傷肝肝氣實也悲哀傷肝肝氣虛也但實不終實而虛則終虛耳虛而不顧則必至勞損而治當察其邪正也

驚氣本以入心而實通於肝膽經曰驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣又曰東方色青入通於肝其病發驚駭此所以驚能動心而尤能傷及肝膽心爲君主固不可傷而膽以中正之官實少陽生氣所居故十一臟陽剛之氣皆取決於膽若或損之則諸臟生氣因皆消索致敗其危立見嘗見微驚致

病者惟養心安神神復則病自却若驚畏日積或一時大驚損膽或致膽汁泄而通身發黃默默無言者皆不可救論詳疸門

色慾過度者多成勞損蓋人自有生以後惟賴後天精氣以爲立命之本故精强神亦强神强必有壽精虛氣亦虛氣虛必多夭其有先天所禀原不甚厚者但知自珍而培以後天則無不獲壽設禀賦本薄而且恣情縱慾再伐後天則必成虛損此而傷生咎將誰委又有年尚未冠壬水方生保養萌芽正在此日而無知孺子遽搖女精余見苞萼未成而蜉蝣旦暮者多矣良可悲也此其責不在孺子而在父師使不先有明誨俾知保生之道則彼以童心豈識利害而徒臨期懇禱號呼悲戚將何濟於事哉

勞倦不顧者多成勞損夫勞之於人孰能免之如奔走食力之夫終日營營而未聞其病者何也貧賤之勞作息有度無關榮辱習以爲常何病之有惟安閑柔脆之輩而苦竭心力斯爲害矣故或勞於名利而不知寒暑之傷形或勞於色慾而不知旦暮之疲困

或勞於遊蕩而忍饑竭力於呼盧馳驟之場或勞於疾病而剝削傷殘於無術庸醫之手或爲詩書困厄每緣螢雪成災或以好勇逞强遂致絕筋乏力總之不知自量而務使勉强一應妄作妄爲皆能致損凡勞倦之傷雖曰在脾而若此諸勞不同則凡傷筋傷骨傷氣傷血傷精傷神傷皮毛肌肉則實兼之五臟矣嗚呼嗜慾迷人其害至此其故則在但知有彼而忘其有我耳廣成子曰無勞女形無搖女精乃可以長生若此二言者人因其簡故多易之而不知養生之道於此八字而盡之矣顧可以忽之也耶

一少年縱酒者多成勞損夫酒本狂藥大損眞陰惟少飲之未必無益多飲之難免無傷而躭飲之則受其害者十之八九矣且凡人之稟賦臟有陰陽而酒之性質亦有陰陽蓋酒成於釀其性則熱汁化於水其質則寒若以陰虛者縱飲之則質不足以滋陰而性偏動火故熱者愈熱而病爲吐血衄血便血尿血喘嗽躁煩狂悖等證此酒性傷陰而然也若陽虛者縱飲之則性不足以扶陽而質留爲水故寒者愈寒

而病爲膨脹泄瀉腹痛吞酸少食亡陽暴脫等證此酒質傷陽而然也故縱酒者既能傷陰尤能傷陽害有如此人果知否矧酒能亂性每致因酒妄爲則凡傷精竭力動氣失機及遇病不勝等事無所不至而陰受其損多罔覺也夫縱酒之時固不慮其害之若此及病至沉危猶不知爲酒困故余詳明於此以爲縱酒者之先覺云

一疾病誤治及失於調理者病後多成虛損蓋病有虛實治有補瀉必補瀉得宜斯爲上工余見世俗之醫門不知神理爲何物而且幷邪正緩急俱不知之故每致伐人元氣敗人生機而隨藥隨斃者已無從訴其有幸而得免而受其殘剝以致病後多成虛損而不能復振者此何以故也故凡醫有未明萬毋輕率是誠仁人積德之一端也至若失於調治致不能起則俗云小孔不補大孔叫寃苦亦自作之而自受之耳又何尤焉

凡虛損之由具道如前無非酒色勞倦七情飲食所致故或先傷其氣氣傷必及於精或先傷其精精傷

必及於氣但精氣在人無非謂之陰分蓋陰爲天一之根形質之祖故凡損在形質者總曰陰虛此大目也若分而言之則有陰中之陰虛者其病爲發熱躁煩頭紅面赤脣乾舌燥咽痛口瘡吐衄便尿血大便燥結小水痛澀等證有陰中之陽虛者其病爲怯寒憔悴氣短神疲頭運目眩嘔惡食少腹痛飧泄二便不禁等證甚至欬嗽吐痰遺精盜汗氣喘聲瘖筋骨疼痛心神恍惚肌肉盡削夢與鬼交婦人月閉等證則無論陰陽凡病至極皆所必至總由眞陰之敗耳然眞陰所居惟腎爲主蓋腎爲精血之海而人之生氣卽同天地之陽氣無非自下而上所以腎爲五臟之本故腎水虧則肝失所滋而血燥生腎水虧則水不歸源而脾痰起腎水虧則心腎不交而神色敗腎水虧則盜傷肺氣而喘嗽頻腎水虧則孤陽無主而虛火熾凡勞傷等證使非傷入根本何以危篤至此故凡病甚於上者必其竭甚於下也余故曰虛邪之至害必歸陰五臟之傷窮必及腎窮而至此吾末如之何也矣所貴乎君子知其微而已

凡損傷元氣者本皆虛證而古方以虛損勞瘵各分門類則病若有異亦所宜辨蓋虛損之謂或有發見於一證或有困憊於暫時凡在經在臟但傷元氣則無非虛損病也至若勞瘵之有不同者或以骨蒸或以乾嗽甚至吐血吐痰營衞俱敗尫羸日甚此其積漸有日本末俱竭而然但虛損之虛有在陰分有在陽分然病在未深多宜溫補若勞瘵之虛深在陰中之陰分多有不宜溫補者然凡治虛證宜溫補者病多易治不宜溫補者病多難治此虛勞若乎有異而不知勞瘵之損即損之深而虛之甚者耳凡虛損不愈則日甚成勞矣有不可不愼也

虛損兩顴紅赤或唇紅者陰虛於下逼陽於上也仲景曰其面戴陽者下虛故也虛而多渴者腎水不足引水自救也喑啞聲不出者由腎氣之竭蓋聲出於喉而根於腎經曰內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也虛而喘急者陰虛肺格氣無所歸也喉乾咽痛者眞水下虧虛火上浮也不眠恍惚者血不養心神不能藏也時多煩躁者陽中無陰柔不濟剛也易生嗔怒或

筋急痠痛者水虧木燥肝失所資也飲食不甘肌肉漸削者脾元失守化機日敗也心下跳動怔忡不寧者氣不歸精也經曰胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣宗氣泄也盜汗不止者有火則陰不能守無火則陽不能固也虛而多痰或如清水或多白沫者此水泛爲痰脾虛不能制水也骨痛如折者腎主骨眞陰敗竭也腰脅痛者肝腎虛也膝以下冷者命門衰絕火不歸源也小水黃澀淋瀝者眞陰虧竭氣不化水也足心如烙者虛火爍陰湧泉涸竭也

凡陽虛之人因氣虛也陽氣旣虛卽不能嚏仲景曰欲嚏不能此人肚中寒故凡以陽虛之證而忽見嚏者便有回生之兆

論脉

虛損之脉凡甚急甚數甚細甚弱甚澀甚滑甚短甚長甚浮甚沉甚弦甚緊甚洪甚實者皆勞傷之脉然無論浮沉大小但漸緩則漸有生意若弦甚者病必甚數甚者病必危若以弦細而再加緊數則百無一生矣

要略曰脉芤者爲血虛沉遲而小者爲脫氣大而無力爲陽虛數而無力爲陰虛脉大而芤者爲脫血平人脉大爲勞虛極亦爲勞脉微細者盜汗寸弱而軟爲上虛尺弱軟澀爲下虛尺軟滑疾爲血虛兩關沉細爲胃虛

脉經曰脉來軟者爲虛緩者爲虛微弱者爲虛弦者爲中虛細而微小者氣血俱虛

辨爪

凡勞損之病本屬陰虛陰虛必血少而指爪爲精血之餘故凡於診候之際但見其指爪乾黃覺有枯槁之色則其髮膚營氣具在吾目中矣此於脉色之外便可知其有虛損之候而損之微甚亦可因之以辨也

論治

病之虛損變態不同因有五勞七傷證有營衛臟腑總之人賴以生者惟此精氣而病爲虛損者亦惟此精氣氣虛者即陽虛也精虛者即陰虛也凡病有火盛水虧而見營衛燥津液枯者即陰虛之證也有水

盛火虧而見臟腑寒脾腎敗者卽陽虛之證也此惟陰陽偏困所以致然凡治此者但當培其不足不可伐其有餘夫既緣虛損而再去所餘則兩敗俱傷矣豈不殆哉惟是陰陽之辨猶有不易謂其陰陽之中復有陰陽其有似陽非陽似陰非陰者使非確有眞見最易惑人此不可不詳察也且復有陰陽俱虛者則陽爲有生之本而所重者又單在陽氣耳知乎此則虛損之治如指諸掌矣

陽虛者多寒非謂外來之寒但陽氣不足則寒生於中也若待既寒則陽已敗矣而不知病見虛弱而別無熱證者便是陽虛之候卽當溫補元氣使陽氣漸囘則眞元自復矣蓋陽虛之候多得之憂愁思慮以傷神或勞役不節以傷力或色慾過度而氣隨精去或素稟元陽不足而寒冷致傷等病皆陽氣受損之所由也欲補陽氣惟辛甘溫燥之劑爲宜萬勿兼清凉寒滑之品以殘此發生之氣如生地芍藥天麥門冬沙參之屬皆非所宜而石斛元參知蘗芩連龜膠之類則又切不可用若氣血俱虛者宜大補元煎或

八珍湯或十全大補湯五臟俱虛宜平補者五福飲命門陰分不足者左歸飲左歸丸命門陽分不足者右歸飲右歸丸氣分虛寒者六氣煎脾腎陰分虛寒諸變不一者理陰煎三焦陽氣大虛者六味回陽飲氣虛脾寒者一炁丹胃氣虛寒者溫胃飲理中湯血虛寒滯者五物煎

陰虛者多熱以水不濟火而陰虛生熱也此病多得於酒色嗜慾或憤怒邪思流蕩狂勞以動五臟之火而先天元陰不足者尤多此病凡患虛損而多熱多燥不宜熱食者便是陰虛之候欲滋其陰惟宜甘涼醇靜之物凡陰中有火者大忌辛溫如乾薑桂附破故紙白朮蒼朮半夏之屬皆不可輕用即如人參黃芪枸杞當歸杜仲之類是皆陰中有陽亦當酌宜而用之蓋恐陽旺則陰愈消熱增則水益涸耳然陰虛者因其水虧而水虧者又忌寒涼蓋苦劣之流斷非資補之物其有火盛之甚不得不從清涼者亦當兼壯水之劑相機間用而可止即止以防其敗斯得滋補之大法

虛損夜熱或午後發熱或喜冷便實者此皆陰虛生熱水不制火也宜加減一陰煎若火在心腎而驚悸失志者宜二陰煎若外熱不已而內不甚熱但宜補陰不可清火宜一陰煎或六味地黃湯有元氣不足而虛熱不已者必用大補元煎庶乎久之自愈

虛損欬嗽雖五臟皆有所病然專主則在肺腎蓋肺爲金臟金之所畏者火也金之化邪者燥也燥則必癢癢則必嗽正以腎水不能制火所以尅金陰精不能化氣所以病燥故爲欬嗽喘促咽痛喉瘡聲啞等證凡治此者只宜甘涼至靜之劑滋養金水使肺腎相生不受火制則眞陰漸復而嗽可漸愈火盛者宜四陰煎加減主之火微者宜一陰煎六味地黃湯或左歸飲兼受風寒而嗽者宜金水六君煎貝母丸治嗽最佳

虛損吐血者傷其陰也故或吐或衄所不能免但當察其有火無火及火之微與甚而治之凡火之盛者以火載血上而脉證之間自有熱證可辨急則治標此不得不暫用芩連梔蘗竹葉童便之屬或單以抽

薪飲從薪飲之類主之若陰虛而兼微火者宜保陰煎或清化飲或加減一陰煎主之血止卽當養血不宜過用寒凉也若無實火而全屬傷陰則陰虛水虧血由傷動而爲吐爲衄者此宜甘純養陰之品以靜制動以和治傷使陰氣安靜得養則血自歸經宜一陰煎六味地黃湯或小營煎之類主之若陰虛連肺而兼嗽兼血者宜四陰煎加減主之若因勞役別無火證心脾腎三陰受傷而動血者宜五陰煎五福飲六味地黃丸之類主之若陰虛於下格陽於上六脉無根而大吐大衄者此火不歸源眞陽失守而然宜右歸飲加減主之或八味地黃湯亦可此惟思慮勞倦過傷者多有此證若因勞倦而素易嘔瀉多有脾不攝血而爲吐血下血者宜六味回陽飲大加白朮主之萬不可用凉藥若大吐大衄而六脉細脫手足厥冷危在頃刻而血猶不止者速宜用鎭陰煎其血自止若血脫至甚氣亦隨之因至厥逆昏憒者速當益氣以固生機宜六味回陽飲或四味回陽飲主之若再用寒凉卽死總之失血吐血必其陰分大傷使

非加意元氣培養眞陰而或專用寒涼則其陰氣愈損血雖得止而病必日敗矣

虛損傷陰本由於五臟雖五臟各有所主然五臟證治有可分者有不可分者如諸氣之損其治在肺神明之損其治在心飲食肌肉之損其治在脾諸血筋膜之損其治在肝精髓之損其治在腎此其可分者也然氣主於肺而化於精神主於心而化於氣肌肉主於脾而土生於火諸血藏於肝而血化於脾胃精髓主於腎而受之於五臟此其不可分者也及乎旣甚則標本相傳連及臟腑此又方之不可執言也故凡補虛之法但當明其陰陽升降寒熱溫涼之性精中有氣氣中有精因且凡上焦陽氣不足者必下陷於腎也當取之至陰之下下焦眞陰不足者多飛越於上也可不引之歸源乎所以治必求本方爲盡善然余用補之法則悉在新方八略八陣中惟細察之可得其概其有諸證未備者如遺精夢泄聲啞盜汗及婦人血枯經斷等證但於各門求之則無不俱有照應

辨似損非損

凡似損非損之證惟外感寒邪者乃有之蓋以外邪初感不爲解散而誤作內傷或用清涼或用消導以致寒邪鬱伏久留不散而爲寒熱往來或爲潮熱欬嗽其證則全似勞損若用治損之法以治此證則滋陰等劑愈以留邪熱蒸既久非損成損矣余嘗治愈數人皆其證也欲辨此者但當詳察表裏而審其致病之由蓋虛損之證必有所因而外感之邪其來則驟若或身有疼痛而微汗則熱退無汗則復熱或見大聲欬嗽脉雖弦緊而不甚數或兼和緩等證則雖病至一兩月而邪有不解病終不退者本非勞損毋誤治也若寒熱往來不止者宜一二三四五柴胡飲酌宜用之或正柴胡飲亦可若兼欬嗽者柴陳煎若脾腎氣虛而兼欬嗽者金水六君煎或邪有未解而兼寒熱者仍加柴胡

虛損危候

凡虛損既成不補將何以復而有不能服人參熟地及諸補之藥者此爲虛不受補何以望生若勞損吐

血失血之後嗽不能止而痰多甚者此以脾肺虛極飲食無能化血而隨食成痰此雖非血而實血之類也經曰白血出者死故凡痰之最多最濁者不可治

左右者陰陽之道路其有不得左右眠而認邊難轉者此其陰陽之氣有所偏竭而然多不可治

凡病虛損者原無外邪所以病雖至困終不憒亂其有患虛證別無邪熱而譫妄失倫者此心臟之敗神去之兆也必死

勞嗽喑啞聲不能出或喘急氣促者此肺臟之敗也必死

勞損肌肉脫盡者此脾臟之敗也必死

筋爲疲極之本凡病虛損者多有筋骨疼痛若痛有至極不可忍者乃血竭不能榮筋此肝臟之敗也必死

勞損既久再及大便泄瀉不能禁止者此腎臟之敗也必死

論難經損證

按難經上損下損之說其義極精然有未盡者猶宜

悉也蓋凡思慮勞倦外感等證則傷陽傷於陽者病必自上而下也色慾醉飽內傷等證則傷陰傷於陰者病必自下而上也如經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月之類此即自上而下者也又經曰五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣此即自下而上者也蓋自上而下者先傷乎氣故一損損於肺則病在聲息膚腠二損損於心則病在血脉顏色三損損於胃則病在飲食不調四損損於肝則病爲瘈瘲疼痛五損損於腎則病爲骨痿二便不禁此先傷於陽而後及乎陰陽竭於下則孤陰無以獨存不可爲也自下而上者先傷乎精故一損損於腎則病爲泉源乾涸二損損於肝則病爲血動筋枯三損損於脾則病爲痰涎壅盛四損損於心則病爲神魂失守五損損於肺則病爲喘急短氣此先傷乎陰而後及乎陽陰竭於上則孤陽無以獨生不可爲也故曰心肺損而神衰肝腎虛而形敝脾胃損而食飲不歸血氣凡明哲之士則當察所由而預防其漸又何虛損之可慮若待源流俱竭

而後歸罪於藥之不效醫之不良此其愚也亦甚矣

方一

桂枝加龍骨牡蠣湯（仲景下同）

桂枝　芍藥　生薑各三兩　大棗十二枚

龍骨　牡蠣各三兩　甘草二兩

右七味以水七升煑取三升分溫三服

天雄散

天雄炮　龍骨各三兩　白朮八兩　桂枝六兩

右四味杵爲散酒服半錢匕日三服不知稍增之

薯蕷丸

薯蕷三十分　人參　阿膠各七分　乾地黃
當歸　桂枝　麯　豆黃卷各十分　麥門冬
防風　芎藭　芍藥　白朮　杏仁各六分
柴胡　桔梗　茯苓各五分　大棗百枚爲膏
乾薑三分　白蘞二分　甘草二十八分

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸爲劑

酸棗湯

酸棗仁二升　甘草一兩　知母　白茯苓
芎藭各二兩（深師有生薑二兩）

右五味以水八升煑酸棗仁得六升內諸藥煑取三升分溫三服

大黃䗪蟲丸

大黃蒸十分　乾地黃十兩　黃芩二兩　桃仁
杏仁　蝱蟲　蠐螬各一升　白芍藥四兩
甘草三兩　乾漆一兩　水蛭百枚　䗪蟲半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

千金翼炙甘草湯

一名復脉湯治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草四兩炙　桂枝　生薑各三兩　麥門冬
麻仁各半升　人參　阿膠各二兩　生地一斤
大棗三十枚

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫服一升日三服

肘後獺肝散

治冷勞又主鬼疰一門相染

獺肝一具

右炙乾末之水服方寸匕日三服

天靈明月丹（華佗下同）

治傳尸

雄黃　木香各半兩　鼈甲製　輕粉各一分
兔糞二兩　天靈蓋炙一兩

右爲末用法酒一大升大黃半兩熬膏入前藥爲丸彈子大硃砂爲衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐欬嗽

不定先燒安息香令烟盡吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若烟入口欬而不能禁止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿使人知以童子小便同酒共一盞化一丸服之如人行二十里止吐出蟲其狀如燈心而細長及寸或如爛李又如蝦蟆狀各不同未效次日再服以應爲度

地黃煎丸

解勞生肌進食活血養心

法酒二升　生地汁　杏仁汁　生薑汁　藕汁

薄荷汁各五升　鵝梨汁一升　沙蜜四兩

右慢火熬成膏入後藥

柴胡洗去蘆三兩　木香　人參　茯苓　山藥

柏子仁微炒另研　白朮　枳殼浸去穰麩炒黃

遠志去心各一兩　秦艽洗去蘆二兩　桔梗

熟地酒浸一宿切焙各四兩　麝香半兩細研

右丸如桐子大每日食後甘草湯下二十丸

補肝湯（千金方下同）

治肝氣不足兩脅下滿筋急不得太息四肢厥冷

發搶心腹痛目不明了

山茱萸　甘草　桂心各三兩　桃仁　柏子仁

細辛　茯苓　防風各二兩　大棗二十四枚

右九味㕮咀以水九升煑取五升去滓分三服

千里流水湯

治虛煩不得眠

麥門冬　半夏各三兩　茯苓四兩　秫米一斗

酸棗仁二升　甘草　桂心　黃芩　遠志

萆薢　人參　生薑各二兩

右十二味㕮咀以千里流水一斛煑米令蟹目沸揚萬遍澄清取一斗煑取二升半分三服

梔子湯

治大下後虛勞不得眠劇者顚倒懊憹欲死

大梔子十四枚　豉七合

右二味以水四升先煑梔子取二升半內豉更煑三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可加生薑二兩

巴戟天酒

治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣

巴戟天　牛膝　枸杞根白皮　麥門冬　地黃
防風各二斤

右六味並生用無生用乾者亦得㕮咀以酒一石四斗浸七日去滓溫服常令酒氣相續勿至醉吐慎生冷猪魚油蒜春七日秋冬二七日夏勿服先患冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虛勞加五味子蓯蓉各一斤陰下濕加五加根皮一斤石斛一斤每加一斤藥加酒七升每年九月中旬卽合入十月上旬卽服設服餘藥以此酒下之大妙滓曝乾搗爲末以此酒服方寸匕日三益佳常服加甘草十兩佳虛勞加黃芪一斤

五加酒

治虛勞不足

五加皮　枸杞根白皮各一斗

右二味㕮咀以水一石五斗煑取汁七斗分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

天門冬大煎

治男子五勞七傷八風十二痹傷中六極

天門冬　生地黃各切三斗半搗壓盡取汁

麞骨一具搗碎以水一石煮取五斗澄清　白蜜

酥各三升並煉　枸杞根切三斗淨洗以水二石五

煑取一斗三升澄清

右六味內大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗內銅器重釜煎令隱掌可丸如梧子大平旦空腹酒服二十丸日二加至五十丸愼生冷酢滑猪鷄魚蒜油麪等須擇四時王相日修合散藥如左

茯苓　桂心　白朮　萎蕤　菖蒲

遠志　澤瀉　薯蕷　人參　石斛

牛膝　杜仲　細辛　獨活　胡麻子

枳實　芎藭　大豆黃卷　黃芪　續斷

狗脊　萆薢　白芷　橘皮　巴戟天

石南各二兩　阿膠十兩　甘草六兩　蜀椒

薏苡仁一升　鹿角膠五兩　蔓荊子三兩

大棗一百枚煑作膏

右三十八味治下篩內煎中有牛髓鹿髓各加三升大佳小便澀去柏子仁加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿失精去萎蕤加五味子二兩頭風去柏子仁加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾薑二兩此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若經夏不壞於舍北陰處入地深六尺塡沙置藥中上加沙覆之女人先患熱者得服患冷者勿服

塡骨萬金煎

治內勞少氣寒疝裏急腹中喘逆腰脊痛

生地黃三十斤取汁　肉蓯蓉　甘草　牛髓

阿膠各一斤　麥門冬　乾地黃各二斤　乾薑

桑根白皮　茯苓　桂心各八兩　人參　桔梗

五味子　附子炮各五兩　石斛一斤五兩

白蜜十斤　清酒四斗　大棗一百五十枚

麻子仁三升　當歸十四兩　乾漆二十兩

蜀椒四兩

右二十三味先以清酒二斗六升內桑根白皮麻子仁棗膠爲刻識之又加酒一斗四升煑取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許令可丸止大甕盛飲呑如彈丸一枚日三若夏月暑熱煑煎轉味可以蜜地黃汁和諸藥成末爲丸如梧子服十五丸不止稍加至三十丸

又方

治男子風虛勞損兼時氣

甘草一斤　石斛　防風　蓯蓉　茯苓　人參

山茱萸　薯蕷各四兩　桂心　牛膝　五味子

菟絲子　巴戟　芎藭各三兩並爲末　生薑汁

胡麻以水二斗煑取四升去滓各二升　牛髓

白蜜　生麥門冬汁各三升　生地骨皮切碎

生地黃汁各一升　丹參二兩

右二十二味先煑地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓蜜薑門冬各等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調內銅鉢中湯上煎令可丸如梧子大酒服三

十丸日二加至五十丸

小鹿骨煎

治一切虛羸

鹿骨一具碎（一作麞骨） 枸杞根切二升

右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃合一器共煎取五升日二服盡好將慎

地黃小煎

治五勞七傷羸瘦乾削

乾地黃末一升 胡麻油半斤 白蜜二升 猪脂一斤

右四味銅器中煎令可丸如梧子大飲服三丸日三稍加十丸久久常服大有所益瘦黑者肥充

陸抗膏

治虛冷枯瘦身無精光虛損諸不足

牛髓 羊脂各二升 酥 生薑汁 白蜜各三升

右五味先煎酥令熟次內薑汁次內蜜次內羊脂牛髓微火煎三上三下令薑汁水氣盡即膏成攪令凝止溫酒服不限多少令人肥健發熱也

又方

治五勞七傷

白羊頭蹄一具淨治更以草火燒令黃赤以淨綿急塞鼻及腦孔　胡椒　蓽茇　乾薑各一兩

葱白一升　豉二升

右七味先煑頭蹄半熟即內藥煑極爛去藥冷暖任性食之日一具七日七具忌生冷酢滑五陳

補虛方

猪肚一具　人參五兩　蜀椒　乾薑各一兩半

葱白七兩　白粱米半升

右六味㕮咀諸藥令相得和米內肚中縫合勿泄氣水四斗半緩火爛煑空腹食大佳兼下少飯

乾地黃圓

治血虛勞胷腹煩滿疼痛瘀血往來臟虛不受穀氣逆不得食補中理血

乾地黃三兩　當歸　乾薑　麥門冬　甘草

黃芩各二兩　人參五分　厚朴　乾桼　枳實

防風　大黃　細辛　白朮各一兩　茯苓五兩

蝱蟲　䗪蟲各五十枚　前胡六分

右十八味爲末蜜丸如梧子大先食服十九日三稍加

茯苓補心湯

治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本强冷涎出或汗出善忘恐走不定

茯苓四兩　桂心　甘草各二兩　紫石英
人參各一兩　大棗二十枚　麥門冬三兩
赤小豆二十四枚

右八味㕮咀以水七升煑取二升分三服

牛髓圓

通治百病虛脊羸乏

牛髓　羊髓　棗膏　白蜜　酥各一升　芎藭
麥門冬　桂心　當歸　茯苓（一云茯神）　甘草
羌活各三十銖　乾地黃　乾薑各三十六銖
五味子　人參　防風各一兩　細辛十八銖
白朮四十二銖

右十九味搗十四味再篩別研棗膏和散次與諸髓蜜攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎取堪爲丸如梧子大酒服三十丸加至四十九日再服

大補心湯

治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮

黃芩　附子各一兩　乾地黃　茯苓　麥門冬
甘草　桂心　阿膠各三兩　飴糖一斤　半夏
遠志　石膏各四兩　生薑六兩　大棗二十枚

右十四味取十三味㕮咀以水一斗五升煑取五升湯成下糖分四服

溫脾圓

治久病虛羸脾氣弱食不消喜噫

黃蘗　大麥蘗　吳茱萸　桂心　乾薑　細辛
附子　當歸　大黃　麴　黃連各一兩

右十一味爲末蜜丸如梧子每服十五丸空腹酒服日三

麻豆散

主脾氣弱不下食餌此以當食

大豆黃二升　大麻子三升熬令香

右二味治下篩飲和服一合日四五任情多少

又方

治骨蒸熱羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西卽發

龍膽　黃連　苦蔞根各四分　芒硝二分

梔子十枚　苦參　大黃　黃芩　靑葙子

芍藥各二兩

右十味爲末蜜丸如梧子大飲服二丸日二以止爲度一方無苦參已下止五味

補肺湯

治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜言語失聲甚者吐血

五味子三兩　乾薑　桂心　款冬花各二兩

麥門冬一升　大棗一百枚　桑根白皮一斤

粳米二合

右八味㕮咀以水一斗先煑桑白皮五沸下藥煑取三升分三服

又方

專治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲食

蘇子一升　桑白皮五兩　半夏六兩　紫菀

人參　甘草　五味子　杏仁各二兩　款冬花

射干各半兩　麻黃　乾薑　桂心各三兩

細辛一兩半

右十四味㕮咀以水一斗二升煑取三升半分五服日三夜二

又方

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絕

蓯蓉　白朮　巴戟天　麥門冬　茯苓　甘草

牛膝　五味子　杜仲各八兩　生乾地黃五斤

車前子　乾薑各五兩

右十二味治下篩食後酒服方寸匕日三

又方

治五勞六極虛羸心驚厎弱多魘亡陽

茯苓四兩　甘草　芍藥　桂心　乾薑各三兩

大棗五枚　遠志　人參各二兩

右八味㕮咀以水八升煑取三升分三服

建中湯

治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利

膠飴半斤　黃芪　乾薑　當歸各三兩　人參

半夏　橘皮　芍藥　甘草各二兩　附子一兩

大棗十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煑取三升半湯成下膠飴烊沸分四服

又方

治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絕傷外引四肢

生薑　芍藥　乾地黃　甘草　芎藭各五兩

大棗三十枚

右六味㕮咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煑取三升分三服藥入四肢百脈似醉狀是效

無生薑酒漬乾薑二兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯

治虛勞寒澼飲在脅下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精氣痛目䀮䀮惚惚多忘

蜀椒二合　半夏一升　生薑一斤　甘草二兩

人參三兩　飴糖八兩

右六味㕮咀以水一斗煑三升去滓內糖溫服七合裏急拘引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子一枚勞者加黃芪一兩

小建中湯

凡男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉疼痠吸吸少氣行動喘惙或小腹拘急腰背强痛心中虛悸咽乾脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘慼多臥少起皆如方治之

甘草二兩　桂心　生薑各三兩　芍藥六兩

膠飴一升　大棗十二枚

右六味㕮咀以水九升煑取三升去滓內膠飴每

服一升日三間三日復作一劑後可與諸丸散

前胡建中湯

治大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾

前胡三兩　黃芪　芍藥　當歸　白茯苓
桂心各二兩　甘草一兩　生薑八兩　人參
白糖　半夏各六兩

右十一味㕮咀以水一斗二升煑取四升去滓內糖分四服

黃芪建中湯

治虛勞裏急諸不足

黃芪　生薑　桂去皮各三兩　甘草二兩
芍藥六兩　大棗十二枚　飴糖一升

右十味㕮咀以水一斗煑取三升去滓內飴令消溫服一升日三間日可作嘔者倍加生薑腹滿者去棗加茯苓四兩佳

黃芪湯

治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即脹汗出

黃芪　麥門冬　芍藥　桂心各三兩　甘草
當歸　五味子　細辛　人參各二兩　生薑
半夏各八兩　大棗二十枚　白茯苓四兩
前胡六兩

右十四味㕮咀以水一斗四升煑取三升每服八合日三服

樂令黃芪湯

治虛勞少氣胷心淡冷時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗五臟六腑虛損腸鳴風濕榮衞不調百病補諸不足又治中風裏急

黃芪　人參　橘皮　當歸　桂心　細辛
前胡　芍藥　甘草　麥門冬　茯苓各一兩
生薑五兩　半夏二兩半　大棗二十枚

右十四味㕮咀以水二斗煑取四升每服五合日三夜一

腎瀝湯

治虛勞損羸乏欬逆氣短四肢煩疼腰背相引痛耳鳴面黧黯骨間熱小便赤黃心悸目眩諸虛乏

羊腎一具　桂心一兩　磁石五兩　人參
澤瀉　五味子　甘草　防風　芎藭　地骨皮
黃芪　當歸各二兩　茯苓　元參　芍藥
生薑各四兩

右十六味㕮咀以水一斗五升先煮腎取一斗去腎入藥煎取三升分三服可常服之

增損腎瀝湯

治大虛不足小便數噓吸焦燆引飲膀胱滿急每年三伏中常服此三劑於方中商量用之

羊腎一具　麥門冬　地骨皮　人參　石斛
澤瀉　苦蔞根　乾地黃各四兩　遠志　生薑
甘草　當歸　桂心　桑白皮（一作桑寄生）　茯苓
五味子各二兩　大棗三十枚

右十七味㕮咀以水一斗五升先煮腎取一斗二升去腎內藥煮取三升去滓分三服

五補湯

治五臟內虛竭短氣欬逆傷損鬱悒下氣通津液

五味子　桂心　甘草　人參各一兩　麥門冬

小麥各一升　粳米三合　生薑八兩　薤白
枸杞根白皮各一斤

右十味以水一斗二升煑三升每服一升日三口燥者先煑竹葉一把水減一升去葉內諸藥煑

人參湯

治男子五勞七傷胷中逆滿害食乏氣嘔逆兩脅下脹小腹急痛宛轉欲死調中平臟理絕傷

人參　當歸　芍藥　甘草　生薑　麥門冬
白糖　桂心各二兩　前胡　茯苓　五味子
蜀椒　橘皮各一兩　枳實三兩　大棗十五枚

右十五味㕮咀取東流水一斗半漬藥半日用三年陳蘆梢煎取四升內糖復上火煎令十數沸年二十以上六十以下一服一升二十以下六十以上一服七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆不則水強火盛猛卽藥力不出也

內補散

治五勞六絕心傷者令人善驚妄怒無常脾傷者

令人腹滿喜噫食竟欲臥面目痿黃肺傷者令人少精腰背痛四肢厥逆肝傷者令人少血面黑腎傷者有積聚小腹腰背滿痹欬唾小便難六絕之爲病皆起於大勞脉虛外受風邪內受寒熱令人手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憒憒不欲語憎聞人聲

乾地黃　菟絲子　山茱萸　地麥各五兩
遠志　巴戟天各半兩　麥門冬　五味子
甘草　人參　蓯蓉　石斛　桂心　茯苓
附子各一兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三匕無所禁

腎瀝散

治虛勞百病

羖羊腎一具陰乾　茯苓一兩半　五味子
甘草　巴戟天　桂心　石龍芮　牛膝　防風
山茱萸　乾薑　細辛各一兩　乾地黃　人參
鍾乳粉　石斛　菟絲子　丹參　肉蓯蓉

附子各五分

右二十味治下篩合鍾乳粉和攪更篩令勻平旦清酒服方寸匕稍加至二匕日再

鍾乳散

治五勞七傷虛羸無氣力傷極

鍾乳六兩無問粗細以白淨無赤黃黑爲上銅鐺中可盛二三斗幷取粟粗糖二合許內鐺中煑五六沸乃內乳煑水欲減又添如故一晬時出以煖水淨淘之曝乾玉硾研不作聲止重密絹水下澄取用

鹿角白者　白馬莖別擣　硫黃別研　石斛

鐵精　人參　磁石　桂心　殭蠶各一兩

蛇牀仁三兩

右十一味爲末以棗膏和擣三千杵酒服三十丸如梧子日再愼房室及生冷酢滑雞猪魚陳敗

石葦圓

黃帝問五勞七傷於高陽負高陽負曰一曰陰衰二曰精清三曰精少四曰陰消五曰囊下濕六曰腰（一作胷）脅苦痛七曰膝厥痛不欲行骨熱遠視淚

出尸乾腹中鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽負曰石韋丸主之

石韋　細辛　礜石　遠志去心　茯苓　澤瀉
菖蒲　杜仲　蛇牀子　肉蓯蓉　桔梗　天雄
牛膝　山茱萸　柏子仁　續斷　薯蕷各二兩
防風　赤石脂各三兩

右十九味爲末取棗膏如蜜和丸如梧子酒服三十丸日三七日愈二十日百病除長服良

五補圓

治腎氣虛損五勞七傷腰腳酸疼肢節苦痛目暗䀮䀮心中喜忘恍惚不定夜臥多夢覺則口乾食不得味心常不樂多恚怒房室不舉心腹脹滿四體疼痹吐酸小腹冷氣尿有餘瀝大便不利

杜仲　巴戟天各六分　人參　五加皮　天雄
五味子　牛膝　防風　遠志　石斛　薯蕷
狗脊各四分　乾地黃　蓯蓉各十二分　茯苓

菟絲子各五分　鹿茸十五分　萆薢　蛇牀子
石南　白朮各三分　天門冬七分　覆盆子
石龍芮各八分

右二十四味爲末蜜丸如梧子酒服十丸日三有風加天雄芎藭當歸黃芪五加皮石南茯神獨活柏子仁白朮各三分有氣加厚朴枳實橘皮各三分冷加乾薑桂心吳茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭子白龍骨牡蠣鹿茸各三分泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅肉各三分春依方服夏加地黃五分黃芩三分麥門冬四分冷則去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上卽覺庶事悉佳愼酢蒜鱠陳臭大冷醉吐自外百無所愼稍加至三十丸不得增常以此爲度

無比薯蕷圓

治諸虛勞百損

薯蕷二兩　蓯蓉四兩　五味子六兩　菟絲子
杜仲各三兩　牛膝　山茱萸　乾地黃　澤瀉

茯神（一作茯苓） 巴戟天 赤石脂各五兩

右十二味爲末丸如梧子食前酒服二十丸加至三十九日再無所忌惟禁酢蒜陳臭等物服七日後令人健四體潤澤脣口赤手足暖面有光彩消食身體安和音聲清朗是其驗也十日後長肌肉其藥通中入腦鼻必酸疼勿怪若求大肥加燉煌石膏二兩失性健忘加遠志一兩體少潤澤加柏子仁一兩

大薯蕷圓

治男子女人虛損傷絕頭目眩骨節煩痛飲食微少羸瘦百病

大黃六分 薯蕷 附子 人參 澤瀉各五分 天門冬 乾地黃 黃芩 當歸各十分 乾漆 杏仁 阿膠各二分 白朮 白薟 桂 芍藥 石膏 前胡 桔梗 乾薑各四分 五味子十六分 甘草二十分 大豆卷五分 大棗一百枚

右二十四味爲末蜜和棗膏擣三千杵丸如梧子酒服五丸日三漸增至十九

腎氣圓

治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊冷濕尿有餘瀝精自出陰痿不起忽忽喜悲

乾地黃八分　遠志　防風　乾薑　牛膝

麥門冬　萎蕤　薯蕷　石斛　細辛　地骨皮

甘草　附子　桂心　茯苓　山茱萸各四兩

蓯蓉六分　鍾乳粉十分　羖羊腎一具

右十九味爲末丸如梧子酒服十五丸日三稍加至三十丸

八味腎氣圓

治虛勞不足大渴欲飲腰痛小腹拘急小便不利

乾地黃八兩　山茱萸　薯蕷各四兩　澤瀉

牡丹皮　茯苓各三兩　桂心　附子各二兩

右八味爲末蜜丸如梧子大酒下十五丸日三加至二十五丸

黃芪圓

治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視䀮䀮耳無所聞

黃芪　乾薑　當歸　羌活（一作白朮）　芎藭　甘草
茯苓　細辛　桂心　烏頭　附子　乾地黃
防風　人參　芍藥　石斛　蓯蓉各二兩
棗膏五合　羊腎一具

右十九味爲末以棗膏與蜜爲丸如梧子大酒服十五丸日二加至三十丸一方無芎藭乾薑當歸羌活止十五味

神化圓

治五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小便數有餘瀝陰頭冷疼失精自出小腹急繞臍痛膝重不能久立目視漠漠見風淚出脛瘦精氣衰微臥不欲起手足厥冷調中利食

蓯蓉　牛膝　薯蕷各六分　續斷　山茱萸
大黃各五分　遠志　澤瀉　天雄　柏子仁
菟絲子　人參　防風　石斛　苦蔞根　杜仲
黃連　白朮　甘草　礜石　當歸各一兩
桂心　石南　乾薑　蛇牀子　赤石脂　萆薢
茯苓　細辛　菖蒲　芎藭各三分

右三十一味爲末蜜丸如梧子酒服五丸日三加至二十丸

三仁九子圓

治五勞七傷補益

酸棗仁　柏子仁　薏苡仁　菟絲子　菊花子
枸杞子　蛇牀子　菴蕳子　地膚子　烏麻子
牡荊子　（缺一子）　地黃　薯蕷　桂心各二兩
蓯蓉三兩

右十六味爲末蜜丸如梧子酒服二十丸日二夜一

塡骨圓

治五勞七傷補五臟除萬病

石斛　人參　當歸　牡蒙　石長生　石葦
白朮　遠志　蓯蓉　巴戟天　紫菀　茯苓
乾薑　天雄　蛇牀子　牛膝　牡蠣　附子
丹皮　柏子仁　甘草　薯蕷　阿膠　乾地黃
五味子各二兩　蜀椒三兩

右二十六味爲末蜜丸如梧子酒服三丸日三

通明圓

治五勞七傷六極强力行事舉重重病後骨髓未滿房室所食不消胃氣不平

麥門冬三斤　乾地黃　石韋各一斤　紫菀
五味子　肉蓯蓉　甘草　阿膠　杜仲　遠志
茯苓　天雄各半斤

右十二味爲末蜜丸如梧子食前苦酒服十丸日再加至二十丸

補虛益精大通圓

治五勞七傷百病

乾地黃八兩　乾薑　當歸　石斛　肉蓯蓉
天門冬　白朮　甘草　芍藥　人參各六兩
麻子仁半兩　紫菀茸　大黃　黃芩各五兩
蜀椒三升　防風四兩　茯苓　杏仁各三兩
白芷一兩

右十九味爲末白蜜棗膏丸如彈子空腹服一丸日二服十日效

乾地黃圓

治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食不下顏色黧黯八風所傷補虛益氣進食養顏色長陽

乾地黃　茯苓　天雄各七分　蛇牀子六分

桂心　麥門冬各五分　遠志　蓯蓉　杜仲

甘草各十分　五味子四分　阿膠　棗肉各八分

右十三味爲末蜜丸如梧子酒下二十丸日再加至三十丸常服彌佳

崔平世方

治五勞七傷

鍾乳粉　萆薢各一分　巴戟天二分　菟絲子

蓯蓉各二分　乾薑三分（一作乾地黃）

右六味爲末蜜丸如梧子酒服七丸日三服訖行百步服酒三合行三百步胸中熱定即食乾飯牛羊兔肉任爲羹去肥膩餘不忌

石英煎

治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛痼冷少氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚懼百病

白石英碎如米以醇酒九升銅器中微火煎取三升以竹篦攪勿住手去滓澄淸　紫石英製法同上

乾地黄各一斤　白蜜三斤　石斛五兩　酥

桃仁各三升　柏子仁　遠志　茯苓　山茱萸

人參　麥門冬　桂心　五味子　乾薑　白朮

蓯蓉　甘草　天雄　白芷　細辛　芎藭

黄芪　防風　薯蕷各二兩

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足爲限煎令可丸如梧子大酒服二十丸日三稍加至四十丸爲度無藥者可單服煎令人肥白充實

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十六卷目錄

醫部彙考三百六

虛勞門四

方二一　地仙散　四君子湯　八物湯　千金散
金剛丸　牛膝丸　煨腎丸　黑地黃
丸　金明散　守靈散　魂停散　虛成散
育嬰散　龍膽丸　無比丸　奪命散　天竺
黃飲子　麝香散　桃仁散　柴胡散　取蟲
藥　釣蟲丸　釣蟲神效奪命散　紙丸子
通神散　紫河車丹　明月丹　青蒿飲　柴
胡散　鼈甲煎　貫仲丸　桂心丸　雄黃丸
輕欬散　蛤蚧散　又方　又方　五蒸湯
鼈甲地黃湯　黃芪飲子　蛤蚧圓　太上

混元丹　經效阿膠圓　蓮心散　黃芪鼈甲散　清骨散　石灰散　又方　獨參湯　保和湯　保眞湯　太平丸　消化丸　潤肺膏　取傳尸伏尸勞蟲法　又方　神人阿魏散　白茯苓湯　犀角紫河車丸　新定拯陰理勞湯　新定拯陽理勞湯　白鳳膏　芎歸血餘散　鼈甲生犀散　大補元煎　左歸飲　右歸飲　左歸丸　右歸丸　五福飲　一陰煎　加減一陰煎　二陰煎　三陰煎　四陰煎　五陰煎　大營煎　小營煎　贊化血餘丹　金水六君煎　保陰煎　四味回陽飲　六味回陽飲　理陰煎　溫胃飲　鎭陰煎　六氣煎

藝術典第三百二十六卷

醫部彙考三百六

虛勞門四

方二

地仙散（濟生方）

治骨蒸肌熱一切虛勞煩躁生津液

地骨皮二兩　防風一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

四君子湯（河間下同）

治肺損而皮聚毛落益氣可也

白朮　人參　黃芪　茯苓各等分

右爲粗末每服五六七錢水一盞煎至七分去滓食遠溫服

八物湯

治心肺虛損皮聚而毛落血脈虛損

白朮　人參　黃芪　茯苓　川芎　熟地黃

當歸　芍藥各等分

右粗末服五七錢水一盞煎七分去滓食後溫服

千金散

治心肺損及胃飲食不爲肌膚宜和氣血調飲食

白朮　人參　黃芪　茯神　桂枝　熟地黃

當歸　川芎　芍藥　甘草等分

右爲末加生薑棗同煎水一大盞藥五錢煎至七分食前日三服

金剛丸

治腎損骨痿不能起於牀宜益精

肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒浸　杜仲炒去絲

萆薢各等分

右爲細末酒煮猪腰子爲丸每服五七十丸空心

酒下

牛膝丸

治腎肝損骨痿不能起於牀筋緩不能收持宜益

精緩中

牛膝酒浸　萆薢　杜仲炒去絲　肉蓯蓉酒浸

防風　菟絲子酒浸　白蒺藜各等分　桂枝減半

右細末酒煮猪腰子搗丸桐子大空心酒下五七

十丸

煨腎丸

治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀

牛膝酒浸　萆薢　杜仲　肉蓯蓉　菟絲子

防風　白蒺藜　胡盧巴　故紙各等分　桂半錢

右和劑服餌如金剛丸法腰痛不起者甚效

黑地黃丸

加五味子名腎氣丸治陽盛陰虛脾腎不足房室

虛損形瘦無力面色青黃無常宜此養血益腎

蒼朮米泔浸　熟地黃各一斤　五味子半斤

川薑冬一兩夏五錢春七錢

右爲細末棗肉爲丸如梧子大每服一百丸至二百丸食前米飲或酒下

金明散（紫庭方下同）

補肝臟勞極

人參　知母　茯苓　秦艽　丁香　甘草炙

石膏煅各等分

右件爲細末每服二分水一盞葱白三寸全煎至八分通口服之

守靈散

補心臟勞極

白茯苓　丁香　訶子各一兩　桔梗　芍藥

羌活　甘草炙各一分

右件爲細末每服二錢水一盞入銀耳鐶一隻葱白三寸煎至八分通口服

魂停散

補脾臟勞極

白藥子　桔梗　人參　訶子皮　茯苓　丁香

甘草炙各一分

右件爲細末每服二錢水一盞入蜜一匙仝煎至八分通口服之

虛成散

補肺臟勞極

枳實麩炒　秦艽　白茯苓　芍藥　麻黃去節

茴香炒　延胡索　當歸各一錢　甘草炙一分

右件爲細末每服二錢水一盞銀鐶一對蜜五點煎至八分通口服之

育嬰散

補腎臟虛勞

附子一枚炮　香附子炒黑　木香　白蒺藜

甘草炙各一分　白茯苓五錢

右件爲細末每服二錢水一盞薑七片葱白同煎至七分空心服之

龍膽丸

治積熱勞瘦不食壓熱壅消瘡腫解肌骨毒散滯

草龍膽　柴胡（一作茯苓）　黃芩　地骨皮　鼈甲酢炙各一兩　桃仁去皮尖　山梔　陳皮　當歸　大黃　甘草炙各五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸空心用溫熱湯吞下如小兒加減丸數

無比丸

治傳尸勞服至一月愈其餘勞瘦之疾數服取效

紫河車二兩煑酢浸一宿焙乾爲末　芍藥

鼈甲酢炙各五錢　苦參　草龍膽　黃蘗子

知母　貝母　犀角屑　秋石　豉心火煆

莪朮　芒硝各二分　桔梗　胡黃連　大黃

甘草炙

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸溫酒送下如腸中熱食前服膈上熱食後服

奪命散

鼈甲酢炙　天靈蓋酢浸一宿酥塗炙黃各一兩

桃仁三七箇去皮尖麩炒　甘草　人參各五錢

柴胡去蘆　知母　青蒿各一兩　葱白一握

阿魏四棗子大

以上藥以鼈甲天靈蓋爲末次下人參知母柴胡甘草擣末次下青蒿桃仁葱白阿魏杵爛和成餅子慢火焙乾爲末秤二錢用童便二盞煎至一盞去查露星斗下一宿至五更三點熱服半盞服後衣被蓋臥天明又煖服半盞扶病人强行三五步三日更不得洗手面候頭後生毛爲驗每日早晨先喫白粥補

天竺黃飲子

天竺黃　麥門冬各一兩　人參　茯苓　甘草

防風　茯神　生地黃　遠志去心　犀角屑

龍骨各五錢　延胡索　大腹子各七箇

以上㕮咀爲末用水二升半煎至一升分作三處溫服忌一切毒物如治久臥牀枕先看十指毛色如藕白者可治如紫黑色者難治

麝香散

治婦人室女一切畜熱腹內著悶骨蒸室女經脈

不行瘦勞肌熱者並效

威靈仙四兩研細末　乾漆一兩碎炒令烟盡

雄黃一分　麝香一分二味另研

共爲末和勻用蒸餠糊爲丸如梧子大每服十五丸至二十丸茶湯任下次服桃仁散

桃仁散

桃仁去皮尖麩炒令黃　赤茯苓一兩　人參

白芍　陳皮各三分　犀角　安息香各一分

麝香二錢　檳榔四箇

共爲末每服二錢薑五片水一盞煎至六分早晚食前服若取下其蟲頭赤便服天竺黃飲子補護心臟未取下蟲亦須先護心須服

柴胡散

治童穉骨蒸熱解傷寒後肌熱

鼈甲酢炙三兩　柴胡　大黃　乾漆炒　秦艽

甘草　常山各一兩

右㕮咀每服一錢水一鍾入小麥一撮煎至七分去查冷服

取蟲藥

啄木鳥一隻　硃砂　精豬肉各四兩

看啄木禽餓甚將硃砂和在切碎肉片子內令食盡若無活的將打死者亦可其禽入罐內鹽泥固濟用剛火煅一夜來日不見太陽取出銀器內研作細末以無灰酒作一服調下入麝少許同調置病人在帳中四下緊閉用鐵鉗等候待病人口中蟲出即將蟲鉗入沸油中煎之方可斷根須預置烈火沸油等候於病人左右蟲出後宜服嘉禾散

如前夜服並服粥呪曰唵嚤嗚咈吽吽叱

釣蟲丸

磁石一兩五錢有牆緊者研爲末　硇砂一兩

麝香一錢　膩粉另研　龍骨各五錢

共爲末用蠟爲丸如櫻桃大每服一丸以藥上針穿一小竅子以青紅線貫之梢頭繫一大古錢早晨令病人向破方正坐用溫水吞下候藥下喉中合口以牙咬定古錢候惡心吐出其蟲狀不一急以熱油煎殺如不吐出蟲只吐得血絲子或涎

二合其病亦愈更服尋常和氣理中諸藥三兩日更妙其治過藥用溫水浴過更可醫一二人若是傳尸勞一丸可活兩人

釣蟲神效奪命散

石燕（煆酢淬七次）　鼈甲（磨）各一箇　油蠟五錢
母丁香一錢五分　硫黃二錢

共爲末用蠟爲丸如菉豆大每用一丸上繫緋線一條長一丈二尺用雪糕少許圍藥丸上以蠶繭一截穿於線上葢之令病人先喫雪糕後一日同藥吞下良久線動用力拽出有蟲入沸油煎殺此藥於端午日日未出時修合先服紙丸子次用神仙祕法收之

紙丸子

凡醫傳尸先當齋戒志心對聖焚香方服紙丸子

雞子清塗紙上令乾

右剪作錢樣大丸服之然後服前件丸散

逼神散

治傳尸勞

附子一箇　大黃一兩　牛黃二字

共爲末加桃柳枝青蒿各七握剉碎用童便半椀浸一宿來日五更初煎數十沸濾查調散子一半喫了以衣被蓋睡取下惡物自住不用止利下時用盆子盛著何物或如馬尾或似亂髮或似蜈蚣雞子或如破綿絮後要有人來別此忌硬物茶炙煿鴨蟹血生冷油膩醃藏等物後服

甘草　黃連　當歸　木香各五錢

將酒二升磁器內煎收五合傾出煎此四味熬看軟硬和丸如梧桐子大空心晚後或酒或鹽湯下三十九立效

紫河車丹

治飛尸鬼疰虛勞羸瘦喘嗽

男子首胎衣一具以皂角水洗淨用米醋煠洗控乾將一小小烘籠以紙周圍糊密不令走火氣安河車於上用大火烘之更將蓋蓋之烘令極乾入後藥

人參一兩半　白朮炒　白茯苓　當歸

熟地各一兩　木香五錢　乳香　沒藥各四錢

硃砂二錢　麝香二分以上四味俱另研

共爲細末和勻以紅麯糊爲丸如桐子大每服五十九人參煎湯空心服之日午再服或煉蜜爲丸亦可

明目丹

治傳尸勞追下尸蟲

望月砂中秋夜取四十九粒野地者　硇砂一錢

右研爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服七丸用甘草五錢生槌碎以水一盞揉取濃汁若患人瘦弱用炙過甘草五更空心服預戒患人不得心躁冷服不妨小瘥兩日再服下蟲爲準上旬服

青蒿飲

專治勞疾

青蒿赤根者取子一升葉五兩陰乾　嫩桃枝　嫩柳枝各三兩　地骨皮二兩　甘草　柴胡　梔子仁各一兩（量虛實用）

右㕮咀每服三錢水一盞烏梅二箇煎至七分不拘時服

柴胡散

補虛勞

柴胡　人參　白茯苓　桔梗　白芍　川芎

當歸酒浸一宿　青皮　麥冬　升麻　桑皮

白术米泔水浸一宿曬乾炒　甘草各一兩

共爲末每服水一盞煎七分通口服之

鼈甲煎

補虛勞

鼈甲一枚酢炙令黃　柴胡　當歸　甘草炙

桔梗　赤芍　人參各一兩　杏仁去皮尖炒

宣黃連　胡黃連　地骨皮各一分　木香

官桂去粗皮不見火　麝香各五錢　眞酥

白蜜各三兩

共爲細末用青蒿一斤童便五升熬青蒿汁約二升濾去查入酥蜜再熬成膏候冷入藥末搜和爲九桐子大每服十五九溫酒送下米飲亦可日進三服如秋冬時更入桃柳心七箇與前柴胡散同煎服之

貫仲丸

去三尸五蟲

貫仲　蕪荑各五分　白藋蘆　雄黃　蜀漆
厚朴各三分　狼牙子　殭蠶各四分　雷丸六分

右揀淨焙乾炒令黃色搗爲細末煉蜜爲丸如桐子大長流水下五丸三服可漸加至十丸二十丸服之二十日百病皆愈三尸九蟲自滅服者須要齋戒恭敬婦人絕孕服之有子

桂心丸

神仙去三尸九蟲

熟地黃三兩　乾漆五錢炒　桂心一兩

右爲末煉蜜爲丸梧子大每服七丸米飲下

雄黃丸

專袪三尸九蟲

雄黃研　松脂各一兩研

右鎔脂爲丸如蓮子大平旦服一丸服之七日三尸九蟲盡去

輕欬散

治勞嗽

烏梅　龍膽草　胡黃連　貝母　知母　桔梗

鼈甲醋炙　甘草炙　秦艽　柴胡　青蒿酒煮

人參　山梔仁　阿膠炒珠　杏仁去皮尖麩炒

右件曬乾爲末用好京墨一寸以井華水磨調前藥末作餅子如大指頭大透風處陰乾二七日方用每服一餅井水磨化又用沒藥五分磨水一盞於五更又用黃皮末二錢同煎數沸却入盞內頻頻打轉通口於五更時輕輕起喫就仰臥甚者不過三服

蛤蚧散

專治勞嗽

人參酥醋刷炙令黃　白茯苓各一兩慢火炒燥

杏仁六兩去皮尖并雙仁隔紙炒乾搗粉出油盡

蛤蚧雌雄一對入酥內浸透慢火炙乾再用酥醋刷炙令黃熟不得燒損　知母酥醋刷炙令黃　貝母酥醋刷炙令黃　桑皮酥醋刷炙令黃紫各二兩

甘草三兩搥碎用酥醋刷炙紫黃　乳酥眞好者五

兩切作骰子塊入銚內鎔成汁入陳米醋半升和勻同刷炙前藥酢不宜多用只以四合多爲的庶好刷用否則希矣

右件爲末每服二錢水一盞煎至七分服忌油膩生冷毒物如久患嗽者初服此藥其嗽加甚須勤服久則可安須自保惜爲妙

又方

治勞熱瘵肺損止欬嗽

蛤蚧一對洗淨酒酢炙　黃芩　甘草　胡黃連

秦艽　甘草　生地黃　熟地黃　人參焙

柴胡　麻黃　知母　杏仁去皮尖　貝母去心

青蒿各五錢　桔梗　木香　龍膽草各一分

鼈甲一兩酒酢炙

右件爲細末用烏梅薑棗煎服

又方

杏仁一斤　嫩生薑六兩切　人參四兩

右剉碎入新沙鍋內用無根水一斗燒木炭以文武火熬水盡爲度去生薑參查放冷每服杏仁五

七箇頻頻服之

五蒸湯（古今錄驗）

茯苓　甘草　人參　竹葉　生地黃　葛根

知母　黃芩　石膏　粳米二合

右㕮咀以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至一盞溫服隨證加減於後忌海藻菘菜蕪荑酢

實熱加黃芩黃連黃蘗大黃

虛熱氣加烏梅秦艽柴胡血加靑蒿鼈甲蛤蚧小麥牡丹皮

肺蒸鼻乾加烏梅天冬〻麥冬〻紫菀

大腸蒸右鼻孔乾痛加大黃芒硝

皮蒸舌白唾血加石膏桑白皮

膚蒸昏昧嗜臥加丹皮

氣蒸鼻乾喘促徧身氣熱加人參黃芩山梔

心蒸舌乾加黃連生地

小腸蒸下脣焦加赤茯苓生地木通

血蒸髮焦加生地當歸桂心童便

脉蒸唾白浪語脉絡溢脉緩急不調加當歸生地

脾蒸脣焦加白芍木瓜苦參

胃蒸舌下痛加石膏粳米大黃芒硝乾葛

肉蒸食無味而嘔煩躁不安加白芍

肝蒸眼黑加川芎當歸柴胡

膽蒸眼白失色加柴胡苦蔞

筋蒸甲焦加當歸川芎

三焦蒸乍熱乍寒加石膏竹葉

腎蒸兩耳焦加生地石膏知母寒水石

膀胱蒸右耳焦加澤瀉茯苓滑石

腦蒸頭眩熱悶加生地防風羌活

髓蒸髓枯骨中熱加生地當歸天門冬

骨蒸齒黑腰痛足逆冷疳蟲食臟加鼈甲地骨皮

丹皮生地當歸

臀蒸肢細趺腫腑臟皆熱加石膏黃蘗

胞蒸小便赤黃加澤瀉茯苓生地沉香滑石

凡此諸證皆熱病後食肥甘油膩房事飲酒犯之而成久蒸不除變成疳病死期近矣

鼈甲地黃湯（濟生方下同）

治熱勞手足熱煩心怔忡

柴胡　當歸酒浸　麥門冬　鼈甲酢炙　石斛

白朮　熟地黃酒浸焙　茯苓　秦艽各一兩

人參　肉桂　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎至七分去滓溫服不拘時候此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服餌虛甚多汗者勿服

黃芪飲子

治諸虛勞氣四肢倦怠骨節瘦疼潮熱乏力自汗怔忡日漸黃瘦胷膈痞塞不思飲食欬嗽痰多甚則唾血

黃芪蜜炙一兩半　當歸酒浸　石斛　地骨皮

人參　紫菀　桑皮　附子炮去皮臍　款冬花

鹿茸酒蒸各一兩　半夏製　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候此藥溫補榮衞枯燥者不宜進此唾血不止者加阿膠蒲黃各半兩

蛤蚧圓

治積勞欬嗽日久不瘥

蛤蚧酥炙一枚　皂角不蛀者酥炙去皮子兩挺

杏仁童便浸一晝夜去皮尖控乾蜜炒　款冬花

木香　天麻　半夏湯泡七次　熟地黃酒蒸焙

五味子各一兩　丁香半兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五圓加至二十圓食後生薑湯下

太上混元丹

河車者天地之先陰陽之祖乾坤之槖籥鉛汞之匡廓胚胎將兆九九數足我則載而成之故謂之河車歷驗篇中名曰混沌皮蓋亦生天地陰陽之始爲七十二丹之首高士垂慈始開端緒太上云若欲長生當修所生人之所生實資於此所以成功靈應非金石草木夜露曉霜之比倫修眞之士服之不輟誠足以還本元補益之道得其眞也

紫河車一具用少婦首生男子者良臍帶全者於東流水洗斷血脉入麝香二錢在內以線縫定用生絹包裹懸胎於沙甕內入無灰酒五升慢火熬成膏

沉香別研　硃砂別研研水飛各一兩　蓯蓉酒浸
安息香酒熬去沙石　人參　乳香別研各二兩
白茯苓去皮三兩

右爲細末入河車膏子和藥末杵千百下圓如梧桐子大每服七十圓空心溫酒送下沉香湯尤佳

詳此丹以紫河車爲主但佐使之藥太輕無病人久服可以輕身延年補損扶虛乃若病重之人服之却宜用增添之法也男子眞陽氣衰榮衞虛耗腰背疼痛自汗怔忡痰多欬喘夢遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸酒蒸　川巴戟　鍾乳粉　陽起石火煅
附子炮去皮臍　黃芪各二兩　龍骨　鹿角鎊
桑寄生（或以川續斷代）　紫菀各一兩

右依前法修製和前藥末杵和前膏子爲圓湯使如前或沉香湯下

經效阿膠圓

治勞嗽并嗽血唾血

阿膠蛤粉炒　生地黃洗　山藥剉炒　卷柏葉

大薊根　五味子　鷄蘇各一兩　茯苓　人參
百部洗去心　遠志去心甘草水煑　防風去蘆
麥門冬去心　柏子仁炒別研各半兩

右爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓細嚼濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下

蓮心散（丹溪下同）

治虛勞或大病後心虛脾弱盜汗遺精

人參　白茯苓　蓮肉各二兩　白朮　甘草
白扁豆炒　薏苡仁炒　桔梗炒　乾葛炒
黃芪炒　桑皮　半夏麯　百合　乾薑炮
山藥炒　五味　木香　丁香　杏仁炒　白芷
神麯炒各一兩　當歸半兩

右剉每服五錢生薑三片棗同煎空心溫服

黃芪鼈甲散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴欬嗽有血

桑皮　半夏　知母　赤芍藥　黃芪各三兩半
生地三兩　天門冬　鼈甲酢炙各五兩　紫菀

甘草各二兩半　秦艽　白茯苓　柴胡　地骨皮各三兩三錢　人參　肉桂　桔梗各二兩六錢半

右剉每服三錢水煎服

清骨散

治男婦五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡　乾生地黃各二兩　人參　防風

熟地黃　秦艽各一兩　薄苛七錢半　赤茯苓

胡黃連各半兩

右每服四錢水煎溫服

石灰散（葛可久下同）

治勞證嘔血咯血嗽血先用此遏之

大薊　小薊　柏葉　荷葉　茅根　茜根

大黃　山梔　牡丹皮　椶櫚灰

右等分燒灰存性研細用紙包碗蓋地上一夕出火毒用時先以白藕搗碎絞汁或蘿蔔搗絞汁亦可磨眞京墨半碗調灰五錢食後服病輕用此立止病重血出升斗者如神之效

又方

花蕊石燒過存性研如粉

右用童子小便一盞煎酢調末三錢極甚者五錢食後服如男子病則和酒一半婦人病則和酢一半一處調藥立止其瘀血化爲黃水服此藥後其人必疎解其病體却用後藥而補

獨參湯

治勞證後以此補之

人參一兩

右㕮咀水二鍾棗五箇煎不拘時細細服之

保和湯

治勞嗽肺燥成痿者服之決效

知母　貝母　天冬　麥冬　款冬花各三錢

天花粉　薏苡仁　杏仁炒各二錢　五味子

粉草炙　兜鈴　紫菀　百合　桔梗各一錢

阿膠炒　當歸　生苄　紫蘇　薄荷各半錢

右以水煎生薑三片入飴糖一匙入藥內服之每日三服食後進加減於後一方無地黃有百部

血盛加蒲黃茜根藕節大薊茅花

痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實苦蔞實炒

喘盛加桑皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子

熱盛加山梔子炒黃連黃芩黃蘗連翹

風盛加防風荊芥金沸草甘菊細辛香附

寒盛加人參芍藥桂皮五味蠟片

保眞湯

治勞證體虛骨蒸服之決補

當歸　生芐　熟芐　黃芪　人參　白茯苓

赤茯苓　白朮　蓮心各半錢　天冬　麥冬

赤芍　知母　黃蘗炒　五味　白芍　柴胡

地骨　甘草　陳皮各二錢

右以水煎生薑三片棗一枚食後服

驚悸加茯神遠志柏子仁酸棗仁

淋濁加萆薢台烏藥猪苓澤瀉

便澀加木通石葦萹蓄

遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子

燥熱加滑石石膏青蒿鼈甲

盜汗加浮麥子炒牡蠣黃芪麻黃根

太平丸

治勞證欬嗽日久肺痿肺壅並宜噙服

天門冬　麥門冬　知母　貝母　款冬花

杏仁各二錢　當歸　生地　阿膠蛤粉炒

黃連各一兩半　北蜜四兩　蒲黃　京墨

桔梗　薄荷各一兩　麝香少許

右爲末煉蜜和丸如彈子大食後濃煎薄荷湯先灌嗽喉中細嚼一丸津唾送下上牀時再服一丸如痰盛先用餄糖拌消化丸一百丸送下後卽噙嚼此丸仰面睡從其流入肺竅一方有熟地

消化丸

白茯苓　青蒙石煆黃金色　半夏　白礬枯

橘紅　牙皂火炙　南星各二兩　薄荷葉一兩

枳實　枳殼各一兩半

右爲末以神麯打糊丸如梧桐子大每服一百丸上牀時餄糖拌吞次噙嚼太平丸二藥相攻痰嗽掃迹除根

潤肺膏

羊肺一具　白蜜二兩　柿霜　眞酥　蛤粉
杏仁淨研各一兩

右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中白煮熟如常服食與前七藥相間服之亦佳

取傳尸伏尸勞蟲法

天靈蓋十字解者酥炙爲末三分　安息香
虎糞骨用酢炙各半兩（人骨爲上獸骨次之）　鼈甲九肋大者酢炙一兩　桃仁去皮尖二錢半　麝香另研
檳榔一錢　青蒿梢六兩　葱頭一百二十根
童便半碗　桃柳東南枝如筯大每七條各七寸
豉三百粒　楓葉二十一片

右先將青蒿桃柳楓葉葱頭用水二官升煎半乾去查入天靈蓋虎糞骨鼈甲安息香童便煎取汁去查約有四五合將檳榔麝香研勻調作一服早晨空腹服以被蓋汗恐汗內有細蟲以白紙拭之投火中須臾必下如有蟲以大火焚之棄流水中所用藥勿令病者知之半月後氣血復完再進一服依前法三次無蟲乃止以美飲食調理其病自

愈此方必有阿魏半錢

又方

青松一小握　石榴枝　桃枝　桑枝　柳枝

梅枝各七莖長四寸

右用童便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半去查別入安息香阿魏各一分煎至一鍾濾去查調辰砂末半錢檳榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三點時一服至巳牌後取下蟲色紅者可治青者不治見有所下卽進稀粥飲溫煖將息不可食粉麪生冷毒物合時須擇良日不得令猫犬孝服穢惡婦人見之

神人阿魏散

治骨蒸傳尸等寒熱羸勞困倦喘嗽

阿魏三錢　青蒿一握研　東北方桃枝一握切

甘草如病人中指許大男左女右細剉

右以童便二升半隔夜浸藥明旦煎取一大升空心溫服分爲三服每次調入檳榔末三分如人行十里再進一服男病女煎女病男煎合藥時忌孝

子孕婦病人及腥穢鷄犬等物服後忌油膩濕麪生冷硬物服一二劑即吐出蟲子或瀉出更不須服餘藥若未吐利即當盡服病在上則吐在下則利皆出蟲如馬尾人髮即愈服藥後覺五臟虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓湯

白茯苓一錢　遠志去心　龍骨　防風各二錢

生地　麥冬去心各四錢　甘草三分　人參

犀角末各五錢　大棗七枚

右以水二大盞煎作八合分三服溫服如人行十里一服仍避風寒若覺未安隔日更作一服已上藥餌須連服之

犀角紫河車丸

治傳尸勞三月必效其餘勞證只消數服

紫河車一具米泔浸一宿洗淨焙乾　鼈甲酥炙

桔梗　胡黃連　白芍　大黃　敗鼓皮心酢炙

貝母去心　龍膽草　黃藥子　知母各二錢半

芒硝　犀角　蓬朮各一錢半　硃砂二錢

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣空心溫酒服三四十丸

新定拯陰理勞湯（必讀下同）

治陰虛火動皮寒骨熱食少痰多欬嗽短氣倦怠焦煩

生地黃忌銅鐵器薑汁酒炒透二錢　歸身酒洗　麥冬去心　橘紅　丹皮各一錢　蓮子不去衣　苡仁各三錢　白芍藥酒炒七分　北五味三分　人參六分　甘草炙四分

水二鍾棗一枚煎一鍾分二次徐徐呷之肺脉重按有力者去人參有血加阿膠童便熱盛加地骨皮泄瀉減歸地加山藥茯苓倦甚用參三錢欬者燥痰也加貝母桑皮嗽者濕痰也加半夏茯苓不寐加棗仁汗多亦用此余自立之方用治陰虛火熾譬如溽暑伊鬱之時而商飈颯然倏動則炎歊如失矣久服無敗胃之虞

新定拯陽理勞湯

治勞傷氣耗倦怠嬾言動則喘乏表熱自汗心煩

徧身作痛

黃芪酒炒三錢　人參去蘆　白朮土炒各二錢
桂心七分　當歸酒炒一錢半　甘草酒炒五分
陳皮去白一錢　北五味打碎四分

水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾服如煩熱口乾加生地氣浮心亂加丹參棗仁欬嗽加麥門冬挾濕加茯苓蒼朮脈沉遲加熟附子脈數實去桂加生地胷悶倍陳皮加桔梗痰多半夏茯苓泄瀉升麻柴胡口渴加乾葛夏月去肉桂冬月加乾薑

白鳳膏（良方下同）

治久勞積虛欬嗽痰血蒸熱困倦

黑嘴白鴨一隻　大棗二升　參苓平胃散一升
陳煑酒一瓶

將鴨縛定量病人飲酒多少以酒盪溫割開鴨頂滴血入酒飲之直入肺經受補將鴨去毛於脇邊開一孔取去腸雜拭淨次將棗去核每箇中納參苓散填滿鴨腹中麻線紮定沙鍋內用火慢煨將酒三次添入以乾爲度但食其棗參湯送之取鴨

肉搗丸服

芎歸血餘散

治傳屍勞瘵去鬼殺蟲

室女頂門生髮一小團皂角湯洗淨酢浸一宿曬乾紙撚火燒存性　川芎五錢　當歸三錢　木香桃仁去皮尖研各二錢　安息香　雄黃各一錢全蠍二枚　江上大鯉魚生取頭酢炙

右爲末分四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降眞香末五分燒北斗符入藥月初五更空心向北仰天呪曰瘵神瘵神害我生人吾奉

帝勑服藥保身急急如律令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹中燒降香置牀下午時又如前服藥

北斗符式　勑



用黃紙一方新筆淨水研透明硃砂書此符書時念前北斗呪

鼈甲生犀散

殺勞蟲取下惡物

天靈蓋一具男者色不赤可用女者色赤勿用檀香

煎湯候冷洗呪曰電公靈雷公聖逢傳屍即須應急急如律令呪七遍訖次用酥炙黃　桃仁去皮炒

安息香　檳榔各五錢　生鼈甲一枚酢炙

虎長牙二枚酢炙　生犀角　木香　降眞香

甘遂　乾漆炒存性　阿魏酒浸研各三錢

雷丸二錢　穿山甲取趾酢炙　全蠍三箇

蚯蚓十條生研和藥

右爲末每服五錢先用豉心四十粒東向桃李桑梅小梢各二莖長七寸生藍青七葉青蒿一小握葱白連根洗五莖石臼內同杵用井水一碗半煎取一盞入童便一盞內藥末煎取七分入麝一字月初旬五更空心溫服即以被覆取汗恐汗中有細蟲軟帛拭之即焚其帛少時必瀉以淨桶盛急鉗取蟲烈火焚之並收入磁瓶中雄黃蓋之以瓦油盞鐵線紮定泥固埋深山中絕人行處

大補元煎（景岳全書下同）

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊化救本培元第一要方

人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢
山藥炒　杜仲各二錢　山茱萸一錢（如畏酸吞酸者去之）
熟地少則二三錢多則二三兩　當歸（若泄瀉者去之）
枸杞各二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

此壯水之劑也凡命門陰衰陽勝者宜此方主之

熟地黃二三錢或加至一二兩　茯苓一錢半
山茱萸一二錢（畏酸者少用之）　炙甘草一錢　山藥
枸杞各二錢

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

此益火之劑也凡命門陽衰陰勝者宜此方主之

熟地用如前　山茱萸一錢　山藥　枸杞
杜仲薑製各二錢　製附子一二三錢　肉桂
甘草炙各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治眞陰腎水不足不能滋養榮衛漸至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原或虛損傷陰或遺淋不禁或氣虛昏運或眼花耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津液枯涸等證俱速宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

大懷熟地八兩　川牛膝酒洗蒸熟三兩（精滑者不用）

龜膠碎炒珠（無火者不必用）　鹿膠碎炒珠　山藥炒

枸杞　山茱萸肉　菟絲子製各四兩

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治元陽不足先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而爲脾胃虛寒等證

大懷熟地八兩　山茱萸微炒　當歸各三兩（便溏勿用）

肉桂二兩漸可加至四兩　山藥炒　枸杞微炒

鹿角膠炒珠　杜仲薑汁炒　菟絲子製各四兩

製附子自二兩漸加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

五福飲

凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　甘草一錢

白朮炒一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

一陰煎

此治水虧火勝之劑凡腎水眞陰虛損而脈證多陽虛火發熱及陰虛動血等證宜用此加減主之

生地　芍藥　麥冬　丹參各二錢　甘草一錢

熟地三五錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

治證如前而火之甚者宜用此方

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

二陰煎

此治心經有熱水不制火之病

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　元參
茯苓　木通各一錢半　甘草一錢　黃連一二錢

水二鍾加燈草二十根竹葉亦可煎七分食遠服

三陰煎

治肝脾虛損精血不足及營虛失血等證

當歸二三錢　熟地黃三五錢　炙甘草一錢
芍藥酒炒　棗仁各二錢　人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

四陰煎

此保肺清金之劑治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴欬嗽吐衄多熱等證

生地二三錢　茯苓一錢半　生甘草一錢
麥冬　白芍藥　百合　沙參各二錢

水二鍾煎七分食遠服

五陰煎

治眞陰虧損脾虛失血等證

熟地五七錢或一兩　扁豆炒二三錢　山藥炒
芍藥炒黃各二錢　茯苓一錢半　人參隨宜
五味子二十粒　白朮炒　甘草炙各一二錢
水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎

治眞陰精血虧損或氣血虛寒心腹疼痛等證
當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞
杜仲各二錢　牛膝一錢半　桂　炙草各一二錢
水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

治血少陰虛此性味平和之方也
熟地二三錢　當歸　芍藥酒炒　山藥炒
枸杞各二錢　炙甘草一錢
水二鍾煎七分食遠溫服

贊化血餘丹

此藥大補氣血
血餘　熟地蒸搗各八兩　枸杞　鹿角膠炒珠
當歸　菟絲子製　杜仲鹽水炒　小茴香略炒

巴戟肉酒浸剝炒乾　茯苓乳拌蒸熟　胡桃肉

何首烏用小黑豆汁拌蒸七次如無黑豆或人乳牛乳拌蒸　蓯蓉酒洗去鱗甲各四兩　人參隨便

右煉蜜丸服每食前用滾白湯送下二三錢許

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰

熟地三五錢　當歸　半夏　茯苓各二錢

陳皮一錢半　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

保陰煎

治一切陰虛內熱動血等證

生地　熟地　芍藥各二錢　山藥　川續斷

黃芩　黃蘗各一錢半　生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

四味回陽飲

治元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　製附子　炮乾薑各二三錢

炙甘草一二錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子

炮乾薑各二三錢　歸身三錢（如泄瀉及血動者冬朮代多多益善）

熟地五錢或一兩

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治脾腎中虛等證

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食等證

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　乾薑炒焦一二三錢　炙草一錢

當歸一二錢（滑泄者勿用）　陳皮一錢或不用

水二鍾煎七分食遠溫服

鎭陰煎

治陰虛於下格陽於上眞陽失守等證

熟地一二兩　炙甘草一錢　澤瀉一錢半

川牛膝二錢　製附子五七分或一二三錢

肉桂一二錢

水二鍾速煎服

六氣煎

治男婦陽氣虛寒等證

黃芪炙　肉桂　人參　白朮　當歸　炙甘草

右咀水煎服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八三〇

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十七卷目錄

醫部彙考三百七

虛勞門五

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百二十七卷

醫部彙考三百七

虛勞門五

單方

百草頭上秋露八月朔日收取摩墨點膏肓穴治勞瘵謂之天灸（外臺祕要下同）

骨蒸發熱雄黃一兩入小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃淋濃汁於石上置薄氈於上患人脫衣坐之衣被圍住勿令洩氣

三五度瘥

肺勞欬嗽雌黃一兩入瓦盒內不固濟坐地上以土培之厚二寸以炭一斤簇定頂火煅三分去一退火出毒爲末糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三丸（斗門方）

骨蒸勞病外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉水和服方寸匕日再以身涼爲度（外臺祕要）

李補闕服乳法主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽不老令人有子取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者卽堪入鍊惟黃赤二色不任用置於金銀器中大鐺著水沉器煑之令如魚眼沸水減卽添乳少三日三夜乳多七日七夜候乾色變黃白卽熟如疑生更煑滿十日最佳取出去水更以清水煑半日其水色清不變卽止乳無毒矣入瓷鉢中玉槌著水研之

覺乾濇卽添水常令如稀米泔狀研至四五日揩之光膩如書中白魚便以水洗之不隨水落者卽熟落者更研乃澄取暴乾每用一錢半溫酒空服調下兼和丸散用其煑乳黃濁水切勿服服之損人咽喉傷肺令人頭痛或下利不止其有犯者但食猪肉解之（千金方）

鍾乳煎治風虛勞損腰脚無力補益强壯用鍾乳粉鍊成者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可煑三十度卽力盡別作袋每煎訖酒濯淨令通氣其滓和麫喂鷄生子食之此崔尚書方也（千金翼下同）

補益勞損用白石英末三斤和黑豆與十歲以上生犢牸牛食每日與一兩七日取牛乳或熱服一升或作粥食其糞種菜食百無所忌潤臟腑澤肌肉令人壯健

一切勞嗽胷膈痞滿焚香透膈散用鵝管石雄黃佛耳草款冬花等分爲末每用一錢安香爐上焚之以

筒吸烟入喉中日二次（宣明方）

元氣虛寒精滑不禁大腸溏泄手足厥冷陽起石煅研鍾乳粉各等分酒煑附子末同麪糊丸梧子大每空心米飲服五十丸以愈爲度（濟生方）

虛勞骨蒸熱病芒硝研末水服方寸匕日二神良（千金方）

勞瘵有蟲硼砂硇砂兔屎等分爲末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾挼汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之（乾坤祕韞）

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發瘡癤或先癰疽而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃芪箭簳者去蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黃爲末每服二錢白湯點服早晨日午各一服亦可煎服名黃芪六一湯（外科精要）

脾胃虛弱不思飲食生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩銀鍋煎成膏每米飲調服一匙（普濟方）

陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭運人參五錢熟附子一兩分作四帖每帖以生薑十片流水二盞煎一盞食遠溫服方（濟生）

補益勞傷精敗面黑用菟蓉四兩水煑令爛細切研精羊肉分爲四度下五味以米煑粥空心食（藥性論）

參朮膏治一切脾胃虛損益元氣白朮一斤人參四兩切片以流水十五椀浸一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服（集簡方）

腹中虛冷不能飲食食輙不消羸弱生病朮二斤麴一斤炒爲末蜜丸梧子大每服三十丸米湯下日三服大冷加乾薑三兩腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩（肘后方）

骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服（廣利方）

虛勞發熱柴胡人參等分每服三錢薑棗同水煎服（澹寮方）

勞瘵熏法甘松六兩元參一斤爲末每日焚之（良方）

胃弱嘔逆不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一

盞煑取汁入生薑汁半合和白麪作撥刀以羊肉臛汁煑熟空心食之（普濟方）

男女五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髭鬚補骨脂一斤酒浸一宿曬乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕簸去只取補骨脂爲末醋煑麪糊丸如梧子大每服二三十丸空心溫酒鹽湯任下（經驗方）

冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子湯下二十丸至三十丸微吐不妨後用棗湯下立效（聖濟總錄）

男婦勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心及臥時溫酒吞下二十丸（斗門方）

虛勞寒熱肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子小便浸三日曬乾爲末每服二錢烏梅一箇煎湯服（靈苑方）

骨蒸鬼氣童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三

大斗去滓漉釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以瓷器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟爲末以煎和擣千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸止（海上方）

骨蒸煩熱青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫服（十便良方）

男女虛損或大病後或積勞後四體沉滯骨肉酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾脣燥或飲食無味多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削用生地黃二斤麪一斤擣爛炒乾爲末每空心酒服方寸匕日三服忌如法（肘後方）

虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗攪勻煎膏服（必效方）

骨蒸勞熱張文仲方用生地一升擣三度絞盡分再服若利即減之以涼爲度（外臺祕要）

勞氣欲絕麥門冬一兩甘草炙二兩粳米半合棗二枚竹葉十五片水二升煎一升分三服（活人書）

虛勞客熱麥門冬煎湯頻飲（本草衍義）

骨蒸積熱漸漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合

煎取四合去滓空心分爲二服如人行五里再服（廣利方）

傳尸勞瘵王瓜焙爲末每酒服一錢（十藥神書）

補益虛損極益房勞用蘿摩四兩枸杞根皮五味子柏子仁酸棗仁乾地黃各三兩爲末每服方寸匕酒下日三服（千金方）

肝勞生蟲眼中赤脈吳茱萸根爲末一兩半粳米半合鷄子白三箇化蠟一兩半和丸小豆大每米湯下三十丸當取蟲下（千金方）

羊汁粥鷄汁粥並治勞損

牛乳粥補虛羸

鹿角膠入粥食助元陽治諸虛

胃虛不尅神麴半斤麥芽五升杏仁一升各炒爲末煉蜜丸彈子大每食後嚼化一丸（普濟方）

飽食便臥得穀勞病令人四肢煩重默默欲臥食畢輒甚用大麥糵一升椒一兩並炒乾薑三兩搗末每服方寸匕白湯下日三（肘后方）

人參酒補中益氣通治諸虛用人參末同麯米釀酒

或袋盛浸酒煑飲

茯苓酒治頭風虛眩暖腰膝主五勞七傷用茯苓粉同麴米釀酒飲之

脾胃虛冷不下食傾久羸弱成瘵者用溫州白乾薑漿水煑透取出焙乾搗末陳廩米煑粥飲丸梧子大每服三五十丸白湯下其效如神（圖經）

脾胃虛弱飲食減少易傷難化無力肌瘦用乾薑頻研四兩以白餳切塊水浴過入鐵銚鎔化和丸梧子大每空心米飲下三十丸（十便良方）

虛勞不眠乾薑爲末湯服三錢取微汗出（千金方）

益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中以酒一大匙熬令香旋添酒一盞攪令勻空心飲之每旦一服（聖惠方）

萬病丸治男婦五勞七傷一切諸疾杏仁一斗二升童子小便煑七次以蜜四兩拌勻再以童便五升於碗內重蒸取出日曬夜露數日任意嚼食卽愈

傳尸鬼氣欬嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦桃仁一兩去皮尖研水一升半煑汁入米作粥空心食之

虛冷短氣川椒三兩去目幷合口者以生絹袋盛浸無灰酒五升中三日隨性飲之

腹內虛冷用生椒擇去不折者四十粒以漿水浸一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐顏黑髮明目令人思飲食方（斗門）

傳尸勞疰最殺勞蟲用眞川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之炒出汗取放地上以砂盆蓋定以火灰密遮四旁約一時許爲細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十丸食前鹽湯下服至一斤其疾自愈方（三因）

骨蒸作熱桃仁一百二十枚留尖去皮及雙仁杵爲丸平旦井華水頓服之令盡量飲酒至醉仍須任意喫水隔日一劑百日不得食肉（外臺祕要）

脾胃虛弱胷膈不快不進飲食用華澄茄爲末薑汁打神麯糊丸梧子大每薑湯下七十丸日二服（濟生方）

脾勞發熱有蟲在脾中爲病令人好嘔者東行茱萸根大者一尺大春子八升橘皮二兩三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火薄暖之絞去查平旦空腹服一升

取蟲下或死或半爛或下黃汁凡作藥時切忌言語（刪繁方）

補虛益損水芝丹用蓮實半升酒浸二宿以牙猪肚一箇洗淨入蓮在內縫定煮熟取出曬乾爲末煮米糊丸梧子大每服五十丸食前溫酒送下（醫學發明）

補益虛弱用烏雄鷄一隻治淨五味煮極爛食生卽反損人或五味醃炙食亦良

男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘惙或小腹拘急心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭難治也用烏雌鷄一頭治如食法以生地黃一斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯於瓶中蒸五升米熟取出食肉飲汁勿用鹽一月一作神效（姚生坦方）

脾胃弱乏人痿黃瘦黃雌鷄肉五兩白麪七兩切肉作餛飩下五味煮熟空心食之日一作益顏色補臟腑（壽親）

虛勞瘵疾烏鴉一隻絞死去毛腸入人參片花椒各五錢縫合水煮熟食以湯下鴉骨參椒焙研棗肉丸

服（食療）

心氣虛損猪腰子一枚水二碗煑至一碗半切碎入人參當歸各半兩煑至八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服（百一選方）

傳尸勞瘵猪腰子一對童子小便二盞無灰酒一盞新瓷瓶盛之泥封炭火溫養自戌至子時止待五更初溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦怯者亦可用之蓋以血養血絕勝金石草木之藥也（經驗方）

補益虛羸用猪肚一具入人參五兩蜀椒一兩葱白七箇粳米半升在內密縫煑熟食（千金翼下同）

補益虛寒精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米中蒸熟取石英和葱薑作小餛飩子每日空腹以冷漿水吞一百枚甚補益

骨蒸久冷羊肉一斤山藥一斤各爛煑研如泥下米煑粥食之（飲膳正要）

骨蒸傳尸用羊肉一拳大煑熟皂莢一尺炙以無灰酒一升銅鐺內煑三五沸去滓入黑錫一兩令病人

先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾爲效（外臺祕要）

五勞七傷白羊頭蹄一具淨治更以稻草燒烟熏令黃色水煑半熟納胡椒蓽茇乾薑各一兩葱豉各一升再煑去藥日食一具七日卽愈（千金方下同）

虛勞口乾千金用羊脂一鷄子大醇酒半升棗七枚漬七日食立愈外臺用羊脂鷄子大納半斤酢中一宿絞汁含之

五勞七傷陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉蓯蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹下葱鹽五味食（經驗方）

陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一莖枸杞葉一斤同五味煑成汁下米作粥食之（正要）

虛損勞傷羊腎一枚米一升水一斗煑九升服日三（肘後方）

久病虛羸不生肌肉水氣在脅下不能飲食四肢煩熱者用羊腎一枚白朮一升切水二斗煑九升分九服日三不過三劑瘥（張文仲方）

老人虛弱白羊脊骨一具剉碎水煑取汁枸杞根剉

一斗水五斗煮汁一斗五升合汁同骨煑至五升去骨瓮盆盛之每以二合和溫酒一盞調服（多能鄙事）

虛勞瘦弱用羊脛骨四十枚以水一升熬減大半去滓及油待凝任食（正要）

骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨上氣釜煑入桃柳枝各五斗煑枯再入棘針三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸令患者正坐散髮以湯從頂淋之惟熱爲佳若心悶可少進冷粥當得大汗出惡氣汗乾乃粉身食豉粥（拾遺）

五勞七傷用乾漆柏子仁山茱萸酸棗仁各等分爲末蜜丸梧子大每服二七丸溫酒下日二服（千金方）

卒熱勞疾皂莢續成一尺以土酥一大兩微塗緩炙酥盡搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑愈（海上方）

急勞煩熱體瘦三皂丸用皂莢皂莢樹皮皂莢刺各一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每空心溫水下七七丸（聖惠方）

脾胃虛弱不思飲食食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳枝一大把熬湯煮小米作飯灑麪滾成珠子曬乾袋懸風處每用滾水隨意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可頓食之久則麪散不粘矣名曰絡索米（簡便方）

膽虛不眠心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗爲散每服二錢竹葉湯調下和劑局方加人參一兩辰砂半兩乳香二錢半煉蜜丸服

虛損白病久服髮白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透曬乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩爲末桑葚子三月收陰乾十兩爲末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑葚搗汁和藥七月收旱蓮搗汁和藥即不用蜜矣（簡便方）

骨蒸不眠心煩用酸棗仁一兩水二盞研絞取汁下粳米二合煮粥候熟下地黃汁一合再煮勻食（聖惠方）

虛勞不足五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七斗分取四斗浸麴一斗以三斗拌飯如常釀

酒法待熟任飲（千金方下同）

五勞七傷五月五日采五加莖七月七日采葉九月九日取根治下篩每酒服方寸匕日三服久服去風勞

虛勞客熱枸杞根爲末白湯調服有痼疾勿服（千金方）

熱勞如燎地骨皮二兩柴胡一兩爲末每服二錢麥門冬湯下（聖濟總錄）

虛勞苦渴骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三升小麥二升水二斗煑至麥熟去滓每服一升口渴卽飲（千金方）

五勞七傷庶事衰弱枸杞半斤切粳米二合豉汁和煑作粥日日食之良（經驗方）

久勞欬嗽吐臭痰者尋水邊蛇吞青鼃未嚥者連蛇打死黃泥固濟煆研空心酒服一二錢至效忌生冷五七日永不發也（祕韞方）

骨蒸勞瘦用鰻鱺二斤治淨酒二盞煑熟入鹽酢食之（聖惠方）

脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱椒醬調

炙熟空心冷食（養老方）

骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾用鹿角二兩牛膝酒浸焙一兩半爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽酒下（濟生方）

補益虛羸鹿骨煎用鹿骨一具枸杞根二升各以水一斗煎汁五升和勻共煎五升日二服（千金方）

勞瘵失血田龜煑取肉和葱椒醬油煑食補陰降火治虛勞失血咯血欬嗽寒熱累用經驗（食療）

骨蒸欬嗽潮熱團魚丸用團魚一箇柴胡前胡貝母知母杏仁各五錢同煑待熟去骨甲裙再煑食肉飲汁將藥焙研爲末仍以骨甲裙煑汁和丸梧子大每空心黃芪湯下三十丸日二服服盡仍治參芪藥調之（奇效方）

骨蒸熱勞取人尿乾者燒令外黑納水中澄淸每旦服一小升薄晚服童便一小升以瘥爲度既常服可就作坑燒尿三升夜以水三升漬之稍稍減服此方神妙非其人莫浪傳之（外臺秘要）

骨蒸發熱三歲童便五升煎取一升以蜜三匙和之

每服二碗半日更服此後常取自己小便服之輕者二十日重者五十日瘥二十日後當有蟲如蜒蚰在身常出十步內聞病人小便臭者瘥也台州丹仙觀道士張病此自服神驗（必效方）

男婦怯證男用童女便女用童男便斬頭去尾日進二次乾燒餅壓之月餘全愈（聖惠方）

虛損勞瘵德生丹用無病婦人乳三酒盃將磁碟曬極熱置乳於中次入麝香末少許木香末二分調勻服後飲濃茶三酒盃如前曬碟盛人乳并人胞末一具調服服畢面膝俱赤如醉思睡只以白粥少少養之（集簡方）

接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證用人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和勻銀石器內頓滾每日五更一服能消痰補虛生血延壽此乃以人補人其妙無加（衆妙方）

天靈蓋散追取勞蟲天靈蓋二指大以檀香煎湯洗過酥炙一氣呪七遍云雷公神電母聖逢傳尸便須定急急如律令尖檳榔五枚阿魏二分麝香三分辰

砂一分安息香三分甘遂三分爲末每服三錢用童便四升入銀石器內以葱白薤白各二七莖青蒿二握桃枝甘草各二莖五寸長者柳枝桑枝酸榴枝各二莖七寸長同煎至一升分作二次五更初調服前藥一服蟲不下約人行十里又進一服天明再進取下蟲物名狀不一急擒入油鐺煎之其蟲嘴青赤黃色可治黑白色難治然亦可斷傳染之患凡修合先須齋戒於遠處淨室勿令病人聞藥氣及鷄犬猫畜孝子婦人一切汚穢之物見之蟲下後以白粥補之數日之後夢人哭泣相別是其驗也（上清紫庭仙方）

五勞七傷吐血虛瘦用初生胞衣長流水中洗去惡血待清汁出乃止以酒煑爛搗如泥入白茯神末和丸梧子大每米飲下百丸忌鐵器（集驗方）

虛損骨蒸用天靈蓋如梳大炙黃以水五升煑取二升分三服起死神方也（千金方）

又方人頭骨炙三兩麝香十兩爲末搗千杵丸梧子大每服七丸飲下日再服若胷前有青脉出者以針刺看血色未黑者七日瘥（備急方）

白鳳膏葛可久云治久虛發熱欬嗽吐痰欬血火乘金位者用黑嘴白鴨一隻取血入溫酒量飲使直入肺經以潤補之將鴨乾撏去毛脅下開竅去腸拭淨入大棗肉二升參苓平胃散末一升縛定用沙甕一箇置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之酒乾爲度取起食鴨及棗頻作取愈（十藥神書）

虛勞不眠酸棗仁榆葉等分爲末蜜丸如梧子每服十五丸日再（千金方下同）

補虛羸九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煑五六沸取出細研濾汁令其子極淨曝令乾搗末和前汁微火煎令可丸酒服二方寸匕日二加至三匕名枸杞煎亦可丸服三十九

又方杏仁三升內湯中去皮尖兩仁熟搗水研取七八升汁以鐵釜置煻火上取羊脂四斤就釜內磨消內杏仁汁溫之四五日色如金狀餌如彈子日三服百日肥白容易人不能識名夏姬杏仁煎

又方豉一升蒸三徧薤白一斤切以水七升煑取三升分三服小取汗

又方不中水猪肪煎取一升內葱白一握煎令黃出內盆中平旦空腹服訖暖覆臥至晡時食白粥粥不得稀過三日服補藥方用羊肝一具羊脊膂肉一條麴末半斤枸杞根十斤以水三斗煑枸杞取一斗去滓細切肝等內汁中煑著葱豉鹽如羹法合煎看如稠餹卽好食之七日禁如藥法

傳尸伏尸皆有蟲令病人仰手掌以帛覆其上燒乳香熏其手背良久手背上出毛長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者卽死最驗若熏良久無毛者卽非此證屬勞瘵虛損宜用參芪溫補之藥（綱目下同）

尸疰鬼疰用桃仁五十枚研以水煑取四升作一服盡當吐如病不盡二三日再服

鍼灸

素問曰肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者

心虛則胷腹大脅下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者

脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者

肺虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太

陽之外厥陰內血者

腎虛則胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者

靈樞經曰三焦並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之

形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣

邪之所在皆爲不足故上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之苦傾目爲之眩中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則乃爲痿厥心悗補足外踝下畱之

下虛則厥上虛則眩虛者引而留之

刺有五奪形肉已奪是一奪也大奪血之後是二奪也大汗出之後是三奪也大泄之後是四奪也新產及大血之後是五奪也此皆不可瀉

千金方曰左手關上陰絕者無肝脉也若癃遺溺難

言脅下有邪氣善吐刺足少陽治陽

肝虛目不明灸肝腧二百壯

左手關上陽絕者無膽脈也若膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

膽虛灸三陰交各二十壯穴在內踝上一尺

左手關前寸口陰絕者無心脈也若心下熱痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽

左手關前寸口陽絕者無小腸脈也若臍痺小腹中有疝瘕王月卽冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分

右手關上陰絕者無脾脈也若少氣下利腹滿身重四肢不欲動善嘔刺足陽明治陽

右手關上陽絕者無胃脈也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本節後一寸

右手關前寸口陰絕者無肺脈也若短氣欬逆喉中塞噫逆刺手陽明治陽

肺風氣痿絕四肢滿脹喘逆胷滿灸肺腧各二壯肺

腧對乳引繩度之在第三椎下兩旁相去各一寸五分

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也若少氣心下有水氣立秋節卽欬刺手太陽治陰在魚際間

左手關後尺中陰絕者無腎脉也若足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽

右手關後尺中陰絕者無腎脉也若足逆冷上搶胷痛夢入水見鬼善魘寐黑色物來掩人上刺足太陽治陽

腎氣虛寒灸腎腧百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸五分

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也病若逆冷婦人月水不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脉是也

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也病若足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

膏肓腧無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝

前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩股肉之表肋間空處按之自覺牽引胷戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下礱礱然如流水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從左肩上拄指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小常定不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣壯旺當消息以自補養取身體平復其穴近第五椎相準望取之

濟生方曰崔丞相灸勞法外臺祕要崔相家傳方及王寶臣經驗方悉編載然皆差誤毘陵郡有石刻最詳予取諸本參校成此一書比古方極爲委曲依此治人未嘗不驗往往一灸而愈予在宜城久病虛羸

亦用此而愈取穴法先兩穴令患人平身正立取一細繩蠟之勿令展縮順脚底貼肉堅踏之男左女右其繩前頭與大拇指端齊後頭令當脚根中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲䐐中大橫紋截斷又令患人解髮分兩邊令見頭縫自顖門平分至腦後乃平身正坐取向所截一頭令與鼻端齊引繩向上正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以墨點記之（墨點不是灸處）又取一繩子令患人合口將繩子按於口上兩頭至吻却勾起繩子中心至鼻柱根下如△此便齊兩吻截斷將此繩展令直於前來脊骨上墨點處橫量取平勿令高下繩子先中摺當中以墨記之却展開繩子橫量以繩子上墨點正壓脊骨上墨點爲正兩頭取平勿令高下於繩子兩頭以白圈記白圈是灸穴

以上是第一次點二穴

次二穴令其人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向前雙垂與鳩尾齊鳩尾是心岐骨人有無心岐骨者至雙胷前兩岐骨下量取一寸即是鳩尾也即雙截

斷却背翻繩頭向項後以繩子中停取心正令當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記之（墨點不是灸處）又取一繩子令其人合口橫量齊兩吻截斷還於脊骨上以墨點橫量如法繩子兩頭以白圈記之白圈處是灸穴

以上是第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七壯至二七壯累灸至一百壯或一百五十壯爲妙候瘡欲差又依後法灸二穴

又次二穴以第二次量口吻繩子於第二次雙繩頭盡處墨點上當脊骨直上下豎點令繩中停中心在墨點上於上下繩盡頭以白圈兩穴白圈是灸穴

以上是第三次點兩穴謂之四花灸兩穴各百壯

三次共六穴各取離日量度訖卽下火惟須三月三日艾最佳疾差百日內愼飲食房室安心靜處將息若一月後覺未差復初穴上再灸

丹溪心法曰大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生則陰長故也

醫學綱目曰體熱勞嗽取魄戸瀉之

五勞羸瘦取足三里

骨蒸熱不可治者或前板齒乾燥取大椎

又法鳩尾灸二七壯補之

傳尸勞取涌泉於第二足指端量至跟盡折中是穴針三分瀉六吸傷寒及勞瘵之證有血可治無血必危凡欲出血刺入二分便須彈指又豐隆治痰針入一寸瀉十吸又丹田治氣喘針入三分補二呼

醫學入門曰方書云虛損勞瘵只宜早灸膏肓穴此乃虛損未成之際如瘦弱兼火亦只宜灸內關三里以散其痰火早年欲作陰火不宜灸

導引

道藏經曰每庚申夜不睡守至曉屍蟲不能爲害三守庚申三屍長絕每夜叩齒三十六通左手捧心呼三屍名上屍彭琚出中屍彭瓆出下屍彭璚出令不得爲害常以庚申去手甲丑日去足甲七月十六日將所去手足甲燒灰水和服之三屍九蟲皆滅

古今醫統曰滅三屍九蟲導引法以兩手著頭相叉長氣卽吐之坐地緩舒兩脚以兩手外抱脚中疾低頭入膝中兩手交叉頭上十三通愈三蟲也

又法叩齒二七通取咽氣二七如三百通乃止爲之二十日邪氣并退六十日病小愈百日大病除三尸伏蟲去肌膚光澤

保生祕要曰癆者勞也感於本來不足兼之後天常耗七情傷重色慾越度精虧氣竭腎中藏火心君馳蕩火上干肺肺竅不清眞水不溉津液炙乾而爲痰嗽嘔血盜汗午後骨蒸上盛下虛皮焦面白四肢無力小水短澀或元精不固遺漏爲害或外腎藏縮浮氣爲喘皆虛怯之證急早行功免至危險

導引法掌心無事任擦搓早晚摩兩脅腎腧耳根湧泉百四十回固精多效朝服人乳酒飲清潔童便或服循環水用薑棗以煖脾宮或用秋石化鹽取其滋陰降火若虛損不能服參者宜依方進氣取效雖至危漏底諸藥難治者用好臍帶數條炙燥爲末每服二錢好酒量意調服神驗也戒惱怒絕思慾忘言守靜若能踵息起死還生

運功一指歸元三提三咽念四字呪於分寸虛虛抱守妄念返復持一死字世事盡歸於空抱守二七痰

涎稍清運動過天借督脉按四時進退有神功

嘔紅起念艮背運行庭歸元合用百日功夫勿使間斷骨蒸盜汗痰嗽盡愈

先顧本源念復用火燒蟲其蟲自不能容或從口中飛出人可避之

弱病先於背上念又向兩乳下推開兩旁轉至兩腎復上轉至頭又下至臍其沉重者先臍上念又升腎水上至頂門滴下心頭歸臍先念背顧本源若身潮熱者或升湧泉或升腎水遍身周流其熱自退

醫案

儒門事親曰西華束茂之病虛勞寢汗面有青黃色自膝以下冷痛無汗腹中燥熱醫以薑附補之五晦朔不令飲水又禁梳頭作寒治之請於戴人戴人曰子之病不難愈難於將護恐愈後陰道轉茂子必不慎束生曰不敢戴人先以舟車丸濬川散下五七行心火下降覺渴與冰水飲之又令澡浴數日間面紅而澤後以河水煮粥溫養脾胃河水能利小溲又以活血當歸丸人參柴胡散五苓散木香白朮散調之

病大瘥寢汗皆止兩足日煖食進戴人常曰此本肺痹當以凉劑蓋水之一物在目爲淚在皮爲汗在下爲小溲穀多水少爲常無水可乎若禁飲水必內竭內竭則燥熱生焉人若不渴與水亦不肯飲之矣束生既愈果忘其戒病復作戴人已去乃殂

薛己醫按曰州同韓用之色慾過度煩熱作渴飲水不絕小便淋瀝大便祕結唾痰如湧面目俱赤滿舌生刺兩脣燥裂遍身發熱或身如芒刺而無定處兩足心如烙左三部脈洪而無倫此腎陰虛陽無所附而發於外蓋大熱而甚寒之不寒是無水也當峻補其陰遂以加減八味丸料一斤內肉桂一兩以水頓煎六碗冰冷與飲半晌熟睡至晚又溫飲一碗諸證悉退翊日畏寒足冷至膝諸證仍至是無火也當補其陽急以八味丸四劑諸證頓退

舉人陳履賢色慾過度孟冬發熱無時飲水不絕痰涎上湧遺精不止小便淋瀝或用四物二陳之類胷膈不利飲食少思大便不實余朝用四君子湯加熟地當歸夕用加減八味丸更以附子唾津調搽湧泉

穴漸愈

府庠王以道元氣素弱丙午丁未二年以科場歲考積勞致疾至十二月間其病盛作大熱淚出隨凝目赤面黯揚手露胷氣息沉沉幾絕脉洪大鼓指按之如無舌乾捫之如刺此內眞寒而外假熱也遂先服十全大補湯余曰既服此湯其脉當收斂爲善少頃熟睡覺而惡寒增衣脉頓微細如絲此虛寒之眞象也余以人參一兩加熟附三錢水煎頓服而安夜間脉復脫余以參二兩熟附五錢仍愈後以大劑參朮歸身炙甘草等藥調理而安

醫學正傳曰金儒元國子生也年五十餘身略瘦十年前得內傷挾外感證一醫用發表疎利之劑十數日後熱雖退而虛未復胷中痞滿氣促眩運召予治以補中益氣湯間與東垣消痞丸陳皮枳朮丸等藥調理而安但病根未盡除而住藥故眩運或時而舉不甚重及至此年因往杭城受跋涉辛苦又兼色慾之過還家眩運大作歷數醫皆與防風羌活荆芥南星半夏蒼朮等去風濕消痰之劑病愈重一日十

數次厥去片時復甦凡動或轉側即厥不知人事舉家徨徨呌哭召予治診其六脈皆浮洪而濡予曉之曰此氣血大虛證幸脈不數而身無大熱不死但恐病愈後而有數年不能下榻行動病者曰只要有命臥亦甘心與大補氣血之藥倍人參黃芪或加附子引經合大劑一日三貼又煎人參膏及作紫河車丸補陰丸之類間服如此調理二月餘服煎藥二百餘貼丸藥三五料用人參五六斤其證漸不厥飲食如故但未能行動越五六年方得起而步履如初

東暘邑庠鄒掌教發大汗戰慄振掉片時許發燥熱身如火燒又片時許出大汗如雨身體若冰冷而發寒戰如前寒後又熱熱後又汗三病繼作而晝夜不息庠生盧明夫作瘧證治不效召予診其右手陽脈數而浮洪無力陰脈略沉小而亦虛左三部比右差小而亦浮軟予曰此陽虛證也用補中益氣湯倍參芪減升柴一半加尿浸生附子一錢半炒黃蘗三分乾薑薄桂各五分大棗一枚同煎服一服而病去三分二服而減半四服寒熱止而身尚有微汗去桂附

乾薑一半服二貼全愈

醫宗必讀曰何邑宰令郎虛損形瘁遺精盜汗已瀕於危見余拙刻微論藥解脉象諸書遣使聘余手書愷切余感其言遂往比至而病益進矣簡其所服以四物知蘗爲主芩連二冬爲加減診其脉大而數按之極軟余曰中氣大寒反爲藥苦矣乃以歸脾湯入肉桂一錢人參五錢當晚得熟寐居十日而汗止精藏更以還少丹兼進補中益氣間服一月而差

少宗伯顧鄰初丙辰年患發熱困倦目昏耳鳴脚軟不能行大便燥結手足痲痹腰膀疼痛余診之曰腎虛不能上交心虛不能下濟且尺脉遲軟力勉其用八味丸十全大補湯加圓眼三十枚五十餘日精神漸旺肌肉漸充致書鳴感一日多飲虎骨酒大便仍結醫者皆云八味丸非久服之藥十全大補宜去肉桂反用知母元參佐之服之數月遂致不起

南都許輪所孫女吐血痰嗽六月診之兩尺如爛綿兩寸大而數余曰金以火爲仇肺不浮濇反得洪大賊脉見矣秋令可憂八月初五復診之肺之洪者變

爲細數腎之軟者變爲疾勁余曰歲在戊午少陰司天兩尺不應今尺當不應而反大寸當浮大而反沉細尺寸反者死肺至懸絕十二日死計其期當死於十六日然能食者過期兄十六十七二日皆金未遽絕也十八日交寒露又值火日經曰手太陰氣絕丙日篤丁日死言火日也寅時乃氣血注肺之時不能注則絕必死於十八日寅時矣輪所聞之潸然淚下以其能食猶不肯信果至十八日未曉而終

汪望洋之孫年方舞象發熱欬嗽羸弱頭眩二冬二母知蘗芩連不啻百劑病勢轉增余診其右脉虛軟乃知脾肺氣虛火不生土之候也遂用補中益氣加五味子苡仁薑桂至三錢十劑而減兩月乃安春初又發令其服補中丸一年諸證永不再作矣

刑部主政唐名必勞心太過因食海鮮吐血有痰喉間如鯁日晡煩熱喜其六脉不數惟左寸濇而細右關大而軟思慮傷心脾也以歸脾湯大料加丹參丹皮麥門冬生地黃二十餘劑而證減六七兼服六味丸三月遂不復發

吳門周復庵年及五旬荒於酒色忽然頭痛發熱醫以羌活湯散之汗出不止昏運不甦余與之灸關元十壯而醒四君子加薑桂日服三劑至三日少康分析家產勞而且怒復發厥余用好參一兩熟附二錢煨薑十片煎服稍醒但一轉側卽厥一日之間計厥七次服參三兩至明日以羊肉羹糯米粥與之尚厥二三次至五日而厥定向余泣曰已蒙再生不知有全愈日否余曰脉有根蔕但元氣虛極非三載調攝不能康也幸其恪信余言遵守用藥兩月之間服參四斤三年之內進劑六百貼丸藥七十餘斤方得步履如初親友衆多議論雜出若非病人任之專或久而見疑服藥少怠未有獲生者也

侍御馮五玉令愛發熱欬嗽已及半載十月間吐鮮血甚多一日之內不過食粥一盞大肉消陷大便溏泄沉困著牀脉來七至余曰法在不救人所共知若能唯余是聽不爲旁撓可救十中之一每貼用人參五錢桂附各一錢芪朮三錢歸芍二錢陳皮一錢日投三貼約進七十劑及壯水丸三斤而後起於牀又

三月而飲食如舊若泥常法而棄之幽潛沉冤矣

古今醫統曰職方郎中游烈其子婦年十六得病渾身壯熱欬嗽痰涎月候不通飲食減少不歲餘衆醫不救用天靈蓋服之取下蟲一枚如蜈蚣之狀當時鉗入沸油鼎中煎之投於江遂瘥

一男子三十餘歲患病厭厭飲食倍多而不生肌常需肉食如或稍饑腹內疼痛倦怠遂以天靈蓋散服之取下赤小蟲無數內有一蟲其色微紫大於衆蟲頭有細毛自後用藥補治遂安兼進眞蘇合香丸

一男子年五十每日須酒數升空心未飲則兩手與脚並皆振動得酒一升飲之少減若至醉則手足不動俗謂酒疾醫之名振風累日針灸服藥無效疑其有蟲遂服天靈蓋散取下一物如烏梅之狀撥之有足正類蜘蛛其疾遂愈不復飲酒

寓意草曰金道賓之診左尺脉和平右尺脉如控弦如貫索上冲甚銳余爲之駭曰是病枝葉未有害本實先撥必得之醉而使內也曰誠有之但已絕慾二年服人參斤許迄今諸無所苦惟閉目轉眄則身非

己有恍若離魂者然不識可治與否余曰可治再四令疏方未知方中之意歸語門人因請立案余曰凡人佳冶當前賈勇以明得意又助之以麴糵五臟翻覆宗筋縱弛百脈動搖以供一時之樂不知難爲繼也嘗有未離女軀項刻告殞者矣是病之有今日者幸也絶慾二年此丈夫之行可收桑榆者但不知能之不爲乎抑爲之不能乎不爲者一陽時生斗柄常運不能者相安於無事而已夫人身之陰陽相抱而不脫是以百年有常故陽欲上脫陰下吸之不能脫也陰欲下脫陽上吸之不能脫也卽病能非一陰陽時有亢戰旋必兩協其平惟大醉大勞亂其常度二氣乘之脫離所爭不必其多卽寸中脫出一分此一分便孤而無偶便營魄不能自主治法要在尋其罅漏而緘固之斷鰲立極煉石補天非飾說也若不識病所而博搜以冀弋獲雖日服人參徒竭重貲究鮮實益蓋上脫者妄見妄聞有如神靈下脫者不見不聞有如聾瞶上脫者身輕快而汗淋漓下脫者身重著而肉多青紫昔有新貴人馬上揚揚得意未及回

寓一笑而逝者此上脫也又有人寢而遭魘身如被杖九竅出血者此下脫也其有上下一時俱脫者此則暴而又暴不多經見者其有左右相畸而脫者左從上右從下魂升魄降同例也但治分新久藥貴引用新病者陰陽相乖補偏救弊宜用其偏久病者陰陽漸入扶元養正宜用其平若久病悞以重藥投之轉增其竭絕耳引用之法上脫者用七分陽藥三分陰藥而夜服從陰以引其陽下脫者用七分陰藥三分陽藥而晝服從陽以引其陰引之又引陰陽忽不覺其相抱雖登高臨深無所恐發表攻裏無所傷矣經云陰平陽祕精神乃治正謂此也善調者使坎中之眞陽上升則周身之氣如冬至一陽初生便葭管飛灰天地翕然從其陽使離中之眞陰下降則周身之氣如夏至一陰初生便葽蜩迭應天地翕然從其陰是身中原有大藥豈區區草木所能方其萬一者耶

金道賓前案次年始見而問治焉今再伸治法夫道賓之病眞陽上脫之病也眞陽者父母搆精時一點

眞氣結爲露水小珠而成胎之本也故胎在母腹先結兩岐卽兩腎也腎爲水臟而眞陽居於其中在易坎中之陽爲眞陽卽此義也眞陽旣以腎爲窟宅而潛伏水中凝然不動默與一身相管攝是以足供百年之用惟夫縱慾無度腎水日竭眞陽之面目始露夫陽者親上者也至於露則魄汗淋漓目中有光面如渥丹其飛揚屑越孰從把握之哉所爲神魂飄蕩三年未有寧宇也故每歲至冬而發至春轉劇蓋無以爲冬水收藏之本無以爲春木發生之基以故腰脊牽强督脈縮而不舒且眩掉動搖有風之象總由自伐其生生之根耳夫生長化收藏之運有一不稱其職便爲不治之證今奉藏者少奉生者更少爲不治無疑矣而僕斷爲可治者以有法治之也且再經寒暑陰陽有漸入之機而驗之人事三年間如處絕域居圍城莫必旦夕之命得於懲創者必深夫是以知其可治也初以煎劑治之劑中兼用三法一者以濇固脫一者以重治怯一者以補理虛緣眞陽散越於外如求亡子不得不多方圖之服之果獲大效於

是爲外迎之法以導之更進而治其本焉治本一法實有鬼神不覩之機未可以言語形容者姑以格物之理明之畜魚千頭者必置介類於池中不則其魚乘雷雨而冉冉騰散蓋魚雖潛物而性樂於動以介類沉重下伏之物而引魚之潛伏不動同氣相求理通元奧也故治眞陽之飛騰屑越不以龜鼈之類引之下伏不能也此意直與奠元圭而告平成施八索以維地脉同符合撰前案中所謂斷鰲立極蚤已言之矣然此法不可瀆也瀆則魚亂於下矣其次用半引半收之法又其次用大封大固之法封固之法世雖無傳先賢多有解其旨者觀其命方之名有云三才封髓丸者有云金鎖正元丹者封鎖眞陽不使外越意自顯然先得我心之同矣前江鼎翁公祖案中盞中加油則燈愈明爐中覆灰則火不熄之說亦早已言之矣誠使眞陽復返其宅而凝然與眞陰相戀然後淸明在躬百年常保無患然道賓之病始於溺情今雖小愈倘無以大奪其情勢必爲情所壞惟是積精以自剛積氣以自衞積神以自王再加千日之

把持庶乎參天之榦非斧斤所能驟傷者若以其時之久而難於需耐也彼立功異域嚙雪邊庭白首始得生還者夫獨非人也歟哉前案中以絕慾二年爲丈夫行可收桑榆者亦早已言之矣今以藥石生之更不得不以苦言繼之僕不自度量輒以一葦障狂瀾也其能乎否耶

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十八卷目錄

醫部彙考三百八

臌脹門一

黃帝素問（生氣通天論　陰陽應象大論　陰陽別論　五臟生成論　藏氣法時論　宣明五氣篇　腹中論　風論　厥論　奇病論　大奇論　脈解篇　水熱穴論　調經論　標本病傳論　氣交變大論　五常政大論　至眞要大論　六元正紀大論）

靈樞經（本神篇　師傳篇　海論　脹論　五癃津液別論　本臟篇　水脹篇　玉版篇　刺節眞邪篇）

張機金匱要略　腫脹　腹脹
華佗中藏經　論水腫脈證生死
孫思邈千金方　水脹　水腫有五傷　水病禁忌
楊士瀛直指方　腫證　脹證
劉完素六書　腫脹論　腫滿　脹病
李杲十書　中滿腹脹論　諸腹脹大皆屬於熱論
朱震亨心法　水腫　鼓脹
危亦林得效方　腫滿有可治不可治　禁忌　脹病有寒有熱　凶證

藝術典第三百二十八卷

醫部彙考三百八

腫脹門一

黃帝素問

生氣通天論

因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭

註　外淫之邪傷於陽氣不能運行則榮血泣而爲腫四肢之陽交相代謝而陽氣乃竭也

陰陽應象大論

寒氣生濁濁氣在上則生䐜脹

註　寒氣下凝故生濁陰今濁氣反在上故生䐜脹

陰陽別論

三陰結謂之水

註　三陰結謂脾肺之脉俱寒結也脾肺寒結則氣化爲水

結陽者腫四肢

註　四肢爲諸陽之本氣歸形氣結故形腫也

陰陽結斜多陰少陽曰石水少腹腫

註　結斜者偏結於陰陽之間此多偏於腎臟故爲多陰少陽而少腹腫也

二陰一陽發病善脹心滿善氣

註　二陰一陽者少陰少陽也此腎氣與生陽並逆故善脹心腎之氣不能相交故心滿善氣

五臟生成論

腹滿䐜脹支膈胠脅下厥上冒過在足太陰陽明

註　腹滿䐜脹邪薄於太陰陽明之氣分太陰陽明之支絡貫膈氣分之邪轉入於經是以連及支膈

胠脅皆脹滿也

藏氣法時論

腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風

註 腎之經病故腹大脛腫水邪上逆則喘欬生氣下衰則身重經氣逆則表氣虛故寢汗出而惡風

宣明五氣篇

五氣所病下焦溢爲水

註 下焦如瀆水道出焉病則反溢而爲水病

腹中論

黃帝問曰有病心腹滿旦食則不能暮食此爲何病岐伯對曰名爲鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已

註 此乃脾土艱於運化以致脹滿不食

帝曰有病膺腫頸痛胷滿腹脹此爲何病何以得之岐伯曰名厥逆帝曰治之奈何岐伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣并乃可治也帝曰何以然岐伯曰陽氣重上有餘於上灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂須其氣并而治之可使全也

註　諸陽之氣上升而腹氣又厥逆於上爲膺腫頸痛胷滿腹脹之病是陽氣重上而有餘於上矣而反灸之則陽熱之氣反入經絡之陰則爲瘖若石砭之則陽氣外泄而虛虛則狂矣衝脉之血亦從胷中而散於肌腠皮膚之間故須其與厥逆之脾氣幷合而後治之可使全也

帝曰病熱而有所痛者何也岐伯曰病熱者陽脉也以三陽之動也人迎一盛少陽二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與腹乃䐜脹而頭痛也

註　病熱者陽脉盛而三陽之氣動之也三陽俱盛當主病熱頭痛腹爲陰陰中之至陰脾也如陽入於陰又當病在頭與腹乃䐜脹而頭痛也

風論

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹善滿失衣則䐜脹食寒則泄胗形瘦而腹大

註　胃腑受邪故飲食不下鬲塞不通腹善滿也形寒則䐜脹飲冷則泄者胃氣虛傷也胃者肉其應

腹者胃之郛故主形瘦而腹大

厥論

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿

註中焦之陽氣日損故陰氣獨盛於上而下焦之陽氣亦虛是以腹脹滿也

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註癲狂走呼妄言妄見陽明之脉病也經氣厥逆故腹滿胃不和不得臥也陽明乃燥熱之經其經氣上出於面故面赤而熱

太陰之厥則腹滿䐜脹後不利不欲食食則嘔不得臥

註足太陰之脉厥逆則腹滿䐜脹食飲入胃脾爲轉輸逆氣在脾故後便不利脾不轉運則胃亦不和是以食則嘔而不得臥也

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

註 足少陰之脉厥逆則陰液不能上資是以口乾心痛肺金不能通調於下故溺赤水火陰陽之氣上下不交故腹滿也

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫胻內熱

註 足厥陰之脉厥逆則少腹腫痛而腹脹涇溲不利陰縮而腫也經脉厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝厥陰木火主氣榮俞厥逆故胻內腫熱也

少陰厥逆虛滿嘔變下泄淸治主病者

註 少陰之氣上與陽明相合而主化水穀少陰氣厥以致中焦虛滿而變爲嘔逆上下水火之氣不交故下泄淸冷也

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫言治主病者

註 虛滿者食氣不能散精於肝也前閉者肝主疏泄也肝主語譫語者肝氣鬱也

奇病論

帝曰有病痝然如有水狀切其脉大緊身無痛者形不瘦不能食食少名爲何病

註 痝然浮腫貌乃水氣上乘非有形之水也大則爲風緊則爲寒故脉大緊夫病風水者外證骨節疼痛此病在腎非外受之風邪故身無痛水氣上乘故形不瘦風水侮土故不能食卽食亦不能多

岐伯曰病生在腎名爲腎風腎風而不能食善驚驚已心氣痿者死

註 此腎臟自生之風非外受之邪

大奇論

肝滿腎滿肺滿皆實卽爲腫

註 滿謂臟氣充滿也夫五臟者藏精氣而不瀉故滿而不實如滿而皆實是爲太過當卽爲腫

脉解篇

陽明所謂脛腫而股不收者是五月盛陽之陰也陽者衰於五月而一陰氣上與陽始爭故脛腫而股不收也

註 五月陽氣始衰而下一陰始生而上陰與陽交爭以致經脉不和而爲脛腫不收也

所謂客孫脉則頭痛鼻鼽腹腫者陽明幷於上上者

則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註 陽明之氣并於上迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脈則腹腫也

厥陰所謂癩疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中故爲癩疝少腹腫也

註 三月陽盛之時而厥陰主氣故爲陽中之陰厥陰之氣在內而未得盡出故爲癩疝腹腫也

陽明所謂上喘而爲水者陰氣下而復上上則邪客於臟腑間故爲水也

註 陰氣下而復上者謂冬至一陽初生陰氣下降至五月陰氣復上也陰氣下歸於水臟至陰氣從上而漸盛則水邪隨氣而上升上客於臟腑之間故喘而爲水也

所謂胷痛少氣者水氣在臟腑也水者陰氣也陰氣在中故胷痛少氣也

註 此水氣上乘也

太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏於中故曰病脹

註　十一月萬物之氣皆藏於中故主病腹脹也

水熱穴論

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故爲胕腫胕腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於元府行於皮裏傳爲胕腫本之於腎名曰風水所謂元府者汗空也

註　水由中焦入胃之飲而生從下焦決瀆而出故關門不利則聚水而從其類水聚於下則反溢於上故腫脹於皮膚之間地氣上者屬於腎而生水液也腎氣動則水液上升而爲汗矣逢於風則內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於元府行於皮裏傳爲胕腫本之於腎名曰風水蓋因風而致

水腫於皮膚間也

調經論

帝曰形有餘不足奈何岐伯曰形有餘則腹脹涇溲不利不足則四支不用

註 腹乃脾土之郛郭故有餘則脹靈樞經云脾氣實則涇溲不利蓋土氣盛實則尅制其水而不流脾主四支故虛則不用

帝曰志有餘不足奈何岐伯曰志有餘則腹脹飧泄不足則厥

註 腎者胃之關也關門不利則聚水而爲腹脹飧泄矣腎爲生氣之原故不足則厥逆而冷

標本病傳論

肺病喘欬三日而脅支滿痛一日身體重痛五日而脹十日不已死冬日入夏日出

註 冬氣收藏夏氣浮長日出氣始生日入氣收引肺主氣故終於氣之出入也

肝病頭目眩脅支滿三日體重身痛五日而脹三日腰脊少腹痛脛痠三日不已死冬日入夏早食

註　夏早食者寅卯之時木氣絕而不生也冬日入者申酉之時金氣旺而木氣絕也

脾病身痛體重一日而脹二日少腹腰脊痛脛痠三日背𦙶筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食

註　冬之人定在亥謂土敗而水勝也夏之晏食在寅木旺而土絕也

腎病少腹腰脊痛胻痠三日背𦙶筋痛小便閉三日腹脹三日兩脅支痛三日不已死冬大晨夏晏晡

註　冬之大明在辰土旺而水滅也夏之晏晡在亥水絕而不能生也

胃病脹滿五日少腹腰脊痛胻痠三日背𦙶筋痛小便閉五日身體重六日不已死冬夜半後夏日昳

註　冬夜半後者土敗而水勝也夏日昳者陽明所主之時土絕而不能生也

膀胱病小便閉五日少腹脹腰脊痛胻痠一日腹脹一日身體重二日不已死冬雞鳴夏下晡

註　冬雞鳴在丑乃太陽少陽生氣之時氣絕故不能生夏下晡乃陽明生氣之時陽明之氣亦絕也

氣交變大論

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則腹大脛腫

註 水邪泛溢土不能制之則腹大脛腫

歲水不及濕乃大行民病腹滿身重甚則胕腫上臨太陰民病寒疾於下甚則腹滿浮腫

註 濕土太過傷及腎陰故爲此諸病

歲木太過風氣流行脾土受邪民病腹支滿

註 此脾土之病也

歲火太過炎暑流行金肺受邪甚則胷中滿脅支滿

註 胷內乃心主之宮城其脈出脅故病如是

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則腹大脛腫

註 此水邪泛溢土不能制之

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹滿溏泄腸鳴

註 此脾土之虛證蓋淫勝則本位反虛而自傷也

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脅滿且痛引少腹

註 此肝木之病也

歲火不及寒乃大行民病脅支滿復則病鶩溏腹滿

食飲不下

註 此寒濕之爲病也

歲水不及濕乃大行民病腹滿身重濡泄跗腫上臨太陰則大寒數舉甚則腹滿浮腫

註 濕土太過傷及腎陰故爲腹滿身重濡泄跗腫若上臨太陽則濕淫太過而脾土受傷也

五常政大論

土太過曰敦阜敦阜之紀是謂廣化其臟脾腎其病腹滿四支不舉

註 此水濕之爲病也

水太過曰流衍流衍之紀是謂封藏其臟腎心其病脹

少陽司天火氣下臨寒熱胕腫

註 此火熱之爲病也

太陽司天濕氣變物水飲內稸中滿不食甚則胕腫

註 此水濕之爲病也

至眞要大論

歲少陰在泉熱淫所勝民病腹中常鳴氣上衝胸喘

不能久立少腹中痛腹大

註　氣上衝胷者火炎上也喘不能久立者火淫肺金也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也

歲厥陰在泉風淫所勝民病灑灑振寒善伸數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註　此木淫而土病也

太陰司天濕淫所勝胕腫骨痛陰痹

註　此感寒濕之氣也

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下腹脹

註　此脾經之病也

少陰司天熱淫所勝民病胷中煩熱嗌乾右胠滿甚則胕腫肺䐜腹大滿膨膨而喘欬

註　此肺經之病也

少陽司天火淫所勝傳而爲水身面胕腫腹滿仰息

註　傳爲水者火淫逼其金水外溢故爲腫滿之水病仰息者肺氣逆而不得偃息也

太陽司天寒淫所勝民病胷腹滿胷脅胃脘不安

註 此陽熱中盛之病也

少陽司天客勝甚則胕腫主勝甚則脅痛支滿

註 胕腫者太陽寒水之氣勝也脅痛支滿者厥陰之初氣勝也

太陰司天客勝則首面胕腫呼吸氣喘主勝則胷腹滿食已而瞀

註 首面胕腫濕淫於上也呼吸氣喘淫於內也胷腹滿者初氣之木勝傷土也

少陽司天主勝則胷滿欬仰息

註 此主氣之二火欲上炎而外出肺受制也

太陰在泉客勝則濕客下焦發而濡瀉及爲腫隱曲之疾主勝則寒氣逆滿食飲不下

註 濕客下焦發而濡瀉及爲腫者因客淫於下而太陰之主氣自病也終之主氣乃太陽寒水客氣乃司天之濕土故主勝則寒氣逆滿食飲不下乃濕氣上逆而病及於厥陰之經也

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便瀉

註 清氣動下者清肅之天氣而動於下也少腹堅滿而數便瀉者太陽寒水之病也

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而瀉

註 陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉心痛否滿腹脹而泄乘火土也

太陽之勝皮膚否腫腹滿食減

註 皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也

太陰之勝火氣內鬱少腹滿腰脽重強內不便善注泄足下溫頭重足脛胕腫飲發於中胕腫於上

註 少腹滿腰脽重強者濕氣下淫而及於腎也足下溫頭重者風火之氣復流於下也足脛胕腫者土淫而水泛也飲發於中胕腫於上者水邪之從下而中中而上也

太陰之復濕變乃舉體重中滿飲食不化陰氣上厥胷中不便飲發於中欬喘有聲

註 陰濕盛故體重中滿飲食不化陰氣上逆則胷中不便欬喘有聲者飲乘於肺也

諸腹脹大皆屬於熱

註 熱乃君火之氣也

六元正紀大論

火鬱之發民病脅腹胷背面目四支䐜膹臚脹

註 此火熱盛而精血傷也

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹

註 此肺金之病也

帝曰論言熱無犯熱寒無犯寒余欲不遠寒不遠熱奈何岐伯曰悉乎哉問也發表不遠熱攻裏不遠寒帝曰不發不攻而犯寒犯熱何如岐伯曰寒熱內賊其病益甚帝曰願聞無病者何如岐伯曰無者生之有者甚之帝曰生者何如岐伯曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瞀鬱注下瞤瘛腫脹嘔鼽衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閟之病生矣帝曰治之奈何岐伯曰時必順之犯者治以勝也

註 辛甘發散爲陽故有病應發散者卽當遠熱而不遠熱矣酸苦涌洩爲陰如有病而應攻裏者卽

當遠寒而不遠寒矣如雖病而不宜發表攻裏若妄犯之則寒熱內賊其病益甚若無病而不遠熱不遠寒者則堅痞腹滿身熱吐下之病生矣時謂四時治以勝者如犯熱則以所勝之寒治之犯寒則以所勝之熱治之

靈樞經

本神篇

脾藏榮榮舍意脾氣實則腹脹涇溲不利

註　腹乃脾土之郭郭故實則腹不能轉輸其水也

腎藏精精舍志腎氣虛則厥實則脹

註　腎者胃之關故實則關門不利而爲脹

師傳篇

胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹

註　熱中寒中者寒熱之氣皆由中而發內而外也

海論

膻中者爲氣之海氣海有餘者氣滿胷中悗息面赤

註　膻中以司呼吸故氣海有餘者氣滿胷中

脹論

黃帝曰脉之應於寸口如何而脹岐伯曰其脉大堅以濇者脹也黃帝曰何以知臟腑之脹也岐伯曰陰爲臟陽爲腑

註 大者邪盛堅者邪實濇者氣血虛而不流利濇而堅者爲陰其脹在臟大而堅者爲陽其脹在腑

黃帝曰夫氣之令人脹也在於血脉之中耶臟腑之內乎岐伯曰三者皆存焉然非脹之舍也黃帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外排臟腑而郭胷脅脹皮膚故命曰脹

註 脹之舍在內者臟腑之外空郭之中在外者皮膚腠理之間謂脹在無形之氣分也

黃帝曰臟腑之在胷脅腹裏之內也若匣匱之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異願聞其故

黃帝曰未解其意再問岐伯曰夫胷腹臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之

道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀營氣循脉衞氣逆爲脉脹衞氣並脉循分爲膚脹三里而瀉近者一下遠者三下無問虛實工在疾瀉

註　營氣循脉衞氣逆於脉中則爲脉脹若並脉而循行於分肉則爲膚脹當取足陽明胃經之三里而瀉之在於膚脉而近者一瀉在於城郭而遠者三下無問虛實工在疾瀉蓋留之則爲臟腑之脹矣衞氣出於太倉故瀉胃之三里

黃帝曰願聞脹形岐伯曰夫心脹者煩心短氣臥不安肺脹者虛滿而喘欬肝脹者肋下滿而痛引小腹脾脹者善噦四肢煩悗體重不能勝衣臥不安腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛六腑脹胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則飧泄不化小腸脹者少腹䐜脹引腰而痛膀胱脹者少腹滿而氣癃三焦脹者氣滿於皮膚中輕輕然而不堅膽脹者脅下痛脹口中苦善太息

註　此衞氣逆於城郭之中而爲臟腑之脹也

凡此諸脹者其道在一明知逆順鍼數不失瀉虛補實神去其室致邪失正眞不可定粗之所敗謂之夭命補虛瀉實神歸其室久塞其空謂之良工

註　脹有虛實當補當瀉其道惟一無二岐也逆順者謂榮行脈中衛行脈外相逆順而爲行也先天之精水穀之精兩精相搏合而爲神塞其空者外無使經脈膚腠疎空內使臟腑之神氣充足自無厥逆之患矣

黃帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在身也常然並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五臟更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止寒氣逆上眞邪相攻兩氣相搏乃合爲脹也

註　夫衛氣與脈內之榮氣相逆順而行得天地自然之和氣外內出入陰陽遞更終而復始應四時寒暑之往來五穀乃化榮衛生焉若厥逆之氣自下而上榮衛失常則眞邪相攻而合爲脹矣

黃帝曰善何以解惑岐伯曰合之於眞三合而得帝曰善

註　下焦先天之眞元上與陽明相合化水穀之精微生此榮衛二氣榮衛之氣通會於腠理與榮衛合并而充行於形身者也故榮衛二氣合之於眞元三合而得其厥逆之因矣如天眞之氣厥逆在下則榮衛之氣留止於上下焦寒水之氣上逆則眞邪相攻榮衛兩氣相搏乃合而爲脹也

黃帝問於岐伯曰脹論言無問虛實工在疾瀉近者一下遠者三下今有其三而不下者其過焉在岐伯對曰此言陷於肉肓而中氣穴者也不中氣穴則氣內閉鍼不陷肓則氣不行上越中肉則衛氣相亂陰陽相逐其於脹也當瀉不瀉氣故不下三而不下必更其道氣下乃止不下復始可以萬全烏有殆者乎其於脹也必審其胗當瀉則瀉當補則補如鼓應桴惡有不下者乎

註　衛氣之逆於內而爲脹者在於宮城空郭之中故取之三里三下而已今有其三而不下者此陷於肉肓而中氣穴故也故鍼不中氣穴則氣閉於內不得外出鍼不陷肓則氣不行不能上越故三

而不下者必更其道取之氣穴惡有不下者乎

五癃津液別篇

黃帝問於岐伯曰水穀入於口輸於腸胃其液別爲五天寒衣薄則爲溺與氣天熱衣厚則爲汗悲哀氣并則爲泣中熱胃緩則爲唾邪氣內逆則氣爲之閉塞而不行不行則爲水脹余知其然也不知其所由生願聞其道岐伯曰水穀皆入於口其味有五各注其海津液各走其道故三焦出氣以溫肌肉充皮膚爲其津其流而不行者爲液陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并於腸胃之中別於廻腸留於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則爲水脹

註 胃者五臟六腑之海也水穀入於胃五臟六腑皆稟氣於胃五味各歸其所喜其津液各走其道隨三焦出氣以溫肌肉充皮膚者爲津其流而不行者爲液流者淖澤注於骨補益腦髓灌精而濡空竅者也陰陽者少陰陽明也不和則液與精不

合使液溢於骨外而下流於陰液溢於外則髓液皆減而下下流過度則骨虛而腰痛脛痠陰陽氣道不通則津液不得注於海而四海閉塞三焦之氣不能通瀉於肌腠則津液不化濟泌之汁不得滲於膀胱則下焦脹水溢於下則上逆而爲水脹

本臟篇

脾偏傾則善滿善脹

註 端正則神志和利偏傾則善滿善脹也

水脹篇

黃帝問於岐伯曰水與膚脹鼓脹何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也

註 目窠上微腫水循經而溢於上也頸脈動水傷氣而及於脈也水邪上乘於肺故欬太陽之氣虛而水流於下則陰股寒足脛腫水泛而土虛故腹大也水在皮中故按之隨手而起如裹水之狀

黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮

膚之間鼟鼟然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也

註　無形之氣故鼟鼟然不堅氣脹故腹大身盡腫寒氣在肌腠故皮厚窅深病在氣故按其腹窅而不起腹色不變寒氣在皮膚而脾土未傷也

鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也

註　身皆大者脾主肌肉也色蒼黃腹筋起者土敗而水氣乘之也

玉板篇

腹脹身熱脈大腹鳴而滿四肢清泄其脈大如是者不過十五日死

刺節眞邪篇

腰脊者身之大關節也肢脛者人之管以趨翔也莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不時津液內溢乃下流於睾血道不通日大不休俛仰不便趨翔不能此病滎然有水

註　腰脊者從大椎至尾骶乃身之大關節也津液

淖澤於肢脛則筋骨利而脛能步趨肢能如翼之翔也津液從宗脈而上濡於空竅故曰莖垂者身中之機陰精之候津液之道也如飲食不節喜怒不時則津液內溢乃下流於睪囊血道不通日大不休俛仰不便趨翔不能此病滎然有水也

漢張機金匱要略

腫脹

肺癰篇曰肺癰胷滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之

五臟篇曰肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

水氣篇曰師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胷滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

脈浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強則爲

癮疹身體爲痒痒爲泄風久爲痂癩氣強則爲水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黃汗

寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裹上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水

太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體重而酸其人不渴汗出卽愈此爲風水惡寒者此爲極虛發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如周痹胷中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲脾脹其狀如腫發汗卽愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之

趺陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之卽胷滿短氣

趺陽脈當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水

寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沉趺陽脈浮而數浮脈卽熱數脈卽止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚卽爲水矣

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行卽惡寒水不沾流走於腸間

少陰脈緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便卽難脈得

諸沉當責有水身體腫重水病脈出者死

夫水病人目下有臥蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫

肝水者其腹大不能自轉側脅下腹痛時時津液微生小便續通

肺水者其身腫小便難時時鴨溏

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈

師曰寸口脈沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏趺陽脈伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血血不利則爲水名曰血分

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胷中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎脅下急痛醫以爲畱飲而大下之氣擊不去其病不除後重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶圓下水當時如

小差食飲過度腫復如前胷脅苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衞氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後

風水脈浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之腹痛者加芍藥

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱越婢湯主之

皮水爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防己茯苓湯主之

裏水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主之

水之爲病其脈沉小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗卽已脈沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

厥而皮水者蒲灰散主之

問曰黃汗之爲病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脈自沉從何得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜芪芍桂酒湯主之

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出

又身常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤卽胷中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髖弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此爲黃汗桂枝加黃芪湯主之

師曰寸口脈遲而濇遲則爲寒濇爲血不足趺陽脈微而遲微則爲氣遲則爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脅鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通卽身冷陰氣不通卽骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻辛附子湯主之

心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳朮湯主之

腹脹

痓篇曰暴腹脹大者爲欲解脈如故反伏弦者痓

黃疸篇曰趺陽脈緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲滿尺脈浮爲傷腎趺陽脈緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治消石礬石散主之

華佗中藏經

論水腫脈證生死

人中百病難療者莫出於水也水者腎之制也腎者人之本也腎氣壯則水還於腎腎虛則水散於皮又三焦壅塞榮衛關格血氣不從虛實交變水隨氣流故爲水病有腫於頭目者有腫於腰脚者有腫於四肢者有腫於雙目者有因嗽而得者有因勞而生者

有因凝滯而起者有因虛而成者有因五臟而出者有因六腑而來者類皆多種狀各不同所以難治由此百狀人難曉達縱曉其端則又以嬌恣不循理法冒犯禁忌弗能備矣故人中水疾死者多矣水有十名一曰青水二曰赤水三曰黃水四曰白水五曰黑水六曰元水七曰風水八曰石水九曰裏水十曰氣水青水者其根起於肝其狀先從面腫而漸行於一身赤水者其根起於心其狀先從胷腫起黃水者其根起於脾其狀先從腹腫白水者其根起於肺先從脚腫而上氣喘嗽黑水者其根起於腎其狀先從足趺腫元水者其根在膽其狀先從面腫至足風水者其根在胃先從四肢腫石水者其根在膀胱其狀小腹腫大裏水者其根在小腸其狀先從腹脹而不腫漸漸而腫氣水者其根在腸乍來乍去乍盛乍衰者是也良由上下不通關竅不利氣血痞格陰陽不調而致其脈洪大者死久不愈之病令人患水氣臨時發散歸五臟六腑則主爲病也消渴者因冒風衝熱饑飽失常飲酒過量嗜慾傷頻或服藥石久而積成

使之然也

唐孫思邈千金方

水脹

大凡水病難治瘥後特須慎口味不則復病水病人多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人飲食於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此未見有一愈者又此病百脈之中氣水俱實治者皆欲令瀉之便虛羊頭蹄極補那得瘳愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絕其根本有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大凡醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云愚醫殺之

水腫有五傷

水有十種不可治者有五第一脣黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治

水病禁忌

凡水病大忌腹上出水出水者一月死中軍侯黑圓治膽元水先從頭面至脚腫頭眩痛身虛熱名曰元水

宋楊士瀛直指方

腫證

凡腫其狀目泡上下微腫如裹水通身浮腫欬喘怔忪股間清凉小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手卽滿是浮腫也如飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痢則曰氣分亦曰水氣經脈不行血化爲水四肢紅腫則曰血分皆水氣之所由作也氣分宜桂朮湯血分宜桂苓湯大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有青筋腹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫脣黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足心平傷腎背平傷肺皆爲不治之證或肉硬或手掌平者亦不治

脹證

失饑傷飽痞悶停酸朝則陰消陽長穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀脹脾

土受濕水漬於腸胃而溢於皮膚漉漉有聲怔忪喘息是爲水脹七情鬱結氣道壅塞上不降下不得升身體腫大四肢瘦削是爲氣脹煩躁漱水迷忘驚狂痛悶嘔逆小便多大便黑婦人多有之是爲血脹久病羸乏卒然腫滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻頻未見一愈者耳

金劉完素六書

腫脹論

經云平治權衡去菀陳莝開鬼門潔淨府平治權衡者察脈之浮沉也去菀陳莝者疎滌腸胃也開鬼門潔淨府者發汗利小便也又鼓脹之病治以雞屎醴名醫云其腫有短氣不得臥爲心水兩脅痛爲肝水大便鴨溏爲肺水四肢皆腫爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦嗌乾爲膽水乍虛乍實爲大腸水各隨其經絡分其內外審其脈證而別之又有風水皮水石水黃汗歸各臟以論之風合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾石合歸腎風水脈浮必惡風皮水脈亦浮按下沒指石水脈沉腹滿不喘黃汗脈沉遲發熱而多涎久而

不愈必致癰膿水腫脈浮帶數卽是虛寒濇止其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實爲水必矣要知水脈必沉是也論曰脈出者死與病不相應也諸脣黑則傷肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足平則傷腎背平則傷肺此五者必不可療也治法云腰以上宜發汗腰以下利小便錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉久病之後亦不因下利脹而喘急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而脹者宜服大黃丸白餅子紫霜丸下之更詳認大小便如俱不通先利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脈微細脾主目胞腮虛腫手足冷當先服塌氣丸後服異功散及和中丸益黃散溫其氣因於氣腫者橘皮煎丸因於濕爲腫者煎防己黃芪湯調五苓散因於熱爲腫者服八正散又法燥熱於肺爲腫者乃絕水之源也當清肺除燥水自生矣於梔豉湯中加黃芩如熱在下焦陰消使氣不得化者當益陰則陽氣自化黃蘗黃連是也

腫滿

肺移寒於腎名曰涌水其證如溢囊裹漿或徧身腫

滿按腹不堅疾行則濯濯有聲故喘欬不定葶藶丸主之

四肢熱勝則腫四肢者諸陽之本陽結者故不行於陰脈陽脈不行故畱結也犀角湯主之

胕腫肉如泥按之不起泥之象也土過濕則爲泥濕爲病也積飲痞隔中滿霍亂吐下體重故甚則胕腫矣

脹病

腹脹大鼓之如鼓氣爲陽陽爲熱氣甚則如是也腫脹熱勝於內則氣鬱而爲腫也陽熱氣甚則腹脹也火主長而茂形貌彰顯升明舒榮皆腫脹之象也濁氣在上則生䐜脹此陰陽返則氣結不散脹滿如飽吳茱萸湯主之

病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散大腸不傳逆滿雞屎醴散

膺腫頸痛胷滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱於胷也不可鍼灸宜服順氣湯小茯苓湯主之

胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在

下故脹而洩妙應丸主之

元李杲十書

中滿腹脹論

六元正紀論云太陰所至爲中滿太陰所至爲稸滿諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰司濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天爲陽爲熱主運化地爲陰爲濕主長養無陽則陰不能生化故云臟寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而致水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿䐜脹支膈胠脅下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也所謂胃中寒則脹滿者是也腹滿大便不利上走胷嗌喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水爲脹與通評虛實論腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕如開鬼門潔淨府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其眞經氣和血平陽布神清此正治也或曰諸腹

脹大皆屬於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變爲熱而作胃實腹滿仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此屬熱脹大抵寒脹多而熱脹少也

諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變爲熱作胃實日晡潮熱大渴引飲讝語是太陽陽明幷大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之泄之則脹已此之謂也假令痎瘧爲脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不卽時發至秋暑氣衰絕而瘧病旋作矣知其寒也局方用交解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿五臟六腑俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生䐜脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水爲脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿䐜脹支膈胠脅下厥上冒過在太陰陽明胃中寒濕鬱過也太陰䐜脹腹不利不欲食食則嘔不得臥按所說寒

脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其濕下焦如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麵及厚味之物膏粱之人或食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之如或多食寒凉及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或臟寒生滿病以至寒脹中滿分消湯主之

朱震亨心法

水腫

水腫因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾使脾氣得實則自能健運升降運動其樞機則水自行非五苓神佑之行水也宜補中行濕利小便切不可下宜二陳湯加白朮人參蒼朮爲主佐以黃芩麥冬炒梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴氣不運加木香木通氣陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行濕二陳治濕加升提之藥能使大便潤而小便長

産後必須大補血氣爲主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬

腰以下腫宜利小便腰以上腫宜發汗此仲景之要法也

諸家只知治濕當利小便之說執此一途用諸去水之藥往往多死又用導水丸舟車丸神佑丸之類大下之此速死之兆蓋脾極虛而敗愈下愈虛雖劫效目前而陰損正氣然禍亦不旋踵而至大法宜大補中宮爲主看所挾加減不爾則死當以嚴氏實脾散加減用

陽病水兼陽證者脉必沉數陰病水兼陰證者脉必沉遲水之爲病不一賈洛陽以病腫不治必爲錮疾雖有扁鵲亦莫能爲則知腫之危惡非他病比也夫人之所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃爲水穀之海又因虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅

塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目泡上下微起支體重著欬喘怔忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也治法身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳證雖可下又當權其重輕不可過用芫花大戟甘遂猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也

皮粗麻木不仁走注疼痛風腫也皮厚四肢瘦削腹脅膨脹氣腫也皮間有紅縷赤痕者此血腫也

婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消

大凡水腫先起於腹而後散四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者不治大便滑泄與夫脣黑缺盆平臍突足平背平或肉硬或手掌平又或男從脚下腫而上女從身上腫而下皆不治若遍身腫煩渴小便赤澀大便閉此屬陽水先以五皮散或四磨飲添磨生枳殼重則疎鑿飲子若遍身腫不煩渴大便溏小便少不澀赤此屬陰水宜實脾飲或木香流氣飲

陽水腫敗荷葉燒灰存性爲末米飲下若可下者以三聖散牽牛枳實蘿蔔子三味看大小虛實與服氣實者三花神佑丸舟車丸禹功散選用

鼓脹

心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲無病之人今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於斯時也清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀鬱而爲熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰膨脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若蠱侵蝕有蠱之義驗之治法理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清化之令却鹽味以防助邪斷妄想以保母氣無有不

安醫不察病起於虛急於作效衒能希謝病者苦於脹急喜行利藥以求一時之快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪愈甚眞氣愈傷去死不遠古方惟禹餘糧丸又名石中黃丸又名紫金丸制肝補脾殊爲切當亦須隨證順時加減用之余友俞仁叔儒而醫連得家難年五十得此疾自制禹餘糧丸服之予診其脉弦濇而數緊曰此丸新製煅煉之火邪尚存溫熱之藥太多宜自加減不可執方俞笑曰今人不及古人此方不可加減服之一月口鼻見血骨立而死

又楊兄年近五十性嗜酒病瘧已半年年患脹病自察必死來求治診其脈弦而濇重則大瘧未愈手足瘦而腹大如蜘蛛狀予敎以參术爲君當歸川芎芍藥爲臣黃連陳皮茯苓厚朴爲佐生甘草些少作濃湯飲之一日定三次彼亦嚴守戒忌一月後瘧因汗而愈又半年小便長而脹愈中間稍有加減大意只是補氣行濕又陳氏年四十餘性嗜酒大便時見血於春間患脹色黑而腹大其形如鬼診其脈數而濇重似弱予以四物湯加黃連黃芩木通白术陳皮厚朴

生甘草作湯與之近一年而安一補氣一補血餘藥大率相出入皆獲安以保天壽或曰氣無補法何子補氣而獲安果有說以通之乎予曰氣無補法世俗之言也以氣之爲病痞悶壅塞似難於補恐增病勢不思正氣虛者不能運行邪滯所著而不出所以爲病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟或氣怯不用補法氣何由行或曰子之藥審則審矣何效之遲也病者久在牀枕必將厭子之迂而求速者矣予曰此病之起或三五年或十餘年根深矣勢篤矣欲求速效自求禍耳知王道者能治此病也或曰脹病將終不可與利藥耶余曰灼知其不因於虛受病亦淺脾胃尚壯積滯不痼而又有有餘之證亦宜略與疏導若授張子和濬川散禹功丸爲例行迅速之策實所不敢

鼓脹又名單鼓宜大補中氣行濕此乃脾虛之甚須遠音樂斷厚味大劑參术佐以陳皮茯苓蒼术之類有血虛者用四物湯行血藥有脈實堅人壯盛者或可攻之便可收拾用參术爲主

凡補氣必帶厚朴寬滿厚朴治腹脹因味辛以氣聚於下焦故也須用薑汁制之

如肥胖之人腹脹者宜平胃五苓共服之如白人腹脹者是氣虛宜參朮厚朴陳皮如瘦人腹脹者是熱宜黃連厚朴香附白芍

如因有故畜血而腹脹者宜抵當丸下死血

如因有食積而腹脹者有熱用木香檳榔丸有寒用木香厚朴丁香砂仁神麯香附

如因外寒鬱內熱而腹脹者用藿香麻黃升麻葛根桂枝

因大怒而腹脹者宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈實者按之不堅不痛治須實者下之消之次補之虛者溫之升之以補爲要

朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛

腹脹不覺滿者食肉多以黃連一兩阿魏半兩酢浸蒸餅爲丸同溫中丸白朮湯下

危亦林得效方

食肉多腹脹三補丸料內加香附半夏麯蒸餅丸服

腫滿有可治不可治

男從上而腫下女從下而腫上所患未久漩利腫退喘定則愈矣

凡水腫大喘氣粗不食乃腎水盈溢上行旁浸於肺也不治

禁忌

凡水腫惟忌鹽雖毫末許不得入口若無以爲味即水病去後宜以酢少許調和飲食不能忌鹽勿服藥果欲去病切須忌鹽

脹病有寒有熱

寒脹者腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之

熱脹者以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則爲虛數則爲熱陰虛不能宣導飲食如故腹中脹滿者爲熱脹

凶證

腹滿得之未久或脹或消腹皮稍軟不泄不喘隨治隨差若臍心突起利後復腹急久病羸乏喘息不得安名曰脾腎俱敗不治腹滿欬逆不得小便不治腹

大滿而下泄不治

六三一

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百二十九卷目錄

醫部彙考三百九

腫脹門二

虞摶醫學正傳（脹滿）

戴思恭證治要訣（腫病證治　蠱脹證治）

李梴醫學入門（水腫論陰陽　濕熱變化總屬脾經　下注腎經則陰胕腫　肺氣上升則爲喘　陽水治法　陰水治法　風氣血因　陰腫治法　忌宜　鼓脹證治　穀蟲癥瘕之分　水血之辨　治法大概以補中去濕爲主）

王綸明醫雜著（脹論）
李中梓醫宗必讀（水腫脹滿　死證　脈法）
趙獻可醫貫（氣虛中滿論）
喻昌醫門法律（水腫論　論海藏集仲景水氣例　律六條　脹病論　律一條）
張介賓景岳全書（腫脹總論　危候總辨　氣分脹滿論治　水腫論治）
陳士鐸石室祕籙（水腫治法　鼓脹治法）

藝術典第三百二十九卷

醫部彙考三百九

腫脹門二

明虞摶醫學正傳

脹滿

或問丹溪治腫脹之證專主乎土敗木賊濕熱相乘爲病東垣又多主乎寒言病機諸腹脹大皆屬於熱之語乃言傷寒陽明經大實大滿之證也又云熱脹少而寒多二說不同其孰是而孰非歟曰東垣北方

人也其地土高燥濕熱少而寒氣多故有是論我丹溪先生生長於東南之地故病此者盡因脾虛受濕肝木太旺故言然也或曰二說不同之義既得聞命矣而丹溪治腫之大法曰必須養肺以制木使脾無賊邪之慮滋腎以制火使肺得清化之源斷妄想以保母氣却鹽味以防助邪以大劑人參白朮補脾使脾氣得實自能健運升降此千載不易之定論萬舉萬全之妙法也活人多矣嘗用此治黃腫之證反加悶亂增劇不安改用香附蒼朮厚朴之劑反獲全功竊思水腫與黃腫皆是濕熱傷脾所致何治法之不同歟曰夫水腫之證蓋因脾土虛甚而肝木太過故水濕妄行其中雖有清痰留飲實無鬱積膠固故以參朮爲君而兼以利水清金去濕熱之藥此標本兼治故有十全之功彼黃腫者或酒疸或穀疸沉積頑痰膠固鬱結於其中故或爲痃癖或爲積聚是以積於中而形於外蓋因土氣外形而黃也故宜以蒼朮厚朴香附陳皮之類以平其土氣之敦阜用鐵粉青皮之類以平其木氣之有餘加以麯蘖助脾消積退

黃之後仍以參朮等補脾之劑以收十全之功此標而本之之治也若二證之藥易而治之禍不旋踵

戴思恭證治要訣

腫病證治

腫病不一遍身腫四肢腫面腫脚腫方書謂之水氣然有陽水有陰水竝宜先用五皮飲升降湯或除濕湯加木瓜腹皮各半錢如未效繼以四磨飲兼吞桂黃丸腫者鍾也寒熱氣所鍾聚也應陰水陽水及蠱脹服藥外竝宜赤小豆粥佐之

遍身腫煩渴小便赤澀大便多閉此屬陽水輕宜四磨飲添磨生枳殼兼進萊菔飲重則疏鑿飲子萬靈飲利之以通爲度

亦有雖煩渴而大便已利者此不可更利宜用五苓散加木通大腹皮半錢以通小便或分心氣飲

遍身腫不煩渴大便自調或溏泄小便雖少而不澀赤此屬陰水宜實脾飲小便多少如常有赤時有不赤時至晚則微赤却無澀滯者亦屬陰也不可遽補木香流氣飲繼進復元丹若大便不溏氣息脹滿宜

四磨飲下黑錫丹

感濕而腫者其身雖腫而自腰至脚重腿腫脹尤甚於身氣或急或不急大便或溏或不溏但宜通利小便多服五苓散呑木瓜圓間進除濕湯加木瓜腹皮各半錢炒蘿蔔子七分半碾碎之

有患生瘡用乾瘡藥太早致徧身腫不可妄施他劑若大便不通升麻和氣飲若大便如常或以自利當導其氣自小便導之宜五皮飲和生料五苓散腹若腫只在下宜除濕湯和生料五苓散加木瓜如澤瀉之類

有元腎氣下注而成脚腫此當就源頭上治不可妄以脚氣藥施之蓋氣入腎則先脚腫而後腎疼腎氣注則先腎疼而後脚腫五心平脣腫臍突者不可治

病後浮腫此係脾虛用二分平胃散一分五苓散和匀湯調或生料煎服或用生料平胃散加木瓜腹皮人參各半錢茯苓一錢或六君子湯加木香半錢腫甚者木香流氣飲

四肢腫謂之肢腫宜五皮飲加薑黃木瓜各一錢或

四磨飲

面獨腫蘇子降氣湯兼氣急者尤宜或煎熟去滓後更磨沉香一呷

有一身之間惟面與雙脚浮腫早起則面甚晚則脚甚經云面腫爲風脚腫爲水乃風濕所致須問其大小腑門通閉別其陰陽二證前後用藥惟除濕湯加木香腹皮白芷各半錢可通用或以蘇子降氣湯除濕湯各半貼煎之

蠱脹證治

蠱與鼓同以言其急實如鼓非蠱毒之蠱也俗謂之膨脝又謂之蜘蛛病所感不同止是腹大而急餘處皮肉如常未辨何證宜用木香流氣飲或五苓散此病多以積漸而致或是病後臟氣未復邪氣乘虛切不可妄下氣急者蘇子降氣湯虛者可用穀神嘉禾散加熟附子半錢佐以復元丹

若腹內熱急大便或祕者宜備急丸或木香檳榔丸或用大黃厚朴陳皮枳實通大便爲上策

若因食傷而腹暴脹見傷食證

中毒腹脹權宜用解毒圓或甘豆湯

李梴醫學入門

水腫論陰陽

陽水多外因涉水冒雨或兼風寒暑氣而見陽證陰水多內因飲水及茶酒過多或饑飽勞役房慾而見陰證陽水先腫上體肩背手膊手三陽經陰水先腫下體腰腹髀跗足三陰經故男從脚下腫起女從頭上腫起爲逆陰陽微妙如此不可不辨

陰水多因久病或產後也久病者蓋謂久病喘欬瘧痢或誤服凉藥以致腫者危證也俱宜補脾爲主大概挾喘者分氣紫蘇飲五皮散葶藶丸久痢加味八味丸久瘧退黃丸產後腫必大補氣血使水自降八物湯加蒼朮陳皮半夏香附有熱加麥門冬黃芩氣不順加木香砂仁懷胎氣過水道腫者去半夏加紫蘇大腹皮飲食無阻者雖不藥而既產自消矣

陽水多兼食積或飲毒水或瘡痍所致也食積者用香平丸枳朮丸因酒小羅皂丸飲毒水而腫者名水蠱漆雄丸不伏水土者胃苓湯膿瘡搽藥愈後發腫

敗毒散便閉升麻和氣飲乾瘡洗浴水氣入腹者赤小豆湯瘡久倦怠嗜臥腫者五苓散加橘皮木香檳榔滑石甘草枳殼大腹皮砂仁薑煎溫服

濕熱變化總屬脾經

人身眞火眞水消化萬物以養生脾病則水流爲濕火炎爲熱久則濕熱鬱滯經絡盡皆濁腐之氣津液與血亦化爲水初起目下微腫如臥蠶及至水浮膜外則爲膚脹流於下焦則爲胕腫手按隨手而起如裹水之狀以指畫之成字者名燥水不成字者名濕水有按之作水聲者乃氣虛不能宣泄久成水瘕

下注腎經則陰胕腫

腎主水也惟脾病則不化飲食滋眞水非惟腎精損削而濕熱下注陰胕獨腫者有之甚則泛濫遍體無歸必土實而後足以收攝邪水腎氣歸元

肺氣上升則爲喘

金生水也惟脾病則肺金失養非惟肺氣孤危而失降下之令滲道不通且濕熱則濁氣上升爲喘爲欬必土實而後肺金清肅以滋化源或曰獨無寒濕者

乎寒則土堅水清間有亦更易治

陽水治法

陽水必熱渴二便閉經曰諸胕腫疼痠皆屬於火又曰結陽肢腫是也治與水證濕證大同大法腰已上腫宜汗腰已下腫宜下表證喘欬小青龍湯越婢湯古麻甘湯桂枝苦酒湯裏證腹腫脅硬十棗湯澤瀉湯澤瀉牡蠣湯導水丸三花神祐丸濬川丸布海丸然證可下又當權其輕重年衰久病及虛者黃米丸初起只宜上下分消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮木香檳榔生薑煎服或單山梔丸木香白朮煎湯下兼黃者茵陳五苓散滲之

陰水治法

陰水必身涼大便利經曰陰畜於內水氣脹滿是也治宜補脾土以復運化之常清心火降肺金俾肝木有制而滲導又且開通此補中行濕兼全虛而有濕熱者最宜若中寒者溫補則氣煖而小便自通氣陷者升提則陽舉而陰自降故曰行濕非五苓神祐之謂也補中氣六君子湯加木香瀉者參苓白朮散升

陽除濕防風湯嘔者赤茯苓湯中寒者元武湯實脾散挾食積者緊皮丸千金養脾丸挾濕熱者中滿分消湯丸濕甚者退黃丸虛甚氣陷口無味者六君子湯加升麻柴胡以提之復元丹切忌淡滲腎虛腰重脚腫濕熱者加味八味丸滋腎丸陽虛小便不利者古沉附湯二便俱利者朮附湯復元丹

風氣血因

陽水陰水腫外又有風氣血腫惟陽覃石瘕乃婦人病也風腫者卽痛風腫腫面多風熱腫脚多風濕關脉浮洪弦者風熱濕三氣鬱而爲腫因脾土不足木火太盛胃中純是風氣所以清氣不升腹作䐜脹濁氣不降大便閉澀經曰中滿瀉之於內者是也外證走注疼痛面皮粗麻木不仁先服三和散次服小續命湯大便閉去附子加檳榔牽牛日久者小金丹風從汗散故也虛弱不敢汗者四君子湯加升麻柴胡蒼朮防風汗多者防己黃芪湯氣腫者七情停涎鬱爲濕熱脾肺俱病四肢瘦削腹脅膨脹與水氣相似但以手按之成凹不卽起者濕也按之皮厚不成凹

者氣也六君子湯加木香木通喘者木香流氣飲大便閉者三和散六磨湯木香檳榔丸小便閉者忩氣飲嘔滿者四炒枳殼丸瀉者單香附丸挾痰腹脹滿者加味枳朮湯控涎丹瘀血腫者皮間必有赤縷血痕用四物湯加桃仁紅花或續斷飲加味八味丸婦人經閉敗血腫者腎氣丸加紅花或紅礬丸

陰腫治法

玉莖與陰囊伸縮痿强乃身中陰陽之機有陽火玉莖腫脹健強不休者柴青瀉肝湯濕熱下流者四苓散加山梔木通金鈴子莖囊腫大通明者木香流氣飲加木通煎吞青木香丸暴風客熱陰挺腫脹者龍膽瀉肝湯膀胱熱甚囊腫二便不通者三白散八正散腫痛者用小茴全蠍穿山甲木香等分爲末每服二錢空心酒下有陰寒濕腫痿弱者五苓散加茴香或八味丸腎大如斗者荔核散上熱下虛玉莖腫痛者清心蓮子飲陰腫大如升斗者用馬鞭草搗爛塗之或乾地龍爲末雞子清調敷囊軟者可治婦人陰腫便閉枳橘炒熱熨之

忌宜

凡陽水宜辛寒散結行氣苦寒瀉火燥濕陰水宜苦溫燥脾或辛熱導氣極忌甘藥助濕作滿尤忌針刺犯之流水而死凡先腫腹而後散於四肢者可治先腫四肢而後歸於腹者難治若肌肉崩潰足脛流水唇黑耳焦缺盆平臍凸背平手足掌平肉硬腹多青筋大便滑瀉者不治又面黑者肝死兩手無紋者心死臍凸者脾死兩肩凸者肺死下注腳腫者腎死

鼓脹證治

鼓脹中空外堅有似於鼓又曰蠱者若蟲侵蝕之義

虛脹陰寒爲邪吐利不食時脹時減按之則陷而軟

實脹陽熱爲邪身熱咽乾常脹內痛按之不陷而硬

大槩肥人氣虛多寒濕瘦人血虛多濕熱都緣脾濕失運布之職蓋脾居中能升心肺之陽降腎肝之陰今內傷外感脾陰受傷痰飲結聚飲食之精華不能傳布上歸於肺下注膀胱故濁氣在下化爲血瘀鬱久爲熱熱化成濕濕熱相搏遂成鼓脹或在臟腑之外或在榮衞之分或在胷脅或在皮膚雖各臟腑見

證亦總歸於脾也所謂各藏腑見證者如心脹煩心肝脹脅痛脾脹善噦肺脹欬喘腎脹腰痛胃脹胃脘痛大腸脹腸鳴飧泄小腸脹小腹引腰痛膀胱脹小便癃閉三焦脹氣滿皮膚膽脹口苦又有外感寒鬱則爲裏邪外感風寒傳至陽明裏分大實大滿者承氣湯古云下之脹已者是也若尋常感風脹者升麻葛根湯加蒼术或升麻胃風湯感寒脹者不換金正氣散加檳榔枳殼乾薑風寒兩感脹者五積散暑脹二便不利者香薷散加滑石枳殼黃連二便利者六和湯濕脹腰重或嘔者除濕湯濕瀉者三白湯若內傷氣滯二便或閉或溏七情鬱塞氣道升降失常腹脹大而四肢多瘦四七湯七氣湯四炒枳殼丸因怒傷肝勝脾者痞滿喘急平肝飲子甚者當歸龍薈丸虛者禹餘糧丸因怒傷肝乘肺傳大腸者腸鳴氣走有聲二便或閉或溏六君子湯加蘇子大腹皮木香草果厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化滯湯木香枳术丸溫膽湯退熱清氣湯恐傷腎精氣怯不上升而下焦脹者補中益氣湯加木香

檳榔故紙若食脹則有因熱者因寒者蓋因食肉果菜不化曰食脹初起多寒濕自利不食者胃苓湯加山楂麥芽或人參養胃湯加香附砂仁甚者治中湯加丁香或厚朴附子二味煎服久則濕熱乘脾大便乾燥者保和丸傷肉者黃連阿魏等分酢浸蒸餅爲丸或三補丸用香附山楂煎湯下傷雜果者古桂香丸或鹽湯探吐膏粱厚味大便祕者大承氣湯加桂或厚朴湯積熱者牽牛丸虛者木香檳榔丸滋腎丸

穀蟲癥痞之分

因穀食不化曰穀脹朝陽盛能食暮陽衰不能食者大異香散五膈寬中散濕熱者古萸連丸清膈蒼莎丸俱穀芽煎湯下或單雞矢醴散最妙又有蟲積脹善食癥脹不食蟲積脹者腹痛善食茶鹽之物千金散雷公丸小兒史君子丸大人虛者木香檳榔丸靈檳散化蟲丸積塊癥瘕脹者心腹堅硬欬嗽不眠廣朮潰堅湯保安丸紅丸子輕者枳朮丸龜甲丸

水血之辨

水脹漉漉血脹瘀血水脹者因停水飲茶酒不散曰

水脹腸中漉漉有聲怔忡喘息二陳湯加桔梗檳榔消飲丸酒脹桂苓甘露飲瘀血脹便黑多跌撲及產後所致人參芎歸湯散血消腫湯又有一種中滿脹稍輕俗云倒飽有氣虛者六君子湯加黃芪厚朴木香食積加山楂麥芽挾濕熱加黃連青皮白芍木香清氣陷者木香順氣湯有血虛者四物湯加白朮木通厚朴挾濕熱者加芩連有食滯者平胃散加山楂麥芽或枳朮丸凡虛脹及久病瘧痢脹者俱依此分氣血調治

治法大概以補中去濕爲主

凡脹初起是氣久則成水治比水腫更難蓋水腫飲食如常鼓脹飲食不及常病根深固必三五年而後成治腫惟補中行濕足矣治脹必補中行濕兼以消積更斷鹽醬音樂妄想不責速效乃可萬全若單腹腫大而四肢極瘦者名蜘蛛蠱古方雖有八物湯去地黃倍參朮加黃連厚朴及四柱散諸蠱保命丹蝦蟆煮肚法然此屬脾氣虛極本經自病更難相生相制乃眞臟病也不治若補中藥則有六君子湯去甘

草加大腹皮厚朴爲君佐以澤瀉利濕黃芩麥冬制肝朝寬暮急爲血虛去參合四物湯暮寬朝急爲氣虛倍參朮朝暮俱急血氣俱虛合八物湯肥人多濕合平胃散瘦人多火加香附黃連寒加附子厚朴熱加大黃食脹加砂仁神麴痰脹倍半夏加檳榔豬苓瘀血加桃仁五靈脂積聚堅硬加三稜莪朮大怒加蘆薈山梔氣脹及蟲積加木香檳榔氣下陷加升麻柴胡凡議下須脈實人盛按之堅者先與補藥次略疏導後入補否則徒快一時其脹愈甚經曰臟寒生滿病然寒脹恆多熱脹恆少

王綸明醫雜著

脹論

喘與脹二證相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後喘而後脹者主於肺脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脈通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也肺受邪而上喘則失下降之令故小

便漸短以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘爲本而脹爲標治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水旣上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之苟肺證而用燥脾之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治二證但知實脾行水而不知分別脾肺二證余故爲發明之

註按前證若肺中伏熱不能生水而喘且渴者用黃芩清肺飲以治肺用五淋散以清小便若脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚味脾肺積熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎丸以利小便若心火尅肺金而不能生腎水者用人參平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土若脾氣虛弱不能相制而喘者用補中益氣湯以培元氣用六味地黃丸以

生腎水若肝木尅脾土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元氣六味地黃丸以補腎水若脾胃虛寒不能相制而脹者用八味丸以補脾肺生腎水若脾肺虛寒不能通調水道而脹者用金匱加減腎氣丸補脾肺生腎水若酒色過度虧損足三陰而致喘脹痰湧二便不調或大小便道相牽作痛者亦宜用此丸多有生者

李中梓醫宗必讀

水腫脹滿

按內經之論腫脹五臟六腑靡不有之詳考全經如脈要論曰胃脈實則脹病形篇曰胃病者腹䐜脹本神篇曰脾氣實則腹脹涇溲不利應象論曰濁氣在上則生䐜脹此四條皆實脹也太陰陽明論曰飲食起居失節入五臟則䐜滿閉塞師傳篇曰足太陰之別公孫虛則鼓脹此二條皆虛脹也經脈篇曰胃中寒則脹滿方宜論曰臟寒生滿病風論曰胃風鬲寒不通失衣則䐜脹此三條皆寒脹也六元正紀至眞要等論有云太陰所至爲胕腫及土欝之發太陰之

初氣太陰之勝復皆濕勝之腫脹也或曰水運太過或曰寒勝則浮或曰太陽司天太陽勝復皆寒勝之腫脹也或曰少陰司天少陰勝復少陽司天少陽勝復或曰熱勝則腫皆火勝之腫脹也或曰厥陰司天在泉厥陰之復或曰陽明之復皆木邪侮土及金氣反勝之腫脹也由是則五運六氣亦各有腫脹矣然經有提其綱者曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰其本在腎其末在肺皆聚水也又曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也可見諸經雖皆有腫脹無不由於脾肺腎者蓋脾土主運行肺金主氣化腎水主五液凡五氣所化之液悉屬於腎五液所行之氣悉屬於肺轉輸二臟以制水生金者悉屬於脾故腫脹不外此三經也但陰陽虛實不可不辨大抵陽證必熱熱者多實陰證必寒寒者多虛先脹於內而後腫於外者爲實先腫於外而後脹於裏者爲虛小便黃赤大便祕結爲實小便淸白大便溏泄爲虛滑數有力爲實弦浮微細爲虛色紅氣粗爲實色悴聲短爲虛凡諸實證或六淫外客或飲食內傷陽邪急速其

至必暴每成於數日之間若是虛證或情志多勞或酒色過度日積月累其來有漸每成於經月之後然治實頗易理虛極難虛人氣脹者脾虛不能運氣也虛人水腫者土虛不能制水也水雖制於脾實則統於腎腎本水臟而元陽寓焉命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土則陰不從陽而精化爲水故水腫之證多屬火衰也丹溪以爲濕熱宜養金以制木使脾無賊邪之患滋水以制火使肺得清化之權夫制火固可保金獨不慮其害土乎惟屬熱者宜之若陽虛者豈不益其病哉更有不明虛實專守下則脹已之一法雖得少寬於一時眞氣愈衰未幾而腫脹再作遂致不救殊可嘆也余於此證察其實者直清陽明反掌收功苟涉虛者溫補脾腎漸次康復其有不大實亦不大虛者先以清利見功繼以補中調攝又有標實而本虛者瀉之不可補之無功極爲危險在病名有鼓脹與蠱脹之殊鼓脹者中空無物腹皮綳急多屬於氣也蠱脹者中實有物腹形充大非蟲卽血也在女科有氣分與血分之殊氣分者心胷

堅大而病發於上先病水脹而後經斷血分者血結胞門而病發於下先因經斷而後水脹在治法有理肺與理脾之殊先喘而後脹者治在肺先脹而後喘者治在脾以上諸法此其大略也若夫虛實混淆陰陽疑似貴在臨證之頃神而明之其免於實實虛虛之害乎若四肢不腫但腹脹者名單腹脹難愈

死證

腹脹身熱者死腹脹寒熱如瘧者死腹大脹四末清形脫洩甚爲逆腹脹便血脉大時絕者死以上脹滿之死證也脣黑或腫肝傷缺盆平心傷臍突脾傷足心平腎傷背平肺傷五傷者死陰囊及莖腫腐者死瀉後腹脹而有青筋者死大便滑泄水腫不消者死水腫先起於腹後散四肢者可治先起於四肢後歸於腹者死以上水腫之死證也

脉法

盛而緊或大堅以濇或遲而滑皆脹滿沉而滑浮而遲弦而緊皆水腫二病之脉實大者可治虛微者難治

趙獻可醫貫

氣虛中滿論

中滿者其證悉與鼓脹水腫無異何故屬之氣虛請得明言之答曰氣虛者腎中之火氣虛也中滿者中空似鼓虛滿而非實滿也大略皆脾腎兩虛所致海藏云夫水氣者乃胃土不能制腎水水逆而上行傳入於肺故令人腫治者惟知泄水而不知益胃故多下之强令水出不依天度流轉故胃愈虛食不滋味則發而不能制也莫若行其所無事則爲上計何今之人不知此等高論舉手便以爲水腫用內經去菀陳莝開鬼門潔淨府之法治之如舟車丸禹功散之類若眞知其爲水濕之氣客於中焦浸於皮膚皮膚中如水晶之光亮手按之隨起者以前藥一服而退若久病大病後或傷寒瘧痢後女人產後小兒痘後與夫元氣素弱者概以前法施之脾氣愈泄愈虛不可復救矣故治腫者先以脾土爲主須補中益氣湯或六君子湯溫補之俾脾土旺則能散精於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行矣或者疑謂喘

脹水滿而又加純補之劑恐益脹滿必須補藥中加行氣利水之品方妙此論似深得病情終非大方家體蓋肺氣旣虛不可復行其氣腎水已衰不可復利其水純補之劑初時似覺不快過時藥力得行漸有條理矣至於補腎以治腫其說難明蓋禹之治水行其所無事也若一事疏鑿則失之矣今人之治腎水者牽牛大戟粗工之小智正禹之所惡也間有用五苓五皮者以爲中正亦轉利轉虛腎氣愈衰而愈不能推送矣故須用補腎經曰腎開竅於二陰腎氣化則二陰通二陰閉則胃膹脹故曰腎者胃之關關門不利故水聚而從其類也又曰腎主下焦三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉必待三焦之火化始能出也其三焦之經在上者布膻中散絡心包在下者出於委陽上絡膀胱上佐天道之施化下佐地道之發生與手厥陰爲表裏以應諸經之使者也是故腎虛者下焦之火虛也宣明五氣論云下焦溢爲水以水注之所氣窒而不瀉則溢而爲水也經曰三焦病者氣滿小腹尤堅不得小便溢則

水留而爲脹惟張仲景製金匱腎氣丸補而不滯通而不泄誠治腫之神方國朝薛立齋先生屢用屢效詳載之醫案中余依其案親試之甚效故敢詳著焉世有患此者幸毋誕之乎

中滿之病原於腎中之火氣虛不能行水金匱腎氣丸以八味丸爲主以補腎中之火有所稟而浩然之氣塞乎天地腎氣不虛而能行水矣內有附子肉桂辛熱之品熱則流通又火能生土土實而能制水矣內加牛膝車前子二味最爲切當本草云車前子雖利小便而不走氣與茯苓同功强陰益精令人有子牛膝治老人失溺補中續絕壯陽益精病人虛損加而用之

前所論證治乃脾腎兩虛者至於純是脾虛之證旣以參芪四君爲主亦須以八味丸兼補命門火蓋脾土非命門火不能生虛則補母之義不可不知

又有一等純是陰虛者其證腹大臍腫腰痛兩足先腫小水短澀喘嗽有痰不得臥甚至頭面皆腫或面赤口渴但其人飲食知味大便反燥醫見形腫氣喘

水證標本之疾雜用利水之藥而益甚殊不知陰虛三焦之火旺與衝脈之屬火者同逆而上由是水從火溢上積於肺而嗽甚則爲喘呼不能臥散聚於陰絡而爲跗腫隨五臟之虛者入而聚之爲五臟之脹皆相火泛濫其水而生病也以六味地黃加門冬五味大劑服之余親試有驗故錄

又有一等火鬱者其證口苦脅痛惡寒目黃面黃嘔酸等證須用以逍遙散舒其鬱繼以六味腎氣滋其陰亦禁用分利

醫門法律　臣喻昌著

水腫論

病機之切於人身者水火而已矣水流濕火就燥水柔弱火猛烈水泛溢於表裏火遊行於三焦拯溺救焚可無具以應之乎經謂二陽結謂之消三陰結謂之水手足陽明熱結而病消渴火之爲害已論之矣而三陰者手足太陰脾肺二臟也胃爲水穀之海水病莫不本之於胃經乃以之屬脾肺者何耶使足太陰脾足以轉輸水精於上手太陰肺足以通調水道

於下海不揚波矣惟脾肺二臟之氣結而不行後乃胃中之水日畜浸灌表裏無所不到也是則脾肺之權可不伸耶然其權尤重於腎腎者胃之關也腎司開闔腎氣從陽則開陽太盛則關門大開水直下而爲消腎氣從陰則闔陰太盛則關門常闔水不通而爲腫經又以腎本肺標相輸俱受爲言然則水病以脾肺腎爲三綱矣於中節目尤難辨晰金匱分五水之名及五臟表裏主病徹底言之後世漫不加察其治水輒宗霸術不能行所無事可謂智乎五水者風水皮水正水石水黃汗也風水其脉自浮外證骨節疼痛惡風渾是傷風本證從表治之宜矣皮水其脉亦浮外證胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗證不同而治同其理安在則以皮毛者肺之合也肺行榮衛水漬皮間榮衛之氣膹鬱不行其腹如鼓發汗以散皮毛之邪外氣通則內鬱自解耳正水其脉沉遲外證自喘北方壬癸自病陽不上通關門閉而水日聚上下溢於皮膚胕腫腹大上爲喘呼不得臥腎本肺標子母俱病也石水其脉自沉外證

腹滿不喘所主在腎不合肺而連肝經謂肝腎丼沉爲石水以其水積胞中堅滿如石不上大腹適在厥陰所部卽少腹疝瘕之類也不知者每治他病誤動其氣上爲嘔逆多主死也巢氏病源謂石水自引兩脅下脹痛或上至胃脘則死雖不及於誤治大抵肝多腎少之證耳黃汗汗如蘗汁其脉沉遲身發熱胷滿四支頭面腫久不愈必致癰膿陰脉陽證腎本胃標其病皆胃之經脉所過後世名之癉水者是也夫水飲入胃不行鬱而爲熱熱則榮衞之氣亦熱熱之所過末流之患不可勝言皆從癉水而浸淫不已耳然水在心之部則鬱心火炳明之化水在肝之部則鬱肝木發生之化水在肺之部則孤陽竭於外其魄獨居水在脾之部則陰竭於內而穀精不布水在腎之部不但諸陽退伏卽從陽之陰亦且退伏孤陰獨居於下而隔絕也故胃中之水惟恐其有火有火仍屬消渴末傳中滿之不救腎中之水惟恐其無火無火則眞陽滅沒而生氣內絕其在心之水遏抑君火若得脾土健運子必救母卽在肝在肺在腎之水脾

土一旺水有所制猶不敢於橫發但當懷山襄陵之日求土不委頹足矣欲土宜稼穡豈不難哉夫水土平成以神禹爲師醫門欲平水土不師仲景而誰師乎

論海藏集仲景水氣例

海藏於治水腫一門務爲致詳設爲水氣問難求責脈之有力無力臟沉腑浮用藥大凡意在發明內經仲景其實渾是後人窠臼中無實得也其云高低內外輕重表裏隨經補瀉要當詳察肺胃腎三經病卽瘥也此一語最爲扼要然終未到家內經明謂三陰結謂之水三陰者太陰也足太陰脾手太陰肺氣結不行卽成水病而水之源出自腎故少陰腎亦司之但當言肺脾腎不當言肺胃腎也何也胃不必言也胃本水穀之海五臟六腑之大源脾不能散胃之水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病於上腎不能司胃之關門時其輸泄而病於下所以胃中積水浸淫無所底止耳海藏舉肺胃腎而遺脾於至理不過一間未達原不必議其治例仍以肺沉

大腸浮心沉小腸浮爲言此則相沿之陋也詎知臟腑各分沉浮而大小二腸不當從上焦分診邪至於所集仲景水氣例則未窺宮牆富美反多門外邪僻矣夫仲景論雜證於水腫一門極其精詳惟恐足太陰脾之健運失職手太陰肺之治節不行足少陰腎之關門不開并其腑膀胱之氣化不行所用方藥皆不蹈重虛之戒立於無過之地海藏集仲景治肺癰葶藶大棗瀉肺湯爲例是欲以瀉肺之法爲瀉水之法矣集仲景治傷寒痞連兩脅雜證支飲在脅之十棗湯爲例是欲以瀉胷脅及膀胱爲瀉水之法矣何其敢於操刃而藉口仲景耶不但此也抑且假托後人治水之峻藥本之仲景謂三花神祐丸即十棗湯加牽牛大黃輕粉除濕丹即神祐丸加乳香沒藥元青丹又即神祐丸加黃連黃蘗青黛集仲景之方以傳會後人罪不容誅矣後來依樣壺盧更改一味二味即成一方不傷脾即瀉肺不瀉肺即瀉膀胱乃致積水滔天載胥及溺絕無一人追悔從前用藥之咎正以繇來者非一日矣水病門中成方百道求一救

肺氣之膹鬱而伸伸其治節之方無有也求一救膀胱阻絕而伸其氣化之方無有也節取數方發明備用臨病自出生心化裁是所望矣

律六條

凡治水腫病不知風水皮水正水石水黃汗五證之別及脾肺腎三臟所主恣用驅水惡劣之藥及禹功舟車導水等定方者殺人之事也

凡治水腫病有當發汗散邪者不知兼實其衞致水隨汗浸淫皮膚不復順趨水道醫之罪也

凡治水腫病遇渴而下利之證誤利其水致津液隨竭中土坐困甚者脈代氣促擯於死亡醫之罪也

凡治水腫病遇少腹素有積塊疝瘕誤行發表攻裏致其人濁氣上衝胷胃大嘔大逆痛引陰筋卒死無救者醫殺之也

凡治水腫黃汗證乃胃熱釀成痺水誤用熱藥轉增其熱貽患癰膿醫之罪也

凡治水腫病不察寸口脈之浮沉遲數弦緊微濇以及趺陽脈之浮數微遲緊伏則無從辯證用藥動罹

凶禍醫之罪也

脹病論

脹病與水病非兩病也水氣積而不行必至於極脹脹病亦不外水裹氣結血凝而以治水諸法施之百中無一愈者失於師承無人輕施妄投耳今天下醫脉久斷醫藥久荒即欲效司馬子長擔簦負笈遍訪於江淮汶泗而師資果安在乎昌於斯世無地可以著矩然而皇皇斯人不敢自外請一比類爲後學商之仲景謂水病氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作然則脹病豈無血分腹中堅大如盤者乎多血少氣豈無左脅堅大如盤者乎多氣少血豈無右脅堅大如盤者乎故不病之人凡有癥瘕積塊痞塊即是脹病之根日積月累腹大如箕腹大如甕是名單腹脹不似水氣散於皮膚面目四肢也仲景所謂石水者正指此也胃中空曠氣食尚可從旁轆轉腹中大小腸膀胱逼處瘀濁占據水不下趨而泛溢無不至矣內經明脹病之旨而無其治仲景微示其端而未立法然而比類推之其法不啻詳也仲景於氣分

心下堅大如盤者兩出其方一方治陰氣結於心下用桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯一方治陽氣結於心下用枳术湯夫胷中陽位尚分陰氣陽氣而異其治況腹中至陰之處而可不從陰獨治之乎陰氣包裹陰血陰氣不散陰血且不露可驅其血乎舍雄入九軍單刀取勝之附子更有何藥可散其陰氣破其堅壘乎推之兩脅皆然但分氣血陰結之微甚而水亦必從其類矣此等比類之法最上一乘非中材所幾和盤托出爲引伸啓發之助

律一條

凡治脹病而用耗氣散氣瀉肺瀉膀胱諸藥者殺人之事也蓋治病用藥貴得其宜病有氣結而不散者當散其結甚有攻下蕩滌而其氣之結尚未遽散者漸積使然也今脹病乃氣散而不收更散其氣豈欲直裂其腹乎收之不能遽收亦漸積使然緩緩圖成可也若求快意一朝如草頭諸方明明立見殺人若輩全不悔悟展轉以售奸吾不知其何等肺腸千刼不能出地獄矣

景岳全書　臣張介賓著

腫脹總論

腫脹之病原有內外之分蓋中滿者謂之脹而肌膚之脹者亦謂之脹若以腫言則單言肌表此其所以當辨也但脹於內者本由臟病而腫於外者亦無不由乎臟病但臟氣之病各有不同雖方書所載有濕熱寒暑血氣水食之辨然余察之經旨驗之病情則惟在水氣二字足以盡之故凡治此證者不在氣分則在水分能辨此二者而知其虛實無餘蘊矣病在氣分則當以治氣爲主病在水分則當以治水爲主然水氣本爲同類故治水者當兼理氣蓋氣化水自化也治氣者亦當兼水以水行氣亦行也此中元妙難以盡言茲雖條列如左然運用之法貴在因機變通也

病在氣分者因氣之滯如氣血之逆食飲之逆寒熱風濕之逆氣虛不能運化之逆但治節有不行者悉由氣分皆能作脹凡氣分之病其色蒼其內堅其脹或連胷脅其痛或及臟腑或倏而浮腫者陽性急速

也或自上及下者陽本乎上也或通身盡腫者氣無不至也有隨按而起者如按氣囊也然此雖皆氣分而氣病有不同故有氣熱而脹者曰諸腹脹大皆屬於熱也有氣寒而脹者曰胃中寒則䐜脹曰臟寒生滿病也有氣濕而脹者曰諸濕腫滿皆屬於脾也有氣虛而脹者元氣虛也曰足太陰虛則鼓脹也有氣實而脹者邪氣實也曰腎氣實則脹曰脾氣實則腹脹曰胃氣實則脹也凡此雖皆脹病而治之則全在察其虛實大都陽證多熱熱證多實陰證多寒寒證多虛先滯於內而後及於外者多實先腫於表而漸及於內或外雖脹而內不脹者多虛小便紅赤大便祕結者多實小便清白大便稀溏者多虛脈滑有力者多實弦浮微細者多虛形色黃紅氣息粗長者多實形容憔悴聲音短促者多虛年青少壯氣道壅滯者多實中衰積勞神疲氣怯者多虛虛實之治反如冰炭若誤用之必致害矣

病在水分者以陰勝於陽而肌膚皆腫此與氣證本有不同凡水之爲病其色明潤其皮光薄其腫不速

每自下而上按肉如泥腫有分界蓋陰本於下而浸漬有漸皆水病之證也觀水脹篇言寒氣之脹按其腹窅而不起水腫之病以手按其腹隨手而起如囊裹水之狀此其候也然以愚見及察之證驗則若與此論相反蓋凡是水證必按之窅而不起此其水在肉中如糟如泥按而散之猝不能聚未必如水囊之比凡隨按隨起者亦惟虛無之氣其速乃然故辨當若此也凡欲辨水氣之異者在欲辨其陰陽耳若病在氣分則陽證陰證皆有之若病在水分則多爲陰證何也蓋水之與氣雖爲同類但陽旺則氣化而水卽爲精陽衰則氣不化而精卽爲水故凡病水者本卽身中之血氣但其爲邪爲正總在化與不化耳水不能化因氣之虛豈非陰中無陽乎此水腫之病所以多屬陽虛也然水主於腎氣主於肺水漬於下而氣竭於上所以下爲腫滿上爲喘急標本俱病危斯急矣此當速救本原庶保萬一倘以虛喘作實邪而猶然泄肺無不敗矣

少年縱酒無節多成水鼓蓋酒爲水穀之液血亦水

穀之液酒入中焦必求同類故直走血分經曰飲酒者衛氣先行皮膚先充絡脈此之謂也然血者神氣也屬陰而性和酒者淫氣也屬陽而性悍凡酒入血分血欲靜而酒動之血欲藏而酒逐之故飲酒者身面皆赤此入血之徵亦散血之徵也擾亂一番而血氣能無耗損者未之有也但年當少壯則隨耗隨生固無所覺及乎血氣漸衰則所生不償所耗而且積傷併至病斯見矣故或致血不養筋則爲中風或致傷脾則爲痰飲瀉痢或濕熱上浮則爲喘汗鼻淵或流於筋骨則爲瘈瘲疼痛或致動血傷精則爲勞損吐衄或致傷肌腐肉則爲爛瘡痔漏其有積漸日久而成水鼓者則尤多也蓋酒性本濕壯者氣行則已酒卽血也怯者著而成病酒卽水也不惟酒爲水而血氣既衰亦皆隨酒而悉爲水矣所以凡治水鼓者必當以血氣爲主而養陰利濕是誠善矣奈無知少年初不知畏而惟酒是耽此其浸漬已非一日致令血氣天眞敗極至此又豈能以旦夕挽回者哉故於諸鼓之中則尤以酒鼓爲最危難治之證嘗有一杜

康之徒不信予說云公爲此言其亦過矣茲見有某人者以酒爲生自朝繼暮今年已若干未聞其病豈酒果傷人者耶是不知若人者惟千百中之一二而天稟之特出者也不然何善飲者如此其多而壽於飲者僅見其人則其他之困於此者從可知矣使不有斯人之稟而有斯人之嗜吾知其不免矣

危候總辨

大凡水腫先起於腹而後散四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者難治又掌腫無紋者死大便滑瀉水腫不消者死脣黑脣腫齒焦者死臍腫突出者死缺盆平者死陰囊及莖俱腫者死脈絕口張足腫者死足胕腫膝如斗者死肚上青筋見瀉後腹腫者死男從身下腫上女從身上腫下皆難治

氣分脹滿論治

凡脹滿由於氣分者宜察氣之虛實若脹滿在中而不在外者其病多實經曰中滿者瀉之於內此之謂也若果因酒食厚味氣滯脈滑而大滿大實者宜廓清飲主之兼脹兼痛諸藥不效者宜神香散主之若

臟腑脹實而兼痛者宜承氣湯或百順丸下之然必年壯力强素無損傷虛弱等證而暴見脹滿方可峻攻否則只宜緩治如果氣實於中而表裏俱脹者宜用蒜瓣以滾湯煮微熟留性少蘸鹽酢常以佐食大能破氣消滯亦佳法也若氣脹而兼小水不利者宐用四苓散以半熟蒜搗膏丸服極妙

飲食停滯而致胃口中焦脹滿者宜大小和中飲酌用之兼痛者宐排氣飲主之

怒氣逆於中焦或脹或痛者宜排氣飲解肝煎之類主之兼喘脹者宐四磨飲或神香散

大人小兒素無脾虛泄瀉等證而忽爾通身浮腫或小水不利者多以飲食失節或濕熱所致宜廓清飲加減主之或四苓散胃苓湯之類皆可用或濕勝者宜平胃散之類主之

脾胃虛寒中氣不健而三焦脹滿者是爲氣虛中滿其爲證也必多吞酸噯腐惡食惡寒或常爲溏泄而別無火證火脈者必屬臟寒此所謂臟寒生滿病也惟宜溫補寒在中焦者宜溫胃飲理中湯寒在下焦

者宜理陰煎八味地黃湯之類主之

單腹脹者名爲鼓脹以外雖堅滿而中空無物其象如鼓故名鼓脹又或以氣血結聚不可解散其毒如蠱亦名蠱脹且肢體無恙脹惟在腹故又名爲單腹脹此實脾胃病也夫脾胃爲中土之臟爲倉廩之官其臟受水穀則有坤順之德其化生血氣則有乾健之功使果脾胃强健則隨食隨化何脹之有此惟不善調攝而凡七情勞倦飲食房闈一有過傷皆能戕賊臟氣以致脾土受虧轉輸失職正氣不行清濁相混乃成此證凡治此者若察其病由中焦則當以脾胃爲主宜參芪白术乾薑甘草之屬主之若察其病由下焦則當以命門母氣爲主宜人參熟地當歸山藥附子肉桂之屬主之如果氣有痞塞難於純補則宜少佐辛香如陳皮厚朴砂仁香附丁香白芥子之屬如或水道不利濕氣不行則當助脾行濕而佐以淡滲如猪苓澤瀉茯苓之屬若諸藥未效仍當灸治如後法以上諸法大略如此然病成單鼓終非吉兆必其傷敗有漸然後至此使非盡掃塵紛加意調理

則未有或免者矣

治脹當辨虛實若察其果由飲食所停者當專去食積因氣而致者當專理其氣因血逆不通而致者當專淸其血其於熱者寒之結者散之淸濁混者分利之或升降其氣或消導其邪是皆治實之法也但凡病腫脹者最多虛證若在中年之後及素多勞傷或大便溏泄或脉息弦虛或聲色憔悴或因病後或因攻擊太過而反致脹滿等證則皆虛實之易見者也諸如此類使非培補元氣速救根本則輕者必重重者必危矣若虛在脾肺者宜四君子湯歸脾湯之類主之若脾虛兼寒者宜理中湯溫胃飲五君子煎若脾虛兼痰者宜六君子湯若腎虛兼痰者宜金水六君煎若虛在肝腎者宜六味地黃湯若腎虛兼寒者宜理陰煎或八味地黃丸甚者加減金匱腎氣湯主之若以虛證而妄行消伐則百不活一矣其有果以少壯停滯或肝強氣逆或時氣亢害爲邪者方可直攻其病但辨之宜詳不可忽也

凡外感毒風邪畱膚腠則亦能忽然浮腫如東垣所

謂八益之邪自外入者是也然其來必速其證則必有脈緊及頭痛骨痛等證方是外感之候先宜解散其邪如正柴胡飲小柴胡湯敗毒散參蘇飲葛根葱白湯之類隨宜用之若風因火熾而表裏俱熱宜芍藥清肝散或龍膽瀉肝湯之類主之若邪傳入裏太陽陽明併病而胃實熱甚必日晡潮熱大渴引飲者白虎湯主之若大實大滿而熱結不退者大承氣湯或百順丸下之若少陽陽明併病寒熱往來滿而實者宜大柴胡湯下之五常政大論曰下之則脹已此之類也

水腫論治

凡水腫等證乃脾肺腎三臟相干之病蓋水爲至陰故其本在腎水化於氣故其標在肺水惟畏土故其制在脾今肺虛則氣不化精而化水脾虛則土不制水而反尅腎虛則水無所主而妄行水不歸經則逆而上泛故傳入於脾而肌肉浮腫傳入於肺則氣息喘急雖分而言之而三臟各有所主然合而言之則總由陰勝之害而病本皆歸於腎內經曰腎爲胃關

關門不利故聚水而從其類也然關門何以不利也經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣夫所謂氣化者卽腎中之氣也卽陰中之火也陰中無陽則氣不能化所以水道不通溢而爲腫故凡治腫者必先治水治水者必先治氣若氣不能化則水必不利惟下焦之眞氣得行始能傳化惟下焦之眞水得位始能分消求古治法惟薛立齋先生加減金匱腎氣湯誠對證之方也余屢用之無不見效此雖壯水之劑而實卽脾肺腎三臟之正治也何也蓋腎爲先天生氣之源若先天元氣虧於下則後天胃氣失其所本而由脾及肺治節所以不行是以水積於下則氣壅於上而喘脹由生但宜峻補命門使氣復元則三臟必皆安矣今論其方如所用桂附以化陰中之陽也熟地山藥牛膝以養陰中之水也茯苓澤瀉車前子以利陰中之滯也此能使氣化於精卽所以治肺也補火生土卽所以治脾也壯水通竅卽所以治腎也此方補而不滯利而不伐凡病水腫於中年之後及氣體本弱者但能隨證加減用之其應如響

誠諸方之第一更無出其右者

證有全由脾肺不足而爲腫脹者治宜以四君歸脾之屬爲主固是正治之法然亦須兼補命門蓋脾土非命門之火不能生肺氣非命門之火不能化人知土能制水而不知陽實制陰人知氣化爲精而不知精化爲氣也虛則補母正此之謂

凡素稟陽盛三焦多火而病爲水腫者其證必煩渴喜冷或面赤便結或熱而喘嗽或頭面皆腫或脈見滑實此濕熱相因陰虛之證也凡辛香燥熱等劑必所不堪宜用六味地黃湯加牛膝車前麥冬之類大劑與之其有熱甚者宜加減一陰煎加茯苓澤瀉牛膝車前之類主之其有虛中挾實胷膈不清宜加陳皮白芥子之類佐之若生平不宜熟地者則單用生地亦可但此等壯水等劑必十餘服後方可望效若先尅伐致虛者其效尤遲愼毋欲速自求伊戚也

凡年少縱酒致爲濕熱所乘元氣尚強脈實有力而不便於溫補者此當逐去濕熱亦能速效宜禹功散導水丸濬川散三花神祐丸之類皆可擇用瀉後宜

薄滋味戒飲酒久之方可復元

古法治腫大都不用補劑而多用去水等藥微則分利甚則推逐如五苓散五淋散五皮散導水茯苓湯之類皆所以利水也如舟車神祐丸濬川散禹功散十棗湯之類皆所以逐水也再如巴豆朴硝鍼砂滑石三稜蓬朮麝香琥珀土狗地龍田螺水蛭鯉魚鯽魚蘿蔔子蘇子商陸葶藶杏仁防己秦艽木瓜瞿麥通草厚朴赤小豆猪苓海金沙五加皮大腹皮羌活獨活之類無非逐水利水之劑但察其果係實邪則此等治法誠不可廢但必須審證的確用當詳慎也凡今方士所用則悉皆此類故能晚服而早通朝用而暮瀉去水斗許腫脹頓消效誠速也但彼不顧人之虛實不慮人之死生惟以見效索謝而去不知隨消隨脹不數日而復脹必愈甚苟以衰年積損之證而復遭此刦則百無一生矣

水腫證以精血皆化爲水多屬虛敗治宜溫脾補腎此正法也然有一等不能受補者則不得不從半補有并半補亦不能受者則不得不全用分消然以消

治腫惟少年之暫病則可若氣血既衰而復不能受補則大危之候也故凡遇此輩必須千方百計務救根本庶可保全嘗見有專用消伐而退腫定喘者於腫消之後必尪羸骨立略似人形多則半年少則旬日終無免者故余之治此凡屬中年積損者必以溫補而愈皆終身絕無後患蓋氣虛者不可復行氣腎虛者不可復利水且溫補即所以化氣氣化而全愈者愈出自然消伐所以逐邪邪逐而暫愈者愈由勉強此其一爲眞愈一爲假愈亦豈有假愈而果愈者哉

無論氣鼓水鼓凡氣實可下者宜用赤金豆或百順丸以漸利之

徐東皐曰經云臟寒生滿病脉經云胃中寒則脹滿脾爲陰中之至陰故經曰太陰所至爲稸滿大抵脾濕有餘無陽不能施化如土之久於雨水則爲泥矣豈能生化萬物必待和風暖日濕去陽生自然生長也故凡若此者宜亟以辛熱藥治之又曰經云下之則脹已此以濕熱飲食有餘脾胃充實者言也如仲

景治傷寒邪入於裏而成腹滿堅實大便祕而不利者宜以三承氣湯下之可也若因脾虛內寒不足而氣不能運化精微以成腹滿者故宜以甘溫補脾爲主少佐辛熱以行壅滯之氣庶使脾土旺健脹滿運行斯可愈矣卽經所謂塞因塞用從治之法耳醫者不察乎此惟執下則脹已急於獲效病者苦於脹滿喜行利藥以求通快不知暫快一時則眞氣愈傷腹脹愈甚去死不遠矣俗謂氣無補法者以其痞塞似難於補不思正氣虛而不能運行爲病經曰壯者氣行則愈是也又曰水腫本因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾使脾氣得實則自健運而水自行大抵只宜補中行濕利小便切不可下但用二陳加人參蒼白朮爲主或佐以黃芩麥冬炒梔子以制肝木若腹脹少佐厚朴氣不運加木香木通氣若陷下加升麻柴胡提之必須補中行濕加升提之藥能使大便潤小便長又曰諸家治水腫只知導濕利小便執此一途用諸去水之藥往往多死又用導水丸舟車丸神祐丸之類大下之此速死之兆蓋脾氣虛極

而腫愈下愈虛雖刦之取目前之快而陰損正氣禍不旋踵大法只宜補中宮爲主看所挾加減不爾則死當以嚴氏實脾散加減要知從治塞因塞用之理然後可以語水腫之治耳

石室祕籙

臣陳士鐸著

水腫治法

水腫之病亦土不能尅水也方用牽牛甘遂各三錢水煎一服即大瀉水斗餘鼓脹盡消此則直奪其水勢而土得其平成矣但二味藥性峻烈過於猛矣人疑非正治之法然水勢滔天必開決其水口則水旋消此二味之中病源妙在於猛也但服此二味之後切不可食鹽如食鹽則前病重犯不可救矣此乃不知禁忌自犯死證非藥之故也今人一見牽牛甘遂視爲必死之品過矣水腫之病必須以手按之而如泥者始可用此二味正治否則按之不如泥隨按而皮隨起者非水也當作氣虛腎虛治之不可以此二味輕投以殺之也

水腫之疾腹脹如鼓兩跗如浮按之如泥小便不利

大便反結人以爲水病誰知皆由於土氣之鬱方用鷄屎醴一升炒黃色爲末以黃酒一斤先將鷄屎末盛於新布上後將黃酒灑之不可太驟緩緩冲之則藥味盡下取汁一椀病人服之切不可令病人先知則不肯信心而服使生別病下喉之後腹卽作雷鳴一飯之間傾腹而出兩足卽減大半再飲一椀全消蓋鷄屎善能逐水而又通土性無微不入將從前所畜之水無不開其水口盡歸大腸而洩此奪治之法也一法用大麥芒二兩煎湯飲之亦消且無後病但須一連數月作湯飲之卽泄水而愈藥平常而奏功甚奇也然此方止可治初起之水腫而不可治久病之水腫也

鼓脹治法

鼓脹數年而不死者必非水鼓水鼓之證不能越於兩年未有皮毛不流水而死者今二三年不死非水鼓乃氣鼓血鼓食鼓蟲鼓也但得小便利而胃口開者俱可治方用茯苓五兩人參大黃蘿蔔子各一兩雷丸三錢白朮五錢附子一錢水十椀煎湯二椀早

服一椀必然腹內雷鳴少頃必下惡物滿桶急拿出傾去再換桶即以第二椀繼之又大瀉大下至黃昏而止淡淡米飲湯飲之不再瀉然人弱極矣方用人參白芥子各一錢茯苓五錢薏苡仁一兩山藥四錢陳皮五分水煎服一劑即愈忌食鹽者一月犯則無生機矣先須斷明然後用藥治之鼓脹之病年久不死原是可救所以用下藥以成功非土鬱之中有水積若果水證早早死矣安能三年之未死也然而雖非水證而水必有壅阻之病方中仍用茯苓爲君以雷丸大黃爲佐不治水而仍治水所以奏功如神也

水鼓滿身皆水按之如泥者是若不急治水流於四肢而不得從膀胱出則變爲死證而不可治矣方用決流湯牽牛甘遂各二錢肉桂三分車前子一兩水煎服一劑而水流斗餘二劑即全愈斷不可與三劑也與三劑反殺之矣蓋牽牛甘遂最善利水又加之車前肉桂引水以入膀胱但利水而不走氣不使牽牛甘遂之過猛利水併走氣也但此二味畢竟性猛多服傷人元氣故二劑逐水之後斷宜屏絕須改用

五苓散調理二劑又用六君子湯以補脾可也更須忌食鹽犯則不救

氣鼓乃氣虛作腫似水鼓而非水鼓也其證一如水鼓之狀但按之皮肉不如泥耳必先從脚面腫起後漸漸腫至上身於是頭面皆腫者有之此等氣鼓必須健脾行氣加利水之藥則可救倘亦以水鼓法治之是速之死也宜消氣散白朮薏仁茯苓各一兩肉桂甘草各一分枳殼五分山藥五錢人參車前子蘿蔔子神麯各一錢水煎服日日一劑初服覺有微碍久則日覺有效十劑便覺氣漸舒二十劑而全消三十劑而全愈此方健脾而仍是利水之品故不傷氣奏功雖緩而起死實妙也然亦必禁食鹽三月後可漸漸少用矣即秋石亦不可用必須三月後用之

蟲鼓惟小腹作痛而四肢浮脹不十分之甚面色紅而帶點如蟲蝕之象眼下無臥蠶微腫之形此是蟲鼓也必須殺蟲可救然過於峻逐未免轉傷元氣轉利轉虛亦非生之之道方用消蟲神奇丹雷丸神麴茯苓白礬各三錢當歸鼈甲醋炙各一兩鮮地栗粉

一兩取汁一茶甌車前子五錢水煎服一劑即下蟲無數二劑蟲盡出矣蟲去而鼓自消不必用三劑也蓋雷丸最善逐蟲去穢而鼈甲地栗更善化蟲於烏有然蟲之生必有毒結於腸胃之間故又用白礬以消之誠慮過於峻逐又佐之當歸以生血新血生而舊瘀去更佐之茯苓車前分利其水氣是蟲從大便而出而毒從小便而行自然病去如掃矣但此藥服二劑後必須服四君六君湯去甘草而善爲之調理也

血鼓之證其由來漸矣或跌閃而血瘀不散或憂鬱而血結不行或風邪而血畜不發遂至因循時日留在腹中致成血鼓飲食入胃不變精血反去助邪久則脹脹則成鼓矣倘以治水法逐之而證犯非水徒傷元氣倘以治氣法治之而證犯非氣徒增飽滿是愈治而愈脹矣宜消瘀蕩穢湯水蛭三錢必須炒黑大約一兩炒黑取末用三錢當歸二兩雷丸紅花枳實白芍牛膝各三錢桃仁四十粒去皮尖搗碎水煎服一煎即下血斗餘再煎即血盡而愈蓋血鼓之證

惟腹脹如鼓而四肢手足並無脹意故血去而病即安也服此方一劑之後切勿再與二劑當改用四物湯調理於補血內加白朮茯苓人參補氣而利水自然全愈否則血鼓雖痊恐成乾枯之證

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十卷目錄

醫部彙考三百十

腫脹門三

方

防己黃芪湯 防己茯苓湯 越婢湯 越婢加朮湯 麻黃附子湯 黃芪芍藥桂枝苦酒湯 桂枝加黃芪湯 甘草麻黃湯 枳朮湯 桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯 防己椒藶丸 厚朴七物湯 中滿分消丸 半夏厚朴湯 木香順氣湯 木香塌氣丸 實脾飲 復元丹 導滯通經湯 胃苓湯 消風敗毒散 加減金匱腎氣丸 調榮飲 烏鯉魚湯 防己散 導水茯苓湯 大腹皮散 楮白皮散 木香丸 海蛤丸 檳榔散

五皮散　五皮散　疏鑿飲子　調胃白朮澤
瀉散　漢防己煑散　葶藶丸　白朮木香散
分氣補心湯　當歸散　無礙丸　木香分
氣湯　沉香琥珀丸　人參木香散　大沉香
尊重丸　續隨子丸　補中治濕湯　澤瀉散
黃米丸　漆雄丸　煨腎丸　退腫塌氣散
葶藶木香散　桂朮湯　桂苓湯　丹房奇
術　塗臍膏　消河餅　加減胃苓湯　四苓
五皮湯　集香湯　三仁丸　椒豉丸　海金
沙散　木香塌氣丸　木香散　大異香散
大半夏湯　人參丸　大溫中丸　禹餘糧丸
朮香化滯散　導氣丸　參香散　平肝飲
子　强中湯　敷藥方　草豆蔻湯　葶藶木
香散　白朮木香散　二氣散　家傳正氣散
行濕補氣養血湯　消脹飲子　金陵酒丸
調胃散　金蟾散　牛皮丸　蘇沉破結湯
回生丹　推車丸　導水餅　消河餅　復
元丹　四苓散

藝術典第三百三十卷

醫部彙考三百十

腫脹門三

方

防己黃芪湯（仲景下同）

治風水脈浮身重汗出惡風者

防己一兩　黃芪一兩二錢　白朮七錢半

甘草炙半兩

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水一盞半煎

取八分去滓溫服良久再服腹痛加芍藥

謹按脈浮表也汗出惡風表虛也身重水客分肉也防己療風腫水腫通腠理黃芪溫分肉補衛虛白朮治皮風止汗甘草和藥益土生薑大棗辛甘發散腹痛者陰陽氣塞不得升降再加芍藥收陰

防己茯苓湯

治皮水爲病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者

防己　黃芪　桂枝各三兩　白茯苓六兩

甘草二兩

右水六升煑取二升分溫三服

謹按本方與上風水相彷彿蓋同一開鬼門而標中之本則微有分風水水下鬱其土氣則用白朮崇土薑棗和中皮水內合於肺金鬱泄之水漬於皮宜淡滲之故以茯苓湯白朮加桂枝解肌散水於外不用薑棗之抑於中也況四肢聶聶風在榮衛觸動經絡桂枝尤不可少耶

越婢湯

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者

麻黃六兩　石膏五錢　甘草二兩　生薑三兩　大棗十五枚

右以水六升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升分溫三服

謹按麻黃甘熱石膏甘寒合而用之者脾偏陰則和以甘熱胃偏陽則和以甘寒至於風熱之陽水寒之陰凡不和於中土者罔不咸宜何者中土和而後水穀化其精悍之氣以實榮衛不和則榮衛虛而或寒或熱之氣皆得壅塞其隧道而不通於表裏所以在表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者亦必用之無非欲其不害中土耳不害中土自足消患於方萌又何汎濫之爲憂哉

越婢加朮湯

治裏水一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故渴此湯主之

麻黃六兩　石膏半兩　白朮四兩　生薑三兩

大棗十五枚　甘草二兩

右以水六升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升分溫三服

謹按前條風水續自汗出無大熱故用越婢湯設不汗出且大熱表法當不止此此條裏水假如小便自利亡津而渴故用越婢加朮不爾裏法當不止此也曰無大熱則有熱可知曰裏水乃軀殼之裏非臟腑之裏可知故俱用越婢湯也

麻黃附子湯

治水病其脈沉小屬少陰浮者爲水無水虛脹者爲氣水發其汗卽已脈沉者宜此方

麻黃三兩　甘草二兩　附子一枚炮

右水七升先煑麻黃去上沫內二味煑取二升半溫服八合日三服

杏子湯未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯前證脈浮者宜此方

謹按此論少陰正水之病其脈自見沉小殊無外出之意若脈見浮者風發於外也無水虛脹者手

太陰氣鬱不行也風氣之病發其汗則自已耳卽脈沉無他證者當倣傷寒少陰例用麻黃附子甘草湯盪動其水以救腎若脈浮者其外證必自喘當倣傷寒太陽例用麻黃杏子甘草石膏湯發散其邪以救肺此治金水二臟之大法也

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

治黃汗因汗出入水浴水從汗孔入病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脈自沉

黃芪五兩　芍藥　桂枝各三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煑取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也一方用美酒醯代苦酒

謹按此方蓋以汗出而衞氣不固外水入搏於營鬱而爲熱熱盛則腫而發黃熱盛則耗其精液而作渴故以黃芪固護其衞以桂枝本方加苦酒引入營分散其水寒之邪其不用薑棗者所重在衞氣虛恃黃芪實衞之大力耳

桂枝加黃芪湯

治黃汗兩脛自冷

桂枝　芍藥　生薑各三兩　大棗十二枚

黃芪　甘草各二兩

右六味以水八升煑取三升溫服一升須臾飲稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

謹按桂枝全方啜熱粥助其得汗加黃芪固衞以其發熱故用桂枝以其自汗盜汗故加黃芪也其發汗已仍發熱邪去不盡勢必從表解之汗出輙輕身不重也久久身瞤胷中痛又以過汗傷其衞外之陽並胷中之陽也腰以上有汗以下無汗陽通而陰不通上下痞隔更宜黃芪固陽桂枝通陰其黃汗與歷節有分陽火獨壅於上爲黃汗陰水獨積於下爲兩脛冷陽火盛及肌肉則發熱陰水寒及筋骨則歷節痛源同而流不同也食已汗出者食入於所長之陽與勞氣相搏散出爲汗乃至氣門不閉津液常泄暮爲盜汗也甲錯者皮間枯澀如鱗甲錯出也發熱不已熱入肉腠必生惡瘡

癅結癰膿也腰髋弛痛如有物在皮中狀卽內經痛痹逢寒則蟲之類也小便不利津液從汗越也不能食脾胃氣虛不化穀也身體重衞氣不充分肉也煩躁胃熱上熏心肺也治黃汗之法盡發於此矣

甘草麻黃湯

甘草二兩　麻黃四兩

右二味以水五升先煑麻黃去上沫內甘草煑取三升溫服一升重覆汗出不汗再服愼風寒有人患氣促積久不差遂成水腫服此湯得效

枳朮湯

枳實七枚　白朮三兩

右二味以水五升煑取三升分溫三服腹中耎卽當散也

觀此可見仲景之法皆用脈病爲本然後量輕重虛實而施治皆守聖經之法耳後世治水腫方有五皮散香蘇散中用薑桔紫蘇大腹皮辛以散之茯苓防己木通桑皮淡以滲之是開鬼門潔淨府

同用也俗醫因病者急求一時之效以破氣去水爲功不知過一二日則病復至而不可救其故有二一以病人不善調攝一以醫悞投下藥之過竭其陰陽絕其胃氣此所以水腫之病多死

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝　生薑各三兩　大棗十二枚　麻黃

細辛　甘草各二兩　附子炮一枚

右七味以水七升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中卽愈

防己椒藶丸

防己　椒目　炙葶藶　大黃各一兩

右末之蜜爲丸桐子大先食飲服十九日三服稍增口中自有津液渴者加芒硝五錢

厚朴七物湯

厚朴半斤　甘草　大黃各三兩　大棗十枚

枳實五枚剉　桂枝三兩　生薑五兩

右水一斗煑取四升溫服八合日三服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

中滿分消丸（東垣下同）

治中滿熱脹有寒者不治

黃芩炒夏月一兩二錢　薑黃　白朮　人參

炙甘草　猪苓各一錢　知母炒四錢　乾薑

白茯苓　砂仁各二錢　厚朴薑炙一兩　澤瀉

陳皮各三錢　枳實炒　半夏泡　黃連炒各五錢

右除茯苓澤瀉生薑外共爲細末入上三味和勻湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服一百丸白湯下食後服量病人大小加減

半夏厚朴湯

半夏一錢　厚朴八分　炒麯六分　當歸梢

猪苓　荆三稜　升麻各四分　肉桂　白茯苓

蒼朮　澤瀉　橘皮　生黃芩　草豆蔻仁

生甘草　柴胡各三分　木香　青皮各二分

桃仁七箇　吳茱萸　乾生薑　黃連各一分

紅花　蘇木各半分　昆布少許

右水二鍾煎至一鍾去柤稍熱服二服後前證減一半却於前藥中加減服之渴加葛根三分

木香順氣湯

治濁氣在上則生䐜脹兩脅刺痛脈弦而細者

木香　蒼朮　草豆蔻麪裹煨各三分　青皮

益智仁　陳皮　澤瀉　乾薑　白茯苓　半夏

吳茱萸湯泡各二分　厚朴製四分　當歸

人參各五分　升麻　柴胡各一錢

右水二盞煎至一盞去柤溫服食前忌生冷硬物

木香塌氣丸

治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子炒　橘紅各五錢　胡椒二錢　木香

草豆蔻麪煨　青皮各三錢　蠍稍去毒二錢半

右爲細末麪糊爲丸桐子大每服三十丸溫米飲下忌油膩服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑白皮湯下十丸日三服大人陰囊紅腫冰冷用青鹽乾薑白麪各三錢水和攤紙上塗貼

實脾飲（濟生方）

治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮薑製　白朮　木瓜去穰　大腹子

附子炮　木香不見火　草果仁　白茯苓去皮
乾薑炮各一兩　甘草炙半兩
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎七分不拘時溫服一方木香炮薑俱減半

謹按治水以實土爲先務不但陰水爲然而本方云治陰水發腫用此先實脾土是以陰水當補陽水當瀉故耳夫陰水者由於少陰腎中之眞陽衰微不能蟄藏故至泛濫無制法當用桂以溫腎水而後實土堤之防方中不用桂而用厚朴檳榔臨病之工尚其審之

復元丹（三因方）

治脾腎俱虛發爲水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子炮二兩　木香煨　茴香炒　川椒炒出汗
厚朴去粗皮薑製　獨活　白朮炒　陳皮去白
吳茱萸炒　桂心各一兩　澤瀉一兩半（一方用二兩）
肉豆蔻煨　檳榔各五錢
右爲細末糊丸如梧桐子大每服五十丸不拘時

紫蘇湯下

得效云心腎眞火能生脾胃眞土今眞火旣虧不能滋養眞土故土不制水水液妄行三焦不瀉樞機不運腫脹滿溢喘息奔急股冷舌乾不能正偃小便不通此藥世傳屢驗其間君臣佐使與造物同妙當屛去諸藥一日三服且禁慾絕鹹半年

謹按此方合前方俱主脾腎之治而此方溫煖腎臟之品居多較勝前方然不用茯苓而用檳榔厚朴之爲未當耳

導滯通經湯（寶鑑）

治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香　白朮　桑白皮　陳皮各五錢　茯苓一兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去查溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去滯氣故以爲主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫臚脹利水道故以爲佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以

淡滲之故以爲使也

謹按脾濕有餘及氣不宣通卽是脾中健運之陽不足法當先理其陽以佐行健之力然後用此方退其浮腫乃爲善也

胃苓湯

官桂五分　蒼朮　厚朴薑汁炒　陳皮　白朮

茯苓各錢半　澤瀉　豬苓各一錢　甘草六分

右加生薑水煎服

謹按此方宣導胃水膀胱水順道而出水患在所必用然腎水既竭津液已虧用之不免蹈重虛之戒若無病人但覺不服水土與此方相宜

消風敗毒散

治風水皮水凡在表宜從汗解者

人參　獨活　柴胡　桔梗　枳殼麩炒　羌活

白茯苓　川芎藭　前胡　甘草　荊芥穗

防風各一錢

右水二鍾薑三片煎八分食遠服

謹按此方卽人參敗毒散合荊防敗毒散並用也

以人參爲君固護元氣固可恃之無恐然仲景汗法必兼黃芪實表蓋恐表虛之人元氣乘表藥外湧盡潰皮腠反爲大累若元氣素虛腠理素踈者必參芪合用乃爲盡善

加減金匱腎氣丸

治肺腎虛腰重脚腫小便不利或肚腹脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱證其效如神此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

茯苓　製附子　牛膝　官桂　澤瀉　車前子

山萸　山藥　丹皮各一兩　熟地黃四兩酒拌

右爲末以地黃杵膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下

謹按本方濟生以附子爲君此薛新甫新定以白茯苓爲君合之牛膝車前治腰以下之水其功最大然非藉附子生陽蒸動腎氣則腎之關門不開積水仍不得下蓋陽主開腎之陽氣動則關開矣關開雖不用茯苓牛膝車前而水亦下否則雖用

茯苓牛膝車前無筭亦無如之何屢試屢驗

調榮飲

治瘀血化爲水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

蓬朮　川芎　當歸　延胡索　白芷　檳榔
陳皮　赤芍藥　桑白皮炒　大腹皮　赤茯苓
葶藶炒　瞿麥各一錢　大黃一錢五分　細辛
官桂　甘草炙各五分

右作一服煎服法同前

謹按此方多峻利之藥作一服云者原不欲多用恐傷元氣也若服後其水不行赤紋不減未可再服且用治血補氣三五日徐進此方虛證者必加參附大力以主持之乃能奏效

烏鯉魚湯

治水氣四肢浮腫

烏鯉魚一尾　赤小豆　桑白皮　白朮炒
陳皮各三錢

右用水三碗葱白五莖同煮不可入鹽先喫魚後服藥不拘時服

謹按烏鯉魚煖胃行水合之赤豆葱白以開鬼門潔淨府更合之白朮陳皮桑白皮淸理脾肺此方之平穩者

防己散

治脾水腫如裹水在皮膚中四肢習習然動

漢防己　桑白皮　桂心　黃芪炙各一兩

赤茯苓二兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時服

謹按此即金匱防己茯苓湯治皮水之方而加桑白皮也其證與金匱同蓋以太陰肺氣不宣鬱其榮衞故加桑白皮泄其肺氣然已有茯苓淡滲之則不可過也易桂心行水在水道不利者宜之不則仍當用桂枝解肌尤爲善治耳

導水茯苓湯

治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得著牀而睡飲食不下小便祕澀溺出如割而絕少雖

有而如黑豆汁者服喘嗽氣逆諸藥不效用此卽愈亦常驗其病重之人煎此藥時要如熬阿刺吉酒相似約水一斗止取藥一盞服後小便必行時卽漸添多直至小便變清白者爲愈

赤茯苓　麥門冬去心　澤瀉　白朮各三兩

桑白皮　紫蘇　檳榔　木瓜各一兩　大腹皮

陳皮　砂仁　木香各七錢五分

右㕮咀每服半兩水二盞燈草二十五根煎至八分去滓空心服如病重者可用藥五兩再加去心麥門冬二兩燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一大盞五更空心服查再煎服連進此三服自然小水日加漸利

謹按此方味甚平而其煎法則甚奇蓋得仲景百勞水之意而自出手眼者

大腹皮散

大腹皮　桑白皮　川芎各二兩　青皮去白

漢防己　羌活　大黃炒　檳榔　桂心各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服五錢水一大盌煎五分去滓不拘時溫服

楮白皮散

楮白皮　猪苓去皮　木通各二兩　紫蘇莖葉　桑白皮各三兩　陳皮去白一兩

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑三片煎至六七分去滓不拘時溫服

木香丸

木香　壺盧子炒　乳香各二錢半　甘遂炒黃　檳榔二枚一生一炮　朱砂細研各半錢

右爲細末以爛飯和分作四十九丸麪裹於銚內水煑熟令患人和汁呑之以盡爲度淸晨服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

海蛤丸

赤茯苓　桑皮　葶藶隔紙炒各一兩　海蛤研　防己各七錢半　郁李仁去皮炒　橘紅各五錢

右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸加至三十丸米飲送下早晚各一服

檳榔散

檳榔另研末五錢　桑白皮一兩五錢　商陸
生薑各一兩　甘草炙二錢五分

右除檳榔外用水二大盞煎至一大盞去滓五更初分作二服每服調檳榔末二錢五分服至平明當利如未利再服

五皮散（和劑）

治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治皮水妊娠胎水

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮

右各等分㕮咀每服三錢水一盞煎七分熱服無時一方加白朮磨沉香木香入

五皮散（澹寮方）

治他病愈後或瘧痢後身體面目四肢浮腫小便不利脈虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿也

大腹皮　赤茯苓皮　生薑皮　陳皮　桑白皮

右各等分爲粗末每服五錢水一大盞同煎八分

去滓溫服不拘時日三服並忌生冷油膩堅硬之物脚腫用加味五皮湯卽五皮散內加五加皮木瓜防己不服水土再入胃苓湯

疏鑿飲子（濟生方）

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉　商陸　赤小豆炒　羌活　椒目　木通

秦艽　白茯苓皮　大腹皮　檳榔各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎七八分不拘時溫服

調胃白朮澤瀉散（元戎）

治痰病化爲水氣傳爲水鼓不能食

白朮　澤瀉　芍藥　陳皮　白茯苓　生薑

木香　檳榔各等分

右爲末一法加白朮本藥各半治臍腹上腫如神心下痞者加枳實下盛者加牽牛

漢防己煑散（褚澄祕方）

治水腫上氣

漢防己　澤漆葉　石葦去毛　桑白皮　澤瀉

丹參　茯苓　橘皮　白术各三兩　通草一兩

生薑切十兩　郁李仁五合

右十二味擣篩爲散以水一升七合內四方寸匕煑取八合頓服日二小便利爲度

葶藶丸

治肺氣喘嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶隔紙炒　貝母煨黃色　木通各一兩

杏仁去皮尖雙仁炒　防己各二兩

右爲細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五十丸桑白皮煎湯食前下

白术木香散

治喘嗽腫滿變成水病不能食不能臥小便祕

白术　赤茯苓　澤瀉各一錢五分　木香

甘草各一錢　官桂七分　滑石三錢　陳皮

右作一服水二鍾生薑三片煎一鍾食前溫服

分氣補心湯

治心氣鬱結發爲四肢浮腫上氣喘急

木通　川芎　前胡　大腹皮　青皮　白朮

枳殼麩炒　甘草炙各一錢　香附炒　白茯苓

桔梗各一錢五分　細莘　木香各五分

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

當歸散

治水腫之病多由腎水不能攝養心火心火不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脈閉塞滲透經絡發爲浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

當歸　桂心　木香　赤茯苓　木通　檳榔

赤芍藥　牡丹皮　陳皮　白朮各一錢三分

右作一服水二鍾紫蘇五葉木瓜一片煎一鍾不拘時服

無碍丸

治脾病濕流四肢浮腫

木香五錢　大腹皮二兩　檳榔　榔李仁

蓬朮　三稜各一兩

右爲細末用炒麥蘗麵煮糊爲丸如梧子大每服

七八十九食前生薑湯送下

木香分氣湯

治氣留滯四肢腹急中滿胷膈脅肋膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香　猪苓　澤瀉　赤茯苓　半夏　枳殼
檳榔　燈心草　蘇子各等分

右剉散每服一兩水二盞煎入麝香末少許同服

沉香琥珀丸

治水腫一切急難證小便不通

橘紅　防己各七錢五分　琥珀　杏仁去皮尖
澤瀉　紫蘇　赤茯苓各五錢　葶藶隔紙炒
郁李仁去皮　沉香各一兩五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大以麝香爲衣每服二十五丸加至五十丸空心人參煎湯送下量虛實加減辨疑無陳皮防己以萊菔子煎湯下

人參木香散

治水氣病

人參　木香　白茯苓　滑石　琥珀　海金砂

枳殼　檳榔　猪苓　甘草各等分

右爲細末每服五錢生薑三片水一盞煎至七分不拘時溫服日進三服

大沉香尊重丸

治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿氣逆嘔噦喘乏小便赤澀大便不調一切中滿下虛危困之病

蘿蔔子炒六錢　沉香　丁香　人參　車前子
葶藶炒　檳榔各二錢　青皮　白丑　枳實炒
木通各四錢　胡椒　海金砂　木香　茯苓
蠍梢去毒　肉豆蔻各二錢半　白丁香一錢半
滑石三錢　郁李仁去皮一兩二錢半

右爲細末生薑自然汁煮糊爲丸如桐子大每服二十丸不拘時薑湯送下日進三服忌鹽魚果肉麵食只可食白粥

續隨子丸

治通身腫滿喘悶不快

人參　木香　漢防己　赤茯苓麵蒸　大檳榔
海金砂研各五錢　續隨子一兩　葶藶炒四兩

右爲末棗肉丸如梧子大每服二十丸至三十丸煎桑白皮湯送下食前溫服

補中治濕湯（醫林）

通治水病補中行濕

人參　白朮各一錢　蒼朮　陳皮　赤茯苓

麥冬　木通　當歸各七分　黃芩五分　厚朴

升麻各三分

右剉作一貼水煎服

澤瀉散（入門下同）

治水腫二便澀

澤瀉　赤茯苓　枳殼　豬苓　木通　檳榔

黑牽牛頭末各等分

右爲末生薑葱白湯調下二錢

黃米丸

治水蠱

乾絲瓜一條去皮剪碎和巴豆肉十四粒同炒以巴豆色黃爲度去巴豆又以陳倉米如絲瓜之多少入瓜內同炒米黃色去瓜取米爲末

右水丸梧子大每湯下百丸數服卽愈蓋絲瓜如人脈絡引巴豆之氣入皮膚也

漆雄丸

治水蠱

生漆一兩鍋內鎔化麻布絞去滓復入鍋內熬乾

雄黃一兩研末

右爲末酢糊和丸梧子大每四丸麥芽湯吞下

煨腎丸（丹溪下同）

治脾虛邪水流注腰膝浮腫而痛

甘遂生五錢　木香一兩

右爲末每一錢猪腰子一枚剜開去筋膜糝藥在內薄荷葉裹定外用濕紙四五重慢火煨熟臨臥細嚼溫酒送下利去黃水爲度

退腫塌氣散

治積水驚水或飲水過多積於脾故四肢腫而外熱

赤小豆　陳皮　蘿蔔子炒各二錢　甘草一錢

木香五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

葶藶木香散（正傳）

治水腫腹脹小便赤大便滑泄

白朮　葶藶　猪苓　赤茯苓各一兩　木香

澤瀉　木通　桂皮　甘草各五錢　滑石三兩

右爲末白湯調下三錢

桂朮湯（直指方下同）

治氣分腫

桂皮一錢五分　白朮　麻黃去根節　細莘

甘草各一錢　枳殼　乾薑各七分半

右剉作一貼入薑五片水煎服

桂苓湯

治血分腫

桂皮　赤茯苓　當歸　川芎　赤芍藥　蓬朮

三稜　桑白皮　檳榔　蒼朮　大腹皮　青皮

陳皮　瞿麥穗　甘草各五分　葶藶隔紙炒

大黃煨各二分半

右剉作一貼入薑五片水煎服

丹房奇術（醫鑑）

治腹腫不服藥

巴豆研去油四錢　水銀粉二錢　硫黃生一錢

右同研成餅先用新綿一片布臍上次以餅掩之外用帛縛如人行三五里許自然瀉下惡水待下三五次去藥以粥補之久患者隔日取水一餅可救二三十人

塗臍膏（得效方）

治水腫小便絕少

地龍生研　猪苓　甘遂　鍼砂各五錢

右爲末擣葱涎調成膏敷臍中約一寸以絹帛束之以小便多爲度日兩易之

消河餅（醫鑑下同）

治水腫膨脹

大田螺四箇　大蒜五箇　車前子末三錢

右研成餅貼臍中以手帕縛之少時尿出如注一二餅卽愈

加減胃苓湯

治浮腫

蒼朮一錢五分　陳皮　澤瀉　白朮　赤茯苓

木瓜各一錢　厚朴薑汁製　猪苓　神麯

檳榔各八分　山楂肉　縮砂各七分　大腹皮

香附子薑汁炒各六分　甘草炙三分

右剉作一貼入薑三片燈心一團水煎服

四苓五皮湯

治浮腫

桑白皮　陳皮　地骨皮　茯苓皮　生薑皮

大腹皮　蒼朮　白朮　澤瀉　猪苓　青皮

車前子炒各一錢

右剉作一貼水煎服

集香湯（直指方下同）

治虛腫先用此以透關絡然後審證療之

木香　藿香　川芎　赤茯苓　檳榔　枳殼

甘草各三錢　沉香　丁香各二錢　麝香一字

乳香一錢五分

右爲粗末每服三錢薑三片紫蘇五葉煎空心服

三仁丸（得效方）

治水腫喘急大小便不利

郁李仁　杏仁　薏苡仁各一兩

右爲末糊丸梧子大米飲下四五十丸

椒豉丸（活人）

治浮腫神方

椒目一錢　豉二七粒　巴豆一箇去皮心熬

右研細滴水和丸菉豆大溫水吞下三丸或五丸以微注爲度氣盛者加巴豆或一箇或三箇

海金沙散（東垣）

治脾濕太過腫脹喘急

黑丑頭末一兩五錢一半炒一半生　白朮一兩

甘遂五錢　海金沙三錢

右爲末每服二錢煎倒流水一盞食前調下

木香塌氣丸（元戎下同）

治單腹脹

丁香　胡椒各二錢　郁李仁四錢　蠍尾

木香　檳榔各五錢　枳實　白牽牛各一兩

右爲細末飯丸菉豆大每服十丸至十五丸陳皮
生薑湯任下

木香散

治單腹脹

木香　青皮　白朮　薑黃　草豆蔻各五錢
阿魏　蓽澄茄各一兩

右爲細末酢糊丸如菉豆大每服二十丸生薑湯
送下

大異香散

三稜　蓬朮　青皮　半夏麴　陳皮　桔梗
枳殼炒　藿香　香附炒　益智各一錢五分
甘草炙五分

右分作二貼每貼用水二鍾生薑三片棗一枚煎
至一鍾去查食遠服

大半夏湯

半夏　陳皮　茯苓　桔梗　檳榔　甘草各等分

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分
去查食前溫服

人參丸

治經脉不利化爲水流四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參　當歸　大黃濕紙裹飯上蒸熟去紙切炒
桂心　瞿麥穗　赤芍藥　白茯苓各五錢
葶藶炒另研一錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十五丸加至二三十丸空心飲湯下

小溫中丸（丹溪）

治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮　半夏湯泡　神麯炒　茯苓各一兩
白朮二兩　苦參炒　黃連炒各五錢　香附曬
針砂醋炒紅各一兩半　甘草三錢

右爲末醋水各一盞打糊爲丸如桐子大每服七八十丸白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯吞下虛甚加人參一錢忌口病輕者服此丸六七兩小便長病甚服一斤小便始長

禹餘糧丸（三因方）

治十種水氣脹膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之許學士及丹溪皆云此方治膨脹之要藥

蛇含石大者三兩以新鐵銚盛入炭火中燒令與銚子一般紅用鉗取傾入酢中候冷取出研極細

眞針砂五兩先以水淘淨炒乾入禹餘糧三兩一處用米酢二升就銚內煮酢乾爲度連銚置炭火中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物爲主其次量人虛實入下項凡治水藥多是取轉惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持之功故虛人老人亦可服

羌活　木香　茯苓　川芎　牛膝酒浸　桂心
白豆蔻炮　大茴炒　蓬朮炮　附子炮　青皮
乾薑炮　三稜炮　白蒺藜　當歸酒浸各五錢

右爲末入前藥拌勻以湯浸蒸餅捩去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下三十丸至五十丸忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥卽於小便內漩去不動臟腑病日去日三

服兼以溫和調補氣血藥助之眞神方也

木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

木香　薑黃　青皮去白　縮砂仁去殼　人參
檳榔　白朮各二錢　白豆蔻去殼　藿香葉
橘皮　大腹子　白茯苓去皮　白檀香各五分
桔梗五分　甘草炙四分

右爲細末每服三錢水一盞半煎至一盞稍熱服
食前沸湯點服亦可忌生冷硬物

導氣丸

治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便祕結小腸腎
氣等疾功效尤速

青皮用水蛭等分同炒赤去水蛭　莪朮用蝱蟲等
分同炒赤去蝱蟲　胡椒用茴香同炒去茴香
三稜用乾漆同炒去乾漆　檳榔用盤蝥同炒去盤
蝥　赤芍用川椒同炒去川椒　乾薑用硇砂同炒
去硇砂　附子用青鹽同炒去青鹽　茱萸用牽牛
同炒去牽牛　石菖蒲用桃仁同炒去桃仁

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用只以青皮等十味爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸加至七十丸空心用紫蘇湯送下

參香散

治一切氣脾虛作脹痞氣

人參　官桂　甘草炙各七分　桑白皮　桔梗
陳皮　枳實麩炒　麥門冬　青皮　大腹皮
半夏各一錢　紫蘇子　白茯苓　香附子
木香各一錢二分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

平肝飲子

治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭眩嘔逆脈來浮弦

防風　枳殼炒　桔梗　赤芍　桂枝各一錢半
木香不見火　人參　檳榔　川芎　當歸
陳皮　甘草炙各八分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

强中湯

治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參　青皮去白　陳皮去白　丁香各二錢
白朮一錢五分　附子炮去皮臍　草果仁
乾薑炮各一錢　厚朴薑汁製　甘草炙各五分

右水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

敷藥方

治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先嚼甘草後用方

大戟　芫花　甘遂　海藻各等分

右爲細末用釅酢調麪和藥攤於綿紙上覆貼腫處仍以輭綿裹住

草豆蔻湯（東垣）

治腹中虛脹

澤瀉二分　木香三分　神麯炒四分　半夏泡
枳實麩炒　草豆蔻　黃芪春夏不用　益智仁
甘草各五分　青皮　陳皮各六分　白茯苓
當歸各七分

右細切作一服加生薑三片水二大盞煎至一盞溫服冬月加黃芪六七分春夏止服正藥食遠服

葶藶木香散（河間下同）

治濕熱內甚水腫腹脹小便赤澀大便瀉此藥下水濕腫脹止瀉利小便

葶藶子　茯苓　猪苓　白朮土炒各二錢五分

木香　澤瀉　木通　甘草各五分　桂二錢半

滑石三兩

右爲極細末每服三錢白湯調下食前服

白朮木香散

治喘嗽腫滿欲變成水病者不能臥不敢多食小便閉而不通

滑石　陳皮去白各二錢　白朮　猪苓　澤瀉

甘草　木通　赤苓各五分　官桂二分　木香

檳榔各三分

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

二氣散

治水氣蠱脹滿悶

白丑　黑丑各二錢

右爲細末外用大麥麪四兩同一處拌勻做燒餅臨臥用茶淸一盞下降氣爲驗

家傳止氣散（醫鑑下同）

治心腹脹滿或出遠方不服水土

蒼朮　陳皮　厚朴　藿香葉　半夏　烏藥

枳殼　香附各一錢　大腹皮八分　甘草五分

右剉生薑棗子煎服

行濕補氣養血湯

治氣血虛弱單鼓腹脹脹浮腫

人參（大補元氣）　白朮（補脾）　白茯苓（滲濕）　當歸（養血）

川芎（行血）　蘇梗（利氣）　白芍（斂脹）　陳皮（泄滿）　厚朴（寬脹）

大腹皮（寬膨）　木通（利水）　萊菔子（消食）　木香（運氣）

海金沙（利水）　甘草（調諸藥扶胃氣）

右剉散薑棗煎服

消脹飲子

治蠱脹單腹脹

白茯苓　猪苓　澤瀉　人參　白朮　半夏

陳皮　青皮　厚朴　紫蘇葉　香附　砂仁

木香　檳榔　大腹皮　木通　萊菔子炒

甘草各等分

右剉生薑五片棗一枚煎服

金陵酒丸

治鼓脹

沉香　牙皂　檳榔各一兩　木香二兩五錢

右爲末用金陵燒酒浸十次曬乾京酒爲丸每服

三錢重者四錢五更燒酒送下水鼓水自小便而出氣鼓放屁水鼓加苦葶藶五錢炒酒送下再服

調胃散

治腹脹

蒼朮　白朮　茯苓　白芍藥　桔梗　紫蘇

檳榔　陳皮　甘草

右爲末生薑棗湯調服

金蟾散

治氣鼓如神

大蝦蟇一箇

右以砂仁推入其口使吞入腹以滿爲度用泥罐封固炭火煆令透紅煙盡取出候冷去泥研末爲一服或酒或陳皮湯下候撒屁多乃見其效

牛皮丸

治腹中水響如雷上攻卽嘔吐胷膈脹滿或手足作腫

黑丑頭末　木香　陳皮各九錢

右爲末黃蠟化爲丸如梧桐子大每服三十丸黃酒送下

蘇沉破結湯

治腹脹滿

紫蘇　薄荷　枳實　麥冬　當歸　川芎
大黃　木通　甘遂　白殭蠶　牙皂　生薑
細茶各一錢　白豆蔻　木香　沉香末各五分

右作二服水煎五更早服忌口

回生丹

治浮腫腹脹退腫

青皮麩炒　陳皮　三稜　莪术　連翹用巴豆去殼兩半於砂鍋同炒入　木香　商陸　甘遂炒　澤瀉　木通　乾漆炒烟盡　蘿蔔子炒各三錢　胡椒炒一錢　赤茯　桑皮炒　椒目炒各五錢　黑牽牛一兩生

右爲末酢糊爲丸如菉豆大每服十五丸至二十丸第一服用生葱二十四根擂碎同溫酒五更下第二服用陳皮桑白皮煎湯第三服用射干湯下切忌食鹽

推車丸

治水腫氣腫單腹脹

沉香　木香　巴豆半生半熟　胡椒各一錢炒

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服五六十丸消上用葱白搗爛熱酒下消中用陳皮湯下消下用牛膝湯下去三五次不補自止後用十皮散

導水餅

治腫脹不服藥自去水

水銀粉二錢　巴豆去油四錢　生硫黃一錢

右三味研成餅令勻先用新綿一塊鋪臍上次以餅當臍掩之外用帛縛如人行三五里自然瀉下惡水待行三五次除去藥以溫白粥補之

消河餅

治水腫膨脹

大田螺四箇　大蒜去皮五箇　車前子末三錢

右三件研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出一二餅即愈

復元丹（三因方）

治脾腎虛寒發爲水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子炮二兩　木香煨　茴香炒　川椒炒出汗

厚朴薑製　獨活　白朮炒　橘紅　吳茱萸炒

桂心各一兩　澤瀉一兩五錢　肉豆蔻煨

檳榔各五錢

右爲末糊丸桐子大每服五十丸紫蘇湯下不拘時

四苓散

治腹脹小便不利

白朮　猪苓　茯苓各七錢半　澤瀉一兩一錢半

右爲粗末每服二錢白湯調下日三服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八三七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十一卷目錄

醫部彙考三百十一

腫脹門四

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百三十一卷

醫部彙考三百十一

腫脹門四

單方

治水腫葶藶三兩爲細末防己末四兩綠頭鴨切頭瀝血於臼中令血盡納藥末和鴨頭更搗五千杵丸如梧子大空心白湯下十丸此藥利小便如神（本草下同）

水腫取白色商陸生根細切雜生鯉魚煑作羹服

水氣蠱脹白丑黑丑頭末各二錢大麥麪四兩和作

燒餅臨臥茶清嚥下降氣爲驗名曰二氣散

水屬腎行腎之水無如黑牽牛取細末入於猪腎慢火煨熟溫酒嚥下則借腎入腎兩得其便惡水既泄不復泛溢矣

又方郁李仁一合爲末和麪作燒餅與喫大便通利便瘥

水腫脚滿氣急鯉魚肉十兩葱白一握麻子一升取汁煑作羹入鹽豉薑椒調和空心食之

又方用鯉魚一頭重一斤已上者煑熟取汁和冬瓜葱白作羹食之

又方大鯉魚取肉赤小豆二升以水一斗同煑取二升許去滓分二服當下利即瘥

黑豆治浮腫黑豆一升水五升煑取三升去滓納酒五升更煑取三升去滓分三服不瘥再合服之

治水腫下水氣赤小豆和桑白皮或通草煑服之

又方赤小豆五合壺盧一頭生薑三錢並碎白色商陸一條切同水煑豆爛湯成去三味只細嚼豆空腹食之旋旋啜汁令盡腫立消便止

水病初得危急冬瓜不限多少任喫神效或取汁服久病忌之

浮腫下水取苦瓠瓜白瓤捻如大豆粒以綿裹煑一沸空心服七枚水自出不止大瘦乃瘥三年內愼口味須擇用細理潔淨者不爾有毒

十種水病垂死青頭鴨一隻治如食法和米幷五味煑令極熟作粥空腹食之白鴨亦好鴨頭能利水而凉血故也

浮腫脹滿猪肝一具細切以酢洗蒜虀食之又以熟水煑單喫亦可

十種水病不瘥垂死猯肉半斤切粳米三合水三升入葱椒薑豉作粥食之又作羹臛食之下水大效

頭面手足虛腫水氣喘急葶藶子隔紙炒爲末棗肉和丸小豆大麻子煎湯下十丸日三

水腫浮滿烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煑六沸頻服至小便出二三升卽消（千金翼）

水腫尿少鍼砂酢煑炒乾猪苓生地各三錢爲末葱涎研和傅臍中約一寸厚縛之待小便多爲度日二

易之入甘遂更妙（德生堂方）

水氣腫滿汞粉一錢烏雞子去黃盛粉蒸餅包蒸熟取出苦葶藶一錢同蒸餅杵丸菉豆大每車前湯下三五丸日三服神效（元戎）

正水腫病大便利者銀朱半兩硫黃煅四兩爲末麵和丸梧子大每飲下三十丸（普濟方）

通身水腫薑石燒令赤納黑牛尿中熱服日飲一升（千金）

張三丰仙傳方載伐木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫如土色服此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿同黃酒麪麴四兩炒赤色皂礬一斤醋拌曬乾入瓶火煅爲末醋糊丸梧子大每服三四十丸好酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治一切中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便消食積也

血證黃腫綠礬四兩百草霜一升炒麪半斤爲末沙

糖和丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下

又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃爲末黑棗肉半斤搗勻米酢打糊丸梧子大每薑湯下八九十丸一日三服（簡便方）

脾病黃腫青礬四兩煆赤蓮子當歸四兩酒酹浸七日焙百草霜三兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳七世

又方綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木香二錢爲末酒煎飛麪丸梧子大每空心酒下五丸

又方平胃散青礬二兩爲末酢糊丸米飲下或加烏沉湯四兩酒糊丸亦可（活法機要）

水脹

水腫桑柴灰水淋取清汁煑赤小豆作粥常服大下

水腫喘急桑皮四兩青粱米四合同煑爛取清飲

四肢腫滿白朮三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚煎九分溫服日三四服不拘時候（本事方）

虛後水腫因飲水多小便不利用白茅根一大把小

豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便下也（肘后方）

心腹脹滿短氣用草豆蔻一兩去皮爲末木瓜生薑湯調服半錢（千金方）

遍身腫滿陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇等分研和老酒服之（直指方）

酒腫虛腫香附蘄艾米酢煮乾焙研爲末米酢糊丸服久之敗水從小便出神效（經驗方）

氣虛浮腫香附子一斤童子小便浸三日焙爲末糊丸每米飲下四五十丸日二（丹溪）

水腫尿澀馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一鍾煎一鍾食前溫服以利小水四五日愈（簡便方）

水病洪腫用乾香薷五十斤剉水釜中以水淹過三寸使氣力都盡去滓澄之微火煎至可丸丸如梧子大一服五丸日三服日漸增之以小便利則愈師深方每香薷一斤熬膏加白朮末七兩和丸（胡洽方）

四肢腫滿白朮三兩剉大棗三枚水煎服日三四

澤瀉逐膀胱三焦停水或剉煎服或爲末白湯調下日二三

一切腫疾紅花熟搗取汁服不過三服便瘥（外臺祕要）

風水身腫欲裂鼠粘子二兩炒研爲末每溫水服二錢日三服（聖惠方）

水蠱腹大惡實微炒一兩爲末麪糊丸梧子大每米飲下十丸（張文仲方）

大腹水腫小便不利蒼耳子灰葶藶末等分每服二錢水下日二服（千金方）

通身水腫鹿葱根葉曬乾爲末每服二錢入席下塵半錢食前米飲下

又方葶藶二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利

又方葶藶一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分十服小便去當瘥

腹脹積聚葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合（千金方）

鼓脹煩渴身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬雷鳴時采者有效（易簡方）

大腹水腫馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煑取五斗去滓再煎令稠以粉和丸大豆大每服二三丸加至四五丸神效（肘后方）

渾身水腫坐臥不得取蒴藋根去皮搗汁一合和酒一合暖服當微吐利愈（梅師方）

通身浮腫杜蒺藜煎湯日日洗之（聖惠方）

水氣腫滿用白商陸根去皮切如豆大一大盞以水三升煑一升更以粳米一大盞同煑成粥每日空心服之取微利不得雜食

又方用白商陸六兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取效

白商陸一斤羊肉六兩水一斗煑取六升去滓和葱豉作臛食之

腫滿洪大防葵研末溫酒服一刀圭至二三服身瞤及小不仁爲效（肘后方）

水腫喘急小便濇及水蠱大戟炒二兩乾薑焙半兩爲散每服二錢薑湯下大小便利爲度（聖濟總錄）

水病腫滿不問年月淺深大戟當歸橘皮各一兩切

以水二升煑取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作

水氣腫滿大戟一兩廣木香半兩爲末五更酒服一錢半取下碧水後以粥補之忌鹹物

又方用大戟燒存性研末每空心酒服一錢

水腫腹大如鼓或遍身浮腫用棗一斗入鍋內以水浸過用大戟根苗葢之瓦盆合定煑熟取棗無時食之棗盡決愈

又方名大戟散用大戟白牽牛木香等分爲末每服一錢以豬腰子一對批開摻末在內濕紙裹煨熟空心食之左則塌左右則塌右（活法機要）

水氣蠱病鮮澤漆曬乾爲末棗肉丸彈子大每服二丸白湯化下日二服覺腹中暖小便利爲度（乾坤祕韞）

水腫腹滿甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半爲末水煎時時呷之（普濟方）

膜外水氣甘遂末大麥麪各半兩水和作餠燒熟食之取利（聖濟總錄）

身面洪腫甘遂二錢生研爲末以豶豬腎一枚分爲

七臠入末在內濕紙包煨令熟食之自一服至四五服覺腹鳴小便利是其效也（御藥院方下同）

腎水流注腿膝攣急四肢腫痛即上方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒嚼下當利黃水爲驗

正水脹急大小不利欲死甘遂五錢半生半炒臙脂坯子十文研勻每以一錢白麪四兩水和作碁子大水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散加熟附子每以二錢煎服（普濟方）

水蠱喘脹甘遂大戟各一兩慢火炙研每服一字半水半盞煎至五沸服不過十服（聖濟總錄）

陽水腫脹續隨子炒去油二兩大黃一兩爲末水丸菉豆大每白湯下五十丸以去陳莝（摘元方）

水氣脹滿萞麻子仁研水得三合清旦一頓服盡日中當下青黃水也或云壯人只可服五粒（外臺祕要）

大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣蓋中焦下焦氣不升降爲寒痞隔故中凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生

薑十片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五十枚亦無害小兒每服三錢水煎服（集驗方下同）

脾虛濕腫大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏附子於中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十丸蘿蔔湯下

陰水腫滿烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸丸小豆大每服三五丸取小便利爲佳忌油膩酒麪魚肉

又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服三十丸煎流氣飲送下（普濟方）

水蠱腹大動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗汁服一杯水即下（肘後方）

水蠱脹滿芫花枳殼等分以酢煮芫花至爛乃下枳殼煮爛搗丸梧子大每服三十丸白湯下（普濟方）

水腫腹大喘急馬兜鈴煎湯日服之（千金方）

水氣浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸空心

分二服水從小便中出（聖惠方）

水腫黃環根曬乾每服五錢水煎服小便利爲效（事親）

遍身黃腫掘新鮮百部根洗搗罨臍上以糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以帛包住待一二日後口內作酒氣則水從小便中出臍自消也（經驗方）

水蠱腹大有聲而皮色黑者山豆根末酒服二錢（聖惠方）

水氣鼓脹大小便濇羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤剉水一斗煑五升熬如稀餳每空心茶服一匙二便利食粥補之（聖惠方）

水濕腫脹白术澤瀉各一兩爲末或爲丸每服三錢茯苓湯下（保命集）

諸積蠱脹食積氣積血積之類石菖蒲八兩剉螌蝥四兩去翅足同炒黃去螌蝥不用以布袋盛拽去螌蝥末爲末酢糊丸梧子大每服三五十丸溫白湯下治腫脹尤妙或入香附末二錢（奇效方）

治腫脹用蠶繭草半斤同冬瓜皮半斤紫蘇根葉半斤生薑皮三兩煎湯熏洗暖臥取汗洗三次小便清

長自然脹退

通身水腫以黍莖掃帚煑湯浴之

水腫喘急用榔李仁二兩研以水濾汁煑薏苡仁飯日二食之（獨行方）

身面浮腫用烏豆一升水五升煑汁三升入酒五升更煑三升分溫三服不瘥再合

新久水腫大豆一斗清水一斗煑取八升去豆入薄酒八升再煎取八升服之再三服水從小便中出

水病腫滿喘急大小便澀大豆黃卷醋炒大黃炒等分爲細末葱橘皮湯服二錢平明以利爲度（聖濟總錄）

水氣腫脹用小赤豆五合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條並碎破同水煑爛去藥空心食豆旋旋啜汁令盡腫立消也

又方治水腫從脚起入腹則殺人赤小豆一斗煑極爛取汁五升溫漬足膝若已入腹但食小豆勿雜食亦愈

水腫以東行花桑枝燒灰一升淋汁煑赤小豆一升以代飯良

十種水氣用菉豆二合半大附子一隻去皮臍切作兩片水三椀煑熟空心臥時食豆次日將附子兩片作四片再以菉豆二合半如前煑食第三日別以菉豆附子如前煑食第四日如第二日法煑食水從小便下腫自消未消再服忌生冷毒物鹽酒六十日無不效者（集驗方）

治水腫利小便桃皮煎汁同秫米釀酒飲

身面浮腫小便不利喘急用胡葱十莖赤小豆三合消石一兩以水五升煑葱豆至熟同擂成膏每空心溫酒服半匙（聖惠方）

水氣腫滿大蒜田螺車前子等分熬膏攤貼臍中水從便漩而下數日卽愈象山民人患水腫一卜者傳此用之有效（稗史）

遍身浮腫蘿蔔浮麥等分浸湯飲之

氣脹氣蠱萊菔子研以水濾汁浸縮砂一兩一夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢如神（集驗方）

水蠱洪腫苦瓠瓤一枚水二升煑至一升煎至可丸如小豆大每米飲下十丸待小便利作小豆羹食勿

飲水

腹脹黃腫用亞腰壺盧連子燒存性每服一箇食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效

中滿鼓脹用三五年陳壺盧瓠瓢一箇以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙熱入酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效（選奇方）

水病危急冬瓜不拘多少任意喫之神效無比（兵部手集）

水蠱腹脹老絲瓜去皮一枚剪碎巴豆十四粒同炒豆黃去豆以瓜同陳倉米再炒熟去瓜研米爲末糊丸梧子大每服百丸白湯下蓋米收胃氣巴豆逐水絲瓜象人脈絡借其氣以引之也（鉤元方）

水氣滿急烏梅大棗各三枚水四升煑二升納蜜和勻含嚥之（聖濟總錄下同）

水腫尿短桃皮三升去內外皮秫米一斗女麴一升以水二斗煑桃皮取汁一斗以一半漬麴一半漬秫飯如常釀成酒每服一合日三次以體中有熱爲候小便多是病去忌生冷一切毒物

手足心腫乃風也椒鹽末等分酢和敷之良（肘後方）

水氣腫滿椒目炒搗如膏每酒服方寸匕（千金方）

身面浮腫取瓜蔕丁香赤小豆各七枚爲末吹豆許入鼻少時黃水流出隔日一用瘥乃止（食療）

十種蠱氣苦丁香爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸棗湯下甚效

水腫葡萄嫩心葉十四箇螻蛄七箇去頭尾同研露七日曝乾爲末每服半錢淡酒調下暑月尤佳（保命集）

陽水浮腫敗荷葉燒存性研末每服二錢米飲調下日三服（證治要訣）

水腫自足起削楠木桐木煑汁漬足併飲少許日日爲之（肘後方下同）

水氣浮腫蘇合香白粉水銀等分搗勻蜜丸小豆大每服二丸白水下當下水出

手足浮腫桐葉煑汁漬之併飲少許或加小豆尤妙（聖惠方）

腫從脚起削桐木煑汁漬之幷飲少許（肘后方）

腫滿入腹脹急皂莢去皮子炙黃爲末酒一斗石器煑沸服一升日三服

食氣黃腫氣喘胷滿用不蛀皂角去皮子酢塗炙焦爲末一錢巴豆七枚去油膜以淡酢研好墨和丸痳子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以愈爲度（經驗方）

胷腹脹滿欲令瘦者豬牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸梧子大服時先喫羊肉兩臠汁三兩口後以肉汁吞藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水卽止藥瘥後一月不得食肉及諸油膩（海上方）

身面卒腫洪滿用皂莢去皮炙黃剉三升酒一斗漬透煑沸每服一升一日三服（肘後方）

通身水腫櫸樹皮煑汁日飲（聖惠方）

身體暴腫楡皮擣末同米作粥食之小便利良（備急方）

大腹水病采柯樹皮煑汁去滓煎令可丸如梧子大平旦空心飲下三丸須臾又一丸氣水竝從小便出也

水氣虛腫小便澀烏柏皮檳榔木通一兩爲末每服二錢米飲下（聖惠方）

氣腫濕腫用海蛤海帶海藻海螵蛸海昆布鳧茨荔枝殼等分流水煎服日二次方（何氏）

食果腹脹不拘老小用桂末飯和丸菉豆大吞五六丸白湯下未消再服方（經驗）

虛肥面腫積年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉八兩以水一斗煑取六升去滓納米煑粥常食勿絕

男婦腫疾不拘久近暴風入腹婦人新產上圊風入臟內腹中如鳴短氣楮皮枝葉一大束切煑汁釀酒不斷飲之不過三四日卽退可常服

膀胱石水四肢瘦削小腹脹滿楮根白皮桑根白皮各二升白朮四兩黑大豆五升流水一斗煑四升入清酒二升再煑至三升日二服之方（集驗）

老幼腹脹血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚而綠背者去穰四兩分作四分一兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼爲末以四味煎汁煑麪糊和丸梧子大每食後米飲下五十丸方（簡易）

熱水腫疾山梔子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用（丹溪）

身腫攻心用生豬肉以漿水洗壓乾切膾蒜啖之一日二次下氣去風乃外國方也（張文仲方）

水腫尿濇茯苓皮椒目等分煎湯日飲取效（普濟方）

水腫脹滿小便濇者用水牛蹄一具去毛煑汁作羮切食之或以水牛尾條切作腊食或煑食亦佳（心鏡）

心腹脹滿野雞一隻不拘雌雄茴香炒馬芹子炒川椒炒陳皮生薑等分用酢以一夜蒸餅和雉雞作餡料外以麪皮包作餛飩煑熟食仍早服嘉禾散辰服此午服導氣枳殼丸（集驗方）

久患氣脹烏牛尿一升空心溫服氣散止（廣濟方）

水腫溲濇黃牛尿一升絞汁飲溲利瘥勿食鹽（梅師方）

水氣腫滿人尿煎令可丸每服一小豆大日三服（千金方）

腫脹忌鹽只以秋石拌飲食待腫脹消以鹽入罐煅過少少用之（摘元方）

積聚脹滿白馬尿同蒜搗膏敷患處效（活人心統）

水腫脹滿雞矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二一錢（正傳）

又方用雞屎川芎藭等分爲末酒糊丸服

一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹氣脹濕脹水脹等峨嵋僧用此治人得效其人牽牛來謝故名牽牛酒用乾雞屎一升炒黃以酒醅三椀煑一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自腳下皮皺消也未盡隔日再作仍以田螺二枚滾酒瀹食後用白粥調理（經驗方）

水鼓石水腹脹身腫者以肥鼠一枚取肉煑粥空心食之兩三頓即愈（心鏡方）

水腫大鯉魚一頭醋三升煑乾食一日一作（范汪方）

又方大鯉魚一尾赤小豆一升水二斗煑食飲汁頓服盡當下利盡即瘥（外臺方）

水腫脹滿赤尾鯉魚一斤破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內紙包裹外以黃土泥包放竈內煨熟取出去紙泥送粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢試經驗（醫方摘要）

卒病水腫用鯽魚三尾去腸留鱗以商陸赤小豆等分塡滿紮定水三升煑糜去魚食豆飲汁一日一作不過三次小便利愈（肘後方）

腎臟氣發攻心面黑欲死及諸氣奔豚喘急鉛二兩石亭油脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以酢噴之傾入地坑內覆住待冷取冷粟飯丸芡子大每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣卽愈如大便不通再用一丸入元明粉五分服（聖濟總錄）

鍼灸

靈樞經曰膚脹先取脹之血絡

營氣循脈衛氣逆爲脈脹衛氣並脈循分爲膚脹三里而瀉近者一下遠者三下無問虛實工在疾瀉

胃者水穀之海其輸上在氣街下至三里水穀之海有餘則腹滿審守其輸調其虛實

胃病者腹䐜脹取之三里胃足陽明之脈是動則病賁響腹脹胃中寒則脹滿視盛虛熱寒陷下取之

脾足太陰之脈是動病腹脹善噫視盛虛熱寒陷下

取之

脾虛則腹滿腸鳴飧瀉取其經太陰陽明少陰血者

足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃虛則鼓脹取之所別

腎病者腹大脛腫取其經少陰太陽血者

腎藏志志有餘則腹脹飧泄瀉然筋血者

邪在腎則病腹脹腰痛大便難取之湧泉崐崘視有血者盡取之

腹滿食不化腹響響不能大便取足太陰

男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲飲食先取湧泉見血

脹取三陽

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留卽爲脹取委陽

振寒灑灑鼓頷不汗出腹脹煩悗取手太陰

陽明之厥腹滿不得臥太陰之厥腹滿䐜脹少陰之厥腹滿心痛厥陰之厥少腹腫痛腹脹盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之

甲乙經曰身腫關門主之

水腫脹皮腫三里主之

風水膝腫巨虛上廉主之

風水面胕腫顏黑解谿主之

風水面胕腫衝陽主之

水中留飲胷脅支滿刺陷谷出血立已

面胕腫上星主之先取譩譆後取天牖風池

水腫人中盡滿脣反者死水溝主之

水腫大臍平灸臍中無理不治

寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積聚疼痛衝門主之

腹滿嚮嚮然不便心下有寒痛商丘主之

腹脹善滿積氣關門主之

腹中氣盛腹脹逆不得臥陰陵泉主之

腹脹腸鳴氣上衝胷不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之

腹中有大熱不安腹有大氣如相挾暴腹脹滿癃淫濼氣衝主之

腹滿痛不得息正臥屈一膝伸一股氣衝鍼入三寸
氣至瀉之

腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴脹滿腹痛
洩食不化心下脹三里主之

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨
虛上廉主之

腹滿不嗜食衝陽主之

寒腹滿脹厲兌主之

男子如蠱女子如阻寒熱少腹偏腫陰谷主之

胃中寒脹食多身體羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胷
脅搘滿嘔吐脊急痛筋攣食不下胃俞主之

頭痛食不下腸鳴臚脹欲吐時泄注三焦俞主之

腹滿臚脹大便泄意舍主之

臚脹水腫飲食不下多寒胃倉主之

腹滿不能食刺脊中

寒中傷飽食飲不化五臟䐜滿脹心腹胷脅搘滿脈
虛則生百病上脘主之

腹脹不通胃中傷飽食飲不化中脘主之

水腫水氣行皮中陰交主之

水腫腹大水脹水氣行皮中石門主之

腹滿胃中有熱不嗜食懸鍾主之

中藏經曰外腰水腫先從腰腫起鍼肝募水分

內中水腫面痿黃鍼胃脘通谷氣海水分

胞中水腫根在心水赤鍼心俞巨闕氣海

腹中水腫從脾起水黃鍼脾俞胃脘水分

肺喘水腫從胷起水白鍼肺俞肝募

足心水腫從足起鍼白環俞水分亶中

四肢水腫偏身浮鍼膽募

兩脅水腫四肢枯瘦從脅腫起鍼章門期門

小腸水腫從臍腫起鍼氣海

千金方曰頭面腫公孫主之

水腫人中滿水溝主之

水腫臚脹食飲不下惡寒胃倉主之

身瞤石水身腫章門主之

身腫皮痛不可近衣屋翳主之

面腹腫中府間使合谷主之

水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿陰交石門主之

小腹滿石水關元主之

大腹石水四滿然谷主之

身腫身重關門主之

面浮腫天樞豐隆厲兌陷谷衝陽主之

四肢腫身重豐隆主之

身脹逆息不得臥風汗身腫喘息多唾天府主之

大氣石水氣街主之

面目癰腫陷谷列缺主之

汗出四肢腫列缺主之

腋下腫胷中滿臨泣主之

大腹腫脹臍腹悒悒大敦主之

乳腫缺盆腫天牖主之

腰尻腫腨跟腫崑崙主之

腋下腫寒熱脛腫丘墟陽蹻主之

腹腫曲泉主之

風逆四肢腫復留豐隆主之

頭面氣胕腫完骨巨窌主之

頭面腫陽陵泉主之

凡頭面癰腫齒飲胸脅支滿刺陷谷出血立已

保命集曰青水灸肝井弦脈赤水灸心滎洪脈黃水灸脾俞緩脈白水灸肺經濇脈黑水灸腎合沉脈

東垣十書曰腹脹臍突缺盆中滿腰尻腫取大敦天牖崑崙

水氣皮痛不可近小腹敦敦然小便黃身瞤灸章門屋翳刺陰交章門

祕要云鼓脹之狀腹身皆大於臍上下左右各刺二寸二分於中脘通關三寸

膚脹之狀空而不堅腹身盡腫按之陷而不起取太白公孫復溜絕骨三里分水

腹脹取分水二寸半及氣海三里三陰交人中

腹脹并兩足有水刺內庭五分瀉之灸臨泣三分瀉之用香油抹穴可出一身之水

腹暴脹按之不下取中脘氣海三里

單蠱脹氣喘取商曲在水分旁各一寸半針入二寸

半灸五十壯或於分水三里行間內庭右關氣海各灸二七壯

筩鍼取水先以鈹鍼鍼之已刺而筩之引鍼而納之入而復之以盡其疢必堅來來緩則煩悗來急則安靜間日一刺之疢盡乃止筩鍼中有空竅如筩也

浮腫於水分中脘各灸之於內庭行間臨泣各瀉立安

玉機微義曰繆刺謂不分其隊穴而刺之也故此水熱穴論無刺水分穴大法水溢於表或腹脹或四肢雖腫而氣稍實脈浮洪者宜行此至病氣孤危脈微弱而四肢水氣盛實者今人往往繆刺之禍不旋踵蓋不審經言脈滿絡溢宜繆刺之理也

景岳全書云脾俞治脹隨年壯灸之

肝俞治脹灸百壯

三焦俞治心腹脹滿飲食減少小便不利羸瘦少氣

水分治腹脹遶臍結痛不能食若是水病尤宜灸之

神闕主水腫鼓脹腸鳴如水之聲極效

石門主水腫水行皮中小便黃

足三里主水腫腹脹

水溝主一切水腫

按水腫證惟得鍼水溝若鍼餘穴水盡則死此明堂銅人所戒也庸人多爲人鍼水分誤人多矣若其他穴或有因鍼得瘥者特幸焉耳大抵水腫禁鍼不可爲法

導引

保生祕要云有大病之後脾土過虛傷於湯水不能運化滯成水脹或憂鬱過度怒氣不伸邪氣溢注月累積毒致成膨脹或飲食失節中氣不足清氣下浸濁氣上塡濕熱相攻遂成氣脹或勞力過傷精虧氣竭水火失度血不順行而爲血脹宜導引坐定擦手足心極熱用大指節仍擦摩迎香二穴以暢肺氣靜定閉息存神半晌次搓手心摩運臍輪按四時吐故納新從懸雍竅轉下至丹田閉氣一回撮谷道緊尾

閭提升泥丸下絳宮復氣海週天一度如此七七身心放下半香許如久病難坐用得力人扶背慎勿早睡恐氣脈凝滯神魂參錯效難應期手足可令人擦摩患輕者一七能取大效重則二七三七五七膨盡消屢屢取驗妙入神也

運功反瞳守歸元念四字訣定後斡旋推入大腸曲行提回抱守能消膨脹

氣脹加推散四肢時吐濁吸清飲食宜少降氣安心而食自然愈也

或病酒過用湯水而成宜通其二次摩臍輪腎腧二穴吹噓其氣或開腠理以洩微汗水脹自消

血脹加運血海效

水脹推下大腸九曲而瀉之兩眼看臍念如氣脹推散四肢去呵而至臍

醫案

養痾漫筆曰象山縣有村民患水腫者以爲鬼禍訊之卜者卜者授之方用田螺大蒜車前草和研爲膏作大餅覆臍上水從便出數日遂愈

儒門事親曰南鄉張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉戴人令上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯布囊高支兩足而臥其藥之行自腰以上水覺下行自足以上水覺上行水行之狀如蛇走隧如線牽四肢森然凉寒會於臍下而出不旬日間病

大減餘邪未盡戴人更欲用藥竟不能從其言

戴人見一男子目下腫如臥蠶狀戴人曰目之下陰也水亦陰也腎爲水之主其腫至於目下故也此由房室交接之時勞汗遇風風入皮腠得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房則死

李七老病涌水證面黄而喘兩足皆腫按之陷而復起行則濯濯有聲常欲飲水不能睡臥戴人令上涌去痰而汗之次以舟車丸濬川散下之以益腎散復下之以分陰陽利水道之劑復下之水盡皆瘥

霍秀才之子十二歲睪丸一旁腫如槌戴人見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲嘔血下則傷腎而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

張小一初病疥爬搔而成腫喘不能食戴人斷爲風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘腠理開發就燠室中用酸苦之劑加全蠍一枚吐之節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去八九分隔一日臨臥向一更來又下神祐丸七十餘粒三次噉之至夜半動一行又續下水煑桃紅丸六十丸以

麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車丸通經散及白术散以調之愈

曹典吏妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫大小便如常其脈浮而大此風水腫也先以虀水撩其痰以火助之發汗次以舟車丸濬川散瀉數行後四五日方用苦劑湧訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車濬川復下之末後用水煑桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以爲倒布袋法耳病再來則必死世俗只見塵中貨藥者用銀粉巴豆塌腫者暫去復來必死以爲驚俗豈知此法乃內經治鬱之元法蓋此藥皆小毒之藥豈有反害者哉但愈後忌慎房室等事況風水不同以水無復來之理

蹙踘張承應年幾五十腹如孕婦面黃食減欲作水氣或令服黃芪建中湯及溫補之劑小溲涸閉從戴人療焉戴人曰建中湯攻表之藥也古方用之攻裏已誤也今更以此取積兩重誤也先以涌劑吐之置火於其旁大汗之次與豬腎散四錢以舟車丸引之

下六缶殊不困續下兩次約三十餘行腹平軟健啖如昔常仲明曰向聞人言瀉五六缶人豈能任及聞張承應渠云誠然乃知養生與攻痾本自不同今人以補劑療病宜乎不效

蕭令腹滿面足皆腫痰黃而喘急食減三年之間醫者皆盡而不驗戴人以瓜蔕散湧之出寒痰三五升以舟車丸濬川散下之青黃涎沫缶平更以桂苓白朮散五苓散調之半月復舊矣

衞生寶鑑曰范郎中夫人因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿旦食則嘔暮不能食兩脅刺痛脈弦而細鍼經云清氣在陰濁氣在陽亂於胷中是以大悗內經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹此陰陽返作病之逆從也至夜濁陰之氣當降而不降䐜脹尤甚又云臟寒生滿病大抵陽生運化精微聚而不散故爲脹滿先灸中脘穴乃胃之募引胃中生發之氣上行次以木香順氣散而愈

醫學正傳曰余族兄素能飲酒年五十得腫脹病遍身水腫腹脹尤甚小便澀而不利大便滑泄名余治

余曰若戒酒色鹽醬此病可保無危不然去生漸遠兄曰自今日戒起余以丹溪之法而以參朮爲君加利水道制肝木淸肺金等藥十貼而小水長大便實腫退而安又半月有二從弟平日乃同飲酒者曰天民弟素不飲酒山中之鹿耳我與兄水中之魚也鹿可無水魚亦可無水乎三人遂痛飲沉醉而止次日病作甚於前復來求治余曰不可爲矣一月而逝

薛己醫按曰大尹劉天錫內有濕熱大便滑利小便濇滯服淡滲之劑愈加滴瀝小腹腿膝皆腫兩眼脹痛此腎虛熱在下焦淡滲導損陽氣陰無以化遂用地黃滋腎二丸小便如故更以補中益氣加麥門冬五味子兼服而愈

州守王用之先因肚腹膨脹飲食少思服二陳枳實之類小便不利大便不實欬痰腹脹用淡滲破氣之劑手足俱冷此足三陰虛寒之證也用金匱腎氣丸不月而康

州同劉禹功素不愼起居七情以致飲食不甘胷膈不利用消導順氣肚腹痞悶吐痰氣逆用化痰降火

食少泄瀉小腹作脹用分利降火小便澀滯氣喘痰湧服清氣化痰丸小便愈滯大便愈瀉肚腹脹大肚臍突出不能寢臥六脈微細左寸虛甚右寸短促此命門火衰脾腎虛寒之危候也先用金匱加減腎氣丸料內桂附各一錢五分二劑下瘀穢甚多又以補中益氣送二神丸二劑諸證悉退五六又用前藥數劑并附子之類貼腰臍及湧泉穴脈漸復而安後因怒復悶惑於人言服沉香化氣丸大便下血諸證悉至余曰此陰絡傷也辭不治果歿

一富商飲食起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胷膈不利飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃連之類前證益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服五苓瞿麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎氣丸補中益氣湯而愈

一儒者失於調養飲食難化胷膈不利或用行氣消導藥欬嗽喘促服行氣化痰藥肚腹漸脹服行氣分利藥睡臥不能兩足浮腫小便不利大便不實脈浮大按之微細兩寸皆短此脾腎虧損朝用補中益氣

湯加薑附夕用金匱腎氣湯加補骨脂肉果各數劑諸證漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味半載而康

一男子素不善調攝唾痰口乾飲食不美服化痰行氣藥胷滿腹膨痰涎愈甚服導痰理脾之劑肚腹膨脹二便不利服分氣利水之劑腹大脅痛睡臥不得服破血消導之劑兩足皆腫脈浮大不及於寸口朝用金匱加減腎氣丸夕用補中益氣湯煎送前丸月餘諸證漸退飲食漸進再用八味丸補中湯月餘自能轉側又兩月而能步履却服十全大補湯還少丹又半載而康後稍失調理其腹仍脹服前藥卽愈

一男子患前證余爲壯火補土漸愈彼欲速效服攻積之劑下血甚多余診之曰此陰絡傷故血內溢非所宜也後果歿

大方妻趙氏忽嬰痰熱治者多以寒涼偶得小愈三四年餘屢進屢退於是元氣消爍庚子夏遍身浮腫手足麻冷日夜欬嗽煩躁引飲小水不利大肉盡去勢將危殆余診之脈洪大而無倫按之如無此虛熱

無火法當益火之源以生脾土與金匱腎氣丸料服之頓覺小水潰決如泉俾日服前丸及大補之藥二十餘劑而愈三四年間平康無恙甲辰仲春悲哀動中前證復作體如焚燎口肉盡腐胷腹腫滿食不下嚥者四日束手待斃復投以八味丸二服神思清爽服金匱腎氣丸料加參芪歸术未竟夕而胷次漸舒陡然思食不三日而病去五六矣嗣後日用前二丸間服逾月而起至秋初復患痢又服金匱腎氣丸料加參芪歸术黃連吳茰木香痢遂止但覺後重又用補中益氣加木香黃連吳茰五味數劑而全愈

醫宗必讀曰太學何宗魯夏月好飲水一日太宗師發放自早起候至未申爲炎威所逼飲水計十餘椀歸寓便脹悶不能食越旬日腹如抱甕氣高而喘求治於余余曰皮薄而光水停不化也且六脈堅實其病暴成法當利之遂以舟車丸每服三錢香薷湯送再劑而二便湧決如泉復進一錢五分腹減如故用六君子十貼即愈

徽州方太和大怒之後復大醉至明日目下如臥蠶

居七日而肢體皆腫不能轉側二便不通煩悶欲絕余診之脈沉且堅當逐其水用疎鑿飲子一服而二便快再服而四肢寬更以五皮飲服三日隨愈

武林文學錢賞之酒色無度秋初腹脹冬杪遍體腫急臍突背平在法不治迎余治之舉家叩首求救哀迫余曰我非有起死金丹但當盡心力而圖之耳卽用金匱腎氣九料大劑煎服兼進理中湯服五日無效余欲辭歸矣其家曰自知必死但活一日則求一日之藥卽使不起安敢歸咎乎勉用人參一兩生附子三錢牛膝茯苓各五錢三日之間小便解下約有四十餘椀腹有縐紋舉家拜曰皆再造之恩也約服人參四斤附子一斤薑桂各一斤餘半載而瘥

都憲李來吳積勞多鬱肢體脹滿以自知醫輙用胃苓湯加枳殼三月以來轉加痞悶余診其脈沉濇而軟視其色黃白而枯此虛證也宜大溫大補始猶不信爭之甚力僅用參二錢稍覺寬舒欲加桂附執不肯從余曰證坐虛寒喜行攻伐己見旣堅良言不納雖有扁倉豈能救耶越兩月果歿

錦衣太傅徐滃寧稟畀素壯病餘肥甘過度腹脹氣粗余診之脈盛而滑按之不甚虛宜以利氣之劑少佐參术惑於多岐之說旦暮更醫余復診曰卽畀參不用攻擊之劑決不可投也後與他醫商之仍用理脾疎氣之劑而安

光祿卿吳伯玉夫人患腹滿而痛喘急異常大便不通飲食不進醫者用理氣利水之劑二十日不效余診之脈大而數右尺爲甚令人按腹手不可近余曰此大腸癰也脈數爲膿已成用黃芪皂刺白芷之類加葵根一兩煎一椀頓服之未申痛甚至夜半而膿血大下昏運不支卽與獨參湯稍安更與十全大補一月而愈

寓意草曰郭台尹年來似有勞怯意胷腹不舒治之罔效茫不識病之所存也聞僕治病先議後藥姑請診焉見其精神言動俱如平人但面色痿黃有蟹爪紋路而得五虛脈應之因竊疑而詰之曰足下多怒乎善忘乎口燥乎便祕乎胷緊乎脅脹乎腹疼乎渠曰種種皆然此何病也曰外證尚未顯然內形已具

將來血蠱之候也曰何以知之曰合色與脈而知之也夫血之充周於身也榮華先見於面今色黯不華既無舊恙又非新疴其所以憔悴不榮者何在且壯盛之年而脈見細損宜一損皮毛二損肌肉三損筋骨不起於牀矣乃皮毛肌肉步履如故其所以微弱不健者又何居是敢直斷爲血蠱腹雖未大而腹大之情狀已著如瓜瓠然其日趨於長也易易耳明哲可不見機於早耶曰血蠱乃婦人之病男子亦有之乎曰男子病此者甚多而東方沿海一帶比他處更多醫不識所由來漫用治氣治水之法嘗試夭枉不可勝計總緣不究病情耳所以然者以東海擅魚鹽之饒魚者甘美之味多食使人熱中鹽者鹹苦之味其性偏於走血血爲陰象初與熱合不覺其病日久月增中焦沖和之氣亦積漸而化爲熱矣氣熱則結而血始不流矣於是氣居血中血裹氣外一似婦女受孕者然至彌月時腹如抱甕矣但孕系於胞中如熟果自落蠱蟠於腹內如附贅難療又不可同語也究而論之豈但東方之水土致然凡五方之因膏粱

厚味椒薑桂糈成熱中者除癰疽消渴等證不嘗見外至脹滿一證人人無不有之但微則旋脹旋消甚則脹久不消而成蠱耳倘能見微知著寧至相尋於覆轍耶要知人之有身執中央以運四旁者也今中央反竭四旁以奉其身尚有精華發見於色脈間乎此所以脈細皮寒少食多汗尪羸之狀不一而足也余言當不謬請自揆之月餘病成竟不能用半載而逝

何茂倩令愛病單腹脹乃脾虛將絕之候也蓋從來腫病遍身頭面俱腫尚易治若只單單腹腫則爲難治此其間有所以然之故不可不辨也蓋傳世諸方皆是悍毒攻刦之法傷耗元氣虧損脾胃可一不可再之藥縱取效於一時倘至復腫則更無法可療此其一也且遍身俱腫者五臟六腑各有見證故瀉肝瀉肺瀉膀胱瀉大小腸之藥間有取效之時而單單腹腫則中州之地久窒其四運之軸而清者不升濁者不降互相結聚牢不可破實因脾氣之衰微所致而瀉脾之藥尚敢漫用乎此又其一也且腫病之可

瀉者但可施之西北壯盛及田野農夫之流豈膏粱老少之所能受設謂腫病爲大滿大實必從乎瀉則病後腫與產後腫將亦瀉之耶此又其一也且古方原載腫病五不治脣黑傷肝缺盆平傷心臍出傷脾背平傷肺足底平滿傷腎此五者不可治矣是其立方之意皆非爲不可治之證而設後人不察概從攻瀉者何耶惟理脾一法雖五臟見不治之證而能治者尚多此又其一也張子和以汗吐下三法刦除百病後人有謂子和之書非子和之筆乃麻徵君文之者誠爲知言如常仲明云世人以補劑療病宜乎不效者此則過信劉張之學而不顧元氣之羸劣耳所以凡用刦奪之藥者其始非不遽消其後攻之不消矣其後再攻之如鐵石矣不知者見之方謂何物邪氣若此之盛自明者觀之不過爲猛藥所攻卽以此身之元氣轉與此身爲難首實有如驅良民爲寇之比所謂赤子盜兵弄於潢池亶其然哉明乎此則有培養一法補益元氣是也則有招納一法升舉陽氣是也則有解散一法開鬼門潔淨府是也三法俱不

言瀉而瀉在其中矣無餘蘊矣聖符病單腹脹腹大如箕緊硬如石胃中時生酸水吞吐皆然經年罔效蓋由醫輩用孟浪成法不察病之所起與病成而變之理增其勢耳昨見雲間老醫煎方龐雜全無取義惟腎氣丸一方猶是前人已試之法但此病用之譬適燕而南其指也夫腎氣丸爲腫脹之聖藥者以能收攝腎氣使水不泛溢耳今小水一晝夜六七行溝渠順導水無泛濫之虞也且謂益火之源以消陰翳耳今酸味皆從火化尚可更益其火乎又有指腹脹爲食積用局方峻攻尤屬可駭僕不得不疏明其旨夫聖符之疾起於脾氣不宣鬱而成火使當時用火鬱發之之法升陽散火病已豁然解矣惟其愈鬱愈湮漸至脹滿則身中之氣一如天地不交而成否塞病成而變矣證似無火全以火爲之根不究其根但治其脹如檳榔厚朴萊菔子之類皆能耗氣助火於是病轉入胃日漸一日煎熬津液變成酸汁胃口有如醋甕胃中之熱有如麯糵俟穀飲一入頃刻釀成酢味矣有時新穀方嚥舊穀即

爲逆出若互換者緣新穀芳甘未變胃愛而受之其酸腐之餘自不能留也夫人身天眞之氣全在胃口今暗從火化津液升騰屑越已非細故況土曰稼穡作甘者也木曰曲直作酸者也甘反作酸木來侮土至春月木旺時必爲難治及今可治又治其脹不治其酸曾不思酸水入腹脹必愈增不塞源而遏流其勢何有極耶試言其槪治火無過虛補實瀉兩法內鬱雖宜從補然甘溫除熱瀉火之法施於作酸日其酸轉增用必無功故驅其酸而返其甘惟有用剛藥一法剛藥者氣味俱雄之藥能變胃而不受胃變者也參伍以協其平但可用剛中之柔不可用柔中之剛如六味丸加桂附柔中之剛也於六味作酸藥中入二味止酸藥當乎不當乎剛中之柔如連理湯丸是也剛非過剛更有柔以濟其剛可收去酸之績矣酸去而後治脹破竹之勢已成迎刃可解錮疾頓蠲脾君復辟保合太和長有天命矣孰是用藥者後先銖兩間可無審乎

景岳全書曰腫脹之治凡脾腎虛證如前論所列薛

氏腎氣湯者誠然矣然用之之法猶當因此廓充不宜執也向余嘗治一陶姓之友年逾四旬因患傷寒爲醫誤治危在呼吸乃以大劑參附熟地之類幸得挽回愈後喜飲未及兩月忽病足股盡腫脹及於腹按之如鼓堅而且硬因其前次之病中氣本傷近日之病又因酒濕度非加減腎氣湯不可遂連進數服雖無所碍然終不見效人皆料其必不可治余熟計其前後病因本屬脾腎大虛而今兼以滲利未免減去補力亦與實漏巵者何異元氣不能復病必不能退遂悉去利水等藥而專用參附理陰煎仍加白朮大劑與之三劑而足脛漸消二十餘劑而腹脹盡退人皆曰此證本無生理以此之脹而以此之治何其見之神也自後凡治全虛者悉用此法無一不效可見妙法之中更有妙焉顧在用者之何如耳

一姻家子年力正壯素日飲酒亦多失饑傷飽一日偶因飯後脅肋大痛自服行氣化滯等藥復用吐法盡出飲食吐後逆氣上升脅痛雖止而上壅胸膈脹痛更甚且加嘔吐余用行滯破氣等藥嘔痛漸止而

左乳脅肋之下結聚一塊脹實拒按臍腹隔閉不能下達每於戌亥子丑之時則脹不可當因其嘔吐既止已可用下凡大黃芒硝稜莪巴豆等藥及蘿蔔子朴硝大蒜橘葉搗罨等法無所不盡毫不能效而愈攻愈脹因疑爲脾氣受傷用補尤覺不便湯水不入口者凡二十餘日無計可施窘劇待斃只得用手揉按其處彼云肋下一點按著則痛連脅腹及細爲揣摸則正在章門穴也章門爲脾之募爲臟之會且乳下肋間正屬虛里大絡乃胃氣所出之道路而氣實通於章門余因悟其日輕夜重本非有形之積而按此連彼則病在氣分無疑也但用湯藥以治氣病本非不善然經火則氣散而力有不及矣乃制神香散使日服三四次兼用艾火灸章門十四壯以逐散其結滯之胃氣不三日脹果漸平食乃漸進始得保全此其證治俱奇誠所難測本年春間一鄰人陡病痛脹隔食全與此同羣醫極盡攻擊竟以致斃是眞不得其法耳故錄此以爲後人之式

孫一奎曰余在吳下時有吳生諱震者博雅士也一

日偶談及鼓脹乃詰余曰鼓有蟲否乎余卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者爲水只腹脹而四肢不腫者爲蠱註曰蠱卽鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三蟲爲首豈無旨哉愚謂鼓脹卽今云氣虛中滿是也以其外堅中空有似於鼓故以名之彼蠱證者中實有物積聚旣久理或有之吳生曰子誠敏也余堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葬燒至腹忽響聲如砲人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之皆蚘也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復生小蟲多者十五六條或十數條或五六條蟲在人腹中蓄息如此曷不令人脹而死哉惜乎諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然猶未親覩其異也歲萬曆癸巳至淮陰有王鄉宦者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如瓜四肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈甚其熱愈熾喉中兩耳俱瘡余診視之脈滑

數望其脣則紅其腹則痛又多嗜肥甘余思諸凡腹痛者脣色必淡不嗜飲食今其若此得非蟲乎遂投以阿魏積塊丸服之果下蟲數十大者一紅一黑長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中復有蟲大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十二卷目錄

醫部彙考三百十二

噎膈反胃門一

黃帝素問（陰陽別論　六節臟象論　血氣形志篇　通評虛實論　氣厥論　舉痛論　風論　大奇論　至眞要大論　五常政大論　六元正紀大論）

靈樞經（邪氣臟腑病形篇　本神篇　終始篇　脈度篇　禁服篇　上膈篇）

扁鵲難經（關格）

張機金匱要略（胃反證治）

華佗中藏經（陰陽否格論）
王叔和脈訣（脈法）
孫思邈千金方（噎塞論　反胃）
嚴用和濟生方（噎膈）
張從政儒門事親（斥十膈五噎浪分支派疏）
李杲十書（噎塞治法　膈咽不通四時換氣用藥法）
朱震亨心法（關格　翻胃）
局方發揮（治法辨惑）
戴思恭證治要訣（噎膈證治　翻胃）
李梴醫學入門（關格證治　膈噎證治　反胃）
李中梓醫宗必讀（反胃噎塞　死證　脈候）
趙獻可醫貫（噎膈論）
喻昌醫門法律（關格論　進退黃連方論　律四條）

藝術典第三百三十二卷

醫部彙考三百十二

噎膈反胃門一

黃帝素問

陰陽別論

一陽發病少氣善欬善泄其傳爲心掣其傳爲膈

註　一陽少陽也少陽主初生之氣病則生氣少矣少陽相火生氣氣少則火壯爍金故欬木火之邪傷土故泄心虛則掣痛邪在胃脘故膈塞不通

三陽結謂之膈

註　三陽太陽也太陽之氣生於膀胱從內膈而出於胷脅陽氣結則膈氣不通飲食亦膈塞不下也

六節臟象論

人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上爲格陽

註　一盛病在少陽少陽主春升之氣也太陽主夏陽明主秋四盛以上乃陽太盛故名曰格陽

寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上爲關陰

註　四盛以上者乃陰太盛故名曰關陰

人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格關格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣

註　俱四倍以上者陰陽俱亢極也陰陽俱盛而不和是不能及於天地陰陽精氣之承制則死矣

血氣形志篇

形苦志苦病生於咽嗌治之以甘藥

註　百憂感其心萬事勞其形則陰陽氣血皆傷故

病生咽嗌宜甘藥以調其脾胃

通評虛實論

隔塞閉絕上下不通則暴憂之病也

註　中焦不通則上下之氣閉塞此五鬱爲病也

氣厥論

肝移寒於心狂膈中

註　陽并於陽故狂肝邪上移於心故爲膈中

舉痛論

恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣

註　恐傷腎是以精氣退却而不能上升膻中爲氣海上出於肺以司呼吸其原出於下焦故精氣却則上焦閉其生升之氣還歸於下而下焦脹矣上下氣不交通故氣不行矣

思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣

註　思則心神內存正氣留中而不行故氣結矣

風論

胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通腹善滿

失衣則膹脹食寒則泄胗形瘦而腹大

註　飲食不下鬲塞不通腹善滿者胃受邪也胃氣不足則身以前皆寒腹脹滿故形寒則膹脹飲冷則泄者胃氣虛傷也腹者胃之郛郭故形瘦腹大

大奇論

胃脈沉鼓濇胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯

註　靈樞經曰濇爲少氣傷寒論曰濇則無血大則爲虛此血氣虛於內外故成鬲偏枯小則血氣皆少堅急爲寒心氣虛寒則血脈不行筋骨無所榮養亦成鬲外之偏枯

至眞要大論

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下舌本强食則嘔

歲厥陰在泉風淫所勝民病灑灑振寒善伸數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔

厥陰之勝胃脘當心而痛上支兩脅甚則嘔吐鬲咽不通

註　此皆風木淫勝故脾爲之病也

太陰之復濕變乃舉體重中滿食飲不化陰氣上厥胷中不便

註　此皆陰濕之爲病也

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦欬噦煩心病在鬲中

註　心痛否滿腹脹而泄乘火土也嘔苦者木受金刑也欬噦煩心病在鬲中者陽明之氣上逆也

太陰在泉主勝則寒氣逆滿食飲不下

註　水淫而上乘於土故逆滿濕氣上逆病及厥陰之經故食飲不下

少陽在泉主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔少陰同候

註　心痛發熱者君相二火之客氣上行而自病也格中而嘔者太陰之客氣自病也

五常政大論

備化之紀其病否

註　否者脾病於中而上下之氣不交也

卑監之紀是謂減化其病留滿否塞

註　脾氣傷也

少陽司天心痛胃脘痛厥逆鬲不通其主暴速

註　心痛煩心者心包絡所生病也胃脘痛者木尅土也土位中央中鬲不通則上下厥逆也風氣迅速故主暴速

太陽司天水飲內稸中滿不食

註　水濕之爲病也

六元正紀大論

太陽司天之政二之氣民病氣鬱中滿

註　陽氣鬱遏於內也

木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通食飲不下

註　木盛而土傷也

太陰所至爲積飲否隔

註　此春病之常也

太陰所至爲中滿霍亂吐下

註　此秋病之常也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

脾脈微急爲膈中食飲入而還出後沃沫

註 脾有寒不能運化飲食故爲膈中脾不能遊溢津液上歸於肺四布於皮毛故涎沫之從口出也

本神篇

愁憂者氣閉塞而不行

註 傷其心臟之神氣也

終始篇

人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽爲外格脈口四盛且大且數者名曰溢陰溢陰爲內關內關不通死不治人迎與太陰脈口俱盛四倍以上命曰關格關格者與之短期

註 外格者謂陽盛於外而無陰氣之和內關者陰盛於內而無陽氣之和關格者陰關於內陽格於外也是爲關陰格陽之死候矣

人迎與脈口俱盛三倍以上命曰陰陽俱溢如是者不開則血脈閉塞氣無所行流淫於中五臟內傷如此者因而灸之則變易而爲他病矣

註　人迎與脈口俱盛命曰陰陽俱溢蓋陰盛於內則陽盛於外陽盛於左則陰盛於右矣若不以鍼開之則血脈閉塞氣無所行流溢於中則內傷五臟矣

脈度篇

五臟不和則七竅不通六腑不和則畱爲癰故邪在腑則陽脈不和陽脈不和則氣畱之氣畱之則陽氣盛矣陽氣太盛則陰脈不利陰脈不利則血畱之血畱之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣不能榮也故曰關陽氣太盛則陰氣弗能榮也故曰格陰陽俱盛不能相榮故曰關格關格者不得盡期而死也

註　關謂關陰於內格謂格陽於外如是則陰陽俱盛不得相榮故曰關格者不得盡期而死也

禁服篇

人迎四倍者且大且數名曰溢陽溢陽爲外格死不治必審按其本末察其寒熱以驗其臟腑之病

註　溢陽者陽盛之氣溢於脈中氣血之相合也

寸口四倍者名曰內關內關者且大且數死不治必

審按其本末之寒溫以驗其臟腑之病

上膈篇

黃帝曰氣爲上膈者食飲入而還出余已知之矣蟲爲下膈下膈者食晬時乃出余未得其意願卒聞之岐伯曰喜怒不適食飲不節寒溫不時則寒汁流於腸中流於腸中則蟲寒蟲寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛氣不營邪氣居之人食則蟲上食蟲上食則下管虛下管虛則邪氣勝之積聚已留留則癰成癰成則下管約其癰在管內者卽而痛深其癰在外者則癰外而痛浮癰上皮熱

註 因於喜怒不適食飲不節寒溫不時病在膈上者食飲入而還出病在膈下者食入晬時乃還夫胃者水穀血氣之海也因於外邪致汁沫滲留於腸外不得散則日以成積如因於內傷汁沫留於腸內則漸漬而成癰癰在脘內則痛而深在外則痛浮在癰上之皮必熱

扁鵲難經

關格

脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脈也關以後者陰之動也脈當見一寸而沉過者法曰太過減者法曰不及遂入尺爲覆爲內關外格此陽乘之脈也故曰覆溢是其眞臟之脈人不病而死也

經言氣獨行於五臟不營於六腑者何也然夫氣之所行也如水之流不得息也故陰脈營於五臟陽脈營於六腑如環無端莫知其紀終而復始其不覆溢人氣內溫於臟腑外濡於腠理

漢張機金匱要略

胃反證治

嘔吐篇曰問曰病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之今脈反弦故名曰虛

寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胷中冷

趺陽脈浮而濇浮則爲虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難治

食已卽吐者大黃甘草湯主之

胃反嘔吐者大半夏湯主之

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

漢華佗中藏經

陰陽否格論

陽氣上而不下曰否陰氣下而不上亦曰否陽氣下而不上曰格陰氣上而不下亦曰格否格者謂陰陽不相從也陽奔於上則燔脾肺生其疸也其色黃赤皆起於陽極也陰走於下則冰腎肝生其厥也其色青黑皆發於陰極也疸爲黃疸也厥爲寒厥也由陰陽否格不通而生焉陽燔則治以水陰厥則助以火乃陰陽相濟之道耳

晉王叔和脈訣

脈法

洪脈關前熱在胷到關翻胃幾千重

唐孫思邈千金方

噎塞論

古今錄驗云五噎者氣憂勞食思也氣噎者心悸上下不通噎噦不徹胷脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣膈脅下支滿胷中塡塞令手足逆冷不能自溫食噎者食無多少惟胷中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮此皆憂恚嗔怒寒氣上入胷脅所致也

反胃

寸緊尺澀其人胷滿不能食而吐吐止者爲下之故不能食設言未止者此爲胃反故尺爲之微澀

趺陽脈浮而澀浮卽爲虛澀卽傷脾脾傷卽不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反趺陽脈緊而澀其病難治

宋嚴用和濟生方

噎膈

素問云陽脈結謂之膈蓋氣之與神並爲陽也逸則氣神安勞則氣神耗倘或寒溫失宜食飲乖度七情傷感氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胷膈則成膈氣畱於咽嗌則成五噎五膈者憂恚寒熱氣也五噎者憂思勞食氣也其爲病也令人胷膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胷痛徹背或脅下支滿或心忡喜忘咽噎氣不舒治療之法調順陰陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下膈噎之疾無由作矣又有下虛氣上控鬲令人心下堅滿痞急肌中苦痹緩急如刺不得俛仰名曰胷痹

元張從政儒門事親

斥十膈五噎浪分支派疏

病派之分自巢氏始也病失其本亦自巢氏始也何者老子曰少則得多則惑且俗謂噎食一證在內經苦無多語惟曰三陽結謂之膈三陽者謂大腸小腸膀胱也結謂結熱也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則後不圊膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閟

塞下既不通必反上行此所以噎食不下縱下而復出也謂胃爲水穀之海日受其新以易其陳一日一便乃常度也今病噎者三日五日或五七日不便是乖其度也亦明矣豈非三陽俱結於下廣腸枯涸所食之物爲咽所拒縱入太倉還出咽嗌此陽火不下推而上行也故經曰少陽所至爲嘔涌溢食不下此理豈不曉然又氣厥論云肝移寒於心爲狂膈中陽氣與寒相薄故膈食而中不通此膈陽與寒爲之也非獨專於寒也六節臟象又云人迎四盛以上爲格陽王太僕云陽盛之極故格拒而食不得入正理論曰格則吐逆故膈亦當爲格後世強分爲五噎謂氣憂食思勞也後又分爲十膈五噎其泒既多其惑滋甚人之溢食初未必遽然也初或傷酒食或胃熱欲吐或冒風欲吐醫氏不察本源火裏燒薑湯中煑桂丁香未已豆蔻繼之蓽茇未已胡椒繼之雖曰和胃胃本不寒雖曰補胃胃本不虛設如傷飲止可逐飲設如傷食止可逐食豈可言虛便將熱補素熱無者於法猶非素熱之人三陽必結三陽既結食必上潮

醫氏猶云胃寒不納燔鍼鑽肉炷艾灼肌苦楚萬千三陽熱結分明一句到了難從不過抽薪最爲緊要揚湯止沸愈急愈增歲月彌深爲醫所誤人言可下退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣止在冲和閉塞不通經無來路腸宜通暢是以腸鳴腸既不通遂成噎病世傳五噎寬中散有薑有桂十膈散有附有烏今予既斥其方信乎與否以聽後賢或云憂恚氣結亦可下乎余曰憂恚磊礴便同大鬱太倉公見下法既廢千年不復今代劉河間治膈氣噎食用三承氣湯獨超近代今予姑示後人用藥之時更詳輕重假如閟久愼勿陡攻縱得攻開必慮後患宜先潤養小著湯丸累累加之關扃自透其或咽噎上阻涎痰輕用苦酸微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引兩藥相通結散陽消飲食自下莫將巴豆耗刼天眞液燥津枯留毒不去人言此病宜下奪之從下奪來轉虛轉痞

李杲十書

噎塞治法

堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎夫噎塞迎逆於咽喉胷膈之間令諸經不行則口開目瞪氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮益智黃蘗散寒氣泄陰火之上逆或以消痞丸合滋腎丸滋腎丸者黃蘗知母微加肉桂三味是也或更加黃連別作丸二藥七八十丸空心約宿食消盡服之待少時以美食壓之不令胃中停畱也

膈咽不通四時換氣用藥法

鍼經曰胃病者腹䐜脹胃脘當心而痛上支兩脅膈咽不通飲食不下取三里夫咽者嚥物之門戶膈者心肺之分野不通者升降之氣不得上下交通又云清氣在下則生飧泄謂泄黃如糜米穀不化也濁氣在上則生䐜脹不得大便或大便難先結後溏皆是也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而反在上胃氣逆上或爲嘔爲吐爲噦者是陰

火上衝而吸入之氣不得入故食不得下此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而榮經因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣弱而下陷入陰中故米穀入而不得升降爲飧泄也咽膈之間壅遏之甚不得交通者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上衝兩脅膈咽不通飲食不下當取之三里鍼經云清濁相干亂於胷中是爲大悗大悗者惑也氣不交通最爲急證不急去之諸變生矣治法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發於陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其臟腑塞者五臟之所主陰也血也噎者六腑之所主陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立四時用藥法并治法於後

冬三月陰氣在外陽氣在內當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善嚔鼻流清

涕寒甚則濁涕嚏不止比常人尤大惡風寒小便數而欠或上欬下便色清而多大便不調常夜無寐甚則爲痰嗽嘔噦吐唾白沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者吳萸茱丸主之

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病値此時是天助正氣而剉其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中梗盛者前證俱作治法當從時用利膈丸瀉肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步恇怯敧側欲倒臂臑如折及作痛而無力或氣短促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓陳皮等作湯送下滋腎丸五六十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞悶食不下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸七十丸更審而用之

朱震亨心法

關格

凡關格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也

有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降

有中氣虛不運者補氣藥中升降

寒在上熱在下脈兩手寸俱盛四倍以上

翻胃

翻胃大約有四血虛氣虛有熱有痰兼病必用韭汁童便竹瀝牛羊乳生薑汁氣虛入四君子湯必右手脈無力血虛入四物湯加童便必左手脈無力切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味

治反胃用黃連三錢生薑汁浸炒山樝肉二錢保和丸二錢同爲末糊丸如麻子大臙脂爲衣人參湯入竹瀝再煎一沸下六十丸

有痰二陳湯爲主必寸關脈沉或伏而大有氣結宜開滯導氣之藥必寸關脈沉而濇有內虛陰火上炎而反胃者作陰火治之

年少者四物湯清胃脘血燥不潤便故澀年老雖不治亦用參朮關防氣虛胃虛氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散或韭汁牛羊乳或入叫驢尿又有積血停於內而致當消息逐之大便澀者難治

常令食兎肉則便利

翻胃卽膈噎膈噎乃翻胃之漸發揮備言年高者不治糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

局方發揮

治法辨惑

局方治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用安息香丸丁沉丸大沉香丸蘇子丸匀氣散如神丸集香丸白沉香丸煨薑丸鹽煎散七氣散溫白丸生薑湯其治嘔吐膈噎也用五膈丸五膈寬中散膈氣散酒癥丸草豆蔻丸撞氣丸人參丁香散其治吞酸也用丁香煎丸小理中丸其治痰飲也用倍术丸消飲丸溫中化痰丸五套丸且於各方條下或曰口苦失味曰噫酸曰舌澀曰吐清水曰痞滿曰氣急曰脅下急痛曰五心中熱口爛生瘡皆是明言熱證何爲悉用熱藥夫周流於人之一身以爲主者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不傷於七情外不感於六淫其爲氣也何病之有今曰冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化

有升無降熏蒸淸道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲展轉變爲嘔吐膈噎痰飲反胃吞酸夫治寒以熱治熱以寒此正治之法也治熱用熱治寒用寒此反佐之法也詳味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能無疑也謹按原病式曰諸病嘔吐酸皆屬於熱諸積飲痞滿中膈皆屬於濕諸氣逆衝上嘔涌溢食不下皆屬於火諸堅痞腹滿急痛吐腥穢皆屬於寒深契仲景之意金匱要略曰胷痹病胷背痛苦蔞薤白湯主之胷痹心痛徹背背痛徹心苦蔞薤白半夏湯主之心下痞氣氣結在胷脅下上逆搶心者枳實薤白苦蔞桂枝湯主之嘔而心下痞者半夏瀉心湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生薑湯主之諸嘔吐穀不得入者小半夏湯主之嘔吐病在膈上者猪苓湯主之胃反嘔吐者半夏參蜜湯主之食已卽吐者大黃甘草湯主之胃反吐而渴者茯苓澤瀉湯主之吐後欲飲者文蛤湯主之病似嘔不嘔似噦不噦心中無奈者薑汁半夏湯主之乾嘔手足冷者陳皮湯主之噦逆者陳皮竹茹湯主之乾嘔下利

者黃芩湯主之氣衝上者皂莢丸主之上氣脈浮者厚朴麻黃湯主之上氣脈沉者澤瀉湯主之火逆上氣者麥門冬湯主之心下有痰飲胷脅支滿目眩茯苓桂朮湯主之短氣有微飲當從小便出宜茯苓桂朮甘草湯主之腎氣丸亦主之病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿者此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之病懸飲者十棗湯主之病溢飲者當發其汗宜大青龍湯又宜小青龍湯主之心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之支飲胷滿者厚朴大黃湯主之支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之嘔家本渴今反不渴心中有支飲故也小半夏湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之心胷有停痰宿水自吐出水後心胷間虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓飲主之先渴後嘔爲水停心下此屬飲家半夏湯加茯苓主之觀其微意可表者汗之可下者利之滯者導之鬱者揚之熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之挾濕

者淡以滲之挾虛者補而養之何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟火實實虛虛咎將誰執或曰脈訣謂熱則生風冷生氣寒主收引今冷氣上衝矣氣逆氣滯矣非冷而何吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣痰飲嘔吐反胃吞酸等病將無寒證耶予曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口食寒物乃爲病寒非若諸火病自內作所以氣之病寒者十無一二或曰其餘痰氣嘔吐吞酸噎膈反胃作熱作火論治於理可通若病人自言冷氣從下而上非冷而何予曰上升之氣自肝而出中挾相火自下而出其熱爲甚自覺其冷非眞冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故見此證冷生氣者出高陽生之謬言也若病果因於寒當以去寒之劑治之何至例用辛香燥熱爲方不知權變寧不誤人或曰氣上升者皆用黑錫丹養正丹養氣丹等藥以爲鎭墜然服之者隨手得效吾子以爲熱甚之病亦將有悞耶予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者經所謂一水不勝二火之火斯火也

出於天造厥陽者經所謂一水不勝五火之火出於人欲二者之火相扇而動氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今借丹劑之重墜而降之氣鬱爲濕痰丹性熱燥濕痰被刼亦爲暫開所以清快丹毒積久偏助狂火陰血愈耗其升愈甚俗人喜溫迷而不悟被此禍者滔滔皆是或曰丹藥之重欲降而升然如之何則可予曰投以辛凉行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升之有先哲治法其則不遠吾不贅及或曰諸氣諸飲與夫嘔吐吞酸膈噎反胃等證局方未中肯綮我知之矣然則要略之方果足用乎抑猶有未發者乎予曰天地之氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也醫之良者引例推類可謂無窮之用借令略有加減修合終難踰越矩度夫氣之初病也其端甚微或因些小飲食不謹或外冒風雨寒暑或內感七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟素實表密無汗或性急易怒陰火炎上以致津液不行清濁相干氣爲之病或痞痛

不思食或噎噫腐氣呑酸或嘈雜膨滿不求本原便認爲寒遽以辛香燥熱之劑投之數貼暫得快然以爲神方仍前厚味不節將理不謹舊疾被刦暫舒濁液易於攢聚或半月一月前病復作如此延蔓自氣成積自積成痰此爲痰飲呑酸之由也良工未遇謬藥已行痰挾瘀血遂成窠囊於是爲痞痛嘔吐噎膈反胃之次第諸證蜂起飲食湯液泥滯不行滲道蹇濇大便或祕或溏下失傳化中焦愈停醫者不察猶執爲冷翻思前藥隨手得快至此賓主皆恨藥欠燥熱顒俟久服脾可以溫胃可以壯以冀一旦豁然之效不思胃爲水穀之海多血多氣氣清和則能受脾爲消化之官氣清和則能運今得香熱之藥偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚無所容受其久也脾氣耗散傳化漸遲其有胃熱易饑急於得食脾傷不磨鬱積成痛醫者猶曰虛而積寒非尋常草木可療妄以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入入亦不多名之曰噎其槁在下與胃爲近食雖

可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便祕小若羊屎然名雖不同病出一體要略論飲有六曰痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲分別五臟諸證治法至矣盡矣但恨醫者不善處治病者不守禁忌遂使藥助病邪展轉病痼去生漸遠深可哀憫或曰千金諸方治膈噎反胃未嘗廢薑桂等劑何吾子之多言也予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆根苦蔞等藥爲之佐使其始則同其終則異病邪易伏故易於安或曰胃脘乾槁者古方果可治乎將他有要捷之法或可補前人之未發者乎予曰古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾薑以養血粟米以實胃蜜水以潤燥薑以去穢正是此意張鷄峰亦曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之此言深中病情治法亦爲近理夫噎病主於血乾夫血者陰氣也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有

明戴思恭證治要訣

噎膈證治

諸痞塞及噎膈乃是痰爲氣所激而上氣又爲痰所隔而滯痰與氣搏不能流通並宜用二陳湯加枳實縮砂仁各半錢木香一錢或五膈寬中散應諸痞塞脹滿胷膈不利或氣上逆或腹疼痛並宜木香流氣飲應膈上諸般冷氣不問痞塞及疼痛且與薑汁一二盞痰飲尤宜

邪氣作痞宜用疎劑若氣不順逆上爲痞此乃虛痞愈疎而痞愈作宜於收補中微有疎通之意不可十分用香劑古方載瀉後痞膈用理中卽此意也

因七氣所傷結滯成痰痞塞滿悶宜四七湯或導痰湯加木香半錢或下來復丹因冷氣滯停中脘痞塞並可用撾脾湯加丁香或丁沉透膈湯因傷食痞塞見傷食證氣虛上逆遂成痞塞而疼者六磨飲吞黑錫丹

若痞塞服諸藥不效大便不甚通者宜感應丸加巴豆或半硫丸備急丸木香檳榔丸通之

諸五噎五膈並宜五膈寬中散不效穀神嘉禾散前痞塞諸藥皆可選用噎膈甚而水漿不入藥食皆不下食入口卽吐者當鎮墜之宜鹽湯下靈砂丹仍以嘉禾散作末乾點服

翻胃

翻胃之病所以重於嘔吐者嘔吐食入卽吐翻胃則或一日半日食復翻上不化如故腹中非不欲食不肯留胃氣不溫不能消食食既不消不爲糟粕而入大腸必隨氣上逆從口而出故翻胃人胷膈多爲冷氣所痞二陳湯加丁香十粒枳殼半錢或治中湯加枳殼砂仁各半錢半夏一錢入米與生薑同煎

若胃寒甚服藥而翻者宜附子粳米湯加丁香十粒砂仁半錢大便祕者更加枳殼半錢

若胷膈痞甚而翻宜穀神嘉禾散生附一錢或丁沉透膈湯五膈寬中散加生附一錢仍以來復丹升降其陰陽通其隧道半硫丸亦可通之隧道久不通名結腸翻胃半硫丸尤宜百藥無效勢危篤者宜桂香清金散以墜之一法用胡椒一味酢浸之曬乾復浸

不計遍數愈多愈好碾米末酢糊爲丸淡酢湯下十丸加至三四十丸

李梴醫學入門

關格證治

經云人迎脈大於氣口四倍名曰格氣口脈大於人迎四倍名曰關關乃陽不下以寒在胸中塞而不入格乃陰不上以熱在下焦塞而不出上下不通三焦撩亂中氣不足陰陽不能相榮故既關且格

中虛者補中益氣湯加檳榔以升降之中虛痰盛者六君子湯去朮加柏子仁及麝少許虛甚吐利俱不得者既濟丸

關格與噎稍異胃中覺氣有礙欲升不升欲降不降欲食不食宜二陳湯加木通吐其橫格之氣不必在出痰也

古云關格死在旦夕但治下焦可愈經云少陽所至爲嘔湧溢食不下言火逆上而爲嘔吐非膈上所生獨爲關非格也大承氣湯下之若但吐而不得小便者胃苓湯有膏粱積熱損傷北方眞水者滋腎丸主

之忌用淡滲利水之藥凡關格見頭汗者死

膈噎證治

飲食不下而大便不通名膈噎疏云膈有拒格意卽膈食反胃也玉機云噎塞大便不通通幽湯故以膈噎爲題局方以噎近咽膈近胃而遺下焦又妄分十膈五噎皆非經旨病因內傷憂鬱失志及飲食淫慾而動脾胃肝腎之火或因雜病誤服辛香燥藥俱令血液衰耗胃脘枯槁其槁在上焦賁門者食不能下則胃脘當心而痛須臾吐出乃止賁門卽胃脘上口言水穀自此奔入於胃而氣則傳之於肺也其槁在中焦幽門者食物可下艮久復出幽門與中脘相近言其位幽僻胃中水穀自此而入小腸也其槁在下焦闌門者朝食暮吐暮食朝吐闌門臍下欄約水穀分入膀胱大腸而爲糞溺是大小腸膀胱乃氣血津液流通之道路也

經曰三陽結謂之膈小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能便膀胱熱結則津液涸三陽熱結脈必洪數有力前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不

下縱下復出乃陽火上行而不下降也

實火黃連解毒湯加童便薑汁或益元散入薑汁澄白腳爲小丸時時服之溫六丸尤妙甚者陶氏六一承氣湯人參利膈丸

虛火衝上食不入者枳桔二陳湯加厚朴白朮及木香少許或古萸連丸渴者錢氏白朮散大便閉者導滯通幽湯或參仁丸麻子仁丸當噎未至於膈之時便宜服此防之膏肓之疾豈可怠忽

間有身受寒氣口傷冷物以致脾胃火衰膈上苦冷腸鳴脈必滑微宜暫用丁香煮散五膈湯五噎湯單附子散以刦之若不求其本偏認爲寒槩用辛香燥藥必至爍陰不救

古云膈噎神思間病惟內觀養之蓋七情火起熏蒸津液爲痰爲積積久則血愈衰針經曰怒氣所至食則氣逆不下勞氣所至爲膈噎喘促思氣所至爲中痞三焦閉塞咽嗌不利

痰飲脈滑或伏二陳湯古參夏湯化痰丸苦蔞實丸或用黃連吳萸貝母苦蔞仁牛轉草水煎

食積脈滑而短枳朮丸加黃連陳皮半夏或狗米平胃丸虎脂平胃丸或用保和丸二錢加薑炒黃連三錢山楂二錢爲丸麻仁大臙脂爲衣每六十丸人參煎湯入竹瀝下

七情鬱結脈沉而濇飲食喜靜胷背痛者四七湯溫膽湯痞滿煩悶微嗽二便不利者分心氣飲四磨湯或木香檳榔二味等分爲末白湯下傷神不睡者十味溫膽湯硃砂安神丸腹脹腸鳴者木香勻氣散有積聚者阿魏撞氣丸惡聞食氣者五膈寬中散

氣血兩虛口沫大出者死

氣虛不能運化生痰者脈必緩而無力四君子湯大便閉加蘆根童便氣虛甚者六君子湯加附子大黃酒毒加甘蔗汁單人參湯人參膏尤妙

血虛不能滋潤生火者脈必數而無力四物湯加童便竹瀝薑汁大便閉加桃仁紅花有瘀血加牡丹皮韭汁防生蟲加驢尿血虛甚加乾薑血燥加牛羊乳汁不可以人乳代之蓋人乳反有七情飲食之毒火故也

氣血俱虛者八物湯主之

血陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣有養陰血自生津液傳化合宜何膈噎之有

大概不問虛實俱以益陰養胃爲主庶免後患或腎氣丸主之

通用二陳湯加童便竹瀝薑汁韭汁有熱加酒炒芩連苦蔞桔梗七情加香附川芎木香檳榔不納食加麥芽神麴熱結食返上奔加大黃桃仁氣虛合四君子湯血虛合四物湯

雜方燒鍼丸杵糠丸紫金錠霞天膏神仙奪命丹古阿魏散或靈砂燒酒下凡五十歲後血枯糞如羊屎及年少不淡薄飲食斷絕房室者不治

反胃證治

胃冷嘔青手足厥食久乃吐二陳湯加薑桂甚加丁附或丁香半夏丸

胃熱面紅手足熱食已卽吐二陳加薑炒芩連山梔暴甚略加檳榔木香胃口痛加薑汁或葛根竹茹湯加味橘皮竹茹湯或小柴胡湯加竹茹如時常口吐

清水冷涎自下湧上者此脾熱所致也二陳湯加白术白芍升麻炒芩連山梔神麯麥芽乾生薑等分或丸或煎服

凡氣吐者氣衝胷痛食已暴吐而渴始當降氣和中六君子湯加木香藿香桔梗枇杷葉或七氣湯熱氣衝者古荆黃湯加人參甘草煨薑

李中梓醫宗必讀

反胃噎塞

按反胃噎膈總是血液衰耗胃脘乾槁槁在上者水飲可行食物難入名曰噎塞槁在下者食雖可入良久復出名曰反胃二證總名爲膈故內經止有三陽結謂之膈一語潔古分吐證爲三端上焦吐者皆從於氣食則暴吐中焦吐者皆從於積或先吐而痛或先痛而吐下焦吐者皆從於寒朝食暮吐暮食朝吐巢氏浪分五噎十膈支派煩多惑人滋甚惟張雞峯以爲神思間病法當內觀靜養斯言深中病情大抵氣血虧損復因悲思憂恚則脾胃受傷血液漸耗鬱氣生痰痰則塞而不通氣則上而不下妨礙道路飲

食難進噎塞所由成也脾胃虛傷運行失職不能熟腐五穀變化精微朝食暮吐暮食朝吐食雖入胃復反而出反胃所由成也二者皆在膈間受病故通名爲膈也噎塞之吐即潔古之上焦吐反胃之吐即潔古之下焦吐王太僕云食不得入是有火也食入反出是無火也噎塞大都屬熱反胃大都屬寒然亦不可拘也脈大有力當作熱治脈小無力當作寒醫色之黃白而枯者爲虛寒色之紅赤而澤者爲實熱以脈合證以色合脈庶乎無誤經曰能合色脈可以萬

全此證之所以疑難者方欲健脾理痰恐燥劑有妨於津液方欲養血生津恐潤劑有礙於中州審其陰傷火旺者當以養血爲亟脾傷陰盛者當以溫補爲先更有憂恚盤礴火鬱閉結神不大衰脈猶有力當以倉公河間之法下之小小湯丸累累加用關局自透膈間痰盛微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨證之權衡也或泥於金匱局方而偏主辛溫或泥於玉機心法而偏主清潤凡若是者皆賴病合法

食難進噎塞所由成也脾胃虛傷運行失職不能熟腐五穀變化精微朝食暮吐暮食朝吐食雖入胃復反而出反胃所由成也二者皆在膈間受病故通名爲膈也噎塞之吐即潔古之上焦吐反胃之吐即潔古之下焦吐王太僕云食不得入是有火也食入反出是無火也噎塞大都屬熱反胃大都屬寒然亦不可拘也脈大有力當作熱治脈小無力當作寒醫色之黃白而枯者爲虛寒色之紅赤而澤者爲實熱以脈合證以色合脈庶乎無誤經曰能合色脈可以萬全此證之所以疑難者方欲健脾理痰恐燥劑有妨於津液方欲養血生津恐潤劑有礙於中州審其陰傷火旺者當以養血爲亟脾傷陰盛者當以溫補爲先更有憂恚盤礴火鬱閉結神不大衰脈猶有力當以倉公河間之法下之小小湯丸累累加用關局自透膈間痰盛微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引自然宣通此皆虛實陰陽之辨臨證之權衡也或泥於金匱局方而偏主辛溫或泥於玉機心法而偏主清潤凡若是者皆賴病合法

耳豈云法治病乎

凡反胃證得藥而愈者切不可便與粥飯惟以人參五錢陳皮二錢老黃米一兩作湯細啜旬日之後方可食粥倉廩未固不宜便進米穀常致不救

死證

年滿六旬者難治若稟厚善守禁忌尊信醫藥亦有生者又糞如羊屎者不治口吐白沫者不治胸腹嘈痛如刀割者死

脈候

緊而滑者吐逆小弱而濇者反胃沉緩無力或大而弱爲氣虛數而無力或濇小爲血虛弦爲痰滑亦爲痰寸緊尺濇爲胷滿不能食而吐又難經曰脈華則吐逆

趙獻可醫貫

噎膈論

噎膈翻胃關格三者名各不同病原迥異治宜區別不可不辨也噎膈者饑欲得食但噎塞迎逆於咽喉胷膈之間在胃口之上未曾入胃卽帶痰涎而出若

一入胃下無不消化不復出矣惟男子年高者有之少無噎膈翻胃者飲食倍常盡入於胃矣但朝食暮吐暮食朝吐或一兩時而吐或積至一日一夜腹中脹悶不可忍而復吐原物酸臭不化此已入胃而反出故曰反胃男女老少皆有之關格者粒米不欲食渴喜茶水飲之少頃卽吐出復求飲復吐飲之以藥熱藥入口卽出冷藥過時而出大小便祕名曰關格關者下不得出也格者上不得入也惟女人多有此證論噎膈丹溪謂得之七情六淫遂有火熱炎上之化多升少降津液不布積而爲痰爲飲被刼時暫得快不久復作前藥再行積成其熱血液衰耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入食亦不多名之曰噎其槁在下與胃爲近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便祕少若羊矢然必外避六淫內節七情飲食自養滋血生津以潤腸胃則金無畏火之炎腎有生水之漸氣清血和則脾氣健運而食消傳化矣丹溪之論甚妙但噎膈反胃分別欠明余獨喜其火熱炎上之化腎有生水之

漸二句深中病源惜其見猶未眞以潤血爲主而不直探乎腎中先天之原故其立方以四物中牛羊乳之類加之竹瀝韭汁化痰化瘀皆治標而不治本也豈知内經原無多語唯曰三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀胱也結謂結熱也大腸主津小腸主液大腸熱結則津涸小腸熱結則液燥膀胱爲州都之官津液藏焉膀胱熱結則津液竭然而三陽何以致結熱皆腎之病也蓋腎主五液又腎主大小便腎與膀胱爲一臟一腑腎水既乾陽火偏盛熬煎津液三陽熱結則前後閉濇下既不通必反於上直犯清道上冲吸門喉咽所以噎食不下也何爲水飲可入食物難下蓋食入於陰長氣於陽反引動胃口之火故難入水者陰類也同氣相投故可入口吐白沫者所飲之水沸而上騰也糞如羊屎者食入者少查滓消盡腸亦乾小而不寛大也此證多是男子年高五十已外得之又必其人不絶色慾潛問其由又諱疾忌醫曰近來心事不美多有鬱氣而然乎意鬱固有之或以鬱故而爲消愁解悶之事不能無也此十有八九

亦不必深辨但老人天眞已絕只有孤陽只以養陰爲主王太僕云食入卽吐是無水也食久反出是無火也無水者壯水之主無火者益火之源褚侍中云上病療下直須以六味地黃丸料大劑煎飲久服可挽於十中之一二又須絕嗜慾遠房幃薄滋味可也若曰溫胃胃本不寒若曰補胃胃復不虛若曰開鬱香燥之品適以助火局方發揮已有明訓河間劉氏下以承氣鹹寒損胃津液愈竭無如補陰燄光自滅世俗不明余特詳揭

論反胃金匱要略云趺陽脈浮而濇浮則爲虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿食不化名曰反胃予閱函史列傳有一醫案云病反胃者每食至明日中晨皆出不化醫以煖胃藥投之罔效脈甚微而弱有國工視之揆諸醫所用藥無遠於病而不效心慊然未有以悟也讀東垣書謂吐有三證氣積寒也上焦吐者從氣中焦吐者從積下焦從寒今脈沈而遲朝食暮吐暮食朝吐小便利大便祕此下焦吐也法當通其閉溫其寒乃遂躍然專治下焦散其

寒徐以中焦藥和之而愈觀此可見下焦吐者乃命門火衰鍋底無薪不能蒸腐胃中水穀腹中脹滿不得不吐也王太僕所謂食久反出是無火也是矣須用益火之原先以八味地黃丸補命門火以扶脾土之母徐以附子理中湯理中焦萬舉萬全不知出此而徒以山楂神麴平胃化食適以速其亡也

論關格者忽然而來乃暴病也大小便祕渴飲水漿少頃則吐又飲又吐脣燥眼珠微紅面赤或不赤甚者或心痛或不痛自病起粒米不思滴水不得下胃飲一杯吐出杯半數日後脈亦沉伏此寒從少陰腎經而入陰盛於下逼陽於上謂之格陽之證名曰關格關格者不得盡其命而死矣須以仲景白通湯用內經寒因熱用之法經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下咽之後冷性既除熱性始發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦寒之物於白通湯中要其氣相從可以去拒格之寒也服藥後脈漸出者生脈乍出者死陶節庵殺車槌中有回陽反本湯極妙愈後須以八味丸

常服不再發

又有一種肝火之證亦嘔而不入但所嘔者酸水或苦水或青藍水惟大小便不祕亦能作心痛此是火鬱木鬱之證木鬱則達之火鬱則發之須用茱連濃煎細細呷之再服逍遙散而愈愈後須以六味丸調理

醫門法律

臣喻昌著

關格論

關格之證自靈素以及難經仲景脈法皆深言之然無其方也後世以無成方依傍其中精言奧義總不叅研空存其名久矣間有以無師之智臨證處方傳之於書眼中金屑不適於用可奈之何謹以尚論之懷暢言其理素問謂人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上爲格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛已上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍以上爲關格關格之脉羸不能極於天地之精氣則死矣此以三陽之腑三陰之臟分診於結喉兩旁人迎之位兩手寸口太淵

之位蓋隨人迎寸口經脈之行度而施其刺法也靈樞言刺之從所分人迎之盛瀉其陽補其所合之陰二瀉一補從所分寸口之盛瀉其陰補其所合之陽二瀉一補皆以上氣和乃止至於用藥則從兩手寸關尺三部之脈辨其臟腑之陰陽故靈樞復言邪在腑則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽氣盛矣陽氣太盛則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣不能榮也故曰關陽氣太盛則陰氣不能榮也故曰格陰陽俱盛不能相榮也故曰關格關格者不能盡期而死也此則用藥之權衡隨其脈之尺陰寸陽偏盛俱盛而定治耳越人宗之發爲陰乘陽乘之脈因推其乘之之極上魚爲溢入尺爲覆形容陰陽偏而不返之象精矣至仲景復開三大法門謂寸口脈浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆從兩手寸口關陰格陽過盛中察其或浮或大定其陽虛陰實陰虛陽實以施治療蓋於靈樞陽太盛則陰不能榮陰太盛則陽不能榮以及越人陰乘陽乘

之法加以浮大之辨而虛實始得燎然不爾關則定爲陰實格則定爲陽實矣抑何從得其微細耶此一法也謂心脉洪大而長是心之本脉也上微頭小者則汗出下微本大者則關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死此則深明關格之源由於五志厥陽之火過鬱於心胞之內其心脉上微見頭小亦陽虛之驗下微見本大亦陽實之驗頭無汗者可治有汗則心之液外亡自焚而死矣在二陽之病發心脾且不得隱曲男子少精女子不月傳爲風消索澤而不治況關格之病精氣竭絶形體毀阻離絶菀結憂愁恐怒五臟空虛氣血離守厥陽之火獨行上合心神同處於方寸之內存亡之機間不容髮可不一辨察之乎此二法也謂趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格診趺陽足脉或伏或濇辨胃氣所存幾何伏則水穀入而不化胃氣之所存可知矣濇則并其食亦不得入胃氣之所存更可知矣榮衛之行遲水穀之入少中樞不運下關上格豈待言哉此三法也仲景金針暗度有此三法大槪在

顧慮其虛矣因是上下古今搜採羣言而諸大老名賢無一論及此證者惟雲岐子述其陰陽反背之狀傳其所試九方譬如航海萬里得一聲氣相通之侶欣慰無似遑計其短乎然不欲後人相安其說又不忍緘口無言也其謂陰陽易位病名關格胷膈上陽氣常在則熱爲主病身半已下陰氣常在則寒爲主病胷中有寒以熱藥治之丹田有熱以寒藥治之若胷中寒熱兼有以主客之法治之主當緩治客當急此從傷寒論胷中有寒丹田有熱立說實非關格本證所引內經運氣治主客之法亦屬無據至於靈素難經金匱之文絕不體會所定諸方渾入後人惡劣窠臼觀之殊不慊耳方中小疵雜用二陳五苓枳殼厚朴檳榔木香是也方中大疵雜用片腦麝香附子皂角牽牛大黃朴硝是也夫陰陽不交各造其偏而謂陰反在上陽反在下可乎九死一生之證而以霸術刦奪其陰陽可乎仲景之以趺陽爲診者正欲人調其榮衛不偏陰偏陽一味沖和無忤聽胃氣之自爲敷布由一九而二八三七四六乃始得協於平

也豈一蹴所能幾耶故不問其關於何而開格於何而通一惟求之於中握樞而運以漸透於上下俟其趺陽脈不伏不濇營氣前通乃加意於營衞氣前通乃加意於衞因其勢而利導之庶不與藥扞格耳若營氣纔通即求之衞衞氣纔通即求之營且爲生事喜功況躁不能需亟思一逞乎夫死裏求生之治須得死裏求生之人嗒然若喪先熄其五志交煽之火治吐逆之格由中而漸透於上治不溲之關由中而漸透於下治格而且關由中而漸透於上下所謂三年之艾不蓄則不免於死亡蓄之則免於死亡矣人亦何爲而不蓄之耶或者病余不立一方此終身不靈之人也寧無見其方而反惑耶不得已姑立進退黃連一方要未可爲中人道也

進退黃連方論

黃連湯者仲景治傷寒之方也傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之以其胃中有邪氣阻遏陰陽升降之機而不交於中土於是陰不得升而獨治於下爲下寒腹中痛陽不得降而獨治

於上爲胷中熱欲嘔吐與此湯以升降陰陽固然矣而濕家下之舌上如胎者丹田有熱胷中有寒亦用此方何耶後人牽強作解不得製方之旨又安能取裁其方耶葢傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之故有小柴胡湯之和法於人參甘草半夏生薑大棗助胃之中但加柴胡一味透表黃芩一味透裏尚恐圭角少露有礙於和於是去滓復煎漫無異同飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡出表胃氣之降者帶黃芩入裏一和而表裏之邪盡服其有未盡者加工治之不相扞格矣至於丹田胷中之邪則在於上下而不爲表裏卽變柴胡湯爲黃連湯和其上下以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑代生薑飲入胃中亦聽胃氣之上下敷布故不問上熱下寒上寒下熱皆可治之也夫表裏之邪則用柴胡黃芩上下之邪則用桂枝黃連表裏之邪則用生薑之辛以散之上下之邪則用乾薑之辣以開之仲景聖法灼然矣昌欲進退其上下之法操何術以進退之耶前論中求之於中握樞而運以漸透於上下俟其營

氣前通衞氣前通而爲進退也然而難言之矣格則吐逆進而用此方爲宜蓋太陽主開太陽不開則胷間窒塞食不得入入亦復出以桂枝爲太陽經藥和營衞而行陽道故能開之也至於五志厥陽之火上入桂枝又不可用矣用之則以火濟火頭有汗而陽脫矣其關則不得小便退之之法從胃氣以透入陰分桂枝亦在所不取但胃之關門已閉少陰主闔少陰之氣不上胃之關必不開矣昌意中尤謂少陰之脈沉而滯與趺陽之脈伏而濇均足慮也內經常兩言之曰腎氣獨沉曰腎氣不衡夫眞氣之在腎中猶權衡也有權有衡則關門時開時闔有權無衡則關門有闔無開矣小溲亦何從而出耶是則腎氣丸要亦退之之中所有事矣腎氣交於胃則關門開交於心則厥陽之火隨之下伏有不得不用之時矣進退一方於中次第若此夫豈中人所能辨哉

律四條

凡治關格病不知批郤導窾但冀止嘔利溲亟治其標伎窮力竭無益反損醫之罪也

凡治關格病不參診人迎趺陽太衝三脉獨持寸口已屬疎略若并寸口陰陽之辨懵然醫之罪也

凡治關格病不辨脉之陽虛陽實陰虛陰實而進退其治盲人適路不辨東西醫之罪也

凡治關格病不崇王道輙操霸術逞己之能促人之死醫之罪也

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六三三

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十三卷目錄

醫部彙考三百十三

噎膈反胃門二

張介賓景岳全書（關格論 論治 噎膈論證 論治 反胃論證 論治）

陳士鐸石室祕籙（噎膈反胃治法）

方（大半夏湯 小半夏湯 大黃甘草湯 茯苓澤瀉湯 五噎圓 又方 竹皮湯 乾薑湯 通氣湯 羚羊角湯 反食方 又方 又方 又方 又方 又方 華佗方 柏子仁湯 人參散 旣濟丸 檳榔益氣湯 導氣清利湯 加味麻仁丸 皂角散 香砂

寬中湯
補氣運脾湯
滋血潤腸湯
人參利膈丸
滋陰清膈飲
丁沉透膈湯
五膈寬中散
穀神嘉禾散
秦川剪紅丸
芫花丸
厚朴丸
三一承氣湯
四生丸
對金飲子
昆布丸
竹皮散
吳茱萸丸
滋血潤腸湯
人參利膈丸
進退黃連湯
滋液救焚湯
崔氏八味丸
回陽反本湯
大補元煎
左歸飲
右歸飲
左歸丸
右歸丸
五福飲
一陰煎
三陰煎
大營煎
金水六君煎
六安煎
芎藥枳朮丸
神香散
四味回陽飲
六味回陽飲
溫胃飲
五君子煎
黃芽丸
聖朮煎
豕膏
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百三十三卷

醫部彙考三百十三

噎膈反胃門二

景岳全書　臣張介賓著

關格論

關格一證在內經本言脈體以明陰陽離絕之危證也如六節臟象論始終篇禁服篇及脈度經脈等篇言之再四其重可知自秦越人三難曰上魚爲溢爲外關內格入尺爲覆爲內關外格此以尺寸言關格

已失本經之意矣又仲景曰在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆故後世自叔和東垣以來無不以此相傳而竟置關格一證於烏有矣再至丹溪則曰此證多死寒在上熱在下脈兩寸俱盛四倍以上法當吐以提其氣之橫格不必在出痰也愚謂兩寸俱盛四倍又安得爲寒在上耶且脈大如此則浮豁無根其虛可知又堪吐乎謬而又謬莫此甚矣夫內經云人迎四倍寸口四倍既非尺寸之謂而曰吐逆者特膈食一證耳曰不得小便者特癃閉一證耳二證自有本條其與關格何涉數子且然况其他乎又安望治此者之無謬哉

關格證在內經本以人迎察六腑之陽寸口察五臟之陰人迎盛至四倍已上此陽明經孤陽獨見水不濟火也故曰格陽格陽者陰格於陽也氣口盛至四倍已上此太陰經元陰無主氣不歸精也故曰關陰關陰者陽關於陰也若人迎寸口俱盛至四倍以上且大且數此其陽氣不藏故陰中無陽陰氣不升故陽中無陰陰陽相離故名關格也凡見此者總由酒

色傷腎情慾傷精以致陽不守舍故脈浮氣露亢極如此此則眞陰敗竭元海無根是誠亢龍有悔之象最危之候也

內經以人迎寸口並診關格今後世診法則但取寸口而不察人迎似於法有未盡然寸口爲脈之大會而脈見於彼未有不見於此者所以但察氣口則人迎之脈亦可概見故凡見寸口弦大至極甚至四倍已上且大且數者便是關格之脈不得誤認爲火證

余嘗診此數人察其脈則如弦如革洪大異常故云四倍察其證則脈動身亦動凡乳下之虛里臍旁之動氣無不春春然振振然與脈俱應者察其形氣則上有微喘而動作則喘甚肢體無力而寤寐多慌張謂其爲虛損則本無欬嗽失血等證謂其爲痰火則又無實邪發熱等證此關格之所以異也然惟富貴之人及形體豐肥者多有此證求其所因則無非躭嗜少艾中年酒色所致是雖與勞損證若有不同而實即勞損之別名也此老成之人所以當知愼也

本經脈度篇所云陰氣太盛則陽氣不能榮也故曰

關陽氣太盛則陰氣弗能榮也故曰格陰陽俱盛不能相榮故曰關格關格者不得盡期而死此舉脈證而兼言之也若以脈言則如前之四倍者是也若以證言則又有陰陽俱盛者以陽病極於陽分而陰病極於陰分也凡陽盛於陽者若乎當瀉而陰分見陰有不可瀉陰極於陰者若乎當補而陽分見陽又不可補若此者陽自陽而陽中無陰陰自陰而陰中無陽上下否隔兩顧弗能補之不可瀉之又不可是亦關格之證也有死而已此與眞寒假熱眞熱假寒之證大有不同學者當辨其疑似

論治

關格之脈必弦大至極夫弦者爲中虛浮大者爲陰虛此腎水大虧有陽無陰之脈也治此者宜以峻補眞陰爲主然又當察其虛中之寒熱陰中之陰陽分別處治斯盡善也

關格證凡兼陽臟者必多熱宜一陰煎左歸飲左歸丸之類主之兼陰臟者必多寒宜大營煎右歸飲右歸丸之類主之若不熱不寒臟氣本平者宜五福飲

三陰煎及大補元煎之類主之

關格證所傷根本已甚雖藥餌必不可廢如精虛者當助其精氣虛者當助其氣其有言難盡悉者宜於古今補陣諸方中擇宜用之斯固治之之法然必須遠居別室養靜澄心假以歲月斯可全愈若不避絕人事加意調理而但靠藥餌則恐一暴十寒得失相半終無濟於事也凡患此者不可不知

噎膈論證

噎膈一證必以憂愁思慮積勞積鬱或酒色過度損傷而成蓋憂思過度則氣結氣結則施化不行酒色過度則傷陰陰傷則精血枯涸氣不行則噎膈病於上精血枯涸則燥結病於下且凡人之臟氣胃司受納脾主運化而腎爲水火之宅化生之本今既食飲停隔不行或大便燥結不通豈非運化失職血脈不通之爲病乎而運行血脈之權其在上者非脾而何其在下者非腎而何矧少年少見此證而惟中衰耗傷者多有之此其爲虛爲實概可知矣故凡治此者欲舍根本而言捷徑又安望其有成功也

噎膈反胃二證丹溪謂其名雖不同病出一體若平似矣然而實有不同也蓋反胃者食猶能入入而反出故曰反胃噎膈者隔塞不通食不能下故曰噎膈食入反出者以陽虛不能化也可補可溫其治猶易食不得下者以氣結不能行也或開或助治有兩難此其輕重之有不同也且凡病反胃者多能食病噎膈者不能食故噎膈之病病於胷臆上焦而反胃之病則病於中下二焦此其見證之有不同也所以反胃之治多宜益火之源以助化功噎膈之治多宜調養心脾以舒結氣此其證候既有不同故診治亦當分類也

噎膈證多有便結不通者內經曰三陽結謂之膈張子和曰三陽者大腸小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不圊膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉濇下既不通必反上行所以噎食不下縱下而復出此陽火不下推而上行也愚按此說則大不爲然夫結之爲義內經原非言熱如本篇曰陰陽結邪多陰少陽曰石水又舉痛論曰思

則氣結是豈以結爲熱耶且熱則流通寒則凝結此自陰陽之至理故凡霜凝冰結惟寒冽有之而熱則無也此天道之顯然可見者人身陰陽之理無非是耳惟人不能知所以多誤也矧內經之言三陽結者乃止言小腸膀胱全與大腸無涉蓋三陽者太陽也手太陽小腸也足太陽膀胱也小腸屬火膀胱屬水火不化則陽氣不行而傳導失職水不化則陰氣不行而清濁不分此皆致結之由也子和不察而遂以三陽之結盡言爲熱以致後世悉傳爲火豈理也哉

然人之病結者本非一端蓋氣能結血亦能結陽能結陰亦能結余非曰結必皆寒而全無熱也但陰結陽結證自不同有不可不辨耳夫陽結者熱結也因火盛爍陰所以乾結此惟表邪傳裏及陽明實熱者乃有之然熱結者必有煩渴發熱等證洪大滑實等脈最易辨也若下有結閉而上無熱證此陰結耳安得謂之熱耶蓋陰結者正以命門無火氣不化精所以凝結於下而治節不行此惟內傷血氣敗及眞陰者乃有之卽噎膈之屬是也夫噎膈之證人皆知爲

內傷也內傷至此其臟氣之健否爲何如而猶云爲熱豈必使元陽盡去而別有生生之道乎噫此余之所不解也不得不辨

噎膈證古人多認爲寒自劉河間治膈氣噎食用三承氣湯張子和以三陽之結盡論爲熱且云人之溢食初未遽然也或傷酒食或胃熱欲吐醫者不察本原投下香桂胡椒丁香之屬設如傷酒傷食正可攻逐豈可言虛便將熱補素熱之人三陽必結食必上潮醫氏猶云胃寒不納燔鍼灼艾三陽轉結歲月彌深遂成噎膈余味此言不能無惑蓋噎膈由於枯槁本非實熱之證三承氣湯尚可用乎此河間之見有弗確也矧酒肉過多者未必遂成噎膈而噎膈之病又豈皆素熱之人乎此子和之見有未然也自後丹溪遂承二子之說而大辟局方之非謂氣之初病或飲食不謹或外冒風雨或內感七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒肝火上炎以致津液不行氣爲之病或痞或痛或噫腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求原本便認爲寒

遽以辛香燥熱之劑投之數貼時暫得快以爲神方厚味仍前不節七情反復相仍舊病被刦暫開濁液易於攢聚或半月或一月前病復作醫者不察猶執爲冷翻思前藥隨手得快顒俟久服可以溫脾壯胃消積行氣以冀一旦豁然不思胃爲水穀之海清和則能受脾爲消化之器清和則能運今反得香熱之偏助刦之而愈復作復刦延綿至久而成噎膈展轉深痼艮可哀憫此丹溪之說也使後人見之無不以爲至論卽余初年亦未嘗不加欽服而今則日見其非矣何也試觀所敘病原其有然者有不然者顧難縷指而辨也但以此證而力指爲熱能無謬乎且旣云燥熱之劑隨手得快則固非無效也夫燥熱已能奏效豈眞火證而燥熱能效乎蓋脾土惡濕故燥之可也火能生土故熱之亦可也溫燥扶陽此自脾家正治而必欲非之以致後人之疑似屬矯矣若謂厚味七情仍前不節以致愈而復作此誰之咎也而亦可歸之藥誤乎又如脾胃清和能受能運之說此實至理誰不云然但余之所謂清和者則與丹溪不同

抑又何也蓋丹溪所言者惟恐火之盛余之所言者惟恐陽之衰異同若此人將焉信請以天人之理證之何如夫天人之所同賴者惟此陽氣而已故經曰天氣清靜光明者也又曰陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以日光明由此言之則六合清和止此太陽爲之用故陽氣勝則溫煖光明而萬類咸亨非清和乎陰氣勝則風霾晦暝而升沉閉塞非不清和乎且春夏萬物之盛非陽盛之化乎秋冬萬物之衰非陽衰之兆乎人之所賴以生者亦惟此耳故人於飲食朝入口而午化盡午入胃而暮化盡此其中焦之熱亦何異大烹之鼎必如是者纔是清和是卽平人之常乃正所謂胃氣也使朝食而午不饑午食而晚不饑飲食化遲便是陽虧之候而矧乎全不能行全不能化者醫且猶云有火豈必幷此化源盡行撲滅而後可亦堪嗟矣夫天下之理本無二三而或是或非何多朱紫余每欲言未嘗不知自反但於最疑處則不得不呈其醜又安得軒岐再起以爲我一正哉嘗聞之康節先生曰欲爲天下屠龍

手背讀人間非聖書其感慨深矣豈不信然豈不信然

論治

凡治噎膈大法當以脾腎爲主蓋脾主運化而脾之大絡布於胷膈腎主津液而腎之氣化主乎二陰故上焦之噎膈其責在脾下焦之閉結其責在腎治脾者宜從溫養治腎者宜從滋潤舍此二法他無捷徑矣然泰交之道天居地下故必三陽出土而後萬物由之可見脾土之母由下而升褚侍中曰外病療內上病救下辨病臟之虛實通病臟之子母斯言得矣不可忽也

治噎膈之法凡氣血俱虛者宐五福飲及十全大補湯脾虛於上者宜四君子湯脾虛兼寒者宜五君子煎脾肺營虛血燥者宜生薑汁煎陰虛於下者宜左歸飲大營煎陰中之陽虛者宐右歸飲加當歸或右歸丸八味地黃丸之類皆治本之法也

噎膈初起微虛者宜溫胃飲加當歸厚朴如果痰氣不清上焦多滯者宐二陳湯加厚朴或六安煎亦可

如氣有不順或兼胷腹微痛者宜加減二陳湯暫解之凡初覺飲食微有不行而年不甚衰者宜速用大健脾丸或木香人參生薑枳术丸以調脾氣爲上策或芍藥枳术丸亦可

噎膈便結者但察其無火無滯而止因血燥陰虛者宜五福飲或大營煎加酒洗肉蓯蓉二三錢同煎服或以豕膏漸潤其下而以調脾等劑治其上最爲良法或多服牛羊乳酥之類以滋其精液使之漸潤毋欲速也如果氣血未至甚損而下焦脹閉之甚者則不得不爲暫通輕則玉燭散人參利膈丸或搜風順氣丸甚則大黃甘草湯酌宜用之

用溫補以治噎膈人必疑其壅滯而且嫌迂緩不知中氣敗證此其爲甚使非速救根本則脾氣何由再健設用溫補而噎塞愈甚則不得不曲爲加減然必須千方百計務從元氣中酌其所宜庶可保全也若用補之後雖或未見功效但得全無窒礙便是藥病相投且此病最不易治既能受補必須多服方得漸效以收全功不可性急致疑一暴十寒以自悞也若

急圖目前之快但使行滯開胃而妄用大黃芒硝三稜莪朮苦蔞桃仁滾痰丸之屬非惟不能見效必致胃氣日敗萬無生理矣此徒速其亡不可不省也

諸家治噎古法用人參黃芪以補元氣御米粟米以解毒實胃竹瀝以淸痰散結乾薑以溫中生薑以去穢牛羊乳以養血潤液蜜汁當歸以潤燥用此數者爲主治其餘因證而增減之俱是良法凡肥胖之人鮮有噎證間或有之宜用二陳加人參白朮之類血虛瘦弱之人用四物合二陳加桃仁紅花韭汁童便牛羊乳之類七情鬱結而成噎膈者二陳合香附撫芎木香檳榔苦蔞砂仁之類飲酒人患噎膈以二陳加黃連砂仁砂糖之類胷膈有熱者加黃連黃芩桔梗苦蔞之類脾不磨者加神麯砂仁麥芽之類以助消導噎膈大便燥結之甚者必用大黃或用二陳湯加酒蒸大黃桃仁以潤之乃急則治標之法也或用四物湯加桃仁童便韭汁多飲牛羊乳爲上策按古人治噎之法大略已盡於此雖其中有宜有不宜者亦幷錄之以備採擇

凡年高患此者多不可治以血氣虛敗故也糞如羊矢者不可治大腸無血也吐痰如蟹沫者不可治脾氣敗也腹中疼痛嘈雜如刀割者不可治營虛之極血竭於中也

反胃論證

反胃一證本屬火虛蓋食入於胃使果胃煖脾強則食無不化何至復出今諸家之論有謂其有痰者有謂其有熱者不知痰飲之留正因胃虛而完穀復出豈猶有熱觀王太僕曰內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也此一言者誠盡之矣然無火之由則猶有上中下三焦之辨又當察也若寒在上焦則多爲惡心或泛泛欲吐者此胃脘之陽虛也若寒在中焦則食入不化每食至中脘或少頃或半日復出者此胃中之陽虛也若寒在下焦則朝食暮吐或暮食朝吐乃以食入幽門丙火不能傳化故久而復出此命門之陽虛也故凡治此者使不知病本所在混行猜摸而妄期奏效所以難也

論治

治反胃之法當辨其新久及所致之因或以酷飮無度傷於酒濕或以縱食生冷敗其眞陽或因七情憂鬱竭其中氣總之無非內傷之甚致損胃氣而然故凡治此者必宜以扶助正氣健脾養胃爲主但新病者胃氣猶未盡壞若果飮食未消則當兼去其滯若有逆氣未調則當兼解其鬱若病稍久或氣體稟弱之輩則當專用溫補不可標本雜進妄行峻利開導消食化痰等劑以致重傷胃氣必致不起也

虛在上焦微寒嘔惡者惟薑湯爲最佳或橘皮湯亦可若氣虛爲寒所侵而惡心嘔食者宜黃芽丸或橘皮乾薑湯之類主之若寒痰勝者宜小半夏湯或大半夏湯之類主之

虛在中焦而食久反出者宜五君子煎理中湯溫胃飮聖朮煎之類主之若胃虛甚者宜四味回陽飮或黃芽丸主之若兼寒痰者宜六君子湯或理中化痰丸之類主之或水泛爲痰者宜金水六君煎主之若胃不甚寒而微虛兼滯者宜五味異功散主之

虛在下焦而朝食暮吐或食入久而反出者其責在

陰非補命門以扶脾土之母則火無以化土無以生亦猶釜底無薪不能腐熟水穀終無濟也宜六味回陽飲或人參附子理陰煎或右歸飲之類主之此屢用之妙法不可忽也

反胃初起而氣體强壯者乃可先從清理如二陳湯橘皮半夏湯之類皆可清痰順氣平胃散不換金正氣散五苓散之類皆可去濕去滯半夏乾薑散仲景吳茱萸湯橘皮湯之類皆可去寒然此惟眞有邪滯乃可用之若病稍久而胃氣涉虛者則非所宜

反胃證多有大便閉結者此其上出固因下之不通也然下之不通又何非上氣之不化乎蓋脾胃氣虛然後治節不行而無以生血血涸於下所以結閉不行此眞陰枯槁證也必使血氣漸充臟腑漸潤方是救本之治若徒爲目前計而推之逐之則雖見暫通而眞陰愈竭矣故治此之法但見其陰虛兼寒者宜以補陽爲主而大加當歸肉蓯蓉韭汁薑汁之屬陰虛兼熱者宜以補陰爲主而加乳汁童便酥油蜂蜜豕膏諸血之屬然此等證治取效最難萬勿欲速非

加以旬月功夫安心調理不能愈也其有糞如羊矢或年高病此者尤爲難治

反胃由於酒濕傷脾者宜葛花解酲湯主之若濕多成熱而見胃火上衝者宜黃芩湯或半夏瀉心湯之類主之

石室祕籙 臣陳士鐸著

噎膈反胃治法

反胃證初起之時未嘗非胃病也當時以逍遙散加黃連一錢立止無如世醫不知治法乃用香砂厚朴枳殼砂仁之類紛投之不應又改用大黃巴豆之類下之又不應改用黃連黃蘗黃芩梔子知母大寒之品以涼之又不應改用桂枝白果肉桂附子乾薑吳茱萸之類以熱之又不應始用柴胡荊芥桔梗防風蘇子之類以散之遂成噎膈之證矣吾今傳一方用熟地一兩山茱萸四錢麥冬三錢北五味元參當歸白芥子各一錢牛膝二錢水煎服此方之妙全在不治反胃正所以治反胃也蓋人反胃乃是腎中陰水竭也腎水不足則大腸細小水不足以潤之故腸細

而乾涸腸既細小則飲食入胃不能下行必反而上吐治之之法不可治上宜治下方用熟地山茱萸之類純是補腎中之水也腎水足而大腸有水相資則大腸仍復寬轉可以容物水路既寬則舟楫無礙大舸小船可以順行又何懼區區小舟不可以轉運糧食哉此腎中虛而水不足以潤大腸者宜如是治法若腎中寒涼而虛者又不如是治也蓋反胃之名雖同反胃之實各異腎中無水而反胃者食下喉即吐腎中無火而反胃者食久而始吐也譬如今日食之明日始盡將今日之物吐出也方用熟地一兩山茱萸四錢麥冬三錢山藥茯苓各二錢北五味丹皮澤瀉牛膝附子肉桂各一錢水煎服此方八味丸湯也妙在用附子肉桂於補腎水之中使去水中補火補火者補命門之火也蓋脾胃之氣必得命門之火始生譬如釜下無火何以煑爨未免水冷金寒結成冰凍必得一陽初復之氣始解人身脾胃亦然然而寒涼之病止該腹痛心疼今反無此證乃上越而吐者何也蓋脾胃有出路則寒邪之氣不留於中今日日

上吐將胃口咽門已成大道熟徑往來無所阻滯則徑情趨奔其勢甚便又何必積畜於中州盤踞於心腹發寒作熱以苦楚此脾胃哉此反胃下寒心腹之所以不痛也此又不治反胃而適所以治反胃此變法治病之端也

有食入而卽出者此腎水虛不能潤喉故喉燥而卽出也有食久而反出者此腎火虛不能溫脾故脾寒而反出也治反胃者但當治腎但當辨其有火無火之異則死證可變爲生也治反胃之證莫妙用仲景地黃湯但無火者加附子肉桂則效驗如響然人亦有用仲景方而不驗者何也以用之不得其法而非方之不神也今酌定二方一治無火而反胃者熟地二兩山茱萸一兩附子茯苓澤瀉丹皮肉桂各三錢山藥一錢水煎服一治有火而反胃者熟地二兩山藥一兩澤瀉丹皮各三錢茯苓麥冬山茱萸各五錢北五味二錢水煎服二方出入加減自然治反胃有神功也

反胃之證雖一時不能遽死然治之不得其宜亦必

死而後已反胃多是腎虛無火故今日食之至明日盡吐即內經所謂食入即出者是也夫食入於胃而吐出似乎病在胃也誰知胃爲腎之關門腎病而胃始病飲食之入於胃必得腎水以相濟而咽喉有水道之通始上可輸挽下易運化然而腎中有火則釜底無薪又何以蒸水穀乎此腎寒而脾亦寒脾寒不能化必上湧於胃而胃不肯受則湧而上吐矣方用定胃湯熟地三兩山茱萸二兩肉桂茯苓各三錢水煎服一劑而吐止十劑而病全愈然此治朝入暮吐暮服朝吐者也倘食下即吐又不可用肉桂加麥冬一兩北五味子一錢亦未嘗不效應如響蓋二方全是大補腎中之水火而不去治胃勝於治胃也

方

大半夏湯（仲景下同）

治胃反嘔吐

半夏二升洗　人參三兩　白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十徧煑藥取二升半溫服一升餘分再服

小半夏湯

治嘔吐穀不得下者

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煑取一升半分溫再服

大黃甘草湯

治食已卽吐者

大黃四兩　甘草一兩

右二味以水三升煑取一升分溫再服

茯苓澤瀉湯

治胃反而渴欲飲水者

茯苓半斤　澤瀉　生薑各四兩　白朮三兩

桂枝　甘草各二兩

右六味以水一升煑取三升內澤瀉再煑取二升半溫服八合日三服

五噎圓（千金方下同）

治胷中久寒嘔逆逆氣飲食不下結氣不消

乾薑　蜀椒　食茱萸　桂心　人參各五分

細辛　白朮　茯苓　附子各四分　橘皮六分

右十味爲末蜜和丸如梧子大以酒服三丸日三不止稍加至十丸

又方

治五種之氣皆令人噎

人參　半夏　桂心　防風（一作防葵）　小草　附子

細辛　甘草各二兩　紫菀　乾薑　食茱萸

芍藥　烏頭各六分　枳實

右十四味爲末蜜丸梧子大酒服五丸日三不止加至十五丸烏頭與半夏相反但去一味合之

竹皮湯

治噎聲不出

竹皮（一作竹葉）　細辛各二兩　甘草　生薑　通草

人參　茯苓　麻黃　五味　桂心各一兩

右十味㕮咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下藥煮取三升分三服

乾薑湯

治飲食輒噎集驗名半夏湯

乾薑　石膏各四兩　半夏　小麥各一升

人參　桂心　苦蔞根各二兩　甘草一兩

吳茱萸二升　赤小豆三十粒

右十味㕮咀以酒五升水一斗煮棗二十枚去滓

合煑取三升分三服

通氣湯

治胷滿氣噎

半夏八兩　生薑六兩　桂心三兩　大棗三十枚

右四味㕮咀以水八升煑取三升分五服日三夜二

羚羊角湯

治氣噎不通不得食

羚羊角　通草　橘皮各二兩　厚朴　吳茱萸

乾薑各三兩　烏頭五枚

右七味㕮咀以水九升煑取三升分三服日三

反食方

治胃虛反食下喉便吐

人參一兩　澤瀉　甘草　桂心各二兩　橘皮

乾薑各三兩　茯苓四兩　大黃六兩　竹茹五兩

右九味㕮咀以水八升煑取三升一服七合日三夜一已利者去大黃

又方

治反胃而渴

茯苓　澤瀉　半夏各四兩　桂心　甘草各二兩

右五味㕮咀以水五升煑取二升分三服一方入生薑四兩

又方

治胃反吐逆不消食吐不止

人參　澤瀉　桂心各二兩　茯苓四兩　橘皮

甘草　黃芪各三兩　大黃一兩半　生薑八兩

半夏一升　麥門冬三升

右十一味㕮咀以水一斗二升煑取三升二合一服八合日三夜一羸人六合已利去大黃

又方

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷

橘皮三兩　甘草　厚朴　茯苓　桂心　細辛

杏仁　竹皮各二兩　檳榔十枚　前胡八兩

生薑五兩　人參一兩

右十二味㕮咀以水一斗三升煑取三升分三服一方有甘皮二兩

又方

橘皮三兩　白朮　人參各二兩　桂心一兩

蜀椒一百二十粒　薤白一握

右六味㕮咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以三升水煮水盡出之決破去滓分三服

又方

治反胃大驗

前胡　生薑各四兩　阿膠一兩　大麻仁五合

橘皮三兩　桂心三寸　甘草五寸　大棗十枚

吳茱萸四合

右九味㕮咀以水三升酒二升煮取一升七合分二服

華佗方

治胃反胃反爲病朝食暮吐心下堅如杯升往來寒熱四逆不下食此爲關上寒澼所作將成肺痿

眞珠　明雄黃　丹砂各三兩　朴硝五兩

乾薑十累

右五味爲末蜜丸如梧子先食服三丸若小煩者

飲水自解然無所忌神良無比一方用桂心一兩

柏子仁湯

人參　半夏　白茯苓　陳皮　麝香少許另研

柏子仁　甘草炙

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參　麝香　片腦各少許

右末甘草湯調服

既濟丸（會編下同）

治關格脈沉細手足厥冷者

熟附子童便浸　人參各一錢　麝香少許

糊丸如桐子大麝香爲衣每服七丸燈心湯下

檳榔益氣湯

治關格勞後氣虛不運者

檳榔多用　人參　白朮　當歸　黃芪　陳皮

升麻　甘草　柴胡　枳殼

右生薑煎服

導氣淸利湯

治關格吐逆大小便不通

猪苓　澤瀉　白术　人參　藿香　柏子仁

半夏薑製　陳皮　白茯苓　甘草　厚朴薑製

梔子　黑牽牛　檳榔　枳殼　大黃　木通

麝香少許

右生薑煎服木香和中丸吐不止灸氣海天樞如又不通用蜜導

加味麻仁丸

治關格大小便不通

大黃一兩　白芍藥　厚朴薑汁炒　當歸

杏仁去皮尖雙仁者　麻仁　檳榔　南木香

枳殼各五錢　麝香少許

右爲末蜜丸熟水下

皂角散

治大小便關格不通經三五日者

大皂角燒存性

右爲末米湯調下又以猪脂一兩煑熟以汁及脂俱食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心

草茶根

香砂寬中湯（統旨下同）

治氣滯胷痞噎塞或胃寒作痛者

木香水磨二匙　白朮　陳皮　香附各一錢半

白荳蔲去殼　砂仁　青皮　檳榔　半夏麯

茯苓各一錢　甘草三分　厚朴薑製一錢二分

水二鍾薑三片煎八分入蜜一匙食前服

補氣運脾湯

治中氣不運噎塞

人參二錢　白朮三錢　橘紅　茯苓各一錢半

砂仁八分　甘草炙四分　黃芪蜜炙一錢

水二鍾薑一片棗一枚煎八分食遠服有痰加半

夏麯一錢

滋血潤腸湯

治血枯及死血在膈飲食不下大便燥結

當歸酒洗三錢　芍藥煨　生地黃各一錢半

紅花酒洗　桃仁泡去皮尖炒　大黃酒煨

枳殼麩炒各一錢

水一鍾半煎七分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸（寶鑑）

治胷中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香　檳榔各七錢半　人參　當歸酒洗
藿香　甘草　枳實麩炒黃各一兩　厚朴薑製
大黃酒蒸各二兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服三五十丸食後諸飲下

滋陰清膈飲（統旨）

治陰火上衝或胃火大盛食不入脈洪數者

當歸　芍藥煨　黃蘗鹽水炒　黃連各一錢半
黃芩　山梔　生地黃各一錢　甘草三分

水二鍾煎七分入童便竹瀝各半酒盞食前服

丁沉透膈湯（和劑下同）

治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治之

香附炒　縮砂仁　人參各一兩　丁香　麥蘖

木香　肉豆蔻　白豆蔻　青皮各半兩　沉香
厚朴薑製　藿香　陳皮各七錢半　白朮二兩
甘草炙一兩半　神麴炒　半夏　草果各二錢半

每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時熱服

五膈寬中散

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胷膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并治一切冷氣

白豆蔻去皮二兩　甘草炙五兩　木香三兩
厚朴去皮薑汁炙熟　香附子炒各一斤　丁香
縮砂仁　青皮去白　陳皮去白各四兩

右爲末每服二錢薑三片鹽少許不拘時沸湯下

穀神嘉禾散

治脾胃不和胷膈痞悶氣逆生痰不進飲食或五噎五膈

白朮炒二兩　茯苓　縮砂仁　薏仁炒　人參
枇杷葉去毛薑汁炙各一兩　桑皮炒　檳榔炒
白豆蔻炒　青皮　穀蘖炒　五味子炒各半兩

沉香　丁香　藿香　木香　杜仲薑汁酒塗炙
隨風子　石斛酒炒　半夏薑汁搗和作餅炙黃
大腹子炒各七錢半　甘草炙兩半　陳皮去白
神麴炒各二錢半

每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分不拘時溫服五噎入乾柹一枚膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚

秦川剪紅丸（良方）

治膈氣成翻胃服此吐出瘀血及下蟲而效

雄黃別研　木香各五錢　檳榔　貫仲去毛
蓬朮煨　三稜煨　乾漆炒烟盡　陳皮各一兩
大黃一兩半

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

芫花丸（本事）

芫花酢炒一兩　牛膝　狼牙根　桔梗炒黃
藜蘆炒　檳榔各半兩　巴豆十粒炒黑

右爲細末酢糊爲丸如赤豆大每服二三丸加至

五七丸食前生薑湯下此方常服化痰消堅殺蟲

厚朴丸

治翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

厚朴　蜀椒去目微炒　川烏炮去皮各一兩半

紫菀　吳茱萸洗　菖蒲　柴胡　桔梗　茯苓

官桂　皂角去皮弦炙　乾薑炮　人參各二兩

黃連二兩半　巴豆霜半兩

右爲細末入巴豆霜勻煉蜜爲劑旋旋丸如桐子大每服三丸漸次加至五七丸以利爲度生薑湯下食後而臥此藥治效與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大效

春夏加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩

三一承氣湯（子和下同）

當歸酒洗焙二錢半　北大黃去粗皮　芒硝

厚朴薑製　枳實生各半兩　甘草去皮炙一兩

右㕮咀每服半兩水盞半生薑五片棗二枚擘開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者每服一兩加薑二片棗一枚若不納藥須時時呷服之以通

爲度雖爲下藥有泄有補卓有奇效劉河間又加甘草以爲三一承氣以甘和其中最得仲景之祕

四生丸

治一切結熱常服肢體潤澤耐老

生芒硝半兩　大黃去皮酒洗紙包煨香不可過　黑牽牛頭末　皂角去皮生用各一兩

右爲末滴水爲丸梧桐子大每服二三十丸白湯送下

對金飲子

陳皮焙製八兩　蒼朮焙　厚朴薑汁炒各四兩　人參　黃芪各一兩　黃芩二兩半　甘草三兩

右㕮咀每服半兩水盞半生薑五片棗二枚同煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服四生丸如已效進食不格拒方用對金飲子然初病作且嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其虛實重輕方用前藥更佳

昆布丸（良方下同）

治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布洗去鹹水　麥冬去心焙　天冬去心焙
訶黎勒去核各一兩半　木通　川大黃微炒
川朴硝　郁李仁湯浸去皮微炒　肉桂去皮
百合各一兩　羚羊角屑　紫蘇子　射干
杏仁湯浸去皮尖麩炒黃各半兩　柴胡去蘆
陳皮湯浸去白　檳榔各二錢半

右爲細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時熱酒送下夜飯後用緜裹彈子大一丸噙化

竹皮散

治噎聲不出

竹皮（一作竹葉）　細辛　通草　人參　五味　茯苓
麻黃　桂心　生薑　甘草各一兩

右㕮咀以水一斗煑竹皮下藥煑取三升分三服

吳茱萸丸（東垣）

大理脾胃胷膈不通調中順氣

吳茱萸　草豆蔻各一錢二分　橘皮　益智仁
人參　黃芪　升麻各八分　白殭蠶　澤瀉

薑黃　柴胡各四分　當歸身　甘草炙各六分
木香二分　青皮三分　大麥蘗一錢五分
半夏一錢
右爲細末用湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸細嚼白湯送下

滋血潤腸湯

治血枯及死血在膈大便燥結

當歸酒洗三錢　芍藥煨　生地黃各一錢五分
紅花酒洗　桃仁去皮尖炒黃　大黃酒煨
枳殼炒各一錢
水鍾半煎七分入韭汁半酒鍾食前服

人參利膈丸

治血少便燥膈氣之聖藥也

木香　檳榔各七錢半　人參　藿香　枳實炒
當歸酒洗　生甘草各一兩　大黃酒蒸透
厚朴薑汁製各二兩
右爲末水丸桐子大每服三錢白湯下

進退黃連湯（喻昌下同）

治關格

人參人乳拌蒸　半夏薑汁製各一錢五分

桂枝一錢　大棗二枚　黃連薑汁炒　乾薑炮

進法用本方七味俱不製水三茶鍾煎一半溫服

退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同但空心朝服崔氏八味丸三錢半饑服煎劑耳

滋液救焚湯

治五志厥陽之火

生地黃　麥門冬各二錢並取汁　胡麻仁炒研

炙甘草　眞阿膠　紫石英敲碎　寒水石敲碎

滑石敲碎各一錢　柏子仁炒七分　五味四分

生犀三分研汁　生薑汁二茶匙

右除四汁及阿膠共八物用名山泉水四茶杯緩火煎至一杯半去滓入四汁及阿膠再上火略煎至膠烊化斟出調牛黃細末五釐日中分二三次熱服空心先服崔氏八味丸三錢

崔氏八味丸

乾地黃八兩　山茱萸　薯蕷各四兩　茯苓

澤瀉　牡丹皮各三兩　桂枝　附子炮各一兩

右八味末之煉蜜丸梧子大酒下十五丸日再

回陽反本湯（節菴）

治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤欲坐臥於泥水井中脈來無力或脈全無欲絕者

熟附子　乾薑　甘草　人參　陳皮　麥門冬

五味子　臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙冷服取汗爲效

大補元煎（景岳全書下同）

治氣血大壞危劇等證

人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢

山茱萸一錢（如畏酸吞酸者去之）　山藥炒　杜仲各二錢

熟地少則二三錢多則二三兩　當歸（若泄瀉者去之）

枸杞各二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

凡命門之陰衰陽盛者宜此

熟地二三錢或加至一二兩　茯苓一錢半

山藥　枸杞各二錢　山茱萸一二錢（畏酸者少用）

炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

凡命門之陽衰陰盛者宜此

熟地用如前　山藥　枸杞　杜仲薑製各二錢

製附子一二三錢　山茱萸一錢　炙甘草

肉桂各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治眞陰不足精髓內虧津液枯涸等證

大懷熟地八兩　川牛膝酒洗蒸熟三兩（精滑者不用）

山藥炒　山茱萸肉　鹿膠敲碎炒珠　枸杞

菟絲子製　龜膠切碎炒珠各四兩（無火者不必用）

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治元陽不足命門火衰而爲翻胃噎膈等證

大懷熟地八兩　山茱萸微炒　當歸各三兩（便溏勿用）

製附子自二兩漸可加至五六兩　枸杞子微炒

鹿角膠炒珠　菟絲子製　杜仲薑汁炒斷絲

山藥炒各四兩　肉桂二兩漸可加至四兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

五福飲

治五臟氣血虧損者

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　炙草一錢

白术炒一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

一陰煎

治陰虧而脈證多陽虛火發熱動血等證

熟地三五錢　牛膝一錢半　甘草一錢　生地

芍藥　麥冬　丹參各二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

三陰煎

治肝脾虛損精血不足等證

人參隨宜　當歸二三錢　熟地三五錢　棗仁

芍藥酒炒各二錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

大營煎

治眞陰虧損氣血虛寒等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞

杜仲各二錢　牛膝一錢半　桂　炙草各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或陰虛血氣不足等證

熟地三五錢　陳皮一錢半　炙甘草一錢

當歸　半夏　茯苓各二錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

六安煎

治痰滯氣逆等證

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草

杏仁去皮尖各一錢　白芥子五七分（老年氣弱者不用）

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

芍藥枳朮丸

治食積痞滿等證

白朮麪炒　赤芍藥酒炒各二兩　枳實麪炒

陳皮各一兩

荷葉湯煑黃老米粥爲丸桐子大米飲或滾白湯

任下百餘丸

神香散

治逆氣痰飲膈噎諸藥不效者

丁香　白豆蔻（或砂仁亦可）

二味等分爲末淸湯調下五七分甚者一錢日數

服不拘

四味回陽飲

治元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩　炙甘草一二錢　附子炮去皮臍

炮乾薑各二三錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治陰陽將脫等證

人參一二兩或數錢　炙甘草一錢　製附子

炮乾薑各二三錢　當歸身三錢（如泄瀉或血動者以冬朮代）

熟地五錢或一兩

水二鍾武火煎七八分溫服

溫胃飲

治中寒食入反出噎膈等證

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　乾薑炒焦一二三錢　炙甘草

陳皮各一錢（或不用）　當歸一二錢（滑泄者勿用）

水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

治前證

人參二三錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢

白朮　茯苓各二錢

水一鍾半煎服

黃芽丸

治前證

人參二兩　焦乾薑三錢

右煉白蜜爲丸芡實大常嚼服之

聖术煎

治寒濕反胃

陳皮酌用　冬术炒五六錢或一二兩　肉桂

乾薑炒各一二錢

水一鍾半煎七分溫熱服

豕膏

治噎膈

當歸半斤濃煎取汁　猪脂煉過一斤

右二味同煉去其水氣乃入白蜜一斤再煉少頃濾淨收貯不時挑服用治老人之祕結及噎膈閉結等證必妙如果陽氣不行者仍加生薑四兩同當歸煎入或宜酒者以酒送服亦可或氣有不利者加杏仁二兩去皮尖同前煎入皆妙或有滯者當以餳代蜜更妙是卽內經所謂以辛潤之也

單方

凡男婦翻胃吐食白堊土煆赤以米酢一升淬之再煆再淬酢乾爲度取一兩研乾薑二錢半炮爲末每服一錢調下服至一斤以上爲妙（千金）

又反胃轉食用地龍屎一兩木香三錢大黃七錢爲末每服五錢無根水調服忌煎煿酒酢椒薑熱物其效如神（經驗方）

又方取螺螄一斗水浸取泥曬乾每服一錢火酒調下

又方取竈中土五年久者爲末米飲服三錢經驗

反胃吐食用梁上倒掛塵黑驢尿調服之（集簡方）

反胃噦逆黑鉛化汁以柳木槌研成粉一兩入米酢一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許搗丸菉豆大每服一丸薑湯下（聖濟下同）

多年反胃不止紫背鉛二兩燒鉛以鹽鹵汁五兩焠盡與石亭脂二兩同炒焰起挑木於上焰止研勻蒸餅丸梧子大每服二十丸煎石蓮乾柿湯下

吐逆不止宜用碧霞丹用北黃丹四兩米酢半升煎乾炭火三秤就銚內煅紅冷定爲末粟米飯丸梧子大每服七丸酢湯下（集驗方）

胃虛反胃氣逆鉛丹二兩白礬二兩生熟亭脂半兩以丹礬研勻入坩鍋內以炭半升煅赤更養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和丸菉豆大每日米飲下十五丸（聖濟下同）

反胃吐食水不能停黑鉛水銀各一錢半結砂舶硫黃五錢官桂一錢爲末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服

脾痛反胃靈砂一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒爲末自然薑汁煮半夏粉糊丸梧子大每薑湯下二十丸（普濟）

反胃吐食雄黃一分甘草生半分爲末飯丸梧子大以五葉草糯米煎湯每服四丸（聖濟）

反胃吐食絕好赤石脂爲末蜜丸梧子大每空腹薑湯下一二十丸先以巴豆仁一枚勿令破以津吞之後乃服藥（聖惠）

痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停赤石脂散主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下利補五臟令人肥健有人痰飲服諸藥不效服此遂愈（千金翼）

噎膈反胃用北庭砂二錢水和蕎麥麪包之煅焦待冷取中間濕者焙乾一宿入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七釐燒酒送下日三服愈卽止後喫白粥半月仍服助胃丸藥

又方以北庭砂一兩人言末一兩同入罐內文武火升三炷取出燈琖上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升之取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈卽止

又方用平胃散各一錢入硇砂生薑各五分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗

反胃嘔吐白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分爲末麪糊丸小豆大每薑湯下十五丸

又方白礬枯三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸（普濟）

反胃吐食白麪二斤半蒸作大饅頭一箇頭上開口剜空將皂礬塡滿以新瓦圍住鹽泥封固穵土窖安放文武火燒一日夜取出研末棗肉爲丸梧子大每服二十丸空心酒湯任下忌酒色（摘要）

飲食入口卽吐困弱無力垂死者上黨人參三大兩拍破水一大升煑取四合熱服日二兼以人參汁入粟米雞子白薤白煑粥與啜李眞方司勳於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日

遂入京師絳每與名醫論此藥難可爲儔也（兵部手集）

食入即吐用人參一兩半夏五錢生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取三升入白蜜三合煑一升半分服（金匱方）

噎食膈氣馬蹄香四兩爲末好酒三升熬膏每服二匙好酒調下日三服

血風反胃香白芷一兩切片瓦炒黃爲末用猪血七片沸湯泡七次蘸末食之日一次（婦人良方）

反胃惡心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分爲末每服一錢沸湯點服（聖濟）

噎膈拒食端午採頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分爲末無灰酒一琖隔湯頓熱徐嚥初服三分次日四分三日五分（簡便方）

反胃吐食火炊草焙爲末蜜丸梧子大白湯下五十丸（一百一）

反胃上氣蘆根茅根各二兩水四升煑二升分服（千金）

食已即吐胷中有火也大黃一兩甘草二錢半水一升煑半升溫服（玉函）

膈氣哽噎甘遂麪煨五錢南木香一錢爲末壯者一錢弱者五分水酒調下（怪病奇方）

久冷反胃大附子一箇生薑一斤剉細同煑研如麪糊每米飲化服一錢（奇效良方下同）

又方用薑汁打糊和附子末爲丸大黃爲衣每溫水服十丸

又方用長大附子一箇坐於磚上四面著火漸逼以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半椀乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或以猪腰子切片炙熟蘸食

又方用大附子一箇切下頭子剜一竅安丁香四十九箇在內仍合定線紮入砂銚內以薑汁浸過文火熬乾爲末每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷

反胃吐食王瓜燈上燒存性爲末一錢入好棗肉平胃散末二錢酒服食即可下即野甜瓜北方多有之（丹溪纂要）

噎塞膈氣威靈仙一把酢蜜各半琖煎五分服之吐

出宿痰愈（經驗方）

治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服

治氣膈噎食用隔山消二兩雞肫皮一兩牛膝南星朱砂各一兩急性子二錢爲末煉蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

噎食用蕎麥稭燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢研末每酒服五分（海上方）

噎食不下赤稻細梢燒灰滾湯隔絹淋汁三次取汁入丁香一枚白豆蔻半枚米一盞煮粥食神效（摘元方）

反胃吐食鸎粟粥用白鸎粟米三合人參末三大錢山芋五寸細切研三物以水二升三合煮取六合入生薑汁及鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨未服湯丸（圖經）

反胃膈氣不下食者大倉散用倉米或白米日西時以水微拌濕自想日氣如在米中次日曬乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之卽時便下也

又方陳倉米炊飯焙研每五兩入沉香末半兩和勻

每米飲服二三錢（普濟）

反胃嘔吐不止用乾餳糖六兩生薑四兩二味同搗作餅或焙或曬入炙甘草末二兩鹽少許點湯服之常熟一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一杯與之飲罷便覺胷快次早入寺供湯者乃夢中所見僧常以此湯待賓故易名甘露湯能利胷膈養脾胃進飲食

膈氣噎塞飲食不下用碓嘴上細糠蜜丸彈子大時時含嚥津液（聖惠）

反胃吐食芥子末酒服方寸匕日三服（千金）

反胃噎疾蘿蔔蜜煎浸油細嚼嚥良（普濟下同）

反胃羸弱用母薑二斤搗汁作粥食

又方用生薑切片麻油煎過爲末軟柹蘸末嚼嚥

反胃欬噫生薑四兩搗爛入蘭香葉一兩椒末一錢鹽和麪四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過兩三度效

反胃入甘蔗汁和之

反胃吐食松節煎酒細飲之（百一）

反胃吐食大棗一枚去核用盤蝥一枚去頭翅入在

內煨熟去螢空心食之白湯下良

反胃嘔噦乾棗葉一兩藿香半兩丁香二錢半每服二錢薑三片水一盞煎服（聖惠）

反胃轉食藥物不下用大雪梨一箇以丁香十五粒刺入梨內濕紙包四五重煨熟食之（總錄）

反胃吐食棠梨葉油炒去刺爲末每旦酒服一錢（山居四要）

反胃吐食乾柿三枚連蔕擣爛酒服甚效切勿以他藥雜之

反胃吐食眞橘皮以日照西壁土炒香爲末每服二錢生薑三片棗肉二枚水二鍾煎一鍾溫服（直指方）

反胃嘔噦枇杷葉去毛炙丁香各一兩人參二兩每服三錢水一盞薑三片煎服（聖惠）

反胃吐食用胡椒酢浸日乾如此七次爲末酒糊丸梧子大每服三四十丸酢湯下

又方用胡椒七錢半煨薑一兩水煎分二服

又方用胡椒半夏湯泡等分爲末薑汁和丸梧子大每薑湯下三十丸

噎食不納華澄茄白豆蔻等分爲末乾舐之（壽域神方）

反胃吐食吐出黑汁治不愈者用華澄茄爲末米糊丸梧子大每薑湯下三四十丸日一服愈後服平胃散三百貼（永類鈐方）

反胃吐食用甘蔗汁七升生薑汁一升和勻日日細呷之（梅師方）

一切反胃虎脂半斤切淸油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘥爲度油盡再添（壽域神方）

反胃吐食取虎肚生者勿洗存查穢新瓦固煅存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效（保壽堂方）

噎食取鵰烏未生毛者一對用黃泥固濟煅存性爲末每用一匙以溫酒服（壽域神方）

胃熱吐食淸膈散用蟬蛻五十箇去泥滑石一兩爲末每服二錢水一琖入蜜調服（家寶方）

反胃吐食用黃蜆殼幷田螺殼並取久在泥中者各等分炒成白灰每二兩入白梅肉四箇搗和爲丸再入砂盒子內蓋定泥固煅存性研細末每服二錢用

人參縮砂湯調下不然用陳米飲調服亦可凡覺心腹脹痛將發反胃卽以此藥治之（百一）

反胃膈氣壁虎七箇砂鍋炒焦木香人參朱砂各一錢半乳香一錢爲末蜜丸梧子大每服七丸木香湯下早晚各一服（摘元方）

反胃吐食猬皮燒灰酒服或煑汁或五味淹炙食（普濟）

反胃吐食用大鯽魚一尾去腸留鱗入綠礬末令滿泥固煅存性研末每米飲服一錢日二（本事）

膈氣吐食用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片塡滿紙包十重泥封曬半乾炭火煨熟去皮取肉和平胃散末一兩杵丸梧子大密收每服三十丸米飲下（經驗）

反胃吐食石蓮肉爲末入少肉豆蔻末米湯調服之（直指）

反胃吐食用母丁香一兩爲末以鹽梅入搗和丸芡子大每噙一丸

又方用母丁香神麴炒等分爲末米飲服一錢

朝食暮吐丁香十五箇研末甘蔗汁薑汁和丸蓮子大噙嚥之（摘元方）

反胃關格氣噎不通丁香木香各一兩每服四錢水一盞半煎一盞先以黃泥做成盌濾藥汁於內食前服試之有效土盌取其助脾也（經驗方）

噎膈反胃用糯米末以牛涎拌作小丸煑熟食（集成）

又方香牛飲用牛涎一盞入麝香少許銀盞頓熱先以帛緊束胃脘令氣喘解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食（得效方）

又方千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服（普濟）

巧婦鳥窠治膈氣噎疾以一枚燒灰酒服或一服三錢神驗（易簡方）

噎膈反胃諸藥不效眞阿魏一錢野外乾人屎爲末三錢五更以薑汁蘸食能起死人乃趙王囦方也（永類鈐方）

噎食不下人屎入蘿蔔內火煉三炷香取研每服三分黃酒下三服效（海上名方）

反胃噎膈大力奪命丸牛轉草杵頭糠各半斤糯米一升爲末取黃母牛涎和丸龍眼大煑熟食之入砂

糖二兩尤妙（正傳）

膈氣不食天靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層層隔封水火升降楊梅色冷定取出去豆不用研末每服一錢溫酒下（集效方）

反胃吐食蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以繰絲湯煮粟米粥食之（惠濟方）

噎食病數月不愈者用狗寶爲末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾攪勻去查調服日二不過三日愈後服補劑（摘要）

反胃膈氣丁丹厓祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶三錢爲末以雞子一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煻火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過二三服見效（顧眞堂方）

噎塞不通羚羊角爲末飲服方寸匕以角摩噎上（外臺）

治胃反食即吐搗粟米作麨水丸梧子大七枚爛煮內酢中細細吞之得下便已麨亦得用之（千金下同）

又方飲白馬尿即止

又方燒先死雞膍胵灰酒服男雄女雌

又方淘小芥子曝乾爲末酒服方寸匕日三

食後吐酸水用乾薑食茱萸各二兩二味治下篩酒服方寸匕日二名治中散胃冷者立驗

卒噎撚取飯盆邊零飯一粒食之卽下

又方常食乾粳米飯卽不噎

又方末火炭蜜丸彈子大含少少嚥卽下

膈氣用大鯽魚一尾自死者可用活者不用割腹去腸雜留鱗用大蒜去淨皮薄切片塡入魚腹中仍合定爲一尾用濕紙包定以麻皮縛之却用熟黃泥厚固乾以糠火煨熟取出去鱗刺骨將肉入局方平胃散末搗和爲丸梧桐子大曬乾收貯勿令泄氣每服三十丸空心米飮下

氣噎食不得下喉中如有肉塊用昆布一兩洗去鹹水小麥二合水三盞煎小麥爛去查不拘時每服一小盞仍取淨昆布頻含一二片津嚥下有效

胷鬲氣滯食噎不下以手巾布包杵頭糠時時拭齒刮舂米杵頭細糠煎湯呷之亦可

男婦噎膈用雞嗉子兩箇帶宿食用紙裹外用黃泥

固濟炭火燒煙盡爲度取出去泥嗉子內宿食不可動入木香丁香沉香各一錢共爲細末用大棗煮熟去皮核研和丸梧桐子大每服三十丸米飲下

噎鬲氣滯煩悶吐逆飲食不下蘆根五兩剉水三盞煎二盞不拘時溫服時時服之尤效

又方白猪肚連食烘乾爲末每服二三錢酒調下

又方千葉白槿花陰乾爲末老米湯調送一錢三五口不轉再將飲調藥送之名槿花散

鍼灸

甲乙經曰胷滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下膽俞主之

胷脅榰滿痹痛骨疼飲食不下嘔（千金作欬）逆氣上煩心紫宮主之

胷脅榰滿鬲塞飲食不下嘔吐食復出中庭主之

胷中榰滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食靈墟主之

胷脅榰滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂步郎

主之

傷憂悁思氣積中脘主之

食飲不化入腹還出下脘主之

食飲不下腹中雷鳴大腸不節小便赤黃陽綱主之

千金方曰豐隆主不能食

維道主三焦有水氣不能食

胃腧主嘔吐筋攣食不下不能食

大腸腧周榮主食不下喜飲

陽綱期門少商勞宮主飲食不下

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷飽身黃酸疼羸瘦

中庭中府主膈寒食不下嘔吐還出

中極主饑不能食

凡飲食不化入腹還出先取下脘後取三里瀉之

胃反灸兩乳下各一寸以瘥爲度又灸臍上一寸二十壯又灸內踝下三指稍斜向前有穴三壯

東垣十書曰吐食不化取上脘中脘下脘

今日食明日吐取心俞膈俞俱沿皮寸半又灸膻中

七壯又取巨闕胃脘寸半各灸五十壯

翻胃取商丘通谷巨闕然谷隱白陽陵泉內庭膈關

醫學綱目曰翻胃取勞宮一分灸中脘瀉之又取心俞一分沿皮向外一寸半補之

翻胃吐食灸中魁在中指第三節瀉之又取中脘寸半腕骨一分瀉之灸

五噎吞酸多唾嘔吐不止取天突五分留三呼得氣卽瀉三吸又取通關在中脘兩旁各五分鍼入八分左撚能進飲食右撚能和脾胃許氏云此穴一鍼四效凡下鍼後良久覺脾磨食運鍼動爲一效次鍼破病根腹中作聲爲二效次覺流入膀胱爲三效又次覺氣流腰後骨空間爲四效

噎塞膈氣取通谷

五噎分灸法氣噎亶中憂噎心俞食噎乳根勞噎鬲俞思噎天府

又法取勞宮中魁中脘三里太陰支溝上脘不已再取亶中太白下脘右關脾俞胃俞

景岳全書曰噎膈灸膏肓百壯以多爲佳又灸膻中

中脘膈俞各七壯

又法灸心俞天府乳根各七壯三里三七壯

翻胃灸上脘中脘下脘各二七壯天樞三七壯

導引

保生祕要曰膈噎證有數種有氣虛惱怒而鬱有血虛倚靠勞傷有食凝滯而成有脾瀉受虧敗壞元氣有因痰火積滯有感七情六慾醉飽房勞脾胃受制陰陽不交所以有膈證也導引行功宜帶餓以雙手懸梁將身下墜微納氣數口使氣冲膈盈滿兩足踏步二九一度之數鬱膈氣逆胃口虛弱不藥而愈運功此證始行調息而坐按週天計籌咽神水一斤意墜丹田夾守艮背運縧胷或梭或散坐臥可行有

動有靜百日功成

又法胷前推開至臍再升湧泉水洗之

念背想腎水通背洗出心頭推開下大腸九曲去

上膈熱下膈寒口乾燥導引法心頭推開又想腎水升至背流出心頭洗之不嘻而吸之或念背舌托上齶而津液自生

上膈冷下膈熱導引法推開心頭至臍少頃於臍下想一條水下膀胱上尾閭直至頂門滴下心頭歸臍旋轉洗之

醫案

史記倉公傳曰齊王中子諸嬰兒小子病召臣意診切其脈告曰氣鬲病病使人煩懣食不下時嘔沫病得之少憂數忔食飲臣意卽爲之作下氣湯以飲之一日氣下二日能食三日卽病愈所以知小子之病者診其脈心氣也濁躁而經也此絡陽病也脈法曰脈來數病去難而不一者病主在心周身熱脈盛者爲重陽重陽者逿心主故煩懣食不下則絡脈有過絡脈有過則血上出血上出者死此悲心所生也病

得之憂也

儒門事親曰遂平李官人妻病咽中如物塞食不下中滿他醫治之不效戴人診其脈曰此痰膈也內經曰三陽結爲膈王啓元又曰格陽云陽盛之極故食則格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以瓜蔕散再越之健啖如昔日矣

本事方曰外臺載昔幼經患此疾每食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等時稱名醫奉勑令治醫竭其術竟不能療漸至羸憊死在朝夕忽有衞士云服驢小便極驗旦服二合後食唯吐一半晡食又服二合人定時食粥吐即便定後奏知大內中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿熱服二合病深者日服良驗

丹溪曰一中年婦患反胃以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿以防其或生蟲也與數十貼而安

台州一木匠年二十七勤於工作而性巧慧有一艾

妻且喜酒病反胃者半載其面白其脈濇而不勻重取則大而弱小便八九日方通一次糞皆燥結如羊屎甚羸乏無力余謂精血耗竭也先與甘蔗汁煎六君湯加附子大黃與之俟大便稍潤令謝去工作臥牧牛家取新溫牛乳細飲之每頓盡一杯一晝夜可五六次以漸而至七八次其餘菜果粥飯皆不入口半月而大便潤月餘而安然或口乾蓋酒毒未解間飲甘蔗汁少許近兩月而安矣

杭州一男子四十餘歲患反胃兩月矣口乾而不喜飲食有時不吐或吐則食物裹涎沫而出吐後胷膈方快其脈但濇重則弦大蓋其壯年多服金石房中之藥所致時正秋初尚熱遂令其多作竹瀝煑鸎粟米爲粥代粥飯與之每啜一二口而止却帶溫頻頻與之自此不吐至旬日稍凉以流水作稀粥入少竹瀝與之時間以四物湯加陳皮益其血月餘而安

醫學綱目曰楊時患風氣冲心飲食吐逆徧身枯瘦日服萬病紫菀丸五丸至二十日瀉出肉塊蝦蟇五六枚白膿二升愈

趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞服萬病紫菀丸五丸至十日瀉出靑蛇五七條下惡膿三升愈

廣五行記云永徽中有僧唯則病噎不能食謂諸弟子曰吾死後便可開吾胷喉視有何物自經而卒弟子果開視胷中得一物形似魚而有兩頭徧體皆肉鱗弟子置椀中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛藍作澱適有一僧以澱置器中此蟲遂繞器中走須臾化爲水此乃蟲瘕非五噎比後人以藍治噎誤矣

醫宗必讀曰邑宰張孟端夫人憂怒之餘得食輒噎胷中隱隱痛余診之曰脈緊且滑痰在上脘用二陳加薑汁竹瀝長公伯元曰半夏燥乎余曰濕痰滿中非此不治遂用四劑病尚不減改大半夏湯服四貼胷痛乃止又四貼而噎亦減服二十劑而安若泥半夏爲燥而以他藥代之豈能愈乎惟痰不盛形不肥者不宜與服也

江右太學方春和年近五旬多慾善怒患噎三月日進粉飲一鍾腐漿半鍾且吐其半六脈細軟此虛寒

之候也用理中湯加人乳薑汁白蜜半夏一劑便減十劑而日進糜粥更以十全大補加竹瀝薑汁四十貼諸證皆愈

南都徐奉誠膈噎不通查質之物不能下咽惟用人乳醇酒數杯吐沫不已求治於余余曰口吐白沫法在不治脈猶未敗姑冀萬一用人參黃芪當歸白术陳皮桃仁牛乳白蜜薑汁連進十劑白沫漸少倍用參术三月全安

嘉定錢遠之二十五歲以鼓盆之戚悲哀過度不能食飯又十餘日粥亦不能食隨食隨吐二便閉澀自謂必死求診於余余曰脈按有力非死證也以酒蒸大黃加桃仁當歸砂仁陳皮蜜丸與服凡五服而下燥屎乾血甚多病若失矣數日之間能食倍常

醫學正傳曰一人年五十三夏秋間得噎證胃脘痛食不下或食下良久復出大便燥結人黑瘦殊甚求余治診其脈右手關前弦滑而洪關後略沉小左三部俱沉弦尺帶芤余曰此中氣不足木來侮土上焦濕熱鬱結成痰下焦血少故大便燥結陰火上衝吸

門故食不下用四物以生血四君子以補氣二陳以袪痰三合成劑加薑炒黃連炒枳實苦蔞仁少加砂仁又間服潤腸丸或服丹溪墜痰丸半年服前藥百餘貼病全安

寓意草曰李思萱室人有孕冬月感寒至春而發初不覺也連食雞麵雞子遂成夾食傷寒一月纔愈又傷食物吐瀉交作前後七十日共反五次遂成膈證滴飲不入延診時其脈上湧而亂重按全無嘔噦連綿不絕聲細如蟲鳴久久方大嘔一聲余曰病者胃中全無水穀已翻空向外此不可救之證也思萱必求良治以免餘憾余籌畫良久因曰萬不得已必多用人參但纔入胃中卽從腸出有日費斗金不勾西風一浪之譬奈何渠曰儘在十兩之內尚可勉備余曰足矣乃煎人參湯調赤石脂末以墜安其翻出之胃病者氣若稍回少頃大便氣卽脫去凡三日服過人參五兩赤石脂末一斤俱從大腸瀉出得食仍嘔但不嘔藥耳因思必以藥之査滓如糲粥之類與服方可望其少停胃中頃之傳下又可望其少停腸中

於是以人參陳橘皮二味剪如芥子大和粟米同煎作粥與服半盞不嘔良久又與半盞如是再三日始得胃舍稍安但大腸之空尙未塡實復以赤石脂爲丸每用人參湯吞兩許如是再三日大便亦稀此三日參橘粥內已加入陳倉米每進一盞日進十餘次人事遂大安矣仍用四君子湯丸調理通共用人參九兩全愈然此亦因其胎尙未墮有一綫生氣可續故爲此法以續其生耳不然者用參雖多安能囘元氣於無何有之鄉哉後生一子小甚緣母病百日失蔭之故

黃咫旭乃室病膈氣二十餘日飲粒全不入口延余診時尺脈已絕而不至矣詢其二便自病起至今從未一通止是一味痰沫上湧厭厭待盡無法以處邑庠有施姓者善決生死謂其脈已離根頃刻當壞余曰不然脈經明有開活一款云上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死是吐則未必死也但得天氣下降則地道自通故此證倍宜治中以氣高不返中無開闔因成危候待吾以法緩緩治之自然逐日見效

於是始獨任以觀驗否迺遂變旋覆黛赭成法而用其意不泥其方緣女病至尺脈全無則莫可驗其受孕萬一有而不求以赭石乾薑輩傷之呼吸立斷矣姑闕疑以赤石脂易赭石煨薑易乾薑用六君子湯加旋覆花煎調服下嘔即稍定其岳父見用人參以爲刼病而致憾余曰無恐也治此不愈願以三十金爲罰如愈一文不取乃全神照應藥必親調始與服之三日後漸漸不嘔又三日後粥飲漸加舉家甚快但病者全不大便至是已月餘矣一則憂病之未除再則憂食之不運刻刻以通利爲囑余曰臟氣久結食飲入胃每日止能透下腸中一二節食飲積之既久臟氣自然通透原議緩治何得急圖耶舉家僉以余爲不情每進診脈輒聞病者鼻息之揚但未至發聲相詈耳蓋余以歸地潤腸之藥恐滯膈而作嘔硝黃通腸之藥恐傷胎而隕命姑拂其請堅持三五日果氣下腸通而病全瘳矣病瘳而其家竊議曰一便且不能通曷貴於醫耶月餘腹中之孕果漸形著又議曰一孕且不能知安所稱高耶吁嗟余之設誠而

行以全人夫妻子母而反以得謗也豈有他哉惟余得謗當世之所謂醫者然後迺得名耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十四卷目錄

醫部彙考三百十四

飲食門一

黃帝素問生氣通天論　平人氣象論　陰陽應象大論　靈蘭祕典論　六節臟象論　五臟生成篇　五臟別論　經脈別論　臟氣法時論　宣明五氣篇　太陰陽明篇　痺論　病能論　刺志論　脈解篇　刺法論　氣交變大論　五常政大論　至眞要大論

靈樞經邪氣臟腑病形篇　榮氣篇　榮衞生會篇　口問篇　平人絕穀篇　五味

（篇　五味論　刺節眞邪篇　九鍼篇　大惑論）

扁鵲難經（受盛多少　口能知味　內傷）

傷寒論（宿食）

王叔和脈訣（脈法）

嚴用和濟生方（論治）

劉完素六書（內傷論）

張從政儒門事親（內傷）

張潔古活法機要（總論）

李杲十書（內傷論）

朱震亨心法（傷食）

格致餘論（飲食箴　醇酒宜冷飲論）

羅天益衞生寶鑑（飲食自倍腸胃乃傷論）

虞摶醫學正傳（論升降生化）

戴思恭證治要訣（傷酒　傷食）

李梴醫學入門（內傷證治）

李中梓醫宗必讀（不能食）

王綸明醫雜著（飲食過傷）

趙獻可醫貫（傷飲食論）

藝術典第三百三十四卷

醫部彙考三百十四

飲食門一

黃帝素問

生氣通天論

陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味是故味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脈沮弛精神乃

央是故謹和五味骨正筋柔氣血以流腠理以密如是則骨氣以精謹道如法長有天命

註 五臟之精生於五味五味各歸其所喜如酸入肝鹹入腎甘入脾苦入心辛入肝太過則傷而病矣能謹和之則骨正筋柔陰陽和平而天命長

平人氣象論

人以水穀爲本故人絕水穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得眞臟脉不得胃氣也

註 五臟元眞之氣皆胃腑水穀之所生也

陰陽應象大論

水穀之寒熱感則害於六腑

註 水穀入胃寒溫不適飲食不節則病生腸胃

形不足者溫之以氣精不足者補之以味

註 形歸氣氣生形溫熱氣勝者補陽氣故形不足者溫之以氣五臟主藏精五味各歸所喜故五味補精

靈蘭祕典論

脾胃者倉廩之官五味出焉

註　運納五穀故爲倉廩之官五味入胃脾爲轉輸以養五臟氣故五味出焉

六節臟象論

天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生

註　在天爲氣故食人以五氣在地爲化化生五味故食人以五味五氣從外竅而入心肺心榮色而華肺主聲故使五色修明五臟之氣得五味以滋養則陰陽和而相生氣和津成而五臟之神生矣

五臟生成篇

多食鹹則脉凝泣而色變多食苦則皮槁而毛拔多食辛則筋縮而爪枯多食酸則肉胝䐢而脣揭多食甘則骨痛而髮落此五味之所傷也

註　五味所以養五臟者也太過則臟有偏勝所不勝之臟受傷而各見其病焉

五臟別論

胃者水穀之海六腑之大源也五味入口藏於胃以

養五臟氣

註　水穀入胃脾爲轉輸以灌溉四臟者也

經脈別論

食氣入胃散精於肝淫氣於筋

註　肝乃土之勝制則生化故散精於肝肝者筋其應故淫氣於筋

食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛毛脈合精行氣於腑腑精神明畱於四臟氣歸於權衡權衡以平氣口成寸以決死生

註　食氣曰濁氣入胃之食氣歸於心子令母實也心通脈故淫精於脈入胃之穀氣先淫氣於脈百脈之經氣總歸於大經經氣歸肺百脈皆朝會於肺也肺合皮毛故輸精焉毛脈合精者血氣相合也腑爲陽故先受氣腑精神明者六腑之津液相成神乃自生也五臟六腑受氣於穀淫精於脈變見於氣口以決其死生

飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺

通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以爲常也

註　脾主爲胃行其津液者也肺應天而主氣故能通調水道下輸膀胱也氣化則水行故四布於皮毛通灌於五臟之經脉而合於四時五行陰陽之揆度以爲經脉之經常也

臟氣法時論

肝苦急急食甘以緩之心苦緩急食酸以收之脾苦濕急食苦以燥之肺苦氣上逆急食苦以泄之腎苦燥急食辛以潤之

註　此論五臟之本氣而合於四時五行五味也

肝欲散急食辛以散之心欲耎急食鹹以耎之脾欲緩急食甘以緩之肺欲收急食酸以收之腎欲堅急食苦以堅之

註　此論五臟之病宜於藥食者五味各有所宜也

宣明五氣篇

辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋

病無多食酸是謂五禁無令多食

註　五味所以養五臟之氣者也病則氣虛故無令多食蓋少則補多則反損其氣

太陰陽明篇

飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟

註　飲食勞倦則傷脾故陰受之入五臟從其類也

痹論

飲食自倍腸胃乃傷

註　居處失宜則邪中其俞又不能調其飲食邪卽循俞而入舍於腑矣

病能論

食入於陰長氣於陽

註　食氣入胃散精於肝濁氣歸心淫精於脉毛脉合精行氣於腑此食入於陰而長氣於陽也

刺志論

穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反此者病穀入多而氣少此謂反也穀不入而氣多此謂反也穀入多而氣少者得之有所脫血濕居下也穀入少而氣多者

邪在胃及與肺也

註 常謂穀之多少與氣之盛衰相應反謂穀入多而氣少穀不入而氣多爲邪病之所致也

脉解篇

少陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡聞食臭也

註 秋深之時陽盡而陰盛故胃無氣惡聞食臭也

刺法論

欲令脾實氣無滯飽無久坐食無太酸無食一切生物宜甘宜淡

氣交變大論

歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減

註 此脾土之病

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病食減

註 土虛而不能主化也

歲火之復民病鶩溏腹滿食飲不下

註 水寒太甚而濕土復之故爲此諸病

歲土之復民病食少失味

註 此水勝之病蓋土弱木亢金乃復而子亦隨之

也

五常政大論

太陽司天濕氣變物水飲內稸中滿不食

註　凡此皆水濕之爲病也

厥陰司天風氣下臨脾氣上從食減口爽

註　土受木化則受其勝制而脾病也

太陰司天濕氣下臨腎氣上從少腹痛時害於食

註　少腹痛者腎病也時害於食者水上乘土也

至眞要大論

歲厥陰在泉風淫所勝民病飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰

註　凡此皆木淫而土病也

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下舌本强食則嘔

註　凡此皆脾經之病蓋風木淫勝故也

少陰之勝心下熱善饑

註　外淫之火交於內也

太陽之勝腹滿食減

註 水氣乘脾也

厥陰之復嘔吐飲食不下入而復出甚則入脾食痹而吐

註 嘔吐飲食不下木淫而土敗也痹者閉而痛也

太陽之復厥氣上行心胃生寒胷膈不利食減

註 厥氣上行者鬱寒之氣上行而欲復歲半以前之氣也食減水乘土也

太陰司天主勝則胷腹滿食已而瞀

註 胷腹滿者初氣之木勝傷土也食已而瞀乃二氣三氣之火上炎而爲肺病也

太陰在泉主勝則寒氣逆滿食飲不下

註 水淫而上乘土故逆滿四之主氣乃太陰濕土客氣乃厥陰風木故食飲不下

五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也

註 此言氣味之不可偏用者也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行

註 此內外俱傷也

腎脈微緩爲洞洞者食不化下咽還出

註 戊癸合而化生火土以消入胃之飲食腎氣緩故食不化而還出

榮氣篇

榮氣之道內穀爲寶穀入於胃乃傳之肺流溢於中布散於外精專者行於經隧常榮無已終而復始是謂天地之紀

註 榮血者中焦受氣取汁化而爲血以奉生身莫貴於此故獨行於經隧常榮無已終而復始以應天地運行之紀

榮衛生會篇

人受氣於穀穀入於胃以傳於肺五臟六腑皆以受氣其清者爲榮濁者爲衛榮在脈中衛在脈外

註 人賴水穀之氣以生此榮衛而榮臟腑經脈也

口問篇

穀入於胃胃氣上注於肺

註 人之所受穀氣由胃海之布散於天下也

平人絕穀篇

腸胃之中常畱穀二斗水一斗五升故平人日再後後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡矣故平人不食飲七日而死者水穀精氣津液皆盡故也

註 此論人之臟腑形骸精神氣血皆藉水穀之所資生水穀絕則形與氣俱絕矣

五味篇

胃者五臟六腑之海也水穀皆入於胃五臟六腑皆稟氣於胃五味各走其所喜穀味酸先走肝穀味苦先走心穀味甘先走脾穀味辛先走肺穀味鹹先走腎穀氣津液已行榮衛大通乃化糟粕以次傳下

註 此論五臟六腑津液榮衛皆稟氣於胃腑水穀之所生養

天地之精氣其大數常出三入一故穀不入半日則

氣衰一日則氣少矣

註　大數出三入一蓋所入者穀而所出者乃化糟粕以次傳下其津液溉五臟而生榮衛其宗氣積於胷中以司呼吸其所出有三者之隧道故穀不入半日則氣衰一日則氣少矣

脾病者宜食秔米飯牛肉棗葵心病者宜食麥羊肉杏薤腎病者宜食大豆黃卷猪肉栗藿肝病者宜食麻犬肉李韭肺病者宜食黃黍雞肉桃葱

註　五色五味各有所宜也

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸腎病禁甘肺病禁苦

註　凡五臟禁服勝尅之味

肝色青宜食甘秔米飯牛肉棗葵皆甘心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦腎色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛

註　緩急燥濕臟氣之不和也五臟有五氣之苦故宜五味以調之用陰而和陽也

五味論

酸走筋多食之令人癃鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悗心

註 五臟本五味之所生而生外合之筋骨血肉也

刺節眞邪篇

眞氣者所受於天與穀氣幷而充身者也

註 眞氣卽先天之精氣穀氣乃後天水穀之精氣相合幷而充身者

九鍼篇

病在筋無食酸病在氣無食辛病在骨無食鹹病在血無食苦病在肉無食甘口嗜而欲食之不可多也必自裁也命曰五裁

註 五味內養五臟外濡形身雖所嗜亦宜裁之

大惑論

黃帝曰人之善饑而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣幷於脾熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也

註 脾主爲胃行其津液者也精氣幷於脾則脾實

而不能爲胃轉輸則熱氣留於胃而消穀善饑矣

扁鵲難經

受盛多少

胃者水穀之海主稟四時皆以胃氣爲本

胃重二斤一兩紆曲屈伸長二尺六寸大一尺五寸徑五寸盛穀二斗水一斗五升小腸重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左迴疊積十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右迴十六曲盛穀一斗水七升半

口能知味

脾氣通於口口和則知穀味矣心氣通於舌舌和則知五味矣

內傷

何以知飲食勞倦得之然當喜苦味也虛爲不欲食實爲欲食何以言之脾主味入肝爲酸入心爲苦入肺爲辛入腎爲鹹自入爲甘故知脾邪入心爲喜苦味也其病身熱而體重嗜臥四肢不收其脈浮大而

緩

飲食勞倦得之爲實熱

漢張機傷寒論

宿食

人病有宿食何以別之曰脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食用大承氣湯下之

脈數而滑者實也此有宿食下之愈宜大承氣湯

下利不飲食者宿食也亦宜大承氣湯下之

脈緊如轉索無常者有宿食也

宿食在上脘者當吐之凡血虛者不可吐

王叔和脈訣

脈法

脾脈歌曰濇卽非多食食不作肌膚若弦肝氣盛妨食被譏謀

右手第二指連脾四十五動無諸疑急動名爲脾熱極食不能消定若斯

滑脈歌曰關滑胃寒不下食

實脈歌曰實脈尋之舉有餘伏陽蒸內致脾虛食少

只緣生胃壅溫和湯藥乃痊除

伏脈歌曰尺部見伏食不消坐臥非安還破腹

短脈歌曰短脈陰中有伏陽氣壅三焦不得昌臟中宿食生寒氣大瀉通腸必得康

死候歌曰脣青體冷及遺尿背面飲食四日期

宋嚴用和濟生方

論治

難經云脾氣通於口口和則知穀味矣心氣通於舌舌和則知五味矣是知穀味五味莫不經由口舌而入於胃也善攝生者謹於和調使一飲一食入於胃中隨消隨化則無滯留之患若稟受怯弱饑飽失時或過餐五味魚腥乳酪強食生冷果菜停畜胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡胷滿噫噎或泄或痢久則積結爲癥瘕面黃羸瘦此皆宿滯不消而生病焉大率纔有停滯當量人虛實速宜尅化之不可後時養成沉痾也

金劉完素六書

內傷論

人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食反過其節腸胃不能勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣痺論曰飲食自倍腸胃乃傷或失四時之調養故能爲人之病也經曰氣口緊盛傷於食心胷滿而口無味與氣口同氣口者乃脾之外候故脾胃傷則氣口緊盛夫傷者有多少有輕重如氣口一盛脉得六至則傷於厥陰乃傷之輕也檳榔丸主之氣口二盛脉得七至則傷於少陰乃傷之重也煑黃丸厚朴丸主之氣口三盛脉得八至則傷於太陰䐜塞悶亂甚則心胃大痛兀兀欲吐得吐則已俗呼食迷風是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐即死宜吐之以瓜蔕散如不能則無治也經曰高者因而越之下者引而竭之是也

元張從政儒門事親

內傷

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊强及兩手脉沉不可用雙解止可用

導飲丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷食宿酒若推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒癥進食丸此藥皆犯巴豆有熱毒之故也

夫膏粱之人起居閒逸奉養過度酒食所傷以致中脘留飲脹悶痞膈酢心可服木香導飲丸以治之夫芻蕘之人飲食粗糲衣服寒薄勞役動作一切酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

張潔古活法機要

內傷

人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食過節以致腸胃不能勝氣不及化故傷焉經云壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣又云飲食自倍腸胃乃傷以失四時之調節故能成病脈在氣口經曰氣口脈盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同口曰坤者口乃脾之候故胃傷而氣口緊盛夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脈六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳朮

丸之類主之氣口二盛脈得七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛脈得八至九至則傷太陰塡塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之兀兀欲吐不已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死瓜蔕散主之如不能吐是無治也經曰其高者因而越之此之謂也備急下之亦可既有三陰可下之法亦必有三陰可補之法予故云內傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脈各在何經若面色青黑脈浮沉不一弦而弱者傷在厥陰若面色紅赤脈浮沉不一細而微者傷在少陰若面色黃潔脈浮沉不一緩而遲者傷在太陰也如傷在厥陰肝之經當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯之類主之傷在少陰腎之經宜服通脈四逆湯傷在太陰脾之經理中丸湯主之大便軟者宜湯結者宜丸

李杲十書

內傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之爲二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則爲喘欬爲腫爲水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解酲湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積爲滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼爲痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸澼當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣朮巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病

十去其八無毒治病十去其九不可過之此聖人之深戒也

酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水眞陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消鑠折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久則爲黑疸愼不可犯宜以葛花解酲湯主之

瓜蔕散治大滿大實氣上衝逆上部有脉下部無脉塡塞悶亂者用之若不至兩尺脉絕者不宜便服此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胷中窒塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐之或曰盛食塡塞胷中痞亂兩寸脉當用事今反兩尺脉不見其理安在曰胷中有食是木鬱宜達故探吐之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胷中者肺

也爲物所塞肺者手太陰金也金主殺伐與坤土俱在手上而旺於天金能剋木故肝木發生之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脈絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故人五臟主有形之物物者陰也陰者水也右三部脈主之偏見於寸口食塞於上是絕五臟之源源絕則水不下流兩尺脈絕此其理也何疑之有然必視其所傷之物冷熱隨證加減如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣無伐天和此之謂也

朱震亨心法

脈浮滑而疾者食不消脾不磨陽脈滑而緊滑則胃氣實緊則脾氣傷得食不消者此脾不和也

傷食

傷食惡食者胷中有物宜導痰補脾用二陳湯加白术山楂川芎蒼术服之

憂抑傷脾不思飲食炒黃連酒芍藥香附同清六丸末用薑汁浸蒸餅丸服

傷食之證右手氣口必緊盛胷膈痞塞噫氣如敗卵臭亦有頭痛發熱但身不痛爲異耳用治中湯加砂仁一錢或用紅丸子

內傷者其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然元氣者乃生發諸陽上升之氣飲食入胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑之陽皆絕於外是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病形乃應是五臟六腑眞氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉

始受飲食勞倦所傷之病必氣高而喘身熱而煩及短氣上逆鼻息不調怠惰嗜臥四肢困倦不收無氣以動亦無氣以言皆爲熱傷元氣以甘溫之劑以補元氣卽是瀉火之藥凡所受病捫摸之肌膚間必大

熱必躁熱悶亂心煩不安或渴久病必不渴或表虛惡風寒愼不可以寒凉藥與之經言勞者溫之損者溫之惟以補中益氣湯溫藥以補元氣而瀉火邪內經云溫能除大熱正謂此也

格致餘論

飲食箴

人身之貴父母遺體爲口傷身滔滔皆是人有此身饑渴洊興乃作飲食以遂其生睠彼昧者因縱口味五味之過疾病蜂起病之生也其機甚微饞涎所牽忽而不思病之成也飲食俱廢憂貽父母醫禱百計山野貧賤淡薄是諳動作不衰此身已安均氣同體我獨多病悔悟一萌塵開鏡淨日節飲食易之象辭養小失大孟子所譏口能致病亦敗爾德守口如瓶服之無斁

醇酒宜冷飲論

醇酒之性大熱大毒清香美味既適於口行氣和血亦宜於體由是飲者不自覺其過於多也不思肺屬金性畏火其體脆其位高爲氣之主腎之母木之夫

酒下咽膈肺先受之若是醇者理宜冷飲過於肺入於胃然後漸溫肺先得溫中之寒可以補氣一益也次得寒中之溫可以養胃二益也冷酒行遲傳化以漸不可恣飲三益也古人終日百拜不過三爵既無酒病亦免酒禍今予稽之於禮經則曰飲齊視冬時飲齊酒也視猶比也冬時寒也叅之內經則曰熱因寒用厥旨深矣今則不然不顧受傷只圖取快蓋熱飲有三樂存焉膈滯通快喉舌辛美蓋飲可多不知酒性喜升氣必隨之痰鬱於上溺澀於下肺受賊邪金體必燥恣飲寒凉其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或瘡痍或鼻齇或自泄或心脾痛尚可發散而去之若其久也爲病深矣爲消渴內疽肺痿內痔鼓脹失明或喘哮勞嗽癲癇亦爲難明之病倘非具眼未易處治可不謹乎或曰人言一盞冷酒須二盞血乃得行酒不可冷飲明矣予曰此齊東之語耳今叅之於經證之以理發之爲規戒子以爲迂耶

羅天益衛生寶鑑

飲食自倍腸胃乃傷論

陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷謂食物無貪於多貴在有節所以保沖和而遂頤養也若貪多務飽飫塞難消徒積暗傷以召疾患蓋食物飽甚耗氣非一或食不下而上湧嘔吐以洩眞元或飲不消而作痰咯唾以耗神水大便頻數而洩耗穀氣之化生溲便滑利而濁耗源泉之浸潤至於精清冷而下漏汗淋漓而外洩莫不由食物過傷滋味太厚如能節滿意之食省爽口之味常不至於飽甚即頓頓必無傷物物皆爲益津液內畜精華和凝邪毒不能犯疾疹無由作矣

明虞摶醫學正傳

論升降生化

或問飲食同入於胃而水穀二者何如而分乎且如膀胱止有下口而無上口其水固可出不知從何而入乎又何其如是之清乎曰經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行陰陽揆度以

爲常也夫胃爲倉廩之官無物不受全藉脾土轉輸而運化焉蓋水穀入胃其濁者爲柤滓下出幽門達於大腸而爲糞以出於穀道其清者倏焉而化爲氣依脾氣而上升於肺其至清而至精者由肺而灌溉乎四體而爲汗液津唾助血脉益氣力而爲生生不息之運用也其清中之濁者下入膀胱而爲溺以出乎小便耳其未入而在膀胱之外者尚爲濁氣既入而在膀胱之內者卽化爲水是故東垣有曰飲者無形之氣正謂此也蓋肺屬金而覆乎脾胃之上卽如天之覆於地之上也經曰清陽爲天濁陰爲地地氣上而爲雲天氣下而爲雨水入於胃輙化氣而上升亦猶天降霖雨於地倏焉化氣上騰而爲雲又復化爲霖雨而下降也或曰老人與壯年者飲水無異多寡壯年小便甚少而老者小便甚多何也曰壯者如春夏之氣升者多而降者少老人如秋冬之氣降者多而升者少耳或曰降多卽小便多升多者未見其化何物而出於上竅焉曰經曰清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸

六腑各從其化也夫大塊之爲器不可論其涵容之量人之氣化亦猶是也

或問饑甚方食而食反不運化多爲嘔吐吞酸等證何也曰饑而即食渴而即飲此造化自然之理也饑不得食胃氣已損脾氣已傷而中氣大不足矣遇食大嚼過飽益甚是以大傷胃氣輕則吞酸惡心重則惡寒發熱而爲內傷等病者多矣又或負重遠行辛苦饑甚遇食太過則四體倦怠矣若又強力復行適遇風雨外襲遂成內傷挾外感之證或爲腫脹危篤之疾養生君子切宜防微杜漸戒之戒之

戴思恭證治要訣

傷酒

傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏冒眩運頭痛如破宜冲和湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛七分或用末子理中湯和縮脾飲酒渴縮脾湯或煎乾葛湯調五苓散久困於酒遂成酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致然並宜酒煮黃連丸多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯加蓬术半錢酒停胷膈爲痰飲者

枳實半夏湯加神麴麥蘗各半錢冲和湯加半夏一錢茯苓七分

多飲酒積入脾遂成酒黃

傷食

傷食之證胷膈痞塞吐逆嚥酸噫敗卵臭畏食頭痛發熱惡寒病似傷寒但身不痛耳治中湯加砂仁一錢或紅丸子小七香圓和服

食過多而傷停留中脘聞食氣則嘔二陳湯加砂仁一錢未愈更加丁香半錢或治中湯加砂仁一錢丁香十粒大嘔不止者大便去之枳實半夏湯加砂仁一錢白豆蔻仁半錢嚥感應丸

初因食一物過傷得病後再食之舊病復作一味紅丸子常服

傷食腹痛脹滿大便不通遂成食積小七香丸一貼用水一盞薑三片煎八分去薑吞感應丸

傷於生冷油膩停滯膈間脾氣不溫食難消化或多餐糯食及一切非時難化之物並宜紅丸子金上牢內消丸

傷食兼感風寒其證與前同但添身疼一證俗謂之夾食傷寒宜生料五積散或養胃湯香蘇飲和解散選用若不瘥而病入裏者則瀉少

食蟹太過致傷一味丁香足以治之有飲食不節傷食以致半身不遂狀如中風不可作風治宜用消食之劑

李梴醫學入門

內傷證治

食停上脘氣壅痰盛者宜吐如傷冷食腹脹氣逆噫氣吞酸惡心欲吐不吐宜平胃散入鹽少許探吐如傷熱物或酒麪發熱心口刺痛停痰停飲伏火宜二陳湯加黃連枳實探吐傷重塡塞胷中下部無脈體實年壯者方以瓜蔕散吐之尋常飲食過飽在膈以手探吐爲好停宿中中下脘者宜下以逐之如傷冷物腹脹滿痛者木香見晛丸丁香脾積丸感應丸如傷熱物痞滿者二黃丸日晡潮熱盛者小承氣湯寒熱兩傷者大黃備急丸除原散體弱者下藥兼補保和丸凡傷食乃中焦血病如牽牛猛烈傷氣及一切峻

攻反傷胃氣又現有吐者二陳湯加砂仁黃連青皮枳實現有瀉者胃苓湯加山楂麥芽或三白湯隨時令寒暑選用如身受寒氣口又傷冷初得便宜辛溫理中稍久鬱而爲熱當兼辛凉散之

吐下未淨宜消導紅丸子枳术丸保和丸大安丸平補枳术丸單山楂丸

吐下已虛宜補益四君子湯六君子湯補中益氣湯

飲酒與水過者宜上汗下滲分消其濕葛花解酲湯微汗即愈滲劑五苓散調中二陳湯如久困於酒或傷灰酒成積腹痛大便窘迫者酒蒸黃連丸香連丸如傷酒嘔逆眩運頭痛如破者補中益氣去白术加半夏白芍芩蘗乾葛川芎有塊者更加莪术木香如善飲每早長噯不吐者小調中湯最妙一月三五次服之亦可爲丸如醉飽行房以致畜血胃口時痛者大調中湯或八物湯加砂仁之類有痛飲不醉忽糟粕出前竅尿溺出後竅者四物湯加海金砂木香檳榔木通桃仁數服可安吃茶成癖者星术丸

憂思傷脾不思飲食者清六丸加香附炒黃連白芍

薑汁蒸餅糊丸服全不食者溫膽湯神效憂思兼傷食者木香化滯湯瘦倦氣抑不食者二炒蒼蘗散加香附白芍陳皮半夏黃連扁柏等分白术爲君薑汁麴丸服濕痰氣滯不食者三補丸加蒼术倍香附

李中梓醫宗必讀

不能食

按脾胃者具坤順之德而有乾健之運故坤德或慚補土以培其卑監乾健稍弛益火以助其轉運故東垣謙甫以補土立言學士用和以壯火垂訓蓋有見乎土強則出納自如火強則轉輸不息火者土之母也虛則補其母治病之常經每見世俗一遇不能食者便投香砂枳朴麴蘗楂芽甚而用黃連山梔以爲開胃良方而夭枉者多矣不知此皆實則瀉子之法因脾胃間有積滯有實火元氣未衰邪氣方張者設也虛而伐之則愈虛虛而寒之遏眞火生化之元有不敗其氣而絕其穀者乎且誤以參术爲滯悶之品畏之如砒酖獨不聞經云虛者補之又云塞因塞用

乎又不聞東垣云脾胃之氣實則枳實黃連瀉之虛則白朮陳皮補之乎故不能食皆屬脾虛四君子湯補中益氣湯補之不效當補其母八味地黃丸二神丸挾痰宜化六君子湯挾鬱宜開育氣湯仇木宜安異功散加木香沉香子金宜顧肺金虛則盜竊土母之氣以自救而脾益虛甘桔參苓之屬夫脾爲五臟之母土爲萬物之根安穀則昌絕穀則亡關乎人者至爲切亟愼毋少忽

王綸明醫雜著

飲食過傷

飲食過傷變爲異常急暴之證人多不識嘗有一壯年人忽得暴病如中風狀口不能言語目不識人四肢不舉急投蘇合香丸不效予偶過聞之因詢其由曰適方陪客飲食後忽得此證遂敎以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐出數椀而醒後服白朮陳皮半夏麥芽調理而愈大抵此等證多因飲食醉飽之後或感風寒或著氣惱而致飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作中風中氣證而用驅風解表行氣散氣之

藥則胃氣重傷死在旦夕內經雖有暴病暴死之證但恐多有因於食者前輩不曾明言故人不識耳今後遇有此等急證須要審問明白若方飲食醉飽或累傷飲食重復受傷但覺胷膈有食滯只作傷食治之

趙獻可醫貫

傷飲食論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六腑是飲食之傷傷於寒熱也痺論云飲食自倍腸胃乃傷是飲食之傷自傷於饑飽也古人治法分上中下三等而治之在上者因而越之瓜蔕散之類主之中者消化神麴麥芽山樝三稜廣术之類主之在下者引而竭之硝黃巴豆牽牛甘遂之類主之古人又分寒熱而治之傷熱物者以寒藥治之傷寒物者以熱藥治之如傷冷物二分熱物一分則用熱藥二停寒藥一停若備急丸是也予意當隨證加減大抵飲食之病傷寒物一邊居多以上法門未必可爲典要也

當今方家以平胃散爲主出入增減亦可爲脾胃之

準繩平胃者胃中有高阜則使平之一平即止不可過劑過劑則平地反成坎矣今人以平胃散爲常服補劑者誤也不若枳朮丸爲勝夫枳朮丸乃潔古老人所製用枳實一兩白朮二兩補藥多於消藥先補而後消以荷葉裹飯燒熟爲丸蓋取荷葉色青得震卦之體有仰盂之象中空而淸氣上升燒飯爲丸以取穀氣謂潔古枳朮一方啓東垣末年之悟補中益氣自此始也但潔古專爲有傷食者設今人以此丸爲補脾藥朝食暮餌更有益之橘半香砂者則又甚矣吾恐枳實一味有推牆倒壁之功而人之腸胃中既已有傷牆壁不固能經幾番推倒乎

至若山楂神麴麥芽三味舉世所常用者予獨未棄蓋山楂能化肉積凡年久母猪肉煮不熟者入山楂一撮皮肉盡爛又產婦兒枕痛者用山楂二十粒砂糖水煎一椀服之兒枕立化可見其破氣又破血不可輕用麴蘖者以米與水在磁缸中必藉麴以釀成酒必藉蘗以釀成糖脾胃在人身非磁缸比原有化食之能今食不化者其所能者病也只補助其能而

食自化何必用此消尅之藥哉

大凡元氣完固之人多食不傷過時不饑若人先因本氣不足致令飲食有傷矣前藥一用飲食雖消但脾既已受傷而復經此一番消化愈虛其虛明後日食復不化猶謂前藥已效藥力欠多湯丸並進展轉相害羸瘦日增良可悲哉余痛此弊因申言之凡太平丸保和丸肥兒丸之類其名雖美俱不敢用蓋名之美者其藥必惡故以美名加之以欺人耳目非大方家可用也故醫有貧賤之醫有富貴之醫膏粱之子弟與藜藿之民不同太平之民與瘡痍之民不同鄉村閭巷頑夫壯士暴有所傷一服可愈若膏粱子弟稟受虛弱奉養柔脆槩以此術施之貽害不小夫有醫術有醫道術可暫行一時道則流芳千古有古方有今方有聖方有俗方余以爲今人不及古人不敢自立一方若脾胃惟東垣爲聖選而用之以調中益氣補中益氣二方出入增減眞知其寒物傷也本方中加熱藥如薑桂之類熱物傷也加黃連之類眞知有肉食傷也加山楂數粒酒食傷也加葛花一味

隨證調理此東垣之法方士之繩墨也然以寒治熱而熱不去以熱治寒而寒不除奈之何經曰寒之不寒是無水也熱之不熱是無火也壯水之主益火之原此東垣之未及也

如有食塡太陰名曰食厥者下部有脈上部無脈不吐則死急以陰陽鹽湯探吐其物卽愈如有食積腸腹絞痛手不可按者不得不下審知其爲寒積必用巴豆感應丸下之審知其爲熱積必用大黃承氣湯下之不當死生立判愼之哉昔張子和動輙言下蓋下之當也仲景三承氣審之詳密可下不可下急下分毫不爽如下血積必用桃仁紅花下水必用牽牛甘遂下水中之血必用蝱蟲水蛭今人畏而不敢下者不明之罪小如無忌而妄用者殺人之罪大醫司人命豈易言哉

何柏齋云造化生物天地水火而已主之者天成之者地也故曰乾知大始坤作成物至於天地交合變化之用則水火二氣也天運水火於地之中則物生矣然水火不可偏盛大旱物不生火偏盛也大澇物

亦不生水偏盛也水火和平而物生自然之理人之臟腑以脾胃爲主蓋飲食入於胃而運以脾猶地之土也然脾胃能化物實由於水火二氣非脾所能也火盛則脾胃燥水盛則脾胃濕皆不能化物乃生諸病制其偏而使之平則治之之法也而愚按制其偏而使之平一句甚好所謂制者非去水去火之謂人身水火原自均平偏者病也火偏多者補水配火不必去火水偏多者補火配水不必去水譬之天平此重則彼輕一邊重者只補足輕之一邊決不鑿去馬子蓋馬子一定之數今人欲瀉水降火者鑿馬子者也

余於脾胃分別陰陽水火而調之如不思飲食此屬陽明胃土受病須補少陰心火歸脾湯補心火以生胃土也能食不化此屬太陰脾土須補少陽相火八味丸補相火以生脾土也無非欲人培養一點先天之火氣以補土之母耳若理中湯用乾薑所以制土中之水也建中湯用芍藥所以制土中之木也黃芪湯所以益土之子使不食母之食也六味丸所以壯

水之主也八味丸所以益火之原也土無定位寄旺於四時無專能代天以成化故以四臟中兼用之總之以補爲主不用尅伐脾氣下陷補中益氣肝木乘脾加左金丸鬱怒傷脾歸脾湯脾虛不能攝痰六君子湯脾腎兩虛四君四神陰火乘脾六味丸命門火衰不生脾土八味丸先天之氣足而後天之氣不足者補中氣爲主先天足而後天不足者補元氣爲主或曰正當胷膈飽悶之時數日粒米不下陳皮枳殼木香烏藥日夜吞咽尚且不通復可補乎曰此正因初先不知補益擅用發散尅伐太過虛否之病也經曰下焦虛乏中焦否滿欲治其虛則中滿愈甚欲消其否則下焦愈乏庸醫值此難以措手疏啓其中峻補於下少用則邪壅於上多用則峻補於下所謂塞因塞用者也善用者能以人參一兩或七八錢少加升麻一錢大劑一服卽愈此內經之妙用不可不知也東垣云酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之

藥下之又有牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水眞陰及有形血氣俱爲不足如此則陰血愈虛眞水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是元氣消鑠折人長命不然則虛損之病成矣宜以葛花解酲湯主之

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

一八一四

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十五卷目錄

醫部彙考三百十五

飲食門二

喻昌醫門法律　飲滾酒過多成膈

張介賓景岳全書　論證　論治　論脾胃三方

陳士鐸石室祕籙　論治法

方　黑圓子　如意圓　阿魏圓　强中圓　蒙石圓　檳榔丸　煑黃丸　瓜蔕散　金露丸　枳實丸　清六丸　又方　又方　又方　補脾丸　紅丸子　治中湯　葛花解酲湯

仙方內消丸　香蘇散　紅砂香附湯　穀神丸　黑丸子　丁香脾積丸　感應丸　五百丸　丁香爛飯丸　木香枳术丸　麴蘗枳术丸　三黃枳术丸　大枳殼丸　集香丸　紫沉消積丸　法製生薑散　木香丸　小分氣丸　益志散　快活丸　破積導飲丸　和中丸　七珍散　二神丸　育氣湯　資生丸　右歸飲　右歸丸　一陰煎　二陰煎　四陰煎　和胃飲　排氣飲　小和中飲　芍藥枳术丸　神香散　赤金豆　四味回陽飲　理陰煎　養中煎　溫胃飲　五君子煎　胃關煎　抑扶煎　五德丸　九烝丹

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百三十五卷

醫部彙考三百十五

飲食門二

醫門法律（臣喻昌著）

飲滾酒過多成膈

過飲滾酒多成膈證人皆知之而所以然之理不達也蓋膈有二一者上脘之艱於納一者下脘之艱於出耳然人胃中全是一團沖和之氣所以上脘清陽居多不覺其熱下脘濁陰居多不覺其寒卽時令大

熱而胃中之氣不變爲熱時令大寒而胃中之氣不變爲寒氣惟沖和故但能容食不能化食必藉脾中之陽氣入胃而運化之機始顯此身中自然之造化也麯糵之性極能升騰日飲沸酒不輟勢必將下脘之氣轉升於中上二脘而幽門之口閉而不通者有之且滾酒從喉而入日將上脘炮灼漸有腐熟之象而生氣不存窄隘有加止能納水不能納穀者有之此所以多成膈證也若夫熱藥之性其傷人也必僭以火曰炎上也寒藥之性其傷人也必濫以水曰潤下也不僭不濫而獨傷中焦沖和之氣者必無之理

景岳全書　臣張介賓著

論證

凡飲食傷脾之證有寒傷有熱傷有暫病有久病有虛證有實證但熱者暫者實者人皆易知而寒者久者虛者人多不識如今人以生冷瓜果致傷胃氣而爲瀉爲痢爲痛之類者人猶以爲火證而治以寒凉者是不識寒證也有偶因停滯而爲脹爲痛者人皆知其實也然脾胃強壯者卽滯亦易化惟其不能化

者則最有中虛之證故或以不食亦知饑少食卽作脹或以無饑無飽全然不思飲食或以胃虛兼嘔而腹滿膨膨或以火不生土而時食時吐或中氣不化則胷喉若有所哽而本非飲食之滯者或因病致傷胃氣則久不思食而本非中滿之病者且胃病於暫者多實脾病於久者多虛時醫於此無論邪正久暫鮮有不用開胃消導等劑是不知虛證也蓋脾胃之職原以化食爲能今旣不能化食乃其所能者病而尚可專意尅伐以害其能乎且凡欲治病必須先藉胃氣以爲行藥之主若胃氣實者攻之則去而疾常易愈此以胃氣強而藥力易行也胃氣虛者攻亦不去此非藥不去病也以胃虛本弱攻之則益弱而藥力愈不能行也若久攻之非惟藥不能行必致元氣愈傷病必愈甚盡去其能必於死矣矧體質貴賤尤有不同凡藜藿壯夫及新暴之病自宜消伐惟速去爲善若以弱質弱病而不顧虛實概施欲速攻治之法則無不危矣

傷食者必惡食

素喜冷食者內必多熱素喜熱食者內必多寒故內寒者不喜寒內熱者不喜熱然熱者嗜寒多生中寒寒者嗜熱多生內熱此內經所謂久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也故凡治病養生者又當於素稟中察其嗜好偏勝之弊

飲食致病凡傷於熱者多爲火證而停滯者少傷於寒者多爲停滯而全非火證大都飲食之傷必因寒物者居多而溫平者次之熱者又次之故治此者不可不察其所因

偶病之人多有非食而疑食者曰某日會食某物或某肉某麪其日卽病醫者不論虛實但聞此言且見胃口不開必先治食夫未病之人誰有不食豈必預爲停食而待病至者斯可信其無食乎及其病也則或因勞倦或因風寒或因七情病發不測而且無脹無滯與食何干藥不對病而妄行剝削必反增病也由此推之則凡無據無證而妄指胡猜者皆其類也良可慨矣

論治

凡治飲食暫傷者亦當辨虛實若停滯中焦或脹或痛者此實證也當先去其食宜大和中飲主之然去食莫先於理氣又惟排氣飲爲佳若所停猶在上焦莫若用吐爲捷法或用吐劑亦可若食停下焦痛極兼脹者須下而去之宜神佑丸或備急丸或赤金豆若偶傷生冷或油膩不堪等物以致吐瀉脹痛而邪氣實者宜抑扶煎若無寒氣者以本方去吳茱萸煎服或用排氣飲和胃飲俱佳若痛脹不解者宜神香散兼用之

飲食傷脾而吐瀉已甚者但察其無中滿無腹痛而惟嘔惡不能止此其食物必已盡去而以中氣受傷大虛而然或其人困倦不寧少氣多汗六脈豁大無神者宜理中湯五君子煎或溫胃飲之類主之若吐甚極虛者宜四味回陽飲瀉甚極虛者宜胃關煎凡大吐大瀉之後多爲腹脹若但外脹而內不覺脹或惡聞食氣不欲飲食者皆脾氣大虛之候速宜用前溫補諸法調治之

凡少年小兒輩縱肆口腹以致胃氣不清或時微脹

或時疼痛或膨膨然不思飲食此皆傷脾而然而實亦食滯使然也滯多者宜和胃飲滯少者宜枳朮丸或芍藥枳朮丸日漸服之仍節飲食自可全愈

凡失饑傷飽損及脾胃多令人胷膈痞悶不能消化飲食少思口中無味或噯氣吞酸神體困倦此皆脾氣受傷中虛而然宜木香人參枳朮丸或大健脾丸去黃連主之其虛甚者宜理中湯或溫胃飲若虛在下焦而陰中無陽不能生土者惟理陰煎加減主之爲善

病後胃口不開飲食不進者有二證蓋一以濁氣未淨或餘火未清但宜以小和中飲加減主之一以脾胃受傷病邪雖去而中氣未復故或有數日不能食或旬日不能開或胷喉中若有所哽如梅核氣者此中本無停積但以陽氣未舒陰翳作滯胃氣大虛不能運化而然輕則溫胃飲甚則必加人參附子但使陽氣得行則胃口自開也

凡飲酒致傷者多宜除濕利水若或傷氣亦宜間用人參然其證有三不可不辨一以酒濕傷脾致生痰

逆嘔吐胷膈痞塞飲食減少者宜葛花解酲湯胃苓湯五苓散之類主之一以酒熱傷陰或致發熱動血者宜黃芩芍藥湯清化飲徙薪飲之類主之一以酒質傷臟致生泄瀉不已若氣強力壯者惟五苓散胃苓湯之類皆可除濕止瀉若因濕生寒以瀉傷陰致損命門陽氣者非胃關煎及五德丸九炁丹之類不可

怒氣傷肝則肝木之氣必侵脾土而胃氣受傷致妨飲食此雖以肝氣之逆然肝氣無不漸散而脾氣之傷則受其困矣此所以不必重肝而重當在脾也故凡遇此證但當察其逆滯之有無如無脅痛脹滿等證則不必疏氣單宜以養脾益氣爲主如五味異功散歸脾湯之屬是也或於補養藥中少加烏藥青皮白豆蔻以佐之亦可

凡時食時吐或朝食暮吐等證詳載反胃門

善食而瘦者多因有火然當察火之微甚微火者微清之如生地芍藥丹皮沙參麥冬石斛竹葉地骨皮黃芩知母細甘草之屬是也若火甚者或隨食隨饑

隨飲隨渴或肌膚燥熱二便濇結則石膏黃連梔子黃蘗龍膽草苦參之屬所不可免此當察其三焦五臟隨所在而治之然陽盛者陰必虛如一陰煎二陰煎四陰煎之屬皆當擇而用也不能食而瘦者必其脾胃虛弱不能健運而然故或爲噯氣吞酸痞滿不饑等證宜四君子湯歸脾湯若兼寒者宜五君子煎養中煎理中湯其命門火衰者宜右歸飲右歸丸八味地黃丸之類主之

凡喜食茶葉喜食生米者多因胃有伏火所以能消此物余嘗以清火滋陰之藥愈此者數人蓋察其脈證有火象故隨用隨效也又有喜食炭者必其胃寒而濕故喜此燥澀之物亦當詳察脈證宜以健脾溫胃爲主

飲食所傷治當從類如麥芽神麴能消米麪之積砂仁厚朴蘿蔔子阿魏能消肉食之積山楂枳實能消瓜果之積凡因濕者宜治以燥如半夏蒼朮草果澤瀉之屬因寒者宜治以熱如薑桂吳茱萸肉豆蔻之屬因熱者宜治以寒如芩連梔子青皮之屬氣滯者

當行其氣宜木香烏藥香附白芥子之屬血滯者當行其血宜桃仁紅花蘇木元胡之屬食聚積堅行散不易者宜巴豆大黃三稜蓬朮之屬凡治食積所停古法不過如此雖然此不過言其大概耳至若淺深虛實貴酌權宜凡欲攻有形須從乎味欲散凝滯須從乎氣未有氣行而實不隨者則此中之氣味通變又自有相濟之妙故不可以膠柱也

論脾胃三方

人賴脾胃爲養生之本則在乎健與不健耳而健脾三方如潔古之枳朮丸東垣之平胃散及補中益氣湯俱當今之相傳以爲準繩者也夫所謂平胃者欲平治其不平也此東垣爲胃强邪實者設故其性味從辛燥苦而能消散惟有積滯與濕者宜之今見方家每以此爲常服健脾之劑動輒用之而不察可否其誤甚矣潔古枳朮丸以白朮爲君脾得其燥所以能健然佐以枳實其味苦峻有推牆倒壁之功此實寓攻於守之劑惟脾氣不清而滯勝者正當用之若脾氣已虛非所宜也今人不察相傳爲補脾之藥而

朝吞暮餌或以小兒瘦弱而製令常服則適足以傷其氣助其瘦耳用宜酌也補中益氣湯乃東垣獨得之心法蓋以脾胃屬土爲水穀之海凡五臟生成惟此是賴者在賴其發生之氣運而上行故由胃達脾由脾達肺而生長萬物滋溉一身即如天地之土其氣皆然凡春夏之土能生能長者以得陽氣而上升升則向生也秋冬之土不生不長者以得陰氣而下降降則向死也今本方以升柴助升氣以參芪歸朮助陽氣此東垣立方之意誠盡善矣但肺本象天脾本象地地天既交所以成泰然不知泰之前猶有臨臨之前猶有復此實三陽之元始故余再製補陰益氣煎正所以助臨復之氣庶乎得根本之道而足補東垣之未盡也又補中益氣湯之用原爲補中扶陽而設然補陽之義則亦有宜否之辨用者不可不知如東垣用此以治勞倦內傷發熱等證雖曰爲助陽也非發汗也然實有不散而散之意故於勞倦感寒或陽虛痎瘧及脾氣下陷等證則最所宜也若全無表邪寒熱而但有中氣虧甚者則升柴之類大非所

宜何也蓋升柴之味皆兼苦寒升柴之性皆專踈散雖曰升麻入脾胃柴胡入肝膽能引清氣上升然惟有邪者固可因升而散之使或無邪能不因散而益耗其中氣乎卽曰此湯以補劑爲主而惟藉升柴以引達清氣不知微虛者猶可出入大虛者必難假借當此之時卽純用培補猶恐不及而再兼踈泄安望成功且凡屬補陽之劑無不能升正以陽主升也用其升而不用其散斯得補陽之大法此中自有元機又奚必升柴之是賴乎故寇宗奭極言五勞七傷之大忌柴胡者是誠絕類之眞見而李時珍復又非之余亦何容再辨哉然理有一定孰能越之茲余單揭其要曰能散者斷不能聚能泄者斷不能補而性味之苦寒者亦斷非扶陽之物只此便是斷案而紛紛之議或可判矣故於諸證之中凡其不宜用此者則有不可不察如表不固而汗不斂者不可用外無表邪而陰虛發熱者不可用陽氣無根而格陽戴陽者不可用脾肺虛甚而氣促似喘者不可用命門火衰而虛寒泄瀉者不可用水虧火亢而吐血衄血者不

可用四肢厥逆而陽虛欲脫者不可用總之元氣虛極者毫不可泄陰陽下竭者毫不可升眞火虧敗者毫不可用淸涼今人但知補中益氣湯可以補虛一槩尚之而不知病當緊急則此時幾微關係判於一舉指之間而纖微不可紊誤者正此類也余亦安能以筆盡哉

石室祕籙

臣陳士鐸著

論治法

塞治法因其塞而塞之也如人氣虛中滿是也凡人氣虛多不能食食則倒飽人以爲多食之故以香砂枳實等丸消導之其初未嘗不少快久則腹飽又消之久久不已必變成中滿之證腹高而大氣喘而粗人又以爲鼓脹也用牽牛甘遂等藥以利導其水水未必去而鼓脹益甚又以爲藥之不勝也又用大黃巴豆之藥下之又不應以爲風邪襲之又以辛散之品如龍膽草茵陳之類雜然紛進不至死不止猶然開鬼門泄淨府紛紛議論皆操刀下石之徒也誰知初起之時即以補胃健脾之藥先爲速治何至此哉

初用之方人參蘿蔔子各一錢白朮二錢陳皮三分甘草一分薏仁芡實各五錢山藥茯苓各三錢水煎服此方絕不去消導而專以補爲事世醫未有不笑其迂以爲此等藥服之必增脹滿下喉之時實覺微飽世醫乃誇示曰吾言之驗如此而病人與病家幷諸親友俱歎世醫而咎此方之迂而害事詎知下喉之時雖覺微脹入腹之後漸覺開爽連服數劑不特開爽而幷無脹滿之疾矣蓋中滿之疾原是氣虛而成不補其虛脹何從解補藥之中加以蘿蔔子分消其脹氣使人參不助邪而助正況又有茯苓薏仁芡實之類純是去濕之藥則水道自行而上壅可免尤妙用甘草一分以引羣藥之入於滿處蓋中滿最忌甘草而此偏用之成功於忌之中也

中滿固是塞證飽食填塞於胷膛亦是塞證也人皆用香砂厚朴消之而予獨不然方用人參白朮神麴各三錢陳皮肉桂各一錢甘草一分水煎服此方妙在全不去消食反助其飽悶之氣誰知飽食而不消者由於胃氣之不足也我補其胃氣則胃強自能運

化而入於脾中又何必用厚朴枳殼之消導哉此亦塞治之法也

暫治者乃强壯之人素不服藥一朝得病用藥暫治之如傷食作痛胷腹飽悶䐜脹欲嘔而不得方用白术麥芽各三錢枳殼二錢山楂三十粒砂仁三粒半夏甘草厚朴各一錢水煎服此方純是攻藥而不至消氣妙在用白术爲君故不消氣而轉能消食然亦因其形壯體健而用之倘體弱久病之人不可也

王治者不可以霸道治之而用王道治法爲必全而尊尚之也如人病已將愈不過飲食難消胷膈不快或吐酸或溏泄或夜臥不寧或日間潮熱俱宜王道治之而不可以偏師取勝方用人參一錢茯苓白术各二錢甘草陳皮各五分半夏七分此六君子湯也最妙者有熱加黃芩三分夜不睡加黃連肉桂各五分潮熱加柴胡丹皮各一錢地骨皮三錢有食覺胷中少痛加枳殼五分山楂十粒有痰加白芥子一錢欬嗽加桔梗一錢下泄水加車前一錢腹中痛加肉桂五分白芍一錢頭運加蔓荆子川芎各一錢上吐

酸水加白芍三錢倍用茯苓飽滿加枳殼五分所謂王道蕩蕩看之平常用之奇妙日計不足歲計有餘何必用參至兩計加桂附以出奇哉此王道之法也初治者首先宜以此治之也如傷食之證心中飽悶見食則惡食之轉痛此傷食也卽以消食藥服之立已方用白朮茯苓半夏枳殼各一錢山樝二十粒麥芽穀芽各二錢神麴三分甘草五分砂仁三粒水煎服一劑快二劑愈

方

黑圓子（濟生下同）

治中脘有宿食吞酸惡心口吐清水噫宿腐氣或心腹疼痛及中虛積聚飧泄赤白痢下

烏梅肉七箇　百草霜三錢　杏仁去皮尖別研
縮砂仁各三七枚　半夏湯泡過七次九枚
巴豆去殼幷油二枚

右爲細末和勻用薄糊爲圓如黍米每服十五圓加至二十圓用熟水送下薑湯亦得更看虛實增

損圓數或因食生冷魚膾得用治中湯送下

如意圓

治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下堅痞兩脅脹滿心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不消久痢赤白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹中一切食癥之疾並皆治之

枳殼去穰　檳榔　橘紅　半夏湯泡七次
蓬朮　京三稜　乾薑炮　黃連去鬚各二兩
巴豆三七粒連殼用

右件除巴豆外剉如豆大用好酢煑乾去巴豆餘藥焙爲細末薄糊爲圓如菉豆大每服十圓加至十五圓用茶清薑湯任下食後臨臥孕婦忌服

阿魏圓

治脾胃怯弱食肉食麪或食生果停滯中焦不能尅化致腹脹疼痛嘔惡不食或痢或祕悉主之

阿魏酒浸化旋用　官桂不見火　蓬朮炮
麥蘗炒　神麯炒　青皮　蘿蔔子炒　乾薑炮
白朮各半兩　百草霜三錢　巴豆去殼油三七箇

右十一味爲細末和勻用薄糊爲圓如菉豆大每服二十圓不拘時薑湯送下麪傷用麪湯送下生果傷用麝香湯送下

強中圓（中藏經下同）

治氣消食益脾胃進飲食

白朮（或蒼朮）　橘紅　乾薑炮　良薑油炒　青皮

右等分同爲細末湯浸蒸餅擣去水和圓如梧子大每服三五十圓

蒙石圓

治脾積滯氣酒食所傷飲食不化惡心嘔逆胷膈不快不思飲食胷腹脹滿臍脅有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰痃癖癥瘕發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑不調裏急後重及十鬲氣虛中有積婦人血氣塊硬悉皆主之

硇砂一兩用米醋三升化開　巴豆霜二兩半二味同入醋煑兩食久　青蒙石半兩研　京三稜一兩醋浸一宿煨二味次入煑半食久入前醋中煑　白麪二兩酒半升化此一味次入煑半食久　大黃

一兩半分三分一生一炒一煨次入煑半食久

木香以下並爲細末　檳榔　肉豆蔻　肉桂

豬牙皂角去皮炙　乾薑炮　丁香　蓬莪朮

芫花醋浸一宿炒微令有煙各一兩　青皮

白豆蔻　好墨燒令八分過各半兩　胡椒

粉霜研各一分

右次第煑了次入木香等一十四味熬成膏圓如菉豆大每服三圓酒飲薑湯雜下

檳榔丸（河間下同）

治飲食不化心腹膨悶

檳榔一錢半　陳皮去白一兩　木香二錢半

牽牛頭末半兩

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服十五丸至二十丸米飲下生薑湯亦可

煑黃丸

治前證兼脅肋虛脹者

雄黃另研一兩　巴豆五錢生用去皮研爛

右二味再研入白麪二兩同再研勻滴水爲丸

如桐子大每服時先煎漿水令沸下藥二十四丸煑三十沸撈入冷漿水中沉冰冷一時下二丸一日二十四丸也加至微利爲度用浸藥水送下此藥治脅下痃癖痛如神

瓜蔕散

瓜蔕　赤小豆各三錢

右爲細末溫水調一錢以吐爲度如傷之大重備急丸獨行丸皆急藥也

金露丸

治氣不下降飲食難消心下痞悶

枳實麩炒五錢　大黃　牽牛頭末　桔梗各二兩

右爲細末燒餅爲丸如桐子大每服三五十丸食後溫水下如常服十丸二十丸甚妙

枳實丸

治氣不下降食難消化常服進食逐飲

枳實麩炒五錢　白朮一兩

右爲細末燒餅爲丸如桐子大每服五十丸米飲下

清六丸（丹溪下同）

去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同用並不單用兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢

六一散一料　紅麴炒半兩（一作二兩半）

右爲末飯丸梧子大每五七十丸白湯下

又方

治氣抑痰倦不思食

扁柏七錢半　陳皮　黃連　黃蘗　半夏

白朮　蒼朮各二兩　香附　白芍各一兩半

右爲末薑汁麪糊丸

又方

治心腹膨脹多食肉所致

南星薑製　半夏　苦蔞仁研和潤各一兩半

香附童便浸一兩　黃連薑炒三兩　蒙石硝煆

蘿蔔子　連麹各半兩　麝少許

右爲末麪糊丸一方加陳皮半兩

又方

治吃麪內傷肚熱頭痛

白术一錢半　白芍　陳皮　蒼术各一錢
茯苓　黃連　人參　甘草各五分
右作一服薑三片煎如口渴加乾葛一錢再調理

補脾丸

白术半斤　蒼术　茯苓　陳皮各三兩
右粥爲丸

紅丸子

治傷食
京三稜　蓬术煨　青皮　陳皮各五兩　胡椒
乾薑炮各三兩
右爲末用醋糊丸如梧子大礬紅爲衣服三十九
食後薑湯下

治中湯

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉
人參　甘草炙　乾薑炮　白术土炒　青皮
陳皮等分
右每服五錢水煎如嘔加半夏等分加丁香減半
夏名丁香溫中湯

葛花解醒湯（東垣）

治一切酒傷

青皮三錢　白朮二錢　橘紅　人參　茯苓

猪苓各一錢半　澤瀉　乾薑　神麴各一錢

木香　白豆蔻　葛花　砂仁各五分

右爲細末每服三錢白湯調下得微汗則病去

仙方內消丸（良方下同）

治酒食過傷脾胃等疾

青皮　陳皮去白　蒼朮米泔浸炒　百草霜

香附　三稜煨　芫花酢炒　破故紙炒　皂角

蓬朮炒　乾漆炒煙盡　官桂去皮各一兩

黑牽牛半斤半生半炒

右爲細末酢糊和丸如梧桐子大每服二十九白湯送下一方有半夏三兩

香蘇散

治宿食留飲積聚中脘噫臭腐氣心腹疼痛或臟腑飧泄並皆治之

香附炒去毛三錢　蒼朮米泔水浸炒　紫蘇葉

陳皮各二錢　甘草一錢半

右作一服水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘時服如頭痛加川芎香白芷

紅砂香附湯

治噫宿腐氣心膨脹滿或時冷疼

香附炒去毛十兩　烏藥五兩　縮砂去殼
粉甘草炒各二兩

右爲細末每服二錢用紫蘇三葉鹽少許煎湯調下不拘時服大便祕用橘皮湯調下

穀神丸

消食健脾益氣進美飲食

人參　縮砂　神麯炒　香附炒去毛　青皮
陳皮　麥蘗炒　枳殼去穰麩炒　三稜煨
蓬朮煨各等分

右爲細末粳米糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心用米飲送下鹽湯下亦可

黑丸子

治中脘有宿食吞酸惡心口吐清水噫宿腐氣或

心腹疼痛及中虛積聚飧泄赤白痢下並皆治之

烏梅肉七箇　百草霜三錢　巴豆去油二枚

杏仁去皮尖　縮砂各三七枚　半夏泡七次九枚

右件爲細末和勻薄糊爲丸如黍米大每服十五丸加至二十丸熟水送下薑湯亦得更看虛實增減丸數或因食生冷魚膾腥腐用治中湯送下

丁香脾積丸

治食積心腹膨脹不得尅化

丁香　木香不見火　巴豆　良薑醋煮各半兩

蓬朮三兩　荆三稜二兩　皂角三大挺燒存性

青皮一兩

右入百草霜三匙同碾爲末麪糊爲丸如麻子大每服十丸至二十丸止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡薑湯下嘔吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡酢湯送下

感應丸

治男子婦人小兒停積宿食冷物不能尅化有傷脾胃或泄瀉臭如抱壞雞子或下痢膿血並皆治

之

杏仁泡去皮尖雙仁者二百四十粒　丁香兩半
百草霜用鄉村人家鍋底上者佳另研細二兩
巴豆七十粒去皮心膜油研如粉　乾薑炮一兩
木香二兩半

右除巴豆百草霜杏仁三味外餘四味杵爲細末同研勻用蠟匱先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾查更以好酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用凡春夏修合清油一兩秋冬用清油一兩半於冷銚內熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末成劑分作小錠子以油單紙裹衣旋丸服餌每服三十丸空心生薑湯送下

五百丸

治宿食留飲積聚中脘噫臭吞酸心腹刺痛

丁香　砂仁　胡椒　巴豆去皮心膜另研
烏梅取肉

右件各一百箇研爲細末和勻蒸餅糊爲丸如菉

豆大每服五七丸食前用白湯送下

丁香爛飯丸

治食傷太陰及治卒心胃痛

丁香　廣朮炮　荊三稜炮　木香各一錢

甘松去土　益智仁　砂仁各三錢　香附半兩

丁香皮　甘草炙各二錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸不拘時滾白湯送下或細嚼下亦可

木香枳朮丸

治強飲食所傷心腹滿悶不快

木香　枳實麩炒各一兩　白朮二兩

右爲細末荷葉煨飯爲丸如梧桐子大每服五十丸食遠白湯送下

麯蘗枳朮丸

治强飲食心腹滿悶不快

神麯炒　麥蘗炒　枳實各一兩　白朮二兩

右爲細末荷葉煨飯爲丸如梧桐子大每服五十丸食遠白湯送下

三黃枳朮丸

治傷肉食濕麵辛辣味厚之物塡塞悶亂不快

黃芩二兩　黃連酒洗　大黃煨　神麴炒

白朮　橘皮各一兩　枳實麩炒半兩

右爲細末湯浸蒸餠爲丸如梧桐子大每服五十丸食遠白湯送下

大枳殼丸

治一切酒食傷胷膈痞悶疼痛飲食不消兩目刺痛嘔逆惡心並皆治之

枳殼麩炒　厚朴薑汁製　茯苓　白朮　人參

半夏　木香　青皮　橘紅　檳榔　荆三稜煨

蓬朮煨　麥蘖微炒　神麴炒各一兩　牽牛炒

大黃各二兩　乾薑半兩

右爲細末薑汁煑糊和丸如梧桐子大每服一百丸食後用生薑湯送下

集香丸

治傷生冷宿食不消

丁皮　茴香　益智　荆三稜　青皮　川楝子

蓬术　陳皮各一兩　巴豆和皮米炒黑去米半兩

右爲細末酢糊爲丸如菉豆大每服五七十丸食前用生薑湯送下

紫沉消積丸

治久積伏滯胷膈膨脹心腹刺痛飲食不化及治婦人血氣疼痛

沉香　阿魏酢化　巴豆取霜各一兩　硇砂

硫黃研　青皮　良薑　檳榔　官桂去皮

人參　木香　胡椒各四兩　丁香　丹砂研

乾薑炮各二兩

右將沉香阿魏巴豆硇砂四味同研用蜜一升酒二盞共熬成膏以磁盒貯之再將餘藥搗爲細末以膏和搗千百杵丸如菉豆大每服五七丸不拘時溫橘皮湯送下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下一方有沒藥一兩

法製生薑散

治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心不欲飲食

生薑切片用青鹽摻過再以白麪拌淨焙乾十兩

官桂去皮　青皮去白　陳皮　半夏薑汁製
白术各一兩　蓽澄茄　丁香　木香各二兩半
白豆蔻　白茯苓　砂仁各一兩半　葛根

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下

木香丸

治積聚氣脾胃虛冷宿食不消心腹氣滯脹滿疼痛

木香　桂心　白术　赤茯苓　人參各三分
乾薑炮　桔梗　吳萸湯泡焙　當歸各半兩
大黃炒　神麴炒　訶黎勒煨去核　陳皮去白
麥蘗炒　檳榔各一兩

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前溫酒送下

小分氣丸

治久積氣塊宿食不消胷膈痞悶痰逆惡心不思飲食臍腹刺痛酢心噎塞

木香　雄黃研各一兩　青皮去白炒　乾薑炮
陳皮去白　楝實炒　檳榔各半兩　蓬术酢浸

巴豆去皮心膜去油　半夏泡　大黃煨各一分

右爲細末酢煑麪糊和丸如菉豆大每服五丸加至七丸食後生薑湯送下

益智散

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消

益智去皮炒　青皮去白　陳皮去白　白茯苓
荊三稜煨　蓬朮煨各一兩　木香一分　人參
甘草炙各半兩　厚朴去皮薑汁塗炙一兩一分

右爲細末每服一錢入鹽少許沸湯不拘時點服

快活丸

治宿食不消致傷脾胃

生大黃　檳榔　陳皮各一兩　青皮一兩半
三稜酢煑　蘿蔔子炒　香附炒　蓬朮各四兩
麥蘖用巴豆三錢同炒黃去巴豆　黑丑各半斤

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服七丸食前用淡生薑湯送下

破積導飲丸

治宿食不消心腹痞悶及治積塊堅硬

牽牛頭末六錢　木香　檳榔　青皮去白
陳皮去白　枳殼炒　枳實炒　荆三稜煨
蓬术煨　半夏湯洗　茯苓去皮　乾生薑
神麴炒

右爲細末生薑汁煑糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫生薑湯送下

和中丸（必讀下同）

開胃進食

人參　白术各三兩　乾薑　甘草　陳皮
木瓜去穰各一兩

右爲末水丸白湯送三錢

七珍散

開胃養氣補脾進食

人參　白术酒炒各一兩半　黃芪蜜炙　茯苓
陳黃米炒焦　砂仁炒各一兩　甘草薑汁炒五錢

右爲末每服三錢薑棗湯送下

二神丸

破故紙補腎爲癸水肉豆蔻補脾爲戊土戊癸化

火進食妙方

破故紙炒四兩　肉豆蔻生二兩

右爲末肥棗四十九枚生薑四兩切同煑爛去薑取棗去皮核研膏爲丸桐子大每服三錢鹽湯下

育氣丸

木香　丁香　藿香　人參　白术　茯苓

砂仁　白蔻　蓽澄茄　炙草　白檀香各半兩

山藥一兩　橘紅　青皮去白各二錢半

右爲末每服二錢木瓜湯調下

資生丸

白术泔浸土蒸九次曬九次切片炒黃　薏仁炒

人參去蘆飯上蒸熟各三兩　橘紅　山楂肉蒸

神麴炒各二兩　山藥炒　麥芽炒　芡實炒

茯苓去皮飛去筋乳拌飯上蒸曬乾各一兩半

黃連薑汁炒枯　白豆蔻　澤瀉炒各三錢

桔梗炒　藿香洗　甘草炙各五錢　蓮肉去心

白扁豆炒去殼各一兩

右爲末蜜丸每丸二錢每服一丸淡薑湯磨服

右歸飲（景岳全書下同）

治命門火衰不能食而瘦者

熟地二三錢或加至一二兩　山茱萸一錢　山藥炒　枸杞　杜仲薑製各二錢　甘草炙　肉桂各一二錢　製附子二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸丸

治前證

大懷熟地八兩　山茱萸微炒　當歸各三兩（便溏勿用）　肉桂二兩漸可加至四兩　山藥炒　枸杞微炒　杜仲薑汁炒　鹿角膠炒珠　菟絲子製各四兩　製附子自二兩漸可加至五六兩

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

一陰煎

治有火之甚善食而瘦者

熟地三五錢　牛膝一錢半　甘草一錢　生地

芍藥　麥冬　丹參各二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

二陰煎

治水不制火致有前證

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　元參

茯苓　木通各一錢五分　黃連或一二錢

生甘草一錢

水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠
服

四陰煎

治陰虛相火盛致有前證

生地二三錢　茯苓一錢半　麥冬　白芍藥

百合　沙參各二錢　生甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

和胃飲

治偶傷生冷油膩等物

陳皮　厚朴各一錢五分　乾薑炮一二錢

炙甘草一錢

水一鍾半煎七分溫服

排氣飲

治氣逆食滯脹痛等證

陳皮　枳殼　藿香各一錢五分　厚朴一錢

木香七分或一錢　香附　澤瀉　烏藥各二錢

水一鍾半煎七分熱服

小和中飲

治病後胃口不開飲食不進

陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　甘草五分

山楂　扁豆炒各二錢

水一鍾半加生薑三五片煎服

芍藥枳朮丸

治縱肆口腹以致胃脘不清胷腹脹痛等證

白朮麪炒　赤芍藥酒炒各二兩　枳實麪炒

陳皮各一兩

荷葉煑黃老米粥爲丸桐子大米飲或滾白湯任

下百餘丸

神香散

治偶傷生冷油膩以致吐瀉脹痛等證

丁香　白豆蔻（砂仁亦可）

二味等分爲末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘

赤金豆

治食停下焦痛脹等證

巴霜去皮膜略去油一錢半　生附子切略炒燥

皂角炒微焦　硃砂爲衣各二錢　輕粉一錢

丁香　木香　天竺黃各三錢

右爲末酢浸蒸餅爲丸蘿蔔子大硃砂爲衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑酢茶蜜茴香史君煎湯爲引送下若利多不止可飲冷水一二口卽止蓋此藥得熱則行得冷則止也

四味回陽飲

治飲食傷脾吐瀉元陽欲脫者

人參一二兩　製附子　炮乾薑各二三錢

炙甘草一二錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

理陰煎

治相火虛衰不能生土致不思食食亦不化等證

熟地三五七錢或一二兩　乾薑炒黃一二三錢

當歸二三錢或五七錢　炙草　或加桂各一二錢

水二鍾煎七八分熱服

養中煎

治脾胃虛寒不能飲食者

人參一二三錢　白扁豆炒二三錢　山藥炒

茯苓各二錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲

治飲食傷脾吐瀉已甚者

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　乾薑炒焦一二三錢　炙甘草

陳皮各一錢（或不用）　當歸一二錢（滑泄者勿用）

水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

治前證

人參二三錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢

白朮　茯苓各二錢

水一鍾半煎服

胃關煎

治前證虛寒甚者

熟地三五錢或一兩　炙甘草一二錢　山藥炒

白扁豆炒各二錢　吳茱萸製五七分　焦乾薑

白朮炒各一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

抑扶煎

治偶傷生冷油膩以致吐瀉脹痛等證

厚朴　陳皮　烏藥各一錢五分　炙甘草一錢

猪苓　瀉澤各二錢　乾薑炮一二錢　吳萸五分

水一鍾半煎七分食遠溫服

五德丸

治酒質傷脾泄瀉者

補骨脂酒炒　乾薑炒各四兩　吳茱萸製

木香　北五味各二兩（或以肉豆蔻或烏藥代之）

右湯浸蒸餅丸桐子大每服六七十丸甚者百餘丸滾白湯或人參湯或米湯俱可下

九炁丹

治前證虛寒甚者

熟地八兩　製附子四兩　肉豆蔻麪煨　焦薑

吳萸　補骨脂酒炒　蓽茇炒　五味炒各二兩

粉甘草炒一兩

煉蜜爲丸或山藥糊丸如桐子大每服六七十丸或百丸滾白湯下

單方

燒酒醉死急以新汲水浸其髮外以故帛浸濕貼其胷膈仍細細灌之至甦乃已（集簡方）

飲酒齒痛井水頻含漱之（直指方）

酒肉過多脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下二三次即如湯沃雪也（簡便方）

腹中食積綠礬二兩研米酢一大杯磁器煎之柳條攪成膏入赤脚烏一兩研丸菉豆大每空心溫酒下五丸（聖惠）

五飲酒癖一留飲水停心下二癖飲水在兩脅下三痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆由飲食胃寒或飲茶過多致此倍朮丸用白朮一斤乾薑炮桂心各半斤爲末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸（局方）

食生米男子婦人因食生米留滯腸胃遂致生蟲久則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生用蒼朮米泔水浸一夜剉焙爲末蒸餅丸梧子大每服五十丸食前米飲下日三服益昌伶人劉淸嘯一娼名曰花翠年逾笄病此惠民局監趙尹以此治之俱兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受濕則穀不磨而成此疾蒼朮能去濕暖胃消穀也（經驗方）

酒醉不醒九月九日眞菊花爲末飲服方寸匕（外臺）

嗜酒不已氈中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之卽不嗜（藏器）

酒積酒毒服此卽解天南星丸用端正天南星一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆泥固濟一夜取出酒和水洗淨切片焙乾爲末入硃砂末一兩薑

汁麪糊丸梧子大每服五十丸薑湯下蔡丞相呂丞相嘗用有驗（家藏方）

胷膈食積牽牛末一兩巴豆霜三箇研末水丸梧子大每服二三十丸食後隨所傷湯下（子和）

酒痰欬嗽用此救肺苦蔞仁青黛等分研末薑汁蜜丸芡子大每噙一丸（丹溪）

飲酒發熱即上方研膏日食數匙一男子年二十病此服之而愈（摘元）

飲酒痰癖兩脅脹滿時復嘔吐腹中水聲苦蔞實去殼焙一兩神麯半兩爲末每服二錢葱白湯下（聖惠）

酒醉不醒生葛汁飲二升便愈（千金 下同）

飲酒咽爛口舌生瘡大麻仁一升黃芩二兩爲末蜜丸含之

食飽煩脹但欲臥者大麥麪炒微香每白湯服方寸匕佳（肘后方）

好喫生米久則成癥不得米則吐出清水得米卽止米不消化久亦斃人用白米五合雞屎一升同炒焦爲末水一升頓服少時吐出癥如研米汁或白沫淡

水乃愈也（千金）

大醉不堪連日病困者蔓菁菜入少米煑熟去滓冷飲之良（肘后方）

食物作酸蘿蔔生嚼數片或生菜嚼之亦佳絕妙乾者熟者鹽醃者及人胃冷者皆不效（集簡方）

開胃進食茴香二兩生薑四兩同搗勻入淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒黃焦爲末酒糊丸梧子大每服十丸至二十五丸溫酒下（經驗方）

冷勞減食漸至黑瘦用桃仁五百顆吳茱萸三兩同入鐵鐺中微火炒一炊久將桃仁去皮微黃色卽漸加火待微烟出卽乘熱收入新瓶內厚紙封住勿令洩氣每日空心取桃仁二十粒去皮嚼之以溫酒下至重者服至百粒愈（聖惠）

食桃成病桃梟燒灰二錢水服取吐卽愈（備急）

食肉不消山樝肉四兩水煑食之幷飲其汁（簡便方）

凡男女脾虛腹薄食不消化面上黑黯者用乾柿三斤酥一斤蜜半斤以酥蜜煎勻下柿煑十餘沸用不津器貯之每日空腹食三五枚甚良（食療）

化食消痰胷中熱氣用橘皮半兩微焙爲末水煎代茶細呷（心鏡）

好食茶葉面黃每日食榧子七枚以愈爲度（簡便方下同）

食茶面黃川椒紅炒碾末糊丸梧子大每服十丸茶湯下

嗜茶成癖新鞋盛茶令滿任意食盡再盛一鞋如此三度自不喫也男用女鞋女用男鞋（集簡方）

下氣消食訶黎一枚爲末瓦器中水一大升煎三兩沸下藥更煎三五沸如麴塵色入鹽飲之（心鏡）

脾胃虛弱不思飲食食下不化病似翻胃噎膈淸明取柳枝一大把熬湯煮小米作飯酒麪滾成珠子曬乾袋懸風處每用燒滾水隨意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可頓食之久則麪散不粘矣名曰絡索米（簡便方）

酒多致病長壽仙人柳曬乾爲末每服一錢溫酒調下（易簡方）

脾胃有蟲食即作痛面黃無色以石州蕪荑仁二兩和麪炒黃色爲末非時米飲服二錢匕（千金下同）

寒澼宿食不消大便閉塞巴豆仁一升淸酒五升煑三日三夜研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大每服一丸水下欲吐者二丸

飲酒頭痛竹茹二兩水五升煑三升納雞子三枚煑三沸食之

飲酒辟氣乾蔓菁根二七枚蒸三遍碾末酒後水服二錢即無酒氣也

斷酒不飲以酒浸氈屜一宿平旦飲得吐即止也

消導酒積雞膍胵乾葛爲末等分麪糊丸梧子大每服五十丸酒下（袖珍方）

化食消氣五靈脂一兩木香半兩巴豆四十粒煨熟去油爲末糊丸菉豆大每白湯下五丸（普濟下同）

酒積黃腫五靈脂末一兩入麝香少許飯丸小豆大每米飲下一丸

中滿腹脹旦食不能暮食用不著鹽水豬血漉去水曬乾爲末酒服取泄甚效（李樓奇方）

食即汗出脾胃虛也豬肝一斤薄切焙乾爲末煑白粥布絞汁衆手丸梧子大每飲下五十丸日五

脾虛吐食羊肉半斤作生以蒜薤醬豉五味和拌空腹食之（心鏡）

食物入鼻介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨出也（外臺）

飲酒欲斷刮馬汗和酒服之（千金）

飲酒過度欲至穿腸者用驢蹄硬處削下水煑濃汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方有效（經驗方）

脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱椒醬調炙熟空心冷食（養老）

飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄用嫩鹿茸酥炙肉蓯蓉煨一兩生麝香五分爲末陳白米飯丸梧子大每米飲下五十丸名香茸丸（普濟）

食後喜嘔鹿角燒灰二兩人參一兩爲末薑湯服方寸匕日三（肘后方）

鍼灸

甲乙經曰傷食脅下滿不能展轉反側目青而嘔期門主之

腹滿不能食刺脊中

腹中氣脹引脊痛食飲而身羸瘦名曰食㑊先取脾俞後取季脅

寒中傷飽食飲不化五臟䐜滿脹小腹胷脅榰滿脹則生百病上脘主之

腹脹腸鳴胃中傷飽食飲不化中脘主之

食飲不化入腹還出下脘主之

腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三里主之

腹滿胃中有熱不嗜食懸鍾主之

大腸實則腰背痛痺寒轉筋頭眩痛虛則鼻衄癲疾腰痛濈濈然汗出令人欲食而走承筋主之取脚下三折橫視盛者出血

千金方曰豐隆主不能食

石門主不欲食穀入不化

天樞厲兌內庭主食不化不嗜食俠臍急

維道主三焦有水氣不能食

中封主身黃有微熱不嗜食

然谷內庭脾俞主不嗜食

胃腧腎腧主胃中寒脹食多身瘦羸

大腸腧周榮主食不下喜飲

陽綱期門少商勞宮主飲食不下

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷飽身黃酸疼羸瘦

中庭中府主膈寒食不下嘔吐還出

巨闕主膈中不利

中極主饑不能食

上脘中脘主寒中傷飽食飲不化

凡飲食不化入腹還出先取下脘後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

東垣十書曰全不思食取然谷出血立饑

饑不能食飲食不下取章門期門

胃病飲食不下取三里

吐宿汁吞酸取章門神光

三焦停水氣攻不食身黃微熱胃中有寒故也取維道中封胃俞腎俞

饑不能食飲食不下嘔而雷鳴取大迎中極食竇

資生方曰飲食不多心腹膨脹面色萎黃世謂脾腎病宜灸中脘

食多身瘦名曰食晦先取脾俞後取章門太倉

醫學綱目曰胃弱不思飲食腸鳴腹痛食亦不化取三里三陰交

三焦邪熱不嗜飲食關元一分沿皮向後三分灸之

導引

保生祕要曰傷食嘔吐導引法按寅卯辰候空心披衣起牀正身直立雙手用力挈兩肘髆脚尖著地脚跟雙懸起倒力春二九之數醉飽勿行恐傷臟腑運功先呼濁次吸清歸臍閉口存心下丹田半晌運臍自然安

飽食醉後因怒下血運功定神存元氣顧臍念戒多怒有食必須調節病自卽安

食積致嗽外法摩臍輪使食漸次下去須寬性平胃

膈而氣下降即愈

醫案

儒門事親曰戴人出遊道經陽夏問一舊友其人病已危矣戴人往視之其人曰我別無病三年前當隆暑時出村野有以煮酒饋予者適村落無湯器冷飲數升便覺左脅下悶漸痛結硬至今不散鍼灸磨藥殊不得效戴人診其兩手脈俱沉實而有力先以獨聖散吐之一涌二三升色如煮酒香氣不變後服和脾散去濕藥五七日百脈沖和始知鍼灸無功徒增苦楚矣

一緇侶好茶成癖積在左脅戴人曰此與肥氣頗同然痎瘧不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手脉沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以水如意揃之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

丹溪心法曰一女子在家因事不如意鬱結在脾半年不食每日食棗數枚適喜饅頭亦能少食惟深惡粥飯予診其脾氣非枳實不能散遂以溫膽湯去竹茹與服經三月服二百貼而愈

一女子年二十餘許婚後夫遠出二年不歸女子病重不食困臥如痴他無所苦諸醫不效予往治之見女向裏牀而睡形體羸瘦余思之此氣結病也藥不能治得怒可解予往激其怒掌其面三且責以不得有外思女果大怒而哭待其哭一二時許令其父母解之進藥二貼即欲食矣余謂其父母曰雖愈必得喜方可解若再思則結氣必復至矣其父因僞作其

夫有書囘約日成婚一月餘其夫果歸病得全愈

醫學綱目曰秦生好服三生茶及冷物成積而痼寒脉非浮非沉上下內外按舉極有力堅而不柔觸指突出膚表往來不可以至數名縱橫不可以巨細狀此陰證鼓擊脉也一身流行之火萃於胷中寒氣逼之故搏大有力與真武四逆理中等湯丸佐以芍藥茴香使不僭上每日服百丸夜八十丸至夜出汗而愈

唐臣嗜冷食遂成陰證脉遲七八至一止後僅三至余亟與溫劑數服四五日不解遂續進三服一日脉生大汗而解

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用尅伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食設或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服慎勿多服余嘗治翁氏久瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令粥多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈

薛己醫按曰趙吏部患吐物出皆酸味其脈氣口大於人迎者二三倍僚友速余投劑余曰此實邪在上候其吐盡酸味不藥自愈翊早吐止而安

一婦人脾胃虛弱飲食素少忽痰湧氣喘頭搖目劄手揚足擲難以候脈視其面色黃中見青此肝木乘脾土用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏調理而痊

光祿高署丞脾胃素虛因飲食勞倦腹痛胷痞誤用大黃等藥下之譫語煩躁頭痛喘汗吐瀉頻頻時或昏憒脈大而無倫次用六君子加炮薑四劑而安但倦怠少食口乾發熱六脈浮數欲用瀉火之藥余曰不時發熱是無火也脈浮大是血虛也脈浮虛是氣虛也此因胃虛五臟虧損虛證發見服補胃之劑諸證悉退

廷評張汝翰胷膈作痞飲食難化服枳朮丸久而形體消瘦發熱口乾脈浮大而微用補中益氣加薑桂諸證悉退惟見脾胃虛寒遂用八味丸補命門火不月而飲食進三月而形體充此證若不用前丸多變

腹脹喘促腿足浮腫小便淋瀝等證急用濟生加減腎氣丸亦有得生者

一婦人飲食無過椀許非大便不實必吞酸噯腐或用二陳黃連更加內熱作嘔余謂東垣先生云邪熱不殺穀此脾胃虛弱末傳寒中以六君加炮薑木香數劑胃氣漸復飲食漸進又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因怒飲食頓少元氣頓怯更加發熱誠似實火脉洪大而虛兩尺如無用益氣湯八味丸兩月餘諸證悉愈

光祿鄭子涇面白神勞食少難化所服皆二陳山楂枳實之類形體日瘦飲食日減余謂此脾土虛寒之證法當補土之母彼不信乃徑消尅以致不起

胡濟之場屋不利胷膈膨悶飲食無味服枳朮丸不時作嘔用二陳黃連枳實痰湧氣促加紫蘇枳殼喘嗽腹脹加厚朴腹皮小便不利加檳榔蓬朮泄瀉腹痛悉屬虛寒用六君加薑桂二劑不應更加附子一錢二劑稍退數劑十愈六七乃以八味丸全愈

一婦人年三十餘忽不進飲食日飲清茶三五椀幷

少用水果三年餘矣經行每次過期而少余以爲脾氣鬱結用歸脾加吳茱萸不數劑而飲食如常若人脾胃虛而不飲食當以四神丸治之

一婦人年踰二十不進飲食二年矣日飲清茶果品之類面部微黃浮腫形體如常仍能步履但體倦怠肝脾二脉弦浮按之微而結滯余用六君加木香吳茱下痰積甚多飲食頓進形體始瘦臥牀月餘仍服六君之類而安

舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便不實此腸胃濕痰壅滯用二陳芩連山梔枳實乾葛澤瀉升麻一劑吐痰甚多大便始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安但如此稟厚者不多耳

太常邊華泉嘔吐不食腹痛後重自用大黃等藥一劑腹痛益甚自汗發熱昏憒脉大余用參朮各一兩炙甘草炮薑各三錢升麻一錢一鍾而甦又用補中益氣加炮薑二劑而愈

醫宗必讀曰文學倪念嵐屢勞積鬱胷膈飽悶不能飲食服消食之劑不效改而理氣又改而行痰又改

而開鬱又改而清火半載之間藥餌百劑而病勢日增惶懼不知所出始來求治於余余先簡其方案次診其六脈喟然歎曰脈大而軟兩尺如絲明是火衰不能生土反以伐氣寒凉投之何異於人既入井而又下石乎遂以六君子湯加益智乾薑肉桂各一錢十劑而少甦然食甚少也余勸以加附子一錢兼用八味丸調補凡百餘日而復其居處之常

新安程幼安食少腹悶食粥者久之偶食蒸餅遂發熱作渴頭痛嘔逆或以傷寒治之或以化食破氣之藥投之俱不效勢甚危迫及余診之謂其兄季涵曰脈無停滯之象按之軟且濇是脾土大虛之診也法當以參朮理之衆皆不然余曰病勢已亟豈容再誤遂以四君子湯加沉香炮薑與之數劑而減一月而安

寓意草曰錢小魯奕秋之徒也兼善飲每奕必飲飲必醉歲無虛日辛巳秋浩飲晚歸嘔吐寒熱兼作骨節煩疼醫以時行感冒表散藥治之不愈更醫知為酒毒於寒涼藥中用熱藥為鄉導治之亦不愈臥牀

二十餘日始請余診其脉洪大促急身耎著蓆不能動展左腿痛如刀刺鼻煤從病起至是總未大便此癰疽之候也歸語兩門人王生欣然有得曰迄今燥金司令酒客素傷濕熱至此而發金盛則木衰是以筋骨疼痛而不能起牀臟燥則腑亦燥是以津液乾枯而大腸失其潤以清金潤燥治之可矣吳生曰不然酒毒大發腸胃如焚能俟掘井取水乎是必以大下爲急也余曰下法果勝但酒客胃氣素爲多嘔所傷藥入胃中必致上湧不能下達即敷臍導腸等法無所用之掘井固難開渠亦不易奈何奈何吾爲子輩更開一竇夫酒者淸冽之物不隨濁穢下行惟喜滲入者也滲入之區先從胃入膽膽爲淸淨之腑同氣相求故也然膽之攝受無幾其次從胃入腸膀胱滲之化溺爲獨多焉迨至化溺則所存者酒之餘質其烈性實惟膽獨當之每見善飲者必淺斟緩酌以俟腹中之滲若連飛數觥有傾囊而出耳是以酒至半酣雖儒夫有揮拳罵座之膽雖寠人有千金一擲之膽雖捐士有鑽穴踰牆之膽甚至兇徒有撫劍殺

人之膽以及放浪形骸之流且有一飲數斛不顧餘生之膽以小魯之赤貧而膽不喪落者夫非借資於酒乎其受病實有較他人不同者蓋膽之腑原無輸瀉膽之熱他人可移於腦濁涕從鼻竅源源而出乃少殺其勢若小魯則陽分之陽過旺陽分之陰甚衰髮鬢全無直似南方不毛之地熱也極矣肯受膽之移熱乎幸其頭間多汗腦熱暗洩不爲大患乃膽熱旣無可宣又繼以酒之熱時之燥熱淫內熾脉見促急幾何不至極憊耶故膽之熱汁滿而溢出於外以漸滲於經絡則身目皆黃爲酒癉之病以其滲而出也可轉驅而納諸膀胱從溺道而消也今獨攻環跳之穴則在膽之本屬無可驅矣且其步履素爲此穴所苦受傷已久氣離血散熱邪瀰漫留連服藥縱多有拒而不納耳何能取效卽欲針之此久傷之穴有難於針瀉者設遇良工如古人輩將何法以處此乎吾更有慮焉有身以後全賴穀氣充養穀氣卽元氣也穀入素少之人又卽藉酒爲元氣今以病而廢飲何所恃爲久世之資耶吾誦思一法先搐腦中黃水

出鼻次針膽穴之絡腦間者數處務期膽中之熱移從腦鼻而出庶乎環跳穴中結邪漸運而腸胃之枯槁漸回然後以瀉膽熱之藥入酒中每日仍痛飲一醉飲法同而酒性異始得陰行而妙其用蓋其以生平之偏造爲堅壘必藉酒轉爲鄉導乃克有濟也豈清金潤燥與下奪之法能了其局乎兩生踴躍曰蒙誨治法令人心地開朗請筆之以誌一堂授受之快錄此付渠子令送商顧幼疏孝廉求救小魯竟阻之或以余言爲不然耶

景岳全書曰一上舍年及三旬因午刻食水煮麪角將至初更食及小腹下至右角間遂停積不行而堅突如拳大如鵝卵其痛之劇莫可名狀余爲治之察其明係麪積顯而無疑然計其已入大腸此正通則不痛之證也乃與木香檳榔丸連下二三次其痛如故因疑藥力之緩猶未及病乃更投神祐丸以瀉之又不效余謂此必藥性皆寒故滯而不行也因再投備急丸雖連得大瀉而堅痛毫不爲解斯時也余計窮矣因潛測其由不過因麪豈無所以制之今旣逐

之不及使非藉氣以行之不可也且計麵毒非大蒜不殺氣滯非木香不行又其滯深道遠非精銳之嚮導不能達乃用火酒磨木香令其嚼生蒜一瓣而以香酒送之一服後覺痛稍減三四服後痛漸止而食漸進方得全愈然雖痛止食進而小腹之塊仍在後至半年許始得消盡由是知欲消食滯卽大黃巴豆猶有所不能及而推宜行氣爲先也且知飲食下行之道乃必由小腹下右角間而後出於廣腸此自古無人言及者故幷筆之用以廣人之聞見

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十六卷目錄

醫部彙考三百十六
積聚門一
黃帝素問（五藏生成篇　氣厥論　腹中論　奇病論　大奇論　四時刺逆從論）
靈樞經（邪氣藏腑病形篇　五變篇　本藏篇　水脹篇　百病始生篇）
扁鵲難經（五臟攸分）
張機金匱要略（病脈證治）
華佗中藏經（積聚癥瘕雜蟲）

孫思邈千金方（證分陰陽）

嚴用和濟生方（總論）

劉完素六書（總論證治）

張從政儒門事親（治同鬱斷）

張潔古活法機要（養正邪自除）

朱震亨心法（證治）

羅天益衛生寶鑑（論治　食物所成）

戴思恭證治要訣（論證治）

藝術典第三百三十六卷

醫部彙考三百十六

積聚門一

黃帝素問

五臟生成篇

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四支汗出當風

（註）腹中脾土之郛郭也四支汗出當風則風濕內乘於脾而爲積氣蓋風木之邪內干脾土濕與陰

土同氣相感故留聚而爲積也脾氣不能灌漑於四旁則逆於中而爲厥氣矣

氣厥論

小腸移熱於大腸爲虙瘕爲沉

註 瘕者假也假津液而爲聚汁也蓋小腸主液大腸主津小腸移熱於大腸則津液留聚而爲伏瘕矣

腹中論

帝曰病有少腹盛上下左右皆有根此爲何病可治不岐伯曰病名曰伏梁帝曰伏梁因何而得之岐伯曰裹大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死帝曰何以然岐伯曰此下則因陰必下膿血上則迫胃脘生鬲俠胃脘內癰此久病也難治居齊上爲逆居齊下爲從勿動亟奪論在刺法中

註 上下左右皆有根此病在血分有脈絡之連絡於上下四旁也不可治者不可治以按摩也如急切欲其解散而按摩之必致痛而欲死蓋有形之邪不易散也此下謂少腹陰前後二陰也此因陰

中必下膿血循經而上則迫及胃脘生鬲俠胃脘內癰以致畱積膿血於腸胃之外而如囊裹之大也臍上乃腹中之氣分故爲逆臍下乃胞中之血分易於行泄故爲從勿動者不可按摩引動也亟當迎而奪之

帝曰人有身體髀股胻皆腫環齊而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於肓肓之原在齊下故環齊而痛也不可動之動之爲水溺澀之病

註氣行於肌腠之間是以身體股胻皆腫此風邪傷氣而畱於臍腹之間故曰風根風邪之氣充溢於大腸之外而畱著於肓正在臍下故遶臍而痛也不可妄攻以鼓動其水水溢於上則小便爲之不利矣

奇病論

帝曰病脅下滿氣逆二三歲不已是爲何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積爲導引服藥藥不能獨治也

註　肺主氣而司呼吸定息故肺之積曰息積漸積而成是以二三歲不已此病腹中有形不可灸刺當日用導引之功調和之藥二者並行斯病可愈若止用藥而不導引則藥不能以獨治也

大奇論

腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆爲瘕

註　小急虛寒之脉臟氣有所畱聚故脉見如此

三陽急爲瘕

註　病在三陽之氣者爲瘕

四時刺逆從論

厥陰濇則病少腹積氣少陰濇則病積溲血太陰濇則病積心腹時滿陽明濇則病積時善驚太陽濇則病積善時巔疾少陽濇則病積時筋急目痛

註　濇者多血少氣微有寒血病謂之積蓋血多而凝泣故成積也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脉微緩爲伏梁在心下上下行時唾血

註　伏梁乃心下有餘之積故微主邪薄於心下心主血熱則上溢故時唾血

脾脉微大爲腹裏大膿血在腸胃之外

註　大乃太過腹裏大膿血有餘之積聚也

肝脉微急爲肥氣在脅下若覆杯微緩爲水瘕痺

註　肝苦急故微急爲肥氣在脅下若覆杯皆有餘之氣也水瘕痺者亦食飲之所積也

肺脉滑盛爲息賁上氣

註　滑主陽氣盛故爲息賁上氣

五變篇

黃帝曰人之善病腸中積聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃傷脾胃之間寒溫不次邪氣稍至稸積留止大聚乃起

註　津液血氣腸胃之所生也腸胃惡則邪氣留止而成積聚乃傷脾胃之間若再飲食之寒溫不節邪氣稍至卽畜積而大聚乃起

本臟篇

肝高則上支賁切脅悗爲息賁

註　肝脈貫膈上注肺故上支賁切脅悗爲息賁

水脹篇

黃帝曰腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得營因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離臟按之則堅推之則移月事以時下此其候也

註　寒氣客於腸外與衛氣相搏則衛氣不得營行矣因有所繫癖而內著者此無形之氣相搏於腸外空郭之中而著於有形之膏膜也是以血肉之惡氣乃起瘜肉乃生而成此覃久則離於臟腑之脂膜如懷子之虛懸按之則堅推之則移不涉於臟腑故月事以時下此其候也

黃帝曰石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衃以畱止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下

註 寒氣客於子門則子門閉而胞中之血當瀉不瀉留積而成衃塊日以益大狀如懷子血留胞中故月事不以時下覃瘕皆生於女子治之者可導而下之

百病始生篇

黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫泆不可勝數

註 此言百病始生無非外感內傷止此上中下三部之分至其浸淫流泆則變不可勝數也

黃帝曰余固不能數故問先師願卒聞其道岐伯曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人此必因虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形兩實相逢衆人肉

堅其中於虛邪也因於天時與其身形參以虛實大病乃成氣有定舍因處爲名上下中外分爲三員

註　虛風者春時之風從西方來夏時之風從北方來此五行不正之氣故傷人之形若人氣不虛雖遇虛風不能傷人故必以身之虛逢天之虛兩虛相搏乃客於形非比衆人之肉堅也三員如下文虛邪中人病因表也積聚之已成病因內也情慾之傷臟病在陰也卽內外三部之謂

是故虛邪之中人也始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去則傳舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經乃代留而不去傳舍於經在經之時洒淅喜驚留而不去傳舍於輸在輸之時六經不通四肢則肢節痛腰脊乃强留而不去傳舍於伏衝之脈在伏衝之時體重身痛留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴飧泄食不化多熱則溏出糜留而不去傳舍於腸胃之外募原之間留著於脈稽留而不去息而成積或著孫脈

或著絡脉或著經脉或著輸脉或著於伏衝之脉或著於膂筋或著於腸胃之募原上連於緩筋邪氣淫泆不可勝論

註　邪之中人必由表入裏始於皮膚人之形虛則皮膚緩邪得乘之毛髮立而淅然血氣凝滯而皮膚痛也察在何經或深或淺治之於外若留而不去其入漸深則傳舍於絡脉故痛於肌肉之間若肌肉之痛時漸止息是邪將出絡而深大經代受之邪氣自絡入經猶爲在表故洒淅惡寒然經氣連臟故又喜驚也輸者皆經氣聚會之處其所留止必在關節谿谷之間故邪留於輸則六經不通而肢節腰脊乃痛乃强也伏衝者伏行腹內之衝脉也邪留於內則血氣不能充溢於形身故體重身痛也留而不去傳舍於腸胃而爲賁響腹脹多寒則腸鳴飱泄多熱則溏出糜腸胃之外募原之間謂皮裏膜外也稽留其間而不去則止於此而成積如瘧痞之屬也孫脉絡脉者募原中之小絡經脉者胃腑之大經也輸脉者臟腑之大絡轉輸

水穀之血氣者也伏衝者伏行於腹之衝脉募原者如手太陰中府爲募太淵爲原之類膂筋者附於脊膂之筋緩筋者循於腹內之筋也此數者在於腸胃之前後左右邪隨著而爲積故淫泆不可勝數也

黃帝曰願盡聞其所由然岐伯曰其著孫絡之脉而成積者其積往來上下臂手孫絡之居也浮而緩不能句積而止之故往來移行腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則䐜滿雷引故時切痛其著於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小其著於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢則安其著於腸胃之募原也痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛其著於伏衝之脉者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀其著於膂筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得其著於輸之脉者閉塞不通津液不下孔竅乾塞此邪氣之從外入內從上下也

註 著於內而成積者其積能往來上下蓋積在大腸小腸之絡皆屬手經其絡浮而緩不能拘束其

積而止之故移行於腸胃之間若有水則滲注於外濯濯有聲若有寒則爲脹滿及雷鳴相引時爲切痛陽明之經乃胃之大絡故其爲積挾臍而居飽則水穀之津注於外故大飢則津血少故小也緩筋在肌肉之間故似陽明之積飽則脹故痛飢則氣退而安也腸胃膜原痛連緩筋飽則津液滲潤於外故安飢則乾燥故痛也伏衝之脈挾於臍間故揣之應手而動發手則熱者衝脈之血氣充於外也如湯沃之狀者因積而成熱也膂筋者附於脊膂之內在腸之後故飢則腸空積見飽則不見而按之不得也輸脉者所以通血氣若閉塞不通則津液不下而皮毛之孔竅乾塞也

黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之始生得寒乃生厥乃成積也黃帝曰其成積奈何岐伯曰厥氣生足悗悗生脛寒脛寒則血脉凝濇血脉凝濇則寒氣上入於腸胃入於腸胃則䐜脹䐜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血

外溢則衂血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通濕氣不行凝血蘊裏而不散津液濇滲著而不去而積皆成矣

註 寒逆於下故生足悗謂肢節痛滯不便利也由脛寒而血氣凝濇則寒氣上入腸胃腸胃寒則陽氣不化而爲䐜脹脹則腸外之汁沫迫聚不散日久成積矣若卒然多食飲則腸運化不及汁溢膜外與血相搏乃成食積如嬰童痞疾之類是也又或起居不節用力過度則絡脉傷上行之陽絡傷則血外溢於上而爲衂下行之陰絡傷則血內溢而爲後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚而積成矣或卒然外中寒邪若兼之內傷憂怒則氣上逆氣上逆則六經之輸不通溫膚熱肉之氣不行血凝蘊裏而不散津液濇於絡中滲於絡外著而不去而積成矣

黃帝曰其生於陰者奈何岐伯曰憂思傷心重寒傷

肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出則傷腎此內外三部之所生病者也

註 傷心者病在陽傷肺者病在氣傷肝者病在血傷脾者病在榮衛傷腎者病在眞陰凡傷臟者皆病生於陰也

黃帝曰善治之奈何岐伯答曰察其所痛以知其應有餘不足當補則補當瀉則瀉毋逆天時是謂至治

註 察其所痛知其所應者積於五臟察其左右上下則外應於五臟之經俞審其有餘不足以施補瀉毋逆天時是謂至治

扁鵲難經

五臟攸分

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故以是別知積聚也

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足久不愈令人發欬痎瘧連歲不已

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人病煩心

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚

肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘欬發肺癰

腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣

漢張機金匱要略

病脉證治

問曰病有積有聚有槃氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移爲可治槃氣者脅下痛按之則愈復發爲槃氣諸積大法脉來細而附骨者乃積也寸口積在胷中微出寸口積在喉中關上積在臍旁上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脉出左積在左脉出右積在右

脉兩出積在中央各以其部處之

華佗中藏經

積聚癥瘕雜蟲

積聚癥瘕雜蟲者皆五臟六腑眞氣失而邪氣併遂乃生焉久之不除也或聚或積或癥或瘕或變或蟲其狀各異有能害人者有不能害人者有爲病緩者有爲病速者有疼者有痒者有生頭足者有如杯塊者勢類不同蓋因內外相感眞邪相犯氣血熏搏交合而成或積者系於臟聚者系於腑癥者系於氣而瘕者系於血蟲者血氣食物相感而化之積有五聚有六癥有十二瘕有八蟲有九其名不等積者心肝脾肺腎之五名聚者大腸小腸膽胃膀胱三焦之六名癥有勞氣冷熱虛實風濕食藥思憂之十二名瘕有靑黃燥血脂狐蛇鼈之八名蟲有伏蚘白肉肺胃赤弱蟯之九名也

唐孫思邈千金方

證分陰陽

病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽氣

也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成故積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處也聚者陽氣也其始發無根本上下無所畱止其痛無常處謂之聚也故以是別知積聚也

宋嚴用和濟生方

總論

夫積有五積聚有六聚積者生於五臟之陰氣也聚者成於六腑之陽氣也此由陰陽不和臟腑虛弱風邪搏之所以爲積爲聚也有如憂思喜怒之氣人之所不能無者過則傷乎五臟逆於四時傳尅不行乃畱結而爲五積故在肝曰肥氣在心曰伏梁在脾曰痞氣在肺曰息賁在腎曰奔豚其名不同其證亦異肥氣之狀在左脅下覆大如杯肥大而似有頭足是爲肝積診其脈弦而細其色青其病兩脅下痛牽引小腹足寒轉筋男子爲積疝女子爲瘕聚伏梁之狀起於臍下其大如臂上至心下猶梁之橫架於胷膈

者是爲心積診其脉沉而芤其色赤其病腹熱面赤咽乾心煩甚則吐血令人食少肌瘦痞氣之狀畱在胃脘覆大如杯痞塞不通是爲脾積診其脉浮大而長其色黃其病饑則減飽則見腹滿嘔泄足腫肉削久不愈令人四肢不收息賁之狀在右脅下覆大如杯喘息奔溢是爲肺積診其脉浮而毛其色白其病氣逆背痛少氣喜忘目瞑膚寒皮中時痛或如虱緣或如針刺奔豚之狀發於小腹上至心下上下無時有若豚走之狀是爲腎積診其脉沉而急其色黑其病饑則見飽則減小腹裏急腰痛口乾目昏骨冷久不愈令人骨痿少氣又如六聚之成於六腑則異是矣何者六腑屬於三陽太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣有如都會之府主轉輸以爲常也夫苟六腑失常則邪氣聚而不散始發既無根本上下無所畱止其痛亦無常處故在上則格在下則脹旁攻兩脅如有杯塊易於轉動故非五積之比也凡診其脉駛而緊者積聚也脉浮而牢者積聚也脉橫者脅下有積聚也脉來小沉實者胃中有積聚也大抵病各

有證治各有方如診心腹積聚其脉牢強急者生虛弱急者死又諸脉實強者生沉小者死此又不可不察也

金劉完素六書

總論證治

癥腹中堅硬按之應手謂之癥也聖惠方謂癥猶徵也然木體柔順而今反堅硬如地亢則害承乃制也故病濕過極則爲痓反兼風化制之也風病過極則反燥筋脉勁急反兼金化制之也病燥過極則煩渴反兼火化制之也病熱過極而反出五液或爲戰慄惡寒反兼水化制之也其爲治者但當瀉其過甚之氣以爲病本不可反誤治其兼化也然而兼化者乃天機造化抑高之道雖在渺冥恍惚之間而有自然之理亦非顯形而有氣也病雖爲邪而造化之道在其中矣夫五行之理甚而無以制之則造化息矣如風木旺而多風風大則反凉是反兼金化制其木也大凉之下天氣反溫乃火化承於金也夏火熱極而體反出液是反兼水化制其火也因而濕蒸雲雨乃

土化承於水也雨濕過極而兼烈風乃木化制其土也飄驟之下秋風反涼乃金化承於木也涼極而萬物反燥乃火化制其金也因而以爲冬寒乃水化承於火也寒極則水凝如地乃土化制其水也凝凍極而起東風乃木化承土而歲周也凡不明病之標本者由未知此變化之道也

瘕腹中雖硬而忽聚忽散無有常準故聖惠方云瘕猶假也以其病瘕未成癥也經注曰血不流而寒薄故血內畱而成瘕也一云腹內結病也經曰小腸移熱於大腸爲虙瘕爲沉注曰小腸熱已移入大腸兩熱相搏則血溢而爲伏瘕也血濇不利則月事沉滯而不行故云虙瘕爲沉虙與伏同瘕一爲疝傳寫誤也然則經言瘕病亦有熱者也或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者非寒癥瘕也宜以脉證別之

大腸小腸移熱名虙瘕津液耗散不能滑利菀結而大腸閟澀檳榔圓主之

病脅下滿逆氣不已氣聚脅下息而不消積而不散氣元在胃妨飲食不可鍼灸宜導引服藥爾白朮丸

主之水得燥則消散而得濕則不消乃爲積飲也傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五臟之氣虛而內外諸邪所侵故稽留不行遂成積聚其脉沉細而微者是也

元張從政儒門事親

治同鬱斷

先賢說五積六聚甚明惟治法獨隱其言五積曰肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足久不已令人發欬逆痎瘧連歲不已者是也心之積名曰伏梁起於臍大如臂上至心下久不已令人病煩心脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不已令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚俗呼爲食勞黃也肺之積名曰息賁在左脅下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘嗽發肺癰腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣此五積之狀前賢言之豈不分明徧訪醫門人人能道及問治法不過三稜廣术乾漆硇砂陳皮蒙石

巴豆之類復有不明標本者又從而補之豈有病積之人大邪不出而可以補之乎至於世之磨積取積之藥余初學醫時苦曾用之知其不效遂爲改轍因考內經驟然大悟內經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之王太僕曰達謂吐發謂汗奪謂下泄謂利小便折謂折其衝逆此五者五運爲司天所制故立此五法與五積若不相似然蓋五積者因受勝己之邪而傳於己之所勝適當旺時拒而不受復還於勝己者勝己者不肯受因畱結爲積故肝之積得於季夏戊己日心之積得於秋庚辛日脾之積得於冬壬癸日肺之積得於春甲乙日腎之積得於夏丙丁日此皆抑鬱不伸而受其邪也豈待司天尅運然後爲之鬱哉且積之成也或因暴怒喜悲思恐之氣或傷酸苦甘辛鹹之食或停溫凉熱寒之飲或受風暑燥寒火濕之邪其初甚微可呼吸按導方寸散而去之不幸而遇庸醫強補而畱之畱而不去遂成五積夫肥氣者不獨氣有餘也其中亦有血矣蓋肝藏血故也伏梁者火之鬱也以熱藥散之則

益甚以火灸之則彌聚況伏梁證有二一名同而實異不可不詳焉其一伏梁上下左右皆有根在腸胃之外有大膿血此伏梁義同肚癰其一伏梁身體髀股胻皆腫環臍而痛是爲風根不可動動則爲水溺濇之病此二者內經雖言不可動止謂不可大下非謂全不可下恐病去而有害痞氣者舉世皆言寒則痞內經以爲濕則痞雖因飲冷而得其陽氣爲濕所畜以熱攻之則不散以寒攻之則濕去而寒退矣息賁者喘息賁而上行也此舊說也余以謂賁者賁門也手太陰之筋結胷裏而貫賁入賁門下抵季脅其病支轉筋痛甚則成息賁手心主結於臂其病胷痛息賁又云肺下則居賁迫肝善脅下痛肝高則上支賁兩脅悗爲息賁若是言之是積氣於賁而不散此靈樞說五臟處言此息賁者多故予發之賁豚者賁與奔同銅人言或因讀書得之未必皆然也腎主骨此積最深難療大忌吐涌以在其下止宜下之故予嘗以獨聖散吐肥氣揃以木架必燠室中吐兼汗也肝之積便言風也吐出數升後必有血一二滴勿疑病

當然也續以磨積之藥調之嘗治伏梁先以茶調散吐之兼汗以禹功導水奪之繼之以降火之藥調之又嘗治痞氣萬舉萬全先以瓜蔕散吐其酸苦黃膠腥腐之物三二升次以導水禹功下二三十行末以五苓淡劑等藥調之又嘗治息賁用瓜蔕散不計四時置之燠室中更以火一爐以助其汗吐汗下三法齊行此病不可逗遛久則傷人又嘗治賁豚以導水通經三日一下之一月十下前後百行次用活血化氣磨積之藥調之此積雖不傷人亦與人偕老若六聚之物在腑屬陽而無形亦無定法倣此而行之何難之有或言余之治積太峻予曰不然積之在藏如陳莝之在江河且積之在藏中間多著脂膜曲折之處區臼之中陳莝之在江河不在中流多在汀灣洄薄之地遇江河之溢一漂而去積之在藏理亦如之故予先以丸藥驅逐新受之食使無梗塞其碎著之積已離而未下次以散藥滿胃而下橫江之筏一壅而盡設未盡者以藥調之惟堅積不可用此法宜以漸除內經曰堅者削之今人言塊癖是也

食積酸心腹滿大黃牽牛之類甚者蒙石巴豆酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者甘遂牽牛氣積噫氣痞塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛涎積咽如拽鋸朱砂膩粉之類甚者瓜蔕甘遂痰積唾涕稠粘半夏南星之類甚者瓜蔕藜蘆癖積兩脅刺痛三稜廣术之類甚者甘遂蠍梢水積足脛脹滿郁李商陸之類甚者甘遂芫花血積打撲肭瘀產後不月桃仁地榆之類甚者蝱蟲水蛭肉積贅瘤核癧膩粉白丁香砭刺出血甚者硇砂信石

九積皆以氣爲主各據所屬之狀而對治之今人總此諸藥併爲一方曰可治諸積大謬也無此病焉用此藥無彼病焉用彼藥十羊九牧何所適從非徒無益而又害之

夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓白术散妙功丸大忌生硬粘滑動風發熱等物

張潔古活法機要

養正邪自除

壯人無積虛人則有之脾胃怯弱氣血兩衰四時有

感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾須去而人已衰矣乾漆硇砂三稜大黃牽牛之類用時則暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故治積者當先養正則積自除譬如滿坐皆君子縱有一小人自無容地而去但令其眞氣實胃氣强積自消矣實中有積大毒之劑治之尚不可過況虛而有積者乎此治積之一端也邪正盛衰固宜詳審

朱震亨心法

證治

痞塊在中爲痰飮在右爲食積在左爲血塊

氣不能作塊成聚塊乃有形之物也痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮桃仁紅花五靈脂香附之類爲丸石鹻白朮湯吞下

治塊當降火消食積食積卽痰也行死血塊塊去須大補

凡積病不可用下藥徒損眞氣病亦不去當用消積藥使之融化則根除矣

凡婦人有塊多是血塊

五臟之積曰五積六腑之積曰六聚積有定形聚無定處不問何經並宜服十味大七氣湯吞下尊貴紅丸子

羅天益衛生寶鑑

論治

黃帝鍼經水脹篇云腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛相搏衛氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其侯也夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳導爲事乃肺之府也肺主衛衛爲氣得炅則泄得冷則凝今寒客於大腸故衛氣不榮有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結爲瘕聚所以惡氣發起瘜肉乃生小漸益大大至甚而鼓其腹則如懷子之狀也此氣病而血未病故月事不斷應時而下本非胎娠可以此爲辨矣又云石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞使氣不通惡血當瀉而不泄衃以畱止

日久益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之夫膀胱爲津液之府氣化則能出焉今寒客於子門則氣必塞而不通血壅而不流衃以留止結硬如石是名石瘕也此病先氣病而後血病故月事不來則可宣導而下出者也難經云任之爲病其內苦結男子生七疝女子爲瘕聚此之謂也非大辛之劑不能已也可服見晛丸

食物所成

凡人脾胃虛弱或飲食過常或生冷過度不能尅化致成積聚結塊心腹脹滿噫氣吞酸面青肌瘦一曰食積二曰酒積三曰麫積四曰肉積五曰魚蟹積六曰果菜積七曰茶積八曰水積九曰血積十曰蟲積食不消化成積痞悶宐用平胃散加縮砂香附神麴麥芽生薑酒傷成積者面黃黑腹脹時嘔痰水宐用對金飲子加葛根赤茯苓縮砂神麴食麫過多成積萊菔子湯下阿魏圓食肉過多成積宜用阿魏圓食魚蟹過傷成積香蘇散多加生薑木香煎服多食果菜成積宜用桂香丸喜吃茶成積成癖及吃乾茶者

宜用星术丸或石膏黃芩升麻爲末砂糖水調下多飲水漿成積胷脅引痛漉漉有聲宜十棗湯瘀血成積或因打撲或因墮落以致畜於胷腹面黃糞黑宜用抵當湯飲食積聚變化成蟲宜用妙應丸

明戴思恭證治要訣

論證治

有飲癖結成塊在腹脅之間病類積聚用破塊藥多不效此當行其飲宜導痰湯何以知爲飲其人先曾病瘥口吐涎沫積水或素來多痰者是也又多飲人結成酒癖肚腹積塊脹急疼痛或全身腫滿肌黃少食宜十味大七氣湯用紅酒煎服

肝積在左脅下狀如覆杯或如鼈或嘔逆或痛在兩脅牽引小腹足寒轉筋久則如瘧名曰肥氣宜大七氣湯煎熟待冷却以鐵器燒通紅以藥淋之乘熱服

肺積在右脅下大如覆杯氣逆背痛或少氣喜忘目瞑膚寒皮中時痛如風緣針刺久則欬喘名曰息賁宜大七氣湯加桑白皮半夏杏仁各半錢

心積起臍下直至心大如臂腹熱咽乾心煩甚則吐

血名曰伏梁宜大七氣湯加石菖蒲半夏各半錢

脾積在胃脘大如覆杯痞塞不通背痛心疼饑減飽見腹滿吐泄足腫肉消久則四肢不收名曰痞氣宜大七氣湯下紅圓子

腎積發於小腹奔上至心上下無時如奔豚走饑見飽減小腹急腰痛口乾目昏骨冷久則骨痿名曰奔豚宜大七氣湯倍桂加茴香炒楝子肉各半錢

若腹中似若癖瘕隨氣上下未有定處宜散聚湯

若氣作痛遊走心腹間攻刺上下隱若雷鳴或已成積或未成聚以全蠍一箇劈破煎湯調蘇合香丸

有正當積聚處內熱如火漸漸及四肢一日數發如此二三日又愈此不當攻其熱

又有元得熱病熱留結不散遂成癥癖此却當兼用去熱之劑

古今圖書集成

之二十九

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八三五

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十七卷目錄

醫部彙考三百十七

積聚門二

李梴醫學入門（積聚皆屬於脾　痞塊）

李中梓醫宗必讀（總論　證治）

張介賓景岳全書（論證　論治）

陳士鐸石室祕籙（痞塊治法）

方一（化塊丸　連蘿丸　消塊丸　加味柴平湯　消積保中丸　開懷散　保和丸）

紫香散　化痞丹　增損五積丸　消積正元
散　伏梁丸　痞氣丸　三稜煎丸　晞露丸
木香通氣散　見睍丸　肥氣丸　加減肥
氣丸　肥氣丸　鼈甲丸　息賁丸　加減息
賁丸　息賁湯　半夏湯　枳實散　伏梁丸
乾漆丸　半夏散　痞氣丸　加減痞氣丸
又方　蒜紅丸　鼈甲丸　匀氣湯　沉香
飲子　奔豚丸　奔豚湯　沉香石斛湯　木
香檳榔散　萬病紫菀丸　溫白丸　萬病感
應丸　千金硝石丸　酢煑三稜丸　聖散子
鷄爪三稜丸　硇砂煎丸　削堅丸　一腎
散　阿魏丸　阿魏丸　散聚湯　新製陰陽
攻積丸

藝術典第三百三十七卷

醫部彙考三百十七

積聚門三

明李梴醫學入門

積聚皆屬於脾

經曰積聚癥瘕痞滿皆太陰濕土之氣始因外感內傷氣鬱醫誤補而畱之以成積積者陰氣五臟所主脉沉伏或左或右發有根痛有常處肝積左脅下曰肥氣言風氣有餘而血隨氣不行也令人脅痛痎瘧

心積臍上曰伏梁言如梁之橫架心下令人煩心乃火之鬱也忌熱藥與灸又腸癰與此相似但身股背腫環臍而痛爲癰脾積胃脘稍右曰痞氣言陽氣爲濕所畜也令人黃疸倦怠飲食不爲肌膚仍忌熱藥肺積右脅下曰息賁言喘息奔而上行也令人欬嗽肺癰腎積發於小腹或湊心下曰奔豚言若豚之奔衝上下無時也令人喘逆骨痿最爲難治諸積勿輕吐下徒損眞氣積亦不去奔豚尤不可吐五積古有五方今增損五積丸更妙聚者陽氣六腑所成脈沉結或隱或見發無根痛無常處散聚湯七氣湯大阿魏丸香稜丸大安丸加參

積初爲寒宜辛溫消導大七氣湯烏白丸之類久則爲熱宜辛寒推蕩木香檳榔丸通元二八丹之類有蟲者妙應丸外治三聖膏三稜煎神效阿魏散之類又陽虛有積易治惟陰虛難以峻補痞積又忌滯藥止宜早服滋補藥中加鼈甲龜板秋石丹午服枳朮丸大安丸或酢鼈丸善消融化爲妙若痞積冷滯貫臍誤爲沉寒痼冷投以薑附熱藥初服甚與病積相

宜久則痞積益甚眞氣傷而陰血爍矣但硫附固不可服如知蘗門冬寒凉傷脾滯氣亦所不宜古云衰其大半而止又云養正積自除皆爲虛損有積而言也平補之外更能斷厚味節色慾戒暴怒正思慮庶乎萬全

痞塊

氣痞能作塊成聚塊乃痰與食積死血有形之物而成積聚癥瘕一也有積聚成塊不移動者曰癥言堅硬貞固也或有或無或上或下或左或右者曰瘕言假血而成蠢動之形且有活性治左破血爲主海石丸或當歸龍薈丸料五錢加桃仁薑黃各一兩蜜丸治右調氣靑皮湯木香分氣丸有積者消積正元散紅丸子小阿魏丸或當歸龍薈丸保和丸俱加鵓鴿屎水穀出入之路飲食七情鬱積成痰石礞丸白芥丸凡痞塊在皮裏膜外俱宜二陳湯加補氣行氣藥

李中梓醫宗必讀

總論證治

按積之成也正氣不足而後邪氣踞之如小人在朝

由君子之衰也正氣與邪氣勢不兩立若低昂然一勝則一負邪氣日昌正氣日削不攻去之喪亡從之矣然攻之太急正氣轉傷初中末之三法不可不講也初者病邪初起正氣尚強邪氣尚淺則任受攻中者受病漸久邪氣較深正氣較弱任受且攻且補末者病魔經久邪氣侵凌正氣消殘則任受補蓋積之爲義日積月累匪朝伊夕所以去之亦當有漸太亟則傷正氣正傷則不能運化而邪反固矣余嘗製陰陽二積之劑藥品稍峻用之有度補中數日然後攻伐不問其積去多少又與補中待其神壯則復攻之屢攻屢補以平爲期此余獨得之訣百發百中者也經曰大積大聚其可犯也衰其半而已故去積及半純與甘溫調養使脾土健運則破殘之餘積不攻自走必欲攻之無餘其不遺人夭殃者鮮矣經曰壯者氣行卽愈怯者著而爲病潔古云壯盛人無積虛人則有之故當養正則邪自除譬如滿座皆君子一二小人自無容身之地雖然此爲輕淺者言耳若大積大聚不搜而逐之日進補湯無益也審知何經受病

何物成積見之既確發直入之兵以討之何患其不愈兵法云善攻者敵不知其所守是亦醫中之良將也夫

脉候堅强者生虛弱者死細沉附骨者積脉也沉而有力爲積脉沉緊者有寒積脉浮而牢積聚也

酒積輕者葛根神麯黃連白豆蔻甚者用甘遂牽牛

氣積輕者木香枳殼厚朴橘紅甚者枳實牽牛

血積輕者乾漆桃仁牡丹歸尾赤芍藥紅花甚者大黃䗪蟲水蛭穿山甲花蕊石

痰積輕者半夏苦蔞甚者滾痰丸老痰海石瓦楞子

痰在皮裏膜外白芥子

水積輕者五苓散甚者商陸甘遂芫花

茶積輕者薑黃芝麻甚者茱萸椒薑

癖積輕者三稜蓬朮甚者巴霜大黃

穀積輕者麥芽穀芽神麴砂仁甚者雞內金

肉積輕者山楂阿魏甚者硇砂硝石

蛋積白豆蔻橘紅豆豉薑汁

菜積丁香肉桂麝香

麪積蘿蔔子薑酒煎

魚鱠積紫蘇橘皮木香薑汁治鱠積白馬尿

狗肉積杏仁山樝

蟲積雄黃錫灰檳榔雷丸蕪荑榧子史君子

瘧積鱉甲草果

景岳全書（臣張介賓著）

論證

積聚之病凡飲食血氣風寒之屬皆能致之但曰積曰聚當詳辯也蓋積者積累之謂由漸而成者也聚者聚散之謂作止不常者也由此言之是堅硬不移者本有形也故有形者曰積或聚或散者本無形也故無形者曰聚諸有形者或以飲食之滯或以膿血之留凡汁沫凝聚旋成癥塊者皆積之類其病多在血分血有形而靜也諸無形者或脹或不脹或痛或不痛凡隨觸隨發時來時往者皆聚之類其病多在氣分氣無形而動也故難經以積爲陰氣聚爲陽氣其義即此凡無形之聚其散易有形之積其破難臨此證者但當辯其有形無形在氣在血而治積治聚

自可得其梗概矣

飲食之積凡暫積者不過以飲食偶傷必在腸胃之內故可行可逐治無難也惟飲食無節以漸留滯者多成痞積於左脅膈膜之外蓋以胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣此陽明宗氣所出之道也若饑飽無倫飲食疊進以致陽明胃氣一有所逆則陰寒之氣得以乘之而脾不及化故餘滯未消乃并腸外汁沫摶聚不散漸成癥積矣然其初起甚微人多不覺及其既久則根深蒂固而藥餌難及今西北小兒多有此疾而尤於食麪之鄉爲最正以麪性多滯而留疾於皮裏膜外所以不易治也即如婦人血癥氣痞或上或下者亦多在腸胃之外募原之間故當以漸漸消磨求法治之慎無孟浪欲速妄行攻擊徒致胃氣受傷而積仍未及反以速其危也

風寒外感之邪亦能成積如經曰虛邪之中人也留而不去傳舍於腸胃之外募原之間留著於脉息而成積又曰病名伏梁此風根也由此觀之凡今人以瘧後成痞者是即風寒之屬類可推矣但瘧由風寒

固易知也而諸積於風若不相涉不知飲食之滯非寒未必成積而風寒之邪非食未必成形故必以食遇寒以寒遇食或表邪未清過於飲食邪食相搏而積斯成矣經曰虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形信乎致積之由多由於此即血癥氣痞之由亦無出於此然積以寒畱畱久則寒多爲熱風以致積積成而證已非風故治此者但當治其所畱不可發散以再傷其眞氣也惟慎疾者能知所由而慮之於始則可爲保脾之良策

癥痞之積凡或上或下或左或右本無定所大都血積多在下而氣積食積則上自胃脘下自小腹凡有畱滯無處不可停畜余嘗治一食癥結痛者乃在小腹下右角尖處自後屢見此證方知食道之行必由小腹下右以入廣腸此實人所不知也別有食停治按在心腹痛門可考故凡治積聚者必當詳審所因庶得其確嘗見丹溪之論曰痞塊在中爲痰飲在右爲食積在左爲血塊其不能作塊或聚或散者氣也塊乃有形之物痰與食積死血而成也愚謂可聚可

散者此氣聚無疑也若以左爲血積右爲食積中爲痰飲則鑿矣卽如小兒多有患痞者必在左肋之下此無非縱食所致豈因其在左卽爲血積而可攻其血乎若謂左血右食則右豈無血而左豈無食乎不可以爲法也

論治

經曰堅者削之留者攻之結者散之客者除之上之下之摩之浴之薄之刦之開之發之適事爲故凡治積聚之法如經所云者亦旣盡矣然欲總其要不過四法曰攻曰消曰散曰補四者而已詳列如左

凡積堅氣實者非攻不能去如祕方化滯丸化鐵丹遇仙丹感應丸大硝石丸三花神祐丸赤金豆百順丸之類皆攻劑之峻者也又如三稜丸勝紅丸阿魏丸助氣丸紅丸子溫白丸之類皆攻劑之次者也

凡不堪攻擊止宜消導漸磨者如和中丸草豆蔻丸保和丸大小和中飲之類是也若積聚下之不退而元氣未虧者但當以行氣開滯等劑融化而潛消之無形氣聚宜散而愈者如排氣飲神香散指迷七氣

湯十香丸四磨飲之屬是也

凡積痞勢緩而攻補俱有未便者當專以調理脾胃爲主如潔古之枳朮丸乃其宜也余復因其方而推廣之近製芍藥枳朮丸兼肝脾以消膨脹除積聚止腹痛進飲食用緩收功其效殊勝於彼再如大健脾丸木香人參生薑枳朮丸皆調補脾胃之妙劑所當擇用者也

凡脾腎不足及虛弱失調之人多有積聚之病蓋脾虛則中焦不運腎虛則下焦不化正氣不行則邪滯得以居之若此輩者無論其有形無形但當察其緩急皆以正氣爲主凡虛在脾胃者宜五味異功散或養中煎溫胃飲歸脾湯之類主之虛在肝腎者宜理陰煎腎氣丸煖肝煎之類酌而用之此所謂養正積自除也其或虛中有滯者則不妨少加佐使

治積之要在知攻補之宜而攻補之宜當於孰緩孰急中辯之凡積聚未久而元氣未損者治不宜緩蓋緩之則養成其勢反以難制此其所急在速攻可也若積聚漸久元氣日虛此而攻之則積氣本遠攻不

易及胃氣切近先受其傷愈攻愈虛則不死於積而死於攻矣此其所重在命不在乎病所當察也故凡治虛邪者當從緩治只宜專培脾胃以固其本或灸或膏以疎其經但使主氣日強經氣日通則積痞自消緩急之機卽萬全之策也不獨治積諸病亦然

凡堅痞之積必在腸胃之外募原之間原非藥力所能猝至宜用阿魏膏琥珀膏或水紅花膏三聖膏之類以攻其外再用長桑君鍼法以攻其內然此堅頑之積非用火攻終難消散故莫妙於灸余在燕都嘗治愈痞塊在左脅者數人皆以灸法收功

積久成疳乃其經絡壅滯致動肝脾陽明之火故爲頰腫口糜牙齦臭爛之證此其在外當用膏藥艾火以破堅頑在內當用蘆薈等丸以清疳熱

石室祕籙　臣陳士鐸著

痞塊治法

病有堅勁而不肯輕易散者當用軟治如人生塊於胷中積痞於腹內法用藥以軟之心中生塊此氣血堅凝之故法當用補血補氣之中少加軟堅之味則

氣血活而堅塊自消倘徒攻其塊而不知溫補之藥則堅終不得消治方用人參當歸靑鹽五味柴胡半夏各一錢白芍麥冬各三錢熟地五錢山茱萸二錢附子一片水煎服此方妙在純用補藥止加靑鹽一味以軟堅若無意於治堅者久之而堅自軟此柔能制剛之妙法也痞塊之堅又一法以治之蓋堅在於腹中若徒攻其堅必致腹中不和而損傷胃氣法當用和解之中軟以治之則堅之性可緩而堅之形可化堅之氣可潰堅之血可消否則有形之物盤踞於中無形之氣必耗於外日除堅而堅終不得去也方用白朮五兩神麯二兩地栗粉八兩鼈甲一斤酢炙白芍茯苓各三兩半夏甘草白芥子各一兩蘿蔔子厚朴人參各五錢肉桂三錢附子一錢各爲末蜜爲丸每日臨睡送下五錢卽以美物壓之一料未有不全愈者此方有神功妙在用鼈甲爲君則無堅不入尤妙用地栗粉佐鼈甲以攻邪又不耗散眞氣其餘各品俱是健脾理正之藥則脾健而物自化尤妙用肉桂附子衝鋒突圍而進則鼈甲大軍相繼而入勇不

可當又是仁者之師賊雖强橫自不敢抵敵望風披靡散走又有諸軍在後斬殺無遺勦撫並用有不三月告捷者哉此更軟治之妙倘不補正氣惟大黃巴豆兩頭尖阿魏之類直前攻堅雖亦有得勝之時然中州掃蕩田野蕭然終必倉空箱罄人民匱乏之形有數年不能培植者也

有人成痞塊之證一時發作而腹痛不可手按者可用下墮之法蓋乘其邪動而墮之也方用枳實一兩白术二兩馬糞炒焦五錢酒煎服蓋馬糞最能安痛又不傷氣且又能逐邪而化物故藥籠中最宜預備之蓋倉猝間不可即得此物愈久愈妙不必多用至五錢即一二錢用之無不奇妙今用五錢又與枳實同用則積塊自消然而徒消其積未免恐傷脾陰又佐以白术二兩大健其脾氣則馬糞與枳實可以施其祛蕩之功此妙法也

方一

化塊丸（丹溪）

治痞塊及血塊

海粉酒煑　三稜　蓬朮俱酢煑　紅花　桃仁

五靈脂　香附子各一兩　石礆五錢

右爲末酢糊和丸梧子大白朮湯下三五十丸

連蘿丸（入門）

治食積死血痰飲成塊兩脅作痛雷鳴嘈雜眩運

黃連一半以吳萸五錢同炒一半以益智五錢同炒

去吳茰益智　白芥子炒　蘿蔔子炒各一兩半

梔子　川芎　三稜　蓬朮　桃仁　香附子

山楂肉　神麯各一兩　青皮五錢

右爲末蒸餅和丸梧子大白湯呑下五六十丸一名白芥丸今名消積丸

消塊丸（入門）

治痞塊癥瘕

大黃四兩　硝石三兩　人參　甘草各一兩五錢

右爲末陳酢三升置磁器內先納大黃煎不住手攪使沸微盡一升下餘藥末熬至可丸則丸梧子大米飲下三十丸當利如雞肝惡物一名硝石丸

加味柴平湯（回春）

治積塊有熱

柴胡　黃芩　半夏　蒼朮　厚朴　陳皮

青皮　山楂肉　枳殼炒　神麯炒　三稜

蓬朮各七分　甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

消積保中丸（醫鑑）（下同）

散痞除塊

白朮土炒三兩　橘紅二兩　半夏　白茯苓

香附酢炒　蘿蔔子炒　白芥子炒　神麯炒

黃連薑汁炒　梔子薑汁炒各一兩　檳榔七錢

蓬朮酢炒　三稜酢炒各八錢　麥芽炒六錢

乾漆炒五錢　青皮香油炒　縮砂仁各四錢

木香　阿魏各三錢

右爲末以薑汁酒糊和丸梧子大白湯下八十丸

開懷散

治心下積塊痞悶或發熱

柴胡　草豆蔻各一錢　三稜酢炒　蓬朮酢炒

青皮　陳皮　半夏　白茯苓　香附子　檳榔

枳實　紅花　甘草各七分

右剉作一貼薑三片煎服

保和丸

治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消

白朮五兩　陳皮　半夏　茯苓　神麴炒

山樝肉各三兩　連翹　香附子酒炒　厚朴

蘿蔔子炒各二兩　枳實　麥芽　黃連酒炒

黃芩酒炒各一兩

右爲末薑汁糊和丸梧子大茶清下五七十丸

紫香散

治心腹有氣一塊略通或膨脹寒熱

枳實　地骨皮　三稜　蓬朮各一錢　柴胡

黃芩各七分　赤芍藥　厚朴　香薷　黃連

延胡索各五分　甘草三分

右剉作一貼水煎服

化痞丹（回春）

消積塊專攻之劑

大黃四兩酢浸七日日曬夜露七日　紅花二錢

穿山甲炒二兩　青黛五分　木鼈子去油

桃仁　香附子便浸炒各一兩

右爲末將大黃和好酢煮爲糊和丸菉豆大茅根

葛根煎湯下五七十丸

增損五積丸

通治五積

黃連肝積五錢脾腎積七錢心肺積一兩五錢　厚朴肝心肺積五錢脾腎積八錢　川烏頭肝肺積一錢心腎脾積五分　乾薑肝心積五分肺脾腎積一錢五分　人參肝心脾肺積二錢腎積五分　茯苓一錢五分　巴豆霜五分

右爲末蜜丸梧子大初服二丸漸加以微溏爲度

治積塊不拘臍上下左右通用

如肝積加柴胡一兩川椒四錢蓬术三錢皂角昆布各二錢五分

心積加黃芩三錢肉桂茯神丹參各一錢菖蒲五分

肺積加桔梗三稜天門冬青皮陳皮白豆蔻各一錢紫菀川椒各一錢五分

脾積加吳茱萸黃芩縮砂各二錢澤瀉茵陳各一錢川椒五分

腎積加延胡索三錢苦楝肉全蠍附子獨活各一錢澤瀉菖蒲各二錢肉桂三分丁香五分

消積正元散

治痰飲氣血鬱結食積氣不升降積聚脹痛

白朮一錢五分　神麯　香附　枳實　延胡索

海粉各一錢　赤茯苓　陳皮　青皮　縮砂

麥芽炒　山楂肉　甘草各七分

右剉作一貼薑三片水煎服

伏梁丸（正傳下同）

治心積

黃連一兩五錢　厚朴　人參各二錢　黃芩

桂皮　茯神　丹參各一錢　乾薑　石菖蒲

巴豆霜　川烏　紅豆蔻各五分

右爲末蜜丸梧子大黃連湯下初服二丸日加一丸三日加二丸至大便溏便漸減服周而復始塊減半勿服

痞氣丸

治脾積

黃連八錢　厚朴四錢　吳萸三錢　黃芩二錢

縮砂　茵陳　乾薑各一錢半　白茯苓　人參

澤瀉各一錢　川烏　川椒各五分　桂皮

巴豆霜各四分　白术二分

右爲末蜜丸梧子大甘草湯下服如上法

三稜煎丸

治心腹堅脹脅下滿硬胷中痞塞喘滿短氣常服順氣消積滯除膨脹

三稜生半斤搗爲末以酒三升於銀石器內熬膏

杏仁去皮尖炒　乾漆炒烟盡　麥蘗炒各三兩

青皮　蘿蔔子炒　神麯炒各二兩　硇砂飛一兩

右爲細末以三稜膏和丸如桐子大每服二十丸食後溫米飲送下

晞露丸（寶鑑下同）

治寒傷於內氣凝不流結於腸外久爲癥瘕時作疼痛腰不得伸

三稜　莪术各一兩並酒浸入巴豆三十粒切碎同炒深黃去巴豆　川烏炮　乾漆炒烟盡各五錢

茴香鹽炒　青皮　穿山甲炒　雄黃研各三錢

硇砂研四錢　輕粉研一錢　麝香另研五分

右爲細末研勻薑汁煮麪糊和丸梧子大每服二

十九至三十丸薑湯送下溫酒亦得空心食前

木香通氣散

治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

木香　戎鹽炒　荆三稜炮各五錢　枳實麩炒

炙甘草各三錢　厚朴薑炙一兩　乾薑炮

蓬朮炮各二錢

右爲末每服三錢淡生薑湯食前調下

見晛丸

治寒客下焦血氣閉塞而成瘕聚堅大久不消者

附子炮去皮臍四錢　鬼箭羽　紫石英各三錢

澤瀉　肉桂　延胡索　木香　大黃用酒同三稜

浸一宿焙各二錢　三稜五錢　檳榔二錢五分

水蛭一錢炒烟盡　桃仁三十粒去皮尖麩炒研

血竭另研一錢五分

右十三味除血竭桃仁外同爲末入另研二味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十丸淡酢湯送下食前溫酒亦得

肥氣丸（東垣下同）

治肝之積在左脅下如覆杯有頭足久不愈令人欬逆痎瘧連年不已其脉弦而細

柴胡二兩　黃連七錢　厚朴五錢　炙草三錢　椒炒去汗去目及閉口者四錢　廣朮炮　昆布　人參　皂角去皮弦子煨各二錢五分　乾薑　巴豆去油各五分　川烏炮去皮臍一錢二分　白茯苓一錢五分

右除茯苓皂角巴豆外爲極細末再另研茯苓皂角爲細末和匀方旋入巴豆霜和匀煉蜜丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從兩丸加服周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴一半連前重一兩減黃連一錢半若治風癇於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春夏用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心溫服

加減肥氣丸

春夏合此治同前

柴胡　厚朴　人參　乾薑各五錢　川烏

巴豆霜各三錢　肉桂二錢　黃連一兩　川椒
甘草各五分
右除巴豆霜外同爲細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡酢湯下空心服秋冬去乾薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

肥氣丸（三因）

當歸頭　莪朮各一兩半　青皮一兩炒　三稜鐵孕粉與三稜莪朮同入酢煑一伏時各三兩　蛇含石火煆酢淬七錢五分
右爲末酢煑米糊丸如菉豆大每服四十丸用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸

治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲一枚重四兩者淨洗以酢和黃泥固濟背上可厚三分令乾　大黃炒二兩　荊三稜炮剉
枳殼麩炒微黃各三兩　木香不見火　桃仁湯浸去皮尖雙仁者麩炒微黃細研如膏各一兩五錢

右除鼈甲外搗爲細末後泥一風爐子上開口可安鼈甲取前藥末並桃仁膏內鼈甲中用好米酢二升時時旋取入鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾搗爲細末與前藥同和搗爲丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒送下晚食前再服

息賁丸（東垣下同）

治肺之積在右脅下覆大如杯久不已令人灑淅寒熱喘嗽發肺癰其脈浮而毛

厚朴薑製八錢　黃連炒一兩三錢　乾薑炮

川椒炒去汗　白茯苓另末　紫菀各一錢半

人參二錢　桂枝　桔梗　荆三稜炮　天門冬

陳皮　川烏炮裂去皮臍　白豆蔻各一錢

青皮五分　巴豆霜四分

右除茯苓巴豆霜旋卽入外餘藥共爲細末煉蜜丸如桐子大每服二丸一日加一丸兩日加二丸加至大便微溏再從二丸加服淡薑湯送下食遠服周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢連

前一兩三錢黃連減七錢用六錢

加減息賁丸

仲夏合此其積爲病寒熱喘欬氣上奔脈濇失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相叅氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏　乾薑　白豆蔻　桔梗各一錢　紫菀
厚朴　川椒炒去汗　天門冬去心　荆三稜
白茯苓各一錢五分　人參　桂枝各二錢
陳皮八錢　黃連一兩三錢　巴豆霜四分
紅花少許　青皮七分

右爲末湯泡蒸餅爲丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸加至大便微溏爲度再從二丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麪腥辣生冷之物

息賁湯（三因下同）

半夏湯泡　桂心　人參　葶藶　吳茱萸湯泡
桑白皮炙　炙甘草各一錢五分

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾

食前服

半夏湯

治肺積息賁欬嗽

細辛去葉苗　半夏製　桔梗炒　桑根白皮炙

前胡各一兩五錢　貝母去心　訶黎勒煨去核

柴胡　炙甘草各一兩　人參　白朮

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服食後臨臥各一服

枳實散

治息賁氣腹脅脹硬欬嗽見血痰粘不利

枳實麩炒　木香　檳榔　赤茯苓　五味子

甜葶藶隔紙炒紫　訶黎勒　甘草微炙各半兩

杏仁一兩湯洗去皮尖雙仁麩炒黃

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

伏梁丸（三因下同）

治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心其脉沉而芤

茯苓　人參　厚朴薑汁製　枳殼炒　三稜煨

半夏湯泡七次　白朮各等分

右爲末麪糊丸梧子大每服五十丸用米飲湯下

乾漆丸

治伏梁氣橫在心下堅牢不散胷中連背多疼

乾漆炒烟盡　芫花醋炒　鱉甲去裙襴醋炙　硇砂研各一兩　木香　桃仁去皮炒　川烏頭去皮臍鹽炒各半兩　雄黃細研　麝香研各二錢半

右爲細末入別研藥令均醋煑麪糊爲丸如菉豆大每服十丸食前溫酒送下

半夏散

治伏梁積心下硬急滿悶不能食胷背疼痛

半夏製　鱉甲醋炙各一兩半　桂心　大黃炒　訶黎勒皮　前胡　當歸焙　青橘皮　檳榔　木香　荆三稜炮各一兩

右爲末每服三錢水一鍾生薑半分煎至六分去滓不拘時稍熱服

痞氣丸（東垣下同）

治脾之積在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚其脉大而長

厚朴薑製半兩　黃連八錢　吳茱萸洗三錢

黃芩　白朮各二錢　茵陳酒炙炒　縮砂仁

乾薑炮各一錢五分　白茯苓另爲末　人參

澤瀉各一錢　川烏炮去皮臍　川椒各五分

巴豆霜另研　桂各四分

右除茯苓巴豆霜另研爲末旋入外餘藥同爲細末煉蜜丸桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯下食遠服周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸

孟秋合此

厚朴　黃芩酒製　黃連酒製　益智仁　歸尾

橘皮去白　附子各三分　半夏五分　吳茱萸

靑皮　澤瀉　茯苓　神麴炒　廣朮　昆布

熟地　人參　炙甘草　巴豆霜　葛根各二分

紅花半分

右爲細末蒸餅爲丸如桐子大依前服法

又方

赤石脂煅酢淬　川椒炒去汗　乾薑炮各二兩

桂心　附子炮各半兩　烏頭炮去皮臍二錢半

右爲細末煉蜜和丸如梧子大以朱砂爲衣每服五十丸食遠米湯下

蒜紅丸（三因　下同）

治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐臥不得者

丁香　木香　沉香　縮砂仁　青皮　檳榔

橘紅　蓬莪朮　草果去皮　牽牛各一兩

粉霜　肉豆蔻麪裹煨各一錢　白茯苓　人參各半兩　蒜二百瓣半用生半火煨熟

右爲細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥爲丸如梧子大每服五七丸加至十五丸食後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬醃藏雞鴨生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鼈甲丸

治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散腹脅疼痛體

瘦成勞不能飲食

附子炮去皮臍　荆三稜炮　乾漆搗碎炒烟盡

木香各一兩　川大黃二兩剉碎酢拌炒令乾

吳茱萸半兩湯泡微炒　鼈甲三兩去裙襴以米酢

一小盞化硇砂一兩用塗鼈甲炙以酢盡爲度

右爲細末酢煑麪糊丸如桐子大每服二十丸空

心溫酒送下

匀氣湯

治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

神麯炒　麥蘗炒　桂心　白朮　厚朴薑汁炙

郁李仁半生半炒　牽牛各一兩半生半炒

良薑炮半兩　甘草炙二兩　大腹子二枚連皮

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破

同煎至七分去滓食遠稍熱服日三

沉香飲子

治痞氣升降陰陽

沉香　木香　羌活　桑皮微炒　人參　獨活

白茯苓　紫蘇葉各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至七分去滓食前溫服二滓又作一服

奔豚丸（東垣）

治腎之積發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下其脈沉而滑

厚朴薑製七錢　黃連炒五錢　楝子酒煮三錢
白茯苓另末　澤瀉　菖蒲各二錢　附子去皮
全蠍　獨活各一錢　延胡索一錢半　川烏炮
丁香各五分　巴豆霜四分　肉桂二分

右除巴豆霜茯苓另爲末旋入外餘藥爲細末煉蜜丸如梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡鹽湯下食遠服周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩連前一兩二錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡蠣三錢疝帶下勿加

如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本臟積藥諸積疾自瘉是治其本也餘積皆然如覺

熱加黃連氣短減厚朴悶亂減桂

奔豚湯（三因下同）

甘李根皮焙　乾葛　川芎　當歸　白芍藥
黃芩　甘草炙各一錢半　半夏湯泡七次二錢

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食前服

沉香石斛湯

治腎臟積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胷脅

沉香　石斛　神麴炒各一兩　赤茯苓　人參
巴戟　桂心　五味炒　白朮　芎藭各七錢半
木香　肉豆蔻各五錢

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至六分去滓食前熱服

木香檳榔散

治積氣不散結伏奔豚發即上衝心胷令人喘逆骨痿少力

木香　檳榔煨　磁石火煅醋淬　訶黎勒去核
牡蠣煅　桂心　蘹香子炒　芎藭　沉香
白芷炒各半兩　陳橘皮七錢五分

右爲細末每服二錢炒生薑鹽湯下

萬病紫菀丸（元戎）

治臍腹久患痃癖如椀

紫菀　菖蒲九節者　吳茱萸湯洗七次焙乾

柴胡　厚朴薑製各一兩　桂枝　桔梗　茯苓

皂角去皮弦炙　乾薑炮　黃連各八錢　人參

蜀椒微炒出汗　防風　巴豆去皮膜研出油

羌活　獨活各五錢　川烏炮去皮臍八錢

右爲細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三丸漸加至五丸七丸生薑湯送下食後臨臥服有孕者不宜服

溫白丸（和劑）

治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心旁攻兩脅十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥

卽前萬病紫菀丸方減羌活獨活防風

肺息賁加人參紫菀心伏梁加菖蒲黃連桃仁脾痞氣加吳茱萸乾薑肝肥氣加柴胡川芎腎奔豚加丁香茯苓遠志

萬病感應丸

卽前溫白丸內加羌活三稜甘遂杏仁防風各一兩五錢威靈仙一兩減蜀椒

千金硝石丸

止可磨塊不令困人須量虛實

硝石六兩　大黃八兩　人參　甘草各三兩

右爲細末以三年苦酒三升置器中以竹片作刻記每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬便可丸如雞子黃大每服一丸如不用大丸作梧子大每服三十丸服後下如雞肝米泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息

酢煑三稜丸（寶鑑下同）

治一切積聚不拘年深日久治之神效

荆三稜四兩酢煑竹刀切曬　川芎二兩酢煑切

大黃半兩酢浸濕紙裹煨過切

右爲末酢糊丸如桐子大每服三十丸溫水下無時病甚者一月效小者半月效

聖散子

治遠年積塊及婦人乾血氣

硇砂　大黃各八錢　麥蘗炒取淨麪六兩

乾漆炒烟盡三兩　萹蓄　茴香炒　檳榔各一兩

婦人乾血氣加穿山甲二兩炮右爲細末每服五錢臨臥溫酒調下仰臥此藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤爲驗藥並無毒有神效小兒用一錢十五以上三錢空心服之更效此按古本校定今綱目刻本硇砂乃六兩大黃乃八兩豈不悞人

雞爪三稜丸

治五臟痃癖氣塊

雞爪三稜　石三稜　荆三稜　木香　青皮

陳皮去白各半兩　硇砂三錢　檳榔一兩

肉豆蔻一兩

右爲細末生薑汁打麪糊爲丸桐子大每服二十丸薑湯下空心臨臥各一服忌一切生冷硬粘物

硇砂煎丸

消磨積塊痃癖一切凝滯

黑附子二枚各重五錢以上正坐妥者炮裂去皮臍剜作瓮子　硇砂　木香各三錢　川蓽茇　破故紙隔紙微炒各一兩

右將硇砂末用一盞水續續化開納在瓮內火上熬乾爲末安在附子瓮內却用剜出附子末塡蓋口用和成白麪裹約半指厚慢灰火內燒勻黃色去麪同木香等爲細末却用元裹附子熟黃麪爲末酢調煑糊爲丸如桐子每服十五丸至三十丸生薑湯下

削堅丸

治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹脹滿瘦瘁少食

鼈甲酢浸兩宿去裙襴再蘸酢炙黃取末秤

乾漆搗碎炒令煙出取末秤　荆三稜剉如半棗大

好醋浸兩宿焙取末秤各二兩半　肉桂去粗皮

細松烟墨燒去膠　沉香　乾薑炮　沒藥另研

蘿蔔子　乾蠍去毒炒　胡椒　檳榔　木香

硇砂通明者爲末另研飛各五錢　乳香另研

粉霜另研　輕粉各二錢五分

右爲細末研勻好醋煑薄麪糊爲丸如小菉豆大每服二十丸淡醋煎生薑湯送下日進二服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

一腎散

消積塊進飲食

橘紅一斤　甘草四兩　鹽五錢

右用水十椀從早煑至夜以爛爲度水乾則添水曬乾爲末淡薑湯調下有塊者加薑黃半兩同前藥煑氣滯加香附二兩同前藥煑氣虛者加沉香半兩另入噤口痢加蓮肉二兩去心另入

阿魏丸

去諸積

山楂　南星皂角水浸　半夏同南星浸　麥芽

神麴炒　黃連　蘿蔔子各一兩　連翹　貝母
阿魏醋浸　苦蔞各半兩　風化硝　石鹼
胡黃連　白芥子各二錢五分
右爲末薑汁浸炊餅丸

阿魏丸

去肉積

阿魏　山楂肉各一兩　連翹五錢　黃連六錢
右三味爲末以阿魏醋煮爲糊丸如桐子大每服五六十丸食前用白湯送下脾胃虛者用白朮三錢陳皮茯苓各一錢煎湯送下

散聚湯（三因）

治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作心腹絞痛攻刺腰脅小腹䐜脹大小便不利

半夏湯浸七次　當歸　檳榔各七錢五分
杏仁去皮尖麩炒　陳皮去白　炙甘草　桂心
茯苓各二兩　枳殼麩炒　附子炮去皮臍
川芎　厚朴薑製　吳茱萸湯浸各一兩
右每服四錢水一盞薑三片煎七分食前溫服大

便不利加大黃

新製陰陽攻積丸（醫宗必讀）

治五積六聚七癥八瘕痃癖蟲血痰食不問陰陽皆效

吳萸泡　乾薑炒　官桂去皮　川烏炮各一兩

黃連炒　半夏洗　橘紅　茯苓　檳榔　沉香

厚朴炒　枳實炒　菖蒲忌鐵　延胡索炒

人參　琥珀另研　桔梗各八錢　巴霜另研五錢

右爲細末皂角六兩煎汁泛爲丸如菉豆大每服八分漸加一錢五分生薑湯送下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十八卷目錄

醫部彙考三百十八

積聚門三

方二　三稜湯　阿魏膏　化氣湯　百勞丸
通元二八丹　香稜丸　大七氣湯　遺
堅湯　眞人化鐵湯　石英散　紅丸子　佐
脾丸　妙應丹　桂香丸　勝紅丸　增味四
物湯　三稜煎　千金化氣丸　金露丸　荊
蓬煎丸　祕方化滯丸　三稜化積丸　寬中
丸　萬應丸　延年護命丹　桃溪氣寶丸
琥珀膏　五仙膏　貼痞膏　保安丸　小七
香丸　取蟲丸　神保丸　三稜散　桃仁煎
穿山甲散　遇仙丹　感應丸　陳米三稜

丸　積塊丸　消痞核桃丸　神化丹　雷丸丸
化蟲丸　黃連消痞丸　木香硇砂煎丸
青鹽丸　乾柹丸　大和中飲　芍藥枳朮丸
赤金豆　百順丸　理陰煎　養中煎　溫
胃飲　煖肝煎　小和中飲　神香散
單方
鍼灸
導引
醫案

藝術典第三百三十八卷

醫部彙考三百十八

積聚門三

方二

三稜湯（河間下同）

治癥瘕痃癖積聚不散堅滿痞膈食不下腹脹

荆三稜二兩　白朮一兩　蓬朮　當歸各半兩

檳榔　木香各七錢五分

右爲末每服三錢沸湯調下

阿魏膏

治一切痞塊更服胡黃連丸

羌活　獨活　元參　官桂　赤芍藥　穿山甲

生地黃　兩頭尖　大黃　白芷　天麻各五錢

槐枝　柳枝　桃枝各三錢　木鼈子仁二十枚

亂髮如雞子大一團　紅花四錢

右用香油二斤四兩煎黑去柤入髮煎髮化仍去柤徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用眞正者效凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

化氣湯（三因）

治息積

砂仁　桂心　木香各二錢半　甘草炙　陳皮

茴香微炒　丁香皮　青皮去瓤炒　乾薑

蓬朮炮各半兩　胡椒　沉香各一錢

右爲細末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人酢調下

百勞丸（河間）

治一切勞瘵積滯疾不經藥壞證者宜服

當歸炒　乳香研　沒藥研各一錢　人參二錢

䗪蟲去翅足　水蛭炒　桃仁各十四箇去皮尖

大黃四錢

右爲細末煉蜜和丸桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物爲度服白粥十日百勞水杓揚百遍乃仲景甘爛水也

通元二八丹（入門下同）

治積聚

黃連八兩　芍藥　當歸　生地　烏梅各五錢

右爲末雄猪肚一具入藥於內以線縫之鋪韭菜二斤於鍋內蒸之一日以藥熟爲度取出搗丸梧子大空心薑湯下七十丸或瀉一二次以粥補住

香稜丸

治五積六聚氣塊

三稜　檳榔各三兩　山楂二兩　香附　枳殼

蘿蔔子　枳實　蓬朮　陳皮　青皮各一兩

黃連　神麴　麥芽　鼈甲　乾漆　桃仁

硇砂　縮砂　當歸尾　木香　甘草各五錢

右爲末酢糊和丸梧子大白湯下三五十丸

大七氣湯

治五積六聚心腹痛脹二便不利

三稜　蓬朮　青皮　陳皮　桔梗　藿香

益智仁　香附子　肉桂　甘草各一錢

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服

一方加大黃檳榔各一錢治諸痞積面色萎黃四肢無力皆緣內有蟲積或好食生米或壁土或茶炭鹹辣等物只此一服除根用水煎露一宿空心溫服不得些少飲食不然則藥力減而蟲積不行矣服後心腹痛當下惡物如魚凍蟲鼈至日午下積盡方用溫粥止之

潰堅湯（同春下同）

治五積六聚諸般痞塊

當歸　白朮　半夏　陳皮　枳實　山樝肉

香附　厚朴　縮砂各一錢　木香五分磨汁

右剉作一貼水煎調木香汁服之一方加海粉瓦壟子鼈甲炙爲末將阿魏醋煮化入薑汁糊和丸梧子大酒下五七十丸名潰堅丸

眞人化鐵湯

治五積六聚痃癖癥瘕

三稜　蓬朮　青皮　陳皮　山楂肉　神麴

枳實　厚朴　黃連　當歸　香附子　川芎

桃仁　檳榔各五分　紅花　木香　甘草各三分

右剉作一貼薑三片棗一枚煎服

石英散（三因）

治石瘕

紫石英酢淬一兩　當歸尾　馬鞭草　紅花炒

烏梅肉各五錢　蓬朮酢炒　三稜酢炒　蘇木節

各三錢　沒藥　琥珀　甘草各一錢

右爲末以濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒薑湯調下

紅丸子（得效）

治食積酒積脾積血氣諸般癥塊

三稜　蓬术　青皮　陳皮各五兩　胡椒

乾薑各一兩

右爲末酢煑麪糊和丸梧子大礬紅爲衣薑湯吞下五七十丸

佐脾丸（丹溪）

治食積

山樝肉三兩　連麹　陳皮　蘿蔔子炒各五錢

赤茯苓　半夏各一錢

右爲末粥丸菉豆大溫水吞下五七十丸

妙應丹（得效）

治飲食中蠱毒或食水陸果瓜子卵入腹而成蟲蛇魚鼈或宿食留飲結爲癥瘕

附子四箇七錢重者生去皮臍剜作瓮入硇砂共一兩七錢重麪裹煨熟去麪不用　蓽茇　木香

青皮　破故紙各三兩五錢

桂香丸（入門）

右爲末麪糊和丸梧子大生薑橘皮湯下三十丸

治多食雜瓜果子成積腹脹氣急

桂心一兩　麝香一錢

右爲末飯丸菉豆大白湯吞下十五丸

勝紅丸（丹溪）

治血積酒積及婦人脾血積氣

三稜　蓬朮並醋炒　青皮　陳皮　乾薑炮

良薑炒各一兩　香附子醋炒二兩

右爲末醋糊和丸梧子大薑湯下三五十丸

增味四物湯（東垣）

治血積

熟地　當歸　川芎　白芍　三稜　蓬朮

乾漆炒　肉桂各等分

右水煎服

三稜煎（入門）

治食癥酒癖血瘕氣塊

三稜　蓬朮各四兩　芫花一兩同入磁器中米醋五盞浸之封口灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦共焙乾

右爲末酢糊和丸菉豆大薑湯下十五丸

千金化氣丸

治男子腹中氣塊痞結

厚朴　腹皮　白芍藥　川芎　白芷　青皮

陳皮　枳殼　香附　砂仁　白蔻　三稜

莪术　延胡各一兩　藿香　半夏　草果

檳榔各一兩半　小茴香　乾薑　木香各五錢

甘草三錢　丁香二錢

右剉生薑三片水煎空心溫服

金露丸（局方）

治腹內一切積聚癥塊作痛

草烏炮　黃連各一兩　生地黃　貝母　桔梗

巴豆霜　柴胡　紫菀　吳茱萸　菖蒲　乾薑

白茯苓　桂心　芎藭　人參　甘草　防風

厚朴　枳殼　鼈甲　川椒　甘遂各五錢

右爲末麪糊和丸梧子大薑湯下三丸或五丸

荆蓬煎丸（得效）

消癥塊冷熱積聚破痰癖消化宿食

三稜　蓬朮並酒浸三日夏一日取出同巴豆肉三十八粒同炒黃色去巴豆却用湯浸去白各二兩

木香　枳殼　青皮　茴香炒　檳榔各一兩

右爲末麪糊和丸菉豆大薑湯下三五十丸

祕方化滯丸（丹溪）

理一切氣化一切積久堅沉痼磨之自消暴積乍留導之立去奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙

三稜　蓬朮並煨各四錢八分　半夏麴　木香丁香　青皮　陳皮並去白　黃連各二錢五分

巴豆肉醋浸一宿熬乾六錢　烏梅肉焙末五錢

右爲末以烏梅末入白麪少許煮作糊和丸黍米大每服五七丸至十丸欲通利則以熱湯下欲磨積則以陳皮湯下欲止泄則飲冷水

三稜化積丸（醫鑑）

治諸般積聚

三稜酒煮六兩　山楂肉四兩　大黃酒蒸

檳榔各三兩　蓬朮醋煮　木香　青皮　陳皮

香附子酢炒　枳實　厚朴　縮砂　神麯炒
麥芽炒　南星薑湯炮　半夏薑製　蘿蔔子炒
黃連炒　桃仁　乾漆炒　甘草各一兩
右爲末酢糊和丸梧子大白湯下四五十丸

寬中丸（類聚下同）

治七癥八瘕五積六聚痃癖氣塊胷腹脹痛面黃肌瘦一切沉滯之疾

蒼朮炒　烏藥　香附各二兩　青皮　乾薑炮
三稜　蓬朮並酢煮　陳皮　良薑炮　茴香炒
神麴　麥芽炒各一兩
右爲末酢糊和丸梧子大薑湯下五十丸

萬應丸

破一切積散一切氣氣蠱血塊癥瘕積聚食積肉積酒積鼓脹浮腫痰飲等證

硇砂水飛　阿魏酢研　大黃　吳茱萸　青蒙石
焰硝（同蒙石煆）　肉桂　木香　青皮　延胡　當歸
五靈脂　蛤粉炒　乳香　沒藥　菖蒲　皂角
茴香炒　乾漆炒　檳榔　陳皮　枳殼　三稜

蓬术並酢煨　丁香　穿山甲　良薑炒　甘遂
芫花　大戟　雄黃各二錢半　巴豆霜一錢半
右爲末酢糊和丸梧子大薑湯下三五十丸

延年護命丹

治三十六般積二十四般氣及血積蟲積
大黃十兩半生半酢浸切片焙乾　乳香　沒藥
輕粉各一錢　芫花　鼈甲酢炙各五錢　蓬术
三稜並炮　黑丑頭末一兩　陳皮二錢五分與芫
花同酢浸一宿焙乾
右爲末蜜和搗千杵每一兩分作四丸細嚼一丸
溫水送下臨臥時明早取下惡物爲效三日只吃
白粥將息忌生冷油膩

桃溪氣寶丸

治積聚癥瘕腹脅如抱一瓮瘦瘠露骨一切氣積
食積大便祕澀寒熱往來
黑丑頭末二兩　大黃一兩半　羌活　茴香炒
川芎　木香　當歸　陳皮各五錢　檳榔
青皮各一兩

右爲末熬皂角膏和丸薑湯下五七十丸

琥珀膏（丹溪）

貼積塊

大黃　朴硝各一兩

右爲末大蒜搗爲膏和勻作片貼之入門加麝香五分名硝黃膏

五仙膏（回春）

治一切痞塊積聚癖疾

大黃　皂角　生薑　生葱　大蒜各半斤

右共搗爛水煎取汁去滓再熬成膏黑色爲度攤絹帛上先以鍼刺患處後貼膏藥

貼痞膏（入門）

水紅花子二錢　生大黃　朴硝　山梔仁　石灰各一錢　酒酵一塊如雞子大

右共搗成膏用布攤開貼痞塊上再用湯瓶熨手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

保安丸

治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及遶

臍腹痛不可忍者

大黃三兩蒸熟切片焙　大附子五錢去臍皮

乾薑一兩炮　鼈甲一兩半醋煑一伏時炙黃炒

右爲末取三年米酢一大升先煑四五合然後和藥丸如桐子大每服十丸至二十丸空心酢或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁淸泥當下

小七香丸（和劑下同）

溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆氣膈食噎茶酒食積

甘松八兩　益智仁六兩　香附子炒　丁香皮

甘草炙各十二兩　蓬朮煨　縮砂各二兩

右爲末蒸餅爲丸菉豆大每服二十丸溫酒薑湯熱水任下

取蟲丸

治蟲積

胡黃連　蕪荑　雷丸　鶴虱　大黃　史君子

錫灰　三稜　蓬朮　木香　檳榔　靑皮

右爲細末丸服

神保丸

治宿食不消

木香　胡椒各二錢五分　巴豆十粒去皮心研

乾蠍七枚

右爲末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢爲衣每服五九用柿帶湯或薑酢茶蜜茴香等湯隨宜送下

三稜散

治積聚癥瘕痃癖不散堅滿痞悶食不下

三稜　白朮炒各二兩　蓬朮　當歸各五錢

木香　檳榔各三錢

右爲末每服三錢沸湯調下

桃仁煎（良方下同）

治血瘕

桃仁　大黃炒　朴硝各一兩　蝱蟲半兩炒黑

右爲末以醇酢一中盞煑三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下朴硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五九日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之

穿山甲散

治癥痞瘀血心腹作痛

穿山甲炙　鼈甲酢炙　大黃炒　乾漆炒煙盡

桂各一兩　川芎　芫花酢炒　歸尾各五錢

麝香一錢

右爲末每服一錢酒調下

遇仙丹

追蟲逐積消癖利痰萬病可除

黑丑頭末　檳榔各一斤　大黃半斤　三稜

莪朮酢炙各四兩　木香二兩

右爲末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煑麪糊爲丸桐子大每服四五十丸以強弱加減五更茶淸下如未通再飲溫茶助之下蟲積惡物盡了白粥補之

感應丸

治宿食積滯腹痛胷膈痞悶疼痛吐瀉

木香　肉豆蔻　丁香各一兩半　乾薑炮一兩

巴豆七十粒取霜　杏仁一百四十粒去皮尖研

百草霜二兩

右先將前四味爲末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶化以絹濾淨更用好酒一升於銀石器內煮黃蠟數沸待傾出其蠟自浮聽用凡春夏修合先用香油一兩銚內熬令香油熟次下酒蠟四兩同化成汁就銚內乘熱拌和前藥成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之若秋冬須用香油一兩五錢每服三十丸空心薑湯下

陳米三稜丸

消積聚去米麪五穀等積

陳倉米一兩用新巴豆五枚去殼同米慢火炒巴豆焦色去豆不用　陳皮　三稜煨　砂仁　麥芽各二錢　南木香一錢

右爲末酢糊和丸菉豆大每服十五丸至二十丸食遠薑湯送下

積塊丸

治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹中飽脹或蟲積疼痛皆能取效如神不傷元氣

沉香八分　三稜　莪术並醋煨　自然銅
蛇含石二味並燒紅醋淬七次各二錢　木香一錢
半　雄黃　全蜈蚣焙各一錢二分　辰砂八分
鐵華粉糯米醋炒一錢　冰片五分　蘆薈
天竺黃　阿魏　全蠍洗焙乾各四錢

右爲極細末用雄猪膽汁爲丸黑狗膽汁尤妙丸如梧桐子大每服七八分重者一錢五更酒送下塊消卽止不必盡劑

消痞核桃

莪术酒洗　當歸酒洗　白芥子四兩　皮硝
海粉各八兩　急性子四兩搗　大核桃一百枚

右先以羣藥入砂鍋內寬水煑三四沸入核桃重五錢者百枚同煑一日夜以重一兩爲度取起晾乾先用好膏藥一箇摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熱手磨擦每空心服前桃一箇三日後二箇以至三箇服完用四物湯之類數貼卽愈

神化丹（秘方）

消癖積破血氣及下諸癖積血氣塊

硇砂　乾漆炒　血竭各三錢　乳香一錢五分

紅娘子二十箇去翅　盤蝥二十箇去翅足

右爲末棗肉爲丸如豌豆大每服一丸至三五丸臨臥或棗湯或薑湯或紅花蘇木湯送下

雷丸丸（外臺）

雷丸　陳皮　桃仁去皮尖麩炒各一兩二錢半

貫衆　蕪荑　青葙子　乾漆炒煙出各一兩

亂髮雞子大燒存性　狼牙一兩半

右爲細末煉蜜丸如小豆大空心溫酒送下二十丸日三服

化蟲丸

鶴虱去土　檳榔　苦楝根　胡粉炒各一兩

枯白礬二錢五分

右爲末米糊丸如桐子大一歲服五丸量人大小加減丸數溫漿水入生麻油三四點打勻送下清米湯亦可不拘時其蟲細小者皆化爲水大者自下

黃連消痞丸

治心下痞滿壅滯不散喘促不安

黃連一兩　黃芩二兩炒　枳實七錢麩炒
半夏九錢　陳皮　猪苓各五錢　白术
甘草炙各三錢　澤瀉一錢　薑黃二錢

右爲末蒸餅爲丸如梧桐子大每服五七十丸白滾湯任下

木香硇砂煎丸

木香　硇砂　官桂　附子炮　乾漆炒去烟
牙皂角　細墨　乳香研　荆三稜炮　廣术炮
大黃炒另末　沒藥研　乾薑炮　青皮各一兩
巴豆霜五錢

右除研藥外同爲末以好醋一升化開硇砂去粗查銀石器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末膏內和丸如桐子大每服三五十丸食後溫酒送下

青鹽丸

青鹽　硇砂各一錢　麯末三錢　鹽豉四十箇
大椒　巴豆各三十箇去皮心膜出油

右棗肉三十箇同研勻酢糊丸桐子大每服三十丸溫薑湯下積在上食後積在下食前服

乾柿丸

猪牙皂角去皮弦子　乾漆炒烟盡　沒藥研　三稜炮　青蒙石　乾薑炮　水銀結沙子各一錢　輕粉二錢　巴豆三十枚去皮膜酢煮十沸

右件各研勻軟飯和丸菉豆大朱砂一錢爲衣柿蔕湯冷下三五丸加減用之婦人有胎勿用

大和中飲

治飲食畱滯積聚等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂　麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢五分

右水一鍾半煎七分食遠溫服

芍藥枳朮丸

治食積痞滿脾胃不和等證

白朮麪炒　赤芍藥各二兩酒炒　陳皮畱白　枳實各一兩麪炒

右荷葉湯煑黃老米粥爲丸桐子大米飲或滾白

湯任下百餘丸

赤金豆

治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹蟲積結聚癥堅宜此主之此丸去病捷速較之硝黃稜莪之類過傷臟氣者大爲勝之

巴豆霜去皮膜略去油一錢五分　輕粉一錢　生附子略炒燥切　皂角炒微焦各二錢　丁香　木香　天竺黃各三錢　朱砂二錢

右爲末酢浸蒸餅爲丸蘿蔔子大朱砂爲衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑酢茶蜜茴香史君子煎湯爲引送下若利多不止可飲冷水一二口卽止蓋此藥得熱則行得冷則止也

百順丸

治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒實熱秘結等證但爲湯引隨宜送下無往不利

川大黃錦紋者一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅擣丸菉豆大每服五分或一

錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜爲丸亦可一

名八仙丹

理陰煎

治肝腎不足積聚等證

熟地黃三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

右水二鍾煎七八分熱服

養中煎

治脾胃不足積聚等證

人參一二三錢　白扁豆二三錢炒　山藥炒

茯苓各二錢　乾薑炒黃一二錢　炙甘草一錢

右水二鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲

治前證

人參一二三錢或一兩　白术炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　陳皮或不用　炙甘草各一錢

乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（滑泄者勿用）

右水二鍾煎七分食遠溫服

煖肝煎

治同理陰煎

當歸二三錢　枸杞子三錢　白茯苓　烏藥

小茴香各二錢　肉桂一二錢　沉香一錢（木香亦可）

右水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服

小和中飲

治氣虛不堪攻擊者

扁豆　山楂各二錢　甘草五分　白茯苓

陳皮　厚朴各一錢五分

右水一鍾半加生薑三五片煎服

神香散

治氣聚

丁香　白豆蔻或砂仁亦可

右二味等分爲末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘

單方

奔豚氣痛枳實蒸爲末飲下方寸匕日三夜一（外臺）

奔豚氣痛上冲心腹鼈甲酢炙三兩京三稜煨二兩桃仁去皮尖四兩湯浸研汁三升煎二升入末煎良久下酢一升煎如餳每空心酒服半匙（聖濟總錄）

腹中鼈癥胡粉黍米淋汁溫服大效（易簡方）

心腹宿癥及卒得癥朱砂研細搜飯以雄雞二隻餓二日以飯飼之收糞曝燥爲末溫酒服方寸匕日三服服盡更作愈乃止（外臺）

腹脅痞塊雄黃白礬各一兩爲末麪糊調膏攤貼卽效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈（祕方也）

癥瘕積聚雄黃二兩爲末水飛去皮入新竹筒內以蒸餅一塊塞口蒸七度用粉脂一兩和丸菉豆大每服七丸酒下日三服（千金方）

腹脅積塊風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩略炒入米酢和成膏攤絹上貼之內服消塊藥甚效（丹溪）

食魚鱠多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取水中小白石數十枚燒赤投五升水中七遍熱飲如此三五度當利出瘕也

腹中痞塊皮硝一兩獨蒜一箇大黃末八分搗餅貼患處以消爲度（經驗方）

積年氣塊臍腹疼痛硇砂酢煮二兩木瓜三枚切去瓤入硇砂在內椀盛於日中曬至瓜爛研勻以米酢五升煎如稀餳密收用時旋以附子末和丸梧子大熱酒化下（聖惠下同）

治痃癖癥塊暖水臟殺三蟲婦人血氣子宮冷臟月

收桑條灰淋去苦汁日乾每硇砂一兩用水三兩以水化硇拌灰乾濕得所以瓶盛灰半寸入硇於內以灰塡蓋固濟文武火煅赤冷定取出以箕鋪紙三重安藥於上以熱水淋之直待硇味盡卽止以鉢盛汁於熱灰中養之常令魚眼沸待汁乾入瓶再煅一食頃取出重研以粟飯和丸菉豆大每空心酒下五丸病去卽止名硇砂丸

嗜酒任氣血凝於氣則爲氣鼈嗜酒痼冷敗血入酒則爲酒鼈搖頭掉尾大者如鼈小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脅背或隱腸腹用生硫黃末老酒調下常服之（直指方）

膜外氣痛及氣塊延胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之（勝金方）

癥瘕鼓脹三稜煎用三稜根切一石水五石煑三石去滓更煎取三斗汁入鍋中重湯煎如稠糖密器收之每旦酒服一匕日二服（千金翼）

痃癖氣塊草三稜荊三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩硇砂二錢爲末糊丸

梧子大每薑湯服三十丸（奇效良方）

痃癖不瘥脅下硬如石京三稜一兩炮川大黃一兩爲末酢熬成膏每日空心生薑橘皮湯下一匙以利下爲度（聖惠）

痞氣胷滿口乾肌瘦食減或時壯熱石三稜京三稜雞爪三稜並炮蓬莪朮三枚檳榔一枚青橘皮五十片酢浸去白陳倉米一合酢浸淘過巴豆五十箇去皮同青皮倉米炒乾去豆爲末糊丸菉豆大每米飲下三丸日一服（聖濟總錄）

老少痃癖往來疼痛香附南星等分爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯下二三十丸（聖惠）

腹中痞塊蓍葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好酢搗成餅量痞大小貼之兩炷香爲度其痞化爲膿血從大便出（保壽堂）

卒暴癥疾腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬之密封於灰火中溫令味出每服五合至一升隨量飲（肘後方）

凡食魚膾及生肉在胷膈不化成癥瘕馬鞭草搗汁

飲一升即愈（千金）

卒暴癥塊堅如石作痛欲死取蒴藋根一小束洗淨細擘以酒二升漬三宿溫服五合至一升日三服若欲速用於熱灰火中溫出藥味服之此方無毒已愈十六人矣（錄驗）

鼈瘕堅硬腫起如盆眠臥不得蒴藋根白皮一握搗汁和水服（千金）

癖痞鼓脹及堅硬如杯盌者用水紅花子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮硝四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以長帛束之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二三次倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間服錢氏白餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者爲實不喘者爲虛（經驗方）

腹中痞積水紅花或子一盌以水三盌用桑柴文武火煎成膏量痞大小攤貼仍以酒調膏服忌腥葷油膩之物（保壽堂）

腹中暴癥硬如石刺痛不治百日內死取虎杖根勿

令影臨水上可得石餘洗乾搗末秫米五斗炊飯納入攪之好酒五斗漬之封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚及鹽但取一斗乾者薄酒漬飲從少起日三服亦佳癥當下也此方大勝諸藥（外臺下同）

萬病積聚七八月收蒺藜子水煑熟曝乾蜜丸梧子大每酒服七丸以止爲度其汁煎如飴服之

腹中痞塊大黃十兩爲散醋三升蜜兩匙和煎丸梧子大每服三十丸生薑湯下以利爲度

腹脅積塊大黃二兩朴硝一兩爲末以大蒜同搗膏貼之或加阿魏一兩尤妙（丹溪）

久患積聚二便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩爲末水丸梧子大每湯下四十丸日三以止爲度（千金）

脾癖疳積不拘大人小兒錦紋大黃三兩爲末醋一盞沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研用舶上硫黃形如琥珀者宮粉各一兩同研勻十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服若

不忌口不如勿服（聖濟總錄）

腹中暴癥有物如石刺痛啼呼不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷即易晝夜勿息（千金）

痃癖如石在脅下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥火煎如餳每服棗許空腹熱酒下以利下惡物爲度

中焦熱痞善忘不禁蔄茹三分甘草炙二兩消石爲末每服一錢雞鳴時溫酒下以止爲度（聖惠）

心下伏瘕大如杯不得食者澤漆四兩大黃葶藶熬三兩搗篩蜜丸梧子大每服二丸日三服（肘後方）

痞證發熱盜汗胷背疼痛甘遂麪包漿水煮十沸去麪以細糠火炒黃爲末大人三錢小兒一錢冷蜜水臥時服忌油膩魚肉（普濟方）

涎積癥塊續隨子三十枚膩粉二錢青黛炒一錢研勻糯米飯丸芡子大每服一丸打破以大棗一枚燒熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後取下積聚惡物爲效（聖濟總錄下同）

積冷成痃癖不思飲食羸困者莨菪子三分水淘去浮者大棗四十九箇水三升煑乾只取棗去皮核每空心食一箇米飲下覺熱卽止

胷中結聚如核巴豆半兩去皮心炒搗如泥藜蘆炙研一兩蜜和丸麻子大每呑一二丸（肘後方下同）

腹中癥結妨害飲食羸瘦射罔三兩椒三百粒搗末雞子白和丸麻子大每服一丸漸至三丸以愈爲度

風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸一宿長流水內洗半日生絹袋盛掛風處令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫久服令人體淸瘦（斗門方）

一切積氣宿食不消黑牽牛頭末四兩用蘿蔔剜空安末蓋定紙封蒸熟取出入白豆蔻末一錢搗丸梧子大每服一二十丸白湯下名順氣丸

男婦五般積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸梧子大至重者三十五丸陳橘皮生薑煎湯臥時服半夜未動再服三十丸當下積聚之物尋常行氣每服十丸（博濟方）

胷膈食積牽牛末一兩巴豆霜三箇研末水丸梧子

大每服二三十丸食後隨所傷湯下（子和）

追蟲取積用黑牽牛半兩檳榔二錢半爲末每服一錢紫蘇湯下（普濟方）

男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二錢半烏藥五分好酒一盞雞子一箇灰火煨一宿五更視雞子殼軟爲度去滓溫服以乾物壓之側睡向塊邊滓再煎次日服覺塊刺痛是其驗也（摘元）

病髮癥者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲之疲極眠睡病當從口出急以石灰粉手捉取抽盡即是髮也

胷喉間覺有癥蟲上下常聞葱豉食香此乃髮癥蟲也二日不食開口而臥以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以物引去之必愈

腹中癖氣生芋子一斤壓破酒五斤漬二七日空腹每飲一升神良（獨行方）

腹內鼈癥陳醬茄兒燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之（壽域方）

心腹積結氣杏仁桂枝橘皮訶黎勒皮等分爲丸每

服三十丸白湯下無忌（食療）

虛寒積癖在背膜之外流於兩脅氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救用胡椒一百五十粒全蠍去毒十箇木香不見火二錢半爲末粟米飯丸菉豆大每服十五丸橘皮湯下名磨積丸（濟生方）

腹中癥塊茱萸三升搗和酒煮熟布裹熨癥上冷更炒熱更番熨之癥移走逐熨之消乃止（集驗方）

脾積結塊雞子五箇阿魏五分黃蠟一兩同煎化分作十服每空心細嚼溫水送下諸物不忌腹痛無妨十日後大便下血乃積化也（保壽堂）

痞塊有積阿魏五錢五靈脂炒烟盡各五錢爲末以黃雄狗膽汁和丸黍米大空心唾津送下三十丸忌羊肉酢麪（扶壽精方）

腹中痞積觀音柳煎湯露一夜五更空心飲數次痞自消（易簡方）

腹滿癖堅如石積年不損者用白楊木東枝去粗皮細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓還納酒中密封再宿每服一合日三服（外臺）

腹中鼈瘕用蕪荑炒煎服之兼用暖胃益血理中之類乃可殺之若徒事雷丸錫灰之類無益也（直指方）

卒心腹癥瘕堅滿痃癖橉木灰淋汁八升釀米一斗待酒熟每溫飲半合漸增至一二盞即愈

血瘕癥癖用鼈甲琥珀大黃等分作散酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服也（甄權下同）

痃癖癥積用鼈甲酢炙黃研末牛乳一合每調一匙朝朝服之

痃癖氣塊用大鼈一枚以蠶沙一斗桑柴灰一斗淋汁五度同煮如泥去骨再煮成膏擣丸梧子大每服十九日三（聖惠）

食髮成瘕心腹作痛咽間如有蟲上下嗜食與油者是也用猪脂二升酒三升煮三沸服日三次

脾積痞塊猪脾七箇俱用新針刺爛以皮硝一錢擦之瓷器盛七日鐵器焙末又用水紅花子七錢同擣爲末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服（保壽堂）

膜內氣塊猪脠一具炙蘸延胡索末食之（易簡方）

腹中冷癖水穀凝結心下停痰兩脅痞滿按之鳴轉逆害飲食大蟾蜍一枚去皮腸支解之芒硝壯人一升中人七合弱人五合水七升煑四升頓服得下爲度（肘後方）

諸果成積傷脾作脹氣急用麝香一錢生桂末一兩飯和丸菉豆大大人十五丸小兒七丸白湯下蓋果得麝則落木得桂卽枯故也（濟生）

抑結不散用龜下甲酒炙五兩側柏葉炒一兩半香附童便浸炒二兩爲末酢糊丸梧子大每空心溫酒服一百丸

心下鼈瘕黑貓頭一枚燒灰酒服方寸匕日三（壽域方）

魚肉成癥幷治諸毒用狗屎五升燒末綿裹於五升酒中浸二宿取淸日三服癥卽便出也（外臺）

癥積滿腹諸藥不瘥者人溺一服一升下血片塊二十日卽出也（蘇恭）

血塊血竭沒藥各一兩滑石牡丹皮同煑過一兩爲末酢糊丸梧子大服之（摘元方）

蛇癥白馬尾切細酒服初服五分一匕次服三分一

匕更服二分一匕不可頓服殺人（千金翼）

肉癥思肉白馬尿三升飲之當吐肉出不出則死

髮瘕咽中如有蟲上下是也白馬尿飲之佳（千金）

伏梁心積銅器承白馬尿一升旦旦服之妙（小品方）

痞塊心痛殭蠶末二錢白馬尿調服并敷塊上（摘元方）

誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹內常饑食物卽吐以赤足蜈蚣一條炙研末酒服（易簡方）

山野人好嚼虱在腹生長爲虱癥用敗梳敗篦各一枚各破作二分以一分燒研以一分用水五升煑取一升調服卽下出（千金）

血積成塊壁虎一枚白麵和鴨子皮包裹研爛作餅烙熟食之當下血塊不過三五次卽愈甚驗（青囊方）

心腹鼈瘕及宿癥并卒得癥以飯飼白雄雞取糞同小便於瓦器中熬黃爲末每服方寸匕溫酒服之日四五服或雜飯飼之以消爲度亦佳（集驗）

食米成瘕好食生米口中出清水以雞矢同白米各半合炒爲末以水一鍾調服良久吐出如米形卽瘥昔慎恭道病此肌瘦如勞蜀僧道廣處此方而愈（醫說）

腹中癖積黃牛肉一斤恆山三錢同煮熟食肉飲汁癖必自消甚效（筆峯雜興）

脾積痞氣牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃牸牛腦子一箇去皮筋擂爛皮硝末一斤蒸餅六箇曬研和勻糊丸梧子大每服二十丸空心好酒下日三服百日有驗（聖濟總錄）

氣積成塊牛腦散用牛腦子一箇去筋雄雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香砂仁各三兩皮硝一椀杵千下入生銅鍋內文武火焙乾爲末入輕粉三錢合勻每服二錢空心燒酒服日三服

鍼灸

甲乙經曰息賁時唾血巨闕主之

腹中積上下行懸樞主之

暴心腹痛疝橫發上衝心雲門主之

心下大堅肓俞期門及中脘主之

賁肫上腹䐜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之

臍下疝繞臍痛石門主之

奔肫氣上腹䐜痛强不能言莖腫先引腰後引小腹

腰髖堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之

奔肫寒氣入小腹時欲嘔傷中溺血小便數背臍痛引陰腹中窘急欲湊後泄不止關元主之

奔肫上搶心甚則不得息忽忽少氣尸厥心煩痛饑不能食善寒中腹脹引膹而痛小腹與脊相控暴痛時窘之後中極主之

腹中積聚時切痛商曲主之

臍下積疝瘕胞中有血四滿主之

臍疝繞臍而痛時上衝心天樞主之

氣疝噦嘔面腫奔肫天樞主之

奔肫卵上入痛引莖歸來主之

奔肫上下期門主之

疝瘕髀中急痛循脅上下搶心腹痛積聚府舍主之

奔肫腹脹腫章門主之

少腹積聚勞宮主之

環臍痛陰騫兩丸縮堅痛不得臥太衝主之

寒疝下至腹腠膝腰痛如清水大腹（一作小腹）諸疝按之至膝上伏兔主之

寒疝痛腹脹滿痿厥少氣陰市主之

大疝腹堅丘墟主之

胞中有大疝瘕積聚與陰相引而痛苦涌泄上下出補尺澤太谿手陽明寸口皆補之

千金方曰氣海主小腹疝氣遊行五臟腹中切痛

膈腧陰谷主腹脹胃脘暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛（一名商曲）

四滿主腹僻切痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積疼淫濼

中極主小腹積聚堅如石小腹滿

通谷主結聚畱飲癖囊胷滿飲食不消

膀胱腧主堅結積聚

上脘主心下堅積聚冷脹

胃脘三膲腧主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消

懸鍾主腹中積上下行

太陰郄主腹積聚

衝門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

中脘主腹脹不通疰大便堅憂思損傷氣積聚腹中甚痛作膿腫往來上下

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移以大針刺中脘久持之中不動乃出針

得效方曰奔豚上氣心痛欲絕急以溫湯浸手足數數易之仍灸氣海關元期門章門各百壯中極五十壯

癥瘕灸足踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百壯中脘二百壯

醫學綱目曰癥瘕積塊先於塊上鍼之甚者又於塊首一鍼塊尾一鍼立應鍼訖灸之又灸三里

積聚取中脘懸樞脾俞商曲補尺澤太谿

積塊取章門中脘氣海天樞上脘通谷

醫學入門曰痞塊用稻稈心量患人足大指齊量至足後跟中住將此稈從尾骨尖量至稈盡處兩旁各開一韭葉許在左灸右在右灸左鍼三分灸七壯神效

又法於足第二指岐叉處灸五七壯左患灸右右患

灸左灸後一晚夕覺腹中響動是驗也

玉機微義曰凡灸痞者須灸痞根無有不效其法在脊背十三椎下當脊中點墨記之此非灸穴却於墨兩旁各開三寸半以指揣摸覺微有動脈即點穴灸之大約穴與臍平多灸左邊或左右俱灸此即痞根也或患左灸右患右灸左亦效

灸穴法中脘期門章門脾俞三焦俞通谷此諸痞所宜灸者

積痞在上者宜灸上脘中脘期門章門之類積塊在下者宜灸天樞章門腎俞氣海關元中極水道之類凡灸之法宜先上而後下臍腹之壯用宜稍大皆先灸七壯或十四壯以後漸次增加愈多愈妙以上諸穴皆能治痞宜擇而用之然猶有不可按穴者如痞之最堅處或頭或尾或突或動處但察其脈絡所由者皆當按其處而灸之火力所到則其堅聚之氣自然以漸解散有神化之妙也但灸痞之法非一次便效務須或彼或此擇其要至再至三連次陸續灸之無有不愈者

導引

保生祕要曰痞塊導引法以左手向前上伸以右手向後下伸閉氣一口抽身轉項左右換轉各七十廻俟後內微覺響聲身熱乃止兼行後功

運功注臍發運患處撤散或想刀劈破氣塊推之四旁又灌火燒之或用梭法

血積時以神火不顧胷膈積蟲痛處念圈自內小圈而至大圈久而覺內中燒熱蟲不能容用意分兩邊撥散背後下大腸去再用脚底之水自脚肋至脚肚

而上至於腰背處洗之復併送大腸從大便而出其蟲自消

鬱積血腫疼處想火燒之水洗之復想疼處一孔鬱氣從此出

醫案

史記倉公傳曰齊中尉潘滿如病少腹痛臣意診其脈曰遺積瘕也臣卽謂齊太僕臣饒內史臣繇曰中尉不復自止於內則三十日死後二十餘日溲血死病得之酒且內所以知潘滿如病者臣意切其脈深小弱其卒然合合也是脾氣也右脈口氣至緊小見瘕氣也以次相乘故三十日死三陰俱摶者如法不俱摶者決在急期一摶一代者近也故其三陰摶溲血如前止

臨菑氾里女子薄吾病甚衆醫皆以爲寒熱篤當死不治臣意診其脉曰蟯瘕蟯瘕爲病腹大上膚黃粗循之戚戚然臣意飲以芫花一撮卽出蟯可數升病已三十日如故病蟯得之於寒濕寒濕氣宛篤不發化爲蟲臣意所以知薄吾病者切其脉循其尺其尺索刺粗而毛美奉髮是蟲氣也其色澤者中藏無邪氣及重病

搜神記曰昔有一人與奴同時得腹瘕病治不能愈奴既死乃剖腹視之得一白鼈赤眼甚鮮明乃試以諸毒藥澆灌之幷內藥於鼈口悉無損動乃繫鼈於牀脚忽有一客來看之乘一白馬既而馬溺濺鼈鼈乃惶駭欲疾走避溺因繫之不得去乃縮藏頭頸足焉病者察之謂其子曰吾病可以救矣乃試取白馬溺以灌鼈上須臾便消成數升水病者乃頓服升餘白馬溺病豁然愈

太尉郗鑒字道徽鎭丹徒曾出獵時二月中蕨始生有一甲士折食一莖卽覺心中淡淡欲吐因歸乃成心腹疼痛經半年許忽大吐吐出一赤蛇長尺餘尚

活動搖乃掛著屋簷前汁稍稍出蛇漸焦小經一宿視之乃是一莖蕨猶昔之所食病遂除瘥

桓宣武時有一督將因時行病後虛熱更能飲復茗必一斛二斗乃飽纔減升合便以爲不足非復一日家貧後有客造之正遇其飲複茗亦先聞世有此病仍令更進五升乃大吐有一物出如升大有口形質縮縐狀如牛肚客乃令置之於盆中以一斛二斗復茗澆之此物噏之都盡而止覺小脹又加五升便悉混然從口中湧出既吐此物其病遂瘥或問之此何病答云此名斛二瘕

異苑曰元嘉中章安有人噉鴨肉乃成瘕病胷滿面赤不得飲食醫令服秫米瀋須臾煩悶吐一鴨雛身喙翅皆已成就惟左脚故綴昔所食肉病遂獲瘥

有人誤吞髮便得病但欲咽猪脂張口時見喉中有一頭出受膏乃取小鉤爲餌而引得一物長三尺餘其形似蛇而悉是猪脂懸於屋間旬日融盡惟髮在焉

儒門事親曰顯慶寺僧應公有沉積數年雖不臥牀

枕每於四更後心頭悶硬不能安臥須起行寺中習以爲常人莫知爲何病以藥請於戴人戴人令湧出膠涎一二升如黑礬水繼出黃綠水又下膿血數升自爾胷中如失巨山飲餌無筭安眠至曉

息城司侯聞父死於賊乃大悲哭之罷便覺心痛日增不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無功議用燔鍼炷艾病人惡之乃求於戴人戴人至適巫者在其旁乃學巫者雜以狂言以誆病者至是大笑不忍回面向壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言憂則氣結喜則百脉舒和又云喜勝悲內經自有此法治之不知何用鍼灸適足增其痛哉

果菌劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絕諸法無措戴人令一月之內湧四次下六次所去痰約一二桶其中不化之物有如葵菜爛魚腸之狀者湧時以木如意揃之覺病積如刮漸漸而平及積之既盡塊痕反窪如臼略無少損至是而面有童色經水既行若當年少可以有子

陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五

年餘後因性急悲慼病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥鍼灸匝矣徒勞力耳乃敬邀戴人而問之既至斷之曰此肥氣也得之季夏戊己日在左脅下如覆杯久不愈令人發痎瘧痎瘧者寒熱也以瓜蔕散吐出魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如斯涌泄凡三四次而方愈

寄西華縣庠山東顏先生有積二十年目視物不真細字不覩當心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑黚滿面腰不能直戴人令涌寒痰一大缶如片粉夜以舟車丸通經散下爛魚腸葵菜汁七八行病十去三四以熱漿粥投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散前後約百餘行略無少困不五六日面紅黚去食進目明心中空曠遂失頑石所在

修弓杜匠其子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則名侍媪待之以爲將產也一二日復故凡數次乃問戴人戴人診其脈濇而小斷之曰塊病也非孕也脈

訣所謂濇脈如刀刮竹形主丈夫傷精女人敗血治法有病當瀉之先以舟車丸百餘粒後以調胃承氣湯加當歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁承氣湯瀉青黃膿血雜然而下每更衣以手向下推之揉之則出後二三日又用舟車丸以猪腎散佐之一二日又以舟車丸通經如前數服病十去九俟晴明當未食時以鍼瀉三陰交穴不再旬塊已沒矣此與隔腹視五臟者復何異哉

汴梁曹大使女年既笄病血瘕數年醫以破血藥治之不愈戴人曰小腸遺熱於大腸爲伏瘕故結硬如塊面黃不月乃用涌泄法數年之疾不再旬而瘳

王亭村一童子入門狀如鞠恭而行戴人曰痃氣也令解衣揣之二道如臂求療於戴人先刺其左如刺重紙剝然有聲而斷令按摩之立軟其右亦然觀者咸嗟異之或問曰石關穴也

一緇侶好茶成癖積在左脅戴人曰此與肥氣頗同然痎瘧不作便非肥氣雖病十年不勞一日况兩手脈沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可

享壽盡期先以茶調散吐宿茶水數升再以水如意揃之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除濕之劑服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩

衛生寶鑑曰眞定王君用年十九歲病積臍左連脅如覆杯腹脹如鼓多青絡脈喘不能臥時值暑雨加之自利完穀日晡潮熱夜有盜汗以危急來求予往視之脉得浮數按之無力曰凡治積非有毒之劑攻之則不可今脉虛弱如此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而清便自調雜以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣稍平間以削劑不月餘良愈潔古云養正積自除譬之滿座皆君子縱有一小人自無容地而出今令眞氣實胃氣強積自消矣潔古之言豈欺我哉經云大積大聚衰其大半而止滿實中有積氣大毒之劑尚不可過況虛中有積者乎此亦治積之一端也邪正虛實宜精審焉

醫宗必讀曰襄陽郡守于鑑如在白下時每酒後腹痛漸至堅硬得食輒痛余診之曰脉浮大而長脾有

大積矣然兩尺按之軟不可峻攻令服四君子湯七日投以自製攻積丸三錢但微下更以四錢服之下積十餘次皆黑而韌者察其形不倦又進四錢於是腹大痛而所下甚多服四君子湯十日又進丸藥四錢去積三次又進二錢而積下遂至六七椀許脉大而虛按至關部豁如矣乃以補中益氣調補一月全愈

親家王部王漢梁鬱怒成痞形堅而痛甚攻下太多遂泄瀉不止一晝夜計下二百餘次一月之間肌體骨立神氣昏亂舌不能言已治終事待斃而已余診之曰在證雖無活理在脉猶有生機以眞臟脉不見也舉家喜曰諸醫皆曰必死何法之治而可再起耶余曰大虛之候法當大溫大補一面用枯礬龍骨粟殼樗根之類以固其腸一面用人參二兩熟附五錢以救其氣三日之間服參半斤進附二兩瀉遂減半舌轉能言更以補中益氣加生附子乾薑併五貼爲一劑一日飲盡如是者一百日精旺食進瀉減十九然每日夜猶下四五行兩足痿廢用仙茅巴戟丁附

等爲丸參附湯並進計一百四十日而步履如常痞瀉悉愈向使委信不專有一人參以他說有片語異多參附安得有再生之日哉詳書之以爲信醫不專者之藥石

社友姚元長之內久患痞積兩年之間凡攻擊之劑無遺用矣而積未盡除形體尪羸余聞之而告其友曰積消其半不可伐已但用補湯元氣一復病祟全祛耳元長信之遂作補丸服畢而痞果全消

寓意草曰顧鳴仲有腹疾近三十年朝寬暮急每一大發腹脹十餘日方減食濕麪及房勞其應如響腹左隱隱微高鼓呼吸觸之汩汩有聲以痞塊法治之內攻外貼究莫能療余爲懸內炤之鑑先與明之後乃治之人身五積六聚之證心肝脾肺腎之邪結於腹之上下左右及當臍之中者皆高如覆盂者也膽胃大小腸膀胱命門之邪各結於其本位不甚形見者也此證乃腎臟之陰氣聚於膀胱之陽經有似於痞塊耳何以知之腎有兩竅左腎之竅從前通膀胱右腎之竅從後通命門邪結於腹之左畔卽左腎與

膀胱爲之主也六腑惟膽無輸瀉其五腑受五臟濁氣傳入不能久畱卽爲輸瀉者也今腎邪傳於膀胱膀胱溺其輸瀉之職舊邪未行新邪踵至勢必以漸透入膜原如革囊裹物者然經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然則腎氣久聚不出豈非膀胱之失其運化乎夫人一團之腹大小腸膀胱俱居其中而胞又居膀胱之中惟其不久留輸瀉是以寬乎若有餘地今腎之氣不自收攝悉輸膀胱膀胱之氣畜而不瀉有同膽腑之清淨無爲其能理乎宜其脹也有與生俱焉者矣經曰腎病者善脹尻以代踵脊以代頭儻膀胱能司其輸瀉何致若此之極耶又曰巨陽引精者三日太陽膀胱經吸引精氣者其脹止於三日此之爲脹且數十年之久其吸引之權安在哉治法補腎水而致充足則精氣深藏而膀胱之脹自消補膀胱而令氣壯則腎邪不畜而輸化之機自裕所以然者以腎不補不能藏膀胱不補不能瀉然補腎易而補膀胱則難以本草諸藥多瀉少補也經於膀胱之亐不足者斷以死期後人莫解其故

吾試揣之豈非以膀胱愈不足則愈脹脹極勢必逆傳於腎腎脹極勢必逆傳於小腸小腸脹極勢必逆傳於脾迺至通身之氣散漫而無統也醫者於未傳之先蚤見而預圖之能事殫矣

袁聚東年二十歲生痞塊臥牀數月無醫不延日進化堅削痞之藥漸至毛瘁肉脫面黧髮卷殆無生理買舟載往郡中就醫因慮不能生還而止然尚醫巫日費余至則家計已罄姑請一診以決生死遠近耳無他望也余診時先視其塊自少腹至臍旁分爲三岐皆堅硬如石以手拊之痛不可忍其脉止兩尺洪盛餘俱微細謂曰是病繇見塊醫塊不究其源而悞治也初起時塊必不堅以峻猛之藥攻至眞氣內亂轉護邪氣爲害如人厮打紐結一團旁無解散故迸緊不放其實全是空氣聚成非如女子衝任血海之地其月經凝而不行卽成血塊之比觀兩尺脉洪盛明明是少陰腎經之氣傳於膀胱膀胱之氣本可傳於前後二便而出悞以破血之藥兼破其氣其氣遂不能轉運而結爲石塊以手摩觸則愈痛情狀大露

若是血塊得手則何痛之有此病本一劑可瘳但數月悞治從上而下無病之地亦先受傷姑用補中藥一劑以通中下之氣然後用大劑藥內收腎氣外散膀胱之氣以解其相廝相結約計三劑可痊愈也於是先以理中湯少加附子五分服一劑塊已減十之三再用桂附藥一大劑腹中氣響甚喧頃之三塊一時頓沒戚友共駭爲神再服一劑果然全愈調攝月餘肌肉復生面轉明潤堆雲之髮纔剩數莖而已每遇天氣陰寒必用重裀厚被蓋覆不敢起身余謂病根尚在蓋以腎氣之收藏未固膀胱之氣化未旺兼之年少新婚儻犯房室其塊復作仍爲後日之累更用補腎藥加入桂附而多用河車爲丸取其以胞補胞而助膀胱之化源也服之竟不畏寒腰圍亦大而體加充盛年餘又得子感前恩而思建祠肖像以報以連値歲凶姑尸祝於家庭焉亦厚之道矣

古今圖書集成 之五十五

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六六六

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百三十九卷目錄

醫部彙考三百十九

驚悸怔忡健忘門一

黃帝素問生氣通天論　金匱眞言論　診要經終論　經脈別論　評熱病論　舉痛論　痹論　厥論　陰陽類論　脈解篇　五常政大論　大奇論　至眞要大論　玉機眞藏論　四時刺逆從論　疏五過論　五藏生成篇　調經論　奇病論　陽明脈解篇　氣厥論　六元正紀大論　血氣形志篇

靈樞經百病始生篇　經脈篇　本神篇　大惑論

張機金匱要略（驚悸證治）

王叔和脈訣（驚病之脉）

孫思邈千金方（驚悸　健忘）

嚴用和濟生方（論治）

劉完素六書（驚病之因）

成無己明理論（心悸）

朱震亨心法（總論證治）

虞摶醫學正傳（驚悸怔忡）

戴思恭證治要訣（總論證治）

李梴醫學入門（總論證治）

李中梓醫宗必讀（總論證治）

王肯堂證治準繩（總論證治）

張介賓景岳全書（論證　論治）

陳士鐸石室祕籙（論治法）

藝術典第三百三十九卷

醫部彙考三百十九

驚悸怔忡健忘門一

黃帝素問

生氣通天論

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈爲瘻留連肉腠俞氣化薄傳爲善畏及爲驚駭

註 背爲陽陽虛則寒邪痹閉於背而形體爲之俯

僂金匱所謂痹俠背行是也如陽虛不能爲榮血之衞邪陷於脈中而爲瘻留連於肉腠之間金匱所謂馬刀俠瘻是也如經俞之氣化虛薄則傳入於內而干及臟神矣心主脈神傷則恐懼自失肝主血故其病發驚駭也

金匱眞言論

東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝其病發驚駭

註春時陽氣上升故病如氣之發而爲驚駭也

診要經終論

春刺秋分筋攣逆氣環爲欬嗽病不愈令人時驚又且哭

註東方肝木其病發驚駭肝藏魂魂魄不安故使人邪哭也

秋刺春分病不已令人惕然欲有所爲起而忘之

註秋主下降刺春分是反導其血氣上行故令人惕然欲有所爲刺逆論曰秋刺經脈血氣上逆令人善忘

陽明終者口目動作善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣

註　手足陽明之脈皆俠口承目故口目動作而牽引歪邪聞木音則惕然而驚是陽明之善驚也罵詈不避親疎是陽明之妄言也色黃陽明之土氣外脫也上下經盛胃氣絕而無柔和之象也肌膚不仁者榮衛之氣絕也

經脈別論

有所驚恐喘出於肺淫氣傷心

註　驚則氣亂故喘出於肺肺爲心蓋故淫氣傷心

驚而奪精汗出於心

註　血乃心之精汗乃血之液驚傷心氣汗出於心故曰奪精

評熱病論

諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也

註　腎邪乘胃故不得臥陰陽相薄故驚恐心氣上乘於肺金畏火熱故欬甚也

舉痛論

驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣

註　驚則心氣散而無所倚神志越而無所歸思慮惑而無所定故氣亂

痹論

肝痹者夜臥則驚

註　肝藏魂臥則神魂不安故發驚駭

厥論

少陽厥逆發腸癰不可治驚者死

註　少陽相火主氣火逆於內故發爲腸癰不可治者謂病在氣分而癰腫在內非鍼刺之可能治也若發驚者其毒氣干臟故死

陽明厥逆喘欬身熱善驚衄嘔血

註　陽明氣厥則喘上逆則欬也陽明之氣主肌肉故身熱經云二陽發病主驚駭衄血嘔血者陽明乃悍熱之氣厥逆則迫血妄行

陰陽類論

三陽一陰太陰脈勝一陰不能止內亂五臟外爲驚駭

註　三陽主開一陰主闔二氣類聚而太陰脈勝是一陰不能止其開則內亂五臟外爲驚駭

脈解篇

陽明所謂甚則厥惡人與火聞木音則惕然而驚者陽氣與陰氣相薄水火相惡故惕然而驚也

註　此陽明經脈病也

五常政大論

委和之紀其發驚駭

註　邪傷肝也

伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也

註　昏惑悲忘心神不足也

太陽司天寒氣下臨心氣上從熱氣妄行善忘

註　寒氣下臨臟氣上從而熱氣妄行故神傷善忘

大奇論

肝雍兩胠滿臥則驚不得小便

註　肝經病故兩胠滿而不得小便臟氣雍滿臥則神魂不安故發驚也

肝脈騖暴有所驚駭

註 肝脈之來疾而暴亂者必有驚駭

二陽急爲驚

註 二陽陽明土也土氣虛寒則陽明脈病故驚

脈至如數使人暴驚三四日自已

註 無形之氣上逆則脈至數疾邪薄心下故發驚

腎肝并小弦欲驚

註 小者血氣皆少弦則爲減爲寒肝臟之氣生於腎脈并小弦是二臟之氣皆虛而欲發驚也

至眞要大論

太陽之復甚則入心善忘善悲神門絕死不治

註 善忘善悲者從胃而上及於心也

少陽之勝熱客於胃善驚譫妄復則驚瘛欬衄

註 熱客於胃則善驚譫妄熱乘心肺則驚瘛欬衄

陽明之復甚則入肝驚駭筋攣

註 如病入肝則干臟矣干臟者半死半生

諸病驚駭皆屬於火

註 火者少陽包絡之相火也相火甚則心神不安故驚駭

玉機眞臟論

春脉太過則令人善忘忽忽眩冒而巓疾

註　春脉太過則氣幷於上經曰氣幷於上亂而喜忘氣上盛而與督脉會於巓故眩冒而巓疾也

四時刺逆從論

秋刺經脉血氣上逆令人善忘

註　秋主降收而反令其生長故血氣上逆而善忘

冬刺肌肉陽氣竭絕令人善忘

註　冬主閉藏刺肌肉是取所藏之氣於肌腠之外使陽氣竭絕於內令人善忘也

陽明濇則病積時善驚

註　濇者多血少氣微有寒也善驚者病在血也

疏五過論

凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所幷醫工診之不在臟腑不變軀形診之而疑不知病名身體日減氣虛無精病深無氣灑灑然時驚病深者以其外耗於衛內奪於營良工所失不知病情此治之

一過也

註常貴後賤常富後貧則傷其志意故雖不中邪而病從內生夫脾藏營營舍意腎藏精精舍志是以志意失而精營脫也五氣畱連謂五臟之神氣畱鬱於內而不得疎達幷者謂幷病於五臟也五臟之氣外合於皮肉筋骨是以身體日減氣虛無精病深無氣言氣生於精精生於氣精氣之幷傷也如久常之富貴不意失之故時驚也此病不在臟腑不在軀形精氣日虛營衛日耗卽有良工不知因名此治之一過也

五臟生成篇

白脈之至也喘而浮上虛下實驚

註呼吸急則脈亦急肺主氣虛故脈浮病氣而不病血病上而不病下故脈上虛而下實也陽氣虛則善爲驚駭

調經論

血幷於陰氣幷於陽故爲驚狂

註血幷居於陰則陰盛而血實心主血脈故陰盛

則驚氣幷於陽則陽盛而氣實陽盛則發狂也

血幷於下氣幷於上亂而善忘

註 血幷於下則血畜於下而善忘氣幷於上則氣逆於上而爲悗亂

奇病論

帝曰有病痝然如有水狀切其脈大緊身無痛者形不瘦不能食食少名爲何病岐伯曰病生在腎名爲腎風腎風而不能食善驚驚已心氣痿者死

註 足少陰寒水主氣脈大則爲風緊則爲寒夫病風水者外證骨節疼痛此病在腎非外受之風邪故身無痛水氣上乘故形不瘦風木水邪乘侮土氣故不能食卽食亦不能多也善驚者水氣乘心也驚已而心氣痿者心受邪傷也

陽明脈解篇

黃帝問曰足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不爲動聞木音而驚何也願聞其故岐伯對曰陽明者胃脈也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也

註　陽明之脈乃胃之悍氣別走陽明悍熱氣盛則胃腑氣虛也

氣厥論

脾移熱於肝則爲驚衄

註　東方肝木其病發驚駭肝主血故熱甚則衄

六元正紀大論

少陽之政寅申之紀也其病掉眩支脅驚駭

註　諸風眩掉皆屬於肝東方肝木其病發驚駭

少陰所至爲驚惑少陽所至爲驚躁

註　此夏病之常也

血氣形志篇

形數驚恐經絡不通病生於不仁治之以按摩醪藥

註　驚則氣亂恐則氣下蓋血隨氣行氣數亂逆則經絡不通榮衛不行是以病生於不仁宜按摩醪藥以行其榮衛血氣焉

靈樞經

百病始生篇

虛邪之中人也在經之時灑淅喜驚

註　足陽明之脈病故愓然而喜驚也

經脈篇

心主手厥陰心包絡之脈是動甚則胷脅支滿心中憺憺大動

註　甚則胷脅支滿心中憺憺大動蓋甚則有餘於內也

本神篇

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏

註　喜忘者神志皆傷也腰者腎之腑故腰脊不可以俛仰屈伸

大惑論

黃帝曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則營衛留於下久之不以時上故善忘也

註　上氣不足下氣有餘則腸胃實而心肺虛虛則榮衛留於下久之不以時上故善忘也

漢張機金匱要略

驚悸證治

病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之

病人語聲寂寂然喜驚呼者骨節間病

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

水在腎心下悸

病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脈偏弦者飲也

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

寸口脈動而弱動卽爲驚弱則爲悸

心下悸者半夏麻黃圓主之

發汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

晉王叔和脉訣

驚病之脉

心臟歌曰實夢憂驚怪虛翻煙火明

心脉歌曰實大相兼并有滑舌強心驚語話難

虛脉歌曰恍惚心中多悸驚三關定息脉難成

唐孫思邈千金方

驚悸

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痹痛手臂捲唇吻不收名曰肺與大腸俱實也

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅搶脅下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痹精少名曰脾胃俱實也

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胷

中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸

診得心積沉而芤時上下無常處病胷滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身瘛瘲主血厥夏瘥冬劇色赤也

徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣內傷傷則寒寒則虛虛則驚掣心悸定心湯主之

健忘

太陽脈浮緩少陽脈微緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳診得肺積脈浮而毛按之辟易脅下時時痛逆背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蝨緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也

羽音人呻而好恚恚而善忘恍惚有所思此爲土尅水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而看人此爲邪熱傷腎甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩嗌乾胷脅時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背强急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痛四肢黑耳聾名曰腎實熱也

宋嚴用和濟生方

論治

夫驚悸者心虛膽怯之所致也且心者君主之官神明出焉膽者中正之官決斷出焉心氣安逸膽氣不怯決斷思慮得其所矣或因事有所大驚或聞虛響或見異相登高涉險驚忤心神氣與涎鬱遂使驚悸驚悸不已變生諸證或短氣悸乏體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安皆心虛膽怯之候也治之之法寧其心以壯膽氣無不瘥者矣

夫怔忡者此心血不足也蓋心主於血血乃心之主心乃形之君血富則心君自安矣多因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛觸事不意眞血虛耗心帝失輔漸成怔忡怔忡不已變生諸證舌强恍惚善憂悲少顏色皆心病之候難經云損其心者益其榮法當專補眞血眞血若富心帝有輔無不愈者矣又有冒風寒暑濕閉塞諸經令人怔忡五飲停畜堙塞中脘亦令人怔忡當隨其證施以治法

夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意與思心亦主思思慮過度意舍不清神宮不職使人健忘治之之法當理心脾使神意寧靜思則得之矣

金劉完素六書

驚病之因

驚心卒動而不寧也火主於動故心火熱甚也雖爾止爲熱極於裏乃火極似水則喜驚反兼腎水之恐者亢則害承乃制故也所謂恐則喜驚者恐則傷腎而水衰心火自甚故喜驚也

一陽一陰病發驚駭背痛噫欠名風厥蓋胃土肝木

爲木尅土風勝濕不制腎水故令上逆

成無己明理論

心悸

傷寒悸者何以明之悸者心忪是也築築惕惕然動怔怔忪忪不能自安者是矣心悸之由不越二種一者氣虛也二者停飲也傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之少陰病四逆其人或悸者四逆散加桂五分是氣虛而悸者也飲水多必心下悸是停飲而悸者也其氣虛者由陽氣內弱心下空虛正氣內動而爲悸也其停飲者由水停心下心爲火而惡水水既內停心不自安則爲悸也又有汗下之後正氣內虛邪氣交擊而令悸者與氣虛而悸者則又甚焉太陽病發汗過多其人叉手自冒心心下悸太陽病若下之身重心下悸者不可發汗少陽病不可吐下吐下則悸而驚少陽病不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸是數者皆汗後協邪者與其氣虛而悸者有以異也或鎭固或化散之皆須定其氣浮也又飲水過多水飲不爲宣布而畱心

下甚者則悸金匱要略曰食少飲多水停心下甚者則悸飲之爲悸甚於他邪雖有餘邪必先治悸何者以水停心下若水氣散則無所不之浸於肺則爲喘爲欬傳於胃則爲噦爲噎溢於皮膚則爲腫漬於腸間則爲利下不可緩之也經曰厥而心下悸宜先治水與茯苓甘草湯後治其厥不爾水漬於胃必作利也厥爲邪之深者猶先治水況其邪氣淺者乎

元朱震亨心法

總論證治

驚悸者血虛驚悸有時以朱砂安神丸

痰迷心膈者痰藥皆可定志丸加琥珀鬱金

怔忡者血虛怔忡無時血少者多

有思慮便動屬虛時作時止者痰因火動

瘦人多因是血少肥人屬痰尋常者多是痰

眞覺心跳者是血少四物朱砂安神之類

假如病因驚而得驚則神出其舍舍空則痰生也

人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辨乎驚者恐

怖之謂悸者怔忡之謂心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心爲之忤使人有惕惕之狀是則爲驚心虛而停水則胷中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則爲悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已

健忘由精神短少者多亦有痰者此證皆由思憂過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘乃思慮過度病在心脾又云思傷脾亦令遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其證自除也

明虞摶醫學正傳

驚悸怔忡

內經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之候或因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令子虛因而心血爲之不足又或遇事繁冗思想無窮則心君亦爲之不寧故神明不安而怔忡驚悸之證作矣夫所謂怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也驚悸者驀然而跳躍驚動而有欲厥之狀有時

而作者是也若夫二三證之因亦有清痰積飲留結於心胞胃口而爲之者又不可固執以爲心虛而治宜以脈證參究其的而藥之毋認非以爲是也

戴思恭證治要訣

總論證治

驚悸者因事有所大驚觸忤心神氣與涎鬱遂生驚悸此乃心虛膽怯所致宜溫膽湯嘔則以人參代竹茹若眠多異夢隨即驚覺者宜溫膽湯加酸棗仁蓮肉各一錢以金銀煎下十四友丸或鎭心丹遠志丸酒調妙香散

怔忡久思所愛觸事不忘虛耗眞血心血不足遂成怔忡俗謂心忡脈亂是也宜益榮湯

怔忡卽忪悸也忪悸與驚悸若相類而實不同驚悸者因事有所驚而悸忪悸者本無所驚常心忪而自悸焉得無辨

感風寒暑濕閉塞諸經而忪忡各見本門

因痰飲怔忡者導痰湯加炒酸棗仁下壽星丸

失志者由所求不遂或過誤自咎懊恨嗟嘆不已獨

語書空若有所失宜溫膽湯去竹茹加人參柏子仁各一錢下定志丸仍佐以酒調辰砂妙香散有痞塞不飲食心中常有所怯愛處暗室或倚門後見人則驚避似失志狀此名爲卑惵之卑以血不足故也穀神嘉禾散加當歸半錢黃芪半錢

健忘者所過之事轉盼遺忘此乃思慮過度病在心脾宜歸脾湯

健忘者爲事有始無終言談不知首尾此乃病之故非比生成之愚頑不知人事者

李梴醫學入門

總論證治

思慮過度及因大驚大恐以致心虛停痰或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳欲厥脈弦濡者虛也血虛四物湯茯神湯妙香散硃砂安神丸氣血俱虛人參養榮湯養心湯時作時止者痰也二陳湯加白朮黃連遠志竹瀝薑汁

怔忡因驚悸久而成痰在下火在上故也溫膽湯加黃連山梔當歸貝母氣鬱者四七湯加茯神遠志竹

瀝薑汁或十味溫膽湯金箔鎮心丸停飲胷中漉漉有聲怏怏不安者二陳湯加茯神檳榔麥門冬沉香或朱雀丸驚悸二證通用歸脾湯仁熟散夢授天王補心丹壽星丸參棗丸

悸動也心膈間客邪乘之築築然觸動如人將捕即怔忡意也有水停心下頭眩身搖厥而悸者滲其水而悸厥自定有神氣素虛心中空耗不能自持者有汗下後內虛而悸者比之素虛者尤甚須先定其氣而後治其悸大約先煩後悸者爲虛小建中湯眞武湯脈代者炙甘草湯入酒少許汗後眩冒者桂枝甘草湯先悸後煩者爲熱小柴胡湯喜嘔譫語大便難者小柴胡湯加大黃或加芒硝少許譫語小便不利者柴胡龍骨牡蠣湯小便赤者五苓散

怔忡久則健忘皆心脾血少神虧清氣不足證屬濁氣上攻引神歸舍丹主之亦有所稟陰魄不足善忘者常大補氣血及定志丸如老年神衰者加減固本丸通用歸脾湯仁熟散夢授天王補心丹壽星丸參棗丸

李中梓醫宗必讀

總論證治

按外有危險觸之而驚心膽強者不能爲害心膽怯者觸而易驚氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣或自汗並溫膽湯嘔則以人參代竹茹眠多異夢隨卽驚覺溫膽湯加棗仁蓮子以金銀煎下或鎭心丹遠志丸妙香散琥珀養心丹定志丸臥多驚魘口中有聲眞珠母丸獨活湯外物卒驚宜行鎭重蜜陀僧細末茶調一錢或黃連安神丸或熱鬱生痰寒水石散或氣鬱生痰加味四七湯丹溪曰驚則神出於舍舍空得液痰涎永繫於胞絡之間控涎丹加辰砂遠志

經曰心痹者脈不通煩則心下鼓蓋閉而不通病熱鬱而爲涎涎成則煩心下鼓動鼓者跳動如擊鼓也五痹湯加茯神遠志半夏按經文及原病式云水衰火旺心胷躁動天王補心丹主之傷寒論曰心爲火而惡水水停心下築築然跳動不能自安半夏麻黃丸茯苓飲子主之亦有汗吐下後正氣虛而悸不得

臥者宜溫膽湯丹溪責之虛與痰宜辰砂遠志丸有飲者控涎丹然證狀不齊總不外於心傷而火動火鬱而生涎也若夫虛實之分氣血之辨痰與飲寒與熱外傷天邪內傷情志是在臨證者詳之

傷寒悸乃心中築築然動怔忡不安也脈結代心悸炙甘草湯傷寒三四日心悸而煩小建中湯發汗過多心悸喜按桂枝甘草湯心神不寧怔忡不臥安神丸少陰病厥逆心下悸四逆散加桂飲水多而悸雖有他邪亦先治水茯苓甘草湯寒熱心悸小便不利心煩喜嘔小柴胡湯少陽發汗譫語悸動小柴胡湯寸口脈動爲驚凡驚者其脈止而復來其人目睛不轉不能呼氣

按內經健忘之原俱責之心腎不交心不下交於腎濁火亂其神明腎不上交於心精氣因而不用火居上則因而爲痰水居下則因而生躁擾擾紜紜昏而不寧故補腎而使之時上養心而使之善下則神氣清明志意常治而何健忘之有思慮過度歸脾湯精神衰倦人參養榮湯寧志膏痰迷心竅導痰湯送壽

星丸　心腎不交朱雀丸

王肯堂證治準繩

總論證治

或問驚悸怔忡恐怖之別曰悸卽怔忡也怔忡者本無所驚自心動而不寧驚者因外有所觸而卒動張子和云驚者爲自不知故也恐者爲自知也蓋驚者聞響卽驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐臥必須人爲伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也

內經無有稱驚怖者始於金匱要略奔豚條云有驚怖繼之云驚恐由是而見驚怖卽驚恐怖懼也恐亦懼也於義且同凡連稱其名以爲提綱者多是一陰一陽對待而言如喜怒並稱者喜出於心心居於陽怒出於肝肝居於陰志意並稱者志是靜而不移意是動而不定靜則陰也動則陽也驚恐並稱者驚因觸於外事內動其心心動則神搖恐因惑於外事內慊其志志慊則精却是故內經謂驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣恐則精却却則上焦閉

閉則無氣還無氣還則下焦脹故氣不行矣又謂嘗貴後賤嘗富後貧悲憂內結至於脫營失精病深無氣則灑然而驚此類皆是病從外事而動內之心神者也若夫在身之陰陽衰盛而致驚恐者驚是火熱爍動其心心動則神亂神用無方故驚之變態亦不一狀隨其所之與五神相應而動肝藏魂魂不安則爲驚駭爲驚妄肺藏魄魄不安則驚躁脾藏意意不專則驚惑腎藏志志慊則驚恐心惕惕然胃雖無神然爲五臟之海諸熱歸之則發驚狂若聞木音則惕然心欲動也恐者則是熱傷其腎腎傷則精虛精虛則志不足志本一定而不移故恐亦無他狀內經於驚之病邪有火熱二淫司天在泉勝復之氣有各經熱病所致有三陽積并有氣并於陽皆爲諸驚等病故病機統而言曰諸病驚駭皆屬於火也於恐病之邪者有精氣并於腎則恐有血不足則恐有陰少陽入陰陽相搏則恐有胃氣熱腎氣微弱則恐腎是動病則恐然於肝之驚恐互相作者以其臟氣屬陽居陰納血藏魂魂不安則神動神動則驚血不足則志

慊志慊則恐故二者肝臟兼而有之似此之類於火熱二淫屬感邪之外餘者之驚恐皆因人氣之陰陽所動而內生者也雖然亦非獨火熱二淫而已於陽明脈急則亦爲驚矣曰驚恐二病與內外所因其治法同乎異乎曰驚則安其神恐則定其志治當分陰陽之別何得而同也夫易之爲卦乾坤交坎離列坎離交而後爲既濟而人以五臟應之心爲離火內陰而外陽腎爲坎水內陽而外陰內者是主外者是用又主內者五神外用者五氣是故心以神爲主陽爲用腎以志爲主陰爲用陽則氣也火也陰則精也水也及乎水火既濟全在陰精上奉以養其神陽氣下藏以定其志不然則神搖不安於內陽氣散於外志感於中陰精走於下既有二臟水火之分治法安得無少異所以驚者必先安其神然後散亂之氣可斂氣斂則陽道行矣恐者必先定其志然後走失之精可固精固則陰氣用矣於藥而有二臟君臣佐使之殊用內外所感者亦少異焉爲外事驚者雖子和氏謂驚者平之平常也使病者時時聞之習熟自然不

驚固是良法不若使其平心易氣以先之而後藥之也吾謂內氣動其神者則不可用張氏之法唯當以藥平其陰陽之盛衰而後神可安志可定矣

傷寒明理論釋悸字云悸心忪也築築惕惕然動怔怔忪忪不能自安也則悸卽怔忡而今人分爲兩條謬矣心悸之由不越二種一者虛也二者飲也氣虛者由陽氣內虛心下空虛火氣內動而爲悸也血虛者亦然其停飲者由水停心下心爲火而惡水水旣內停心不自安故爲悸也有汗吐下後正氣內虛而悸者有邪氣交擊而悸者有榮衛涸流脈結代者則又甚焉必生津液益血以實其虛此從傷寒而論者若雜病則考諸內經云心痺者脈不通煩則心下鼓膽病者口苦嘔宿汁心下憺憺恐如人將捕之狀足陽明是動聞木音則惕然而驚心包絡是動病心中憺憺大動腎是動病善恐心惕然如人將捕之原病式云因水衰火旺其心胷躁動謂之怔忡然後知悸之爲病是心臟之氣不得其正動而爲火邪者也蓋心爲君火包絡爲相火火爲陽陽主動君火之下陰

精承之相火之下水氣承之夫如是而動則得其正而清淨光明爲生之氣也若乏之所乘則君火過而不正變爲煩熱相火妄動既熱且動豈不見心悸之證哉況心者神明居之經曰兩精相搏謂之神又曰血氣者人之神則是陰陽氣血在心臟未始相離也今失其陰偏傾於陽陽亦以失所承而散亂故精神怔怔忡忡不能自安矣如是者當自心臟中補其不足之心血以安其神氣不已則求其屬以衰之壯水之主以制陽光也又包絡之火非惟輔心而且游行於

五臟故五臟之氣妄動者皆火也是以各臟有疾皆能與包絡之火合動而作悸如是者當自各臟補瀉其火起之由而後從包絡調之平之隨其攸利而治若各臟移熱於心而致包絡之火動者治亦如之若心氣不足腎水陵之逆上而停心者必折其逆氣瀉其水補其陽若左腎之眞水不足而右腎之火上逆與包絡合動者必峻補左腎之陰以制之若內外諸邪鬱其二火不得發越隔絕榮衞不得充養其正氣者則皆以治邪解鬱爲主若痰飲停於中焦礙其經

絡不得舒通而鬱火與痰相擊於心下以爲怔忡者必導去其痰經脈行則病自已

人生氣禀不同得氣之清則心之知覺者明得氣之濁則心之知覺者昏心之明者無有限量雖千百世已往之事一過目則終身記而不忘豈得忘其目前者乎心之昏者精神既短則目前不待於傷心而不能追憶其事矣劉河間謂水清明而火昏濁故上善若水下愚若火此禀質使之然也設禀質清濁混者則不耐於事物之擾擾則失其靈而健忘也蓋氣與血人之神也經曰靜則神藏躁則消亡靜乃水之體躁乃火之用故性靜則心存乎中情動則心忘於外動不已則忘亦不已忘不已則存乎中者幾希存乎中者幾希則語後便忘不俟終日已所以世人多忘者役役擾擾紛紜交錯當事於一生其氣血之陰者將竭必禀質在中人以上清明有所守不爲事物所亂者百難一人也由是言之藥固有安心養血之功不若平其心易其氣養其在己而已若夫痰之健忘乃一時之病然病忘之邪非獨痰也凡其心有所寄

與諸火熱傷亂其心者皆得健忘如靈樞謂盛怒傷志志傷善忘內經謂血幷於下氣幷於上亂而善忘夫如是豈可不各從所由而爲治耶

景岳全書　臣張介賓著

論證

怔忡之病心胷築築振動惶惶惕惕無時得寧者是也然古無是名在內經則曰胃之大絡名曰虛里出於左乳下其動應衣宗氣泄也在越人仲景則有動氣在上下左右之辨云諸動氣皆不可汗下也凡此者卽皆怔忡之類此證惟陰虛勞損之人乃有之蓋陰虛於下則宗氣無根而氣不歸源所以在上則浮撼於胷臆在下則振動於臍旁虛微者動亦微虛甚者動亦甚凡患此者速宜節慾節勞切戒酒色凡治此者速宜養氣養精滋培根本若或誤認爲痰火而妄施清利則速其危矣

驚有二證有因病而驚者有因驚而病者如東方色靑入通於肝其病發驚駭及傷寒陽明證聞木音則惕然而驚之類此則或因歲火之盛或因歲木之衰

或因風熱之相搏或因金木之相制是當察客邪以兼治其標若因驚而病者如驚則氣亂而心無所倚神無所歸慮無所定之類此必於聞見奪氣而得之是宜安養心神滋培肝膽當以專扶元氣爲主治此固有二者之辨然總之主氣强者不易驚而易驚者必肝膽之不足者也故雖有客邪亦當知先本後標之義

又如驚則氣亂恐則氣下驚恐雖若同類而不知恐之傷人尤甚於驚何也蓋驚出於暫而暫者卽可復恐積於漸而漸者不可解甚至心怯而神傷精却則陰痿日消月縮不亡不已此非大勇大斷者必不能拔去其病根徒資藥力不易及也予嘗治暴驚者十愈其八九治恐懼者十不得其一二

論治

凡治怔忡驚恐者雖有心脾肝腎之分然陽統乎陰心本乎腎所以上不寧者未有不由乎下心氣虛者未有不因乎精此心肝脾腎之氣名雖有異而治有不可離者亦以精氣互根之宜然而君相相資之全

力也然或宜先氣而後精或宜先精而後氣或兼熱者之宜清或兼寒者之宜煖此又當因其病情而酌用之故用方者宜圓不宜鑿也

心脾血氣本虛而或爲怔忡或爲驚恐或偶以大驚猝恐而致神志昏亂者俱宜七福飲甚者大補元煎若命門水虧眞陰不足而怔忡不已者左歸飲若命門火虧眞陽不足而怔忡者右歸飲若三陰精血虧損陰中之陽不足而爲怔忡驚恐者大營煎或理陰煎若水虧火盛煩躁熱渴而怔忡驚悸不寧者二陰煎或加減一陰煎若思鬱過度耗傷心血而爲怔忡驚悸者逍遙飲或益營湯若寒痰停畜心下而怔忡者薑朮湯

心虛血少神志不寧而驚悸者養心湯或寧志丸或十四友丸若因驚失志而心神不寧者寧志膏或遠志丸心血不足肝火不清血熱多驚者硃砂安神丸心神虛怯微兼痰火而驚悸者八物定志丸心氣鬱滯多痰而驚者加味四七湯痰迷心竅驚悸者溫膽湯或茯苓飲子甚者硃砂消痰飲風熱生痰上乘心

膈而驚悸者簡要濟衆方

若大恐大懼以致傷損心脾腎氣而神消精却飲食日減者必用七福飲理陰煎或大營煎或大補元煎之類酌宜治之然必洗心滌慮盡釋病根則庶可保全也

石室祕籙　臣陳士鐸著

論治法

心驚非心病也乃肝血虛而不能養心也方用白芍當歸麥冬熟地各五錢生棗仁一兩茯神三錢北五味遠志各一錢人參二錢水煎服此方之妙全不去治心治肝正所以治心治肺正所以益心也

腎水臟也心火臟也是心腎二經爲讎敵似乎不宜牽連而一治之不知心腎雖相尅其實相須無心之火則成死灰無腎之水則成氷炭心必得腎水以滋養腎必得心火而溫煖如人驚惕不安豈非心腎不交乎人以爲驚惕不安心之病我以爲腎之病非顚倒之也實至當不易之理方用白朮芡實橘紅熟地各五兩人參棗仁炒山藥柏子仁去油茯神山茱萸

麥冬各三兩北五味遠志菖蒲各一兩砂仁三錢各爲末蜜爲丸白滾水送下五錢此丸之妙乃治腎之藥少於治心蓋心君寧靜腎氣自安腎氣既安何至心動此治心正所以治腎而治腎正所以治心也

心經之病怔忡不寐等證乃心血少也方用人參麥冬茯神當歸各三錢丹參二錢生棗仁熟棗仁各五錢菖蒲甘草五味子各一錢水煎服此方之妙妙在生熟棗仁各五錢而以諸補心之藥爲佐使蓋棗仁乃安心治不寐之聖藥生用使其日間不臥熟用使其夜間不醒也日夜既安則怔忡自定又何必用虎睛琥珀丹砂之多事哉

怔忡之證擾擾不寧心神恍惚驚悸不已此肝腎之虛而心氣之弱也若作痰治往往殺人蓋腎虛以致心氣不交心虛以致肝氣益耗不治虛而反攻痰安得不速死乎一方名寧靜湯生棗仁麥冬白朮各五錢人參白芍熟地元參各一兩白芥子三錢水煎服此方一派補心肝腎之藥三經同治則陰陽之氣自交上下相資怔忡自定而驚悸恍惚之證亦盡除矣

怔忡治之不得法多致危亡此證乃因泄精之時又得氣惱更不慎色而成者也似乎宜治腎爲主不知愈補腎而心氣愈加怔忡者何故因肝得氣惱肝氣大旺補腎則肝氣更旺反去增心之火故愈加怔忡也然則心不可補乎心不補則火不能息補心而又加去火之藥則得生矣方用化忡丹人參生棗仁各二錢麥冬白芍元參茯神各五錢黃連白芥子各一錢甘草五分水煎服此方妙在不去定心反去瀉火尤妙在不去瀉肝反去補肝尤妙在不去補腎反去補肺蓋瀉心火卽所以定心氣也補肝氣則肝平肝平則心亦平補肺氣則肺旺能制肝經之旺矣制服相宜自然心氣得養而怔忡有不全愈者乎

健忘上病也方用人參芡實麥冬生棗仁當歸山茱萸各三兩五味子遠志菖蒲柏子仁去油各一兩熟地五兩蓮鬚二兩山藥四兩各爲末蜜爲丸每日早晚各用白滾水送下各五錢半料而痊

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十卷目錄

醫部彙考三百二十

驚悸怔忡健忘門二

方　防風丸　遠志湯　補心湯　大補心湯
又方　小定心湯　大定心湯　大荊瀝湯
大鎮心散　小鎮心散　鎮心丸　大鎮心丸
小鎮心丸　小溫膽湯　十四友丸　平補鎮
心丹　平補鎮心丸　遠志丸　琥珀養心丹
定志丸　寧志丸　人參遠志丸　養心湯
鐵精丸　菖蒲丸　茯神丸　人參丸　茯
苓甘草湯　茯苓飲子　薑朮湯　炙甘草湯
益榮湯　祕傳酸棗仁湯　葉氏鎮心爽神
湯　兪居士選奇方　參乳丸　龍齒丹　靈

砂寧志丸　棗肉靈砂　辰砂遠志丸　心丹　補心神效丸　八物定志丸　天王補心丹　補心丹　天地丸　小半夏加茯苓湯　樂令黃芪湯　內補散　琥珀散　竹瀝湯　安心散　棗仁湯　小建中湯　茯神湯　歸脾湯　朱雀丸　加減二陳湯　養血寧心湯　壽星丸　遠志飲子　茯神湯　大建中湯　心腎丸　茸硃丹　茸附湯　二白丸　硃砂安神丸　黃連安神丸　控涎丹　羌活勝濕湯　半夏麻黃丸　茯苓丸　桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯　桂枝甘草湯　茯苓桂枝甘草大棗湯　鎮心丹　犀角湯　安神補心湯　參歸腰子　鎮心湯　四物安神湯　養血清火湯　養血安神湯　安神鎮驚丸　溫膽湯　金箔鎮心丸　聰明湯　孔聖枕中方　茯神丸　又方　八味散　茯苓補心湯　讀書丸　二丹丸　菖蒲益智丸　健忘丸　大益智散　不忘散　開心散　蓯蓉散　人參養榮湯　導痰湯　蘂珠丸　加味定志丸　硃砂消痰飲　寧志膏　平驚通聖散　酸棗仁湯　預知子丸　開心不忘方　狀元丸　又方　人參遠志丸　大歸神丹　巴戟天丸　丹參飲子　七福飲　大補元煎　右歸飲　左歸飲　二陰煎　逍遙飲　大營煎　加減一陰煎　理陰煎

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百四十卷

醫部彙考三百二十

驚悸怔忡健忘門二

方一

防風丸（千金方下同）

補虛調中治脉虛驚跳不定乍來乍去小腸腑寒

防風　桂心　通草　茯神　遠志　麥門冬

甘草　人參　白石英各三兩

右九味爲末白蜜和丸如梧子大酒服三十丸日

再加至四十丸

遠志湯

補心治心氣虛驚悸喜忘不進食

大棗十二枚　遠志　乾薑　白朮　桂心

黃芪　紫石各三兩　防風　當歸　人參

茯苓　甘草　芎藭　茯神　羌活各二兩

麥門冬　半夏各四兩　五味子二合

右十八味㕮咀以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜二

補心湯

治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛口脣黑嘔吐血舌本強不通水漿

紫石英　茯苓　人參　遠志　當歸　茯神

甘草　紫菀各二兩　麥冬一升　赤小豆三合

大棗三十枚

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

按深師無茯神有桂

大補心湯

治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮

黃芩　附子各一兩　甘草　乾地黃　麥門冬
茯苓　桂心　阿膠各三兩　生薑六兩　半夏
遠志　石膏各四兩　飴糖一斤　大棗二十枚

右十四味㕮咀以水一斗五升煮取五升湯成下糖分四服

又方

治心氣不足心痛驚恐

遠志　蒲黃（一本作菖蒲）　人參　茯苓各四兩

右四味㕮咀以水一斗煮取三升半分三服

小定心湯

治虛羸心氣驚弱多魘

茯苓四兩　桂心三兩　甘草　芍藥　乾薑
遠志　人參各二兩　大棗十五枚

右八味㕮咀以水八升煮取三升分四服日三夜一

大定心湯

治心氣虛悸恍惚多忘或夢寐驚魘志少不足

人參　茯苓　茯神　遠志　石脂　龍骨

乾薑　當歸　甘草　白朮　芍藥　桂心

紫菀　防風各二兩　大棗二十枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煑取三升半分五服日三夜二

荆瀝湯

治心虛驚悸不定羸瘦病

荆瀝二升　茯神　白蘚皮各三兩　人參二兩

白銀十兩以水一斗煑取二升

右五味三味㕮咀以荆瀝內銀汁中煑取一升四合分三服相去如人行十里久進一服

大鎮心散

治心虛驚悸夢寐恐畏

紫石英　茯苓　防風　人參　甘草　澤瀉各八分　黃芪　秦艽　白朮　薯蕷　白蘞各六分

麥冬　當歸各五分　大豆卷　桔梗　柏子仁

桂　遠志　大黃　石膏各四分　蜀椒　芍藥

乾薑　細辛各三分

右二十四味治下篩酒服二方寸匕日三一方無紫石茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十五丸

小鎭心散

治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕然驚者

人參　遠志　白朮　附子　乾地黃　桂心

黃芪　細辛　乾薑　赤小豆　龍齒　防風

菖蒲各二兩　茯苓四兩

右十四味治下篩酒服二方寸匕日三

鎭心丸

治男子婦人虛損夢寐驚悸或失精神婦人赤白注瀉或月水不利風邪鬼疰寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸病

紫石英　茯苓　菖蒲　蓯蓉　麥門冬　遠志

乾地黃十二分　大黃　當歸　細辛　大豆卷

卷柏　乾薑各五分　防風　人參　澤瀉
秦艽　丹參各六分　石膏　芍藥　柏子仁各三
分　烏頭　桂心　桔梗　甘草　薯蕷各十分
白蘞　鐵精　銀屑　前胡　牛黃各二分
白朮　半夏各四兩　䗪蟲十一枚　大棗五十枚

右三十五味爲末蜜棗和擣五千杵丸如梧子大酒服五丸日三加至二十丸一本無大豆卷大棗

大鎭心丸

所治與前方大同凡是心病悉皆主之

乾地黃八分　牛黃五分　羌活　桂心　秦艽
芎藭　人參　遠志　麥門冬　丹砂　紫石英
阿膠　甘草　大黃　銀屑　白蘞　當歸
乾薑　防風各八分　桑螵蛸十一枚　杏仁
蜀椒各三分　柏子仁　澤瀉　大豆卷　茯苓
薯蕷　茯神　前胡　黃芪　鐵精各五分
大棗四十枚

右三十二味爲末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸

小鎮心丸

治心氣少弱驚虛振悸胷中逆氣魘夢參錯謬忘恍惚

紫石英　硃砂　茯神　銀屑　雄黃　菖蒲
人參　桔梗　乾薑　遠志　甘草　當歸
桂心各二分　防風　細辛　鐵精　防己各一兩

右十七味爲末蜜丸如大豆狀飲服十九日三加至二十九一方用茯苓二分爲十八味

溫膽湯方（三因）

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽慴氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏

半夏湯洗　枳實　竹茹各一兩　甘草炙四錢
橘皮一錢半　茯苓七錢

每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分食前熱服一本有生薑四錢無茯苓一本有遠志

十四友丸

補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精神昏憒睡臥不安

龍齒二兩　柏子仁研　遠志酒蒸曬　當歸
棗仁炒　紫石英　熟地黃　白茯苓　茯神
人參　黃芪蜜炙　阿膠蛤粉炒　肉桂各一兩
辰砂另研二錢五分

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食後棗湯送下

平補鎭心丹（局方）

治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮崖谷常服安心腎益榮衛

酸棗仁炒二錢半　車前子　白茯苓　麥門冬
五味子　茯神　桂心不見火各一兩二錢半
龍齒　熟地黃酒蒸　天門冬　遠志甘草水煮
山藥薑汁製各一兩半　人參　硃砂飛各半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大以前硃砂爲衣每服三十丸空心米湯溫酒任下

平補鎭心丸

治前證

熟地黃　生地黃　山藥　天門冬　麥門冬

柏子仁　茯神各四兩（一本七兩）　辰砂另研爲衣

桔梗各三兩　遠志甘草製七兩　當歸六兩

石菖蒲節密者十六兩　龍骨一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二十丸空心米飲吞下溫酒亦得漸加至五十丸宜常服

遠志丸

治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安心志恐怯

遠志薑汁製　石菖蒲各五錢　茯苓　茯神

人參　龍齒各一兩

右爲末煉蜜和丸如桐子大辰砂爲衣每服七十丸食後臨臥熱水下

琥珀養心丹

治心血虛驚悸夜臥不寧或怔忡心跳者

琥珀另研二錢　龍齒煅另研一兩　石菖蒲

遠志黑豆甘草同煑去骨　茯神　酸棗仁炒

人參各五錢　當歸　生地黃各七錢　硃砂飛

黃連各三錢　柏子仁五錢　牛黃另研一錢

右爲細末將牛黃硃砂琥珀龍齒研極細以猪心血丸如黍米大金箔爲衣每服五十丸燈心湯送下

定志丸

治心氣不足驚悸恐怯

菖蒲炒　遠志各二兩　茯神　人參各三兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大硃砂爲衣每服五十丸米湯下一方去茯神名開心散服二錢匕無時

寧志丸

治心虛血少多驚

人參　茯神　白茯苓　柏子仁　遠志酒浸焙

棗仁酒浸微炒　當歸　琥珀各半兩　石菖蒲

硃砂另研　乳香各二錢半

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸食後棗湯送下

人參遠志丸

治心氣不安驚悸恍惚

人參　遠志　酸棗仁炒　黃芪各半兩　桔梗

官桂　丹砂各二錢半　天門冬　白茯苓

石菖蒲各七錢半

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食遠米湯下

養心湯（得效方下同）

治心虛血少驚惕不寧

甘草炙五分　黃芪炙　茯神　茯苓　半夏麴

當歸　川芎各七分半　遠志薑汁焙　柏子仁

棗仁隔紙炒香　辣桂　五味子　人參各一錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食後溫服加檳榔赤茯苓治停水怔悸一本有生地黃

鐵精丸

治驚風恍惚寢寐不安

鐵精另研　龍齒研　犀角屑　麥門冬　人參

茯神　防風各一兩　石菖蒲　遠志各七錢半

生地黃一兩半

右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服二十丸不拘時粥飲送下

菖蒲丸

治前證

石菖蒲　遠志　鐵粉研　硃砂飛各一兩

金箔五十片　羚羊角屑七錢半　防風七錢

白茯苓　人參各一兩半

右爲細末入研藥令勻煉蜜和丸如梧子大每服

二十丸粥湯下不拘時候

茯神丸

治心臟風虛驚悸心忪常多健忘

茯神　人參　麦冬　黃芩　熟地黃　柏子仁

薏苡　犀角各一兩　龍齒研　鐵粉各一兩半

防風　黃芪各七錢半

右爲細末入研藥令勻煉蜜和擣二三百下丸如

梧子大每服二十丸溫粥飲下無時

人參丸

治心臟風虛驚悸心忪或因憂慮之後時有恍惚

心神不安

人參　熟地黃　龍齒各一兩研　茯神一兩半

白朮　甘草炙　麥門冬各半兩　防風七錢半
金箔　銀箔各五十片
右爲細末入研藥令勻煉蜜和搗二三百下丸如
梧子大每服十五丸不拘時粥飲送下

茯苓甘草湯（仲景）

治心下停水忪悸
茯苓　桂枝各二錢　生薑半兩　甘草二錢
水二盞煎至一盞不拘時服

茯苓飲子（濟生方下同）

治痰飲畜於心胃怔忡不已
赤茯苓　半夏　茯神　麥冬　橘紅各一錢半
檳榔　沉香不見火　甘草炙各一錢
水二鍾薑三片煎八分食遠服一本無檳榔

薑朮湯

治停飲怔忡
白薑生　白朮　茯苓　半夏麴各一錢　辣桂
甘草各五分
水一鍾薑三片紅棗一枚煎六分不拘時服

炙甘草湯

一名復脈湯治脈結代心動悸

甘草一兩二錢一字　人參　阿膠各六錢二字

麻子仁　桂枝　麥門冬各一兩　生地黃一兩半

水酒各五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三合水二升七合煑取二升去查內阿膠烊盡分三服

益榮湯

治思慮過多耗傷心血心血旣傷神無所守是以怔忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

白芍藥　黃芪　人參　小草　茯神　棗仁炒

柏子仁炒　木香不見火　麥門冬　當歸酒浸

紫石英煅研　甘草炙各一錢

右作一服水二盞薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服一本無麥冬

祕傳酸棗仁湯

治心腎水火不交精血虛耗痰飲內畜怔忡恍惚夜臥不安

棗仁炒　遠志製　黃芪　白茯苓　當歸酒浸
蓮肉　人參　茯神各一兩　陳皮　炙草各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚以
瓦器煎七分日二服臨臥一服

葉氏鎮心爽神湯

治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便
頻數遺泄白濁
石菖蒲半兩　甘草炙四錢　人參　酸棗仁炒
赤茯苓　當歸酒浸焙各三錢　南星泡　陳皮
山藥　細辛　紫菀　半夏製　川芎　覆盆子
通草　麥冬　五味　柏子仁炒　枸杞各二錢半
右㕮咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓入
麝香少許再煑一二沸溫服不拘時

俞居士選奇方

治心常忪悸忘前失後
白檀香　白茯苓　桂心各十二分　石菖蒲
天竺黃　熟地黃　蘇合香　犀角各四分
天門冬　遠志　人參各十六分　甘草十分

右爲細末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸食後噙化或米飲嚥下

參乳丸

治心氣不足怔忡自汗

人參一兩　乳香三錢另研　當歸二兩

右爲細末研勻山藥煮糊丸如梧桐子大每服三十丸食後棗湯送下

龍齒丹

治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

當歸酒浸　龍齒　遠志甘草水煮　棗仁炒研

官桂　琥珀　附子炮去皮臍切作八片薑汁浸

南星剉碎薑汁浸一宿各一兩　木香　沉香

紫石英煅醋淬　熟地黃酒蒸焙各半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十丸不拘時用棗湯送下

靈砂寧志丸

治男婦大病後損傷榮衛失血過多精血虛損心神恍惚不得眠睡飲食全減肌體瘦弱

辰砂二兩不夾石者夾絹袋盛懸於銀石器內用椒紅三兩取井華水調椒入於器內可八分別用鍋子注水置硃砂器在內重湯煑令魚眼沸三晝夜爲度取出辰砂水飛細　茯神　鹿茸燎去毛酥炙黃　黃芪蜜炙　白朮　人參各三兩　石菖蒲二兩

右爲末入辰砂研勻棗肉和杵一二千下丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒米飲任下

棗肉靈砂

專治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗忪悸

靈砂二錢研　人參半錢　酸棗仁肉一錢

右爲末棗肉丸如菉豆大臨臥棗湯呑五七粒

辰砂遠志丸

安神鎭心消風化痰

石菖蒲　遠志　人參　茯神　辰砂各半兩

川芎　山藥　鐵粉　半夏麴　麥門冬　細辛

天麻　南星炒黃　白附子生各一兩

右爲末用生薑五兩取汁入水煎糊丸如菉豆大別以硃砂爲衣每服三十粒臨臥薑湯下

心丹

治男婦心氣不足神志不寧一切心疾並治之

硃砂五十兩　遠志甘草煑　人參　木鼈仁炒

熟地黃酒蒸焙　石菖蒲　當歸酒焙　麥門冬

黃芪　石蓮肉炒　茯神　柏子仁　茯苓

益智仁各三兩　白朮五兩

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌勻次將硃砂滾和以夾生絹袋盛貯用麻線緊紥袋口却用瓦鍋一口盛七分重安銀罐一箇於鍋內入白蜜二十斤將藥袋懸之中心不令著底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煑三日蜜焦黑再換蜜煑候七日足住火取出淘去衆藥洗淨硃砂令乾入牛心內仍用銀鍋於重湯內蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換牛心如前法蒸凡七次其砂已熟即用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米粽爲丸如豌豆大陰乾每服二十丸食後參湯棗湯麥門冬湯任下

補心神效丸（百一選方）

治前證

黃芪蜜炙　茯神　人參　遠志各四兩　棗仁

柏子仁另研　五味子各二兩　硃砂一兩另研

熟地黃三兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸米飲溫酒任下

八物定志丸

補益心神安定魂魄治痰去胷中邪熱

硃砂一錢　人參一兩半　菖蒲　遠志　茯苓

茯神各一兩　白朮　麥門冬各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大米飲下三十丸不拘時

天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令人不忘除怔忡定驚悸清三焦化痰涎祛煩熱療咽乾育養心神

人參五錢　麥冬　天冬　當歸酒浸　柏子仁

五味子　棗仁各一兩　白茯苓　元參　丹參

桔梗　遠志各五錢　生地四兩　黃連酒炒二兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大硃砂爲衣每服二三十丸臨臥燈草竹葉煎湯下一方有石菖蒲熟地黃杜仲百部茯神甘草六味

補心丹（元珠）

治血氣不足驚悸健忘又能安養心神兼治五臟無偏勝之弊可以久服

麥門冬二兩半　遠志甘草湯煮　石菖蒲

香附童便浸各二兩　天門冬　苦蔞根　白朮

貝母　熟地黃　茯神　地骨皮各一兩半

人參　當歸　牛膝　黃芪各一兩　木通八錢

右爲細末大棗肉爲丸如梧桐子大或用酒或圓眼湯吞下五十丸

天地丸

治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小便黃赤或生瘡瘍

天門冬二兩　熟地黃九蒸九曬一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服百丸不拘

時用人參煎湯下

小半夏加茯苓湯（仲景）

治膈間有水眩悸者

半夏一升　生薑半斤　茯苓三兩（一本四兩）

右三味以水七升煑取一升五合分溫再服

樂令黃芪湯（千金方下同）

治虛勞少氣胷心淡冷時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗五臟六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病補諸不足

黃芪　人參　橘皮　當歸　桂心　細辛

前胡　芍藥　甘草　麥門冬　茯苓各一兩

生薑五兩　半夏二兩半　大棗二十枚

右十四味㕮咀以水二斗煑取四升每服五合日三夜一深師無橘皮細辛前胡甘草麥門冬有烏頭三兩蜀椒一兩遠志二兩胡洽崔氏有蜀椒一兩烏頭五枚崔氏名樂令大黃芪湯

內補散

治心傷善驚妄怒無常

乾地黃　菟絲子　山茱萸　地麥各五兩
遠志　巴戟天各半兩　麥門冬　五味子
甘草　人參　蓯蓉　石斛　桂心　茯苓
附子各一兩
右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無所禁

琥珀散

治虛勞驚悸不安五臟虛勞上氣滿悶

琥珀研一兩　通草十四分　蕪菁子　胡麻子
車前子　蛇牀子　菟絲子　枸杞子　菴藺子
麥門冬各一升　松子　柏子　茌子各三升
橘皮　肉蓯蓉　松脂　牡蠣各四兩　桂心
石葦　石斛　滑石　茯苓　芎藭　人參
杜蘅　續斷　遠志　當歸　牛膝　丹皮各三兩
右三十味各治下篩合擣二千杵盛以韋囊先食服方寸匕日三夜一用牛羊乳汁煎令熟長服令人彊性輕體益氣消穀能食耐寒暑百病除雖御十女不勞損令精實如膏服後七十日可得行房

久服老而更少髮白返黑齒落重生

竹瀝湯

治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安

淡竹瀝　生地黃汁各一升　石膏八兩　芍藥
白朮　人參　梔子仁各三兩　赤石脂　紫菀
知母　茯神各二兩

右十一味㕮咀以水九升煑十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

安心散

治心熱滿煩悶驚恐

白芍藥　遠志　宿薑二兩　茯苓　赤石脂
麥門冬　知母　紫菀　石膏各四十銖　桂心
麻黃　條黃芩各三十銖　萎蕤三十六銖
甘草十二銖　人參二十四銖

右十五味治下篩爲粗散先以水五升淡竹葉一升煑取三升去滓煑散一方寸匕半以絹裹煑時動之煎取八合爲一服日再

棗仁湯

治大虛勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕忪悸小腹裏急

棗仁二合　澤瀉　人參　芍藥　桂心各一兩

黃芪　甘草　茯苓　白龍骨　牡蠣各二兩

生薑三片　半夏一合

右十二味㕮咀以水九升煑取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

小建中湯

治心中虛悸咽乾脣燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘慼多臥少起久者積年輕者百日漸致瘦削五臟氣竭則難可復振

甘草二兩　桂心　生薑各三兩　芍藥六兩

膠飴一升　大棗十二枚

右六味㕮咀以水九升煑取三升去滓內膠飴每服一升日三間三日復作一劑後可與諸丸散

茯神湯

治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳

動恍惚不定

茯神去木　人參　石菖蒲　白茯苓各三兩

赤小豆四十枚

右五味㕮咀以水一斗煑取二升半分三服

歸脾湯

治思慮過多勞心傷脾健忘怔忡煩躁不寐短氣

自汗坐臥不安

木香四分　人參　茯神　黃芪　遠志　白朮

當歸身各一錢　龍眼肉十箇　炙甘草五分

棗仁八分研

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服

朱雀丸

驚悸怔忡此方主之

白茯苓二兩　沉香五錢

二味爲丸

加減二陳湯

心若時跳時止是痰因火動

陳皮　半夏　茯苓　甘草　枳實　麥門冬

竹茹　炒黃連　炒山梔　人參　白朮　當歸

辰砂　烏梅　竹瀝

右薑三片棗一枚水煎調辰砂末服

養血寧心湯

當歸一錢二分　白芍藥酒炒　梔子七分

黃芩　黃連各八分　棗仁　生地各一錢

遠志　麥冬各二錢

薑棗煎服

壽星丸（濟生方下同）

治因病驚憂涎留心胞精神不守譫言妄語不得安臥

生天南星一斤　琥珀一兩別研　硃砂飛二兩

右爲細末和勻用生薑自然汁打麪糊爲丸如菉豆大每服四十丸不拘時候用人參石菖蒲煎湯送下淡薑湯亦得若心氣狂甚入鐵豔粉一兩

遠志飲子

治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安夢寐驚魘

遠志甘草煮　茯苓　桂心　人參　棗仁炒

黃芪　當歸酒浸各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

茯神湯

治脈虛極欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫驚悸不安

茯神　人參　遠志　甘草煑　通草　麥門冬

黃芪　桔梗剉炒　甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

大建中湯

治諸虛不足小腹急痛脅肋䐜脹骨肉瘦痛短氣喘逆痰多欬嗽潮熱多汗心下驚悸腰背彊痛多臥少起

黃芪蜜炙　附子炮去皮臍　鹿茸酒蒸　續斷

地骨皮　白芍藥　石斛　人參　當歸酒浸

川芎　小草各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分

去滓溫服不拘時候

心腎丸

治心腎不足精少血燥心下煩熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭運小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受峻補者悉宜服之

菟絲子淘酒蒸擂　麥門冬各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七十丸空心食前用鹽湯送下熟水亦得

茸硃丹

治心虛血少神志不寧驚惕恍惚夜多異夢睡臥不安

鹿茸去毛酒蒸一兩　硃砂半兩水飛蜜炒尤佳

右爲細末煑棗肉爲丸如梧桐子大每服四十丸炒酸棗仁煎湯送下午前臨臥服之

茸附湯

治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦乏但是一切虛弱之證皆宜服之

鹿茸去毛酒蒸　附子炮去皮臍各一兩

右㕮咀分作四服水一盞生薑十片煎至八分去滓食前溫服

二白丸（元戎）

治痰涎爲病患以致癲癇狂妄驚悸等證

白礬一兩　輕粉一字或半錢量虛實加減

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐子大每服二三十丸生薑湯下小兒服如黍米大

硃砂安神丸

治心神煩亂怔忡不安兀兀欲吐胷中氣亂而有熱若懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸而不安宜從權衡法以鎭陰火之浮行以養上焦之元氣

硃砂另研水飛陰乾　黃連各一錢　生地三分

當歸　炙甘草各半錢

右爲末酒浸蒸餅丸如黍米大硃砂爲衣每服十五丸津唾送下食後此緩治之理也

黃連安神丸

外物卒驚宜此以鎭之

硃砂細研水飛　生地黃　當歸頭各一錢

黃連酒炒一錢五分　甘草炙五分

右爲極細末蒸餅丸黃豆大每服十丸津下

控涎丹

治驚則神出於舍舍空涎入

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子各等分

右爲末煮糊丸桐子大臨臥淡薑湯下七丸

羌活勝濕湯

治臥而多驚邪在少陽厥陰

羌活　獨活　藁本　防風各一錢　川芎二分

蔓荊子三錢　甘草炙五分

水二鍾煎一鍾食後服

半夏麻黃丸

治心下悸

半夏　麻黃各等分

右二味爲末煉蜜丸小豆大飲服三丸日三服

茯苓丸

治驚悸怔忡

石菖蒲　辰砂　人參　遠志　茯苓　眞鐵粉

茯神　南星牛膽製　半夏麯各等分

右爲細末生薑四兩取汁和水煑糊丸如桐子大別用細末爲衣乾之每服十粒加至二十粒夜臥生薑湯下

桂枝蜀漆牡蠣龍骨救逆湯（仲景下同）

治傷寒火刼亡陽驚狂起臥不安者

桂枝　生薑切　蜀漆各三兩　甘草炙二兩

牡蠣炒五兩　龍骨四兩　大棗十二枚

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去查溫服

桂枝甘草湯

治發汗後叉手冒心心下悸欲得按者

桂枝四錢　甘草二錢

右二味以水一盞半煎八分去查溫服

茯苓桂枝甘草大棗湯

治發汗後臍下悸欲作奔豚

茯苓八錢　甘草炙二錢　桂枝四錢　大棗二枚

右作二服以甘爛水二鍾先煑茯苓減二分納諸

藥煑取一盞去査溫服日三作甘爛水法取水一斗許置大盆中以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

鎭心丹（千金方下同）

治驚悸

辰砂用黃松節酒浸　龍齒用遠志苗酢煑

右只取辰砂龍齒各等分爲末猪心血爲丸如芡實大每服一丸以麥門冬葉菉豆燈心白蜜水煎豆熟爲度臨臥嚥下小兒磨化半丸量歲數與之

犀角湯

治傷寒後伏熱在心怔忪驚悸不得眠睡

犀角屑　山梔各半兩　茵陳蒿七錢半　茯苓

芍藥　生地焙各二兩　麥門冬兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三七片同煎食後服

安神補心湯（醫鑑下同）

治心虛驚悸怔忡

當歸　生地黃　茯神　黃芩各一錢二分

川芎七分　白芍炒　白朮各一錢　棗仁炒

遠志甘草水泡各八分　麥冬二錢　元參五分

甘草三分

一方去遠志麥冬黃芩元參加陳皮柏子仁酒炒

黃連剉一劑水煎服

參歸腰子

治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈

人參　當歸各五錢　豬腰子一個

右先將腰子用水二椀煎至一椀半細切入二味藥同煎至八分喫腰子以藥汁送下有喫不盡腰子同上二味藥查焙乾爲細末山藥糊爲丸梧子大每服三五十丸米湯下

鎮心湯

治心慌立應

當歸一錢二分　川芎　梔子仁炒各七分

生地黃　片芩　白芍各八分　黃連六分

酸棗仁炒　遠志製　麥門冬去心各一錢

右生薑煎服

四物安神湯

治心中無血養故作怔忡兼服辰砂安神丸

當歸酒洗　白芍酒炒　生地黃酒洗　熟地黃　人參　白朮　茯神　酸棗仁炒　黃連薑炒　梔子炒　麥門冬　竹茹　辰砂研末臨服調入

右烏梅一枚棗二枚炒米一撮水煎食遠服

養血清火湯

治心慌神亂煩躁不寧

當歸　川芎各七分　白芍酒炒　生地黃酒洗　黃連酒炒　酸棗仁炒　麥門冬各一錢　片芩　梔子炒各八分　遠志　辰砂各五分　甘草三分

右生薑三片水煎入辰砂溫服

養血安神湯

治血虛火動驚悸者

當歸酒洗　川芎　白芍炒　陳皮　柏子仁炒　黃連酒炒各五分　生地黃酒洗　茯神各一錢　白朮　酸棗仁炒各七分　甘草炙三分

右水煎服

安神鎮驚丸

治血虛心神不安驚悸怔忡不寐等證

當歸酒洗　白芍煨　貝母　麥門冬　陳皮

硃砂水飛各一兩　川芎　茯苓　遠志各七錢

酸棗仁炒　黃連薑汁炒各五錢　甘草二錢

生地酒洗一兩五錢

右爲細末煉蜜丸如菉豆大每服五十丸食遠棗湯送下

溫膽湯

治痰火驚惕不眠

人參　白朮　茯神　當歸酒洗　生地黃酒洗

酸棗仁炒　麥門冬　枳實麩炒　半夏薑汁炒

黃連酒炒　竹茹　山梔炒各等分　甘草三分

右薑一片棗一枚烏梅一箇竹瀝調辰砂末五分服

金箔鎮心丸

治一切驚悸

硃砂　琥珀　天竺黃各五錢　膽星一兩

牛黃　雄黃　珍珠各二錢　麝香

右爲細末煉蜜爲丸如皂角子大金箔爲衣每服一丸用薄荷湯送下心經有熱加炒黃連當歸生地黃人參各一兩炙甘草五錢去雄黃膽星麝香

聰明湯（體仁彙編）

治不善記而多忘者

白茯神　遠志肉甘草水煮　石菖蒲一寸九節者

右各三兩製後共爲極細末每日用三五錢煎服空心食後服一日食八九次或十餘次久久服著

能日誦千言

孔聖枕中方

治健忘

龜甲　龍骨　遠志　菖蒲

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三常服令人大聰一本食後水服

茯神丸

治多忘令人不忘

石菖蒲二分　茯苓　茯神　人參各五分

遠志七分

右五味治下篩酒服方寸匕日二夜一五日後知神良

又方

治前證

蓯蓉　續斷各二分　遠志　菖蒲　茯苓各三分

右五味治下篩酒服方寸匕日三至老不忘

八味散

治前證

天冬六分　桂心　茯苓各一兩　乾地黃四分

五味子　菖蒲　遠志　石葦各三分

右八味治下篩後食或酒或水服方寸匕三十日力倍六十日氣力强志意足

茯苓補心湯

治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本强冷涎出（一作汗出）善忘恐走不定婦人崩中面色赤

茯苓四兩　桂心　甘草各二兩　紫石英

人參各一兩　大棗二十枚　麥門冬三兩

赤小豆二十四枚

右八味㕮咀以水七升煮取二升分三服

讀書丸

治健忘能除百病日記萬言

石菖蒲　菟絲子酒煮　遠志　地骨皮　生地

五味子　川芎各一兩

右爲末薄糊丸如梧桐子大每服七八十丸臨臥白湯下一本有人參棗仁當歸

二丹丸

治健忘養神定志和血安神外華腠理

天門冬　熟地黃　丹參各一兩半　白茯神

麥門冬　甘草各一兩　遠志　人參各半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大以硃砂半兩研極細爲衣每服五十丸加至百丸空心煎愈風湯送下一方有菖蒲五錢

菖蒲益智丸

治善忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲炒　遠志薑汁淹炒　牛膝酒浸　桔梗炒

人參各三兩七錢半　白茯苓一兩七錢半

附子一兩炮去皮臍　桂心三錢

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒或米湯送下

健忘丸

久服令人不忘耳目聰明身體輕健

天門冬　遠志　白茯苓　熟地黃各等分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服四五十丸空心米飲送下日進二服

大益智散

治心志不寧語言健忘

熟地黃　人參　白茯苓　蓯蓉酒浸各二兩

菟絲子酒浸　遠志各七錢半　蛇牀子二錢半

右爲細末每服一錢食後米飲調下日進二服忌食猪肉

不忘散

石菖蒲　白茯苓　茯神　人參各一兩二錢半

遠志一兩七錢半

右爲細末每服一錢食後溫酒調下千金名定志丸菖蒲遠志各二兩茯苓人參各三兩蜜丸桐子大每服七丸日三

開心散

治好忘

石菖蒲一兩　茯苓二兩　遠志　人參各二錢半

右爲細末每服一錢食後米飲調下

蓯蓉散

久服至老不忘

肉蓯蓉酒浸　續斷各二錢半　遠志　石菖蒲

白茯苓各七錢半

右爲細末每服二錢食後溫酒調下

春依方服夏加地黃五分黃芩三分麥門冬四分冷則去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上卽覺庶事悉佳愼酢蒜鱠陳臭大冷醉吐自外百無所愼稍加至三十九不得增常以此爲度

人參養榮湯

治脾胃俱虛精神衰倦健忘

白芍藥一錢五分　人參　陳皮　黃芪蜜炙

桂心　當歸　白朮土炒　甘草炙各一錢

熟地黃　五味炒　茯苓各八分　遠志肉五分

水二鍾薑三片棗二枚煎服

導痰湯

治痰涎壅盛健忘

半夏湯洗七次四兩　南星炮　橘紅　赤茯苓

枳實麩炒各一兩　甘草炙半兩

每服四錢水一盞薑十片煎八分食後服

蘂珠丸（良方下同）

治心恙

猪心一箇取血　靛花一匙　硃砂一兩爲衣

右先將靑靛花暴乾次入猪心血同研爛次入硃砂末爲丸如梧桐子大每服二十丸不拘時茶酒任下

加味定志丸

治肥人痰迷心膈尋常怔忡

遠志　人參　琥珀　天花粉　鬱金各一兩

茯苓三兩　菖蒲二兩　貝母　苦蔞

右爲末薑汁竹瀝丸菉豆大每服二錢硃砂爲衣

火盛者加炒黃連一兩

硃砂消痰飲（醫統下同）

治心氣痰迷心竅驚悸

牛膽南星半兩　硃砂減半另研　麝香二分另研

右爲末臨臥薑汁湯調服一錢

寧志膏

治因驚失志

人參　酸棗仁泡去皮隔紙炒　辰砂各半兩

滴乳香一錢研細

右爲末煉蜜丸彈子大每服一丸薄荷湯下

平驚通聖散

治一切驚悸怔忡健忘等證

當歸　人參　黃連　茯神　遠志甘草水製

甘草炙各三錢　石菖蒲　硃砂另研各二錢

右爲細末竹葉煎湯調二錢食後臨臥服

酸棗仁湯（圖經）

治振悸不眠

棗仁二升　茯苓　白朮　人參　甘草各二兩

生薑六兩

水八升煑三升分服

預知子丸（局方）

治心氣不足精神恍惚語言錯妄忪悸煩鬱憂愁

慘慼喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或

發狂眩暴不知人並宜服此

預知子去皮　白茯苓　枸杞子　石菖蒲

茯神　柏子仁　人參　地骨皮　遠志　山藥

黃精蒸熟　硃砂水飛各等分

右爲末煉蜜丸芡子大每嚼一丸人參湯下

開心不忘方（聖惠方下同）

補心虛治健忘令人耳目聰明用戊子日服

菖蒲　遠志各一分

右搗爲細末服方寸匕食後令人耳目聰明從外

見裏及千里外事令人長生去三百病毒不能爲害

狀元丸

治健忘開心通竅定智寧神多記

石菖蒲去毛一寸九節者佳　地骨皮　白茯神　遠志甘草水泡各一兩　人參三錢　巴戟天五錢

右爲末用白茯苓末二兩粘米二兩共打粉外用石菖蒲三錢打碎煎濃湯去查煑糊爲丸每日食後午時臥時服三十五丸

又方

治好忘久服聰明益智

龍骨　虎骨　遠志各等分

右三味治下篩食後服方寸匕日二

人參遠志丸

治神思困乏健忘驚悸

人參　遠志　白茯苓　天門冬　黃芪　棗仁　石菖蒲　桔梗各一兩　丹砂五錢　官桂二錢

右爲末煉蜜丸菉豆大每服二十丸至三十丸米

湯下

　大歸神丹

治健忘鎮心安神

龍齒　琥珀各半兩　人參　當歸　酸棗仁

茯苓　遠志薑汁炒各一兩　金銀箔各二十片

右爲細末酒煑稀糊丸如小豆大每服二十九日

用麥冬湯下夜以酸棗仁湯下

　巴戟天丸

治健忘服此令人聰明善記

巴戟天半兩　石菖蒲　地骨皮　遠志製

白茯神各一兩　人參三錢

右爲末粘米粉同白茯苓末一兩作糊以菖蒲湯

調爲丸桐子大每服三十丸酒白湯任下日三

　丹參飲子

治健忘辛苦勤讀之士宜服此

石菖蒲一錢　丹參　當歸酒洗　白术炒

天冬　麥冬各一錢半　貝母　陳皮　知母

甘草各七分　黃連薑汁炒五分　五味子九粒

右水半盞薑一片煎八分不拘時溫服

七福飲（景岳全書下同）

凡怔忡係五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　棗仁二錢　白术炒一錢半　炙甘草一錢　遠志製三五分

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

大補元煎

治氣血大壞精神失守怔忡等證

人參少則用一二錢多則一二兩　山藥炒　杜仲各二錢　熟地少則用二三錢多則二三兩　當歸　枸杞各二三錢　山茱萸一錢（畏酸吞酸者去之）　炙甘草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

凡驚悸怔忡係命門之陽衰陰盛者宜此方加減主之

熟地二三錢或一二兩　山藥炒　枸杞子

杜仲薑製各二錢　山茱萸一錢　甘草炙

肉桂各一二錢　製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

凡驚悸怔忡係命門之陰衰陽勝者宜此方加減主之

熟地二三錢或至一二兩　山藥　枸杞各二錢

炙甘草一錢　茯苓一錢半　山茱萸一二錢

水二鍾煎七分食遠服

二陰煎

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言多笑或瘍疹煩熱失血等證宜用此

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　元參

茯苓　木通各一錢半　黃連　生甘草各一錢

水二鍾燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠溫服

逍遙飲

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯

漸至經脈不調或成驚悸怔忡等證

當歸二三錢　白芍藥　茯神各一錢五分

熟地三五錢　棗仁二錢炒　遠志製三五分

陳皮八分　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

大營煎

治眞陰精血虧損驚悸怔忡等證

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　枸杞

杜仲炒去絲各二錢　牛膝一錢半　炙甘草

肉桂各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

凡腎水眞陰虛損而脈證多陽虛火發熱驚悸怔忡宜此

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

水二鍾煎服

理陰煎

凡脾腎中虛驚悸怔忡等證宜溫潤者當用

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

單方

九竅出血因暴驚而得其脈虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證不可錯認作血得氣則流妄用凉藥悞事（直指方）

急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢爲末薄荷汁入酒調一字服取吐

怔忡自汗心氣不足也用豶猪腰子二箇以水二盌煮至一盌半細切人參當歸各半兩同煎至八分空心喫腰子以汁送下其查焙乾爲末以山藥末作糊

丸如菉豆大每服五十丸食遠棗湯下不過兩服即愈此岷山神濟大師方也一加乳香二錢（百一）

驚悸遺精木饅頭炒白牽牛等分爲末每服二錢用米飲調下（乾坤秘韞）

心虛驚悸不定荆瀝二升緩火煎取一升六合分溫每服四合日三夜一（千金）

蜜陀僧一物煎湯每服匙許驚氣入心瘖不能語者此方主之或爲末茶調服一匕（身經圖考）

自然銅止驚悸以酒摩服（大明）

驚悸善忘心臟不安上膈風熱化痰安神白石英硃砂各一兩爲散每服半錢食後煎金銀湯下（濟衆方）

虛勞驚悸補虛止驚令人能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以水一斗煑取三升細細服或煑粥食水盡可再煎之（張文仲方）

安魂定魄眞珠末豆大一粒蜜一蜆殼和服日三丸宜小兒（肘后方）

因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄鷄一隻治如食法眞珠四兩薤白四兩水三升

煑二升盡食之飲汁令盡（肘后方）

人魄鎭心安神魄定驚怖癲狂磨水服之（時珍）

傷寒心悸脉結代者甘草二兩水三升煑一半服七合日一服（類要下同）

驚怖卒死溫酒灌之卽醒

傷寒發狂驚怖恍惚用撒法郎二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳（醫林集要）

心孔惛塞多忘善誤丁酉日自至市買遠志裹著衣中角頭還爲末服之勿令人知不復忘（千金）

健忘久服聰明益智慧用白龍骨遠志等分爲末食後酒服方寸匕日三永類鈐方用生薑湯下（千金）

痰迷心竅心膽被驚神不守舍恍惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑一尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出爲末琥珀一兩硃砂二兩爲末生薑汁打麪糊丸梧子大每服三十丸至五十丸煎人參石菖蒲湯一日三服（局方）

治好忘久服聰明七月七日取菖蒲酒服三方寸匕

飲不至醉（千金下同）

又方常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者陰乾百日治合下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘

治人心昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

又方七月七日收麻勃一升人參二兩爲末蒸令氣遍每臨臥服一刀圭能盡知四方之事此乃治健忘服之能記四方事也陶云逆知未來事過言矣

心虛健忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝二七枚縛著臥枕中枕之不忘

又方常以五月五日日未出時取東向桃枝刻作三寸木人著衣帶中令人不忘

心孔昏塞多忘喜誤取牛馬猪雞羊犬心乾之爲末向日酒服方寸匕日三服聞一知十（外臺）

人心惛塞多忘喜悞取商陸花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕臥思念所欲事卽於眼中自覺（本草）

心虛風邪精神恍惚健忘以久使鐵鏵四斤燒赤投酢中七次打成塊水二斗浸二七日每食後服一小

盞（時珍）

驚悸善忘心臟不安上膈風熱化痰安神白石英硃砂各一兩爲散每服半錢食後煎金銀湯下（濟衆方）

開心益智人參末一兩錬成豬肥肪十兩以淳酒和勻每服一盃日再服服至百日耳目聰明骨髓充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病（千金）

膽寒睡臥不安心多驚悸酸棗仁炒香一兩爲細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調服（良方）

健忘以遠志石菖蒲煎湯常常茶喫

又方用益智遠志等分爲末食後酒調服

益精神强志意聰明耳目以雞頭實爲粉用粳米煮粥空心食之良

治健忘補中益心志聰明耳目以遠志泡去心皮爲粉先以粳米二合煮粥候冷入蓮子粉攪勻再煮二三沸食之

治健忘久服聰明益智龍骨遠志等分爲末食後酒調方寸匕日三服兼治白濁

又方用吉祥草爲末酒調服方寸匕補心不忘書房

中裁養使人明目强記人家堂屋中有之辟忘

鍼灸

素問曰肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脈引衝頭也

無刺大驚人

人有所墮墜惡血留內腹中脹滿不得前後先飲利

藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然谷之前血脉出血刺足跗上動脉不已刺三毛上各一痏見血立已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方

靈樞經曰熱病嗌乾多飲善驚臥不起取之膚肉以第六鍼五十九目眥青索肉於脾不得索之木木者肝也

熱病數驚瘈瘲而狂取之脉以第四鍼急瀉有餘者癲疾毛髮去索血於心不得索之水水者腎也

厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰

甲乙經曰心痛善悲厥逆懸心如饑之狀心憺憺而驚大陵及間使主之

心澹澹而善驚恐心悲內關主之

善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱渴行間主之

驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飲不欲食照海主之

膽眩寒厥手臂痛善驚忘言面赤泣出腋門主之

狐疝驚悸少氣巨闕主之

少腹疝臥善驚氣海主之

熱病汗不出鼽衄眩時仆面浮腫足脛寒不得臥振寒惡人與木音喉痹齲齒惡風鼻不利多善驚厲兌主之

驚不得眠善斷水氣上下五臟游氣也三陰交主之

千金方曰陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急

列缺主熱癇驚而有所見

曲骨陰谷行間主驚癇狂走癲疾

間使主善悲驚狂面赤目黃瘖不能言

陽谿天井主驚瘈

懸釐束骨主癲疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癲疾互引數驚悸

支正魚際合谷少海曲池腕骨主狂言驚恐

陰蹻主臥驚視如見鬼

曲澤太陵主心下憺憺喜驚

陰交氣海大巨主驚不得臥

大鍾郄門主驚恐畏人神氣不足

解谿主瘈瘲而驚

少衝主太息煩滿少氣悲驚

行間主心痛數驚心悲不樂

三間合谷厲兌主吐舌戾頸喜驚

通里主心下悸

手少陰陰郄主氣驚心痛

後谿主泣出而驚

腕骨主煩滿驚

通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻呻心下悸悲恐

巨闕間使主胷中憺憺

陽陵泉主嘔宿汁心下憺憺

蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒

彧中雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

少府主數噫恐悸氣不足

天府曲池列缺百會主惡風邪氣泣出喜忘

左手關上陽絕者無膽脉也苦膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或

刺三毛中

醫學綱目曰心爍爍跳動少衝瀉之灸立效

健忘取列缺心俞神門中脘三里灸少海

醫案

本事方曰紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每臥則魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通夕無寐更醫不效予爲診視詢之曰醫作何病治董曰衆皆以爲心病予曰以脈言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉

痾去體矣願求治之予曰公且持此說與衆醫議治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故余處以眞珠母丸獨活湯二方以贈服一月而病悉除此方用眞珠母爲君龍齒佐之眞珠母入肝經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以爲鎭心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已矣

儒門事親曰衞德新之妻旅中宿於樓上夜値盜劫人燒舍驚墮牀下自後每聞有響則驚倒不知人家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不痊諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無效戴人見而斷之曰驚者爲陽從外入也恐者爲陰從內出也驚者爲自不知恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手按高椅之上

當面前下置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何以驚乎伺少定擊之驚乃緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人畫背後之牕徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊其門牕自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜戴人至是終身敬服如有人言戴人不知醫者執戈以逐之

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睒脣舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜臥發熱衣被盡去遍身燥癢中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未愈更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則吐痰一二升至晚又下

五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞蛋黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺勢輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筋未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之反成他病

上渠卜家一男子年二十八歲病身弱四肢無力面色蒼黃左脅下身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常小便微黃已二三載矣諸醫計窮求戴人治之視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也張曰甲膽乙肝故青其黃者脾也診膽脈小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎綠水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾戴人夜以舟車百五十丸濬川散四五錢加生薑自然汁平旦果下綠水四五行或問大加生薑何也荅曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有力戴人謂卜曰汝妻亦當病卜曰太醫未見

吾妻何以知之曰爾感此驚幾年矣卜省曰當被火時我正在草堂中熟睡人驚喚我睡中驚不能言火已塞門我父拽出我火中今五年矣張曰汝膽伏大驚甲乙乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而殺穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋敗精反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卜曰吾妻實如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救於子己土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金故大加生薑使伐木然先不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調濬川散大下之次瀉其所勝也大抵陽干尅陽干腑尅腑臟尅臟

丹溪心法曰憲幕之子傅兄年十七八時暑月因勞而渴恣飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似邪鬼診其脈兩手皆虛弦而帶沉數余曰數爲有熱虛弦是大驚又梅酸之漿鬱於中脘補虛清熱導去

痰滯病乃可安遂與人參白术陳皮茯苓芩連等濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未效衆皆尤藥之不審余脈之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入荊瀝又旬日而安

醫學綱目曰林學士本南人歷內地爲官有一子甚端嚴而聰敏父母愛之居常喜食海蛤飲食之頃未嘗不設至十八年忽面色頓青形體瘦削夜多驚悸皆謂勞瘵之疾百療不瘳遂召杜脈之杜曰非病何以知之蓋雖病削面青精神不減問秀才好食甚物曰多食南海中味杜曰但多服生津液藥病當自愈如是經兩月面色漸有紅潤意夜亦無驚悸林問曰醫師之驗久聞世名願聞此病所以杜曰王冰註素問曰鹽發渴乃勝血之證海味皆鹹物既多食海味使心血漸衰則夜驚悸今既去鹹用生津液之藥人且少壯血液易生面色漸有紅潤此疾去乃安矣衆醫以爲勞瘵非其治也

薛氏醫按曰下堡顧仁成年六十有一痢後入房精滑自遺二日方止又房勞感寒怒氣遂發寒熱右脅

痛連心胷腹痞自汗盜汗如雨四肢厥冷睡中驚悸或覺上升如浮或覺下陷如墮遂致廢寢或用補藥二劑益甚脈浮大洪數按之微細此屬無火虛熱急與十全大補加山藥山茱丹皮附子一劑諸證頓愈而痊此等元氣百無一二

二八三九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十一卷目錄

醫部彙考三百二十一

情志門

黃帝素問 陰陽應象大論 靈蘭祕典論 玉
機眞臟論 舉痛論 調經論 大
奇論 脈解篇 四時刺逆從論 經脈別論
宣明五氣論 風論 病能論 臟氣法時
論 痺論 診要經終論 氣交變大論 五
常政大論 至眞要大論 解精微論 六元
正紀大論 疏五過論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇 本神篇 經脈篇
淫邪發夢篇 行鍼篇 百病始生

（篇　邪客篇　脈論　本藏篇　五癃津液別篇）
扁鵲難經（五積具五志）
張機傷寒論（恐怖之脈）
華佗中藏經（情欲成氣痹　恐怖死證）
王叔和脈訣（脈法）
孫思邈千金方（邪熱傷腎）
劉完素六書（笑病之原　悲病之原）
張從政儒門事親（九氣感疾更相爲治術）
李梴醫學入門（情病治法）

李中梓醫宗必讀（恐屬四臟）
喻昌醫門法律（心爲臟腑之主）
陳士鐸石室祕錄（怒傷肝治法　膽怯治法）
方（補心丸　茯苓補心湯　半夏補心湯　十黃散　定志小丸　鎮心湯　又方　賁散
方　竹瀝湯　大鎮心散　小鎮心散　又方　石葦圓　內補散　鎮心丸　大鎮心丸
加味七氣湯　除濕補氣湯　甘麥大棗湯　預知子丸　香附甘草散　人參散　茯神散
補膽防風湯）
單方
鍼灸

醫案

藝術典第三百四十一卷

醫部彙考三百二十一

情志門

黃帝素問

陰陽應象大論

心在聲爲笑在變動爲憂在志爲喜喜傷心恐勝喜

註　心志喜故發聲爲笑心獨無俞故變動在志心氣幷於肺則憂在志爲喜此心中和樂也過於喜則心志自傷恐勝喜者恐爲腎志水勝火也

肝在聲爲呼在變動爲握在志爲怒怒傷肝悲勝怒

註 肝者將軍之官故在志爲怒而發聲爲叫呼也怒傷肝者用志太過則反傷其體矣悲勝怒者悲爲肺志以情勝情也

脾在聲爲歌在變動爲噦在志爲思思傷脾怒勝思

註 脾主運用故其志在思發聲爲歌也思傷脾者用志則傷氣氣傷則臟傷也怒爲肝志故能勝思

肺在聲爲哭在變動爲欬在志爲憂憂傷肺喜勝憂

註 肺志在悲故發聲爲哭臟氣變動則及於喉而爲欬也若精氣并於肺則憂憂傷肺者過則損也喜則氣散故能勝憂

腎在聲爲呻在變動爲慄在志爲恐恐傷腎思勝恐

註 腎氣在下故聲欲太息而呻出之腎藏志而爲作強之官故慮事而時懷恐怖也恐傷腎者恐懼而不解則傷精也思慮深則處事詳故勝恐

靈蘭祕典論

膻中者臣使之官喜樂出焉

註 膻中者心主之宮城心主包絡位居膻中而代

君行令故爲臣使之官心志喜心主代君宣布故喜樂出焉

玉機眞臟論

因而喜大虛則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣此其道也故病有五五五二十五變及其傳化傳乘之名也

註 因而喜大則心氣虛而腎氣乘於心矣怒則肝氣傷而肺氣乘於肝思則脾氣傷而肝氣乘於脾恐則腎氣傷而脾氣乘於腎憂則肺氣傷而心氣乘於肺矣如一臟虛而受乘卽傳之五臟五臟有五變則五五二十五變矣如喜大而腎氣乘心心卽傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎是五臟傳化亦各乘其所勝故曰傳者乘之名也

舉痛論

百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上矣喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉

而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣炅則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣

註 怒爲肝志肝主藏血怒則肝氣上逆故甚則嘔血木氣乘脾故爲飱泄脾位中州肝臟居下故嘔血飱泄皆爲氣上也喜則志意和達榮衛疏通其氣舒徐而和緩矣心氣并於肺則悲心悲氣并則心系急而上焦之氣不通榮衛不能行散矣氣鬱於中則熱中氣不運行故潛消也恐傷腎是以精氣退却而不能上升膻中爲氣之海上出於肺以司呼吸然其原出於下焦故精氣却則上焦閉閉則生升之氣還歸於下而下焦脹矣上下之氣不相交通故氣不行矣寒氣客於腠理則腠理閉而氣不通故氣收於內矣炅則腠理開汗大泄則陽氣從而外泄矣驚則心氣散而無所倚神志越而

無所歸思慮惑而無所定故氣亂矣勞則腎氣傷而喘息於內陽氣張而汗出於外外內皆越故氣耗散矣思則心神內存正氣畱中而不行故氣結矣

調經論

神有餘則笑不休神不足則悲

註 心在志爲喜在聲爲笑故有餘則笑不休不足則金氣反勝而爲悲

血有餘則怒不足則恐

註 肝志怒故血有餘則肝氣盛而主怒腎志恐故血不足則母氣衰而并於脾故恐

血并於上氣并於下心煩惋善怒

註 血并上則脉氣實而心煩惋氣并於下則不舒氣而多怒也

大奇論

脉至如華者令人善恐不欲坐臥行立常聽是小腸氣予不足也季秋而死

註 脉至如華者如華之輕微也小腸爲心之腑而

屬丙火其脉當來盛反如華者氣予不足也腑氣不足則臟氣亦虛神虛則恐懼自失神志不寧故坐臥不安也小腸之脉入耳中屬聽宮常有所聽者如耳作蟬鳴或如鐘磬聲皆虛證也遇金水生旺之時而死

脉解篇

陽明所謂甚則厥惡人與火聞木音則惕然而驚者陽氣與陰氣相薄水火相惡故惕然而驚也

註 陽明氣厥則陽明之脉病乃惡人與火聞木音則惕然而驚也

少陽所謂少氣善怒者陽氣不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥

註 少陽主氣秋時陽氣下降而不治於外則少陽之氣亦不得出故少氣也厥陰肝氣與少陽標本相合少陽之氣不得出則肝氣當治而亦未得矣肝氣內鬱故善怒煎厥者焦煩顛倒也

所謂恐如人將捕之者秋氣萬物未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也

註 秋時陽氣雖入而陰氣尚少故萬物雖衰而未盡去陰氣雖少當正出之時而與陽氣之入相薄則少陽厥陰之氣皆傷肝氣虛則恐膽病者心下澹澹如人將捕之

四時刺逆從論

夏刺肌肉血氣內却令人善恐

註 夏氣在孫絡而使之溢於肌中則血氣虛却於內矣陽明脈虛則恐如人將捕之

夏刺筋骨血氣上逆令人善怒

註 夏氣浮長於上而反逆之使下則氣鬱不疎而使人善怒也

經脈別論

有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心

註 墮則傷筋肝主筋故喘出於肝木勝土故淫氣害脾驚則氣亂故喘出於肺肺者心之蓋故淫氣傷心

疾走恐懼汗出於肝

註　疲勞傷筋故汗出於肝

宣明五氣論

胃爲氣逆爲噦爲恐膽爲怒

註　胃受肺之寒氣所逆而欲復出於胃故爲噦胃之逆氣下幷於腎則爲恐蓋腎於胃戊癸相合也膽爲中正之官性秉剛決病則氣鬱而爲怒

五精所幷精氣幷於心則喜幷於肺則悲幷於肝則憂幷於脾則畏幷於腎則恐是謂五幷虛而相幷者也

註　心爲陽臟陰精幷之故喜肺虛而肝氣幷於肺則悲肝虛而脾氣幷於肝則憂脾虛而腎氣幷於脾則畏陰氣少陽氣入陰陰陽相薄故恐也

陽入之陰則靜陰出之陽則怒

註　陽分之邪入陰則病者靜蓋陰盛則靜也陰分之邪出陽則病者多怒蓋陽盛則怒也

五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是爲五邪皆同命死不治

註春茲夏鉤秋毛冬石五臟陰陽之正氣也反得所勝之脉者邪賊盛而見於脉也在內所傷之臟氣而外見於脉故名之曰陰出之陽邪出於脉則血有餘經曰血有餘則怒此正氣爲邪氣所勝故爲不治所謂不治者謂五脉皆爲邪勝也如五臟之氣爲邪所勝見四時相尅之脉皆爲死不治矣

風論

心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇赤色病甚則言不可快診在口其色赤

註心爲火臟風淫則火盛故脣舌焦而津液絕風化木木火交熾故善怒嚇心主舌病甚則舌本強而言不可快

肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在目下其色青

註肝開竅於目而主泣故善悲風木合邪則火熱盛而嗌乾肝氣病故善怒

病能論

帝曰有病怒狂者此病安生

註　肝雖順傳於心而不得相生之正氣反受肝之寒邪寒凌心火故爲怒狂

岐伯曰生於陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥

註　肝氣上逆則陽氣暴折而不得出陽氣難於流行則肝氣亦未得而治故善怒也

臟氣法時論

肝病者兩脅下痛引小腹令人善怒虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之

註　虛者精氣奪也少陽經脉入耳中故無所聞肝病者心下澹澹如人將捕之

痺論

淫氣憂思痺聚在心

註　淫氣憂思則心氣不藏而痺聚在心矣

診要經終論

春刺秋分筋攣逆氣環爲欬嗽病不愈令人時驚又且哭

註　病在肝而反傷其肺是以筋攣血氣環逆故欬

嗽魂魄不安故哭也

夏刺冬分病不愈令人少氣時欲怒

註　夏月陽氣外張而反逆藏於冬分故不惟病不愈而更令人少氣善怒也

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病意不樂

註　腎藏志志不舒故意不樂

歲木太過甚則忽忽善怒

註　善怒肝志之病也

歲土不及民病善怒

註　風木之病

五常政大論

發生之紀其病怒

註　怒肝氣盛也

伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也

註　心神不足也

太陽司天火氣高明喜悲

註　火熱鑠金也

至眞要大論

太陽司天民病善悲

註 陽熱中盛之證

太陽之復善悲甚則入心善忘善悲

註 木火之氣衰也

解精微論

悲哀則泣下泣下水所由生水宗者積水也積水者至陰也至陰者腎之精也宗精之水所以不出者是精持之也輔之裹之故水不行也

註 悲哀則動其心志故泣下而水所由生水宗者宗脈之所聚上液之道也腎臟之精水由宗脈而上通於心外注於目故曰目者宗脈之所聚也如志不悲則精持於下輔之裹之水精不出於宗脈故水不行於上也

夫水之精爲志火之精爲神水火相感神志俱悲是以目之水生也故諺言曰心悲名曰志悲志與心精共湊於目也

註 心之所之謂之志心志之合一也心者五臟之

專精故水精與心精共湊於目而爲泣是以俱悲則神氣傳於心精上不傳於志而志獨悲故泣出也

註　精不上傳於志而志獨悲於上故泣出也

泣涕者腦也腦者陰也髓者骨之充也故腦滲爲涕志者骨之主也是以水流而涕從之者其行類也

註　骨之精髓充於骨髓從骨空而上通於腦故腦滲之爲涕也夫志者骨之主也是以水流而涕從之者其行與志悲而腎精出於目之爲泣者相同類也

夫涕之與泣者譬如人之兄弟急則俱死生則俱生其志以早悲是以涕泣俱出而橫行也夫人涕泣俱出而相從者所屬之類也

註　涕泣俱出而相從者緣腎臟所屬之同類也

夫泣不出者哭不悲也不泣者神不慈也神不慈則志不悲陰陽相持泣安能獨來夫志悲者惋惋則冲陰冲陰則志去目志去則神不守精精神去目涕泣出也

註　陰陽相持謂水火之神志主持於內則精不出也冲陰謂志上冲於腦也夫目系上屬於腦故志上冲陰則志去走於目志去則神不獨守其精精神並去出於目而涕泣皆出也

六元正紀大論

少陰所至爲語笑

註　此冬病之常也

疏五過論

暴怒傷陰暴喜傷陽

註　暴怒則血并於陰故傷陰暴喜則氣并於陽故傷陽矣

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脉緩甚爲狂笑

註　緩甚則心氣有餘心藏神神有餘則笑不休

本神篇

是故怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止因悲哀動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁

憂者氣閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收

註　思慮志意皆心之所生是以傷心臟之神氣

心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭死於冬

註　思慮脾之情如怵惕思慮則傷心臟之神神傷則不能主持而恐懼自失

脾憂愁而不解則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛悴色夭死於春

註　憂愁肺之情如憂愁不解則傷脾臟之意意傷則悗亂而四肢不舉

肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮而攣筋兩脅骨不舉毛悴色夭死於秋

註　悲哀肺之情如悲哀動中則傷肝臟所藏之魂魂傷則狂忘不精

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏

註　喜樂心之情如喜樂無極則傷肺臟之魄魄傷

則狂狂則神亦憚散而意不存

腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏

註 怒者肝之情如盛怒不止則傷腎臟之志志傷則喜忘其前言喜忘者神志皆傷也

恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下是五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣

註 恐傷腎故恐懼不解則傷腎臟之精腎主骨故骨痠痿厥精時自下者臟氣傷而不能藏也

肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒

註 肝者將軍之官故氣虛則恐氣實則怒

心藏脈脈舍神心氣虛則悲實則笑不休

註 心氣虛則悲盛實則笑不休

經脈篇

心主手厥陰心包絡之脈是動甚則胷脅支滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休

註 胷脅支滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休

者有餘於內也

腎足少陰之脉氣不足則善恐心惕惕如人將捕之

註 此少陰腎臟之生氣厥逆於下而爲病也

邪淫發夢篇

肝氣盛則夢怒

註 此邪干五形臟而形之於夢也

行鍼篇

多陽者多喜多陰者多怒

註 心爲陽中之太陽肝爲陰中之少陽心主喜肝主怒也

百病始生篇

喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也

註 此形氣外內之相應也

邪客篇

天有風雨人有喜怒

厥論

風痹淫濼病不可已者足如履冰時如入湯中股脛淫濼煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則目眩悲以

喜恐短氣不樂不出三年死也

註　風邪淫濼於上下故病不可已蓋寒之則傷心主之火熱之則傷腎臟之陰病不可治故不可已也悲以喜恐者心腎之神志傷而悲泣也短氣者傷其腎氣也不樂者傷其心氣也

本臟篇

五臟皆小者少病苦焦心大愁憂五臟皆大者緩於事難使以憂

註　五臟所以藏精神血氣魂魄志意者也故小則血氣收藏而少病小則神志畏怯故苦焦心大憂愁也大則神志充足故緩於事難使以憂

五癃津液別篇

五臟六腑之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上溢夫心系與肺不能盡舉乍上乍下故欬而泣出矣

註　心悲則臟腑之氣皆上并於心聽令於君主也氣并於心則心系急心系急則肺舉肺乃心之蓋也肺舉則液上溢肺主氣而水隨氣行也心系與

肺不能盡舉乍上乍下下則爲欬上則泣出矣

扁鵲難經

五積具五志

假令得肝脈其外證善潔面青善怒其內證臍左有動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋溲便難轉筋有是者肝也無是者非也

假令得心脈其外證面赤口乾喜笑其內證臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而啘有是者心也無是者非也

假令得脾脈其外證面黃善噫善思善味其內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠墮嗜臥四支不收有是者脾也無是者非也

假令得肺脈其外證面白善嚔悲愁不樂欲哭其內證臍右有動氣按之牢若痛其病喘欬洒淅寒熱有是者肺也無是者非也

假令得腎脈其外證面黑善恐欠其內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆有是者腎也無是者非也

漢張機傷寒論

恐怖之脉

問曰人病恐怖者其脉何狀師曰脉行如循絲纍纍然其面白脫色也

華佗中藏經

情欲成氣痺

氣痺者愁思喜怒過則氣結於上久而不消則傷肺傷氣則生氣漸衰而邪氣愈勝留於上則胷腹痺而不能食注於下則腫脚重而不能行攻於左則左不遂衝於右則右不仁貫於舌則不能言遺於腸則不能溺壅而不散則痛流而不聚則麻眞經既損難以醫治邪氣不勝易爲痊愈其脈右手寸口沉而遲澀者是也宜節憂思以養氣愼怒以全眞最爲良矣

恐怖死證

肝絕汗出如水恐懼不安伏臥目直面青者八日死

又曰卽時死

筋絕魂驚虛恐手足爪甲青呼罵不休者八九日死

晉王叔和脈訣

脈法

肝臟歌曰逆時生恚怒順候脈弦長泣下爲之液聲呼是本鄉

三部俱弦肝有餘目中疼痛苦痃虛怒氣滿胷常欲叫翳蒙瞳子泪如珠

唐孫思邈千金方

邪熱傷腎

羽音人呻而好恚恚而喜忘恍惚有所思此爲土尅水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而看人此爲邪熱傷腎甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治

金劉完素六書

笑病之原

笑蕃茂鮮淑舒榮彰顯火之化也故喜爲心火之志喜極而笑者猶燔爍火喜而鳴笑之象也故病笑者火之甚或心本不喜因侮戲而笑者俗謂之冷笑由是違己心則喜笑涉人非道而伐之便慚然失志或

以輕手擾人頸腋腹脅股膕足趺令人痒而笑者由動亂擾撓火之用靜順淸謐水之化皮膚彰顯之分屬火嫩薄隱藏之分屬水以火用擾其水分使人慚然失志而痒則水衰火旺而爲笑以手自擾而不笑者不羞不痒故也然羞慚而痒者心火之化人失信志則羞慙者水衰火實故也志與信者腎水之化但痒而不笑羞而不痒皆不能爲笑者化微不能變動故也

悲病之原

悲金肺之志金本能令燥者火也心火主於熱喜痛故悲痛苦惱者心神煩熱躁亂而非淸淨所以悲哭而五液俱出者火熱亢極而反兼水化制之故也夫五臟者肝心脾肺腎五臟之志者怒喜悲（一作憂）思恐若志過度則勞傷本臟凡五志所傷皆熱六欲者眼耳鼻舌身意七情者喜怒哀樂愛惡欲（一作好愛惡）肝之所傷則皆屬火熱所謂陽動陰靜故形神勞則躁不寧靜則淸平是故上善若水下愚如火先聖曰六欲七情爲道之患屬火故也如中風偏枯者由心火暴

甚而水衰不能制之則火能尅金金不能尅木則肝木自甚而兼於火熱則卒暴僵仆多因五志七情過度而卒病也又如酒醉而熱則五志七情競起故經曰戰慄驚惑悲笑譫妄歌唱駡詈癲狂皆爲熱故熱甚癲狂者皆此證也

元張從政儒門事親

九氣感疾更相爲治衍

天以氣而燾地以氣而持萬物盈乎天地之間咸以氣而生及其病也莫不以氣而得且風之氣和平而豐啓熱之氣暄而舒榮火之氣炎暑而出行濕之氣埃溽而負盈燥之氣清勁而悽愴寒之氣寒氣而歸藏此六氣時化司化之常也及其變風之氣飄怒而反大凉熱之氣大暄而反寒火之氣飄風燔燎而反霜凝濕之氣雷霆驟注而反烈風燥之氣散落而反濕寒之氣寒雪霜雹而反白埃此六氣之變也故天久寒則治之以暑天久凉則治之以暄天久晦則治之以明天久晴則治之以雨夫天地之氣常則安變則病而況人稟天地之氣五運迭侵於其外七情交

戰於其中是以聖人嗇氣如持至寶庸人役物而反傷太和此軒岐所以論諸痛皆因於氣百病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而爲九所謂九者怒喜悲恐寒暑驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衞通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衞不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣王太僕云恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦迴環而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也新校正云不行當作下行寒則腠理閉氣下行故氣收矣王太僕云身凉則衞氣沉故皮膚之理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衞氣收斂於中而不散也炅則腠理開榮衞通汗大出故氣泄矣王太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衞大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣

王太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣王太僕云繫心不散故氣亦停留此素問之論九氣其變甚詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔血及飧泄余皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜樂愁憂盛怒恐懼而言其病其言曰智者之養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而和剛柔如是則邪僻不至而長生久視是故怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止因悲哀動中者竭絕而失生喜樂者神蕩散而不藏愁慮者氣閉塞而不行盛怒者神迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛瘁色夭死於冬脾憂愁而不解則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛瘁色夭死於春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮而攣筋兩脅不舉毛瘁色夭死於秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛瘁色夭死於夏腎盛怒而不止則傷志

志傷則喜忘其前言腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色夭死於季夏恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無氣則死矣靈樞論神意魂魄志精所主之病然無寒暑驚勞四證余以是推而廣之怒氣所至爲嘔血爲飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胷滿脅痛食則氣逆而不下爲喘渴煩心爲消癉爲肥氣爲目暴盲耳暴閉筋解發於外爲癰疽喜氣所至爲笑不休爲毛髮焦爲內病爲陽氣不收甚則爲狂悲氣所至爲陰縮爲筋攣爲肌痹爲脉痿男爲數溲血女爲血崩爲酸鼻辛頞爲目昏爲少氣不足以息爲泣則臂麻恐氣所至爲破䐃脫肉爲骨酸痿厥爲暴下綠水爲面熱膚急爲陰痿爲懼而脫頤驚氣所至爲潮涎爲目睘爲口呿爲癡癇爲不省人爲僵仆久則爲痛痹勞氣所至爲咽噎病爲喘促爲嗽血爲腰痛骨痿爲肺鳴爲高骨壞爲陰痿爲唾血爲冥視爲耳閉男爲少精女爲不月衰甚則潰潰乎若壞都汩汩乎不可止思氣所至爲不眠爲嗜臥爲昏瞀爲

中痞三焦閉塞爲咽嗌不利爲膽癉嘔苦爲筋痿爲白淫爲得後與氣則快然如衰爲不嗜食寒氣所至爲上下所出水液澄徹淸冷下利淸白吐利腥穢食已不饑堅痞腹滿急痛癥瘕癩疝屈伸不便厥逆禁固炅氣所至爲喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大而鼓之有聲如鼓瘡疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻窒鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒甚則瞀瘛目昧不明耳鳴或聾躁擾狂越罵詈驚駭禁慄如喪神守氣逆衝上噎腥涌溢食不下胕腫疼痠暴瘖暴注暴病暴死凡此九者內經有治法但以五行相勝之理治之夫怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太過則肝亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺金受邪火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則氣并於肺而肝木受邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎屬水恐則氣并於腎而心火受邪水太過則腎亦自病思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎水受邪土太過則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病寒太過則陰亦自病炅傷氣氣屬

陽熱勝寒則陰受病熱太過則陽亦自病凡此七者更相爲治故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪戲狎之言娛之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可以治思以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼志此之言奪之凡此五者必詭詐譎怪無所不至然後可以動人耳目易人視聽若胷中無材器之人亦不能用此五法也炅可以治寒寒在外者以焠鍼焫熨烙灸湯而汗之寒在內者以熱食溫劑平之寒可以治炅炅在外者以清房凉榻薄衣以清劑汗之炅在內者以寒飲寒劑平之惟逸可以治勞經曰勞者溫之溫謂溫存而養之今之醫者以溫爲溫煖之藥差之遠矣岐伯曰以平爲期亦謂休息之也惟習可以治驚經曰驚者平之平謂平常也夫驚以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣此九者內經自有是理庸工廢而不行今代劉河間治五志獨得言外之意謂五志所發皆從心造故凡見喜怒悲恐思之證皆以平心火爲主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火二者亦

以平心爲主今之醫者不達此旨遂有寒凉之謗羣聚而譟之士大夫又從而惑之公議何時而定耶

明李梴醫學入門

情病治法

怒傷肝氣上逆過則嘔吐枳梗二陳湯紺珠正氣天香湯熱者柴陳湯憂傷肺其氣聚過則喘促蘇子降氣湯分氣紫蘇飲噎膈者暫用五膈寬中飲悲傷心胞及肺系其氣急過則爲狂者枳殼煮散升陽順氣湯思傷脾其氣結過則痞滿退熱清氣湯溫膽湯木香化滯湯木香枳朮丸此四者皆令邪氣鬱結多見有餘之證又逸則氣滯亦令氣結輕者行動卽愈重者橘皮一物湯

李中梓醫宗必讀

恐屬四臟

經曰在臟爲腎在志爲恐又云精氣幷於腎則恐蓋恐者腎之情志下章之言他臟者亦莫不由於腎也肝藏血血不足則恐肝者腎之子也水强則膽壯水薄則血虛而爲恐矣胃爲恐胃屬土腎屬水土邪傷

水則爲恐也心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失夫心藏神神傷則心怯所以恐懼自失火傷畏水之故按經文論恐有腎肝心胃四臟之分而肝膽於腎乙癸同源者也胃之於腎侮所不勝者也心之於腎畏其所勝者也故恐之一證屬腎之本志而旁及於他臟治法則有別焉治腎傷者宜味厚枸杞遠志地黃山茱萸茯苓牛膝杜仲之屬治肝膽者宜養陰棗仁山茱萸牡丹皮白芍藥甘草龍齒之屬治陽明者壯其氣四君子湯倍加茯苓治心君者鎭其神硃砂琥珀金銀箔犀角龍齒之屬

醫門法律

臣喩昌著

心爲臟腑之主

本神篇曰心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失邪氣臟腑病形篇曰憂愁恐懼則傷心口問篇曰悲哀憂愁則心動心動則五臟六腑皆搖可見心爲五臟六腑之大主而總統魂魄兼該志意故憂動於心則肺應思動於心則脾應怒動於心則肝應恐動於心則腎應此所以五志惟心所使也設能善養此心而

居處安靜無爲懼懼無爲欣欣婉然從物而不爭與時變化而無我則志意和精神定悔怒不起魂魄不散五臟俱寧邪亦安從奈我何哉

石室祕錄（臣陳士鐸著）

怒傷肝治法

凡人有鬱鬱不樂忽然氣塞而不能言苟治之不得法則死矣夫鬱證未有不傷肝者也傷肝又可伐肝乎伐肝是愈助其鬱鬱且不能解又何以救死於頃刻哉方用救肝開鬱湯白芍二兩柴胡甘草各一錢白芥子三錢白朮茯苓當歸各五錢陳皮二錢水煎服一劑而聲出再劑而神安三劑而鬱氣盡解此方妙在用白芍之多至二兩則直入肝經以益其匱乏之氣自然血生而火熄又用白朮當歸健土以生血柴胡以解鬱甘草以和中白芥子以消膈膜之痰又妙在多用茯苓使鬱氣與痰涎盡入於膀胱之中而消弭於無形也倘人有鬱氣不解奄奄黃瘦亦急以此方治之何至變生不測哉

膽怯治法

凡人膽怯不敢見人者少陽膽經虛也而所以致少陽膽經之虛者肝木之衰也而肝木之衰又因腎水之不足法當補腎以生肝木方用熟地一兩山茱萸四錢芍藥當歸茯神各五錢柴胡白芥子棗仁肉桂各一錢水煎服此方之妙補腎之中用補肝之品尤妙再去補心使心不取給於肝膽之血則膽之汁有餘而怯形可去又妙用肉桂以入肝如人得勇往之人自然頃刻膽壯矣此治腑實有妙理人知之乎

方

補心丸（千金方下同）

當歸　防風　芎藭　附子　芍藥　甘草

蜀椒　乾薑　細辛　桂心　半夏　厚朴

大黃　猪苓各一兩　茯苓（一方用茯神）　遠志各二兩

右十六味爲末蜜丸如梧子大酒服五丸日三不知加至十丸冷極加熱藥

茯苓補心湯

治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱

或獨語不覺咽喉痛舌本强冷涎出（一作汗出）善忘恐走不定婦人崩中面色赤

茯苓四兩　桂心　甘草各二兩　紫石英
人參各一兩　大棗二十枚　麥門冬三兩
赤小豆二十四枚

右八味㕮咀以水七升煑取二升分三服

半夏補心湯

治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤

半夏六兩　宿薑五兩　茯苓　桂心　枳實
橘皮各三兩　白朮四兩　防風　遠志各二兩

右九味㕮咀以水一斗煑取三升分三服

十黃散

治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高墮下落水所致悉主之

雄黃　人參各五分　黃芩　大黃　黃蘗
黃芪　細辛　桂心各三分　黃連　黃香
蒲黃　麻黃各（缺）分　黃環　澤瀉　山茰各二分

右十五味治下篩未食溫酒服方寸匕日二不知加至三匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生黃二分按崔氏有蜀椒五分乾薑四分

定志小丸

治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發狂眩者

菖蒲　遠志各二兩　茯苓　人參各三兩

右四味爲末蜜丸如梧子大飲服七丸日三加茯神爲茯神丸散服之亦佳

鎮心湯

治風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神志不定

防風　當歸　大黃　麥門冬各五分　澤瀉

大豆卷　白蘞各四分　菖蒲　人參　桔梗

桂心　遠志　薯蕷　石膏各二分　秦艽六分

紫菀　乾薑　茯苓　茯神　附子各一兩

白朮　甘草各十分　粳米五合　大棗五兩

右二十四味㕮咀以水一斗二升先煮粳米令熟去滓內藥煮取四升分服八合日三夜一按千金

翼不用粳米蜜丸梧子大酒服十九加至二十九

又方

治腎熱好怒好忘耳聽無聞四肢滿急腰背動轉彊直

柴胡　茯神　黃芩　澤瀉　升麻　杏仁
大青　芒硝各三兩　淡竹葉　地黃各切一升
磁石四兩　羚羊角一兩

右十二味㕮咀以水一斗煑取三升去滓下芒硝分三服外臺茯苓作茯神

煑散方

治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸

丹參　牛膝　葛根　杜仲　乾地黃　甘草
猪苓各二兩半　五加皮　石膏各三兩　茯苓
遠志　黃芩各一兩十八銖　羚羊角　生薑
橘皮各二兩　淡竹葉鴨子大

右十六味治下篩爲粗散以水三升煑兩方寸匕帛裹之時用動取八合爲一服日二服

竹瀝湯

治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安

淡竹瀝　生地黃汁各一升　石膏八兩　芍藥

白朮　人參　梔子仁各三兩　赤石脂　紫菀

知母　茯神各二兩

右十一味㕮咀以水九升煑十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

大鎭心散

治心虛驚悸夢寤恐畏

麥門冬　當歸各五分　紫石英　茯苓　防風

人參　甘草　澤瀉各八分　黃芪　秦艽

白朮　薯蕷　白蘞各六分　桔梗　大豆卷

柏子仁　桂心　遠志　大黃　石膏各四分

蜀椒　芍藥　乾薑　細辛各三分

右二十四味治下篩酒服二方寸匕日三一方無紫石茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十五丸

小鎭心散

治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕然驚

人參　遠志　白朮　附子　乾地黃　桂心
黃芪　細辛　乾薑　赤小豆　龍齒　防風
菖蒲各二兩　茯苓四兩

右十四味治下篩酒服二方寸匕日三

又方

治男子五勞七傷八風十二痹無有冬夏悲憂憔悴凡是病皆須服之

厚朴　五味子　女萎　細辛　牡荊子　芍藥
巴戟天　石斛　白蘞　桂心　茯苓　石龍芮
山茱萸　乾漆　礬石　龍膽　芎藭　蓯蓉
蜀椒　白朮　菊花　續斷　遠志　人參
黃芪　澤瀉　萆薢　黃芩各三兩　乾薑
附子　防風　菖蒲　牛膝各二兩半　薯蕷
秦艽各二兩　桔梗一兩半　羊腎一具陰乾

右三十七味治下篩酒服方寸匕日三忌房室

石葦圓

黃帝問五勞於高陽負高陽負曰一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽負曰石韋丸主之

石韋　細辛　礬石　遠志　茯苓　澤瀉

菖蒲　杜仲　蛇牀子　肉蓯蓉　桔梗　天雄

牛膝　山茱萸　柏子仁　續斷　薯蕷各二兩

防風　赤石脂各三兩

右十九味爲末取棗膏加蜜和丸如梧子大酒服三十丸日三七日愈二十日百病除長服良

內補散

治男子五勞六絕其心傷者令人善驚妄怒無常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥面目痿黃六絕令人心下憒憒不欲語惛閙人聲

乾地黃　菟絲子　山茱萸　地麥各五兩

遠志　巴戟天各半兩　麥門冬　五味子

甘草　人參　蓯蓉　石斛　桂心　茯苓

附子各一兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三匕

鎭心丸

治男子婦人虛損夢寐驚悸或失精神婦人赤白注漏或月水不利風邪鬼疰寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸病

乾地黃十二分　紫石英　茯苓　菖蒲　蓯蓉

麥門冬　遠志　大黃　當歸　細辛　大豆卷

卷柏　乾薑各五分　防風　人參　澤瀉

秦艽　丹參各六分　䗪蟲十一枚　石膏

芍藥　柏子仁各三分　烏頭　桂心　桔梗

甘草　薯蕷各十分　白蘞　鐵精　銀屑

前胡　牛黃各二分　白朮　半夏各四分

大棗五十枚

右三十五味爲末蜜棗和搗五千杵丸如梧子大酒服五丸日三加至二十丸一本無大豆卷大棗

大鎭心丸

所治與前方大同凡是心病悉皆主之

乾地黃八兩　牛黃五分（一用牛膝）　羌活　桂心

秦艽　芎藭　人參　遠志　麥門冬　丹砂

阿膠　甘草　大黃　紫石英　銀屑　白蘞
當歸　乾薑　防風各八兩　桑螵蛸十一枚
杏仁　蜀椒各三分　大棗四十枚　澤瀉
黃芪　大豆卷　茯苓　薯蕷　茯神　前胡
柏子仁　鐵精各五分

右三十二味爲末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸

加味七氣湯

治喜怒憂思悲恐驚七氣爲病發則心腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕氣作痛亦宜服之

半夏湯泡七次三兩　人參　甘草炙各半兩
桂心　延胡索炒去皮各一兩　乳香三錢

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至七分去滓食前溫服婦人血痛加當歸煎

除濕補氣湯

一名清神補氣湯治兩腿痲木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出寸脈洪大

蒼朮四錢　酒黃蘗　柴胡　黃芪各三錢
酒知母　藁本　生甘草　當歸各二錢　五味
陳皮各一錢五分　升麻六錢

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去柤空心服之待少時以早飯下之

甘麥大棗湯

治婦人臟燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右三味水六升煮三升溫分三服亦補脾氣

預知子丸（局方）

治心氣不足精神恍惚語言錯妄忪悸煩鬱憂愁慘慼喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤卽驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此

預知子去皮　白茯苓　枸杞子　山藥　茯神
柏子仁　人參　地骨皮　遠志　石菖蒲
黃精蒸熟　朱砂水飛等分

共爲末煉蜜丸芡子大每嚼一丸人參湯下

香附甘草散（丹溪）

治怒氣

香附米六兩　甘草一兩

右爲細末每服二錢白湯調下立消

人參散

治膽虛常多畏恐不能獨臥如人捕之狀頭目不利

人參　枳殼　五味子　桂心　乾菊花　茯神

山茰　枸杞各七錢半　柏子仁　熟地各一兩

右爲細末每服二錢溫酒調下

茯神散

治膽虛冷目眩頭痛心神恐畏不能獨處胷中滿悶

茯苓一兩　遠志　防風　細辛　白朮　前胡

人參　桂心　熟地　菊花各七錢半　枳殼半兩

右爲末每服三錢水一盞薑三片煎至六分溫服

補膽防風湯

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見與人鬬訟恐懼面色變者

防風一錢　人參七分　細辛　芎藭　甘草
茯苓　獨活　前胡各八分
右爲粗末每服四大錢水一盞半棗子二枚煎至八分食前服

單方

憂鬱不伸胷膈不寬貝母去心薑汁炒研薑汁麪糊丸每服七十丸征士鎖甲煎湯下（集效方）

病笑不休滄鹽煆赤研入河水煎沸啜之探吐熱痰數升卽愈（子和）

番紅花主治心憂鬱積氣悶不散活血久服令人心喜又治驚悸（時珍）

治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄鷄一頭治如食法眞珠薤白各四兩水三升

煑二升盡食之飲汁令盡（附後方）

驢肉主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煑食或以汁作粥食（孟詵）

鍼灸

素問曰肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽

腎虛則胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陰太陽血者

陽明令人腰痛不可以顧顧如有見者善悲刺陽明於胻前三痏上下和之出血秋無見血

解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已

飛揚之脉令人腰痛痛上怫怫然甚則悲以恐刺飛揚之脉在內踝上五寸少陰之前與陰維之會

人有所墮墜惡血留內腹中脹滿不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝之下然谷之前血脉出血刺足跗上動脉不已刺三毛上各一痏見血立已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方

邪客於足太陰之絡令人嗌痛不可內食無故善怒氣上走賁上刺足下中央之脉各三痏凡六刺立已左刺右右刺左

靈樞經曰膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中吤吤然數唾在足少陽之本末亦視其脉之陷下者灸之其寒熱者取陽陵泉

善怒而不欲食言益小取足太陰怒而多言刺足少陽

厥陰爲闔闔折卽氣絶而喜悲悲者取之厥陰視有餘不足

邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不足而調之

其輸也

厥頭痛頭脉痛心悲喜泣視頭動脉反盛者刺盡去血後調足厥陰

黄帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脉感宗脉感則液道開液道開故泣涕出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經挾頸

甲乙經曰短氣心痹悲怒逆氣怒狂易魚際主之

心痛善悲厥逆懸心如饑之狀心憺憺而驚大陵及間使主之

心憺憺而善驚恐心悲內關主之

驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飲不欲食照海主之

千金方曰列缺主四肢厥喜笑

內庭主喜頻數欠伸惡聞人音

章門主四肢懈惰喜怒

左手關前寸口陰實者心實也若心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰

通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲恐

漏谷主腸鳴强欠心悲氣逆腹䐜滿急

天井神道心腧主悲愁恍惚悲傷不樂

間使主善悲驚狂面赤目黃瘖不能言

少衝主太息煩滿少氣悲驚

行間主心痛數驚心悲不樂

商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

太衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

支正魚際合谷少海曲池腕骨主狂言驚恐

然谷陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之狀

少府主數噫恐悸氣不足

左手關上陽絕者無膽脈也苦膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

醫案

儒門事親曰戴人之次子自出妻後體曰瘦語如瓮中出此病在中也常撚第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更服凉劑戴人曰惡雪則愈矣其妻懼太寒戴人曰吾用藥如鼓之應桴汝親也尚惡凉藥宜乎世之謗我也至七月厭冰不飲病日解矣

一人因喜樂之極而病者莊先生切其脈爲之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者悲泣辭其親友曰吾不久矣莊知其將愈慰之詰其故莊引素問曰懼

勝喜

戴人路經古亳逢一婦病喜笑不止已半年矣衆醫皆無術矣戴人曰此易治也以滄鹽成塊者二兩用火燒令通赤放冷研細以河水一大椀同煎至三五沸放溫分三次啜之以釵探於咽中吐出熱痰五升次服大劑黃連解毒湯不數日而笑定矣內經曰神有餘則笑不休此所謂神者心火是也火得風而成焰故笑之象也五行之中惟火有笑矣

一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受病脾主思故也乃與其夫議以怒而激之多取其財飲酒數日不處一法而去其人大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寐自是而進食脈得其平

洛陽孫伯英因誣獄妻子被繫逃於故人家是夜覺胃脅痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人適在焉當與公同往時戴人宿酒未醒强呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔牕望見伯英曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色膽受怖也

後會赦乃出方告戴人

霍秀才之子年十二歲睪丸一旁腫膇戴人見之曰此因驚恐得之驚之爲病上行則爲嘔血下則腎傷而爲水腫以琥珀通經散一瀉而消散

丹溪心法曰一婦十九歲氣實多怒一日忽大叫而欲厥蓋痰閉於上火起於下而上衝始用香附五錢生甘草三錢川芎七錢童便薑汁煎服又用青黛人中白香附末爲丸稍愈不除後用大吐乃安吐後用導痰湯加薑炒黃連香附生薑煎下龍薈丸而愈

一女許婚後夫經商二年不歸因不食困臥如癡無他病竟日向壁而臥其父迎丹溪翁治之告以故翁脉畢謂其父曰此思則氣結也藥難獨治得喜可解不然令其怒於是掌其面誣以外情果大怒而號泣者三時令解之即求食矣所以然者悲則氣消怒則勝思故也翁謂其父曰病雖瘥得喜方已乃諭以夫回既而果然疾亦不舉

一婦病不知稍蘇即號叫數四而復昏丹溪翁診之肝脉弦數而且滑曰此怒心所爲蓋得之怒而强酒

也詰之則不得於夫每遇夜自酌解其懷翁治以消痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈

東陽吳子方年五十形肥味厚且多憂怒脉常沉濇自春來得痰氣病醫認爲虛寒率與燥熱香竄之劑至四月間兩足弱氣上衝飲食減予曰此熱鬱而脾虛痿厥之證作矣形肥而脉沉未是死證但熱邪太盛當此火旺實難求生且與竹瀝下白术膏盡二斤氣降食進一月後大汗而死

一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒而呃作每作則舉身跳動神昏不知人問之乃知暴病視其形氣俱實遂以人參蘆煎湯飲一椀大吐頑痰數椀大汗昏睡一日而安人參入手太陰補陽中之陰者也蘆則反爾大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肝主氣經曰怒則氣逆氣因怒逆肝木乘火侮肺故呃大作而神昏參蘆喜吐痰盡氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解麻黄發汗節能止汗穀屬金糠之性熱麥屬陽麩之性凉先儒謂物物具太極學者其可不觸類而長引而伸之乎

周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦覺火光炎上食飲雖進而不知味口乾而不欲食以人參白术當歸身爲君陳皮爲佐加鹽炒黃蘗炙元參各少許煎服自愈月餘而安

醫學綱目曰鄉里有一婦人數次無故悲泣不止或謂有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金匱有一證云婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人識病制方種種絕妙如此

薛己醫按曰一婦人元氣素弱痰氣時作或咽間不利或胷痞等證余以爲鬱結傷脾用加味歸脾湯治之而愈後遇恚怒前證仍作惑於衆言以爲痰飲妄用祛痰之劑吐瀉數次變諸異證口禁不醒余以爲脾胃復傷日用六君子一劑米飲濃煎常服匙許至四日漸進粥食乃服前藥間以歸脾湯喜其善調養兩月餘諸證悉愈

一婦人因怒患痰厥而蘇左手臂不能伸手指麻木

口喎眼斜痰氣上攻兩腿骨熱或骨中酸痛服烏藥順氣散之類諸證益甚不時昏憒更加內熱晡熱余以爲肝經血虛內熱生風前藥復耗肝血虛火熾盛而益甚也先以柴胡梔子散調養肝經氣血數日後用八珍湯加鈎藤鈎散諸證稍愈又用加減八味丸料少加酒炒黃蘗知母黑色者數劑諸證頓退乃服八珍湯柴胡梔子散半載而痊後勞役卽有復作之意服柴胡梔子散隨安

醫方考曰按聞見錄云州監軍病悲思其子迎赫允治之允告其子曰法當甚悸卽愈時通守李宋卿御史嚴甚監軍內所畏也允與其子請於宋卿一造問責其過失監軍惶怖汗出疾乃愈蓋恐思則氣結驚怖則氣浮浮則氣不結矣此亦以情相勝也

趙知則太原人因喜成疾巢氏醫脈之爲之驚異出取藥竟不與之數日趙悲哭辭家人曰處世不久矣巢知其將愈使人慰之詰其故引素問恐勝喜以對可謂得元關者也

韓丞相疾天方不雨更十醫罔效左友信最後至脈

已則以指計甲子曰某日當雨竟出韓疑曰豈爲吾疾不可爲耶何言雨而不及藥我也既而其夕果雨韓喜起而行乎庭達旦疾若脫去乃名左至而問之對曰公相之疾以憂得之私計公相忠且仁方今久旱必爲民憂以旱爲憂必以雨而瘳理固宜然何待藥而愈耶此亦素問喜勝憂也

一縣差拿犯人以鐵索項所犯至縣行至中途其犯投河而死犯家告差人索騙威逼至死及能脫罪未免破財憂憤成病如醉如癡謬言妄語無復知識其主延戴念仁視之戴云此以費財而病必以得財而愈乃命作三錫錠如銀狀預置於泥溝之中候其至時詐以鎖鑰誤墮其中命探之乃出三錫錠主曰銀也吾不用此弗義之財悉以與汝其差握視不置病遂日愈此亦喜勝憂也

一女子母甚是相愛既嫁而母死遂思念不已精神短少厭厭嗜臥諸藥不應其夫延韓世良治之韓曰此病得之於思藥不易愈當以術治之乃賄一巫婦授以祕語一日夫謂妻曰汝之念母如此不識彼在

地下亦念汝否吾當他往汝盍求巫婦卜之妻欣諾遂名巫至焚香禮拜而母靈降矣一言一默宛然其母之生前也女遂大泣母叱之曰勿泣汝之生命尅我我遂早死我之死皆汝之故今在陰司欲報汝讎汝病厭厭實我所爲我生則與爾母子死則與爾寇讎矣言訖女改容大怒訴之曰我因母病母反我害我何樂而思之自是而病愈矣此亦以情療之也

譚植素謹言爲韶州佐一日會堂屬官筵中有蘿蔔頗大衆羨之譚曰尚有大如人者衆皆笑以爲無譚悔恨自咎曰人不見如是大者而吾以是語之宜其以吾言爲妄且笑也因而憂憤連日不能食其子煌讀書達事思父素不輕言因愧赧成疾必實所言始可療病遂遣人至家取蘿蔔如人大者至官所復會堂屬强父扶疾而陪酒至數巡以車載至席前衆皆驚訝其父大喜厥旦疾愈此亦素問喜勝憂也

寓意草曰吳添官生母時多暴怒以致經行復止入秋以來漸覺氣逆上厥如畏舟船之狀動輒運去久臥於牀時若天翻地覆不能强起百般醫治不效因

用人參三五分略寧片刻最後增至五錢一劑日費數金意圖旦夕苟安以視稚子究竟家產盡廢病轉凶危大熱引飲腦間有如刀劈食少瀉多已治木無他望矣聞余返婁延診過許以可救因委命以聽焉余以怒甚則血菀於上而氣不返於下者名曰厥巔疾厥者逆也巔者高也氣與血俱逆於高巔故動輒眩運也又以上盛下虛者過在少陽少陽者足少陽膽也膽之穴皆絡於腦鬱怒之火上攻於腦得補而熾其痛如劈同爲厥巔之疾也風火相煽故振搖而熱木土相凌故艱食而多瀉也於是會內經鐵落鎮墜之意以代赭石龍膽草蘆薈黃連之屬降其上逆之氣以蜀漆丹皮赤芍之屬行其上脘之血以牡蠣龍骨五味之屬斂其浮游之神最要在每劑藥中加入生猪膽汁二枚蓋以少陽熱熾膽汁必乾亟以同類之物濟之資其持危扶顛之用病者藥一入口便若神返其舍忘其苦口連進十數劑服猪膽二十餘枚熱退身凉飲食有加便瀉自止始能起牀行動數步然尚覺身輕如葉不能久支僕恐藥味太苦不宜

多服減去猪膽及蘆龍等藥加入當歸一錢人參三分薑棗爲引平調數日而全愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十二卷目錄

醫部彙考三百二十二

煩躁門

黃帝素問（至眞要大論　氣交變大論　五常政大論　五臟生成論　調經論　刺熱篇　診要經終論　玉機眞臟論）

靈樞經（經脈篇　五亂篇）

張機金匱要略（煩躁病脈證治）

王叔和脈訣（脈法）

孫思邈千金方（論證治）

嚴用和濟生方（總論）

朱肱活人書（傷寒煩躁證）

劉完素六書（躁擾　煩）

李杲十書（總論　論梔子豉湯）

朱震亨心法（論證治）

戴思恭證治要訣（總論證治）

李梴醫學入門（總論證治）

樓英醫學綱目（論虛煩）

陶華六書（論傷寒證）

王肯堂證治準繩（辨證）

喻昌醫門法律（論傷寒證）

陳士鐸石室祕錄（傷寒證治法）

方

溫膽湯　千里流水湯　酸棗湯　梔子湯

又方　茯神散　人參竹葉湯　陳皮湯

遠志湯　小草湯　地仙散　分氣飲　竹葉湯　竹皮大丸　人參當歸散　霹靂煎

小青龍加石膏湯　桂枝加黃芪湯　酸棗湯

烏梅丸　三物黃芩湯　桂枝加桂枝湯　四逆湯

人參散　白朮黃芪散　新添三黃丸　梔子厚朴湯　天水散　火鬱湯　三黃瀉心湯

人參三白湯　妙香丸　酸棗仁湯

單方
鍼灸
醫案

藝術典第三百四十二卷

醫部彙考三百二十二

煩躁門

黃帝素問

至眞要大論

少陽司天火淫所勝民病煩心胷中熱

註 煩心火熱盛也

少陰之勝心下熱善饑臍下反動嘔逆躁煩

註 外淫之火交於內也

少陽之勝熱客於胃煩心心痛

註 少陽之氣合於三焦故熱客於胃三焦與心主包絡相合故煩心心痛

少陰之復燠熱內作煩躁

註 煩躁火煩而陰躁也

少陽之復大熱將至心熱煩躁

註 心熱煩躁皆熱乘心肺也

少陰司天主勝則心熱煩躁

註 君相二火之氣勝也

諸躁狂越皆屬於火

註 火者少陽包絡之相火

氣交變大論

歲木太過風氣流行脾土受邪民病體重煩冤

註 水氣上乘於心故病煩冤

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病體重煩冤

註 水不能濟火故煩冤也

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病體重煩冤

註 腎虛脾虛肝虛皆令人體重煩冤

歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸

註　煩心悸者水上凌心也躁者火不交於陰也

歲水不及濕乃大行民病煩寃

註　寒氣上凌故病煩寃

五常政大論

太陽司天心熱煩

註　心熱煩者火炎於上也

五臟生成篇

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰

註　君火之氣外受於邪則心煩於內太陽之氣受邪則頭痛於上病在膈中是過在手太陽少陰之經矣

調經論

血并於上氣并於下心煩惋善怒血并於下氣并於上悗亂而喜忘

註　血并於上則脉氣實而心煩惋氣并於下則氣不舒而多怒血并於下則血畜於下而喜忘氣并於上則氣逆於上而爲悗亂

刺熱篇

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱

註 脾絡注心中故心煩而顏青熱邪干胃故欲嘔脾主肌肉故身熱

診要經終論

厥陰終者中熱嗌乾善溺心煩

註 心煩者包絡之氣上炎也

玉機眞臟論

夏脉不及則令人煩心上爲欬唾下爲氣泄

註 不及則反逆於內而煩心上熏肺而欬唾下走腹而氣泄矣

靈樞經

經脉篇

腎足少陰之脉是主腎所生病者煩心心痛

註 水不濟火也

心主手厥陰心包絡之脉是主脉所生病者煩心心痛掌中熱

註 煩心心痛掌中熱自內而外也

五亂篇

清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胷中是謂大悗故氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏

註　清濁相干者循脈之營衛與行陰行陽之營衛相干是以亂於胷亂於心也

漢張機金匱要略

煩躁病脈證治

上氣篇曰肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏湯主之

水氣篇曰心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫

太陽病脈浮而緊身腫而冷狀如周痹胷中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此爲黃汗然病此者渴而下利小便數者不可發汗

虛勞篇曰虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

病人如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此爲陰伏是瘀血也當下之

下利篇曰下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之

肺痿篇曰上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

腹滿篇曰病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死

黃疸篇曰陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

腹滿舌（當作身）痿黃躁不得睡屬黃家

晉王叔和脈訣

脈法

心脈歌曰溢關骨痛心煩躁更兼頭面赤騂騂

雜病生死歌曰內外俱虛身體寒汗出如珠微嘔煩忽然手足脈厥逆體不安寧必死拵

虛脈歌曰恍惚心中多悸驚三關定息脈難成血虛臟腑生煩熱補益三焦便得寧

唐孫思邈千金方

論證治

陰脈不濇身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此爲肺痿欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣脅下痛引缺盆設若有實者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之

留飲形不發作無熱脈微煩滿不能食脈沉滑者留飲病

骨實者苦煩熱

凡人病脈已解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

診得心積沉而芤時上下無常處病胷滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱甚則吐血身瘛瘲主血厥夏瘥冬劇色赤也

心病煩滿少氣大熱熱上湯心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體厥冷其脈當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此是水尅火爲大逆十死不治

傷寒病無熱但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當

逼與新汲水一升若二升強飲之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與水水停則結心下也當更以餘藥吐之

諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈爲可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉水爲佳若不吐與葛根薺苨飲服之

宋嚴用和濟生方

總論

夫虛煩者心虛煩悶是也且人之有血氣分爲榮衛別乎陰陽榮衛通適然後陰平陽祕精神迺治攝養乖方榮衛不調使陰陽二氣有偏勝之患或陰虛而陽勝或陰勝而陽虛素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽勝則外熱陰勝則內寒今虛煩之病陰虛生內

熱所致也但虛煩有數證不可不辨傷寒大病之後霍亂吐瀉之後及婦人產後皆使人心虛煩悶又有虛勞之人心火內蒸亦致心煩治療之法不可不詳審也

朱肱活人書

傷寒煩躁證

傷寒煩躁太陽與少陰經爲多陽明經或因不大便中有燥屎故煩躁耳大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽經傷風多煩而躁陽虛陰勝亦發煩躁陽氣弱爲陰所乘而躁故少陰病亦煩躁當以外證與脉別之然有汗之而煩者有下之而煩者又有病已解而反微煩者此由病新差不勝穀損穀則愈

金劉完素六書

躁擾

躁擾躁動煩熱擾亂而不寧火之體也熱甚於外則支體躁擾熱甚於內則神志躁動反復癲狂（一作顛倒）懊憹煩心不得眠也或心嘔噦而爲胃冷心煩疼者非也故煩心心痛腹空熱生而發得食熱退而減也或

逆氣動躁者俗謂咽喉由水衰火旺而猶火之動也故心胷躁動謂之怔忡俗云心忪皆爲熱也

煩

懊憹煩心反復顚倒不得眠者煩熱怫鬱於內而氣不能宣通也或胷滿結痛或頭微汗出虛煩者梔子湯主之或氣少者加甘草一錢或嘔者及初誤以丸藥下者加生薑半兩凡懊憹虛煩者皆用凉膈散甚佳及宜湯濯手足使心胷結熱宣散而已心煩腹滿坐臥不安梔子厚朴湯主之或陽明病下之後躁熱而懊憹者三一承氣湯汗後躁煩不得眠五苓散或凉膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓散黃連解毒湯煩心者凉膈散少陽證胷中煩而不嘔者小柴胡去半夏人參加苦蔞實主之

元李杲十書

總論

黃帝鍼經五亂篇云氣亂於心則煩心密默俛首靜伏云云氣在於心者取少陰心主之俞又云欬喘煩寃者是腎氣之逆也又云煩寃者取足少陰又云煩

寃者取足太陰仲景分之爲二煩也躁也蓋火入於肺則煩入於腎則躁俱在於腎者以道路通於肺母也大抵煩躁者皆心火爲病心者君火也火旺則金爍水虧惟火獨存故肺腎合而爲煩躁又脾經絡於心中心經起於脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂兀兀欲吐怔忡不安躁者無時而熱冷汗自出少時則止經云陰躁者是也仲景以梔子色赤而味苦入心而治煩鹽豉色黑而味鹹入腎而治躁名梔子豉湯乃神藥也若有宿食而煩者梔子大黃湯主之

陰躁之極欲坐井中陽已先亡醫猶不悟復指爲熱重以寒藥投之其死也何疑焉況寒涼之劑入腹周身之火得水則升走矣

火入於肺煩也火入於腎躁也煩躁俱在上者腎子通於肺母也髮潤如油喘而不休總言肺絕鼻者肺之外候肺氣通於鼻鼻中氣出粗大是肺也髮者血之餘腎氣主之髮潤如油火迫腎水至高之分是水將絕也仲景以髮潤喘大爲肺絕兼其腎而言之髮

在高巔之上雖屬腎肺爲五臟之至高故言肺絕兼腎也大抵肺腎相通肺既已絕則腎不言而知其絕矣或曰煩者心爲之煩躁者心爲之躁何煩爲肺躁爲腎也夫心者君火也與邪熱相接上下通熱金以之而爍水以之而虧獨存者火爾故肺腎與心合而爲煩躁焉此煩雖肺躁雖腎其實心火爲之也若有宿食而煩躁者梔子大黃湯主之

中熱證如修善常齋之人胃氣久虛而因勞役得之者皆與陽明中熱白虎湯證相似必肌體捫摸之壯熱必躁熱悶亂大惡熱渴而飲水以勞役過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱外得有餘之證相似若誤與白虎湯旬日必死此證脾胃大虛元氣不足口鼻中氣皆短促而上喘至日轉以後是陽明得時之際病必少減若是外中熱之病必到日晡之際大作讝語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此證尤易爲分解若有難決疑似之證必當待一二日求醫治療必不至錯誤矣

論梔子豉湯

煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁煩躁者懊憹不得眠也少氣虛滿者加甘草如若嘔噦者加生薑橘皮下後腹滿而煩者梔子厚朴枳實湯下後身熱微煩者梔子甘草乾薑湯

朱震亨心法

論證治

胷中煩熱須用梔子仁有實熱而煩躁者亦用梔子仁有虛熱而煩躁者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹白芍藥若脉實數有實熱者神芎丸

明戴思恭證治要訣

總論證治

汗下霍亂吐瀉後因滲泄而津液去多五內枯燥者皆能虛煩以陰血不足以濟陽陽氣偏勝故虛熱而煩宜參蘇飲去蘇倍參加麥門冬半錢煩而渴者獨味人參湯加以小便不利者春澤湯加以心經熱而躁者辰砂五苓散煩而嘔不喜食者橘皮湯煩而睡不寧者溫膽湯大煩身熱甚者竹葉石膏湯血虛生

煩見前諸證者茯苓補心湯外有一得病時節卽惡寒身不疼頭不痛但煩熱者亦名虛煩內外俱不可攻攻之必損竭宜參蘇飲去蘇倍參或更加石膏半錢不愈者竹葉石膏湯兼有上項證候者於前藥選用其人虛甚不宜專用涼劑者茯苓補心湯

李梴醫學入門

總論證治

虛煩者七情六慾以致腎水虛而心火煩躁或雜病後餘熱未淨而煩或勞役氣衰火旺而煩或陰虛相火動而煩有類傷寒初證外亦發熱但頭身不痛脈不緊數爲異雖陰虛亦惡寒而不甚脈亦能數而無力大概病後虛羸少氣煩躁欲嘔者竹葉石膏湯輕者小柴胡湯痰逆惡心者橘皮竹茹湯陰證內寒外熱肢節痛口不燥而虛者陰旦湯服涼藥後脈愈大而無力熱愈甚而躁渴者單人參湯或人參黃芪煎湯下五苓散勞役氣虛者補中益氣湯陰虛者四物湯加知母黃蘗脾胃弱者三白湯驚悸痰盛者溫膽湯心神不安者朱砂安神丸婦人新產挾血虛煩者

四物湯加人參淡竹葉麥門冬甘草表虛忌汗裏虛忌下但宜和平之劑調理千金云虛煩不可大攻熱去則寒起若用傷寒汗下重劑而治虛煩重則津竭而死輕則內消盜汗變爲癆瘵傷寒有未經汗吐下而煩者胷滿膈實煩熱有已經汗吐下而煩者胷滿煩躁懊憹見各條

心煩作渴欲嘔身熱睡臥不寧與發熱均屬表熱但煩熱無休歇時發熱時發時止凡煩熱未經汗吐下邪熱傳裏而作如未膈實心中欲吐不吐鬱悶之狀爲虛但當和解或微汗而已經云病人煩熱汗出則解是也若心中驟滿而煩者爲實則有吐下之異賦云微煩爲陽之相勝言當分表裏而治之也又云煩極則反發厥者乃陰所致言熱極則反與陰盛發躁一同必以四逆理中湯治之宜與動悸條參看

樓英醫學綱目

論虛煩

煩熱怔忡知熱在心肺也故用竹葉石膏辰砂鎮墜其熱使下行也煩而下利知熱在上也故用梔豉湯

吐之煩而汗出不解知表裏有邪也故用表裏飲湯脉沉口渴手心熱知熱不在表也故用妙香丸下之溫膽酸棗治不得眠也

凡心虛則煩心肝腎脾虛亦煩心經云夏脉者心也其不及者令人煩心又云肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩冤者是知煩多生於虛也

活人云虛煩似傷寒非傷寒也成無己云傷寒有虛煩有心中煩有胷中煩二說不同攷之於書成無己之言實出仲景活人無據然往往有非因傷寒而虛煩者今故兩存之

虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴淸淸不寐皆虛煩也

起臥不安睡不穩謂之煩宜梔豉湯竹葉石膏湯

陶華六書

論傷寒證

邪熱傳裏不經發汗吐下則爲煩熱與發熱似同而異經曰病人發熱汗出則解如未作膈熱但當和解微熱而已若心下滿而煩則有吐下之異宜別其證

之虛實而爲劑之輕重也先煩而悸者爲實先悸而煩者爲虛虛煩而心中欲嘔吐鬱悶之狀

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛爲異耳表既虛不可汗裏不實不可下叔和云虛煩有熱不可攻

腎傷寒表裏無熱但煩憒不欲見光明有時腹痛其脉沉細四逆湯

煩爲擾亂而躁爲憤怒躁爲先煩而漸至躁也傷寒煩躁則有陰陽虛實之別心熱則煩陽實陰虛腎熱則躁陰實陽虛煩則熱之輕躁則熱之甚也有邪在裏而煩躁者有不煩便作躁悶者此爲陽盛隔陰欲於泥水中臥飲水不得入口也

其或結胷證具而煩躁吐利四逆湯煩躁下利發熱厥逆煩躁不得眠惡寒燥攣脉不出而躁者皆爲不可治矣

陰極發躁或陰毒火邪投熱藥反劇者不可用凉藥躁甚仍與熱劑用四逆湯輩

王肯堂證治準繩

辨證

先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩不躁者多屬熱唯悸而煩者爲虛寒治獨躁不煩者多屬寒唯火邪者爲熱蓋煩者心中煩胸中煩爲內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井中爲外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒也

內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦乾黑者死

醫門法律（臣喻昌著）

論傷寒證

凡傷寒家服藥後身熱煩躁發渴冒瞀脉兩手忽伏而不見惡寒戰慄此皆陰陽氤氳正邪相爭作汗之徵也姑宜靜以待之不可因而倉皇反至錯誤

少陰病利不止厥逆無脉乾嘔煩者有白通加猪膽汁一法服湯脉暴出者死微續者生蓋少陰下利其

人腎臟虛寒邪盛也脉微者與白通湯驅寒助陽斯利止脉健矣服之利不止轉至無脉嘔煩有加此因以熱藥治寒寒甚而格藥不入徒增其逆亂之勢也加猪膽汁爲鄉導斯藥入而寒不爲拒陽可囘脉可出矣然脉必微續乃生暴出反死甚哉虛陽之易出難囘也

少陽病四逆惡寒而身踡脉不至不煩而躁者死蓋脉不至陽已先絕不煩而躁孤陰頃刻自盡矣

發汗若下之病仍不解煩躁者用茯苓四逆湯爲救法誤汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁用此湯以救之此一證表裏兩虛製方之妙又非表裏一言可盡蓋煩爲心煩躁爲腎躁故用乾薑附子入腎以解躁茯苓人參入心以解煩也

下之後復發汗脉沉微身無大熱者用乾薑附子湯爲救法蓋以其證晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱此證前一條云下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以內外俱虛故

也誤汗亡陽誤下亡陰故云內外俱虛然不出方以用附子回陽人參益陰已有成法不必贅也此復教人以深微之蘊見亡陽一證較亡陰倍多然陽用事於晝者也熱煩躁擾不得眠見於晝者若此陰用事於夜者也安靜不吐不渴見於夜者若彼豈附子人參陰陽兩平之可施乎必乾薑附子偏於辛熱適足回其陽以協於偏勝之陰也

石室祕錄 臣陳士鐸著

傷寒證治法

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死此仲景原文也夫傷寒陰證發厥灸其厥陰之經亦不得已之法原不及湯藥之神也灸厥陰不還聽其死者亦僅對貧寒之子而說以其不能備參藥也儻以參附湯救之未有不生者今傳一方名還厥湯用白朮四兩附子乾薑各三錢水煎服一劑而生凡見有厥逆等證即以此方投之無不神效如響葢白朮最利腰臍陰寒之初入原從臍始吾利其腰臍則腎宮已有生氣况佐之附子乾薑則無微不達而邪

又安留乎況白朮健脾開胃中州安奠四肢邊旁有不回陽頃刻者乎

傷寒發熱下利又加厥逆中心煩躁而不得臥者死證也身熱未退邪又在中今既發厥身雖熱而邪將散矣宜下利之自止乃不止而心中轉添煩躁不得臥此血乾而心無以養陽氣將外散也不死何待又將何法以生之亦惟有補元陽之氣而已矣方用參朮湯人參白朮各三兩炒棗仁一兩麥冬三錢水煎服此方參朮補氣氣足而血自生血生而煩躁可定況又佐之棗仁以安魂麥冬以益肺有不奏功如神者乎縱不能盡人可救亦必救十之七八矣

方

溫膽湯（千金方下同）

治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服之

半夏　竹茹　枳實各二兩　陳皮去白三兩

生薑四兩　甘草一兩

右六味㕮咀以水八升煑取二升分三服一方無

生薑有茯苓一兩

千里流水湯

治虛煩不得眠

麥門冬　半夏各三兩　茯苓四兩　棗仁二升
甘草　桂心　黃芩　遠志　萆薢　人參
生薑各二兩　秫米一斗
右十二味㕮咀以千里流水一斛煑米令盤目沸
揚萬遍澄清取一斗煑取二升半分三服

酸棗湯

治虛勞煩擾奔氣在胷中不得眠

酸棗仁五升　人參　桂心　生薑各二兩
石膏四兩　茯苓　知母各三兩　甘草一兩半
右八味㕮咀以水一斗先煑酸棗仁取七升去滓
下藥煑取三升分三服日三

梔子湯

治大下後虛煩不得眠劇者顛倒懊憹欲死

大梔子十四枚　豉七合
右二味以水四升先煑梔子取二升半內豉更煑
三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加
橘皮二兩亦可加生薑二兩

又方

治煩悶不得眠

枸杞根白皮　生地黃各五兩　麥門冬　甘草

前胡各三兩　茯苓　知母各四兩　人參二兩

粟米　豉各五合

右十味㕮咀以水八升煮取三升七合分四服

茯神散

治心實熱口乾煩渴眠臥不安

知母一兩　茯神　麥門冬各三十六銖　通草

升麻各三十銖　赤石脂四十二銖　紫菀

桂心各十八銖　大棗二十枚　竹茹雞子大一枚

右十味治下篩爲粗散以帛裹方寸匕井華水二升半煮取七合時動裹子爲一服日再

人參竹葉湯（三因方下同）

治汗下後表裏虛煩不可攻者

人參　炙甘草各二兩　製半夏二兩半　石膏

麥門冬各五兩　淡竹葉一握

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片粳米一撮煎熟去滓空心服濟生方除石膏加茯苓小麥

陳皮湯

治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

橘皮去白一兩半　人參二錢五分　甘草炙　竹茹各五錢

右剉如麻豆大每服五錢生薑三片水一盞棗一枚煎七分食後服

遠志湯

治心虛煩熱夜臥不寧及病後虛煩

遠志黑豆甘草同煎　黃芪　當歸酒洗　麥冬　棗仁炒　石斛各一錢半　人參　茯神各七分　甘草五分

水二鍾煎八分食遠服煩甚者加竹葉知母

小草湯（濟生方）

治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草　黃芪　當歸酒浸　麥門冬　酸棗仁炒　石斛　人參各一兩　甘草炙半兩

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎服不拘時

地仙散

治大病後煩熱不安一切虛煩熱

地骨皮二兩　防風一兩　甘草炙半兩

右剉散煎同上

分氣飲

治脾胃虛弱血氣不和煩熱躁擾胷膈不利或痰氣喘嗽飲食少思

陳皮　茯苓　半夏薑汁炒黃色　桔梗炒

大腹皮　紫蘇梗　枳殼麩炒　白朮土炒

山梔炒各一錢　甘草炙五分

右薑棗水煎服

竹葉湯

治傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶內熱不解

竹葉　麥門冬去心　人參　茯苓　小麥炒

半夏湯泡七次各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

竹皮大丸

治證同上

生竹茹　石膏各五錢　甘草一兩七錢半

白薇　桂枝各二錢半

右五味末之棗肉和丸如彈子大以飲服一丸日三夜二有熱者倍白薇煩喘者加柏實二錢半

人參當歸散

治證同上

生地黃　人參　當歸　肉桂　麥門冬各一兩

白芍藥二兩

右㕮咀每服四錢水一盞先以粳米一合淡竹葉十片煎去米葉入藥幷棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黃

霹靂煎

治陰盛格陽身冷脉沉煩躁不飲水

附子一枚炮

右取出用冷灰培之以半兩入眞臘茶一大錢同研勻更分二服每用水一盞煎至六分臨熱入蜜

半匙候溫冷服須煩躁止得睡汗出瘥若爲末蜜水調服名霹靂煎

小青龍加石膏湯（仲景下同）

治肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者

石膏二兩　麻黃　芍藥　桂枝　細辛　甘草

乾薑各三兩　五味子　半夏各半升

右九味以水一斗先煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升强人服一升羸者減之日三服小兒四合

枝桂加黃芪湯

治黃汗劇者不能食身體重煩躁小便不利

桂枝去皮　生薑　白芍藥各三兩　甘草

黃芪各二兩　大棗十二枚

右六味以水八升煑取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

酸棗湯

治虛煩不得眠

酸棗仁二升　知母　茯苓　芎藭各二兩

甘草一兩

右五味以水八升煑酸棗仁得六升內諸藥煑取三升分溫三服按本方深師有生薑二兩

烏梅丸

治病者靜而復時煩此屬蚘厥

烏梅三百箇　細辛　附子炮　桂枝　人參

黃蘗各六兩　乾薑十兩　黃連一斤　當歸

川椒去汗各四兩

右十味異擣篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧子大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷滑臭等食

三物黃芩湯

治煩躁

黃芩一兩　苦參二兩　乾地黃四兩

右以水八升煑取二升溫服一升多吐下蟲

桂枝湯

治傷風煩躁手足不冷者

桂枝　芍藥各三錢　甘草二兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入生薑五片棗子二枚煎至一盞去滓溫服須臾歠熱稀粥一盞以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者佳

四逆湯

治少陰病欲吐不吐心煩但欲寐小便色白者

甘草二兩炙　附子一枚生用　乾薑一兩半炮

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服强人加附子半箇乾薑加一兩半

人參散（河間下同）

治身熱黃瘦煩渴

石膏　甘草各一兩　滑石四兩　寒水石二兩
人參半兩

右爲末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金花丸一名旣濟解毒丸

白术黃芪散

治五心煩躁自汗四肢痿劣飲食減少肌瘦昏昧

白术　黃芪　當歸　黃芩去皮　芍藥各半兩

石膏　甘草各二兩　茯苓　寒水石各一兩

官桂一分　人參　川芎各二分

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

新添三黃丸

治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚者

大黃　黃芩　黃連各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二三十丸加至五十丸生薑湯下不計時候日二服妙

梔子厚朴湯

治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安者

大梔子七箇　枳實二錢　厚朴半兩

右剉如麻豆大以水一盞半煑絞汁半盞溫服

天水散

治煩熱不得眠

滑石六兩　甘草一兩

加牛黃另爲細末每用五錢冷水調服

火鬱湯

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之

升麻　葛根　柴胡　白芍藥各一兩　防風

甘草各五錢

右㕮咀每服五錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎至一盞去柤稍熱不拘時候

三黃瀉心湯（活人下同）

治傷寒陽證煩躁發熱胷中煩滿

大黃　黃連各二兩　黃芩一兩

右剉每服一兩百沸湯二大盞熱漬之停一時久絞去柤分二服

人參三白湯

治傷寒陰證煩躁

白朮　芍藥　茯苓　竹茹各一兩　人參二兩

右剉每服五錢水二盞生薑三片煎八分去柤溫服

妙香丸（綱目）

丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也故治痰水作煩神效

巴豆三百十五粒去膜炒研　辰砂飛研五兩

牛黃　龍腦　膩粉　麝香各一兩　金箔九十片

右研勻煉黃蠟六兩入好蜜三分同煉令勻爲丸每兩作三十丸如要此藥速行針刺一眼子冷水浸少時服效更速小兒丸如菉豆大

酸棗仁湯（深師）

治虛煩不眠

棗仁二升　蝭母　乾薑　茯苓　芎藭各二兩

甘草炙一兩

右以水一斗先煑棗仁減三升乃同煑取三升分服

單方

膈上煩熱多渴利九竅滑石二兩擣水三大盞煎二盞去滓入粳米煑粥食（聖惠）

陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脉危甚者船上硫黃爲末艾湯服三錢就得睡汗出愈（本事方）

胷膈煩悶白朮末水服方寸匕（千金）

五心煩熱胡黃連末米飲服一錢（易簡方）

急勞煩熱身體瘦疼用秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每服三錢白湯調下（時珍）

傷寒煩渴心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大盞煎六分分作二服（聖惠）

骨蒸煩熱青蒿一握猪膽汁一枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便一大盞煎五分空心溫服（十便良方）

熱攻心煩恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分爲二服（心鏡）

攀倒甑解利風熱煩渴狂躁搗汁服甚效（蘇頌）

陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩重附子一箇生破作四片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服暖臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎滓服屢用多效（續傳信方）

傷寒煩熱欲飲苦蔞根三兩水五升煑一升分二服先以淡竹瀝一斗水二升煑好銀二兩半冷飲汁然後服此（外臺）

心痹心煩內熱茜根煑汁服（傷寒類要）

老人煩渴寒食大麥一升水七升煎五升入赤餳二合渴即飲之

煩悶不眠大棗十四枚葱白七莖水三升煑一升頓服（千金）

除煩止渴生葡萄擣濾取汁以瓦器熬稠入熟蜜少許同收點湯飲甚良（居家必用）

時氣煩渴生藕汁一盞生蜜一合和勻細服（聖惠）

鯉肉煑食之去胷中邪熱煩悶飯後食之（嘉祐）

白鴨肉和葱豉煑汁飲之去卒然煩熱（孟詵）

鍼灸

靈樞經曰熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆筋躄目浸索筋於肝不得索之金金者肺也

喉痺舌卷口中乾煩心心痛臂內廉痛不可及頭取手小指次指爪甲下去端如韭葉

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰

千金方曰尺澤少澤主短氣脅痛心煩

通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻呻心下悸悲恐

內關主凡心中實則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息

大鍾太谿主煩心滿嘔

紫宮玉堂太谿主欬逆上氣心煩

俠白主欬乾嘔煩滿

完骨主風頭耳後痛煩心

少衝主太息煩滿少氣悲驚

腕骨主煩滿驚

醫案

儒門事親曰高爍巡檢之子八歲病熱醫者皆爲傷冷治之以熱藥攻矣欲飲水水禁而不與內水涸竭煩躁轉生前後皆閉口鼻俱乾寒熱往來欬嗽時作遍身無汗又欲灸之適遇戴人戴人責其母曰重裀厚被煖炕紅爐兒已不勝其熱矣尚可灸乎其母謝以不明戴人令先服人參柴胡飲子連進數服下爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪凉水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與牛黃

通膈丸復下十餘行約五十餘行略無所困冰雪水飲至一斛向若灸之當何如哉

丹溪心法曰一女子年二十餘歲在室素强健六月間發煩悶困憊不食發時欲入井六脉皆沉細而弱兩日後微渴衆以爲病暑治不效四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏脉時妄語予急制局方妙香丸如桐子大以井水下一丸半日許大便藥已出病無退減遂以麝香水洗藥以針穿三竅次日以凉水送下半日許大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥治之

薛氏醫案曰一儒者脾胃素虛而有痰或用導痰之法痰甚作渴頭運煩熱余謂中氣虛弱而變證用補中益氣湯而愈後勞役發熱頭運此氣虛不能上升也用前湯加蔓荆子而愈後又勞神畏見風寒四肢逆冷口沃痰涎余以爲脾氣虛寒之眞病以六君子加炮薑肉桂而愈

光祿高署丞脾胃素虛因飲食勞倦腹痛胷痞誤用

大黃等藥下之譫語煩躁頭痛喘汗吐瀉頻頻時或昏憒脉大而無倫次用六君子加炮薑四劑而安但倦怠少食口乾發熱六脉浮數欲用瀉火之藥余曰不時發熱是無火也脉浮大是血虛也脉虛浮是氣虛也因此胃虛五臟虧損虛證發見服補胃之劑諸證悉退

州同韓用之年四十有六時仲夏色慾過度煩熱作渴飲水不絕小便淋瀝大便祕結唾痰如湧面目俱赤滿舌生刺兩脣燥裂遍身發熱或時如芒刺而無定處兩足心如烙以冰折之作痛脉洪而無倫此腎陰虛陽無所附而發於外非火也蓋大熱而甚寒之不寒是無水也當峻補其陰遂以加減八味丸料一斤內肉桂一兩以水頓煎六椀冰冷與飲半晌已用大半睡覺而食溫粥一椀復睡至晚乃以前藥溫飲一椀乃睡至曉食熱粥二椀諸證悉退翌日畏寒足冷至膝諸證仍至或以爲傷寒余曰非也大寒而甚熱之不熱是無火也陽氣亦虛矣急以八味丸一劑服之稍緩四劑諸證復退大便至十三日不通以猪

膽導之諸證復作急用十全大補湯數劑方應

一男子鰥居數年素勤苦勞而吐血發熱煩躁服犀角地黃湯氣高而喘前病益盛更遺精白濁形體倦怠飲食少思脉洪大舉按有力服十全大補加麥冬五味山茱山藥而愈

寓意草曰徐國禎傷寒六七日身熱目赤索水到前復置不飲異常大躁將門牖洞啓身臥地上展轉不快更求入井一醫洶洶急以承氣與服余診其脉洪大無倫重按無力謂曰此用人參附子乾薑之證奈何認爲下證也醫曰身熱目赤有餘之邪躁急若此再以人參附子乾薑服之踰垣上屋矣余曰陽欲暴脫外顯假熱內有眞寒以薑附投之尚恐不勝回陽之任况敢以純陰之藥重劫其陽乎觀其得水不欲嚥情已大露豈水尚不欲嚥而反可嚥大黃芒硝乎天氣燠蒸必有大雨此證頃刻一身大汗不可救矣且既認大熱爲陽證則下之必成結胷更可慮也惟用薑附所謂補中有發并可以散邪退熱一舉兩得至穩至當之法何可致疑吾在此久坐如有差誤吾

任其咎於是以附子乾薑各五錢人參三錢甘草二錢煎成冷服服後寒戰戛齒有聲以重綿和頭覆之縮手不肯與診陽微之狀始著再與前藥一劑微汗熱退而安

六·六

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十三卷目錄

醫部彙考三百二十三

嗜臥門

黃帝素問（刺熱篇　厥論　診要經終論　六元正紀大論）

靈樞經（海論　大惑論）

扁鵲難經（脾病）

張機金匱要略（但欲臥）

朱肱活人書（多眠有四證）

李杲十書（熱傷氣證　脾胃虛證）

李梴醫學入門（總論證治）

陶華六書（辨證）

陳士鐸石室祕錄（論治法）

方（大建中湯　白朮飲　平胃丸　四逆湯　萎蕤湯　黃芪人參湯　交泰丸　升陽補氣湯　升陽益胃湯）

單方

鍼灸

醫案

不得臥門

黃帝素問（病能論　逆調論　厥論　診要經終論　熱論　評熱病論　水熱穴論）

靈樞經（脈論　邪客篇　大惑論）

張機金匱要略（雜病脈證治）

孫思邈千金方（論脈證）

朱肱活人書（總論證治）

劉完素六書（總論證治）

李杲十書（治法）

戴思恭證治要訣（證辨虛實）
李梴醫學入門（總論證治）
李中梓醫宗必讀（論治法）
陶華六書（傷寒證治法）
喻昌醫門法律（傷寒證治法）
張介賓景岳全書（論證　論治）
陳士鐸石室祕錄（論治法）
方（酸棗湯　苦蔞薤白半夏湯　溫膽湯　千里流水湯　酸棗湯　又方　茯神散　梔豉湯　五苓散　猪苓湯　乾薑附子湯　黃連解毒湯　梔子烏梅湯　黃連阿膠湯　涼膈散　鼈甲丸　六君子湯　麥門冬茯苓飲子　高枕無憂散　酸棗仁丸　酸棗仁湯　酸棗仁湯　加味溫膽湯　七福飲　理陰煎　六安煎　大和中飲　大補元煎　三陰煎　五福飲　壽脾煎　排氣飲　五君子煎）
單方
鍼灸
醫案

藝術典第三百四十三卷

醫部彙考三百二十三

嗜臥門

黃帝素問

刺熱篇

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死其逆則頭痛員員脉引衝頭也

註　肝主疎泄故小便赤黃肝脉環陰器抵小腹而

上故腹痛肝藏魂魂傷故多臥木火主氣故身熱此言內因之病熱爭者寒與熱爭也此言外淫之邪魂傷則狂言肝病發驚駭肝脉布脅肋故脅滿痛入臥則血歸於肝肝氣傷故不得臥氣逆者熱淫而反內逆也熱甚而上逆於頭故頭痛而員轉

厥論

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫胻內熱

註 足厥陰厥則少腹腫痛而腹脹涇溲不利陰縮而腫肝主筋膝者筋之會經脉厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝厥陰木火主氣榮俞厥逆故胻內腫熱也

診要經終論

秋刺夏分病不已令人益嗜臥

註 秋氣在皮膚氣分刺夏分之絡脉則氣不外行故令人嗜臥

六元正紀大論

陽明司天之政初之氣其病善眠

註　濕土爲病也

靈樞經

海論

髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥

註　姚氏曰精液補益腦髓而下流陰股故髓海有餘則足勁輕健而多力髓從骨空循度而上通於腦故有餘則自過其度也髓海不足則精液竭是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥

大惑論

黃帝曰人之多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝日常行於陽夜行於陰故陽氣盡則臥陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不精則欲瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解利衛氣之留於陽也久故少瞑焉

註　衛氣日行於陽夜行於陰陽氣盡而入於陰則臥陰氣盡而出於陽則寤如留於陰久則多臥留於陽久則少瞑焉

黃帝曰其非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣久畱於陰而不行故卒然多臥焉

註　非常經者非日行於陽夜行於陰之經常出入此因邪氣留於上焦則上焦閉而不通飲食於胃則中焦滿實以致衛氣久畱於下之陰而不能上行於陽故卒然多臥也

扁鵲難經

脾病

假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味其內證當齊有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠墮嗜臥四支不收有是者脾也無是者非也

漢張機金匱要略

但欲臥

孤惑篇曰病者脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初

得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眥黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之

五臟篇曰邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者爲癲陽氣衰者爲狂

宋朱肱活人書

多眠有四證

病人尺寸脉俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四支不收默默但欲眠者風溫證也風溫不可發汗宜萎蕤湯

病人脉浮頭眩強痛而惡寒者太陽證也十日已去脉浮細而嗜臥者外已解也設胷滿脅痛者與小柴胡湯脉但浮者麻黃湯主之

病人尺寸脉俱沉細但欲寐者少陰證也急作四逆湯復其陽不可緩也

若狀如傷寒四支沉重忽忽喜眠須看上下脣上脣有瘡蟲蝕五臟下脣有瘡蟲蝕下部當作狐惑治

元李杲十書

熱傷氣證

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四支沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也

脾胃虛證

脾胃虛則怠惰嗜臥四支不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益氣宜升陽益胃湯

李梴醫學入門

總論證治

傷寒邪傳陰則多眠昏昏閉目者陰主闔也默默不欲言者陰主靜也有太陽證外已解神將復者設若胃滿脅痛鼻乾得汗者小柴胡湯脉浮羌活冲和湯冬月麻黃湯有陽明熱伏於裏而嗜臥者小柴胡湯少陰脉沉細自利欲吐而渴多眠者四逆湯加人參茯苓以益陰回陽或熱病得汗後脉沉細身冷初覺

安靜漸次昏沉喜臥不省宜急與四逆湯令四肢溫不爾有睡熟而死者百合病目合則汗出風溫常不了了狐惑精神恍惚治見各條惟汗下後酣睡者爲正氣已復不必藥也

陶華六書

辨證

夫衞氣者晝行於陽夜行於陰行陽於寤行陰於寐陽氣虛陰氣盛則目瞑故多眠乃邪氣傳於陰而不在陽也昏昏閉目陰自闔也默默不言者陰主靜也經曰太陽病十日已去脉浮細嗜臥者外已解也鼻乾不得汗嗜臥者氣熱內攻不干乎表故熱氣伏於裏則喜睡也三陽合病但欲眠睡目合則汗譫語爲有熱也見盜汗其胃熱亦嗜臥也風溫狐惑亦有是證又當辨之

石室祕籙

臣陳士鐸著

論治法

傷寒少陰病脉微沉細但欲臥汗出不煩自欲嘔吐至五六日自利復煩躁不能臥寐者死證也傷寒而

脉微沉細明是陰證況欲臥而不欲動乎汗已出矣內無陽證可知心中不煩時欲嘔吐此陽邪已散而陰邪作祟急宜祛寒爲是乃失此不溫至五六日而下利是上下俱亂也此時倘不煩躁則腎中之眞陽未散今又加煩躁不得臥寐明是奔越而不可囘之兆矣非死證而何然而其先原因失治以至於不可救非本不可救而成此擾亂之證也我有奇方名轉陽援絕湯用人參白朮炒棗仁各一兩茯神五錢肉桂二錢水煎服一劑卽可安臥而囘春矣此方用人參以救絕用白朮茯神以分消水濕而止下利又用肉桂以溫中而去寒加棗仁以安心而解躁用之得宜自然奏功如響也

方

大建中湯（東垣下同）

治諸虛不足多臥少起

黃芪　附子炮去皮臍　鹿茸酒蒸　地骨皮

續斷　川芎藭　石斛　人參　當歸身酒浸

白芍藥　小甘草各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分

去滓溫服不拘時候

白朮飲

治脾勞虛寒嘔吐不食腹痛泄瀉胷滿喜噫多臥
少起情思不樂腸鳴體倦

白朮　人參　草果仁　乾薑炮　厚朴薑汁炒
肉豆蔻麪裹煨　橘皮　木香　麥蘖炒各一兩
甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚
煎至七分去滓溫服食前

平胃丸（千金方）

凡身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥
者皆針胃脘太倉服建中湯及服此方

杏仁去皮尖五十枚　丹參三兩　苦參　葶藶
元參各二兩　芎藭　桂心各一兩

右蜜丸梧子大酒服五丸日三以知爲度

四逆湯（仲景下同）

治少陰病欲吐不吐心煩但欲寐小便色白者

甘草二兩炙　附子一箇生用　乾薑一兩半炮

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至七分去
滓溫服强人加附子半箇乾薑加一兩半

萎蕤湯

治風溫病嘿嘿但欲眠

萎蕤三分　石膏一兩碎　白薇　麻黃　川芎　羌活　甘草炙　杏仁去皮尖雙仁者　葛根各半兩（生者可用二兩尤佳）　青木香一分（冬一兩始春半兩）

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎一盞日三四服

黃芪人參湯（東垣下同）

治脾胃虛弱暑傷元氣怠惰嗜臥

黃芪一錢（如自汗過多更加一錢）　升麻六分　人參　陳皮　麥冬　蒼朮（無汗更加五分）　白朮各五分　黃蘗酒洗　神麯炒各三分　當歸身酒洗　炙甘草各二分　五味子九箇

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去查稍熱服食遠或空心服之忌酒濕麪大料物冷物

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

乾薑炮三分　巴豆霜五分　人參　桂各一錢

知母四錢一半炒一半酒洗（春夏所用秋冬去之）　柴胡

川椒炒去汗并閉目去子　白朮各一錢五分

厚朴去皮剉炒各七錢（春夏酌減）　苦楝酒煮曬

白茯苓　砂仁各三錢　吳茱萸湯洗七次五錢

川烏頭炮去皮臍四錢五分　皂角水洗去皮弦

黃連（秋冬減一錢半）　紫菀各六錢

右除巴豆霜另入外同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸溫水送下量虛實加減

升陽補氣湯

治飯後要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作

厚朴薑製五分　升麻　羌活　白芍藥　獨活

防風　甘草炙　澤瀉各一錢　生地一錢五分

柴胡二錢五分

右件爲粗末每服五錢水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去柤大溫服食前

升陽益胃湯

治脾胃虛怠惰嗜臥

黃芪二兩　半夏（脈濇者用）　人參　甘草炙各一兩

獨活　防風　白芍　羌活各五錢　橘皮四錢

茯苓（小便利不渴者勿用）　柴胡　澤瀉　白朮各三錢

黃連一錢

右㕮咀每服三錢水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞去柤溫服早飯後或加至五錢不淋減澤瀉

單方

人心昏塞多忘喜臥商陸花陰乾百日搗末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事即於眠中醒悟也（蘇頌）

飽食便臥得穀勞病令人四支煩重嘿嘿欲臥食畢輒甚用大麥蘗一升椒一兩并炒乾薑三兩搗末每服方寸匕白湯下日三（肘后方）

人耽睡臥花穀葉曬研末湯服一二錢取瘥止（楊堯輔方）

馬頭骨主治喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕日三夜一作枕亦良（別錄）

膽熱多眠馬頭骨灰鐵粉各一兩硃砂半兩龍腦半分爲末蜜丸梧子大每服三十丸竹葉湯下（聖惠方）

膽風毒氣虛實不調昏沉欲睡用酸棗仁一兩生用全挺蠟茶二兩以生薑汁塗炙微焦爲散每服二錢水七分煎六分溫服（濟衆方）

鍼灸

千金方曰凡身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥者皆針胃脘太倉

醫學綱目曰困睡無名指第二節尖灸一壯屈手指取之

醫案

儒門事親曰陳州長吏一小兒病寐而不寤三日諸醫作睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎問於戴人戴人診其兩手脈皆平和曰驚風之脈當洪大而强今則平和非驚風也竊問其乳母爾三日前曾飲酒醉否蘧然笑曰夫人以煑酒見餉酒味甚美飲一器而睡夫陳酒味甘而戀膈酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛葛花縮砂仁貫衆煎汁啜之立醒

衞生寶鑑曰常德甫至元甲戌三月間感傷寒求治予診得兩手六脉沉數外證却身凉四支厥逆發斑微紫見於皮膚脣及齒齦破裂無色咽乾聲嗄默默欲眠目不能閉精神鬱冒反側不安此證乃熱深厥亦深變成狐惑其證甚急詢之從者乃曰自感冒頭痛身體拘急發熱惡寒醫以百解散發之汗出浹背殊不解延他醫皆發汗遂至如此予詳其平昔膏粱積熱於內已燥津液又發汗過多津液重竭因轉屬陽明故大便難急以大承氣下之得更衣再用黃連解毒湯病減大半復與黃連犀角湯數日而安

省椽曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脈得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱腋下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫留白虎加人參湯一服可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若執此一句亦未然今此證不可用白虎者有三傷寒論云立夏已前處暑已後不可妄用一也太陽證無汗而渴者不可用二也況病人陰證悉具其時春氣尚寒不可用三也仲景云下利清穀急當救裏宜四

逆湯遂以四逆湯三兩加人參一兩生薑十餘片連鬚葱白九莖水五大盞同煎至三盞去柤分三服一日服之至夜利止手足溫翌日大汗而解繼以理中湯數服而愈

不得臥門

黃帝素問

病能論

帝曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰臟有所傷及精有所之寄則安故人不能懸其病也

註　胃腑所生之精能分寄於五臟則安逆畱於胃即爲臥不安有所畱阻則爲癰逆故人不能少空懸其病也

帝曰人之不得偃臥者何也岐伯曰肺者臟之蓋也

肺氣盛則脈大脈大則不得偃臥論在奇恆陰陽之中

註　肺朝百脈而輸精於臟腑肺氣逆則氣盛而脈大脈大則不得偃臥矣

逆調論

逆氣不得臥而息有音者是陽明之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也

註　陽明胃脈爲五臟六腑之海其所出血氣從大絡而上注於肺從胃脈而下注足少陰如陽明逆則不得從其道是以不得臥而息有音也陽明之津液隨氣而下注於腎如陽明逆不得從其道而腎之水氣反上客於陽明是以胃不和而臥不安也

夫不得臥臥則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也

註　陽明逆不得從其道而下入於腎則腎之水氣

反循津液之道路而上乘於胃是以胃不和而臥不安也故曰腎者水臟主藏津液又主臥與喘也

厥論

太陰之厥則腹滿䐜脹後不利不欲食食則嘔不得臥

註 足太陰厥則腹滿䐜脹後便不利脾不轉運則胃亦不和是以食則嘔而不得臥也

陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註 癲狂走呼妄言妄見陽明之脈病也經氣厥逆故腹滿胃不和故不得臥也

診要經終論

冬刺春分病不已令人欲臥不能眠眠而有見

註 春令所以洩冬藏之氣也人臥則氣歸於陰而反洩之故令人欲臥不得眠氣行於陽則目張行於陰則目瞑眠有所見者目不瞑也

熱論

傷寒二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故

身熱目痛而鼻乾不得臥也

註　身熱者病陽明之氣也病雖在氣而陽明之脈俠鼻絡目而屬胃故有目痛鼻乾之形證胃不和故不得臥也

評熱病論

諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也

註　水邪乘胃故不得臥陽氣入陰陰陽相薄故驚恐也金畏火熱故欬甚也

水熱穴論

腎俞五十七穴積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞故水病下爲胕腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得臥分爲相輸俱受者水氣之所留也

註　五行乃水陰之所注故皆爲腎俞是以病水則下爲胕腫大腹上則爲喘呼不得臥者此標本俱病蓋腎爲本肺爲標在肺則爲喘呼在腎則爲水腫肺爲氣逆故不得臥也

靈樞經

脹論

脾脹者善噦四支煩悗體重不能勝衣臥不安

註 吳氏曰此衛氣逆於城郭之中而爲腑脹也

邪客篇

黃帝問於伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不明不臥出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胷中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉榮氣者泌其津液注之於脉化以爲血以榮四支內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慓疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不瞑

註 衛氣者慓悍滑疾獨行於脉外晝行於陽夜行於陰以司晝夜之開闔行於陽則目張而起行於陰則目瞑而臥如厥逆之氣客於五臟六腑則衛氣獨衛於外行於陽不得入於陰故目不瞑

黃帝曰善治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煑之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭爲一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知爲度故其病新發者覆杯則臥汗出則已久者三飲而已也

註　衞氣之行於陰從手足陽明下行至足而交於足少陰從足少陰而注於五臟六腑故當調此二經之氣焉補不足者補衞氣之不足瀉有餘者瀉厥氣之有餘調虛實者調外內之虛實以通其道路而去厥逆之邪覆杯則臥汗出而已者正氣和而厥氣散衞氣得從其道而出入矣

大惑論

黃帝曰病而不得臥者何氣使然岐伯曰衞氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣

註衛氣出於陽則目張而寤入於陰則目瞑而臥故衛氣畱於陽則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑

漢張機金匱要略

雜病脈證治

虛勞篇曰虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

胷痹篇曰胷痹不得臥心痛徹背者苦蔞薤白半夏湯主之

水氣篇曰太陽病脈浮而緊身腫而冷狀如周痹胷中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此爲黃汗然病此者渴而下利小便數者不可發汗

心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫

黃疸篇曰腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家（舌痿疑作身痿）

驚悸篇曰衄家不可汗汗出必額上陷脈緊急直視不能眴不得眠

吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得臥者死

唐孫思邈千金方

論脈證

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴（外臺作耳虛鳴）時寒時熱脣口乾面目浮腫名曰胃虛冷也

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得臥名曰脾實熱也

右手關上脈陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃癉心煩不得臥腸鳴名之曰脾虛冷也

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹悶滿不得臥以胃氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實也

支飲亦喘而不能眠加氣短其脈平也

病有留飲者脅下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛

宋朱肱活人書

總論證治

問傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長曰此足陽明胃經受病也傷寒二日陽明經受病可

發其汗非正陽明也今言一二日傳陽明經身熱目疼鼻乾不得臥其脉俱長者是太陽陽明可表已問不欲眠曰太陽證發汗大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者當少少與之胃中和即愈若脉浮小便不利發渴者五苓散主之下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之若發汗若吐若下後虛煩不得眠劇則反覆顛倒心中懊憹者宜梔子豉湯主之傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠黃連解毒湯主之傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不得眠酸棗湯主之少陰病得之二三日已上心中煩不得眠黃連阿膠湯主之若少陰病下利而渴不得眠豬苓湯主之又問傷寒差後不得眠何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以病後仍不得睡也梔子烏梅湯主之

金劉完素六書

總論證治

懊憹煩心反覆顛倒不得眠者煩熱怫鬱於內而氣不能宣通也或胷滿結痛或煩微汗出虛煩者梔子

湯主之或氣少者加甘草一錢或嘔者及初誤以丸藥下者加生薑半兩凡懊憹虛煩者皆用凉膈散甚佳及宜湯濯手足使心胷結熱宣散而已心煩腹滿坐臥不安梔子厚朴湯主之或陽明病下之後燥熱而懊憹者三一承氣湯汗後煩躁不得眠五苓散或凉膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓湯黃連解毒湯煩心者凉膈散少陽證胷中煩而不嘔者小柴胡去半夏人參加苦蔞實主之

元李杲十書

治法

羌活勝濕湯加柴胡治臥而多驚邪在少陽厥陰中也

諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也

內經半夏湯治不得臥乃去飲之劑也

明戴思恭證治要訣

證辨虛實

不寐有二種有病後虛弱及年高人陽衰不寐有痰在膽經神不歸舍亦令不寐虛者六君子湯加炒酸

棗仁炙黃芪各半錢痰者宜溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁各半錢下靑靈丹

自驚悸怔忡癲狂諸證亦可用溫膽湯加或同金銀煎竹茹則隨其寒熱虛實而去取之導痰湯加石菖蒲半錢尤妙

大抵驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆是膽涎沃心以致心氣不足若用凉心之劑太過則心火愈微痰涎愈盛病愈不減惟當以理痰氣爲第一義

李梴醫學入門

總論證治

或終夜煩擾或晝夜惺惺不眠未經汗下而不眠屬陽明初證者葛根解肌湯在裏屬心神不淸者大承氣湯已經汗下不眠津液乾熱盛陰虛胃不和也太陽發汗過多躁不得眠欲飲水者卽愈若脈浮而渴小便難者五苓散汗吐下後懊憹不眠者梔豉湯晝夜不眠者酸棗仁湯錯語乾嘔不眠者解毒湯譫語小便淋澀煩躁少睡者白虎加山梔挾瘀血者犀角地黃湯少陰下利而渴或因下後不得眠者猪苓湯

少陰二三日心煩不眠者黃連鷄子湯下後陽虛脈沉無表證夜靜晝煩不得眠者宜古薑附湯或四逆湯加茯苓汗多者小建中湯傷寒瘥後不眠者陰氣未復也梔子烏梅湯或溫膽湯加竹茹虛者十味溫膽湯精神恍惚者朱雀丸古法不眠者單熟酸棗散多眠者生酸棗散亦好

李中梓醫宗必讀

論治法

按內經及前哲諸論詳考之而知不寐之故有五一曰氣虛六君子湯加酸棗仁黃芪一曰陰虛血少心煩酸棗仁一兩生地黃五錢米二合煮粥食一曰痰滯溫膽湯加南星酸棗仁雄黃末一曰水停輕者六君子湯加菖蒲遠志蒼朮重者控涎丹一曰胃不和橘紅甘草石斛茯苓半夏神麯山楂之類大端雖五虛實寒熱互有不齊神而明之存乎其人耳

陶華六書

傷寒證治法

陽盛陰虛則晝夜不得眠蓋夜以陰爲主陰氣盛則

目閉而臥安若陰爲陽所勝故終夜煩擾而不得眠也所謂陰虛則夜爭者是也汗出鼻乾不得臥則邪在表也若胃有燥屎與大熱譫語反大汗胃中汁乾而不得臥則爲邪在裏也胃不和則臥不得安故宜散熱和胃若汗吐下後虛煩不得眠又用梔子豉湯以湧之至於少陰病熱煩於內而不得眠又宜扶陰散熱若瘥後不得眠者則熱氣與諸陽相併陰氣未復也有汗下太過陽氣暴虛而不得眠者若無熱證又宜陽附湯以退陰復陽也此又不可不知也

醫門法律

臣喻昌著

傷寒證治法

少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死夫傷寒忌見陰脈故仲景謂少陰病脈沉者急溫之今脈之微沉細俱見外證嗜臥汗出不煩陽不爲用矣自欲吐陰邪上干矣更加自利則臟氣必至盡絕矣況始先不煩今更煩躁始先欲寐今更不得臥寐所存一綫之陽擾亂若此可復收乎

下之後復發汗脈沉微身無大熱者用乾薑附子湯爲救法其證晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱此證前一條云下之後復發汗必振寒脈細微所以然者以內外俱虛故也誤汗亡陽誤下亡陰故云內外俱虛然不出方以用附子回陽人參益陰已有成法不必贅也此復教人以精微之蘊見亡陽一證較亡陰倍多然則陽用事於晝者也熱煩躁擾不得眠見於晝者若此陰用事於夜者也安靜不嘔不渴見於夜者若彼豈附子人參陰陽兩平之可施乎必乾薑附子偏於辛熱乃足回其陽以協於偏勝之陰也

景岳全書 臣張介賓著

論證

不寐證雖病有不一然惟知邪正二字則盡之矣蓋寐本乎陰神其主也神安則寐神不安則不寐其所以不安者一由邪氣之擾一由營氣之不足耳有邪者多實證無邪者皆虛證凡如傷寒傷風瘧疾之不寐者此皆外邪深入之擾也如痰如火如寒氣水氣

如飲食忿怒之不寐者此皆內邪滯逆之擾也舍此之外則凡思慮勞倦驚恐憂疑及別無所累而常多不寐者總屬眞陰精血之不足陰陽不交而神有不安其室耳知此二者則知所以治此矣

飲濃茶則不寐心有事亦不寐者以心氣之被伐也蓋心藏神爲陽氣之宅也衛主氣司陽氣之化也凡衛氣入陰則靜靜則寐正以陽有所歸故神安而寐也而濃茶以陰寒之性大制元陽陽爲陰抑則神索不安是以不寐也又心爲事擾則神動神動則不靜

是以不寐也故欲求寐者當養陰中之陽及去靜中之動則得之矣

凡服藥卽得寐者此得效之徵也正以邪居神室臥必不寧若藥已對證則一匕入咽羣邪頓退盜賊甫去民卽得安此其治亂之機判於頃刻藥之效否卽此可知其有誤治妄投者反以從亂反以助虐必致煩惱懊憹更增不快知者見幾當以此預知之矣

論治

無邪而不寐者必營氣之不足也營主血血虛則無

以養心心虛則神不守舍故或爲驚惕或爲恐畏或若有所繫戀或無因而偏多妄思以致終夜不寐及忽寐忽醒而爲神魂不安等證皆宜以養營養氣爲主治若思慮勞倦傷心脾以致氣虛精陷而爲怔忡驚悸不寐者宜壽脾煎或歸脾湯若七情內傷血氣耗損或恐畏傷腎或驚懼傷膽神以精虧而無依不寐者宜五福飲七福飲或三陰煎五君子煎擇而用之若營衛俱傷血氣大壞神魂無主而晝夜不寐者必用大補元煎加減治之若勞倦傷心脾中氣不足清陽不升外感不解而寒熱不寐者補中益氣湯若思慮過度心虛不寐而微兼煩熱者養心湯或酸棗仁湯若焦思過度耗心血動心火而煩熱乾渴不寐者天王補心湯若心虛火盛煩亂內熱而怔忡不寐者安神丸若精血虛耗兼痰氣內畜而怔忡夜臥不安者祕傳酸棗仁湯痰盛者十味溫膽湯

凡人以勞倦思慮太過者必致血液耗亡神魂無主所以不寐卽有微痰微火皆不必顧只宜培養氣血血氣旺則諸證自退若兼顧而雜治之則十暴一寒

病必難愈漸至元神俱竭而不可救者有矣有邪而不寐者去其邪而神自安也故凡治風寒之邪必宜散如諸柴胡飲及麻黃桂枝紫蘇乾葛之類是也火熱之邪必宜涼如竹茹石膏湯及芩連梔蘗之屬是也痰飲之邪宜化痰如溫膽湯六安煎導痰湯滾痰丸之屬是也飲食之邪宜消滯如大和中飲平胃散之屬是也水濕之邪宜分利如五苓散五皮散或加金匱腎氣丸之屬是也氣逆之邪宜行氣如排氣飲四磨飲之屬是也陰寒之邪宜溫中如理陰煎理中湯之屬是也諸如此類亦略舉大概未悉其詳仍當於各門求法治之

徐東皋曰有痰火擾亂心神不寧思慮過傷火熾痰鬱而致不眠者有因腎水不足眞陰不升而心火獨亢不得眠者有脾倦火鬱不得疎散每至五更隨氣上升而發躁便不成寐者此宜用快脾解鬱清痰降火之法也

有體氣素盛偶爲痰火所致不得眠者宜先用滾痰丸次用安神丸清心涼膈之類有體素弱或因過勞

或因病後此爲不足宜用養血安神之類凡病後及婦人産後不得眠者此皆血氣虛而心脾二臟不足雖有痰火亦不宜過於攻治仍當以補養爲君或佐以清痰降火之藥其不因病後而不寐者雖以痰火處治亦必佐以養血補虛之藥方爲當也

石室祕錄

臣陳士鐸著

論治法

人病心驚不安或夜臥不睡者人以爲心之病也誰知非心病也腎病也欲安心者當治腎方用人參熟地山茱萸當歸菖蒲麥冬茯苓茯神各三兩遠志二兩生棗仁白芥子各一兩黃連肉桂砂仁各五錢右爲末蜜爲丸每日送下五錢或酒或湯俱可此方乃治不寐耳宜用參苓當歸麥冬足矣即或爲火起不寐加黃連亦足矣何以反用熟地山茱萸補腎之藥又加肉桂以助火不知不寐者乃心氣不歸於腎也今用熟地山茱萸以補腎則腎氣有根自然上通於心矣肉桂以補命門之火則腎氣既溫相火有權則心氣下行君火相得自然上下同心君臣合德矣

凡人臥不得安枕方用人參五兩遠志棗仁炒各三兩熟地八兩山茱萸四兩柏子仁一兩麥冬茯神各三兩陳皮五錢各爲末蜜爲丸每日白滾水送下一兩五日卽安一料全愈名爲寧神安臥丸

方

酸棗湯（仲景下同）

治虛煩不得眠

酸棗仁二升　知母　茯苓　芎藭各二兩

甘草一兩

右五味以水八升煑酸棗仁得六升內諸藥煑取三升分溫三服（深師有生薑麥冬）

苦蔞薤白半夏湯

治胷痹不得臥心痛徹背者

苦蔞一枚搗　薤白三兩　半夏半升　白酒一斗

右四味同煑取四升溫服一升日三服

溫膽湯（千金方下同）

治大病後虛煩不得眠此膽寒故也

半夏　竹茹　枳實炒各二兩　橘皮三兩

生薑四兩　甘草一兩

右六味㕮咀以水八升煑取二升分三服一本有

茯苓

千里流水湯

治虛煩不得眠

麥冬　半夏各三兩　茯苓四兩　酸棗仁二升

甘草　桂心　黃芩　遠志　萆薢　人參

生薑各二兩　秫米一斗

右十二味㕮咀以千里流水一斛煑米令蟹目沸

揚萬遍澄清取一斗煑取二升半分三服

酸棗湯

治虛勞煩擾奔氣在胷中不得眠

酸棗仁五升　人參　桂心　生薑各二兩

石膏四兩　茯苓　知母各三兩　甘草一兩半

右八味㕮咀以水一斗先煑酸棗仁取七升去滓下藥煑取三升分三服日三

又方

治煩悶不得眠

枸杞白皮　生地黃五兩　麥門冬　甘草

前胡各三兩　茯苓　知母各四兩　人參二兩

粟米　豉各五合

右十味㕮咀以水八升煑取三升七合分四服

茯神散

治心實熱口乾煩渴眠臥不安

知母一兩　茯神　麥門冬各三十六銖　通草

升麻各三十銖　淡竹茹鷄子大一枚　紫菀

桂心各十八銖　赤石脂四十二銖　大棗二十枚

右十味治下篩爲粗散以帛裹方寸匕井華水二升半煑取七合時動裹子爲一服日再

梔豉湯（仲景下同）

治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊憹欲死

大梔子十四枚　豉七合

右二味以水四升先煑梔子取二升半內豉更煑三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可加生薑二兩

五苓散

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈

澤瀉一兩一分　猪苓去黑皮　茯苓去皮

白朮各三分　桂枝去皮半兩不見火

右搗篩爲散拌和每服抄三錢白湯調下此藥須各自秤見分兩然後合

猪苓湯

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓　茯苓　阿膠炙過　澤瀉　滑石各一錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

乾薑附子湯

治太陽病下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而

安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者

乾薑一兩炮　附子一枚生用去皮

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服未知再服

黃連解毒湯

治時疾三日已汗解或因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得臥

黃連三分　黃蘗半兩　黃芩一兩　梔子四枚劈

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取一盞去滓服未知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者

梔子烏梅湯

治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

梔子　黃芩　甘草炙微赤各半兩　柴胡一兩

烏梅肉十四枚微炒用

右爲粗末每服四錢水一盞半生薑三片竹葉十四片豉五十粒煎至七分去滓溫服

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日已上心中煩不得眠者

梔子仁半兩　黃蘗微炙　阿膠炒令黃各一兩

黃連二兩微炒

右件藥搗爲粗末每服四錢用水一盞煎至七分去滓不拘時候溫服

凉膈散

一名連翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全煩心懊憹不得眠譫語狂妄等熱證

連翹一兩　梔子　大黃　薄荷　黃芩各半兩

甘草一兩半　朴硝一分

右爲末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓溫服虛實加減

鼈甲丸（綱目下同）

治膽虛不得眠四支無力

鼈甲　酸棗仁　羌活　牛膝　黃芪　人參

五味子各等分

右爲細末煉蜜杵爲丸如梧子大每服三四十丸

溫酒送下

六君子湯

治氣虛脈弱不得臥

人參　白朮　茯苓　橘紅　半夏　甘草各等分

水煎服

麥門冬茯苓飲子

治傷寒後心神恍惚不得臥

麥門冬　赤茯苓　知母焙　芎藭　炙甘草

酸棗仁微炒　橘紅炒　檳榔各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎溫服日三服

高枕無憂散（醫鑑下同）

治心膽虛怯晝夜不睡百方無效服此劑如神

人參五錢　石膏三錢　陳皮　白茯苓　竹茹

半夏薑汁浸炒　枳實　麥門冬　龍眼肉

甘草各一錢半　酸棗仁炒一錢

右剉水煎服

酸棗仁丸

治膽氣實熱痰迷不睡

酸棗仁炒二兩　青竹茹二錢半　柏子仁炒研

遠志　防風各三兩　生地黃酒洗　枳實各五錢

右爲末煉蜜爲丸如梧子大硃砂乳香爲衣每服
五十丸棗湯送下

酸棗仁湯（圖經下同）

治振悸不眠

酸棗仁二升　生薑六兩　茯苓　白朮　人參

甘草各二兩

右用水八升煑三升分服

酸棗仁湯

治虛煩不眠

棗仁二升　蝭母　乾薑　茯苓　芎藭各二兩

甘草炙一兩

用水一斗先煑棗仁減三升乃同煑取三升分服

加味溫膽湯

治病後虛煩不得臥及心膽虛怯觸事易驚短氣
悸乏

半夏泡七次三錢半　竹茹　枳實炒各一錢半

陳皮二錢一分　茯苓　甘草各一錢一分

棗仁炒　遠志　五味子　人參　熟地黃各一錢

右剉一劑薑棗煎服

治五臟氣血虧損不得臥

七福飲（景岳全書下同）

人參　熟地各隨宜　棗仁二錢　當歸二三錢

白朮炒一錢半　炙甘草一錢　遠志三五分製

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

理陰煎

治脾腎中虛不寐

熟地三五七錢或一二錢　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢水二鍾煎七八分熱服此方加附子卽名附子理陰煎再加人參卽名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證

六安煎

治痰滯氣逆不得臥

陳皮一錢半　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草
杏仁各一錢去皮尖切　白芥子五七分（老年氣弱者不用）
水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服

大和中飲

治飲食留滯積聚不寐

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂
麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半
水一鍾半煎七分食遠溫服

大補元煎

治氣血大壞精神失守不寐

人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢
山藥炒　杜仲各二錢　當歸　枸杞各二三錢
熟地少則二三錢多則二三兩　山茱萸一錢
水二鍾煎七分食遠溫服

三陰煎

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血怔忡不寐
等證

當歸二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢

芍藥酒炒　杏仁各二錢　人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

五福飲

治五臟氣血虧損怔忡不寐

人參　熟地各隨宜　當歸二三錢　炙草一錢

白朮炒一錢半

水二盞煎七分食遠溫服或加生薑三五片

壽脾煎

一名攝營煎治怔忡不寐神魂不寧大便脫血

白朮二三錢　當歸　山藥各二錢　棗仁錢半

炙甘草一錢　遠志製三五分　人參（急者用一兩）

乾薑炮各一二三錢　蓮肉去心炒二十粒

水二鍾煎服

排氣飲

治氣逆不寐

木香七分或一錢　厚朴一錢　藿香　陳皮

枳殼各一錢五分　澤瀉　香附　烏藥各二錢

水一鍾半煎七分熱服

五君子煎

治脾胃虛寒吐瀉不寐

人參二三錢　白朮　茯苓各二錢　炙草一錢

乾薑炒黃一二錢

水一鍾半煎服

單方

虛勞煩悶不得眠用大棗二七枚葱白七莖以水三升煑取一升去滓頓服（千金下同）

虛勞不得眠酸棗榆皮各等分爲末蜜丸如梧子大每服十五丸日再爲度

又方乾薑四兩爲末湯和頓服覆取汗病愈

骨蒸勞煩心不得眠用酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黃汁一合更煑過不計時服之（聖惠）

晝夜不眠以新布火炙熨目并蒸大豆更番囊盛枕之冷卽易終夜常枕之卽愈（肘后方）

膽虛不眠心多驚悸用酸棗一兩炒香搗爲散每服二錢竹葉湯調下和劑局方加人參一兩辰砂半兩乳香二錢半煉蜜丸服

膽虛不眠用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩爲末每服二錢溫酒服（聖惠）

鍼灸

甲乙經曰熱病汗不出鼽衄眩時仆面浮腫足脛寒不得臥振寒惡人與木音喉痹齲齒惡風鼻不利善驚厲兌主之

驚不得眠善齘水氣上下五臟游氣三陰交主之

不得臥浮郄主之

醫學綱目曰膽寒不得臥竅陰一分補之灸

醫案

儒門事親曰一婦思慮過甚二年不寐無藥可療戴人曰兩手脉緩乃脾病脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去果大怒汗出是夜困眠至八九日不寤醒而食進脉平

一婦久思不眠余假醉而不問婦果怒是夜困睡

醫學綱目曰紹興癸丑次明有董生者患神氣不寧每臥則魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通夕無寐更醫不效予爲診視詢之曰醫作何病治董

曰衆皆以爲心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉疴去體矣遂處方以贈服一月而病悉除方用眞珠母爲君龍齒佐之眞珠母入肝經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以爲鎭心藥不知龍齒安魂虎睛定魄各從其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

萬病囘春曰一小兒十五歲因用心太過少寐驚悸怔忡惡寒先用補中益氣湯茯苓酸棗遠志惡寒漸止又用加味歸脾湯驚悸少安又用養心湯而痊

薛己醫按曰一婦懷抱不舒腹脹少寐食少痰湧月經頻來余曰脾統血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血

制涎歸源用補中益氣濟生歸脾二湯而愈

景岳全書曰省中周公者年逾四旬因案牘積勞致成羸疾神困食減時多恐懼通宵不寐者凡半年餘而上焦無渴不嗜湯水或有少飲則沃而不行然每夜必去溺二三升莫知其從來且半皆如膏濁液尫羸至極自分必死診其脉猶帶緩肉亦未脫知胃氣尙存乃用歸脾湯去木香及大補元煎一以養陽一以養陰出入間用至三百餘劑計人參二十斤乃得全愈此神消於上精消於下之證也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十四卷目錄

醫部彙考三百二十四

聲音門

黃帝素問（脈要精微論　宣明五氣篇　奇病論　大奇論　腹中論　脈解篇　氣交變大論　至眞要大論）

靈樞經（邪氣臟腑病形篇　經脈篇　憂恚無言篇　九鍼論）

扁鵲難經（不治證）

孫思邈千金方（風寒客中

楊士瀛直指方（大驚不語　聲出於腎）

錢乙指迷論（腎怯與失音相似）

劉完素六書（不能言　暴瘖）

張從政儒門事親（婦人重身證）

朱震亨心法（分經辨因）

危亦林得效方（虛損證）

樓英醫學綱目（病因有二）

李梴醫學入門（證治）

徐春甫古今醫統（總論　證治　病分三因　證本六淫）

龔信古今醫鑑（中風失音）

李時珍本草綱目（雜證）

張介賓景岳全書（論證　論治）

方（二物湯　荊芥湯　木通湯　薑橘飲　玉粉丸　芎藭散　人參清肺散　杏仁煎　嚮聲破笛丸　犀角地黃湯　金花散　治匱桃仁湯　通聲膏　訶子湯　又方　發聲散　蛤蚧丸　又方　密陀僧散　遠志丸　茯神散　加味固本丸　加味上清丸　嘹亮丸　訶子散　柴胡升麻湯　潤肺丸　蜜脂煎　人參平補湯　補中益氣湯　歸脾湯　人參固本丸　平補鎮心丹　定志丸　六味地黃丸　八味丸　二陳湯　小降氣湯　七氣湯　潤下丸　十味溫膽湯　小青龍湯　參蘇飲　三拗湯　華蓋散　麥門冬湯　柴胡）

清肝散　六味竹葉石膏湯　竹衣麥門冬湯

百合丸　龍花丸　荊蘇湯　人參荊芥散

射干湯　大補元煎　左歸丸　右歸丸

五福飲　七福飲　一陰煎　二陰煎　四陰煎　補陰益氣煎　金水六君煎　六安煎

貝母丸　理陰煎　溫胃飲

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百四十四卷

醫部彙考三百二十四

聲音門

黃帝素問

脈要精微論

心脈搏堅而長當病舌卷不能言

註　搏堅而長者搏擊應手有力而長此爲太過之脈心火太過故當舌卷心主言故不能言也

宣明五氣篇

五邪所亂搏陰則爲瘖

註 足少陰繫於舌絡於橫骨終於會厭邪搏於陰則厭不能發發不能下至其開闔不致故瘖

奇病論

帝曰人有重身九月而瘖此爲何也岐伯對曰胞之絡脈絕也胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

註 十月胎出則胞絡通而音聲復矣

大奇論

脈不至若瘖不治自已

註 脈絡阻則音不出脈絡疏通其音自復故脈不至而瘖者不須治之其病自已此係經脈所阻之病與邪搏於陰而爲瘖之不同也

胃脈沉鼓濇胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯男子發左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死

註 陽明氣血皆多其脈當浮大今脈沉而鼓動帶濇是血氣虛於內矣大則爲虛是血氣虛於外矣

蓋榮衞血氣皆從內鬲而外達於形身榮衞不足則鬲氣虛是以胷脅脊背之間而成麻痹不仁矣鬲偏枯也夫榮衞氣血雖生於陽明主於心臟然始於先天之腎中少陰之脉貫腎繫舌本不瘖舌轉是先天之根氣不傷故爲可治如男子發左女子發右陰陽血氣雖順而瘖者當至三歲之久而後能復也若年不滿二十者臟腑正盛血氣方殷而反有此敗證比及三年五臟六腑之氣漸至消滅而死矣

腹中論

帝曰有病膺腫頸痛胷滿腹脹此爲何病何以得之岐伯曰名厥逆帝曰治之奈何岐伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣幷乃可治也帝曰何以然岐伯曰陽氣重上有餘於上灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂

註　諸陽之氣上升而腹氣又厥逆於上是有餘於上反灸之則陽熱之氣乃入於陰而爲瘖矣砭之則陽氣外泄而虛虛則狂矣須厥逆之氣與血相

并而後治之

脈解篇

太陽所謂入中爲瘖者陽盛已衰故爲瘖也內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也少陰不至者厥也

註 入中爲瘖者陽盛已衰入中之氣不足則陰虛而爲瘖矣陽受氣於四末陽盛已衰故四支不收而爲痱腎氣不足則爲瘖以致少陰之氣不至則手足厥冷矣

氣交變大論

歲火不及寒乃大行民病暴瘖

註 水寒乘心心主言故暴瘖也

至眞要大論

帝曰六氣之復何如岐伯曰少陰之復暴瘖

註 金主聲故暴瘖也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈濇甚爲瘖

註 心主言心氣少故爲瘖

經脈篇

手少陰之別名曰通里循經入於心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言

註 手少陰之別絡與經相干於通里之間去腕一寸半別經而上行循經入於心中繫舌本屬目系虛則不能言者蓋心主言而經別絡舌本也

足陽明之別名曰豐隆其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘖

註 陽明之別絡與經相會於豐隆之間而別走於足太陰之別絡其別行者並經脈而循於脛骨外廉上絡頭項十五大絡之氣血皆本於胃腑水穀之所生是以足陽明之絡與諸經之氣相合其病氣逆則喉痹卒瘖經別之絡於喉嗌也

憂恚無言篇

黃帝問於少師曰人之卒然憂恚而言無音者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方少師答曰咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者音聲之戶也口脣者音聲之扇也舌者音聲之機也

懸雍垂者音聲之關也頏顙者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頏顙不開分氣失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音

註 肺主聲心主言肝主語然由足少陰腎氣之所發故善治者審其有音聲而語言不清者當責之心肝能語言而無音聲者當責之脾肺不能語言而無音聲者此腎氣之逆也夫憂則傷肺肺傷則無音矣恚怒傷肝肝傷則語言不清矣此音聲之戶謂聲氣之從此而外出也口脣開闔而後語句清明故爲音聲之扇舌動而後能發言故爲音聲之機懸雍爲音聲之關頏顙者齶之上竅口鼻之氣及涕唾從此相通故爲分氣之所洩謂氣之從此而分出於口鼻者也橫骨者神氣之所遊行出入故爲神氣之所使主發舌者也人之鼻洞涕出不收者因頏顙不開分氣失也會厭者爲開爲闔

主聲氣之出入薄小則發聲疾厚大則開闔難其氣出遲故重言也寒氣者足少陰寒水之氣也蓋少陰之脉上繫於舌絡於橫骨終於會厭其正氣上行而後音聲乃發如寒氣客於厭則厭不能發謂不能開也發不能下謂不能闔也是以至其開闔不致而無音聲矣

九鍼論

邪入於陰轉則爲瘖

（註）謂邪入於腎臟之陰轉入於心臟之陽則爲瘖矣

扁鵲難經

不治證

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

唐孫思邈千金方

風寒客中

風寒之氣客於中滯而不發故瘖不能言宜服發表之藥不必治瘖

宋楊士瀛直指方

大驚不語

大驚入心則敗血頑痰塡塞心竅故瘖不能言宜密陀僧散遠志丸茯神散之類

聲出於腎

心爲聲音之主肺爲聲音之門腎爲聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣若夫腎虛爲病不能納諸氣以歸元故氣逆而上欬嗽痰壅或鳴或脹胷腹百骸俱爲之不利其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾矣

錢乙指迷論

腎怯與失音相似

病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又不進藥此非失音乃腎怯不能上接於陽故也當補腎地黃丸主之失音乃感風寒卒病耳

金劉完素六書

不能言

腎虛內奪則爲瘖痱蓋內奪而厥舌瘖不能言二足廢不爲用腎脉虛弱其氣厥不至舌不仁經云瘖痱

足不履用音聲不出者地黃飲子主之燥乾者金肺之本燥金受熱化以成燥澀也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又如大便乾澀乃大腸受熱化成燥澀經云諸澀枯涸又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液元腑閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲者是也蓋肺主聲也肢痛緛戾者風熱濕相搏遂致偏枯語音澀手足不隨然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注多成偏枯經曰諸澀枯涸乾勁皴揭屬於燥也

暴瘖

暴瘖猝瘂也金肺主聲故五行惟金響金應於乾乾爲天天爲陽爲健爲動金本燥爲涸爲收爲斂爲勁切爲剛潔故諸能鳴者無越此也凡諸發語聲者由其形氣之鼓擊也鼓擊者乃健動之用也所謂物寒則能鳴者水實制火火不尅金也其或火旺水衰熱

乘金肺而神濁氣鬱則暴瘖無聲經言內奪而厥則爲瘖痱此腎虛也

元張從政儒門事親

婦人重身

夫婦人重身九月而瘖瘂不言者是脬之絡脉不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去查放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

朱震亨心法

分經辨因

足少陰之脉挾舌本足太陰之脉連舌本手少陰之別脉繫舌本故此三脉虛則痰涎乘虛閉塞其脉道而舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌無血榮養而然治當補血又此三脉風熱中之則舌脉弛縱而然風寒客之則舌脉縮急而然隨證治之

危亦林得效方

虛損

虛損憔悴氣血不足失聲音久瘖宜天眞丸服過半

月言語自然有聲

明樓英醫學綱目

病因有二

瘖者邪入陰部也經云邪搏於陰則爲瘖又云邪入於陰搏則爲瘖然有二證一曰舌瘖乃中風舌不轉運之類但舌本不能轉運言語而喉咽音聲則如故也二曰喉瘖乃勞嗽失音之類但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也

李梴醫學入門

證治

有氣血虛損者有腎虛及老人忽言不出者宜於十全大補湯去桂加菖蒲遠志

痰塞不語宜導痰湯加菖蒲竹茹人參或芩連亡血不語宜四物湯加人參白术陳皮甘草菖蒲遠志

徐春甫古今醫統

總論證治

聲音者內關五臟其爲病也因於六氣金匱眞言論曰東方青色入通於肝其音角其聲呼南方赤色入

通於心其音徵其聲笑中央黃色入通於脾其音宮其聲歌西方白色入通於肺其音商其聲哭北方黑色入通於腎其音羽其聲呻此所以聲音通於五藏者也直指云心爲聲音之主肺爲聲音之門腎爲聲音之根此特言其所重者舌爲心之苗心病舌不能轉則不能語言暴病者尚可醫治久病者不可治也故心爲聲音之主者此也肺者屬金主淸肅外司皮腠風寒外感者熱鬱於內則肺金不淸欬嗽而聲啞故肺爲聲音之門者此也腎者人身之根本元氣發生之主也腎氣一虧則元氣寖弱而語音瘖者有之經曰言而微終日乃復言者此奪氣也錢氏方小兒吐瀉利小便過多以致脾虛不飲食用益黃散作效數日後忽爾不語錢氏知其脾氣已復腎氣尚虛投以地黃丸益腎相繼數劑遂能言於是益信聲音之根出於腎也不誣

病分三因

有內熱痰鬱窒塞肺金而聲啞及不出者及有欬嗽久遠傷氣而散者此內因也有外受風寒腠理閉塞

寒束於外鬱嗽而聲啞三拗湯之類此外因也又有怒暴吸風卒然聲不出者亦外因也有因爭競大聲號叫以致失聲或因歌唱傷氣而聲不出此不內外因也養息自愈

證本六淫

風寒燥熱致聲不清者人共知之暑濕相干者鮮有知也經曰因於濕首如裹聲如從室中言此中氣之濕也直指云風寒暑濕燥火痰氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣惟夫腎虛爲病不能納諸氣以歸元故氣奔而上欬嗽痰壅或喘或脹足冷骨痿胷腹百骸俱爲之牽掣其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也

風寒欬嗽失音者三拗湯主之熱痰壅盛聲不出者鹽湯探吐之大腑祕結上下不通聲氣不出者大柴胡湯下之此皆切於病證其效如響應也

凡病人久嗽聲啞乃是元氣不足肺氣不滋宜補氣養金潤燥其聲自亮若虛勞之人則宜滋腎水潤肺金爲本訶子百藥煎收斂以治其標標本兼治此十

全也久病人不語爲心氣絕者死

龔信古今醫鑑

中風失音

中風飲食坐臥如常但失音不語俗呼爲瘂風小續命去附子加石菖蒲一錢或訶子清音湯亦可然不語豈止一端有舌强不語有神昏不語有口噤不語有舌縱語澀有舌麻語澀其間治痰治風安神養氣血各從活法又難拘續命訶子而已也

李時珍本草綱目

雜證

音瘖有肺熱肺痿及風毒入肺蟲食肺或寒包熱狐惑或失音不語舌强不語或痰迷或腎虛瘖俳

景岳全書　臣張介賓著

論證

聲音出於臟氣凡臟實則聲弘臟虛則聲怯故凡五臟之病皆能爲瘖如以憂思積慮久而至瘖者心之病也驚恐憤鬱猝然致瘖者肝之病也或以風寒襲於皮毛火燥刑於金臟爲欬爲嗽而致瘖者肺之病

也或以饑飽或以疲勞致敗中氣而喘促爲瘖者脾之病也至於酒色過傷慾火燔爍以致陰虧而盜氣於陽精竭而移槁於肺肺燥而欬欬久而瘖者此腎水枯涸之病也是五臟皆能爲瘖者其槩如此然舌爲心之苗心病則舌不能轉此心爲聲音之主也聲由氣而發肺病則氣奪此氣爲聲音之戶也腎藏精精化氣陰虛則無氣此腎爲聲音之根也經曰言而微終日乃復言者此氣之奪也而況於無聲者乎是知聲音之病雖由五臟而實惟心之神肺之氣腎之精三者爲之主耳然人以腎爲根蔕元氣之所由生也故由精化氣由氣化神使腎氣一虧則元陽寖弱所以聲音之標在心肺而聲音之本則在腎觀之經云陽盛已衰故爲瘖也內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也然則腎爲聲音之根信非謬矣

瘖啞之病當知虛實實者其病在標因竅閉而瘖也虛者其病在本因內奪而瘖也竅閉者有風寒之閉外感證也有火邪之閉熱乘肺也有氣逆之閉肝滯强也風閉者可散而愈火閉者可清而愈氣閉者可

順而愈此皆實邪之易治者也至若痰涎之閉雖曰有虛有實然非治節不行何致痰邪若此此其虛者多而實者少當察邪正分緩急而治之可也內奪者有色慾之奪傷其腎也憂思之奪傷其心也大驚大恐之奪傷其膽也饑餒疲勞之奪傷其脾也此非各求其屬而大補元氣安望其嘶敗者復完而殘損者復振乎此皆虛邪之難治者也然難易之辨固若此而猶有難易之辨者則辨其久暫辨其病因乃可悉焉蓋暫而近者易漸而久者難脉緩而滑者易脉細而數者難素無損傷者易積有勞怯者難數劑即開者易久藥罔效者難此外復有號叫歌唱悲哭及因熱極暴飲冷水或暴吸風寒而致瘖者乃又其易者也若此者但知養息則弗藥可愈是皆所當辨者

論治

風寒襲於皮毛則熱鬱於內肺金不清而閉塞喉竅欬嗽甚而聲瘖者宜參蘇飲二陳湯小青龍湯金水六君煎三拗湯之類以散之

火邪侵肺上焦熱甚而聲瘖者宜四陰煎麥門冬湯

主之心火盛者二陰煎胃火上炎者竹葉石膏湯肝膽火盛者柴胡清肝湯之類主之勞瘵痰嗽挾火者竹葉麥門冬湯主之

肝邪暴逆氣閉爲瘖者宜小降氣湯潤下丸七氣湯之類主之

痰氣滯逆爲瘖者如二陳湯六安煎貝母丸潤下丸之類皆治標之可用者或用鹽湯探吐之亦可其有虛痰或痰火之甚者當於痰飲門參酌治之

虛損爲瘖者凡聲音之病惟此最多當辨而治之凡色慾傷陰病在腎者宜六味丸八味丸左歸丸右歸丸人參平肺湯大補元煎之類主之或兼肺火者宜一陰煎四陰煎人參固本丸之類擇而用之

凡大驚大恐猝然致瘖者肝膽受傷也宜七福飲五福飲十味溫膽湯平補鎮心丹定志丸之類主之

凡饑餒疲勞以致中氣大損而爲瘖者其病在脾宜歸脾湯理陰煎補中益氣湯補陰益氣煎溫胃飲之類主之

凡憂思過度致損心脾而爲瘖者宜七福飲歸脾湯

之類主之

凡病人久嗽聲啞者必由元氣大傷肺腎俱敗但宜補肺氣滋腎水養金潤燥其聲自出或略加訶子百藥煎之類兼收斂以治其標務宜先本後末庶可保全若見其假熱而過用寒凉或見其痰盛而妄行消耗則未有一免者矣

凡患風毒或病喉癰病既愈而聲則瘖者此其懸雍已損雖瘖無害也不必治之

方

二物湯

治風寒邪氣留滯失音

薄桂二錢　石菖蒲一錢

右咀新水煎細呷

荊芥湯

失音通用

荊芥穗　紫蘇葉　陳皮　木通　當歸　薄桂

石菖蒲各等分

每服四錢水煎服

木通湯

治諸風失音

石菖蒲　防風　羌活　直殭蠶炒　全蠍焙

桑螵蛸　木通　炙甘草各一分　南星炒五錢

右㕮咀每服三錢薑五片蘇葉五片煎服

薑橘飲

治風痰風毒纏喉不語

南星略炒半兩　生薑四兩　橘皮三錢

右㕮咀每服三錢紫蘇五葉煎服

玉粉丸（寶鑑）

治冬月寒痰結於咽喉不利語言不出鍼經云寒氣客於會厭卒如啞宜服此藥

桂心　草烏各一字　半夏泡五錢

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如鷄頭大每服一丸至夜含化多年不愈者亦效

芎莘散（得效）

治熱痰壅盛失音聲不出是燥熱所致用此卽效

川芎　細辛　防風　桔梗　白芷　桑白皮
羌活各一錢　甘草五分
右剉作一貼入薑二片薄荷三葉水煎服

人參清肺散

治痰嗽咽乾聲不出
人參　陳皮　貝母炒各一錢半　款冬花七分
半夏　桔梗　茯苓　知母　桑白皮　川黃連
枳殼　杏仁研各一錢　麥門冬　地骨皮
甘草各五分　五味子二十粒

右剉分作二貼每服薑三片水煎服

杏仁煎（直指）

治欬嗽失音聲不出
杏仁泥　砂糖屑　白蜜　生薑汁各一盞
桑白皮　木通　貝母炒各一兩五錢　紫菀
五味子各一兩　石菖蒲五錢
右六味剉以水五升煎至半升去滓入杏蜜糖薑再煎成稀膏每取一匙含化咽下或加知母款冬花尤效

響聲破笛丸（回春）

治謳歌動火失音不語者服之神效

連翹　桔梗　甘草各二兩五錢　薄荷葉四兩

砂仁　訶子煨　大黃酒蒸各一兩　川芎五錢

百藥煎二兩

右爲細末雞子清和丸彈子大臨臥噙化一丸

犀角地黃湯

治熱入血室心忪不語眩冒迷忘失音

生地黃四兩　犀角　牡丹皮　芍藥各五錢

右咀每服四錢入桃仁去皮尖七粒煎服

金花散

治失聲亦治喉痺

槐花新瓦上炒令香熟

右三更後仰臥隨意食之熱證通用聲即開

治䘌桃仁湯

治狐惑蟲食其臟上脣瘡其聲啞

桃仁去皮炒　槐子　艾葉各一兩　大棗十五枚

右水三盞煎一盞半分三次服

通聲膏

治欬嗽氣促胷中滿悶語音不出

杏仁一升去皮尖炒另研　人參　桂心　木通

五味子　款冬花　石菖蒲　竹茹　生薑汁

白蜜各二升　棗肉　細辛　酥各二兩

右咀水五升煎五七沸內酥蜜薑棗再煎令稀稠得所每服一匙溫酒一小盞化下或不用酒噙化

訶子湯（河間下同）

治失音不能言語

訶子四箇半生半炮　桔梗一兩半生半炙

甘草二寸半生半炙

右爲細末每服二錢童便一盞水一盞煎五七沸溫服甚者不過三服愈醫鑒名訶子清音湯蓋桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣童便降火甚速

又方

治前證

桔梗三兩　大訶子四箇　甘草二兩製同上

每服一錢匕入沙糖一小塊不用童便獨用水五

盞煎至三盞時時細呷一日服盡其效甚速

發聲散（海藏）

治咽喉語聲不出

苦蔞皮剉　白殭蠶去頭　甘草各等分並炒黃

右爲細末每服三錢溫酒或生薑自然汁調下用五分緜裹噙化嚥津亦得日兩三服一方有桔梗

蛤蚧丸（丹溪）

治肺間邪氣胷中積血作痛失音并作久欬失音

蛤蚧一對去嘴足水浸去膜刮了血脉用米酢炙

訶子煨　阿膠炒　生地黃　製甘草　麥門冬

北細辛各半兩

右爲末煉蜜丸如棗大每服一丸食後含化

又方（千金）

治暴嗽失音語不出

杏仁研如泥　生薑汁　沙糖　白蜜各一升

五味子　紫菀各三兩　通草　貝母各四兩

桑白皮五兩

右以水九升煑五味子紫菀通草貝母桑白皮取

三升去滓入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四升初服四合日再夜一後稍加

密陀僧散（虞世）

治驚氣入心瘖不能言

密陀僧研極細末

每用一錢茶清調下或熱酒調下有熱者麝香湯調下昔有人爲虎蛇所驚久瘖服此卽愈

遠志丸（本事）

治因驚言語顚錯

遠志薑製　南星牛膽製　白附子　白茯神

人參　酸棗仁炒各五錢　硃砂三錢水飛

麝香一錢　金箔五片

右爲末蜜丸梧子大硃砂爲衣薄荷湯下三十丸日再服

茯神散（本事）

治同上

茯神　生乾地黃　白芍藥　川芎　當歸

桔梗　白茯苓　遠志薑製

右爲末每二錢水二盞燈心一錢大棗二枚同煎至七分服之有一婦年七十四歲因戎亂爲驚疾服二方得效

加味固本丸（入門）

治男女聲音不清或失音

生地　熟地　當歸　黃蘗蜜炙　茯苓各一兩

烏梅肉十五箇　訶子　天冬鹽炒　麥冬鹽炒

知母　阿膠珠各五錢　人參三錢　人乳

牛乳　梨汁各一椀

右爲末和勻蜜丸黃豆大以訶子湯或蘿蔔湯下八十丸或百丸醫鑑名鐵笛丸

加味上清丸（回春）

清聲潤肺止欬嗽爽氣寧神

白沙糖八兩　薄荷葉四兩　柿霜四兩　硼砂

元明粉　寒水石　烏梅肉各五錢　片腦五分

右爲末甘草水熬成膏和丸芡實大每一丸噙化茶湯下

嘹亮丸（回春）

治久失音聲啞

香椿芽汁四兩如無用淡香椿芽爲末四兩代之

人乳　白蜜　梨汁各四兩

右和匀重湯煑熟不拘時服白湯送下

訶子散（丹溪）

治欬嗽聲音不出

訶子皮三錢半生半炒　桔梗五錢半生半炒

甘草二錢半生半炒　木通三錢

右剉分二劑每一劑水煎去滓入生地黃汁一小盞臨臥咽下

柴胡升麻湯（醫鑑）

治傷寒欬嗽聲嘶或咽痛

柴胡　黃芩　半夏　升麻　葛根　桑白皮

枳實　桔梗　知母　貝母　元參　甘草各七分

右剉作一貼薑三片水煎服

潤肺丸（入門）（下同）

治久嗽聲嘶語音不出

訶子皮　五倍子　五味子　片芩　甘草各等分

右爲末蜜丸櫻桃大每一丸噙化咽下

蜜脂煎

治暴失音聲嘶常服潤肺

猪脂二斤熬去查　白蜜一斤再煉少頃濾淨

右入磁器內候成膏不拘時挑服一匙

人參平補湯

治腎虛聲不出

人參　川芎　當歸　熟地黃　白芍藥　杜仲

白茯苓　菟絲子　北五味子　川巴戟　橘紅

半夏製各六分　牛膝　白朮　破故紙　益智

胡盧巴　甘草炙各三分　石菖蒲二分

右剉作一貼薑三片棗二枚水煎五更初腎氣開時不許欬唾言語默默服之回春名滋腎湯

補中益氣湯（東垣）

人參　黃芪炒　白朮炒　甘草製各一錢五分

當歸一錢　陳皮五分　升麻　柴胡各三分

右加薑棗水煎空心午前服

歸脾湯

人參　黃芪　白朮　茯苓　棗仁各二錢
遠志　當歸各一錢　木香　製甘草各五分
水二鍾加龍眼肉七枚煎七分食遠服

人參固本丸

人參二兩　天冬炒　麥冬炒　生地黃各四兩
熟地黃四兩
蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒或淡鹽湯下中寒之人不可服

平補鎮心丹

人參　龍齒各二兩五錢　白茯苓　白茯神
麥冬　五味各一兩二錢五分　山藥薑汁炒
天冬　車前子　遠志製　熟地酒蒸各一兩半
棗仁炒三錢　硃砂一兩五錢爲衣
煉蜜丸桐子大每服八九十丸早晚米飲或溫酒下

定志丸

人參　茯苓各二兩　菖蒲　遠志製各一兩
煉蜜丸桐子大硃砂爲衣每服五七十丸米飲下

六味地黃丸

熟地八兩蒸搗　山茱萸　山藥炒各四兩

牡丹皮　澤瀉　白茯苓各三兩

右爲細末和地黃膏加煉蜜爲丸桐子大每服七八十丸空心食前滚白湯或淡鹽湯任下

八味丸

卽前方六味地黃丸加肉桂製附子各一兩

二陳湯

陳皮　半夏製各三錢　茯苓二錢　製甘草一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

小降氣湯

家紫蘇　台烏藥　白芍藥　陳皮各二錢

製甘草五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

七氣湯

半夏製五兩　人參　肉桂　甘草製各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

潤下丸

橘紅一斤鹽五錢水浸同煮乾　製甘草一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服五十丸滾白湯下

十味溫膽湯

半夏湯泡　枳實麩炒各二錢　廣陳皮二錢

茯苓錢半　人參　熟地　棗仁炒　遠志製

五味各一錢　炙甘草五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

小青龍湯

半夏　五味各半斤　麻黃去節　桂枝　芍藥

甘草　乾薑　細莘各二兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升溫服一升今當隨證輕重酌宜用之

參蘇飲

人參　蘇葉　乾葛　前胡　陳皮　白茯苓

枳殼　半夏各八分　木香　桔梗　甘草各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

三拗湯

麻黃連節　杏仁連皮尖　生甘草

右㕮咀每服五錢薑三五片水煎食遠服

華蓋散

麻黃去節　蘇子　桑白皮　杏仁去皮尖炒

赤茯苓　橘紅各一錢　甘草五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分食遠服

麥門冬湯

天冬　麥冬　桑白皮各七分　五味九粒

紫菀茸　貝母各六分　桔梗　甘草各五分

淡竹葉　生地各一錢

水一鍾半棗一枚煎服

柴胡清肝散

柴胡　黃芩炒各錢半　山梔炒　川芎各一錢

人參一錢　甘草五分　連翹　桔梗各八分

水一鍾半煎服

六味竹葉石膏湯

石膏煅　淡竹葉　桔梗　薄荷葉　木通

甘草各一錢

水煎服

竹衣麥門冬湯

竹衣取金竹內衣膜鮮者一錢　竹瀝取金竹者　竹茹彈子大一丸　甘草　橘紅各五分　茯苓　桔梗各一錢　杏仁七粒去皮尖研　麥冬二錢

右咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和勻服

百合丸

百合　百藥煎　杏仁去皮尖雙仁者　薏苡仁　訶子等分

右爲末雞子清和丸彈子大臨臥噙化或用蜜丸亦妙

靛花丸

靛花　薄荷葉蘇州者

右等分爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸臨睡噙化

荊蘇湯（直指）

治感風寒卒瘂及失音通用

荊芥穗　紫蘇葉　木通　橘紅　當歸　辣桂

石菖蒲各一錢

右剉作一貼水煎服

人參荊芥散（丹溪）

治感冒風寒言語不出咽乾鼻涕

人參　荊芥穗　陳皮　桔梗　半夏　杏仁

通草　北細辛　麻黃　甘草各一錢

右剉作一貼薑五片水煎服

射干湯（仲景）

治天行暴寒熱伏於內欬嗽不得息喉瘂失聲或乾嗽無唾喉中如梗

半夏二錢　杏仁　陳皮　桂心　枳實各一錢

射干　當歸　獨活　麻黃　紫菀　甘草各五分

右剉作一貼薑五片水煎服

大補元煎

治色慾傷陰成瘖

人參少則用一二錢多則一二兩　山藥炒

杜仲各二錢　熟地少則用二三錢多則二三兩

枸杞　當歸各三錢　山茱萸　製甘草各一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸丸

治前證

熟地八兩　山藥炒　山萸肉　枸杞　菟絲製

鹿膠炒珠　龜膠炒珠各四兩　牛膝酒蒸三兩

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜丸桐子大每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

右歸丸

治前證

熟地八兩　山藥炒　枸杞微炒　鹿角膠炒珠

菟絲子製　杜仲薑汁炒各四兩　當歸身

山萸肉各三兩　製附子二兩漸加至五六兩

肉桂二兩漸加至四兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼二三丸以滾白湯送下其效尤速

五福飲

治大驚猝恐致瘖

人參　熟地並隨宜　當歸三錢　炙甘草一錢

白朮一錢五分炒

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片亦可

七福飲

治前證

人參　熟地並隨宜　當歸三錢　製甘草一錢

白朮炒一錢五分　棗仁二錢　遠志製三五分

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片亦可

一陰煎

治色慾傷陰兼火致成瘖者

熟地五錢　芍藥　生地　麥冬　丹皮各二錢

牛膝一錢五分　甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

二陰煎

治前證

生地　麥門冬各三錢　棗仁二錢　生甘草

黃連各一錢　白茯苓　元參　木通各一錢半

水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠

服

四陰煎

治前證

生地三錢　麥冬　芍藥　百合　沙參各二錢

生甘草一錢　茯苓一錢五分

水二鍾煎七分食遠服

補陰益氣煎

治中氣大虛而瘖者

人參　當歸　山藥炒各二錢　陳皮　製甘草

柴胡各一錢　熟地三錢或一兩　升麻五分（火浮去之）

水二鍾加生薑三片煎八分食遠溫服

金水六君煎

治風寒外襲欬嗽而瘖者

熟地黃五錢　陳皮一錢五分　當歸　半夏

茯苓各二錢　製甘草一錢

水二鍾生薑三片煎七八分食遠溫服

六安煎

治痰氣致瘖

陳皮一錢五分　半夏二三錢　白茯苓二錢

甘草　杏仁各一錢去皮尖　白芥子七分（老弱不用）

水一鍾半加生薑三片煎七分食遠服

貝母丸

治前證

貝母一兩

爲末用沙糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

理陰煎

治中氣大損而瘄者

熟地黃三五七錢或一二兩　製甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

水二鍾煎七八分熱服或加肉桂一二錢

溫胃飲

治前證

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

白扁豆二錢炒　乾薑炒焦一二三錢　陳皮

製甘草各一錢　當歸一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

單方

失聲不出用蘿蔔搗自然汁入薑汁少許時時飲之聲則出（本草下同）

又方密陀僧爲極細末每服一錢點茶飲之聲卽出

又方皂角一條去皮子蘿蔔三枚煎服數次聲則出

風冷寒鬱失音用桂心爲末頻放舌下漸漸嚥汁聲自出（丹溪下同）

卒啞用杏仁三分去皮煎熬別杵桂一分和搗如泥每用杏核大綿裹噙細細嚥之日三夜五

欬嗽聲嘶者此血虛受熱也用青黛蛤粉蜂蜜調服之

風冷失音以紫梗荊芥根一兩研汁入酒相和溫飲半盞服無時（聖惠）

風冷失音咽喉不利以蘘荷根二兩絞汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半鍾（聖濟總錄）

卒失音陳皮五兩水三升煑取一升去滓頓服（肘后）

熱病聲瘖黃芩麥門冬爲丸服（本草下同）

肺熱聲瘖人參訶子末同噙之

聲啞牛蒡子桔梗甘草煎服

又方青黛薄荷蜜丸含之

失聲不出馬勃馬牙硝沙糖丸服

欬嗽失音萊菔同皂莢煎服

客熱中風不語梨汁竹瀝荊瀝生地汁熬膏服

風熱失音槐花炒嚼

感寒失音訶黎勒桔梗甘草童便水煎服久欬嗽失音加木通

肺癰失音杉木灰瀝汁飲良

痰熱失音中風不語天竺黃煎汁飲

瘂病蟬蛻爲末水和服

風熱失音犀角磨水服之

肺傷失音豬脂同生薑煑蘸白芨末食

肺熱暴瘂豬油一斤煉入白蜜時服一匙

失音人乳竹瀝各二升溫服（摘元）

卒不得語人乳和酒服

中風不語舌強三年陳醬人乳汁各五合相和研以生布絞汁隨時少少與服良久當語（聖惠）

久欬失音人尿服之良（本草下同）

諸風口噤不語天南星蘇葉生薑煎服

諸風卩噤不語荆芥爲末童便酒煎服

風瘂不語黃芪防風煎湯熏之

男女中風卩噤不語紅花乳香同服

口卒噤瘂附子吹之

卒然失音黑大豆同靑竹篦子煑服

卒不得語豉汁合美酒服

咽傷聲破酒調乾薑末服

卒風不語生薑安舌下嚥津

偏風失音不語杏仁生吞良

尸咽痛痒語音不出有蟲食咽梔子蕪荑杏仁桂蜜爲丸噙

風僻失音桂安舌下嚥津

又方桂同菖蒲煎服

卒風不語楮枝葉煑酒服

失音不語東家鷄棲木燒灰水服盡一升效

驚氣入心瘖不能言密陀僧茶服一匙

尸咽語聲不出履鼻繩燒灰水服

中風失音白殭蠶酒服

中風舌瘖不語龜尿點舌下良

卒忤不語眞珠爲末鷄冠血和丸納口中

中風痰迷失音鷄屎白水煑服

中風失音百藥不效亂髮灰同桂末酒服

石菖蒲出音聲煎服或末服並佳

通草出音聲可煎服之佳

杏仁可和酪作湯益潤肺氣又欲好聲杏仁一升去

皮尖熬酥一兩蜜少許和丸梧子大米飲下十五丸或二十丸

感寒失音取桂心爲細末含之咽汁

咽喉痒痛失音不語桂心杏仁各一兩爲末蜜丸櫻桃大綿裹含化嚥汁

卒失聲聲噎不出用苦竹葉濃煎飲之

卒失聲音不出橘皮濃煑取汁頻服

中風失音不語用梨生擣取汁每服一合日再

乾柿潤聲喉可水漬常服之

胡麻油主瘖瘂能潤肺故也可和竹瀝薑汁童便等服之

童子尿主久嗽失音由其能降火故也又云人尿盆聲可溫服之

鷄子多食令人有聲以水煑兩沸合水服之

鍼灸

靈樞經曰厥胷滿面腫脣漯漯然暴難言甚則不能言取足陽明

厥氣走喉而不能言手足凊大便不利取足少陰

暴瘖氣梗取扶突與舌本出血

痱之爲病也身無痛者四肢不收智亂不堪其言微知可治甚則不能言不可治也病先起於陽後入於陰者先取其陽後取其陰浮而取之

脾足太陰之脈是動則病舌本強視盛則瀉之虛則

補之熱則疾之寒則畱之陷下則灸之

手少陰之別名曰通里去腕一寸五分別而上行入於心中繫舌本虛則不能言取之掌後一寸

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰下絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘖取之所別

黃帝問於少師曰人之卒然憂恚而言無音者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方少師答曰寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音黃帝曰刺之奈何岐伯曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭兩瀉其血脈濁氣乃辟會厭之脈上絡任脈取之天突其厭乃發也

喉痹卒瘖取豐隆

暴瘖氣喘取扶突廉泉

厭氣走喉不能言取照海

卒然無音取天突

甲乙經曰欬上氣喘暴瘖不能言及舌下挾縫青脈頸有大氣喉痹咽中乾急不得息喉中鳴翕翕寒熱項腫肩痛胷滿腹皮熱衄氣短哽心痛隱疹頭痛面

皮赤熱身肉盡不仁天突主之

瘖不能言刺腦戶

暴瘖不能言喉嗌痛刺風府

舌緩瘖不能言刺瘖門

喉痺瘖不能言天突主之

暴瘖氣哽喉痺咽痛不得息食飲不下天鼎主之

食飲善嘔不能言通谷主之

瘖不能言期門主之

暴瘖不能言支溝主之

瘖不能言合谷及湧泉陽交主之

癲疾狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出聽宮主之

衛生寶鑑曰不語飲食不收水漿漏落取足陽明頰車地倉左治右右治左

瘖不能言取手少陰陰郄或手少陽三陽絡

暴瘖不語取靈道或支溝

暴瘖不能言取手太陽天窗或足少陰通谷或手厥陰間使

資生方曰舌緩不能言取瘂門舌下腫難言取廉泉

導引

保生祕要曰失聲導引法心頭推開至臍想腎水升至肺潤之呼吸歸丹田以調其息

口不能言導引法先推開肺經運腎水洗其心肺又推其舌肋肺如華蓋覆於心頭不能言者是火旺肺燥非腎水不能潤之

醫案

丹溪心法曰一人患乾欬嗽聲瘂用白朮二錢人參橘紅各一錢半半夏麴一錢白茯苓桑白皮天門冬各七分甘草青皮各三分五味子二十粒知母地骨皮苦蔞仁桔梗各五分作一貼入薑三片煎服夏加黃芩五分仍與四物湯入童便竹瀝薑汁幷炒黃蘗二藥晝夜相間服兩月聲出而愈

俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅於上焦而瘖聲不出用香附童便浸透爲末調服而疎通上焦

以治瘖又用蛤粉青黛爲君黃蘖知母香附佐之爲丸而塡補下焦以治遺十餘日良愈

孫兆口訣云內侍曹都使新造一宅落成遷入經半月飲酒大醉臥起失音不能語孫用補心氣薯蕷丸以細辛川芎治濕十日其病漸減二十日全愈曹旣安見上問誰醫曰孫兆郎中上乃召問曰曹何疾也對曰凡新宅壁土皆濕地亦多陰人乍來陰氣未散曹心氣素虛飲酒至醉毛竅皆開陰濕之氣從而入乘心經心經旣虛而濕氣又乘之所以不能語臣先用薯蕷丸使心氣壯然後以川芎細辛去濕氣所以能語也

醫學綱目云人舌短言語不辯乃痰涎閉塞舌本之脈而然嘗治一中年男子傷寒身熱師與傷寒藥五貼日後變神昏而瘖遂作體虛有痰治之人參五錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢煎湯入竹瀝薑汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之半月舌漸能轉運言語熱除而痊蓋腎足少陰之脈挾舌本脾足太陰之脈連舌本心手少陰之別繫舌本故此三脈虛

則痰涎乘虛閉塞其脉道而舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌無血營養而瘖經云刺足少陰脉重虛出血爲舌難以言又云刺舌下中脉太過血出不止爲瘖治當以前方加補血藥也

一男子年五十餘歲嗜酒吐血桶許後不食舌不能語但渴飲水脉略數與歸芎芍地各一兩朮參各二兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便薑汁至二十餘貼能言若此三脉風熱中之則其脉弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘖風寒客之則其脉縮急故舌强

舌卷而瘖

一男子久病痰嗽忽感風寒食酒肉遂厥氣走喉病暴瘖灸豐隆二穴各三壯照海二穴各一壯其聲立出仍用黃芩降火爲君杏仁陳皮桔梗瀉厥氣爲臣訶子泄逆氣甘草和元氣爲佐服之良愈

古今圖書集成

之四十九

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八三九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十五卷目錄

醫部彙考三百二十五

呃門

黃帝素問（至真要大論）

靈樞經（邪氣臟腑病形篇　九鍼論　雜病篇）

張機金匱要略（噦病證治）

華佗中藏經（脾病）

朱肱活人書（傷寒證）

嚴用和濟生方（論證）

成無己明理論（傷寒證治）

李杲十書（辨證別名）

朱震亨心法（論證治）

李梴醫學入門（水寒相搏　吃逆辨名　證分陰陽　病別虛實　火炎陰虛　勞役傷脾　久病　傷食　痰氣　失下誤下　治法）

戴思恭證治要訣（總論證治）

陶華六書（論證辨名）

徐春甫古今醫統（證有所別　欬逆多火病要分標別本　治宜降火順氣　吐下法效速）

王肯堂證治準繩（總論）

張介賓景岳全書（論證　論治）

陳士鐸石室祕籙（論治法）

方（小承氣湯　小半夏湯　羌活附子散　橘皮湯　柿蒂湯　橘皮乾薑湯　生薑半夏湯　又方　人參白朮湯　橘皮竹茹湯　木香調氣散　人參三白湯　八味加竹茹湯　倍陳湯　增半湯　丁香柿蒂湯　三香散　麥門冬竹茹湯　丁香散　丁香湯　炙甘草湯　稀涎散　青白散　人參蘆湯　倉鹽湯　鮮陳湯　溫中散　橘參飲　黃荊散　雄黃酒　大補元煎　右歸飲　大和中飲　小和中飲　柴陳煎　安胃飲　理陰煎　溫胃

（飲　佐關煎　歸氣飲）

單方

鍼灸

醫案

噫氣門

黃帝素問（診要經終論　痹論　脈解篇　刺禁篇）

靈樞經（經脈篇　九鍼篇）

張機金匱要略（三焦竭證）

朱震亨心法（論證治）

李梴醫學入門（病屬痰火　治分虛實）

虞摶醫學正傳（總論）

戴思恭證治要訣（噫氣吞酸）

徐春甫古今醫統（脾胃不和有痰有火）

王肯堂證治準繩（總論）

方（檳榔散　又方　消食膏酒　三台圓　愛氣方　順氣木香散　異香散　透膈湯

益中丸　薑棗丸　勻氣丸　祛痰火丸　十味保和湯　枳殼散　半星丸）

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百四十五卷

醫部彙考三百二十五

呃門

黃帝素問

至眞要大論

少陰之復燠熱內作外爲浮腫噦噫

註　噦者小腸之氣不通逆氣上走心而爲噫也

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦欬噦煩心病在鬲中

註　欬噦肺氣逆也欬噦煩心者病在鬲中陽明之氣上逆也

太陽之復厥氣上行唾出清水及爲噦噫

註　唾出清水及爲噦噫從胃而上及於心也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈小甚爲善噦

註　心臟虛而火土之氣弱也

九鍼論

胃爲氣逆噦

註　有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂眞邪相攻氣并相逆復出於胃故爲噦

雜病篇

噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已

註　陽明所受穀氣欲從肺而達表肺氣逆還於胃氣並相逆復出於胃故爲噦以草刺鼻取嚏以通肺肺氣疎通則穀氣得以轉輸而呃逆止矣鼻氣

不通而無息則疾遲引之連取其噫也大驚則肝心之氣分散胃之逆氣亦可從之而外達也

漢張機金匱要略

噦病證治

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

千金翼小承氣湯治大便不通噦數譫語

噦而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈

華佗中藏經

脾病

脾脹則喜噦四肢急體重不食善噫

寒則陰中與腰脊俱疼面黑耳乾噦不能食或嘔血是也

宋朱肱活人書

傷寒證

欬逆者仲景所謂噦者是也噦胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛復發汗者其人水氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者

胃中寒故也橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散主之若服藥不差者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指爲率正以男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脉處是然亦有陽證欬逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯仲景又云傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之即愈仲景無方前部宜猪苓湯後部宜調胃承氣湯扁鵲中藏經治傷寒欬逆丁香散丁香柿蔕各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱猛吃極效

三因第十一卷又有竹茹湯等方亦丁香散方竹茹湯治陽證也

本事方第八卷治傷寒候欬逆豆蔻湯治陰證欬逆丁香茴香肉豆蔻等藥若陽證不可用

凡欬逆多有先熱而喫生冷或凉藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏鄰人之僕本發大熱以凉藥下之想太甚欬逆四五日竟至於服丁香柿蔕而後却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下後蓋有身熱不解

治傷寒欬逆後二方出撫州華蓋山周先生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋呷服一方單用香附子末一方用大蒜頭二箇煨動爆研入白薑末丸得爲度丸如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

宋嚴用和濟生方

論證

夫欬逆之病詳考諸書無該載者唯孫眞人云欬逆遍尋方論無此名稱但古人以欬逆爲噦耳多因吐利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃氣爲上熱噦至八九聲相連收氣不回者却當子細看脉與證施以治法大抵老人虛人久病人及婦人產後有此證者皆是病深之候非佳兆也

金成無己明理論

傷寒證治

傷寒噦者何以明之噦者俗謂之欬逆吃吃然有聲

者是也若䭇則但胷喉間氣噎塞不得下通然而無聲也皆胃之疾但輕重有差爾虛寒相搏反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽䭇言胃氣虛竭也傷寒大吐大下之後極虛復發汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也又胃中虛冷不能食者飲水則噦由是皆胃疾可知矣經曰趺陽脉浮則爲虛關脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實之過也大抵妄下之後胃中氣逆則成噦也經曰濕家若下之太早則噦胃中本虛攻其熱則噦而陽明病不能食攻其熱必噦諸如此者皆下之後胃虛而然也然䭇者正爲水寒相搏必用小青龍湯去麻黃加附子而可矣至於噦者則又熱氣壅鬱氣不得通而成者也輕者有和解之證重者有攻下之候經曰有潮熱時時噦與小柴胡湯卽是和解之證也噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈卽是攻下之候也傷寒至於噦則病已極矣非若渴煩等輕緩之候如太陽中風以火刧發汗陰陽俱虛竭身體枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口

乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦是言其極也又不尿腹滿加噦者不治是爲眞病其若是者雖有神術當斯脫絕之候又何以措其手足哉

元李杲十書

辨證別名

欬逆俗以吃逆與吃忒呼之然欬逆二字僅見傷寒論首辨脉平脉法中其六經病篇及汗下可否諸篇皆無所有後人因見六經病篇及汗下可否諸篇但有噦而無欬逆遂謂曰欬逆呃斯言也孫眞人倡於前朱奉議成無己和於後由是二者之名義紊矣金匱要略曰病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者生薑半夏湯主之乾嘔噦若手足厥者橘皮湯主之噦逆者橘皮竹茹湯主之觀此則仲景但指與乾嘔同類者言何嘗指與欬逆言乎欬逆言其聲之纔發而遽止雖發止相續有至數十聲者然而短促不長有若欬嗽之欬然故曰欬逆噦逆則言其似欲嘔物以出而無所出但聲之濁惡長而有力直至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚

故二者皆由氣之逆上而作故俱以逆言傷寒雖以辨脈平脈法之欬逆與欬逆上氣視爲吃忒然安知其不爲欬而氣逆之病乎故今不敢定其必爲吃忒也金匱要略曰病欬逆寸口脈微而數此爲肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之此三條者皆是欬而氣逆之病豈可以欬逆專爲吃忒哉今傷寒家本有吃忒而六經病篇及汗下可否諸篇却無者必亡逸於散落之餘耳雖吃忒爲六經病篇及汗下可否諸篇所不言決不可以噦爲吃忒之欬逆亦不可以噦爲欬而氣逆之欬逆也或曰吾子以要略所謂噦逆非吃忒病何後人治吃忒者用橘皮竹茹湯而愈乎余曰橘皮竹茹湯辛甘之劑也有散有緩有和有補其二證雖不同而爲邪正之氣怫鬱擾亂所致則一故用焉而皆愈雖然二證以一藥同治則可以一體同視則不可

朱震亨心法

論證治

吃病吃逆也氣自臍下直冲上出於口而作聲也書曰火炎上內經曰諸逆冲上皆屬於火東垣謂火與元氣不兩立又謂火元氣之賊也古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蔕竹茹陳皮等劑治之未審孰爲降火孰爲補虛人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之此土敗木賊也陰爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直冲清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此似爲危證然有實者不可不知

欬逆有痰氣虛陰火視其有餘不足治之不足者人參白朮湯下大補丸有餘並有痰者吐之人參蘆之類痰凝氣滯而吃逆用蜜水吐此乃燥痰不出痰者陳皮半夏氣虛人參白朮陰火黃連黃蘗滑石欬逆自痢者滑石甘草炒黃蘗白芍人參白朮陳皮加竹荊瀝服

欬逆爲病古謂之噦近謂之呃乃胃寒所生寒氣由逆而上此證最危亦有屬熱者已見傷寒證其有他病發呃者宜用半夏一兩生薑半兩水煎熱服或理

中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒

吐利後胃虛寒欬逆者以羌活附子湯或丁香十粒柹蔕十箇切碎水煎服吐利後胃熱欬逆者以竹皮竹茹湯

亦無別病偶然致呃此緣氣逆而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏又或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散熱服之氣逆用之最佳

明李梴醫學入門

水寒相搏

噦卽乾嘔聲更重且長耳餲乃胃間氣塞不通胃脈浮則爲餲滑則爲噦皆因胃氣本虛汗下太過或復飲冷水水寒相搏胃氣虛逆而上理中湯加肉桂丁香以散寒下氣茯苓半夏以消水而不止者橘皮乾薑湯橘皮竹茹湯間有熱邪壅鬱上下之氣不得通者俱小柴胡加生薑和之熱甚便難者小承氣下之便軟者諸瀉心湯選用溫病發渴飲冷作噦者升麻葛根湯加茅根必用半夏散結氣也用竹茹清胃解

煩也用生薑散逆氣也皆因氣逆所致故生薑爲嘔家聖藥熱者烏梅代之

吃逆辨名

舊以爲欬嗽之欬俗又以爲口吃之吃虞花溪考韻書餩與呃通乃氣逆上之名又有以呃逆爲噦者噦出聲然後吸呃逆入聲逆盡然後呼出入呼吸不同兼嘔噦者本於胃不嘔噦者本於肺穀入於胃胃氣上注於肺故寒氣與新穀氣相忤逆而復於胃故噫噫有聲所以丹溪力辨乃相火自臍下直上衝胷交於厥陰水火相搏而聲作也

證分陰陽

陽證發熱口苦胷滿脈弦數小柴胡湯加竹茹小便閉加茯苓或猪苓湯大便閉者調胃承氣湯少陰證失下腹滿便閉或純下清水餩逆者小承氣湯陽明身熱口渴胷滿煩躁脈洪數餩逆者火衝肺也甘草瀉心湯

陰證便軟胃寒或因吐下虛極惡寒脈細者橘皮乾薑湯內寒厥冷者羌活附子湯丁香柿蒂散調蘇合

香丸胃寒飲水相搏者小青龍湯去麻黃加附子手足厥冷者小橘皮湯胷滿虛煩者大橘皮湯凡飽逆藥中俱宜陳皮竹茹薑汁此證有欲作正汗陰陽升降而然者卽愈又有食積而致者小便閉澀及痰火上衝者腹滿不得小便及脈見沉微散者死其爲病大同水氣表裏俱有此證

病別虛實

不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面靑肢冷便軟有餘因外感胃燥及大怒大飽多面紅肢熱便閉有餘可治不足者危

火炎陰虛

火乃元氣之賊人之陰氣依胃氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾相火直衝淸道而上乃虛之甚也

膏粱濕熱者十味小柴胡湯吞單黃蘗丸或調益元散胃火善食者小半夏湯加山梔黃芩吐之火盛者益元散加黃連黃蘗自利更加參朮白芍陳皮

久病滯下及婦人產後從臍下逆上夜分轉甚者皆

屬陰虛四物湯加知蘗陳皮竹茹

勞役傷脾

貧苦大勞火動濁升清陷者補中益氣湯或合生脈散加黃蘗附子少許挾房勞者瓊玉膏腎氣不歸元者九味安腎丸

久病

久病極是危證脈數爲火刑金必死凡傷寒吐下及雜病久每呃逆者皆火欲上行爲胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜丁香柹蔕散羌活附子湯理中湯倍參久者三香散或木瓜根煎湯呷之中虛昏憒脈結者炙甘草湯救之

傷食

飽食塡塞胷中失升降之道二陳湯加枳殼砂仁

痰氣

痰閉於上火動於下無別證忽然發呃從胷中起者苓連二陳湯或只陳皮半夏薑煎服或人參蘆煎湯吐之停痰或因怒鬱挾熱者亦宜蓋參蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣

七情氣鬱者木香勻氣散用蘿蔔煎湯下或蘇子降氣湯

失下誤下

地道不通因而呃逆宜寒藥下之大柴胡湯陽極脉微將脫者宜凉膈散解毒湯養陰退陽不可大下汗吐下後胃熱未除小柴胡加橘皮竹茹或橘皮竹茹湯單瀉心湯

治法

平人食物太速飲水入肺喜笑太多亦屬有餘食呃笑呃以紙撚刺鼻取嚏或久閉氣可止水呃小陷胷湯小青龍湯去麻黃淸之利之而已大凡汗吐下服凉藥過多者當溫補脾胃陰火上衝者當平補挾熱者宜凉補局方率用丁附溫煖助火損不足而益有餘宜乎呃逆之必死也

戴思恭證治要訣

總論證治

傷寒欬逆仲景謂欬逆爲噦有陰陽二證陰證乃胃寒所生亦有初本是熱因大發汗後復吐下之攻熱

太過以致胃寒因寒而欬逆者橘皮乾薑湯或半夏生薑湯欬逆就桔梗枳殼湯中加半夏陳皮等分生薑十片煎亦治陰證欬逆陽證欬逆乃胃家熱小柴胡湯橘皮竹茹湯陽證欬逆而又兼腹痛者問其前後知何部不利前部猪苓湯後部調胃承氣湯亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之最佳若胃中寒甚欬逆不已或復加以嘔吐輕劑不能取效宜丁香煑散及以附子粳米湯增炒川椒丁香每服各十粒

胃實卽噫胃虛卽噦逆者胃中虛膈上熱也欬逆爲病古謂之噦近謂之呃乃胃寒所生寒氣自逆而呃上此證最危間有熱呃已見傷寒證其有他病發呃者皆屬寒宜用半夏一兩生薑兩半水一椀煎半椀熱服或用丁香十粒柿蔕十箇切碎白水盞半煎或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒

陶華六書

論證辨名

噦卽乾嘔之甚者非比乾嘔則有聲濁惡而長皆有聲而無物也蓋因胃氣本虛因汗下太過或恣飲冷水水寒相搏虛逆而成也又有熱氣擁鬱上下不得通而噦者輕則和解疎利重則溫散噦而腹滿大便不利先用半夏生薑湯次用小承氣小便不利者豬苓湯噦不止者乾薑橘皮湯溫病有熱暴飲冷水作噦茅根乾葛湯噦家若不尿而噦者則病篤矣

夫欬逆者俗謂之吃忒是也纔發聲於喉間則遽止呃呃然連續數聲然而短促不長古人謂之噦者非也噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長然皆有聲而無物病至於噦則危難治矣大抵餇者但胷間氣塞不得下通噦則惡濁之聲達於外故二者相近蓋因胃氣本虛汗下太過或復飲水水寒相搏虛逆而成經曰陽脉浮則爲氣餇又曰脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實之過也又有熱氣擁鬱上下氣不得通而噦者輕則和解之通利之甚則溫散之設若不尿腹滿

而噦者欬逆脉散而無倫者雖神醫不能措手與傷寒欬而氣逆者又不同也若將吃忒紊於噦與欬而氣逆則誤人多矣臨病之際宜明辨之欬逆大便少與大承氣湯下之蓋由熱氣衝格脾肺故耳若便軟瀉心湯胃氣虛而衝脉逆也若脉散者不治欬逆潮熱小柴胡加橘皮生薑湯

傷寒或汗下太過或恣飲冷水水寒相搏虛逆聲濁惡而長名噦此與乾嘔不相類輕則和解疎利重則溫散

徐春甫古今醫統

證有所別

欬逆乃乾欬之漸進無痰有聲連連不絕其氣自丹田而逆上出於咽喉如有所擊逆而然也亦有欬聲出咽復有還聲吸入咽內此所以爲欬逆證也呃逆者卽下文云入聲是也有欬呃兼聲擊發連續千萬之聲而不已者服藥不效卽用吐法吐出痰涎立已若噦者乃出聲也聲盡然後吸病本於胃於嘔吐門中已詳言之此不復及呃逆者入聲也氣逆入喉逆

聲盡然後呼也病本於肺其出入呼吸大不相同何難辨哉

欬逆屬火

活人書云欬逆仲景所謂噦是也噦爲胃寒所生傷寒本虛攻其熱必噦又云傷寒大吐下之極虛後汗出者因得噦所以然者胃氣虛寒故也宜橘皮乾薑湯羌活附子湯半夏生薑湯退陰散之屬主之此仲景治噦之方也活人書誤以欬爲噦故以熱作寒治仲景之言噦非以爲欬逆之謂也欬逆從熱而噦從寒活人以欬逆爲噦夫安得不用熱藥蓋辯證一差故其用藥必反若非東垣力辯其失後學將孰從而知之

病要分標別本

東垣云活人書以欬逆爲噦謂若可下之宜調胃承氣湯是因邪氣在胃故斷爲噦是則然矣抑不思欬逆是足陽明失下傳手太陰活人書言其火之本不言其火之標炎上至極高之分而欬逆也合而觀之噦與欬逆同一熱也分而言之噦爲本爲膽爲胃爲

中欬逆爲標爲心爲肺爲上若標因應見上當其標不必名噦噦不言作噦使後人一見膽胃本而不見心肺標也

治宜降火順氣

欬逆證古方多作寒氣故用丁香柿蒂薑附熱劑此亦一偏也欬逆有虛有實有火今其氣自下衝上而作聲非氣而何大抵傷寒雜證汗吐下後過服凉劑胃氣虛寒者或亦有之惟此可從溫補亦不宜用熱劑除此之外就因病後必是發熱失於汗下熱鬱旣久以致陰虛須汗下之亦失其時致火亢極故雖退熱之後尚有火伏陰中而乘胃虛衝上連聲逆吸而爲欬飽之證也竹茹麥門冬橘皮之類便祕以承氣湯下之

吐下法效速

凡有忍氣鬱結積怒之人并不得行其志者多有欬逆之證藥以降火清痰順氣不效者必須吐法以人參蘆煎湯入煨鹽少許飲之少頃探吐膠固痰涎其欬立已

實者病傷寒失下大便祕結而欬逆速以寒劑下之若因飲食過傷或因痰飲停宿或因暴怒氣逆而得此證皆爲形氣俱實用子和涌法極效人參蘆尤佳欬逆要審有餘不足如丹溪治一老人患滯下後發欬逆用參朮湯下大補丸而愈又治一女子怒後作呃用人參蘆吐之而愈

王肯堂證治準繩

總論

呃逆卽內經所謂噦也或曰成無己許學士固以噦爲呃逆然東垣海藏又以噦爲乾嘔陳無擇又以噦名欬逆諸論不同今予獨取成許二家之說何也曰噦義具在內經顧諸家不察耳按靈樞雜病篇末云噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已詳此經文三法正乃治呃逆之法按呃逆用紙撚刺鼻便嚏嚏則呃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立已或作寃盜賊大驚駭之亦已此予所以取成許二家之論噦爲呃逆爲得經旨也若以噦爲乾嘔設使乾嘔之人或使之嚏或使之無息或使之

大驚其乾嘔能立已乎噦非乾嘔也明矣若以噦名欬逆按內經生氣通天論曰秋傷於濕上逆而欬陰陽應象論曰秋傷於濕冬生欬嗽以此論之則欬逆爲欬嗽無疑以春夏冬三時比例自見孫眞人千金曰欬逆者嗽也本自明白後人不知何以將欬逆誤作呃逆失之遠矣

劉宗厚曰呃逆一證有虛有實有火有痰有水氣不可專作寒論蓋傷寒發汗吐下之後與瀉利日久及大病後婦人產後有此者皆脾胃氣血大虛之故也若平人食入太速而氣噎或飲水喜笑錯喉而氣搶或因痰水停隔心中或因暴怒氣逆痰厥或傷寒熱病失下而有此者則皆屬實也夫水性潤下火性炎上今其氣自下衝上非火而何大抵治法虛則補之虛中須分寒熱如因汗吐下後誤服寒凉過多當以溫補之如脾胃陰虛火逆上衝當以平補之挾熱者凉而補之若夫實者如傷寒失下地道不通因而呃逆當以寒下之如痰飲停畜或暴怒氣逆痰厥此等必形氣俱實別無惡候當隨其邪之所在涌之洩之

清之利之也

景岳全書　臣張介賓著

論證

呃逆一證古無是名其在內經本謂之噦因其呃呃連聲故今以呃逆名之於義亦妥觀內經治噦之法以草刺鼻而嚏及氣息迎引大驚之類是皆治呃之法此噦本呃逆無待辨也自孫眞人云遍尋方論無此名遂以欬逆爲噦因致後世訛傳乃以欬逆乾嘔噫氣之類互相淆亂自唐迄今矣此名之不可不察亦不可不正也

欬逆之名原出內經本以欬嗽氣逆者爲言如氣交變大論曰歲金太過甚則喘欬逆氣此因喘欬以致氣逆故云欬逆氣也又曰欬逆甚而血溢正以欬逆不止而血隨氣溢則病之常也未聞以呃逆而見血者也即如六元正紀大論云金鬱之發民病欬逆者亦是此意此欬逆之非呃逆亦甚明矣而今後世諸公乃悉以噦爲欬逆豈皆未之詳察耶及觀丹溪之言在纂要則曰孫眞人誤以噦爲欬逆是謂噦非欬

逆也在心法附錄則曰欬逆爲病古謂之噦近謂之呃此又謂噦卽欬逆也在嘔吐門則又曰有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦此又以乾嘔爲噦也前後不一何其自謬若此再如海藏河間諸公有以噦爲乾嘔者有以欬逆爲噫者總皆謬矣蓋嘔卽吐之類但吐而無物者曰嘔嘔而有物者曰吐腹脹噯氣者曰噫逆氣自下而上者亦曰噫此四者之辨自有正名顧可紛紛若是乎茲余析而判之曰噦者呃逆也非欬逆也欬逆者欬嗽之甚者也非呃逆也乾嘔者無物之吐卽嘔也非噦也噫者飽食之息卽噯氣也非欬逆也後人但以此爲鑑則異說之疑可盡釋矣

呃逆證有傷寒有雜證其在古人則悉以虛寒爲言惟丹溪引內經之言曰諸逆衝上皆屬於火病人見此似爲死證然亦有實者不可不知余向見此說疑其與古人相左不以爲然蓋亦謂此證必屬虛寒何有實熱茲及晚年歷驗始有定見乃知丹溪此言爲不誣也雖其中寒熱虛實亦有不同然致呃之因總

由氣逆氣逆於下則直衝於上無氣則無呃無陽亦無呃故致之之因所以必由氣也欲得其象不見雨中之雷水中之浡乎夫陽爲陰蔽所以爲雷而轟轟不已者此火爲雷之本而火卽氣也氣爲水覆所以爲浡而汩汩不已者此氣爲浡之本而氣卽陽也然病在氣分本非一端而呃之大要亦惟三者而已則一曰寒二曰熱三曰虛脫寒呃可溫可散寒去則氣自舒也熱呃可降可清火靜而氣自平也惟虛脫之呃則誠危殆之證其或免者亦萬幸矣

論治

凡雜證之呃雖由氣逆然有兼寒者有兼熱者有因食滯而逆者有因氣滯而逆者有因中氣虛而逆者有因陰氣竭而逆者但察其因而治其氣自無不愈若輕易之呃或偶然之逆氣順則已本不必治惟屢呃爲患及呃之甚者必其氣有大逆或脾腎元氣大有虧竭而然然實證不難治而惟元氣敗竭者乃最危之候也

寒滯爲呃者或以風寒或以生冷或其臟氣本寒偶

有所逆皆能致呃但去其蔽抑之寒而呃自止宜橘皮湯三因丁香散或二陳湯加生薑五七片或佐關煎或甘草乾薑湯橘皮乾薑湯之類皆可酌用若寒之甚者漿水散或四逆湯

胃火爲呃者其證極多但察其脈見滑實而形氣不虛胷膈有滯或大便堅實或不行者皆其胃中有火所以上衝爲呃但降其火其呃自止惟安胃飲爲最妙余嘗治愈多人皆此證也

氣逆爲噦而兼脹悶者宜加減二陳湯加烏藥或寶鑑丁香柿蔕散或羌活附子湯或神香散

食滯而呃者宜加減二陳加山楂白芥子烏藥之屬或用大和中飲加乾薑木香

中焦脾胃虛寒氣逆爲呃者宜理中湯加丁香或溫胃飲加丁香若因勞倦內傷而致呃逆者宜補中益氣湯加丁香凡中焦寒甚者多由脾胃氣虛而然蓋脾胃不虛則寒亦不甚故治寒者當以脾氣爲主若吐利後胃氣微虛或兼膈熱而呃者宜橘皮竹茹湯無熱者宜生薑半夏丁香柿蔕白术肉桂之類皆可

酌用

下焦虛寒者其肝腎生氣之原不能暢達故凡虛弱之人多見呃逆正以元陽無力易爲抑遏而然此呃逆之本多在腎中故余製歸氣飲主之甚效或用理陰煎加丁香以疎氣抄亦如之

凡以大病之後或以虛羸之極或以虛損誤攻而致呃逆者此最危之證察其中虛速宜補脾察其陰虛速宜補腎如前二條固其法矣然猶恐不及則惟大補元煎及右歸飲之類斯其庶幾者也

呃逆證凡聲強氣盛而脉見滑實者多宜清降若聲小息微而脉見微弱者多宜溫補

凡傷寒之呃亦無非氣逆之病其有與雜證不同者如仲景所言則其類也然猶有未悉及治有未備者謹略如左

傷寒胃中虛冷等證大約與前雜證相似悉宜如前以溫中等劑治之或如仲景所言胃中虛冷及飲水則噦等證當以仲景法治之

傷寒邪在表者與裏無涉故無噦證惟少陽證邪在

半表半裏之間則寒熱往來氣爲邪抑而噦逆者有之矣宜柴陳煎主之有寒者加丁香有火者加黃芩或小柴胡湯亦可

傷寒失下邪入正陽明內熱之極三焦乾涸陰道不行而上衝作呃者必宜去火去閉斯逆氣得降而噦乃可愈然必察邪之微甚如無堅實脹滿等證而但以乾涸燥熱者宜白虎湯或竹葉石膏湯或瀉心湯涼解之若果有燥糞大便閉結脹滿實堅俱全者宜三承氣湯下之

傷寒邪有未解而用溫補太過者則其中焦氣逆最能爲噦惟安胃飲爲最妙若氣逆無火者宜橘皮湯若兼表邪未解者宜柴陳煎

傷寒誤攻或吐或下或誤用寒涼以致脾腎胃氣大虛大寒而發噦者大爲危候速當以前雜證溫胃理陰等法調治之恐遲則無濟於事也

按張子和吐法亦可治噦者以其氣得伸而鬱則散也故凡氣實而鬱者在子和之法亦所宜用

石室祕籙

臣陳士鐸著

論治法

揚治者乃氣沉而不能上也氣得揚而展舒倘沉抑不揚則必有呃逆之證必用藥以揚之則氣舒展也方用當歸白芍黃芪白术各三錢熟地五錢人參茯苓川芎各一錢柴胡升麻各五分水煎服此八珍湯也妙是血氣平補若用甘草而不用黃芪則不是八珍湯矣氣血平補既無偏曲而後以升麻柴胡揚之使血氣流動自無血幷氣而成呃逆之證矣設止補其陽而不補其陰則陽旺而陰愈消設止補其陰而不補其陽則陰旺而陽愈息故必兼補之始爲有益不可與發散之一類而並觀之也

水氣凌心包之絡呃逆不止死證也而吾以爲可救者心包爲水氣所凌惟恐犯心所以呃逆不止者欲號名五臟之氣共救水氣之犯心也水氣凌心包以成呃逆之證亦止須分消其水濕之氣而呃逆自除也方用止呃湯茯苓薏仁各一兩蒼术白术人參各三錢芡實五錢半夏陳皮各一錢丁香五分吳茱萸三分水煎服一劑而呃即止二劑而呃卽愈此方健

胃固脾雖利濕分水而不消眞氣故能補心包而壯心君之位不必治呃而呃自定矣

方

小承氣湯（仲景下同）

治大便不通噦數譫語者

大黃四兩　厚朴三兩炙　枳實大者三枚炙

右三味以水四升煑取一升二合去滓分溫二服得利則止

小半夏湯

治黃疸噦者

半夏一升　生薑半斤

右二味以水七升煑取一升半分溫再服

羌活附子散

治吐痢後胃寒欬逆

羌活去蘆　附子炮去皮臍　茴香炒各半兩

乾薑炮去土　丁香各一兩

右爲細末每服二錢水一盞入鹽少許煎至七分空心熱服丹溪無丁香有木香

橘皮湯（濟生方下同）

治吐利後胃中虛膈上熱欬逆者

橘皮去白二兩　人參　甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半竹茹一小塊生薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

柿蔕湯

治胷滿欬逆不止

柿蔕　丁香各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓熱服不拘時候

橘皮乾薑湯（丹溪下同）

治欬逆不止

橘皮　通草　乾薑　桂心　甘草炙各二兩

人參一兩

右用五錢水煎服

生薑半夏湯

通治欬逆欲死

半夏一兩　生薑二兩

右以水煎溫作三服

又方

治陰證欬逆

川烏頭　乾薑炮　附子炮　肉桂　白芍藥

甘草炙　半夏　吳茱萸　陳皮　大黃各等分

右爲末每服一錢生薑五片煎服

人參白朮湯

一名十味小柴胡湯治胃虛不足呃逆

人參　黃芩　柴胡　乾薑　梔子仁各七錢半

甘草炙　白朮　防風　半夏泡七次各五錢

五味子九十粒

右㕮咀每服四錢薑三片煎

橘皮竹茹湯

橘皮一升　竹茹一升半　人參　生薑各半兩

甘草炙二兩　棗子三十箇

右㕮咀水十盞煎至三盞作三服

木香調氣散

白蔻仁　丁香　檀香　木香各二兩　藿香

甘草炙各八兩　砂仁四兩

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點服

人參三白湯

治身熱脈數而噦

白术　白芍藥　白茯苓各一兩　人參二兩

右剉每服五錢加竹茹一兩水二盞生薑三片煎

八分去柤溫服

八物加竹茹湯

治噦

人參　白术　白茯苓　甘草　當歸　熟地黃

川芎　竹茹　白芍藥各等分

右剉每服五錢水一盞生薑三片煎八分去柤溫服

倍陳湯

治脾虛呃逆有效

陳皮四錢　人參二錢　甘草四分

右水煎服

增半湯

治胃虛中寒停痰留飲嘔吐呃逆

藿香二錢　半夏湯泡炒黃三錢半　人參　丁香皮各一錢半

右薑七片煎服

丁香柿蔕散

治吐利及病後胃中虛寒飽逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香　柿蔕　人參　茯苓　橘皮　良薑　半夏各一兩　生薑一兩半　甘草三分

右爲末每服三錢水煎乘熱頓服或用此藥調蘇合香丸服亦妙

三香散

治胃冷飢逆經久不止

沉香　紫蘇　白豆蔻各等分

右爲細末每服五七分柿蔕煎湯調下

麥門冬竹茹湯（醫統下同）

治胃熱多渴欬逆嘔噦不進食

麥門冬　竹茹　陳皮去白　半夏湯泡　人參

白茯苓各一錢　甘草五分　枇杷葉四箇去毛炙

水盞半薑五片煎八分食遠服

丁香散

治欬逆

丁香　柿蔕各一錢　甘草炙　良薑各五分

右爲細末每服二錢熱湯調不拘時候

丁香湯（良方）

治欬逆嘔噦

丁香　柿蔕　青皮　陳皮各一錢

水盞半薑五片煎七分服

炙甘草湯（寶鑑）

治中氣虛而飢逆

桂枝　炙甘草各五分　生地黃　阿膠各七分

人參　麻子仁　麥門冬各一錢

右生薑五片大棗三枚水二盞煎八分服

稀涎散

治痰涎膠固喉中欬逆不已

半夏十四枚　豬牙皂角炙

右水盞半薑五片煎七分溫服不能飲者灌之須臾探吐

青白散

吐欬逆不已

青黛　白礬　烏梅肉焙各等分

右爲末每服二錢虀湯調服先飲虀湯一杯次服藥探吐

人參蘆湯

治虛人欬逆吐痰者用此

參蘆三錢

水一盞煎五七沸溫飲之探吐

倉鹽湯

治欬逆并一切痰證倉卒用之最妙

倉鹽一兩用濕草紙裹煨紅取出用

右以河水二碗砂鍋入煨鹽煎五七沸放溫頓飲之少頃探吐

鮮陳湯（醫鑑下同）

治呃逆欲死

半夏五錢　生薑二錢半

右剉一劑水煎服

溫中散

治吐瀉及病後胃中虛寒欬逆至三四聲或數聲相連收氣不回者難治

丁香　柿蔕　人參　茯苓　橘皮　良薑

半夏各一錢　生薑一錢半　甘草三分

右剉一劑水煎服

橘參飲

治吐利後胃虛膈熱而欬逆者

橘皮五錢　人參　竹茹各二錢　甘草炙一錢

右剉作一劑生薑五片棗三枚水煎服

黃荊散

治傷寒發熱而欬逆者

黃荊子不拘多少炒

右水煎服

雄黃酒

治呃逆

明雄黃一錢

右酒一盞煎七分急令患人齅其熱氣卽止

大補元煎（景岳全書下同）

治男婦氣血大壞精神失守呃逆危劇等證

人參少則用一二錢多則用一二兩　當歸三錢

熟地少則用二三錢多則用二三兩　山藥炒

杜仲各二錢　枸杞二三錢　山萸　炙草各一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

右歸飲

凡命門之陽衰陰勝呃逆者宜此方加減主之

熟地二三錢或一二兩　山茱萸一錢　枸杞子

山藥炒　杜仲薑製各二錢　製附子一二三錢

肉桂　甘草炙各一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

大和中飲

治飲食留滯積聚呃逆等證

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂

麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治胷膈脹悶呃逆等證

陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　甘草五分

山楂　扁豆炒各二錢

水一鍾半加生薑三五片煎服

柴陳煎

治傷風兼寒欬嗽發熱痞滿多痰呃逆等證

柴胡二三錢　陳皮一錢半　甘草一錢　半夏

茯苓各二錢　生薑三五七片

水一鍾半煎七分食遠溫服

安胃飲

治胃火上衝呃逆不止

陳皮　山楂　麥芽　木通　澤瀉　黃芩　石斛

水一鍾半煎七分食遠服

理陰煎

此理中湯之變方也治脾腎中虛呃逆

熟地三五錢或一二兩　當歸二三錢或五七錢

炙甘草一二錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治中寒呃逆

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢　乾薑炒焦一二三錢　陳皮

炙甘草各一錢　當歸一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

佐關煎

治生冷傷脾呃逆

厚朴炒　陳皮炒各一錢　炙草七分　肉桂

乾薑各一二錢　山藥炒　扁豆炒　猪苓
澤瀉各二錢
水一鍾半煎服

歸氣飲

治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中脾腎等證

熟地三五錢　茯苓　扁豆各二錢　乾薑炮
丁香　陳皮各一錢　藿香一錢半　炙甘草八分
水一鍾半煎七分食遠溫服

單方

溫病熱噦乃伏熱在胃令人胷滿則氣逆逆則噦或大下胃中虛冷亦令致此茅根切葛根切各半斤水三升煎一升半每溫服一盞噦止即停（龐安常方）

虛寒嘔噦飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半爲末每服一錢柿蔕湯下

嘔噦不止厥逆者蘆根三斤切水煑濃汁頻飲二升必效若以童子小便煑服不過三升愈（肘後方）

又方酢和麵作彈丸二三十枚以沸湯煑熟漉出投

漿水中待溫吞三兩枚噦定卽不用再吞未定至晚再吞（兵部手集）

心痞嘔噦心下痞堅生薑八兩水三升煑一升半夏五合洗水五升煑一升取汁同煑一升半分再服（千金）

溫病發噦因飲水多者枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水四升煎二升稍稍飲之（龐安常方）

腎氣上噦腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能吐或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃脘腎虛氣逆上乘於胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服此方如不止灸期門關元腎俞穴用吳茱萸酢炒熱橘皮附子去皮各一兩爲末麪糊丸梧子大每薑湯下七十丸（仁存方）

噦逆不止石蓮肉六枚炒赤黃色研末冷熟水各半盞和服便止（圖經）

治欬逆不止用柿蔕十五枚白鹽梅半箇水一盞煎六分不拘時溫服（醫統下同）

寒飯嘔噦用吳茱萸泡過青橘皮去白各二錢水一盞薑三片煎七分服

又方用川椒末麪糊丸梧桐子大每服二十丸白湯送下

又方用陳皮枳殼各二錢煎服

齅法治欬逆服藥不效者用硫黃乳香等分以酒煎令患人以鼻齅之效一方用雄黃一味煎酒齅

久患欬噫連欬二三十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熱溫服如此三服立效

鍼灸

靈樞經曰黃帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂眞邪相攻氣並相逆復出於胃故爲噦補手太陰瀉足少陰

肺主爲噦取手太陰足少陰

甲乙經曰煩心客寒熱善噦勞宮主之

脾逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胷滿激呼胃氣上逆心痛太淵主之

千金方曰少海主氣逆呼吸噫噦嘔

溫留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

又方灸承漿七壯炷如麥大

又方灸臍下四指七壯

胃中熱病善噦灸三里三十壯穴在膝下三寸

濟生方曰灸欬逆其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者以一指爲率正男左女右與乳相直間陷中動脈處是穴艾炷如小豆許灸三壯

衛生寶鑑曰一切呃逆不止男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯病甚者灸二七壯

古今醫統曰呃逆灸膻中中脘氣海三里

醫學綱目曰氣逆發呃取膻中中脘先補後瀉不已再取三里肺俞行間

噫呃服藥無效灸期門必愈

醫案

儒門事親曰一婦人頭重壯熱面紅寒熱往來乾嘔欬逆脅痛不能轉側耳鳴食不下先以涌瀉復服益元散加青黛薄荷末調二三服前證俱減戴人診之曰此病常欲痛哭爲快婦曰然常有此不知何謂戴人曰少陽相火凌爍肺金金受火制屈無所告肺主悲故欲痛哭而爲快也再加歸芎黃連解毒湯數劑全瘥

丹溪心法曰一女子年踰笄性躁味厚暑月因大怒

而欬逆發舉身跳動脉不可診神昏視其形氣俱實曰膈上有痰怒氣連鬱痰熱相搏氣不得降非吐不可以人參蘆煎飲大吐頑痰數椀昏睡一日而安人參入手太陰補陰中之陽者也蘆則反是大瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣怒則氣逆肝木乘火侮肺故欬逆而神昏參蘆善吐今痰盡氣降火息金氣復位胃氣得和而解

趙立道年近五十質弱而多怒七月炎暑大饑索飯於家不能急具因大怒兩日後得滯下病口渴自以冷水調生蜜飲之甚快滯下亦漸緩如此五七日召予視脉稍大不數遂令止蜜水渴時且令以人參白术煎湯調益元散與之滯下亦漸收七八日後覺倦甚發呃予知其因下久而陰虛也令其守前藥然滯下尚未止又以煉蜜飲之如此者三日呃猶未止衆皆尤藥之未當將以薑附飲之予曰補藥無速效附子非補陰者服之必死衆曰冷水飲多得無寒乎予曰炎暑如此飲凉非寒勿多疑待以數日藥力到當自止又四日而呃止滯下亦安

陳擇仁年近七十厚味之人也有久嗽病而作止不常新秋患滯下食大減至五七日後呃作召予視之脉皆大豁衆以爲難予曰形瘦者尚可爲以人參白术湯下大補丸以補血至七日而安

趙越陳氏二十餘歲因飽後奔走數里遂患噦病但食物則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至晚發熱如此者二月脉濇數以血入氣中治之用桃仁承氣湯加紅花煎服下汚血數次即減再用木香和中丸加丁香服之十日而愈

洪孺人年二十六歲夏月因事爲長上所阻怒氣鬱抑不得舒須臾就浴湯熱不可近怒氣復增就悶絶昏倒乃以衣遮掩就房須臾欬逆大作每一聲必渾身爲跳躍仍復昏悶凡三五息一作脉不可診予曰此膈上有痰逆爲怒氣所鬱痰熱相搏氣不得降而逆非吐則不可是時夜半又事出倉卒適有人參蘆二兩在彼濃煎飲之大吐稠痰二升許通體得汗困睡半夜而安

醫學正傳曰東陽李氏子病傷寒陽明內實醫與補

藥治而成發呃十日後召予診其脉長而實大與大承氣湯大下之熱退而呃亦止

盤松周氏子得傷寒證七日熱退而呃連聲不絕舉家徬徨召予診脉六脉皆沉細無力人倦甚以補中益氣湯作大劑加炮附子一錢一日三貼兼與灸乳根氣海三處當日呃止脉亦充而平安

醫學準繩六要曰一老人內傷飲食消導未減一人悞與潤腸丸二服下清水脹痛轉甚一人復投巴豆丸二服致欬逆不止用大劑六君子湯二貼至五貼全止補養而愈

醫學綱目曰予長兄九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不下五六日後加呃逆與丁香一粒噙之立止但少時又至遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之呃雖少止滯下未安如此者十餘日遂空心用御米殼些少澀其滑日間用白术陳皮之類補其虛自服御米殼之後呃聲漸輕滯下亦收而安

有病傷寒將愈忽患呃逆予與古人治呃逆之藥殆徧皆不愈計出無奈遂用皂角末吹入鼻中得嚏而

呃逆止少時又呃又與皂角末嚏而止者凡數百次其嚏時出痰涕漸多自是呃逆漸疎至二三日而止此是合經草刺鼻嚏之法故書之

噫氣門

黃帝素問

診要經終論

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔

註 足太陰脉入腹屬脾故爲腹脹手太陰脉上膈屬肺而主呼吸故爲不得息脹滿則升降難不得息則氣道滯故爲噫爲嘔

痹論

心痹者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫

註　邪薄心下鼓動而上干心臟則煩故煩則心下鼓也逆氣暴上則喘而嗌乾心主噫心氣上逆而出則善噫也

脈解篇

太陰所謂上走心爲噫者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心爲噫也

註　噫者噯氣也太陰之氣從陽明而上出於心則爲噫也

刺禁論

刺中心一日死其動爲噫

註　心在氣爲噫噫則心氣絕矣

靈樞經

經脈篇

脾足太陰之脈是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫

註　脾是動則病氣而及於經從經而及於臟腑故爲舌本強嘔痛脹諸證善噫者脾氣上走心爲噫

九鍼篇

心主噫

（註）噫者中焦之逆氣上走心也

漢張機金匱要略

三焦竭證

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭卽遺溺失便其氣不和不能自禁制不須治久則愈

元朱震亨心法

論證治

噯氣胃中有火有痰不可服軟石膏丸本方痰條下云噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上黃芩爲君南星半夏陳皮爲佐熱多加青黛

明李梴醫學入門

病屬痰火

胃中鬱火膈上稠痰飲食鬱成宜祛痰火也潤下丸古萸連丸

治分虛實

氣盛實噯食罷噯轉腐氣甚則物亦噯轉多傷食濕

熱所致二陳湯加蒼朮神麯麥芽薑炒黃連或保和丸

不因飲食常噯者虛也蓋胃有濁氣膈有濕痰俱能發噯六君子湯加沉香爲君厚朴蘇子爲臣吳萸爲使氣逆勻氣丸或蘇合香丸甚者靈砂以鎮墜之

虞摶醫學正傳

總論

內經曰胃爲水穀之海無物不受若夫濕麪魚腥生冷水果以及烹飪調和粘滑難化等物恣食無節朝傷暮損而成清痰稠飲滯於中宮故爲嘈雜噯氣吞酸痞滿甚則爲翻胃噎膈即此之由也夫嘈雜之爲證也似饑不饑似痛不痛而有懊憹不自寧之况者是也其證或兼噯氣或兼痞滿或兼惡心漸至胃脘作痛實痰火之爲患也治法以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連梔子石膏知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾行濕壯其本元又當忌口節慾無有不安者也

戴思恭證治要訣

噫氣吞酸

噫氣吞酸吐酸者宿食所爲故曰中脘有飲則嘈有宿食則酸噫氣吞酸噯宿腐氣逆嚥酸水亦有每晨吐清酸水數口有日間無事者亦有膈間常如酸折皆飲食傷兼中脘虛所致生料平胃散加神麯麥蘖各半錢或八味平胃散

徐春甫古今醫統

脾胃不和有痰有火

丹溪曰噯氣爲胃中有痰有火春甫謂噯氣多是胃氣不和窒塞不通則噯氣何以見之凡人食飽後多有噯氣由飲食飽則胃不舒暢而致然也噫氣若非食後則爲胃虛而不和丹溪謂痰與火特一端耳

王肯堂證治準繩

總論

內經所謂噫即今所謂噯氣也宣明五氣論以心爲噫痺論以心痺者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫至眞要大論以太陽司天少陰之復皆爲噦噫四時刺逆從論刺中心一日死其動爲噫陰陽

別論二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥脈解篇太陰所謂上走心爲噫者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心爲噫也此乃噫從心出者也厥陰在泉腹脹善噫得後與氣則快然如衰玉版論太陰終者善噫靈樞云足太陰是動病腹脹善噫又云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故爲噫仲景謂上焦受中焦氣未和不能消是故能噫又云上焦不歸者噫而吞酸不歸者不至也上焦之氣不至其部則物不能傳化故噫而吞酸由是觀之噫者是火土之氣鬱而不得發故噫而出王註解心爲噫之義象火炎上煙隨焰出如痰閉膈間中氣不得伸而噯者亦土氣內鬱也

方

檳榔散（千金方下同）

治脾寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不樂

檳榔八枚皮子全　人參　茯苓　陳麴　厚朴

麥糵　吳茱萸　白朮各二兩

右八味治下篩食後酒服二方寸匕日再一方用

橘皮一兩半

又方

治腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下口乾四肢重好

怒不欲聞人聲忘誤喉痹

黃連一兩　禹餘糧二兩　白朮　乾薑各三兩

大麻子五兩　桑白皮八兩　大棗二十枚

右七味㕮咀以水一斗二升煑取三升分四服

消食膏酒

治脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下善通噫

豬膏三升　宿薑　吳茱萸　白朮

右四味擣茱萸白朮等二味細細下篩爲散內薑汁膏中煎取六升溫淸酒一升進方寸匕日再

三台圓（濟生方）

治五臟寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不生肌膚甚者嘔逆若傷寒瘧已愈令不復發食後服五丸飲多者十丸常服令人大小便調和長肌肉

茯苓半兩　大黃　前胡各二兩　硝石　葶藶

杏仁各一升　厚朴　附子　細辛　半夏各一兩

右十味爲末蜜和擣五千杵丸如梧子大服五丸稍加至十丸以知爲度

噯氣方（丹溪下同）

南星　半夏　軟石膏　香附

右作丸或作湯服之蓋胃中有鬱火膈上有稠痰故也

順氣木香散

治氣不升降胷膈痞悶時或引痛及酒食過傷噫氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

砂仁　官桂　甘草炙　陳皮　厚朴　丁皮
茴香　桔梗　蒼朮　木香　乾薑　良薑

右水煎服

異香散

治腎氣不和腹脅脹滿飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛

莪朮炮　益智　甘草炙　三稜各六兩　青皮
陳皮各三兩　厚朴二兩　石蓮肉一兩

右剉每服三錢水煎薑三片棗一枚入鹽一捻同煎服

透膈湯

治脾胃不和中脘氣滯胷膈滿悶噎塞不通噫氣

呑酸脅肋刺痛嘔逆痰涎食飲不下並皆治之

木香　白豆蔻　縮砂仁　檳榔　枳殼麩炒

厚朴薑製炒　半夏湯泡　青皮去白　橘紅

大黃　朴硝　甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

益中丸

健脾暖胃消化冷痰治中滿脹悶噫氣呑酸心腹時痛不進飲食

神麴炒黃　麥蘖炒　乾薑炮　高良薑炒

陳皮各二兩　枳殼去瓤麩炒　肉豆蔻麪裹煨

丁香各半兩

右爲細末麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸食遠溫米飲或白湯送下

薑棗丸

治胃寒痰逆噫氣呑酸胃膈不利不思飲食

生薑去皮切片焙乾四兩　附子炮裂去皮臍

丁香各一兩

右爲細末用蒸熟棗肉和爲丸如梧桐子大每服
十五丸加至二十丸不拘時候米飲送下

匀氣丸

治氣虛濁升多噯

草豆蔻　橘皮　沉香　人參各五錢　益智仁
檀香　大腹子各一兩

右爲末飯丸如梧桐子大每服八十丸淡薑湯下

祛痰火丸

治胃火痰火噯氣

南星　半夏　香附　石膏　山梔各等分

右爲末薑汁浸蒸餅爲丸服或薑煎服亦可

十味保和湯（醫統下同）

治胃氣虛而滯作噯

人參　茯苓　陳皮　半夏薑製　白朮各一錢
藿香　香附　砂仁各六分　木香　炙草各三分

右水二盞薑三片棗二枚煎八分食前溫服

枳殼散

治心下否悶作痛多噫氣如敗卵

枳殼　白朮各五錢　香附子一兩　檳榔二錢

右爲細末每服二錢米飲調下日三服不拘時

半星丸

治痰火氣噯

半夏薑製　南星薑製　軟石膏　香附子

梔子各等分

右爲末神麴爲丸服

單方

久患欬噫生薑汁半合蜜一匙煎溫呷三服瘉（外臺）

諸氣呃噫橘皮二兩去穰水一升煎五合頓服或加枳殼尤良（孫氏方）

呃噫不止川椒四兩炒研麪糊丸梧子大每服十丸酢湯下神效（經驗方）

傷寒呃噫枳殼半兩木香一錢爲末每白湯服一錢未知再服（本事方）

噫不下食取崖蜜含微微嚥下（廣利方）

噫吐酸漿水煎頭垢豆許服一盃效（普濟方）

傷寒呃噫日夜不定者用華澄茄高良薑各等分爲末每服二錢水六分煎十沸入酢少許服之（圖經）

鍼灸

靈樞經云黃帝曰人之噫者何氣使然岐伯曰寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故爲噫補足太陰陽明一日補眉本也

脈經曰右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中塞噫逆刺手陽明經治陽

甲乙經曰熱病發熱煩滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴舌中爛掌

中熱飲嘔勞宮主之

腸中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛泄食不化心下脹三里主之

熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫語解谿主之

千金方曰少海主氣逆噫噦嘔

陷谷主腹大滿喜噫

蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒

大敦主噦噫又灸巨闕

勞宮主氣逆噫不止

噫噦膈中氣閉寒灸腋下聚毛下附脅宛宛中五十壯

噫噦嘔逆灸石關百壯

古今醫統曰噫氣取脾經穴中脘

醫案

丹溪心法曰宣州人病心下畜積痞悶或作痛多噫敗卵氣用枳殼散證皆除氣上築心膈噫氣稍寬脉之右關弱短左關左尺長洪大而數此肝有熱宜瀉肝補脾用青皮一錢白朮二錢半木通甘草各二錢煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十六卷目錄

醫部彙考三百二十六

懊憹門

黃帝素問（六元正紀大論）

張機金匱要略（論證治）

傷寒論（傷寒證治）

劉完素六書（總論證治）

成無已明理論（屬傷寒證）

方（梔子大黃湯　梔子湯　梔子厚朴湯　京膈散　安神丸）

鍼灸

懈惰門

黃帝素問（診要經終論　平人氣象論　玉機眞藏論　氣厥論　風論　痺論　病能論　刺要論　四時刺逆從論　示從容論）

靈樞經（邪氣臟腑病形篇　海論　動輸篇　論疾診尺篇）

李杲十書（脾胃虛證）

朱震亨心法（論證治）

徐春甫古今醫統（久暫之殊）

方（紫菀湯　黃芪飲子　黃芪人參湯　交泰丸　生薑和中湯　升陽益胃湯　升陽補氣湯　益胃湯　升陽除濕湯　補虛損方　人參補氣湯）

鍼灸

醫案

太息門

黃帝素問（氣交變大論　五常政大論　至眞要大論）

靈樞經（經脈篇　脹論）

張機金匱要略（肝中寒證）

方（半夏湯　溫膽湯）

鍼灸

藝術典第三百四十六卷

醫部彙考三百二十六

懊憹門

黃帝素問

六元正紀大論

火鬱之發民病甚則瞀悶懊憹善暴死

註　皆火熱盛而精血傷也

漢張機金匱要略

論證治

黃疸篇曰心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸

酒黃疸心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之

傷寒論

傷寒證治

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心中因鞕則爲結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利者身必發黃也

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒反譫語若加燒針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承

氣湯

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

傷寒頭痛翕翕發熱形像中風常微汗出自嘔者下之益煩心中懊憹如饑發汗則致痓身強難以屈伸熏之則發黃不得小便久則發欬吐

金劉完素六書

總論證治

懊憹者煩心熱躁悶亂不寧也甚者似中巴豆草烏頭之類毒藥之狀也

懊憹煩心反復顛倒不得眠者煩熱怫鬱於內而氣不能宣通也或胷滿結痛或頭微汗出虛煩者梔子湯主之或氣少者加甘草一錢或嘔者及初誤以丸藥下者加生薑半兩凡懊憹虛煩者皆用涼膈散甚佳及宜湯濯手足使心胷結熱宣散而已心煩腹滿坐臥不安梔子厚朴湯主之或陽明病下之後躁熱而懊憹者三一承氣湯汗後煩躁不得眠五苓散或

凉膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓散黃連解毒湯煩心者凉膈散少陽證胷中煩而不嘔者小柴胡去半夏人參加苦蔞實主之

成無己明理論

屬傷寒證

傷寒懊憹何以明之懊者懊惱之懊憹者鬱悶之貌即心中懊懊惱惱煩煩憹憹鬱鬱然不舒暢憒憒然無奈比之煩悶而甚者懊憹也由下後表中陽邪乘虛內陷鬱而不發結伏於胷心之間故如是也經曰表未解醫反下之胃中空虛客氣動膈心中懊憹又曰下之益煩心中懊憹如饑即是陽氣內陷爲諸懊憹也其治之法或吐或下若發汗吐下後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊憹與陽明病下之其外有熱手足溫而不結胷心中懊憹饑不能食但頭汗出二者爲邪熱鬱於胷中當須梔子豉湯吐之以湧其結熱也陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者與陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃二者爲邪熱結於胃中當須大承氣湯茵陳湯攻之以

滌其內熱也識諸此者吐下之不差湯劑之適當則無不愈若當汗反吐療熱以溫則變證百出斑出黃生者多矣

方

梔子大黃湯（仲景下同）

治酒疸心中懊憹或熱痛者

梔子十四枚　大黃一兩　枳實五枚　豉一升

右四味以水六升煑取二升分溫三服

梔子湯

治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹

大梔子十四枚　豉七合

右二味以水四升先煮梔子取二升半內豉更煮三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮二兩亦可加生薑二兩

梔子厚朴湯

治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安者

大梔子七箇　枳實二錢　厚朴半兩去皮炙

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

涼膈散

一名連翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未全煩心懊憹不得眠讝語狂妄等熱證

連翹一兩　甘草一兩半　山梔子　薄荷葉

大黃　黃芩各半兩　朴硝一分

右爲末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓溫服

安神丸（東垣）

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胷中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱

淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱爲君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血爲臣以當歸補血不足以硃砂納浮游之火而安神明也

黃連一錢五分酒洗　硃砂一錢水飛　酒生地
酒當歸身　炙甘草各五分

右件除硃砂水飛外搗四味爲細末同和勻湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十五丸津唾嚥下食後

懶惰門

黃帝素問

診要經終論

夏刺春分病不愈令人懶惰

註　三月四月人氣在脾脾病不愈故令人懶惰

平人氣象論

尺脈緩濇謂之解㑊安臥

註　緩爲脾脈濇主臟氣之不足解㑊懶惰也此脾臟之爲病也

玉機眞臟論

冬脈太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言

註　腎爲生氣之原而主閉藏太過則氣外泄而根本反傷故爲懈惰少氣生陽之氣不足故脊中痛心主言而發原於腎根氣傷故不欲言也

氣厥論

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦

註　胃主受納水穀大腸爲傳導之官大腸熱邪反逆乘於胃是以熱則消穀善食陽明燥熱則榮衛精液不生故雖能食而瘦亦解㑊也謂雖能食而身體懈惰故又謂之食亦

胃移熱於膽亦曰食亦

註　五臟六腑皆取決於膽膽氣燥熱則生陽不升故身體懈惰胃氣熱則消穀善饑故亦曰食亦

風論

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食胗在鼻上其色黃

註　身體怠惰四肢不欲動脾氣病也經脈篇云是

主脾所生病者食不下土位中央故胗在鼻

痺論

脾痺者四支懈惰發欬嘔汁上爲大塞

註　脾氣不能行於四支故四支懈惰氣痺不行故發欬也入胃之飲上輸於脾肺脾氣不能轉輸故嘔汁肺氣不能通調故上爲大塞

病能論

帝曰有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名曰酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉术各十分麋銜五分合以三指爲後飯

註　飲酒數醉氣聚於脾中熱盛於中故熱徧於身而四支懈惰也熱盛則生風風熱相搏是以汗出如浴而惡風少氣

刺要論

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠胻酸體解㑊然不去矣

註　刺骨太過則傷髓而胻酸也髓海不足則腦轉耳鳴胻酸眩冒目無所見懈怠安臥

四時刺逆從論

夏刺經脉血氣乃竭令人解㑊

註　夏氣盛長而血氣已外出於孫絡矣若再取之於經脉則血氣內竭而令人懈惰矣

示從容論

雷公曰於此有人四支懈惰喘欬血泄而愚診之以爲傷肺切脉浮大而緊愚不敢治粗工下砭石病愈多出血血止身輕此何物也帝曰子所能治知亦衆多與此病失矣譬如鴻飛亦冲於天夫聖人之治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經

註　脾病則懈惰水氣幷於陽明則喘欬脉急血無所行則血泄粗工之所用砭石而病愈者治在經脉也故子之所能亦多知治經脉之法若夫一臟之精氣貫通於中土上乘於肺金則子與此病大義失之矣是以聖人之治病循陰陽之法度引物比類譬以鴻飛亦冲於天故聖人察造化之冥冥循水天之上下又何必僅守其經

今夫脉浮大虛者是脾氣之外絕去胃外歸陽明也夫二火不勝三水是以脉亂而無常也四支懈惰此

脾精之不行也喘欬者是水氣并陽明也血泄者脉急血無所行也若夫以爲傷肺者由失以狂也不引比類是知不明也

註 陽明之氣循於脉中脾氣外絕者不行於肌腠也去胃外歸陽明者去中胃而外歸陽明之經也二火者心之君火心主包絡之相火三水者太陰所至爲濕生終爲注雨是地之水濕也太陽之上寒水主之通天之寒水也腎爲水臟天一之癸水也夫三水太盛則火不能勝之是以脉亂無常蓋心主血心主包絡主脉水并於脉中而君相之陽不能勝故脉亂而血妄行也四支懈惰者脾土之精氣不行於肌腠也喘欬者是下焦之水氣并於陽明之經也血泄者水氣并於脉中則脉急而無所循行故血妄行而下泄也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

肺脉微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胷若鼻息肉不通

註　肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急也肺主氣怠惰欬唾血引腰背胷鼻若有息肉而氣不通皆肺氣虛寒之所致

海論

髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見怠惰安臥

註　髓海不足則精液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥

動輸篇

黃帝曰榮衛之行也上下相貫如環之無端今有其卒然遇邪氣及逢大寒手足懈惰其脉陰陽之道相輸之會行相失也氣何由還岐伯曰夫四末陰陽之會者此氣之大絡也四街者氣之徑路也故絡絕則徑通四末解則氣從合相輸如環黃帝曰善此所謂如環無端莫知其紀此之謂也

註　相輸之會氣從合者謂皮膚之氣血從四末而溜於脉中輸行於經而與脉中之血氣相會入於

肘膝之間而與脉中之血氣相合故曰四末解則氣從合蓋假風寒之邪以明四末乃陰陽之會氣從此而入大絡也如因邪氣所阻則手足懈惰而道路不通氣何由而環轉如四末和解則氣血輸會於脉中而環轉於氣街矣

論疾診尺篇

尺肉弱者解㑊安臥

註 尺肉弱則脾土虛而解㑊安臥

元李杲十書

脾胃虛證

脾胃之虛怠惰嗜臥四支不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃宜升

陽益胃湯

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜臥四支不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血

倶不足宜黃芪人參湯主之

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四支沉困不收此乃熱傷元氣脾主四支旣爲熱乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也

朱震亨心法

論證治

凡肥人沉困怠惰是濕熱宜蒼朮茯苓滑石

凡肥白之人沉困怠惰是氣虛宜二朮人參半夏草果厚朴芍藥

凡黑瘦而沉困怠惰者是熱宜白朮黃芩

脾胃受濕沉困無力怠惰好臥

濕痰多見倦怠軟弱

明徐春甫古今醫統

久暫之殊

胃主生氣脾主運動脾胃一虛則穀氣不充脾愈無所稟脾運四支旣稟氣有虧則四支倦怠無力以動故困乏而嗜臥也亦有食飽過傷以致脾難運化每食飽後則困倦而瞌睡此則食後暫有之消化之後

則不然也若此者當補脾胃而兼之消導可也若是脾胃俱虛飲食少進形氣衰弱常常倦怠者當大補脾胃以滋其化源而尅伐消導之劑則又不可輕用輕犯也久久滋補脾胃一健而精神斯足矣何倦怠之有哉

方

紫菀湯（濟生方下同）

治氣虛極皮毛焦津液不通四肢無力或喘急短氣

紫菀茸洗　乾薑炮　黃芪　人參　五味子
鍾乳粉　杏仁去皮尖麩炒　甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

黃芪飲子

治諸虛勞氣四肢倦怠骨節痠疼潮熱乏力自汗怔忡日漸黃瘦胷膈痞塞不思飲食欬嗽痰多甚則唾血

黃芪蜜炙一兩半　當歸酒浸　石斛　地骨皮
紫菀　人參　桑皮　款冬花　附子炮去皮臍
鹿茸酒蒸各一兩　半夏製七次　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至七分去滓溫服此藥溫補榮衛枯燥者不宜用此唾血不止者加阿膠蒲黃各半兩

黃芪人參湯（東垣下同）

治脾胃虛弱暑傷元氣怠惰嗜臥

黃芪一錢（自汗過多更加一錢）　升麻六分　人參　麥冬
陳皮　蒼朮（無汗更加五分）　白朮各五分　黃蘗酒洗
神麯炒各三分　當歸身酒洗　炙甘草各二分
五味子九箇

右件同㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去查稍熱服食遠或空心服之忌酒濕麪大料物之類及過食冷物

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹中除怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

巴豆霜五分　人參　桂各一錢　柴胡　白朮
川椒炒去汗井目及閉子各一錢五分　厚朴炒
苦楝酒煑　茯苓　砂仁各三錢　乾薑炮三分
川烏炮去皮臍四錢五分　吳茱萸湯洗七次五錢
知母四錢一半炒一半酒洗　皂角水洗去皮弦煨
黃連　紫菀各六錢

右除巴豆霜另入外同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸溫水送下量虛實加減厚朴秋冬用七錢黃連用一錢半去知母

生薑和中湯

治食不下口乾虛渴四肢困倦

生甘草　炙甘草各一分　生黃芩二錢　柴胡
酒黃芩　橘皮各二分　升麻三分　蒼朮一錢
人參　葛根　藁本　白朮各五分　羌活七分

右㕮咀作一服水二盞生薑五片棗二枚擘開同

煎至一盞去柤稍熱服之食前

升陽益胃湯

治脾胃虛弱怠惰嗜臥四肢不舉

半夏湯洗（脈濇者宜）　人參　甘草炙各一兩　芍藥

防風　羌活　獨活各五錢　橘皮不去穰四錢

黃芪二兩　茯苓（小便利不渴者勿用）　澤瀉（不淋勿用）　柴胡

白朮各三錢　黃連二錢

右㕮咀每服三錢生薑五片棗二枚去核水三盞同煎至一盞去柤溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五錢止

升陽補氣湯

治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不耐寒熱早飯後轉增昏悶須要眠睡怠惰四支不收懶倦動作及五心煩熱

厚朴薑製五分　升麻　羌活　白芍藥　獨活

防風　甘草炙　澤瀉各一錢　生地一錢五分

柴胡二錢五分

右爲粗末每服五錢水二盞生薑三片棗二枚煎

至一盞去柤大溫服食前

益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四支倦怠煩躁短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶口乾不喜飲冷

人參　黃芪蜜炙　當歸身　黃芩　甘草炙

益智仁各五分　蒼朮　白朮各一錢　陳皮

半夏　升麻　柴胡各六分

右水盞半煎八分食前服忌生冷硬物酒麪

升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃赤四肢困倦

陳皮　半夏　白茯苓　甘草　麥芽　猪苓

澤瀉各五分　益智仁　神麯　防風　羌活

升麻各三分　蒼朮製一錢

右水二盞薑三片棗一枚煎一盞空心服

補虛損方（本事方）

治勞倦一切虛極欲垂死者肥人陰虛宜服瘦人

不宜服

蒼术一斤泔浸一宿切用韭白一斤切同罨一宿草烏半斤水浸一宿切用鹽四兩罨一宿炒乾川椒四兩炒　甘草三兩

右共爲末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻爲丸如桐子大每服三十丸空心溫酒鹽湯任下婦人淡酢湯下

人參補氣湯（東垣）

黃芪一錢　熟地六分　五味子二十粒　人參防風　升麻　黃蘗　知母各七分　生地白芍藥各五分　肉桂二分　炙甘草三分生甘草一分

右爲粗末作一服水二盞煎一盞去查空心熱服

鍼灸

素問曰足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

靈樞曰少氣身漯漯也言吸吸也骨痠體重懈惰不能動補足少陽

黃帝曰人之嚲者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛諸脈虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故爲嚲因其所在補分肉間

千金方曰章門主四肢懈惰喜怒

五里三陽絡天井厲兌三間主嗜臥四肢不欲動搖

醫案

東垣十書曰戊申六月初樞判白文舉年六十二素有脾胃虛損病目疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食減少氣短上氣怠惰嗜臥四肢不收至六月中目疾復作醫以瀉肝散下數行而前疾增劇予謂大黃牽牛雖除濕熱而不能走經絡下咽不入肝經先入胃中大黃苦寒重虛其胃牽牛其味至辛能瀉氣重虛肺本嗽大作蓋標實不去本虛愈甚加之適當暑雨之際素有黃證之人所以增劇

也此當補脾肺之本虛瀉外經中之濕熱製清神益氣湯主之而愈

丹溪心法曰羅先生治一病僧黃瘦倦怠羅公診其病因乃蜀人出家時其母在堂及遊浙右經七年忽一日念母之心不可遏欲歸無腰纏徒爾朝夕西望而泣以是得病時僧二十五歲羅令其隔壁泊宿每日以牛肉猪肚甘肥等煑糜爛與之凡經半月餘且時以慰諭之言勞之又曰我與鈔十錠作路費我不望報但欲救汝之死命爾察其形稍甦與桃仁承氣一日三貼下之皆是血塊痰積方止次日只與熟菜稀粥將息又半月其人遂如故又半月餘與鈔十錠遂行因大悟攻擊之法必其人充實稟質本壯乃可行也否則邪去而正氣傷小病必重重病必死

衞生寶鑑曰丙辰秋楚丘縣賈君次子二十七歲病四支困倦躁熱自汗氣短飲食減少欬嗽痰涎胷膈不利大便祕形容羸削一歲間更數醫不愈或曰明醫不如福醫某處某醫雖不精方書不明脉候看證極靈治無不效人目之曰福醫頗有可信試命治之

醫至診曰此病予飽諳矣治之必效於肺腧各灸三七壯以鐲飲枳實丸消痰導滯不數服大便溏泄無度腹痛食不進愈添困篤遂卒冬予從軍回其父以告予予曰經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足瀉之則重不足此陰陽俱竭氣血皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣不足補之此其理也令嗣久病羸瘦乃形不足氣短促乃氣不足病躁汗嗜臥四支困懶言語乃氣血皆不足也補之惟恐不及反以毒劑瀉之虛之愈虛損之又損不死何待

薛氏醫按曰文選姚海山中暑頭痛發熱氣高而喘支體倦怠兩手麻木予謂熱傷元氣用人參益氣湯頓安又用補中益氣湯加麥門五味而痊

予甥范允迪欬嗽痰盛胷腹不利飲食少思支體倦怠脈浮大按之微弱服二陳枳殼等藥愈盛予曰脾肺腎虛也用補中益氣六味丸而愈

一婦人腿足無力勞則倦怠予曰四支者土也此屬脾虛當用補中益氣及還少丹主之俱不從予言各執搜風天麻二丸并愈風丹而殞

大參李北泉時吐痰涎內熱作渴支體倦怠勞而足熱用淸氣化痰益甚予曰此腎水泛而爲痰法當補腎不信另進滾痰丸一服吐瀉不止飲食不入頭運眼閉始信予用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸證悉愈

昌平守王天成頭運惡寒形體倦怠得食稍愈勞而益甚寸關脈浮大此脾肺虛弱用補中益氣加蔓荆子而愈後因勞役發熱惡寒譫言不寐得食稍安用補中益氣湯而痊

太息門

黃帝素問

氣交變大論

歲土之復善太息

（註）膽病者善太息蓋木鬱則膽氣不舒故太息以伸出之

五常政大論

少陰司天地迺燥凄滄數至脅痛善太息

（註）肝膽之病也

至眞要大論

歲陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦善太息

註 金勝而肝膽病也

陽明之復清氣大舉病生胠脅氣歸於左善太息

註 病生胠脅氣歸於左者金乘木也善太息者木受金刑腑亦病也

靈樞經

經脈篇

膽足少陽之脈是動則病口苦善太息

註 此少陽之氣不升也少陽主初陽之生氣故膽氣升十一臟腑之氣皆升

脹論

膽脹者脅下痛脹口中苦善太息

註 此衞氣逆於城郭之中而爲腑脹也

漢張機金匱要略

肝中寒證

肝中寒者兩臂不舉舌本燥善太息胷中痛不得轉側食則吐而肝出也

方

半夏湯

治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢汗憎風善太息

半夏　宿薑各一錢五分　黃芩　遠志各一錢

生地黃二錢　秫米一合　酸棗仁三錢炒

右長流水煎服

溫膽湯

治心膽虛怯怔忡多驚太息

半夏製　枳實　白茯苓　陳皮　遠志各一錢
甘草五分　竹茹一丸

右水盞半薑三片棗一枚煎七分服

鍼灸

素問曰足太陰之瘧一令人不樂好太息不嗜食多寒熱一汗出病至則善嘔嘔已乃衰卽取之

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

靈樞曰膽病者善太息口苦嘔宿汁心下憺憺恐人將捕之嗌中吤吤然數唾在足少陽之本末亦視其脈之陷下者灸之其寒熱者取陽陵泉

善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽

逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆刺少陽血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪

黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰憂思則心系急心系急則氣道約約則不利故太息以伸出之補手少陰心主足少陽留之也

甲乙經曰色蒼蒼然太息如將死狀振寒溲白便難中封主之

髀虛令人病寒不樂好太息商丘主之

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰卽取公孫及井腧實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂飲多不嗜臥虛則腹脹腸中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

千金方曰鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息

商丘主髀虛令人病不樂好太息

日月大橫主小腹熱欲走太息

少衝主太息煩滿少氣悲驚

古今圖書集成 之五

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十七卷目錄

醫部彙考三百二十七

中蠱門

孫思邈千金方（論證治）

嚴用和濟生方（論治）

樓英醫學綱目（論證治）

陳士鐸石室祕籙（中蠱）

方（大金牙散　太上五蠱圓　太乙追命圓　又方　萬病圓　又方　犀角圓　又方）

又方　辰砂丸　又方　北地太守酒　丹砂圓　雄麝
散　保靈丹　青黛雄黃散　歸魂
散　桔梗散　石刻方　七寶丸　蜜髓煎
槲皮散　又方　地榆散　茜根散　雄黃散

單方

鍼灸

中毒門

張機金匱要略（禽獸魚蟲禁忌　果食菜穀禁忌）

應劭風俗通（論飲食諸毒）

孫思邈千金方（論五石　論解百藥毒）

張介賓景岳全書（解一切飲食毒　解一切藥毒）

陳士鐸石室祕籙（中砒毒）

方
潔古解毒丸　解毒丸　三因解毒丸　神
仙散　解毒萬病丹　雞腸草散　解毒藥散
礬灰散　青黛雄黃丸　又方　又方

單方

藝術典第三百四十七卷

醫部彙考三百二十七

中蠱門

唐孫思邈千金方

論證治

蠱毒千品種種不同或下鮮血或好臥闇室不欲光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日卽死其死時皆有九孔中或於脅下肉中

出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猫鬼狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初中蠱於心下捺便大炷灸一百壯并主猫鬼亦灸得愈又當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上得者有肉菜出卽愈神驗皆於灸瘡上出

凡中蠱毒令人心腹絞痛如有物嚙或吐下血皆如爛肉若不卽治蝕人五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水沉者是蠱不沉者非蠱也

凡人患積年時腹大便黑如漆或堅或薄或微赤者皆是蠱也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者遍身腫滿四肢如故小便不甚澀以水病治之延日服水藥經五十餘日望得痊愈日復增加奄至殞歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不

可一一備述云耳

凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇涎合作蠱藥者飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥

宋嚴用和濟生方

論治

經書所載蠱毒有數種廣中山間人造作之以蟲蛇之類用器皿盛貯聽其互相食啖有一物獨存者則謂之蠱取其毒於酒食中能禍於人中其毒也令人心腹絞痛如有物咬吐下血皆如爛肉若不卽治蝕人五臟卽死然此病有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊周腹內氣力羸憊骨節沉重發卽心腹煩躁而病人所食之物亦變化爲蠱漸侵食腑臟則死矣死則病流注染著旁人遂成蠱注也欲驗之法令病人唾水沉者是蠱不沉者非蠱也或含一大豆豆脹皮脫者蠱也豆不爛脫非蠱也以鵠皮

置病人臥下勿令病人知病劇者是蠱病不劇者非蠱也治療之法不可作他病治之切須細審古人以敗鼓皮燒灰米飲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名令呼喚將去則愈凡中毒嚼生黑豆不腥白礬味甘皆中毒也

明樓英醫學綱目

論證治

兩廣山間人以蛇虺蜈蚣蜒蚰蝦蟇等百蟲同器畜之使其自相食啖勝者爲靈以祀之取其毒雜以菜果飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或中之證狀萬端或年歲間人多死又有人家香火奉祀如家先者亦謂之蠱能病人世謂之蟲疰以姓類屬五音故謂之五蠱此皆邊陲邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物吐出皆如爛肉若不即治食人五臟即死驗令病人唾水沉者即是有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作末飲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名可語之令呼

嗅將去則愈治之亦有方

驗蠱之法含一大豆其豆脹皮脫者蠱也豆不脹皮不脫者非也又以鵠皮置病人臥所下勿令知覺病甚者是否則非也治療之法必須審而後行試而後可今人偶有積聚脹滿之病類乎蠱者便以爲蠱尤爲非也凡蠱毒之中有緩有急急者十數日便死緩者待以歲月氣力羸敗食盡五臟而後死死則其毒流注於旁人亦成蠱疰矣驗知是蠱宜速服千金牙散太上五蠱圓或濟生丹砂圓

人爲百藥所中傷脈浮濇而疾者生微細者死洪大而遲者生

蛇蠱飲食中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶悶心熱服馬兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

凡諸蠱多是假毒藥以投之知時宜煑大豆甘草薺苨汁飲之通除諸毒藥

山豆根不拘多少如中藥蠱毒密遣人和水研以禁聲服少許不止再服一方用酒調下二錢

食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病

變無常用鐵精細研搗雞肝和爲丸桐子大食前或後酒下五丸

解毒丸治誤食毒中井有物毒救人於必死

青黛雄黃丸凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔作卽服此毒氣不聚

解毒丸善治男子婦人及小兒一切積熱不解停留作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不省人事虛煩發躁赤目口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常服此藥補眞益氣化毒除風神效不可細述

石室祕籙　臣陳士鐸著

中蠱

有中金蠶之毒如兩粵間有金蠶人收留在家用計遣之不去其初有嫁金蠶之法人家感受此蠶則子子孫孫永不脫離最可惡之物也蓋有神人作祟附在此家不肯去人家有不願者將平生所得財物并

將金蠶包裹其內故意置在道旁倘人不知其故拾之而歸則金蠶附於身中而不可脫離矣再禱而再送之斷斷不能也方用雷丸三錢爲末同白礬少許調勻倘見金蠶出見之時輒以末少許滲在蟲身之上立時化爲紅水如血神道必然震怒作祟倘空中有聲卽將此藥末聽其聲音響處望空灑去則神道必大罵負心而去永不再至矣其初起得物之時必然驟富物從空中來其人喜極將金蠶供之廚櫃間晨夕拜禱久之其人面如金色與金蠶相同服藥無效又久之腹大如鼓脹矣當時蜀中盛多此風得金蠶者大約不能出五年必死而金蠶不去也又傳於子孫往往至滅門之禍

方

大金牙散（千金方下同）

治一切蠱毒百疰不祥醫所不治者

金牙　鸛骨　石膏各八分　螌蝥七分　白朮

活草子　胡燕屎　雷丸　龍牙各六分　乾漆

銅鏡鼻　梔子　龜甲　鼈甲　鬼督郵　大黃

桃白皮各四分　徐長卿　桂　羚羊角　芍藥

射干　升麻　鳶尾　馬目毒公　蜂房　細辛

乾薑　硭硝　由跋　犀角屑　生甘草　狼毒

蜣螂　狼牙　雄黃　草龍膽　眞珠各三分

芫花　莽草　射罔　烏梅各二分　鐵精一分

赤小豆一合　蛇蛻皮一尺　樗雞　地膽

芫青各七枚　桃奴　巴豆各二七枚

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之辟百邪治九十九種疰一本有麝香無白朮

太上五蠱圓

治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐貍作魅卒得心痛上叉胷脅痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之

雄黃　椒目　巴豆　莽草　芫花　鬼臼（一作木香）

眞珠（一作木香）　礬石　藜蘆各四分　附子五分

獺肝一分　蜈蚣二枚　盤蝥三十枚

右十三味爲末蜜和更擣二千杵丸如小豆先食飲服一丸餘密封勿泄藥氣十九爲一劑如不中病後日增一丸以下利爲度當下蠱種種狀貌不

可具述下後七日將息服一劑三十年百病盡除

忌五辛

太乙追命圓

治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛積聚臚脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱瘰癧蠱毒婦人產後餘疾

蜈蚣一枚　丹砂　附子　礬石（一作礜石）　雄黃

藜蘆　鬼臼各一分　巴豆二分

右八味爲末蜜丸如麻子一服二丸日一服傷寒

一二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸一丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和摩病上在膈上吐膈下利有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳

又方

治人得藥雜蠱

盤蝥　桂心　藜蘆各如指大　斧月下土如彈大

右四味治下篩服一錢匕下蠱蛇蝦蟆蜣蜋毒俱出

萬病圓

小品名雄黃丸治蠱疰四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀死後轉易於家人一名蠱脹

雄黃　巴豆　莽草　鬼臼各四兩　蜈蚣三枚

右五味爲末蜜和搗三千杵丸如小豆密封勿泄氣宿勿食平旦空腹一丸一炊久不知更加一丸當先下清水次下蠱長數寸及下蛇又下蝦鷄子或白如膏下後作葱豉粥補之百種煖將息

又方

治中蠱毒腹內堅如石面目青黯小便淋瀝病變無常

羖羊皮方五寸　蘘荷四兩半　犀角　芍藥

黃連　牡丹各一兩　梔子仁七枚

右七味㕮咀以水九升煑取三升分三服葛氏崔氏俱無芍藥牡丹梔子用苦參升麻當歸

犀角圓

治蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫

犀角屑　鬼臼屑　桂心末　羚羊角屑各四錢

天雄　莽草　眞珠　雄黃各一兩　蜈蚣五節
貝子五枚燒　射罔如鷄子黃大一枚　麝香
巴豆五十枚

右十三味爲末合擣蜜丸如小豆服一丸日二含咽不知少增之卒得腹滿蜚屍服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗上縫袋子盛藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒可以備急

又方

大戟　盤蝥　五月五日東引桃白皮各四分

右三味治下篩旦空腹以水一鷄子許服八捻用二指相著如開頓服之若指頭相離取藥太多恐能損人

又方

治中蠱下血日數十行者

巴豆二七枚　元靑　藜蘆　附子　礬石各二分

右五味爲末別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大豆許內下部中日三瘥

又方

治下血狀如鷄肝腹中攪痛難忍

茜根　升麻　犀角各三兩　桔梗　黃蘗

黃芩各二兩　地榆　白蘘荷各四兩

右八味㕮咀以水九升煑取二升半分三服此蠱

和血用之

北地太守酒

治萬病蠱毒風氣寒熱

烏頭　甘草　芎藭　黃芩　桂心　藜蘆

附子各四兩　白蘞　桔梗　半夏　柏子仁

前胡　麥門冬各六兩

右十三味七月麴十斤秫米一斛如醞酒法㕮咀藥以絹袋盛之沉於甕底酒熟去糟還取藥滓以青布袋盛沉著酒底泥頭秋七日夏五日冬十日空腹服一合日三以知爲度藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出其狀如漆五十日病悉愈婦人年五十被病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛遶臍絞急上氣胷滿二十餘年服藥二七日所下三四升卽愈又有女人病偏枯終產

服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許卽愈其年生子又有女人小得癲病服十八日出血二升半愈有人被杖崩血內瘀臥著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十七年服藥三十五日鼻中出血三升耳中出黃水五升便愈古方云熹平二年北地太守臣光上然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不愈極難瘥者不過二七日所有效莫不備出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長臥牀枕耳聾一無所聞兩手不收已經三年余爲合之遂得平復如舊有人中蠱毒而先患風眼因於酒傷多吐出蠱數十枚遂愈何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

丹砂圓（濟生方下同）

治蠱毒

雄黃別研　硃砂別研研各半兩　巴豆去心皮油

藜蘆略炒　鬼臼各一分

右爲細末煉蜜爲圓如大豆大每服三圓空心煎乾薑湯送下當轉下惡物幷蠱等當煩悶後以鴨

爲羹食之

雄麝散

治五種蠱毒

雄黃末　麝香末各一字

右件藥取生羊肺如指大以刀割開內二末以肺裹吞之

辰砂丸

一名丹砂丸治蠱毒從酒食中著者

辰砂　雄黃　赤足蜈蚣　續隨子各一兩

麝香二錢半

右爲末糯米飯和丸芡實大每一丸以酒化下端午日合

保靈丹

治蠱毒諸毒一切藥毒神效

硃砂細研　大山豆根各一兩　雄黃　黃丹

麝香　黃藥子　川巴豆肥者取肉不去油

續隨子生杵末　盤蝥去頭足翅各二錢半

糯米半生半炒　赤蜈蚣二條一生一炙

右各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不令鷄犬婦人見用糯米稀糊丸如龍眼核大陰乾磁盒收每一丸好茶清呑下不得嚼破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條聲將毒物下或自口出或大便出嫩則是血老則成鼈或蜣螂諸雜帶命之物藥丸與凝血並下以水洗淨收可救三人如中毒口噤卽挑開下藥或蛇蠍諸毒以好酢磨傳患處立解服藥已效如知毒害之家不必研究若訴之其毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食一月惟輭飯可也或急用但擇吉日精潔修合

青黛雄黃散

凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔作卽服此令毒氣不聚

青黛　雄黃各等分

右研細新汲水調下二錢

歸魂散

凡初中蠱在膈上者當用此藥吐之

白礬　建茶各一兩

右二味爲細末每服五大錢新汲水調下頓服一時久當吐毒食出此藥入口其味甘甜並不覺濇味者是也

桔梗散

桔梗去蘆不以多少擇味苦者剉碎微炒

右爲細末每服三錢米飲調服不拘時候此藥不吐不利加之易爲收買多服有益如服吐利藥後日進二三服使毒氣日漸消散不致再發動也

石刻方

治蠱毒無論年多遠近但煑一鴨卵插銀釵於內並噙之約一食頃取視釵股俱黑卽中毒也

五倍子二兩　硫黃末一錢　丁香　木香
麝香　輕粉各少許　甘草三寸半生半炙
糯米二十粒

右用水十分於瓶內煎至七分候藥面生皺皮爲熟絹濾去滓通口服病人平正仰臥令頭高覺腹中有物衝心者三次卽不得動若吐以盆桶盛之如鯀魚之類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無妨

旋煑白粥補忌生冷油膩鮓醬十日後服解毒丸三五丸經旬平復

七寶丸

治蠱毒

敗鼓皮　蠶退紙各燒存性　刺蝟皮　五倍子

續隨子　硃砂研　雄黃研各等分

右爲細末糯米稀糊和丸如梧桐子大每服七丸空心用熟水送下

蜜髓煎

治中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃病變無常

蜜一椀　猪骨髓研五兩

右同煎令熟分作十服日三服卽瘥

槲皮散

治蠱毒下血如爛肉片心腹疞痛如有物齧若不卽治食人五臟乃死

槲木北陰白皮　桃根白皮並細剉各四兩

蝟皮灰　亂髮灰各一兩　火麻子汁五升

右先以水五盞煑槲皮桃根皮取濃汁二盞和麻

子汁每服煖汁一盞調蝟皮灰髮灰二錢匕令患人少食旦食須臾用水一盞以鷄翎引吐於水中如牛涎諸蠱並出

又方

治中蠱毒下血如肝

萞麻子一粒去皮　朴硝一錢

右細研作一服新汲水調下連作二三服效

地榆散

治蠱毒下血或腹痛或不痛百治不效煩渴不止

臭椿根東引白皮蜜炙焙乾　地榆各半兩

右爲細末每服一錢熱米飲調下

茜根散

治蠱注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

茜根　川升麻　犀角屑　地榆剉　黃芩

黃連炒各一兩

右爲散每服四錢水一中盞煎至六分去查不拘時溫服

雄黃散

治中蠱毒吐血

雄黃研二錢半　蟠蝥去足翅糯米炒十四枚

獺肝炙如棗大　伏龍肝研半兩

右爲細末每服二錢匕空心以酪漿調下或吐蝦蟆及蛇蠱等出效

單方

中蠱吐血麥麪散用小麥麪二合分爲三服以冷水調下半日服盡當下蠱卽瘥

解蠱毒生玳瑁磨汁水服一盞卽消（產乳）

諸蠱用鰻鱺魚乾末空心服之三五度瘥一方燒炙令香食之尤佳其魚有五色文者良

中蠱腹痛支太醫祕方以豬肝一具蜜一升同煎分二十服或爲丸服（肘后方）

解百蠱毒白鴨血熱飲之（廣記）

蠱疰腹痛雄猫屎燒灰水服（外臺）

中惡蠱毒臘月狐腸燒末水服方寸匕（千金下同）

中惡蠱毒車轄脂如雞子大酒化服

蝦蟆蠱病及蝌蚪蠱心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘用車轄脂半斤漸漸服之其蠱卽出（聖惠）

解中蠱毒生羊肺一具割開入雄黃麝香等分吞之（濟生）

解蠱毒取燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和擣丸梧子大每服三丸蠱當隨利而出

中蠱藥毒雖面青脈絕腹脹吐血者服之卽活用蠶退紙燒存性爲末新汲水服一錢（衞生方）

解諸蠱毒不拘草蠱蛇蠱蜣螂蠱其狀入咽刺痛欲死取胞衣一具洗切曝乾爲末熟水調服一錢（梅師方）

食中有蠱腹內堅痛面目青黃瘦瘁淋露骨立病變無常鐵精丸鐵精乃煅鐵爐中如塵紫色輕者爲佳不拘多少研末雞肝和丸梧子大食前後酒下五丸七丸不過十日愈（肘后方）

蟲毒蠱毒雄黃生礬等分端午日研化蠟丸梧子大

每服七丸念藥王菩薩七遍熟水下（東坡方）

中蠱吐血或下血如肝鹽一斤苦酒一升煎化頓服得吐卽愈（小品方）

蠱毒藥毒甘草節以眞麻油浸之年久愈妙每用嚼嚥或水煎服神妙

蛇蠍蠱毒牛蒡子煑汁服之（易簡方）

卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以蘘荷葉密置病人蓆下勿令知之必自呌蠱主姓名也（梅師方）

挑生蠱毒野葛毒幷以升麻多煎頻飲之（直指方）

嶺南有挑生蠱毒於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人已死則陰役其家初得覺胷腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胷膈痛卽用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐卽下李巽巖侍郎爲雷州推官鞫獄得吐方活人甚多也

嶺南里人多於食中毒人漸不能食胷背漸脹先寒似瘴用都淋藤十兩水一斗酒二升煑三升分三服

毒從小便出十日愼食毒物不瘥更服卽馬兜鈴也

中諸蠱毒王瓜根大如指長三寸切以酒半升漬一宿服當吐下（外臺）

一切蠱毒飲薺苨汁立出（本草下同）

又方石蟹熱水磨服自下

又方霹靂碪一名雷楔出雷州并河東山澤間因雷震處掘地得之其形不一有似斧刀者有似銼刀者有二孔者取刮末服立下（雷書）

解中蠱毒山豆根不以多少密遣人和水研已禁聲服少許不止再服

中蠱毒吐下血如猪肝茜草根蘘荷葉各三兩水四升煑二升頓服卽愈自當呼蠱主姓名也（千金）

中蠱毒以淸油多飲取吐（嶺南方）

菜中蛇蠱蛇毒入菜果中食令人得病名蛇蠱大豆爲末酒漬絞汁服半升

人頭面上有光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇狀

解中蠱毒胡荽根擣汁半升和酒服立下神驗（必效方）

中蠱欲死馬齒莧擣汁一升飲并傳之日四五次

卒中蠱毒或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煑一升服立吐卽愈

又方用苦酒一升煑苦瓠令消服之取吐神驗（肘後方）

蠱毒用東引桃枝白皮烘乾大戟盤蝥去足翅熬三物等分爲末以井水服半方寸匕卽出不出更服或因酒得以酒服因食得以食服亦可以米泔丸服（圖經）

中蠱腹痛面目青黃淋露骨立剉棗木心桑木心亦可取一斛水淹三寸煑至二斗澄清煎五升旦服五合取吐卽愈又煎紅水服之能通經脈

金鵞蠱毒吮白礬味甘嚼黑豆不腥者卽是中蠱也石榴根皮煎濃汁服卽吐出活蠱無不愈者（丹溪）

解中蠱毒用未鑽相思子十四枚杵碎爲末溫水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大吐非常輕者但服七枚神效（外臺）

解中蠱毒平胃散以生漆和丸梧子大每空心溫酒下七十丸至百丸

蠱毒百毒及諸熱毒時氣熱病口鼻出血用人屎尖

七枚燒灰水調頓服溫覆取汗即愈勿輕此方神驗者也（外臺）

中諸蠱毒及六畜肉毒用伏龍肝末一雞子大水服取吐

閩廣多蠱或謂凡至旅寓當扣主人云你家有無蠱毒耶問之即不行佛說解蠱毒神呪云姑蘇琢摩耶琢吾知蠱毒生四角父是穹窿窮母是耶舍女眷屬百千萬吾今悉知汝摩訶薩摩訶

中蠱毒梅師方云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人唾於水內沉者是蠱浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須臾自呼蠱主姓名（梅師方）

治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煑二升服之當下蠱蟲即愈（外臺）

蠱毒用槲樹北陰白皮一大握長五寸水三升煑取一升空腹服即吐蟲出亦治中蠱下血（千金下同）

又方蝟皮灰水服方寸匕亦出蟲

中蠱吐下血用櫸皮廣五寸長一尺蘆荻根五寸二

味㕮咀以水二升煑取一升頓服極下蠱

蠱毒下血狀如鷄肝日夜不解欲死桔梗犀角各等分爲末酒服方寸匕日三不能自服絞口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食猪脾臟補養

中蠱先下赤後下黃白沫連年不瘥牛膝一兩搥散切以清酒一升漬一宿平旦空腹服之再服便愈

鍼灸

千金方曰灸蠱毒法於足小指尖上灸三壯即有物出酒飯得之隨酒飯出肉菜得之隨肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出

中毒門

漢張機金匱要略

禽獸魚蟲禁忌

凡飲食滋味以養於生食之有妨反能爲害自非服藥煉液焉能不飲食乎切見時人不閑調攝疾疢競起若不因食而生苟全其生須知切忌者矣所食之味有與病相宜有與身爲害若得宜則益體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之　肝病

禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾辯曰春不食肝者爲肝氣王脾氣敗若食肝則又補肝脾氣敗尤甚不可救又肝王之時不可以死氣入肝恐傷魂也若非王時卽虛以肝補之佳餘臟準此　凡肝臟自不可輕噉自死者彌甚　凡心皆爲神識所舍勿食之使人來生復其報對矣　凡肉及肝落地不著塵土者不可食之　猪肉落水浮者不可食　諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食　諸肉不乾火炙不動見水自動者不可食之　肉中有如朱點者不可食之　六畜肉熱血不斷者不可食之　父母及身本命肉食之令人神魂不安　食肥肉及熱羮不得飲冷水　諸五臟及魚投地塵土不汚者不可食之　穢飯餒肉臭魚食之皆傷人　自死肉口閉者不可食之　六畜自死皆疫死則有毒不可食之　獸自死北首及伏地者食之殺人　食生肉飽飲乳變成白蟲　疫死牛肉食之令病洞下亦致堅積宜利藥下之　脯藏米甕中有毒及經夏食之

發腎病　馬腳無夜眼者不可食之　食酸馬肉不飲酒則殺人　馬肉不可熱食傷人心　馬鞍下肉食之殺人　白馬黑頭者不可食之　白馬青蹄者不可食之　馬肉㹠肉共食飽醉臥大忌　驢馬肉合猪肉食之成霍亂　馬肝及毛不可妄食中毒害人　疫死牛或目赤或黃食之大忌　牛肉共猪肉食之必作寸白蟲　青牛腸不可合犬肉食之　牛肺從三月至五月其中有蟲如馬尾割去勿食食則損人　牛羊猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人腹內生蟲　噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也　羊肉其有宿熱者不可食之　羊肉不可共生魚酪食之害人　羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癲　白羊黑頭食其腦作腸癰　羊肝共生椒食之破人五臟　猪肉共羊肝和食之令人心悶　猪肉以生胡荽同食爛人臍　猪脂不可合梅子食之　猪肉和葵食之少氣　鹿肉不可和蒲白作羹食之發惡瘡　麋脂及梅李子若妊婦食之令子青盲男子傷精　麞肉不可合煆

及生菜梅李果食之皆病人　癇疾人不可食熊肉令終身不愈　白犬自死不出舌者食之害人　食狗鼠餘令人發瘻瘡　婦人妊娠不可食兔肉山羊肉及鼈鷄鴨令子無聲音　兔肉不可合白鷄肉食之令人面發黃　兔肉著乾薑食之成霍亂　凡鳥自死口不閉翅不合者不可食之　諸禽肉肝青者食之殺人　鷄有六翮四距者不可食之　烏鷄白首者不可食之　鷄不可共胡蒜食之滯氣　山鷄不可合鳥獸肉食之　雉肉久食之令人瘦　鴨卵不可合鼈肉食之　婦人妊娠食雀肉令子淫亂無恥　雀肉不可合李子食之　燕肉勿食入水爲蛟龍所噉　魚頭正白如連珠至脊上食之殺人　魚頭中無腮者不可食食之殺人　魚無腸膽者不可食之三年陰不起女子絶生　魚頭似有角者不可食之　魚目合者不可食之　六甲日勿食鱗甲之物　魚不可合鷄肉食之　魚不得合鸕鷀肉食之　鯉魚鮓不可合小豆藿食之其子不可合猪肝食之害人　鯉魚不可合犬肉食之　鯽魚不可合猴

雉肉食之一云不可合猪肝食　鯷魚合鹿肉生食令人筋甲縮　青魚鮓不可合生胡荽及生葵幷麥中食之　鰌鱓不可合白犬血食之　黿肉不可合酒果子食之　鼈目凹陷者及厭下有王字形者不可食之　其肉不得合鷄鴨子食之　黿鼈肉不可合莧菜食之　鰕無須及腹下通黑煑之反白者不可食之　食膾飲乳酪令人腹中生蟲爲瘕　蟹目相向足斑目赤者不可食之　凡蟹未遇霜多毒其熟者乃可食之　蜘蛛落食中有毒勿食之　凡蜂蠅蟲蟻等多集食上食之致瘻

果實菜穀禁忌

果子生實生瘡　果子落地經宿蟲蟻食之者人大忌食之　生米停留多日有損處食之傷人　桃子多食令人熱仍不得入水浴令人病淋瀝寒熱病　杏酪不熟傷人　梅多食壞人齒　李不可多食令人臚脹　林檎不可多食令人百脉弱　橘柚多食令人口爽不知五味　梨不可多食令人寒中金瘡產婦亦不宜食　櫻桃杏多食傷筋骨　安石榴不

可多食損人肺　胡桃不可多食令人動痰飲　生棗多食令人熱渴氣脹寒熱羸瘦者彌不可食傷人　木耳赤色及仰生者勿食　菌仰卷及赤色者不可食　正月勿食生葱令人面生游風　二月勿食蓼傷人腎　三月勿食小蒜傷人志性　四月八日勿食胡荽傷人神　五月勿食韭令人乏氣力　五月五日勿食一切生菜發百病　六月七月勿食茱萸傷神氣　八月九月勿食薑傷人神　十月勿食椒損人心傷心脉　十一月十二月勿食薤令人多涕唾　四季勿食生葵令人飲食不化發百病非但食中藥中皆不可用深宜慎之　時病差未健食生菜手足必腫　夜食生菜不利人　十月勿食被霜生菜令人面無光目澀心痛腰疼或發心瘧瘧發時手足十指爪皆青困委　葱韭初生芽者食之傷人心氣　飲白酒食生韭令人病增　生葱不可共蜜食之殺人獨顆蒜彌忌　棗合生葱食之令人病　生葱和雄雞雉白犬肉食之令人七竅經年流血　食糖蜜後四日內食生葱韭令人心痛　夜食諸薑

蒜葱等傷人心　蕪菁根多食令人氣脹　薤不可共牛肉作羹食之成瘕病韭亦然　蓴多食動痔疾　野苣不可同蜜食之作內痔　白苣不可共酪同食作䘌蟲　黃瓜食之發熱病　葵心不可食傷人葉尤冷黃背赤莖者勿食之　胡荽久食之令人多忘　病人不可食胡荽及黃花菜　芋不可多食動病　妊婦食薑令子餘指　蓼多食發心痛　蓼和生魚食之令人奪氣陰欬疼痛　芥菜不可共兎肉食之成惡邪病　小蒜多食傷人心力　扁豆寒熱者不可食之　久食小豆令人枯燥　食大豆屑忌噉猪肉　大麥久食令人作熱　白黍米不可同飴蜜食亦不可合葵食之　荍麥麪多食之令人髮落　鹽多食傷人肺　食冷物冰人齒　食熱物勿飲冷水　飲酒食生蒼耳令人心痛　夏月大醉汗流不得冷水洗著身及使扇即成病　飲酒大忌灸腹背令人腸結　醉後勿飽食發寒熱　飲酒食猪肉臥秫稻穰中則發黃　食飴多飲酒大忌　凡水及酒照見人影動者不可飲之　酢合酪食之令人血

瘕　食白米粥勿食生蒼耳成走疰　食甜粥已食鹽卽吐　犀角筋攪飲食沫出及澆地墳起者食之殺人　礬石生入腹破人心肝亦禁水　商陸以水服殺人　葶藶子傅頭瘡藥成入腦殺人　水銀入人耳及六畜等皆死以金銀著耳邊水銀則吐　苦楝無子者殺人

應劭風俗通

論飲食諸毒

禽獸自死者俱有毒不可食　魚無腮者有毒腮大者亦有毒　鼈肚下有紅藻紋者有毒　蟹腹下有毛者有毒　煑酒初出火者有毒江南謂之火頭酒飲之則生痔溢血　夏月飲食但過宿者卽有毒　夏月酒在銅錫器中過夜卽有毒　銅氣蓋熱食氣上蒸成汗滴下食中卽有毒　炊湯過宿飲之有毒盥洗則生疥　桃杏仁雙仁者毒能殺人　果未成核者俱有毒令人發瘡癤　夏秋果熟落地蟲緣者有毒人食之作漏　屋漏水有毒人食之有脹而死者用之沐手則生浸淫之疥屢驗　澤中死水有毒

飲之令人生瘕　湯池中溫泉水不可飲令人脹悶惟澡浴可以疎風愈疥癩蓋其泉自硫黃中出故溫也患疥者宜飽食入浴之連日數次汗透而愈體虛者不可輕浴

唐孫思邈千金方

論五石

人不服石以庶事不佳惡瘡疥癬溫疫瘧疾年年常患寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年三十以上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足溫煖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服之凡石皆熟鍊用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一切冷食惟酒須溫

又曰凡服石人甚不得雜食口味雖百品具陳終不用重食其肉諸雜旣重必有相賊聚積不消遂動諸石如法時心將攝得所石藥爲益善不可加余年三十八九常服五六兩乳自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地淸白光潤羅紋鳥翮一切皆成白可入服其非土地者愼勿服之多皆殺人甚於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顚覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不愼也有識者遇此方卽須焚之勿久留也

論解百藥毒

甘草解百藥毒實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖卽止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解

百藥毒余每試之大懸絕不及甘草又能加之爲甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸致嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾　石藥毒用白鴨屎人參汁　雄黃毒用防己　鐵粉毒用磁石　礜石毒用大豆汁白鵝骨　防葵毒用葵根汁　大戟毒用菖蒲汁　桔梗毒用白粥　甘遂毒用大豆汁　蹢躅毒用梔子汁　雞子毒用淳酢　馬刀毒用清水

野芋毒用土漿人糞汁　杏仁毒用藍子汁　百藥毒用甘草薺苨大小豆汁藍葉根實汁　金銀毒用水銀服數兩即出雞子汁及屎白燒猪脂和水淋雞屎汁　芫花毒用防己防風甘草桂汁　野葛毒用雞子清葛根汁甘草汁鴨頭熱血猪膏雞屎人屎　藜蘆毒用雄黃溫湯煑葱汁　烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防風棗肉飴糖　射罔毒用藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁藕芰汁六畜血貝齒屑蚯蚓屎　半夏毒用生薑汁及煑乾薑汁　莨菪毒用薺

芫甘草犀角蟹汁升麻　狼毒毒用杏仁藍汁白蘞鹽汁木占斯　巴豆毒用煑黃連汁大豆汁菖蒲汁生藿汁（肘後云小豆藿）煮寒水石汁　蜀椒毒用葵子汁蒜桂汁豉汁人尿冷水土漿雞毛燒吸煙及調水服　盤蝥芫青毒用猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煑猪膏巴豆　服藥過劑悶亂者用水和胡粉水和葛粉地漿蘘荷汁秔米瀋豉汁乾薑黃連飴糖飲藍汁吞雞子黃

景岳全書

臣張介賓著

解一切飲食毒

芝麻油總能解一切飲食諸毒不可不知凡造餚饌必先用眞麻油於淨鍋熬熟却下肉炒過然後入清水煑之則並不犯毒今徽州池州地方食牛肉不論春夏無日不食惟製之有方所以鮮有中毒但犯一切飲食毒者卽用麻油一二杯飲之得吐卽毒釋而無不愈者

善解毒者無如火蓋火能革物之性

解一切藥毒

凡解諸藥毒者宜以薺苨汁白扁豆汁菉豆汁甘草汁餳糖汁米糖汁蠶退紙燒灰隨便用之俱可解

凡解毒藥湯劑不可熱服宜涼飲之蓋毒得熱而勢愈盛也雖然此特以熱毒爲言耳若解木鼈菌蕈黃連石膏之類以中陰毒者豈仍避熱而猶堪以寒飲乎

石室祕籙　臣陳士鐸著

中砒毒

世人有服砒霜之毒五臟欲裂者腹必大痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也方用瀉毒神丹大黃二兩生甘草五錢白礬一兩當歸三兩水煎湯數椀飲之立時大瀉則生否則死矣此砒毒已入於臟非可用羊血生甘草上吐而愈我所以又變下法救之飲之而不瀉此腸已斷矣又何救乎倘用之早未有不生者不可執吐法而無變通若初飲砒毒莫妙用生甘草三兩急煎湯加羊血半椀和勻飲之立吐而愈若飲之不吐速用大黃之方則無不可救也

方

潔古解毒丸

善治男子婦人及小兒一切積熱不解停畱作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴伏暑困悶霍亂不寧或山嵐瘴氣及食毒酒毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不省人事虛煩發躁目赤口瘡善解四時傷寒之疾發散瘟疫毒邪之氣及四方人不服水土一切諸毒並皆解之常服補眞益氣化毒除風神效不可細述

滑石　黃芩　貫衆　茯苓　山梔子　乾薑
草龍膽　大豆　青黛　甘草　薄荷　寒水石各
一兩　百藥煎　砂仁　大黃　山豆根　桔梗
生地　益智　紫河車（卽蚤休）　菉豆粉　馬屁勃
板藍根　黃藥子各半兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸新汲水化下細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦人血運不省生薑薄荷水磨下一丸

解毒丸

解世間一切不測毒

山豆根　山慈姑　菉豆粉各三兩　板藍根
土馬椶　黃藥子　紫河車　續隨子仁　木通
盆硝　藿香　五味子　薄荷　寒水石
白殭蠶　乾葛　雄黃　百藥煎　茜草根
大黃　朱砂各二兩　麝香半兩　甘草　臘月竹筒
盛置糞清內春月取出陰乾四兩

右爲細末蒸餅和丸如彈子大以螺青三兩和勻留一半爲衣每服半丸用生薑蜜水化下

三因解毒丸

治誤食毒草并百物毒救人於必死

板藍根洗淨曬乾四兩　貫衆剉去毛　青黛研　生甘草各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大以青黛爲衣如稍覺精神恍惚即是誤中諸毒即取十五丸爛嚼用新汲水送下即解或用水浸蒸餅爲丸尤佳常服三五丸大解暑熱

神仙散毒萬病丹

一名玉樞丹一名紫金錠治一切藥毒菰子毒鼠莽毒惡菌蕈金石毒喫疫死牛馬肉毒河豚毒時行瘟疫山嵐瘴瘧忽喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼瘡癤衝冒寒暑熱毒上攻或自縊溺水打撲傷損癰疽發背未破魚臍瘡腫湯火所傷百蟲鼠犬蛇傷男子婦人或中顛邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之凡人居家或出入不可無此藥眞濟世衞家之寶如毒藥嶺南最多若適宦嶺纔覺意不快便服之即安二廣山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若

人以急水吞之急死緩水吞之緩死又取毒蛇殺之以草覆上以水洒之數日菌生其上取爲末酒調以毒人始亦無患再飲酒卽毒發立死其俗淫婦人多自配合北人與人情分相好多不肯遂北人回陰以藥置食中北人還卽戒之曰子某年來若從其言卽復以藥解之若過期不往卽死矣名曰定年藥北人居彼亦宜誌之若覺中毒四大不調卽便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉下藥復食此物卽觸發其毒急服此藥一粒或吐或利隨服便瘥昔有一女子久患勞瘵病爲屍蟲所噬磨一粒服之一時久吐下小蟲千餘條一大者正爲兩段後只服蘇合香丸半月遂復如常至牛馬六畜中毒亦以此救之無不效

山慈姑去皮洗極淨焙　川文蛤搥破洗極盡炒乾各二兩（一名五倍子）　麝香揀盡血毛皮殼細研三錢

千金子去殼紙包裹以去盡油爲度（一名續隨子）

紅芽大戟去蘆根洗極淨焙乾各一兩

右各研爲細末和勻以糯米粥爲劑每料分作四

十粒於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝子不具足人雞犬之類見之切宜祕惜不可廣傳輕之無效

如癰疽發背未破之時用冷水磨塗痛處幷磨服良久覺痒立消

陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胷膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下

急中癲邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用煖無灰酒下

自縊落水死心頭煖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下

蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處

諸般瘧疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨下

小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷葉同磨下

牙關緊急磨塗一丸分作三服量大小與之

牙痛酒磨塗及含藥少許吞下

湯火傷東流水磨塗患處

打撲傷損炒松節無灰酒下

年深日近頭疼太陽疼用酒入薄荷葉磨紙花貼太陽穴上

諸般癎疾口眼喎斜眼目掣眨言語謇澀卒中風口噤牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱辛一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服一方加山豆根全蠍朱砂雄黃各一兩

解諸毒

雞腸草散（千金方下同）

雞腸草三分　薺苨　升麻各四分　芍藥　當歸　甘草各二分　坌土一分　藍子一合

右八味治下篩水服方寸匕多飲水爲佳若爲蜂蛇等毒蟲所螫以針刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕瘥爲射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以絲纏繞水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出卽休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥散

薺苨一分　藍并花二分

右二味七月七日取藍陰乾搗篩水和服方寸匕日三

礬灰散

治中諸物毒

晉礬　建茶各等分

右件藥爲細末每服二錢新汲水調下得吐即效未吐再服

青黛雄黃丸

凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔作服此毒氣不聚

青黛　雄黃各等分

右爲細末新汲水調下二錢

又方

解砒毒

巴豆半粒用半邊去殼不去白　白扁豆　青黛

甘草

右同爲末用沙糖一大塊水化開調一大盞飲之砒毒隨利去却服五苓散之類

又方

解砒毒

漢椒四十九粒　黑豆十四粒　甘草節二寸碎

烏梅二箇

右㕮咀用水一盞煎至七分溫服

單方

治自死六畜肉中毒方黃蘗屑擣服方寸匕（金匱下同）

治食鬱肉漏脯中毒方鬱肉密器蓋之隔宿者是也漏脯茅屋漏下沾著者是也燒犬屎酒服方寸匕每服人乳汁亦良或飲生韭汁三升亦得

治黍米中藏乾脯食之中毒方大豆濃煑汁飲數升卽解亦治貍肉漏脯等毒

治食生肉中毒方掘地深三尺取其下土三升以水五升煑數沸澄清汁飲一升卽愈

治六畜鳥獸肝中毒方水浸豆豉絞取汁服數升愈

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和日再服屎尖者是

又方人垢取方寸匕服之佳

治食馬肉中毒欲死方香豉二兩杏仁三兩二味蒸一食頃熟杵之日再服

又方煑蘆根汁飲之良

治噉蛇牛肉食之欲死方飲人乳汁一升立愈

又方以泔洗頭飲一升愈

又方牛肚細切以水一斗煑取一升煖飲之大汗出者愈

治食牛肉中毒方甘草煑汁飲之即解

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下方用杏仁一升合皮研爛以沸湯三升和取汁分三服利下肉片大驗

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方大豆煑汁及鹽汁服之解

鱠食之在心胷間不化吐復不出速下除之久成癥

病治之方橘皮一兩大黃二兩朴硝二兩三味以水一大升煑至一小升頓服卽消

食鱠多不消結爲癥病治之方馬鞭草擣汁飲之或以薑葉汁飲之一升亦消又可服吐藥吐之

食魚後食毒兩種煩亂治之方橘皮濃煎汁服之卽解

食鯸鮧魚中毒方蘆根煑汁服之卽解

食蟹中毒治之方紫蘇煑汁飲之三升或紫蘇子擣汁飲之亦良

又方冬瓜汁飲二升食冬瓜亦可

食諸果中毒治之方猪骨燒過一味末之水服方寸匕亦治馬肝漏脯等毒

食諸菌中毒悶亂欲死及食楓桂菌而笑不止野芋煩毒欲死治之方人糞汁飲一升或土漿飲一二升或大豆濃煑汁飲之或服諸吐利藥並解

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣病欲絕或吐下白沫身體痹冷急治之方肉桂煎汁飲之或多飲冷水一二升或食蒜或飲地漿或濃煑豉汁飲之並

解

食躁方豉濃煑汁飲之

鉤吻與芹菜相似誤食之殺人解之方薺苨八兩水六升煑取二升分溫二服

菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂亂狀如中風或吐血治之方甘草煮汁服之卽解

春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之爲病發時手背腹滿痛不可忍名蛟龍病治之方硬糖二三升日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差

食苦瓠中毒治之方黍穰煑汁數服之解

飲食中毒煩滿治之方苦參三兩苦酒一升半二味煑三沸三上三下服之吐食出卽差或以水煑亦得又服犀角湯亦佳

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方鹽一升水三升煮令鹽消兩三服當吐出食便差

凡諸毒多是假毒以投元知時宜煑甘草薺苨汁飲之通除諸毒藥

中砒石烏啄毒多飲新汲井水得吐利佳（集簡方）

中蒙汗毒飲井華冷水即愈

中煤炭毒一時運倒不救急以清水灌之

卒中水毒初覺頭目微痛惡寒骨節強急旦醉夕劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰食至五臟殺人也搗蒼耳絞汁服一二升井以綿染導其下部（肘后方）

中川烏草烏一切藥毒及六畜肉毒用多年塵壁東土泡湯服之冷水亦可（通變要法）

中金石藥毒黑鉛一斤鎔化投酒一升如此十餘次待酒至半升頓飲

中輕粉毒出山黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲

中砒霜毒煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾黑鉛四兩或錫器亦可磨水一碗灌之（危病方）

中硫黃毒黑錫煎湯服即解（集簡方）

中諸藥毒釵子股煮汁服亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰

中飲食毒雌黃青黛等分爲末每服二錢新汲水下（鄧筆峯方）

乳石發動煩悶芒硝蜜水調服一錢日三服（聖惠）

飲食毒物硼砂甘草各四兩眞香油一斤瓶內浸之遇有毒者服油一小琖久浸尤佳（瑞竹堂）

山嵐瘴毒瘡毒幷中諸毒錦地羅根研生酒服一錢匕卽解

中砒石毒白芷末井水服二錢（廣記下同）

中砒霜毒鬱金末二錢入蜜少許冷水調服

一切食毒砂仁末水服一二錢

解輕粉毒齒縫出血臭腫貫衆黃連各半兩煎水入冰片少許時時漱之（積德堂方）

中烏頭天雄附子芫花野菌毒並用防風煎汁飲之（千金）

中諸毒藥已死只要心中溫煖者乃是熱物犯之只用防風一味擂冷水灌之（積善堂方）

金石藥發麥門冬六兩人參四兩甘草炙二兩爲末蜜丸梧子大每服五十丸飲下日再服（圖經）

食丹藥毒萱草根研汁服之（廣記）

丹石發動口乾欬嗽者每食後飲冬月葵虀汁一琖便臥少時（食療）

馬汁毒氣入腹葶藶一兩炒研水一升浸湯服取下惡血（十全方）

卒中水毒搗藍青汁傅頭身令匝（肘后方下同）

服藥過劑煩悶及中毒欲死搗藍汁服數升

誤吞水蛭青靛調水飲即瀉出（普濟方）

中鼠莽毒金線重樓根磨水服即愈（集簡方）

一切菌毒因蛇蟲毒氣熏蒸所致芫花生研新汲水服一錢以利爲度

食雉中毒吐下不止用生犀角末方寸匕新汲水調服即瘥（聖惠下同）

食物中毒貝子一枚含之自吐又治漏脯毒麪臛毒及射罔在諸肉中有毒並用貝子燒研水調五分服

中河豚及砒石毒倉卒無藥急以麻油灌之多灌取出毒物即愈（易簡方）

丹石毒發發熱者不得食熱物不用火爲便但著厚

衣暖臥取麻油一匙含嚥戒怒二七日也

中野菌毒急采鴛鴦草啖之卽今忍冬草也（夷堅志）

中一切毒石菖蒲白礬等分爲末新汲水下（廣記）

中水毒病手足指冷至膝肘卽是以浮萍日乾爲末飲服方寸匕良（集驗方）

中鼠莽毒鏡面草取自然汁淸油各一盃和服卽下毒三五次以肉粥補之不可遲（醫說）

解雄黃毒防己煎汁服之

中砒石毒稻草燒灰淋汁調靑黛三錢服（摘要）

一切毒藥及鴆毒煩懣不止用甘草三兩水五升煑取二升去查入黍米粉一兩白蜜三兩煎如薄粥食之（外臺 下同）

乳石發熱烏豆二升水九升銅器煑五升汁熬稠一升飲之

中巴豆礜砒魚肉酒食毒大豆煑汁飲之（肘后方）

六畜肉毒小豆一升燒研水服三方寸匕神良（千金）

解燒酒毒菉豆粉盪皮多食之卽解

解鴆酒毒幷諸藥毒已死但心頭溫者用菉豆粉三

合水調服（易簡方）

解砒石毒菉豆粉寒水石等分以藍根汁調服三五錢（外臺）

服石毒發胡豆半升擣研以水八合絞汁飲之即愈

中砒霜毒白扁豆生研水絞汁飲（永類方）

六畜肉毒白扁豆燒存性研水服之良（廣記）

諸鳥肉毒生扁豆末冷水服之

小蝦蟆有毒食之令人小便祕澀臍下悶痛有至死者以生豉一合投新汲水半碗浸濃汁頓飲之即愈（茅亭客話）

服藥過劑悶亂者豉汁飲之（千金方）

服藥過劑悶亂井中草烏天雄附子毒並食飴糖即解（總錄）

中砒石毒飲釅酢得吐即愈不可飲水亦治食雞子毒（廣記）

狼煙入口以酢少許飲之（祕方）

解金銀毒葱白煑汁飲之（外臺）

解鉤吻毒面青口噤欲死以葱涕啖之卽解（千金）

鬱肉脯毒杵薤汁服二三升良（葛洪方）

食蟹中毒乾蒜煑汁飲之（集驗方）

閉口椒毒氣閉欲絕者煑蒜食之

食諸肉毒吐下血不止痿黃者胡荽子一升煑令發裂取汁冷服半升日夜各一服卽止（食療）

食魚中毒冬瓜汁飲之良（小品方）

解狼毒毒杏仁搗爛水和服之（千金）

硫黃毒發令人背膊疼痛目暗漠漠烏梅肉焙一兩沙糖半兩漿水一大琖煎七分呷之（總錄）

中水毒病初起頭痛惡寒心煩拘急旦醒夕劇梅葉搗汁三升飲之良

食椒閉氣京棗食之卽解也（百一）

中水毒病初起頭痛惡寒拘急心煩用梨葉一把搗爛以酒一琖攪飲之（醫中集）

中桐油毒乾柹餅食之

中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用楊梅木皮煎湯二三椀服之卽愈（易簡方）

解諸中毒芽茶白礬等分碾末冷水調下（簡要方）

食蟹中毒生藕汁飲之（聖惠方）

中砒石毒桐油三升灌之吐卽毒解

鼠莽砒毒烏桕根半兩擂水服之（醫方大成）

解中藥毒巴豆去皮不去油馬牙消等分研細冷水服一彈丸

解百毒氣桑白皮汁一合服之須臾吐利自出（肘后方）

解丹石毒發熱困篤肥猪肉五斤葱薤各半斤煑食或作臛食必腹鳴毒下以水淘看沙石盡則愈（千金翼）

服石發熱猪腎脂一具勿中水以火炙取汁每服三合日夜五六服毒隨大便下（總錄）

食金中毒已死取雞矢半升水淋取汁一升飲之日三（肘後方）

解野葛毒已死者挖開口灌雞子三枚須臾吐出野葛乃甦（肘後方）

胡蔓野毒卽斷腸草一葉入口百竅流血惟急取鳳凰胎卽雞卵抱未成雛者已成者不用研爛和麻油灌之吐出毒物乃生少遲卽死（衛生方）

閉口椒毒氣欲絕或出白沫身體冷急煎桂汁服之多飲新汲水二三升（梅師方）

乳石熱毒壅悶頭痛口乾便漩赤少者用蜂房煑汁五合服乳石末從小便中下大效圖經云用十二分炙以水二升煑八合分服

藥毒上攻如聖散用蜂房甘草等分麩炒黃色去麩爲末水二盌煎八分臨臥頓服明日取下惡物（經驗方）

中諸菜毒發狂吐下欲死用雞矢燒末水服方寸匕（葛氏方）

解一切毒母猪屎水和服之（千金）

丹石發毒頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝服二三升（錄驗）

硫黃毒發氣悶用羊血熱服一合效（聖惠）

解蜀椒毒雞毛燒煙吸之井水調一錢服之（千金）

諸毒卒惡熱悶欲死者新屎汁水和服或乾者燒末漬汁飲名破棺湯（蘇恭）

合口椒毒人尿飲之（肘後方）

解諸菜毒小兒尿和乳汁服二斗（海上方）

自死肉毒故頭巾中垢一錢熱水服取吐

鷓鴣肉主治嶺南野葛菌子毒生金毒及溫瘴久病欲死者合毛熬酒漬服之或生搗汁服最良（唐本）

食蟹致傷丁香末薑湯服五分（證治要訣）

中河豚毒五倍子白礬末等分以水調下（廣記）

中諸藥毒用蠶紙數張燒灰冷水服方（易簡）

有人服伏火丹藥多腦後生瘡熱氣冉冉而上一道人教灸風市數十壯而愈仍時復作又教以陰煉秋石用大豆黃卷煎湯下遂愈和其陰陽也（清明餘話）

飲食中毒煩滿苦參三兩㕮咀以酒二升半煮取一升頓服即吐愈（千金下同）

食百物中毒掘廁旁地深一尺以水滿坑中取廁籌七枚燒令煙以投坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地著水即取飲之

又方含貝子一枚須臾吐食物瘥

食六畜肉中毒各取六畜乾屎爲末水服佳若是自死六畜肉毒水服黃蘗末方寸匕須臾服與佳

諸食中毒飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良

中藥毒者取秦燕毛二七枚燒灰服

中野葛毒已死口噤者取青竹去兩節注兩脅臍上內冷水注之煖即易須臾口開開即服藥立活惟須數易水

腹中有鐵取白折鐵刮取末井華水服三錢不過再服

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十八卷目錄

醫部彙考三百二十八

中惡門

孫思邈千金方（飛尸鬼疰　鬼擊　卒忤）

樓英醫學綱目（中惡　五尸）

徐春甫古今醫統（邪祟敘論　病自心生　禁呪服藥兼治　脈候）

王肯堂證治準繩（中惡）

陳士鐸石室祕籙（中邪）

方　還魂湯　又方　五疰湯　蜈蚣湯　又方　又方　桃皮湯　桃奴湯　小附著湯　大附著湯　大金牙散　金牙散　白朮散　太乙備急散　龍牙散　又方　黑奴散　鸖骨圓　蜥蜴圓　桔梗圓　十疰圓　太乙神明陷冰圓　江南度世圓　大度世圓　又方　雷氏千金圓　又方　八毒赤散　雄朱散　五邪湯　太乙神精丹　辟邪丹　蘇合香九

單方

鍼灸

醫案

卒中暴死門

黃帝素問　六元正紀大論　五常政大論　大奇論　脈要精微論　王機眞臟論　歲露論　五色篇

張機金匱要略　尸蹷

樓英醫學綱目　卒中暴厥

徐春甫古今醫統　卒死

王肯堂證治準繩　卒中暴厥

陳士鐸石室祕籙　暴死

方　黃龍九　還魂湯　破棺散　朱砂九　朱犀散　韭根茱萸湯　蘇合香丸　三物備急九　又方　附子理中湯

單方
鍼灸
醫案

藝術典第三百四十八卷

醫部彙考三百二十八

中惡門

唐孫思邈千金方

飛尸鬼疰

尸疰鬼疰者卽五尸之中尸疰又挾諸鬼邪爲害者也其變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復疰易旁人乃至滅

門覺知此候者宜急療之

凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣息急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及女人血堅痛發作無定者神良

鬼擊

鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或卽吐血或鼻口血出或下血一名鬼排

卒忤

卒忤卽中惡也與卒死鬼擊相類治皆叅取而用之

明樓英醫學綱目

中惡

病者卒心腹脹滿利吐不行如乾霍亂狀世所謂中惡是也由人精神不全心志多恐遂爲邪鬼所擊或附著沉沉默默妄言譫語誹謗罵詈訐露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮未失人有起心已知其故登高陟險如履平地或悲泣呻吟不

欲見人如醉如狂其狀萬端但隨方俗攷驗治之

五尸

飛尸者發無由漸昏然而至其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿遁尸者停遁在人肌肉血脉之間觸卽發動亦令人心腹脹滿刺痛喘急攻脅衝心瘥後復發沉尸者發時亦心腹絞痛脹滿喘急雖歇之後猶沉痼在人腑臟令人無處不惡風尸者在人四肢循環經絡其狀冷躍去來沉沉默默不知痛處衝風則發伏尸者其病隱伏五臟積年不除未發身體都如無患發則心腹刺痛脹滿喘急又有諸尸疰候者則是五尸內之尸疰而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝或腹痛脹滿喘急或礨塊踊起或攣引腰背或舉身沉重精神錯雜恆覺昏謬每節氣改變輒致大惡積年累月漸至頓滯以至於死死後復易旁人乃至滅門故爲尸疰皆用忍冬藤葉剉數斛煮令濃取汁煎服日三瘥

徐春甫古今醫統

邪祟敘論

內經曰邪氣盛則實正氣奪則虛夫經之所謂邪者風寒暑濕燥火有餘之淫邪耳非若世俗所謂鬼神之妖怪也病有心虛驚惕如醉如癡如有邪鬼所附或陽明內實以致登高而歌棄衣而走皆痰火之所爲實非鬼妖邪祟之所迷也古雖有禁呪一科及龍樹呪法之治皆移精變氣之術但可解疑釋惑以使心神之歸正耳何邪祟之可祛哉

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斥邪惡鬼祟而病也如病此者未有不因氣血先虧而致者氣血者心之神也神既衰乏邪因而入理或有之血氣兩虛痰塞心竅妨碍升降不得運行以致十二官各失其職視聽言動皆爲虛妄以邪治之其人必死

病自心生

凡山谷幽隱處所或有魍魎魑魅狐精狸怪及人間多年雞犬亦間有成妖縱使迷人則不過近於氣血虛而正氣弱者正氣弱卽心邪心邪則妄見妄聞妄言妄走無非邪也惟邪見邪故有之矣正人無病者皆不得見從可審矣惟此心一正則百邪俱避何邪

祟之疑哉

禁呪服藥兼治

治邪祟病雖禁呪以釋其疑服藥必詳虛實痰火輕重調治則內外合一其病速愈若只務巫而不用藥其病不能去必無可愈之理若只服藥而不用巫以釋疑雖愈效遲是故內外兼治斯速效矣此祝由之所由設也

脉候

乍疎乍數乍大乍小或促或結皆邪脉也脉緊而急爲遁屍脉滑者爲鬼疰

王肯堂證治準繩

中惡

中惡之證因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或頭旋運倒昏不知人卽此是卒厥客忤飛尸鬼擊弔死問喪入廟登塚多有此病蘇合香丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣平胃散

石室祕籙

臣陳士鐸著

中邪

急治者不可須臾緩也如人中邪實由於痰方用人參白朮半夏各三錢皂角末陳皮各一錢水煎服此方之妙在皂角能開人之孔竅引羣藥直入心經而痰之迷滯無不盡開痰去邪將何留

方

還魂湯（仲景下同）

治卒死客忤死

麻黃去節二兩（一本四兩） 杏仁去皮尖雙仁七十箇

甘草炙一兩

右三味以水八升煑取三升去滓分令嚥之通治諸感忤

又方

韭根一把 烏梅二七枚 吳茱萸半升炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中煮三沸櫛浮者生沉者死煮取三升去滓分飲之

五疰湯（千金方 下同）

治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛脹急

大黃　甘草各三兩　當歸　芍藥各二兩

烏頭十枚　生薑　蜜各一斤　桂心四兩

右八味㕮咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服三合如人行三十里久更進一服日三不止加至四合

蜈蚣湯

治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四支煩痛羸乏短氣

蜈蚣一枚　牛黃一分　大黃二兩　丹砂

人參各三分　細辛　鬼臼　當歸　桂心

乾薑各一兩　黃芩　麝香各半兩　附子四枚

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝香末分三服

又方

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時搶心胷滿脅痛如刀刺口噤者

甘草　乾薑　茯苓　乾地黃　羊脂　當歸
細辛各一兩　芍藥　吳茱萸　桂心各二兩
梔子仁十五枚

右十一味㕮咀以水八升煮取三升去滓內脂烊盡分三服欲利者加大黃三兩

又方

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸心腹絞痛

乾地黃　茯苓　芎藭　當歸　甘草各一兩
吳茰　桂心　乾薑　芍藥各二兩　梔子十四枚

右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加羊脂二兩當歸人參芍藥各一兩心腹堅急加大黃三兩

桃皮湯

治中惡氣心腹痛胷脅脹滿短氣

東引桃白皮一握　眞珠　附子各一兩　吳茰
豉各五合　梔子十四枚　當歸三兩　桂心二兩

右八味㕮咀以水五升煮取二升去滓內眞珠末分作二服一方無當歸吳茱萸桂心

桃奴湯

治中惡諸尸蠱疰心腹卒絞痛

桃奴　當歸　人參　乾薑各二兩　芎藭

甘草各三兩　丹砂　麝香　茯苓　犀角

鬼箭羽　桂心各一兩

右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分二服未食服大便不通腹滿者加大黃三兩芒硝二兩胡洽有雄黃一兩無砂芎藭

小附著湯

治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發一日半日乃瘥須臾復發者

細辛　甘草（一作莽草）　天雄各一分　桂心三分

附子　烏頭　乾薑各一兩　雄黃　眞珠各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知爲度胡洽有蜀椒四分不用桂心附子

大附著湯

治五尸疰忤與前狀同者

黃芩　由跋　椒目　細辛　雄黃　乾薑

黃連各一兩　眞珠三分　金牙　犀角　麝香

牛黃各一分　天雄　桂心各半兩　蜈蚣一枚

右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知爲度

大金牙散

治一切疰病

金牙　鸛骨　石膏各八分　螌蝥七分　白朮

活草子　胡燕屎　雷丸　龍牙各六分　乾漆

銅鏡鼻　梔子　龜甲　鼈甲　鬼督郵　大黃

桃白皮各四分　徐長卿　桂　羚羊角　芍藥

射干　升麻　鳶尾　馬目毒公　蜂房　細辛

乾薑　芒硝　由跋　犀角屑　生甘草　狼毒

蜣螂　狼牙　雄黃　草龍膽　眞珠各三分

芫花　莽草　射罔　烏梅各二分　鐵精一分

赤小豆一合　蛇蛻皮一尺　樗雞　地膽

芫青各七枚　桃奴　巴豆各二七枚

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之

避百邪治九十九種疰一本有麝香無白术

金牙散

治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胸脅流無常處不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張脣乾甲黃

金牙　雄黃　鐵精　野葛　露蜂房　芎藭
大黃　甘草　曾青　蛇蛻皮　眞珠　丹砂
蕳茹　乾漆各一分　石長生　狸骨（一本作鸛骨）
桔梗　鬼臼　鬼箭羽　鬼督郵　椒目　烏頭
狼毒　蕪荑　藜蘆　雷丸　滑石（一本作消石）
鼈甲各二分　毒公　胡燕屎　牛黃各三分
人參　狼牙　寒水石　桂心各四分　蜈蚣
蜥蜴　附子各一枚　蜣螂　亭長各七枚
石膏五分　芫青　徐長卿　螌蝥各十四枚
貝母二枚

右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日再不知漸加之蟲隨大小便出

白术散

治風入臟腑悶絕常自躁痛或風疰入身冷疰鬼

疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外鍼灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕痒或大便有血小便赤黃房中勞極

白朮十四枚　附子　秦艽　人參　牡蠣
蜀椒　細辛　黃芩　芎藭　牛膝各三分
乾薑　桂心　防風各五分　茯苓　桔梗
當歸　獨活　柴胡各四分　烏頭　甘草
麻黃　石南　莽草　花粉　天雄　杜仲各二分

右二十六味治下篩平旦酒服五分匕訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合爲佳

太乙備急散

治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼痱及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日

雄黃　桂心　芫花各二兩　野葛三分　丹砂
蜀椒各一兩　藜蘆　巴豆各一分　附子五分

右九味巴豆別治如脂餘各治下篩以巴豆合和更擣合和調置銅器中密貯之勿泄有急疾水服

錢五匕可加至半錢匕老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四支當汗出此之所謂如湯沃雪下手皆愈宜祕之非賢不傳

龍牙散

治百疰邪鬼飛尸萬病

龍牙　茯苓各二兩半　乾地黃　胡燕屎

石斛各三分　雄黃　棗膏　芍藥各五分

鬼箭羽　烏頭　羌活　露蜂房　曾青　眞珠

桂　杏仁　防風　桃奴　鬼臼　鸛骨各一兩

人參　大黃各一兩半　白朮二兩　蘇子四合

銅鏡鼻　甘草　橘皮　芎藭　鬼督郵　遠志

鼈甲各半兩　狸陰二具　蜈蚣一枚

右三十三味治下篩酒服一刀圭以知爲度當有蟲從大便出

又方

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常者

貝子十枚　犀角　麝香　丹砂　雄黃　蜈蚣

鮫魚皮　丁香　鹿角　龍骨　蘘荷根　蜀椒

乾薑各一分

右十三味治下篩酒服方寸匕加至二匕日三

黑奴散

治卒得惡疰腹脹

釜下墨一合　鹽二合

右二味合治以水一升半煑取八合一服令盡須臾吐下卽瘥

鸛骨圓

治遁尸飛尸積聚胷痛連背走無常處或在臟或在腹或奄奄然而痛

鸛骨三寸　丹砂（一作丹參）　牡蠣（一作牡丹）　雄黃　莽草各四分　藜蘆　桂心　野葛各二分　螌蝥　芫青各十四枚　巴豆四十枚　蜈蚣一枚

右十二味爲末蜜丸如小豆每服二丸日三以知爲度

蜥蜴圓

治癥堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸疰骨血相注惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留飲結積虎

狠所齧瘈犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒
毒卽消婦人邪氣鬼忤亦能遣之

蜥蜴　蜈蚣各二枚　䖟蟲　杏仁各三十枚
地膽五十枚　䗪蟲四十枚　乾薑四分　朴硝
巴豆各七分　澤漆　鬼督郵　桑赤雞　桃奴
犀角各二分　虎骨六分　甘草一兩　芍藥
甘遂各五分　款冬花三分　蜣螂十四枚

右二十味別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下
蜜搗二萬杵丸如麻子大食前服三丸日一不下
加之不取吐下者一丸旦服有人風冷疰癖堅二
十年得愈

桔梗圓

治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消酒癖諸病

桔梗　藜蘆　皂莢　巴豆　附子各二兩

右五味爲末蜜和搗萬杵丸如梧子宿不食平旦
飲服二丸仰臥服勿眠至食時膈上吐膈下下去
惡物如科斗蝦蟇子或長一二尺下後當大虛口
乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升三四日病

未盡更服忌如藥法

十疰圓

治氣勞鬼冷人死尸食水土十種疰並宜此方

雄黃　巴豆各二兩　人參　甘草　麥門冬

細莘（一作藁本）　桔梗　附子　皂莢　蜀椒各一兩

右十味末蜜丸如梧子空腹服五丸日再稍加以知爲度

太乙神明陷冰圓

治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病欬逆唾噫辟除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胷中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之跳手心中慍慍如有蟲狀毒疰相染甚至滅門

芫青五枚　雄黃　桂心　丹砂　礬石（一作礜石）

藜蘆　大黃各二兩　眞珠　附子各一兩半

當歸三兩　麝香　人參　犀角　鬼臼　射罔

牛黃各一兩　蜈蚣　蜥蜴各一枚　烏頭八枚

杏仁三十枚　螌蝥　樗雞　地膽各七枚

巴豆一分

右二十四味爲末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食服二丸日再不止稍增以藥二丸著門上令衆邪不近傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸衆邪不能近也

江南度世圓

治萬病癥結積聚伏尸長病寒熱疰氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四支煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡疰汗出口噤不開心痛

蜀椒三兩　人參　細辛　甘草各二兩　茯苓

眞珠　大黃　乾薑　丹砂　野葛　桂心

雄黃　麝香　鬼臼各一兩　巴豆六十枚

烏頭　牛黃各二分　附子　紫菀各六分

蜈蚣二枚

右二十味爲末蜜丸如小豆飮服二丸加至四丸日二加獺肝一具尤良

大度世圓

治萬病與前狀同者

野葛一尺　牛黃　大黃　雄黃　細辛　附子

眞珠　甘草　人參　射罔　丹砂　鬼臼
莽草各一兩　蜀椒　麝香　鬼箭羽　茯苓
桂心　紫菀各二兩　乾薑三兩　地膽五十枚
芫青二十枚　樗雞三十枚　巴豆仁八十枚
蜥蜴　蜈蚣各一枚

右二十六味爲末蜜丸如小豆飲服二丸日二先食服之

又方

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤等病

獺肝一具　蜈蚣一枚　麝香二分　雄黃
莽草　丹砂　鬼臼　犀角　巴豆　大黃
牛黃各一兩

右十一味爲末蜜丸如麻子空腹服二丸至三丸以止爲度

雷氏千金圓

治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺及疰

硝石三分　大黃五分　桂心　乾薑各二兩
巴豆仁六十枚

右五味爲末搗三千杵蜜丸如大豆服二丸神驗

無比已死者折齒灌之

又方

治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍

桂心　乾薑各一兩　巴豆仁二兩

右三味治下篩以上酢和如泥傅病上乾卽易之

八毒赤散（李豫）

治一切邪祟鬼疰服之卽愈

雄黃　硃砂　礜石　附子炮　藜蘆　牡丹皮

巴豆霜各一兩　蜈蚣炙一枚

右爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸無時凉水

送下

雄朱散（綱目）

治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動不已

似冷似熱風氣觸則發

雄黃　硃砂　桔梗　羌活　芍藥　當歸炒

升麻　川烏　龍腦　川芎　南星炮　山梔

陳皮　木香　莽草　白朮　枳殼　檳榔

黃芩各等分　麻黃五分　白殭蠶炒　紫蘇子

虎頸骨酢炙　鬼箭羽炒等分　蜈蚣二條酒炙

右爲細末每服二錢酒調下日三服

五邪湯（千金方下同）

治邪氣啼哭或歌或笑

禹餘糧　防風　桂心　芍藥　獨活　甘草

白朮　人參　石膏　牡蠣　秦艽各二兩

防己　菖蒲　茯神　雄黃　蛇蛻皮各一兩

右㕮咀每服五錢水三盞煎七分服之

太乙神精丹

治客忤霍亂尸疰惡氣顛狂鬼語蠱毒妖魅温瘧一切惡毒無所不治

曾青　雄黃　雌黃　磁石　丹砂各四兩

金牙二兩半

右丹砂雄黃雌黃以釅酢浸曾青以好酒浸以紙密封日中暴百日然後各研如細粉以釅酢拌使乾濕得所納土釜中六一泥固濟安鐵脚環子高一尺五寸以漸放火其火勿令近釜底至一伏時

止候冷出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色者次一色者下俱光明皎潔如雪最佳若飛不盡更著火如前以雞羽掃取棗膏和丸如黍粒平旦空腹服一丸漸加一丸以知爲度舊不用磁石金牙今加之服此者五服內必吐利過則自定初服如黍粒漸加一丸至如小豆大而止不得更大若服藥悶亂煑木防已湯飲之卽定若欲解殺藥喫爛煑肥猪肉久瘧變腫垂死者服一丸卽吐差瘧母亦差癥瘕積聚服一丸以漿飲送下諸卒死心下微暖者斡開口以漿飲調一刀圭服之以絳囊盛丸刀圭散繫男左女右臂上避瘴疫時氣最妙

避邪丹

治衝惡邪祟怪疫及山谷間九尾狐精爲患

人參　赤茯神　遠志　鬼箭羽　石菖蒲

白朮　蒼朮　當歸各一兩　桃奴五錢　雄黃

硃砂各三錢　牛黃　麝香各一錢

右爲末酒糊和丸龍眼大金箔爲衣每一丸臨臥

以木香湯化下諸邪不敢近體更以絳囊盛五七丸懸牀帳中尤妙

蘇合香丸

療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

白朮　青木香　烏犀角屑　香附子炒去毛

硃砂研水飛　訶黎勒煨取皮　白檀香　沉香

安息香另末無灰酒一升熬膏　麝香研　丁香

蓽茇各二兩　龍腦研　蘇合香油入安息膏內

薰陸香別研各一兩

右爲細末入研藥勻用安息香膏幷煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

單方

中惡冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐（千金下同）

又方溫猪肪二升頓服之

又方車缸脂如雞子大酒服

卒忤以鹽八合水三升煑一升半分二服得吐卽愈

卒忤小便不通筆頭七枚燒灰水和服之卽通

又方犢子屎半盞酒三升煑服之亦治霍亂

又方黑墨爲末水服一錢匕

又方臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三血化爲水

鬼擊病用雞屎白如棗大青花麻一把以酒七升煑取三升熱服須臾發汗若不汗熨斗盛火炙兩脅下使熱汗出愈

又方艾如雞子大三枚以水五升煑取二升頓服

又方吹酢少許入鼻中

中惡用葱心黃刺鼻孔中血出愈

又方大豆二七粒爲末雞子黃丼酒相和頓服

又方使人尿其面上可愈

治諸雜疰相連續死亦治三十年衆疰桃根白皮一斤㕮咀以水二斗煑取一斗去滓分八九服須令二日服盡

又方擣桃仁三七枚研酒服

又方小芥子爲末雞子白和傅

尸疰鬼疰獺肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具不瘥更作

鬼疰暴心痛面無顏色欲死以布裹鹽如彈丸大燒

令赤置酒中消服之利卽愈

蠱疰雄猫兒屎燒灰水服之

哭疰梳齒間刮取垢水服之

又方亂髮一兩臘月猪脂二合以猪脂煎髮令消烊服之蠱死矣

又方熬大豆帛裹熨之

食疰取釜下土雞子大爲末酢泔清一升和服之行五十步吐卽瘥（凡食上得病名食疰）

又方還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰如杏仁大水服之

治遁尸尸疰心腹及身有痛處不得近取艾小挼令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令强熱置艾上冷卽易不過二三度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面用白芥子一升蒸熱擣以黃丹二兩攪和分作兩分用疎布袋盛更蒸使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱薄之如此三五度卽定

皮膚中痛名曰癥疰酢和燕窠土傅之

走疰燒車釭令熱暫入水以濕布裹熨病上

三十年氣疰豉心半升生椒一合以水二升煑取半升適寒溫用竹筒縮取汁令病者側臥手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥

鍼灸

素問曰人憂愁思慮則傷心又驚而奪精汗出於心或遇少陰司天天數不及因而三虛神明失守蓋心爲君主之官神明出焉神既失守神光不聚却遇火不及歲有黑屍鬼見之令人暴亡治法刺手少陽之所過陽池穴也復刺心俞則生

凡飲食勞倦則傷脾又飲食飽甚汗出於胃醉飽入房汗出於脾遇太陰司天天數不及因而三虛脾神不守蓋脾爲諫議之官志意出焉神既失守神光不

聚却遇土不及歲有青屍鬼見之令人暴亡可刺足陽明之所過衝陽穴也復刺脾俞卽生

人久坐濕地强力入水則傷腎又遇遠行汗出於腎或遇太陽司天天數不及因而三虛腎神失守蓋腎爲作强之官伎巧出焉神既失守神光不聚却遇水不及歲有黃屍鬼見之令人暴亡可刺足太陽之所過京骨穴也復刺腎俞卽生

人恚怒氣逆則傷肝又遇疾走恐懼汗出於肝或遇厥陰司天天數不及因而三虛肝神失守蓋肝爲將軍之官謀慮出焉神既失守神光不聚却遇木不及歲有白屍鬼見之令人暴亡可刺足少陽之所過丘墟穴也復刺肝俞卽生

人形寒飲冷則傷肺復登高疾走喘出於肺或遇陽明司天天數不及因而三虛肺神不守蓋肺爲相傅之官治節出焉神既失守神光不聚却遇金不及歲有赤屍鬼見之令人暴亡可刺手陽明之所過合谷穴也復刺肺俞卽生

肝虛見白屍鬼而後暴厥不知人名曰屍卒目中神

采不變四肢雖冷心腹尚溫口中無涎舌卷囊不縮者可刺之復甦

心虛見黑屍鬼而後暴厥不知人四肢雖冷目中精采不變氣雖閉舌不縮未出一時可治刺之復甦

脾虛見青屍鬼而後暴厥不知人四肢冷而身溫脣溫一時可治

肺虛見赤屍鬼而後暴厥不知人雖無氣手足冷心腹溫鼻微溫目中神采不變口中無涎舌不卷囊不縮者未出一時可治

腎虛見黃屍鬼而後暴厥不知人氣絕四肢厥冷心腹微溫目中精采不變脣口焦黑口中無涎可救

千金方曰天府主卒中惡風邪氣飛尸惡疰鬼語遁尸

豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼好笑面四肢卒痛

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷中俗名注市舉腋取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁疰胷脅滿

九曲中府在旁廷注市下二寸刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸內有瘀血

百會玉枕主中惡卒起僵仆惡見風寒

通天絡郄主暫起僵仆

大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安蓆

中惡灸胃脘五十壯愈

卒忤灸手十指爪下各三壯又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯

鬼擊灸人中一壯立愈不瘥更灸

又法灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取瘥又灸臍下一寸三壯

醫學綱目曰凡五尸者飛尸遁尸風尸沉尸尸疰也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胷旁攻兩脅或壘塊踊起或攣引腰背治之之法灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止

又灸兩手大拇指頭各七壯

又灸心下三寸十壯

又灸乳下一寸隨病左右多其壯數

又以細繩量患人兩乳頭內卽截斷中屈之又從乳頭向外量使當肋罅於繩頭灸三壯或十壯男左女右卒疰忤攻心胷灸第七椎隨年壯

又灸心下一寸三壯

又灸手肘文隨年壯

一切病食疰灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒疰不能飲食百病灸心下三寸胃脘十壯

水疰（口中涌水）經云肺來乘腎食後吐水灸肺腧

又灸三陰交

又灸期門穴在乳下二肋間瀉肺補腎也各隨年壯

一切疰無新久先仰臥灸兩乳邊邪下三寸第三肋間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名疰市

古今醫統曰秦承祖灸鬼法治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親踈等證以病人兩手大拇指用細麻繩縛定以大艾炷置於其中兩介甲及兩指角肉四處著火一處不著則無效灸七壯神驗

醫案

丹溪心法曰虛病痰病有似邪祟蓋血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆成虛妄以邪治之必死一少年暑月因大勞而渴恣飲梅漿又連得大驚三四次妄言妄見病似鬼邪脈兩手皆虛弦而沉數余曰數爲虛熱弦爲驚又梅酸之漿鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與參朮陳皮茯苓芩連等藥濃煎湯入竹

瀝薑汁旬日未效衆皆尤藥之不對余脈之知其虛未復痰未降也仍令前方入荆瀝服旬日而安

一人醉飽後妄見如祟詢之係亡兄附體言出生前事甚的乃叔在旁叱之曰非邪乃食魚腥與酒太過痰所爲耳灌鹽湯一二椀吐痰一二升汗大作睡一夕而安

衞生寶鑑曰信副使許可道到雄州請余看脈診之脈中乍大乍小乍短乍長此乃血氣不匀邪氣傷正本官說在官宿邯鄲驛中夜夢一婦人著青衣不見面目以手於脅下打一拳遂一點痛往來不止兼之寒熱而不能食乃鬼擊也余曰可服八毒赤丸本官嘗讀名醫錄中見李子豫八毒赤丸爲殺鬼杖子遂與藥三粒卧時服明旦下清水二斗效

醫學綱目曰項在徽城日嘗修和神精丹一料庚申余家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂魘覺後心一點痛不可忍昏悶一時許余忽憶神精丹有此一證取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛

止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石爲難合爾

醫宗必讀曰章仲輿女在閣時昏運不知人蘇合香丸灌醒後狂言妄語喃喃不休余診其左脉七至大而無倫右脉三至微而難見正所謂兩手如出兩人此祟憑之脉也線帶繫定二大拇指以艾炷灸兩介甲至七壯鬼卽哀詞求去服調氣平胃散加桃奴不日而祟絕

卒中暴死門

黃帝素問

六元正紀大論

陽明司天之政二之氣厲大至民善暴死

註 二之主客乃君相二火如厲大至則民善暴死

少陽司天之政三之氣炎暑至民乃熱中善暴死

註 司天主時之氣皆屬少陽二火相交風熱並至故善暴死

火鬱之發民病甚則瞀悶懊憹善暴死

註　瞀悶肺之病火甚精傷故善暴死

少陽所至爲暴注瞤瘛暴死

註　此冬病之常也

五常政大論

少陽司天風行於地其主暴速

註　風氣迅速也

厥陰司天火縱其暴其發機速

註　厥陰風木司天則少陽相火在泉木火相生故火縱其暴少陽主樞故發機速

大奇論

脈至如喘名曰暴厥暴厥者不知與人言

註　如喘脈滑急此痰水上壅也

脈要精微論

脈浮而散者爲眴仆

註　陰上逆於陽也

玉機眞臟論

急虛身中卒至五臟絕閉脈道不通氣不往來譬於墮溺不可爲期

註　風寒之邪卒中於身精氣一時虛奪故急虛而五臟之氣一時絕閉脈道一時不通氣不往來譬若墮溺之倉卒時日難期也

其脈絕不來若人一息五六至其形肉不脫眞臟雖不見猶死也

註　倉卒之病脈絕不來生氣絕於內也一息五六至邪氣盛於外也不必眞臟見而猶死也

歲露論

黃帝曰其有卒然暴死暴病者何也少師答曰三虛者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷是謂三虛逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之

註　乘年之衰者六氣司天在泉之不及也逢月之空者月郭空之時也失時之和者四時不正之氣也夫衞氣與天地相參與日月相應是年之虛月之空時之違和皆主衞氣失常衞氣虛則腠理疎而邪氣直入於內故爲暴病卒死

五色篇

雷公曰人不病卒死何以知之黃帝曰大氣入於臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出兩顴大如母指者病雖小愈必卒死黑色出於庭大如母指必不病而卒死

註 大氣入臟者外淫之邪入於臟腑故不病而卒死矣不病者無在外之形證也病小愈而卒死者內因之病臟腑相乘也五色之見於面者五臟之氣見於色也聚色外見者臟眞之外洩也

漢張機金匱要略

尸蹶

尸蹶脈動而無氣氣閉不通故靜而死也

明樓英醫學綱目

卒中暴厥

卒中者卒然不省人事全如死屍但氣不絕脈動如故或脈無倫序或乍大乍小或微細不絕而心胷暖者是也

中暑悶倒急扶在陰涼處切不可與冰水當以布巾衣物等蘸熱湯熨臍中及氣海續以湯淋布上令徹

臍腹煖卽漸醒如倉卒無湯處掬道上熱土於臍以多爲佳冷卽易之古法道塗無湯卽掬熱土於臍上仍撥開作窩子令人更溺於中以代湯續與竹葉白虎石膏湯

凡覺中暑急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷亂悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼卽用水研灌之卽醒路中倉卒無水渴甚急嚼生葱二寸許津同嚥可抵飲水二升

人平居無疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人聲但加眩冒移時方寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

徐春甫古今醫統

卒死

扁鵲肘後方中惡與卒死鬼擊亦相類爲治皆參取而用之已死搗鮮菖蒲根絞汁灌之立瘥

卒中屍厥鬱冒中風中暑之類皆當發表仲景云鬱冒欲解必大汗出故返魂湯用麻黃桂枝清魂湯用荊芥及諸卒中用皂角半夏嚙鼻取嚏用藜蘆砒霜揩齒取痰皆所以開發上焦使表邪流通也中暑忌凉水恐閉腠理亦此意也

山居中惡客忤卒死者灸臍中百壯皂角末吹鼻或韭汁灌耳中

本事方云世言氣中者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁失意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊急若槩作中風用非止不相爲宜而反致殺人者多矣元祐庚午予母氏親遭此禍至今飲恨母氏素食氣血羸弱因先子捐館憂惱忽一日氣厥牙緊涎潮里醫便作中風大下數行一夕而死予因啣恨至今每見此證急化蘇合丸灌之便甦然後隨其寒熱而調治之無有不愈者

氣疾人因氣不歸元遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰不可誤用風藥及通關利腠等輩先以薑汁泡湯調蘇合香丸次用七氣湯大流氣

飲加石菖蒲順氣而甦繼以治中湯加木香以和中使氣歸道若更不能調則氣逆而厥又有變證

王肯堂證治準繩

卒中暴厥

經云暴病卒死皆屬於火註云火性速疾故也然初治之藥不寒而溫不降而升甚者從治也俗有中風中氣中食中寒中暑中濕中惡之別但見卒然仆倒昏不知人或痰涎壅塞咽喉作聲或口眼喎斜手足癱瘓或半身不遂或六脉沉伏或指下浮盛者並可用麻油薑汁竹瀝調蘇合香丸如口噤抉開灌之或用三生飲一兩加人參一兩煎成入竹瀝二三杯薑汁少許如抉不開不可進藥急以生半夏爲末吹入鼻中或用細辛皂角菖蒲爲末吹入得嚏則甦此可以驗其受病深淺則知其可治不可治若口開手撒遺尿者虛極而陽暴脫也速用大料參芪接補之及臍下大艾灸之

痰涎壅盛者宜吐之急救稀涎散猪牙皂角肥實不蛀者四挺去黑皮晉礬光明者一兩各爲細末研勻

輕者五分重者三字溫水調灌下又碧霞散揀上色精好石綠研篩水飛再研取二三錢同冰片三四豆許研勻以生薄荷汁合溫酒調服之二藥不大嘔吐但微微令涎自口角流出自甦

舊說口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾肺絕皆爲不治之證然五證不全見者速服參芪膏灸臍下亦有得生者

若中人髮直吐清沫搖頭上攛面赤如糚汗綴如珠或頭面赤黑眼閉口開氣喘遺尿皆不可治

諸中或未甦或已甦或初病或久病或吐出紫紅色者死

傳心方云治男子婦人涎潮於心卒然中倒當卽時扶入暖室中扶策正坐當面作好酢炭熏之令酢氣衝入口鼻內良久其涎潮聚於心者自收歸輕者卽時甦醒重者亦醒人事惟不可喫一滴湯水入喉也如喫湯水則其涎永繫於心絡不能去必成廢人

風邪中人六脉多沉伏亦有脉隨氣奔指下洪盛者浮遲吉堅大急疾凶浮遲爲寒虛大爲暑不當暑則

爲虛浮澀爲濕浮大爲風浮數無熱亦爲風微而數浮而緊沉而遲皆氣中又凡風應人迎氣應氣口洪大爲火滑爲痰或浮而滑沉而滑微而虛者皆虛與痰更當察時月氣候及其人之起居參以顯證而定病之主名以施治療

石室祕籙 臣陳士鐸著

暴死

死治者如人死厥不醒人事中風不語或感鬼神之祟或遇山魈之侵一時卒倒不醒人事是也此等病是邪氣中之痰迷心竅也怪病多起於痰不必驚惶治其痰而病自愈然而邪之所湊其氣必虛用祛痰之藥加入於補正之中則病去如掃死者重生方用白朮五錢人參茯苓半夏天南星各三錢白芥子一錢生附子五分生薑一大塊搗汁水半酒半共二椀煎八分服外用皂角刺爲末人研皂角刺時先用紙一張濕透封住同在之人鼻孔然後研爲細末取一匙於鵝翎管吹入病人鼻孔內必取噴嚔以前藥灌之立醒必吐出痰水半盆或一盆如膠如湯之類或

黃黑青紅之色人自然困倦欲睡不可驚他任他自睡醒來用人參半夏白薇各一錢白朮五錢茯苓白芥子各三錢陳皮甘草各五分水煎服一劑全愈此死治之一法也蓋人之中邪必由元氣之虛邪遂乘虛而入故用人參以助其正氣而以半夏白芥子以袪邪與痰天南星尤能入心而袪邪用附子猛烈之將單刀直入邪自驚退故一下口而邪即外越上湧出矣然邪出之後當純補胃氣故又不用袪痰之劑而竟用健脾補胃之品也更有死證治法如尸厥之證亦是氣虛當用人參一兩白朮半夏茯苓各五錢菖蒲一錢陳皮五分治之雖同是中邪然前證是陽邪此乃遇陰邪也陽邪者日間遇之陰邪者夜間遇之也後方雖亦用人參以補正而終不用南星之類直入其心中也如不能語言亦用皂角末吹之倘共前二證俱遺尿手撒則多不能救否則皆一劑回生也以上二證皆死治之法也觸類旁通頭頭是道大約治邪之法二方足以包括再看病之輕重用藥之多寡則得之矣

人卒然見鬼卒倒或在神廟之內或在棺椁之旁偶遇尸氣感中陰邪鬼魅不省人事者以瓜蒂散吐之必然吐痰如湧泉傾盆而出鬼若遠走則已吐後仍見鬼者痰未淨也又用前瓜蒂吐之以不見鬼爲度後用白朮一兩茯苓五錢白薇神麯炮薑各一錢陳皮五分水煎服此法可治貧窮之人

方

黃龍丸（醫統下同）

治中暑卒死不知人或身熱惡寒頭痛狀如傷寒或往來寒熱煩渴嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰陽

硫黃　硝石各一兩　寒食麵四兩　雄黃明者

滑石　白礬各研細半兩

滴水丸新汲水下五丸漸加至二十丸口噤者水化灌下中暑忌冷此藥冷水下者乃熱因寒用

還魂湯

治卒死客忤暴厥

麻黃去節一兩　杏仁三十五枚　炙甘草半兩

右三味水四升煑升半去查令隨嚥之通治諸感卒中忤暴擊飛尸諸魘忽氣絕無復覺或已無脉口噤拗不開湯入口不下者分病人髮左右提擒肩引之藥下復進一服須臾甦千金有桂

破棺散

一名散生散治卒死中惡諸暴絕死及石木所壓溺水自縊一切橫死但心口溫者并皆治之

半夏泡七次

右爲末以大豆許吹入鼻中得嚏卽活

硃砂丸

治卒中惡垂死

硃砂細研　附子炮去皮臍　雄黃細研各一兩

巴豆二十粒取仁搥去油　麝香研一分

右研勻煉蜜和搗丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如不利更加三丸至七丸以利爲度

朱犀散

治卒中惡氣鬼邪或因暮夜如厠或出郊野或遊空室或人所不至之地忽然見鬼物鼻口吸著惡氣卒然仆倒四肢厥冷兩手握拳口鼻出清血性命逡巡須臾不救此則屍厥相同但腹不鳴心脅俱暖切勿移動即令人圍繞焚爇麝香或安息香乳香蒼朮之類候醒方可移歸

大硃砂　麝香研各一兩　犀角鎊研末半錢

右爲細末研勻每服二錢井華水調灌服

韭根茱萸湯（仲景）

救卒死

韭根一把　吳茱萸炒八兩　烏梅十四箇

右以水一斗檳榔七箇煑三沸檳榔浮者生沉者死煑取三升去滓分飲之

蘇合香丸

療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

白朮　青木香　烏犀角屑　香附子炒去毛

硃砂研水飛　訶黎勒煨取皮　白檀香　沉香
安息香另末無灰酒一升熬膏　麝香研　丁香
蓽茇各二兩　龍腦研　蘇合香油入安息膏內
薰陸香別研各一兩

右爲細末入研藥勻用安息膏並煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

三物備急丸（仲景）

大黃　乾薑　巴豆去皮尖心熬如脂各一兩

右藥各須精新先搗大黃乾薑爲末研巴豆內中合搗千杵蜜和丸器中貯之主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死者以熱苦酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽須臾當差如未差更與三丸當腹中鳴卽吐下便差若口噤亦須折齒灌之

又方

解一切暑毒欲死者便服之立甦

半夏酢一升半煮盡焙乾四兩　肉桂去皮

赤茯苓各半兩　甘草　白茯苓各一兩

右爲末用生薑汁麪糊丸如桐子大每服五十丸熱水下于夏日登途常帶此藥於篋笥中防諸緩急及僕价俱每日一服無伏暑之疾奇驗不一

附子理中湯

治五臟中寒口噤四肢强直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外忽運倒時灌以此藥兩劑遂醒

大附子炮去皮臍　人參　乾薑炮　甘草炙

白术各等分

右剉爲散每服四大錢水一盞半煎七分去柤空心服口噤則斡口灌之

單方

凡中暍死不可使得冷得冷便死方用屈草帶繞暍人臍使三兩人溺其中令溫亦可用熱泥和屈草亦可扣瓦椀底按及車缸以著暍人取令溺須得流去此謂道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令溫若湯便可與之不可泥及車缸恐此物冷暍既在夏月得熱泥土暖車缸亦可用也（仲景下同）

救卒死方薤搗汁灌鼻中

又方雄雞冠割取血管吹內鼻中

又方猪脂如雞子大苦酒一升煑沸灌喉中

又方雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起

又方大豆二七粒以雞子白并酒和盡以吞之

救卒死而壯熱者礬石半斤以水一斗半煑消以漬脚令没踝

救卒死而目閉者騎牛臨面擣薤汁灌耳中吹皂莢末鼻中立效

救卒死而張口反折者灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散有巴豆者

救卒死而四肢不收失便者馬屎一升水三斗煑取二斗以洗之又取牛洞（稀糞也）一升溫酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯差

救小兒卒死而吐利不知是何病用狗屎一丸絞取汁以灌之無濕者水煑乾者取汁

尸蹶脉動而無氣氣閉不通故靜而死也用草蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下

又方剔取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉立起

治熱暍取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

又方令暍人仰臥以熱土壅臍上令人尿之臍中溫卽愈（千金下同）

又方可飲熱湯亦可內少生薑橘皮甘草煮飲之稍稍咽勿頓使飽但以墼土及熬灰土壅臍上佳

又方濃煮蓼取汁三升飲之卽愈不瘥更灌

又方張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人頭令湯入腹須臾卽蘇

又方使人噓其心令暖易人爲之

又方抱狗子若雞著心上熨之

又方屋上南畔瓦熱熨心冷易之

又方灌地漿一盞卽愈

又方地黃汁一盞服之

又方水半升和麪一大抄服之

硃砂符治卒中惡氣絕硃砂書舌作鬼字額上書之艮（醫統下同）

卒死心頭微熱用百草花曝乾水漬封埋百日砂鍋內連水熬稠丸皂角子大令患人口含一丸須臾卽活大妙

中鬼氣卒死口鼻出血用雄黃末一錢桃葉煎湯下

中惡客忤睡死用麝香一錢研和酢二合灌之卽甦

尸厥奄然死去腹中氣鳴用生薑汁半盞和酒煎沸灌之仍灸丹田百會氣海穴

卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也牽取牛臨鼻上二百息牛舐必瘥牛不從當著鹽汁塗面上牛卽肯舐（千金下同）

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得肘後方云乾者以人溺解之

中暑發昏以新汲水滴兩乳以扇搧之重者以地漿灌之則醒若與水飲則死

鍼灸

靈樞經曰太陽根於至陰結於命門命門者目也太陽爲開開折則肉節瀆而暴病起矣故暴病者取之太陽視有餘不足皮肉宛膲而弱也

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痏後刺手大指內側去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨

之端各一痏立已不已以竹管吹其兩耳鬄其左角之髮方一寸燔飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

甲乙經曰尸厥死不知人脉動如故隱白大敦主之

恍惚尸厥頭痛中極及僕參主之

尸厥暴死金門主之

傷寒論曰少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胷膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸蹶當刺期門巨闕

千金方曰隱白大敦主卒尸厥不知人脉動如故

中極僕參主恍惚尸厥煩痛

金門主尸厥暴死

內庭主四肢手足悶久持之厥熱脛痛腹脹皮痛者使人久持之

卒死無脉無他形候陰陽俱竭也火灸熨斗熨兩脅下又治尸厥

針問使各百餘息又灸鼻下人中一名鬼客廳肘後方云又治尸厥

醫學綱目曰氣昏運取奪命在曲澤上針入三分先

補候氣回後瀉不可離手忌灸如不甦取臍中又臍中灸七壯忌針此二穴能起死回生

又法取尸蹶玉泉八分補十呼得氣卽瀉隱白三分先補後瀉補生瀉成更於兩脅頻頻熨之

鬼擊支溝二分先補後瀉補生瀉成三里補十呼瀉五呼此二穴刺之氣不至無問其數刺之氣至去之勿復刺

證治準繩曰卒中眼上戴不能視者灸第二椎骨第五椎上各七壯一齊下火炷如半棗核大

醫案

儒門事親曰一夫病痰厥不知人牙緊諸藥不能下戴人問侍病者口中曾有涎否曰有戴人先以防風藜蘆煎湯調瓜蔕末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其尖灌於右鼻竅中嘓然下咽有聲復灌其左竅亦然戴人曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐膠涎數升頓甦砒亦尋常勿用以其病大非此莫能動然無瓜蔕亦不可使用宜消息之

丹溪曰鄭兄年近六十奉養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房勞忽一晚登厠兩手踈散兩眼開而無光尿自出汗如雨喉如鋸呼吸甚微脉大而無倫且無部位可畏之甚予急令煎人參膏且先與灸氣海穴炷如小指大至八十壯右手能動又三壯脣微動參膏亦成遂與一盞半夜後盡二盞眼能動盡二斤方能言而索粥五斤而痢止數十斤而安

醫宗必讀曰楊方壺夫人忽然運倒醫以中風藥治之不效迎余診之左關弦急右關滑大而軟本元氣不足又因怒後食停先用理氣消食藥得解黑尿數枚急以六君加薑汁服四劑而運止更以人參五錢芪术半夏各三錢茯苓歸身各二錢加減調理兩月而愈此名虛中亦兼食中者

邑尊張太羹令郎丙子六月間未申時運絕不知人至更餘未甦此得之生冷太過也皂角末吹鼻中無嚏舉家驚惶余以皂角灰有性新汲水灌之更取沉檀焚之俾香氣滿室以達其竅至子後方甦服十味香薷飲而安此暑中挾虛者

給諫晏懷泉夫人先患胷腹痛次日卒然運倒手足厥逆將有醫者以牛黃丸磨就將服矣余診之六脉皆伏氣口稍動此食滿胷中陰陽痞隔升降不通故脉伏而氣口獨見也取陳皮砂仁各一兩薑八錢鹽三錢煎湯以指探吐得宿食五六椀六脉盡見矣左關弦大胷腹痛甚知爲大怒所傷也以木香青皮橘紅白朮香附煎成與服兩劑痛止更以四君子加木香烏藥調理十餘日方瘥此食中兼氣中者

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百四十九卷目錄

醫部彙考三百二十九
諸哽門
孫思邈千金方（諸治大法）
徐春甫古今醫統（從類治法　吐法最妙）
單方
醫案
五絕門

單方
怪病門
單方
諸蟲門
黃帝素問（氣交變大論）
靈樞經（邪氣臟腑病形篇 五癃津液別篇 上膈篇 論疾診尺篇）
張機金匱要略（狐惑）
孫思邈千金方（九蟲）
許叔微本事方（治法）

王肯堂證治準繩（九蟲）
張介賓景岳全書（論證 論治 蚘蟲 寸白蟲 小兒疳蟲）
陳士鐸石室祕籙（蟲痛）
方
甘草瀉心湯 遇仙丹 蕪荑散 蕪荑散
烏梅丸 木香檳榔丸 化蟲散 肝蟲
方 心蟲方 脾蟲方 肺蟲方 腎蟲丸
蘼蕪圓 神效剪紅丸 萬應丸 追蟲丸
下蟲丸 化蟲丸 集效方 祕方 萬應丸
又方 萬靈丸 麥門冬湯 前胡湯 錫灰
丸 又方 又方 又方 濕䘌方 懊憹散
青葙散 薑蜜湯 又方 杏仁湯 桃皮散
湯 猪膽苦酒湯 又方 又方 雄黃兌散
溫臟丸 獵蟲丸 百順丸 掃蟲煎
單方

鍼灸
醫案

藝術典第三百四十九卷

醫部彙考三百二十九

諸哽門

唐孫思邈千金方

諸治大法

凡療病者皆以其類治之豈宜以鸕鷀主魚哽狸虎治骨哽耶至於竹篾薤白嚼筋緜蜜等事乃可通用耳

明徐春甫古今醫統

從類治法

陳無擇云治法皆以類從如鸕鶿豺獺治魚骨磁石治鍼髮灰治髮狸虎治諸骨亦各從其類也

吐法最妙

凡物哽者蓋以食入喉而不順致物刺住而不能下推之以理反而上出則爲順焉爲治者卽當涌吐乘其飲食之出而上逆此其順而易爲如拔刺之法也若刺之深者必欲推下非惟理勢不能延遲日久則咽喉漸腫其刺愈深腹中飲食消盡雖欲涌吐而無推送之物矣欲食而不能下如此因循多致不救

凡治哽所傷之物下咽不可便與米湯米飯喫恐米粒入瘡口中且喫羹數日爲美後單方中呪能治一切諸物諸骨幷絲髮纏喉不下內經曰不因氣動而生病於外者愚意宜用藏經呪法治之是也

單方

諸哽取鹿筋漬之令濡合而索之大如彈丸以線繫之持筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽著筋出

又方作竹篾刮令滑淨綿裹內咽中令至哽處可進退引之哽即隨出

又方用綿二兩以蜜煎使熱的的爾從外薄哽所在處灼瓠以熨縣上若故未出復煮一投縣以代前用者井以皂莢屑少少吹鼻中使得嚔哽出

又方煑薤白令半熟小嚼之以線繫薤中央捉線吞

薤下候至哽處牽引哽卽出矣

又方以虎骨末若狸骨服方寸匕

又方瞿麥末服方寸匕

魚骨哽用鸕鷀屎服方寸匕

又方口稱鸕鷀七徧用水嚥下則下

又方服橘皮湯

又方服沙糖水

又方燒魚網灰服方寸匕必效方以魚網覆頭立下

骨鯁在喉衆治不出取飴糖丸如雞子黃大吞之不去更吞漸大作丸可至十九止

又方燒虎狼屎服之

又方吞豬膏如雞子不瘥更吞瘥止

食中吞髮咽不去繞喉取亂髮燒末酒服一錢匕

悞吞錢方艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之卽下

又方服蜜二升卽出

又方末火炭酒服方寸匕水服亦得

吞金銀鐶及釵白糖二斤一頓漸漸食之多食亦佳

又方呑水銀一兩再服之

悞呑鐶及指彄燒鴈毛二七枚末之鵝羽亦得

悞呑釵方曝韭令萎蒸熟勿切食一束卽出或生麥葉筋縷如韭法皆可用但力薄多食自消

悞呑銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中飲立愈

悞呑釘鍼及箭鏃等但多食脂肥肉令飽自裹出

悞呑鍼方取懸鍼慈石末飲服方寸匕卽下古今錄驗曰呑鍼在喉服慈石末則入腹若含慈石口中或吸鍼而出耳

諸魚骨哽久不出以皂角少許吹入鼻中得嚔哽出多祕此方（本事）

魚骨哽不可出者取獺爪於項下爬之亦可煑汁食之

治哽用螻蛄膽一枚呑下亦治刺不出傅之刺卽出（外臺）

魚骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑水服之卽出未出再服（錄驗）

骨哽不得出砂仁甘草爲末綿裹含徐徐嚥津久隨

痰出

魚骨哽小嚼韭白令柔以細繩繫口中吞韭到哽處引之哽骨卽隨出驗

又方水一盞自默以左眼睛於水中書龍字服之不過二盞則下小兒遇哽大人如前書水中服之妙

又方用山粟紅果獨根向下者取來與玉簪花根同搗自然汁用竹管灌入喉中不可著牙著牙則牙化山粟果山樝也

雞骨哽以雞汁化哽藥下或食餳糖一大塊滿吞下

又方用狸骨燒灰調下少許效（陳氏方）

魚刺哽金鳳花嚼爛噙下無子用根搗爛絞汁下

又方用魚骨頂在頭上欬聲則出

又方用本魚骨左右手反覆擲背後立出

又方用萱草根搗取汁吞之立下

又方用薔薇根爲末水調方寸匕

諸骨哽以野苧根搗爛如泥如龍眼肉大化下如被雞骨哽者以雞羹化下魚骨哽以魚羹化下

又方用楮實子搗汁服

魚骨哽用橄欖味澀食久則甘嚼汁嚥下（衍義）

骨哽用鹿角爲末含嚥津下（斗門方）

髮哽用舊木梳燒灰酒調下

食魚骨下肚內刺痛煎吳茱萸湯一盞飲之骨軟而小或用好米酢飲半盞亦軟而痛止（丹溪）

悞食麥芒刺入喉中將鵝倒提口流涎以椀盛之飲少許卽隨涎而下

篾刺入喉用多年竹籬棍急流水煎湯服

悞吞銅錢在喉用生慈姑搗汁呷飲（山居）

悞吞銅錢併金銀物在喉以胡粉一兩搗硝石少許服作二服如吞金銀在腹中服此俱消下（外臺）

錢哽艾一把水五升煎一升頓服便下

又方百部根四兩酒一升浸一宿溫服一升（錢氏方）

魚骨竹木等物哽咽不下用象牙屑爲末水調一錢服

又法道藏經神呪曰吾請老君東流順水老君奉勅攝攝攝法毒水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身急急如律令奉勅攝一氣念七遍又以左手屈中

指無名指作三山印上坐淨水一椀右手掐卯文作金鎗印左手在下右手在上左手象地右手象天虛捥虛卓九次爲定左足橫右足豎作丁字立如法作望日月燈火吸氣一口吹在盞內此法百無禁忌用法之時以正神氣是也

又神方呪法治骨哽急無藥處用新水一盞呪曰吾順東流豈毒業一氣念七遍急急如律令攝望日月燈光收氣吹入水中令患人大喫三口水須臾卽下

九龍入洞法左手掐三山訣捧淨水一盞向東右手掐劒訣寫雲龍鬼三字於水內念呪云此盞化爲東洋大海咽喉化作萬丈深潭九龍入洞之法吾奉太上老君急急如律令勑呑法水一口哽隨化令人每用寸長竹竿九節置口中如法呑若無物

骨哽入喉用縮砂甘草各等分右爲末以緜裹少許噙之旋旋嚥津久之卽出（綱目）

醫案

儒門事親曰一小兒悞吞一錢在喉中不下諸醫皆不能出亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白裱紙令捲實如箸以刀縱橫亂割其端作鬅鬙之狀又別取一箸縛鍼鉤於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺鉤入於錢竅然後以紙捲納之咽中與鉤尖相抵覺鉤尖入紙捲之端不碍肌肉提之而出

醫說曰一兒悞吞鉤魚鉤在喉諸醫不能措手一人

偶見鈎鈎雖在喉而鈎線幸在外遂以意療用數珠子穿在鈎線上逐箇送喉中以數珠抵鈎頂其利嘴一掣而鈎出遂獲安

古今醫統曰一富家子被雞骨哽喉百方莫能治一叟見云我有手法取之不勞藥餌急取新緜白糖二物將綿裹糖如梅大其子嚥下入喉間畱緜一半於外時時以手牽掣待喉中作痒忽然痰涎壅出其骨粘於綿上而出遂愈

一稚子以線錘置口中悞吞之有胡僧啖以餳糖半斤卽於穀道中隨糞而下僧云凡悞吞五金皆可啖餳也

一小兒悞吞金綱圈一箇或云急用韭菜熟而勿斷與蠶豆同嚥之不過二次其金圈從大便出矣

五絕門

單方

救自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難也恐此當言忿氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶慮可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之將死人徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胷上數動之一人摩捋臂脛屈伸之若已殭但漸漸強屈之幷按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而

猶引按莫掇亦勿苦勞之須臾可將少桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥及稍止若向令兩人以管吹其兩耳甚好此法最善無不活者（仲景下同）

救溺死方取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔卽活

凡魘死不自覺者愼燈火勿令人手動牽牛臨其上卽覺若卒不能語取東門上雞頭爲末以酒服之（千金下同）

治卒魘死搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳

鬼魘不臥伏龍肝爲末吹鼻中

又方皂莢爲末如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死囘生

辟魘用雄黃如棗大繫左腋下令人終身不魘仲景云男左女右

又方灸兩足大趾叢毛中各二七壯肘後方云華佗以此法救卒死中惡

自縊者切不可割斷繩子以膝蓋或用手厚裹衣物緊頂穀道抱起解繩放下揉此項痕搐鼻及吹其兩

耳待其氣回方可放手若便泄氣則不可救矣

救自縊死安定心神徐緩解之愼勿割繩斷須抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中卽活男雌女雄（肘后方）

又方雞屎白如棗大酒半盞和灌及鼻中尤妙

又方以藍汁灌之（千金）

自縊死但身溫未久者徐徐放下將喉氣管捻圓揪髮向上揉擦用口對口接氣糞門用火筒吹之以半夏皂角搐鼻以薑汁調蘇合香丸灌之或煎木香細辛湯調灌亦得甦可治繩小痕深過時者不治

卒墮攧壓倒打死心頭溫者皆可救將本人如僧打坐令一人將其頭髮控放低用半夏末吹入鼻內如活却以生薑汁香油打勻灌之

溺水死者撈起以尸橫伏牛背上無牛以凳控去其水冬月以綿被圍之却用皂角以生薑自然汁灌之上下以炒薑擦之得甦可治若五孔有血者不治

溺水者放大凳上睡著將脚後凳脚起二磚却蘸鹽擦臍中待其水自流出切不可倒提出水此數等但心頭微熱者皆可救治

又方溺水死一宿者尚可活搗皂角緜裹納下部須臾出水卽活

魘死不得近前喚但痛咬其脚跟及唾其面不醒者移動些少臥處徐徐喚之元有燈則存無燈切不可點燈

臥忽不寤勿以火照之殺人但痛嚙大拇指際而唾其面則活取韭搗汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌口中（肘後方）

又方雄黃搗末細篩以管吹入鼻孔中

神虛氣濁風痰客於心肺所以得夢不覺濁氣閉塞而死氣動不甦面靑黑者不治急以搐鼻散引出痰次以蘇合香丸導動淸氣身動則甦若身靜色陷者不治（準繩）

五絕乃縊死跌死魘死淹死壓死是也世人禍成倉卒往往不救然此等之死五臟未絕因外來之禍而枉死者也其魂魄守於屍旁相去未遠苟以神術招之魂魄卽附體而可生也我傳神符一道先書黃紙上焚化在熱黃酒內掘開牙關灌入喉中後再用藥

丸化開亦用黃酒調匀以入口含藥水用葱管送於死人喉內少頃即活藥丸名救絕仙丹山羊血菖蒲蘇葉各二錢人參製半夏各三錢紅花皂角刺麝香各一錢各爲末蜜爲丸如龍眼核大酒化開用修此丸須端午日妙如臨時不必如許之多十分之一可也此方神奇之極閒時備藥修合一料大可救人若到臨期緩不濟事此方不特救五絕凡有邪祟昏迷一時卒倒者皆可灌之以起死回生也

神符



無呪但書符時一心對雷眞君及天醫使者書之自然靈應無比（石室祕籙）

怪病門

單方

項瘡皮斷　一人項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消

四肢有聲　一人寒熱不止經月後四肢堅如石以物擊之一似鐘磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲卽愈

大腸寸截　一人大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名爲截腸病若腸盡乃不治但初截寸餘可

治用脂麻油盛之以臀坐之自入飲大麻子油數升愈

鼻水成蝦　一人鼻中腥臭水流以椀盛之有鐵色蝦魚如粳米大走躍不住以手捉之卽化爲水此肉壞矣食雞肉一日二次任意饌食月餘愈

前陰出糞　一婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可用舊幞頭燒灰酒服之

足脛流髓　一人兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬如釘子釘了履地不得脛骨有碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傅之煎韭子湯服效

四肢節解　一人四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆三兩經一宿取出焙乾爲末每服二錢酒調下服盡安

莖健漏精　一人玉莖硬不痿精流無歇時時如針刺捏之則脆乃爲腎滿漏精疾用韭子破故紙各一兩爲末每服三錢水一盞煎至六分日三次飲之愈則住服

喉竅臭氣　一人咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

臍內生蟲　一人腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行之狀遶身匝啄癢痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服痊

眼見飛走　一人眼前常見諸般禽蟲飛走以手捉之則無乃肝膽經爲疾用酸棗仁羌活元明粉青葙子花各一兩爲末每服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服

大腸生蟲　一人大腸蟲出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱草爲末水調五錢服之自愈

眼珠突垂　一人眼睛垂出至鼻如角黑色痛不可忍或時時大便血出名曰肝脹用羌活煎汁數服自愈

應聲怪蟲　一人腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之又名應聲蟲當服雷丸自愈

嗜油髮蟲　一人日飲油四五升以來方始快意長

得喫則安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了化爲蟲也用雄黃半兩爲末水調服蟲自出如蛇形者置於油中逡巡間連油潑之長江

失說物望　一人臥於牀四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之失說物望病治法如說食猪肉時便云你喫猪肉一頓病者聞之卽喜遂置肉令病人見臨要却不與喫此乃失他物望也當自睡中涎出便愈

指斷筋連　一人手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數尺餘遍身綠毛名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈

皮內波聲　一人遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以人參苦杖青鹽細莘各一兩作一服水二碗煎十數沸去查飲盡便愈

眼白變黑　一人眼白渾黑見物依舊毛髮直如銕條雖能飲食不語如醉名曰血潰用五靈脂爲末二錢酒調下

瘡肉蝶飛　一人因著艾灸火痂便退落瘡內出鮮

肉片子飛如蝶形狀騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴硝各半兩爲末水調下微利卽愈

徧身出虱　一人臨臥忽渾身虱出約至四五升隨至血肉俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水臥牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑脣動鼻開但飲鹽醋湯十數碗卽安

毛髮如鐵　一人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃胃中熱毒氣結於下焦用白礬滑石各一兩爲末作一服水三碗煎至半合不住飲候靜乃安

皮內蟹行　一人病皮中有蟲如蟹走作聲如小兒啼乃筋肉爲火之化用雷丸雄黃各一兩爲末摻在猪肉片上炙熟喫盡自安

手足肉刺　一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍喫葵菜自愈

鼻中長毛　一人鼻中出毛晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘去一莖卽後更生此因食猪羊血過多遂用乳香硇砂各一兩爲末以飯圓梧桐子大空心臨臥各一服水下十粒自然退落

瘡如猫眼　一人面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少久則透骨名曰寒瘡多喫魚雞葱韭自愈

腸從脅出　一人脅破腸出臭穢急以香油抹腸用手送入煎人參枸杞湯服又淋破處皮自合矣喫羊腎粥赤石脂十日即愈

口鼻黑氣　一人口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋過十日漸漸至肩胷與肉相連堅勝金鐵無由飲食此多因瘧後得之煎澤蘭葉湯日飲三盞連服五日愈

肉出如錐　一人徧身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血擁若不速治潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫豉湯數盞自安

眉動目張　一人眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不效者用蒜三兩取汁酒調下即愈

毛竅血出　一人毛竅節次血出若血不出皮即膨脹如鼓須臾眼鼻口目俱脹此名脈溢飲生薑汁合

水各一二盞卽安

傷寒併熱　一人忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服可安

口內肉毬　一人口內生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股吐毬出方可飲食以手輕捏痛徹於心困不可言用水調生麝香一錢服數日驗

泡破石出　一人渾身生燎泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌肉不可治急用荊三稜蓬莪朮各五兩爲末分三服酒調連進愈

面熱有光　一人頭面發熱有光色他人手近之如火燒用蒜汁半兩酒調下吐出如蛇狀遂安

離魂假相　一人忽覺自形作兩人並臥不別眞假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓濃煎湯服之眞者氣爽假者化也

飲酒身瘦　一男子自幼喜飲酒至成丁後日飲一

二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父用手巾縛住其手足不令動搖但扶少立却取生辢酒一罎就於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者索飲堅不與之須臾口中忽吐物一塊直入罎中卽用紙封裹罎口用猛火燒滾約酒乾一半卽開視之其一塊如猪肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣

瘡如人面　一商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤以物食之凡物必食食多覺膊內肉漲起或不食之則一臂痹焉有善醫者敎其歷試諸藥金石草木悉與之至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥必治之也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈

蛟龍怪病　古有患者飲食如故發則如癲面色青黃小腹脹滿如孕醫者診其脈與證皆異而難明其主療忽有一山叟曰聞開皇六年灞橋有患此病蓋因三月八日水邊食芹菜得之有識者曰此蛟龍病

也爲龍遊於芹菜之上誤食而病也遂以寒食餳每劑五合服之數服吐出一物雖小而似蛟龍狀有兩頭其病自此獲痊

瘡破雀飛　一人左目上瞼忽生一小瘡其形長如鴨卵其根如弦極偃其目不能開金州防禦使崔堯封飲之酒令大醉便與割去瘡既破中有黃雀飛鳴而去

身漸縮小　世有奇疾終莫能曉昔呂縉叔以制誥知潁州忽得疾身體日漸縮小人不能醫臨終僅如小兒古人不曾患此疾終無人識

視物倒植　元末四明呂復別號滄洲翁深於醫道臨川道士蕭雲泉眼中視物皆倒植請復治問其因曰某嘗大醉盡吐所飲酒熟睡至天明遂得此病復診其脈左關浮促卽告之曰傷酒大吐上焦反覆致倒其膽腑故視物皆倒植不內外因法當復吐以正其膽遂用藜蘆瓜蔕爲粗末水煎使平旦頓服以吐爲度吐畢視物如常

視直如曲　一婦人視物如曲弓視界尺之直亦如

曲鉤藥莫能治

嘔物如舌　鎭陽有士人嗜酒日飲數斗飲興一發則不過一夕大醉嘔出一物如舌初視無痕竅至欲飲時眼徧其上矗然而起家人沃之以酒立盡至常日所飲之數而止遂投之猛火自出裂爲十數片士人自此惡酒不飲

病消食龍　齊諧記云江夏郡安陸縣隆安中有郭坦兄弟三人大兄得天行病後遂大能食一日食斗米其家給五年貧罄後乞食至一家門前已得飯又復乞其後門其家人愁之云前門已飯了又從後門來討那得許多與你彼答云腹中饑甚實不知是後門門園有薤三畦彼就地而啗其二須臾悶臥在地大吐一物如龍因出漸漸小人持飯與遂不復食將飯著所吐之物上即消化成水此病尋差

婦人異疾　一婦異疾每腹脹則腹中有聲如擊鼓遠聞於外人行過其門者皆疑其家作樂腹脹消則鼓聲亦止一月一作經百醫皆莫能明其疾

腹內鐘鳴　有娠婦腹內如鐘鳴一貧士用鼠窟前

畚土研羅爲末每服二錢麝香湯調服其疾卽愈

產婦腹癢　箭簳及鏃主治婦人產後腹中癢安所臥牀蓆下勿令人知

產後腸癢　針線袋主治婦人產後腸中癢不可忍以袋安所臥褥下勿令人知

盃中蛇影　陳留何解元一日飲於趙修武宅酒至陳忽見盃中似有小蛇入口亦不覺有物但每思而疑之日久覺心痛自思蛇入腹爲患不淺後復會其宅恰纔執盃又見小蛇乃放盃細看乃梁上挂弓一張蛇影乃弓梢之影是也遂解其疑痛卽止

食挂　眉州米思古得疾不能食聞葷腥則嘔惟用大鐺旋煮湯沃淡飯數數食之醫莫能治史載之曰俗輩不讀內經而妄醫人之疾可歎可駭君之疾正在素問經中名曰食挂凡人之肺六葉舒張而蓋下覆於脾子母氣和則進食一或有戾則肺不能舒脾之爲弊故不嗜食遂授一方以清氣潤肺爲治服三日病者鼻聞肉味覺香取啖之甚美此宋人載於傳記考之素問並無食挂之病或記者假托耳

毛如鐵條　一白人忽變黑毛直如鐵條雖飲食不語如大醉名無血證

眼見五色　一人酒色過度眼見空中有五色物稍近變成一美婦人亭亭而立徐之才曰此色慾多大虛所致乃處補藥飲之數劑而愈

面腫如蛇　一人頭面肉腫如蛇狀用濕磚上青苔一錢水調塗立消

遍身赤肉　有小兒初生遍身無皮俱是赤肉掘土坑臥一宿即長皮又方用白旱米粉乾撲於上候生皮乃止

腦瘊　一婦人年少腦生一瘊凡欬膿血與瘊相應而出此肺痿也用參芪歸芍加退熱排膿之劑而愈

胞滿　一婦產後有傷胞破不能小便常常滲漏不乾用生絲絹一片剪碎白牡丹根皮白芨末各一錢水一碗煎至絹爛如錫空心頓服不可聲言即效

蛇頭瘡　患瘡如蛇頭突出數寸用雄黃硫黃塗之即消

心疾見獅　有患心疾見物如獅子程伊川教以手

直前捕之見其無物久久自愈

觀壁皆蓮　一婦病熱目視壁上皆是紅蓮花醫用滾痰丸下之愈

乳懸　婦產後忽然兩乳細小下垂痛甚名曰乳懸用芎歸各二斤內用半斤煎水服餘以燒煙熏口鼻二料乃愈

水道出線　一婦產後水道中出肉線一條長尺餘動之則痛欲絶先服失笑散數服次以帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎乾爲度用絹兜起肉線屈曲於水道邊以煎薑熏之冷則熨之一日夜縮其大半二日則盡又再服失笑散芎歸湯調理如肉線斷不可治

灸火出血　有人灸火至五壯血出一縷急如溺手冷欲絶以酒炒黃芩一二錢爲末酒下止

頭皮蛆出　一人頭皮內時有蛆出以刀切破皮用絲瓜葉搗汁搽之蛆出盡根絶

瘡爛生蛆　小兒瘡爛生蛆以柳條帶葉鋪地將兒臥其上蛆盡出而愈

瘡孔兒啼　一人淵疽發於肋下久則潰竅有聲如兒啼灸陽陵泉二七壯即止

指節斷落　有人手指節間痛不可忍漸至斷落以蓖麻子去殼二兩碎者不用黃連四兩貯瓶內水二升浸之春夏三日秋冬五日每早向東以此水吞下蓖麻子一粒漸加至四五粒微泄無害忌食動風物屢驗

耳內雀聲　一人患頭風證耳內常鳴如鳥雀啾唧之聲此挾腦風火之聲也用川當歸煎服而愈

傷寒舌出　一人傷寒舌出寸餘連日不收用梅花冰片搽舌上應手而收重者用三錢方愈

產後舌出　婦人產後舌出不能收以硃砂傅其舌令作產兒之狀以一女扶之壁外潛將瓦器忽然崩墜響聲婦聞而驚舌則收

產子母蟲　一婦人忽產蟲一對在地上能行長寸餘自後月生一對以苦參加殺蟲藥爲丸服之又生一對埋於土中過數日發而視之大如拳名子母蟲從此絕根

眼中出血　一婦人眼中血如射而出或沿鼻流下但出血多時卽經不行乃陰虛相火之病遂用當歸生地酒芍加柴胡黃連黃蘗知母條芩側柏木通桃仁紅花水煎食前服愈

妳頭開裂　妳頭開裂用秋後嫩茄子裂開頭者陰乾燒爲末水調服

徧身紅點　男子每至秋冬遍身發紅點作痒此寒氣收斂腠理陽氣不能發越怫鬱內作也宜用人參敗毒散解表再用補中益氣湯實表而愈

徧身紫泡　一人因剝死牛瞀悶遍身俱發紫泡悶絕便急刺破泡良久遂收而甦醒更與敗毒藥愈

紅絲瘤　一人問東垣曰某生一子一歲後生紅絲瘤而死後生四子皆然何也曰汝乃腎中伏火精乃有紅絲故也俗名胎瘤汝試以精驗之果然令服滋腎丸其妻服六味地黃丸後受胎生子前證不作

產後食茶　一婦人產後日食茶二十餘碗一月後遍身冰冷數塊人以指按其冷處卽從指下上應至心如是者二年諸醫不效以八物湯去地黃加橘紅

入薑汁竹瀝一酒盃十服而溫

聞雷昏倒　一小兒七歲聞雷即昏倒以人參當歸身麥門冬少入五味子熬膏盡劑後聞雷自若

別有一喉　一人但飲食若別有一喉齇斜過膈下徑達左脅而作痞悶以手按之則瀝瀝有聲以控涎丹十粒服之少時痞處熱作一聲轉瀉下痰飲二升再飲食正下而達胃矣

三陰交血出　一婦三陰交無故血出如射將絶以指按其竅縛以布條昏倒不知人以人參一兩煎湯灌之愈

項腫與頭相統　一人頸項腫與頭相統按之堅硬漏蘆湯一劑服下發痒項刻消散

痒入骨髓　一人田間收稻忽然遍身痒入骨髓此痰氣也用食鹽九錢泡湯三碗每進一碗探而吐之三進三探則不痒矣

產戶一物如泡　丹溪治一婦產戶下一物如泡有尖約重斤餘却喜血不盡虛急與黃芪白朮升麻各五分人參當歸各一錢水煎連服三劑即收愈

胷間潰竅　一少婦胷潰一竅有膿血與口中所欬相應而出以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈

玉莖長腫　一少年玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩腿氣衝上手足倦弱先以小柴胡湯加黃連大劑行其濕熱少加黃蘗降其逆上之氣腫漸消莖中硬塊未盡以青皮爲君佐以散風之藥爲末服外以絲瓜汁調五倍子傅之愈

陰莖腫大　一人莖頭腫大如升光如魚泡以二陳湯加升麻青黛牡蠣水煎服二劑愈

陰戶如石　一婦產後因子死經斷不行半年一日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之而痛不禁羣醫不識青林曰此石瘕也用四物湯加桃仁大黃三稜檳榔延胡索附子澤瀉血竭爲湯二劑而愈

瘡血如溺　一人左手無名指爪角生一小瘡初起麻粒大用小刀挑開瘡頭血出如溺不止一日夜長出肉瘤如菌裹指頂內開一孔如眼目轉動此疔毒也以艾灸四十壯不知疼痒復烙之剪去肉瘤傳收疔散外以膏藥貼之內服解毒湯七日愈

皮生惡物　一女十六歲四肢輙皮處生惡物如黃豆大半在肉內紅紫色痛甚諸藥不效方士教買水銀四兩以白紙二張揉熟蘸水銀擦三日自落而愈

膽衡　一產婦因事大恐而病病雖愈惟目張不閉人皆不能曉問於錢仲陽曰病名膽衡煑郁李仁酒飲之使醉即愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衡不下郁李仁可去結隨酒入膽結去膽下目則能閉矣如言而效

腹內蝦蟆　汾州王氏病右脅有聲如蝦蟆常欲手按之否則聲聲相接醫不能辨雷陽山人趙巒診之曰此因驚氣入於臟腑而成與鎮驚硃砂丸以蝦蟆衣湯送下遂瘥蝦蟆衣即車前草也

諸蟲門

黃帝素問

氣交變大論

歲木不及收殺氣行寒雨害物蟲食甘黃脾土受邪

（註）夏秋之交土氣用事而反爲寒雨所勝故也

歲土不及復則收政嚴峻名木蒼凋蟲食甘黃氣客於脾

（註）氣水氣也蟲食甘黃氣客於脾水侵土也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

脾脈微滑爲蟲毒蛕蝎腹熱

註 脾爲濕陰之土滑爲濕熱之脈濕熱則生蟲也

五癃津液別篇

中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃充郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出

註 胃緩則少陰之氣不與陽明相合反上逆於廉泉則水液隨之故涎唾也

上膈篇

氣爲上膈者食飲入而還出蟲爲下膈下膈者食晬時乃出

註 上膈者上焦之氣也下膈者中焦之氣也

論疾診尺篇

肘後粗以下三四寸熱者腸中有蟲

漢張機金匱要略

狐惑

狐惑之爲病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其

面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝甘草瀉心湯主之

蝕於下部則咽乾苦參湯洗之

蝕於肛者雄黃熏之

唐孫思邈千金方

九蟲

夫人腹中有屍蟲此物與人俱生而爲人大害屍蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰蚘蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲則羣蟲之主也蚘蟲貫心殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五寸亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居胴腸之間多則爲痔劇則爲癩因人瘡痍卽生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏

有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白筵草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是屍蟲所畏也

凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并痰飲宿癖除盡方可服補藥不爾必不得藥力

凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒齗無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽善眠當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕其五臟下脣內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾䘌蟲殺人又曰凡患濕䘌者多是熱病後或久下痢不止或有客熱結在腹中或易水土溫凉氣著多生此病亦有乾䘌不甚泄痢而下部瘡痒不問乾濕久則殺人凡濕得冷則苦痢單煑黃連及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒齗無色舌上白者或喜眠煩憒不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部爲意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便死

燒艾於竹筒熏之

宋許叔微本事方

治法

心蟲曰蛔脾蟲曰寸白腎蟲如寸截絲縷肝蟲如爛杏肺蟲如蠶皆能殺人惟肺蟲爲急居肺葉之內蝕人肺系故成瘵疾由是欬嗽咯血聲嘶藥所不到治之爲難道藏經中載諸蟲頭皆向下惟自初一至初五以前蟲頭向上故用藥多取效者此也又姚寬西溪叢話云五臟蟲皆上行唯有肺蟲下行最難治用獺爪爲末調藥於初四初六日治之此日肺蟲上行也二說小異姑兩存之以備叅考

王肯堂證治準繩

九蟲

蟲由濕熱鬱蒸而生觀之日中有雨則禾節生蟲其理明矣善乎張戴人推言之也曰水火屬春夏濕土屬季夏水從土化故多蟲焉人患蟲積多由饑飽調燮失宜或過餐魚膾白酒多食牛羊或誤啖鼈莧中脘氣虛濕熱失運故生寸白諸蟲或如蚯蚓或似龜

髓小兒最多大人間有其候心嘈腹痛嘔吐涎沫面色痿黃眼眶鼻下靑黑以致飲食少進肌肉不生沉沉默默欲眠微有寒熱如不早治相生不已古人云蟲長一尺則能害人蟲若貫串殺人甚急治法追蟲取積以剪紅丸尊神丸遇仙丹

九蟲皆由臟腑不實脾胃皆虛雜食生冷肥甘油膩鹽藏等物節宣不時腐敗停滯所以發動又有神志不舒精魄失守及五臟勞熱又病餘毒氣血積鬱而生或食瓜果與畜獸內藏遺留諸蟲子類而生蟲之爲候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來乍作乍止寸白蟲色白形褊損人精氣力乏腰疼蟯蟲細如菜蟲能爲痔漏瘡癩疥癬癰疽等患寸白蟯蚘是三者皆九蟲數中之一物也外此又有兒童疳慝昏睡煩躁鼻爛汁臭齒斷生瘡下利黑血蟲食下部爲狐下脣有瘡蟲食其臟爲惑上脣有瘡

三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷則相

生未已更宜速治之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃無不有者宜服九蟲丸以除之

蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作積聚行來上下痛有休息亦攻心痛腹中熱口中喜涎及吐清水貫傷心者則死診其脉腹中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則蛔蟲也

蚘蟲九蟲之數人腹中皆有之小兒失乳而哺早或食甜過多胃虛蟲動令人腹痛惡心口吐清水腹上有青筋火煨史君子與食以殼煎湯送下甚妙然世人多於臨臥服之又無日分多不驗唯是於月初四五間五更服之至日午前蟲盡下可以和胃溫平藥一兩日調理之不可多也九蟲在人腹中月上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下故中下旬用藥卽不入蟲口所以不驗也牛馬之生子上旬生者行在母前中旬生者並肩而行下旬生者後隨之猫之食鼠亦然上旬食上段中旬中段下旬下段自然之理物皆

由之而莫知之

景岳全書

臣張介賓著

論證

蟲之爲病人多有之由於化生誠爲莫測在古方書雖曰由濕由熱由口腹不節由食飲停積而生是固皆有之矣然以常見驗之則凡臟强氣盛者未聞其有蟲正以隨食隨化蟲自難存若夫臟氣之弱行化之遲所以停聚而漸致生蟲耳然則或由濕熱或由生冷或由肥甘或由滯膩皆可生蟲非獨濕熱已也然以數者之中又惟生冷生蟲爲最卽如收藏諸物但著生水或近陰濕則最易蛀腐非其義乎故凡欲愛養小兒極當節其水果以防敗脾此實緊要之一端也至若治蟲之法雖當去蟲而欲治生之之本以杜其源猶當溫養脾腎元氣爲主但使臟氣陽强非惟蟲不能留亦自不能生也余製有溫臟丸方最所宜也

蟲之爲病其類不一或由漸而甚或由少而多及其久而爲害則爲腹痛食減漸至羸瘠而危者有之凡

蟲痛證必時作時止來去無定或嘔吐青黃綠水或吐出蟲或痛而坐臥不安或大痛不可忍面色或青或黃或白而脣則紅然痛定則能飲食者便是蟲積之證速宜逐之

論治

治蟲之劑凡蟲勢驟急上攻心腹作痛者宜掃蟲煎先治其標若蟲積堅固者宜獵蟲丸遇仙丹木香檳榔丸百順丸之類主之若稍緩而質弱者宜蕪荑散化蟲散之類主之丹溪云打蟲方用楝樹根檳榔鶴蝨夏取汁冬濃煎飲之又萬應丸最妙

治蟲之法按丹溪云上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以肉汁或糖蜜引蟲頭向上然後用藥此皆法之善者然此乃緩治之法耳夫蟲證甚急又安能必待其時乎且以望前望後辨蟲頭亦若渺茫無據惟先用香餌而蟲頭可引豈非望後之治亦自有法又何慮其難治也

徐東皐云治蟲之方固多而用之者不知其法則亦不能下蟲如丹溪云蟲欲向下之時必須俟其向上

法當行於月半之前也若蟲得食則不食藥亦不能下蟲而徒瀉其虛也故雖有方不知其法則方亦不效凡欲下蟲必先一日不食而使蟲饑次早五更用油煎肉嚼之良久腹內蟲聞肉香頭皆向上而欲食乃以鷄卵煎餅和藥嚼而食之須臾服葱湯或白水少少以助藥力下行不踰時而蟲俱下甚至數升然後以白粥補之隨服補劑調理脾胃而疾可悉愈

一驗治法昔一人患心腹大痛或止或作痛不可忍凡用去積行氣等藥百方不效但於極痛處須用拳搥之痛得少止而旋止旋作久不能愈日加困弊莫測其故忽一胡僧見之曰予能治也遂令病者先食香餌繼進一丸打下一硬嘴異蟲遂愈此因蟲齧腸臟所以痛極搥之則五內震動蟲亦畏而斂伏不搥則蟲得自由所以復作此亦驗蟲奇法故凡見心腹痛證但用揉按重捻而痛得暫止者多有因蟲而然也

蚘蟲

凡諸蟲之中惟蚘蟲最多其逐治之法總若前條然

旋逐旋生終非善策欲杜其源必須溫養脾胃脾胃氣強蟲自不生矣故凡於逐蟲之後或於未逐之先若欲調補脾胃則如歸脾湯溫胃飲五君子煎理中湯或理陰煎之屬皆所宜也若欲兼蟲而治之則惟溫臟丸爲最善凡治蟲之法或攻或補自有緩急先後之宜所當詳辨不可任意忽略也

巢氏病源曰凡腹中痛其脉法當沉弱今脉反洪大是蚘蟲也

寸白蟲

此蟲長寸許色白其狀如蛆母子相生有獨行者有箇箇相接不斷者故能長至一二丈治寸白蟲無如榧子煎其效如神

小兒疳蟲

小兒疳蟲名曰疳䘌亦由飲食過傷致成疳積身熱腹大面黃四肢無力昏睡鼻爛汁臭齒齦生瘡或下利黑血皆腹中有蟲故也宜九味蘆薈丸追蟲丸四味肥兒丸七味肥兒丸蟾蜍丸之類主之蟲去之後仍當調補氣血

石室祕籙　臣陳士鐸著

蟲痛

蟲痛之證得食則痛減無食則痛增以酸梅湯一盞試之飲下而痛卽止乃蟲痛飲下而痛增重或少減者非蟲痛也方用白朮二兩楝樹根白薇各一兩黃連烏梅肉吳茱萸炒梔子茯苓甘草鼈甲各三錢各爲末蜜爲丸每服三錢丸如小米大此丸必須乘其饑餓思食之時與之此丸服下必痛甚不可卽與之水蓋蟲得水卽生也此方之妙妙在健脾之中而用殺蟲之品既是殺蟲之藥何故必待其饑餓而始殺之蓋腹中無食則蟲不得養蟲口必向上而索食待其饑餓枵腹之時則蟲頭盡向上而不向下矣一與之食彼必以爲食也盡來爭食之奈入口拂其性則亂動而跳躍故轉痛甚也禁與之水則周身上下耳目口鼻無非沾染藥氣內外夾攻有死而已設不知禁忌仍與之水蟲且借勢而翻騰沐浴藥少水多自然解體止可殺蟲一半而不能剪草除根矣故必堅忍須臾一刻之痛使終身之痛除願人忍之哉大黃

亦可加三錢不加亦可腹之上疼不宜加腹之下疼宜加也

方

甘草瀉心湯

治蟲蝕上部聲喝者

甘草生四兩　黃芩　人參　乾薑各三兩

黃連一兩　大棗十二枚　半夏半升

右七味水一斗煑取六升去滓再煎溫服一升日三服

遇仙丹

治蟲積堅固者

黑丑頭末　檳榔各一斤　大黃半斤　三稜　莪朮各醋炙四兩　木香二兩

右爲末用皂角去子打碎煎濃湯去滓煑麪糊爲丸桐子大每服四五十丸以强弱爲加減五更茶清下如未通再以溫茶助之下蟲積惡物盡了白粥補之

蕪荑散

治大人小兒蚘咬心痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此蚘心痛也宜此主之

蕪荑　雷丸各半兩　乾漆搥碎炒烟盡一兩

右爲細末每服三錢用溫水七分調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分

蕪荑散（直指）

取諸蟲

雞心檳榔　蕪荑各三錢　木香一錢

右爲末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自轉困而下一方無蕪荑

烏梅丸（仲景）

治胃寒吐蚘蚘厥等證

烏梅肉三十箇　人參　黃蘗炙　細辛　桂枝

附子炮各六錢　黃連炒一兩六錢　乾薑一兩

當歸酒浸　川椒去目及閉口者各四錢

右研末先將烏梅用酒蒸爛搗膏加煉蜜丸桐子大每服一二十丸日三服忌生冷滑物用理中湯下

木香檳榔丸（寶鑑）

治前證

木香　青皮去瓤　陳皮去白　枳殼麩炒

檳榔　蓬朮煨切　黃連各一兩　黃蘗去皮

香附炒　大黃炒各三兩　黑丑取頭末四兩

滴水爲丸豌豆大每服三五十丸食遠薑湯送下以微利爲度

化蟲散（醫林）

雷丸二粒　檳榔二枚　鶴蝨一錢　輕粉少許

史君子七枚

右爲末分二服候晩刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候溫取前藥一服擦肉上略烘過食之至巳時蟲下了乃進飲食

肝蟲方

治肝勞生長蟲在肝爲病恐畏不安眼中生花

蠟　吳茱萸東行根皮各三兩　乾漆四兩

雞蛋五枚去黃　粳米粉半斤

右五味搗茱萸皮爲末和藥銅器中煎可丸如小豆大宿勿食可平旦飲服一百丸小兒服五十丸蟲當爛出

心蟲方

治心勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心爲病

雷丸　橘皮　桃仁（一本作桃皮）　石蠶各五分

狼牙六分　貫衆二枚　吳茱萸根皮七分

殭蠶三七枚　蕪荑　青葙　乾漆各四分

亂髮如雞蛋大燒

右十二味爲末蜜丸如梧子空腹苦酒下七丸加

至二七丸日二服一方無石蠶

脾蟲方

治脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔下蟲

大麻子八升　東引吳茰根大者一尺　橘皮二兩

右三味㕮咀以水煎臨時量服凡合禁聲勿語道作藥蟲當聞便不下切忌之

肺蟲方

治肺勞熱生蟲在肺爲病

東行桑根白皮一升　東行吳茱萸根白皮五合

狼牙三兩

右三味㕮咀以酒七升煮取一升平旦頓服之

腎蟲丸

治腎勞熱四肢腫急蟯蟲狀如菜蟲在腎中爲病

蕪荑　胡粉　槐皮各一兩　杏仁四十枚

乾漆二兩　貫衆三枚　吳茱萸五十枚

右七味治下篩平旦井華水服方寸匕加至一匕半瘥止

蘼蕪圓

治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐悶寒熱飲食不生肌皮肉萎黃四肢不相勝舉

蘧蘆　甘菊花各四分　蘼蕪　貫衆　雷丸

山萸　天冬　狼牙各八分

右八味爲末蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲以上以意加之漸至十丸

神效剪紅丸

專取一切蟲積神效無比每於五更雞鳴時用冷茶清下更用馬桶盛糞於野地看之庶見藥功易辨或蟲或積或如爛魚凍或作五色等積若一次未見蟲積更看第二三次下來此卽是病根有積消積有氣消氣有蟲取蟲有塊消塊若病根去其病自消若病淺卽一服見效若源深根固須再一服能宣導四時蘊積春宣積滯不生瘡毒夏宣暑濕不生熱利秋宣痰飲不生瘴瘧冬宣風寒不生瘟疫此藥溫和不動元陽眞氣亦無反惡小兒半服孕婦休服其效如神

一上末用檳榔生研細取淨末一斤以二兩爲母餘

十四兩第一次以一等羅篩過取齊曬乾
二上末用商陸根即樟柳根白者可用赤者殺人
金毛狗脊　貫衆各四兩已上三味和一處研極細
末上第二次以二等羅篩過取齊曬乾若不用貫衆
則蟲出來猶未死也
三上末用三稜　莪术並酢煑各八兩　青木香
西木香各四兩　雷丸酢煑二兩半　南木香二兩
已上六味和一處研極細末上第三次以三等羅篩
過取齊
四上末用大黃剉碎浸酒曬乾研細取淨末一斤上
第四次以四等羅篩過取齊曬乾
五上末用黑牽牛半生半炒研細取頭末淨一斤上
第五次以五等羅篩過取齊曬乾又方有枳殼一斤
爲母有藿香四兩和入諸藥
右作五處另研極細末要作五次上末却用茵陳
半斤大皂角一斤煎汁濾淨法水爲丸如菉豆大
曬乾後用丁香末一兩或加蘆薈末一兩亦妙以
前淨汁煎一滾灑入丸藥旋搖令光瑩爲度再以

阿膠二兩生以前汁熬鎔灑入丸藥旋搖光瑩曬乾壯人每服五錢弱人每服四錢五更以茶清吞下小兒減半

萬應丸

取蟲積神效

黑牽牛取頭末　大黃　檳榔各八兩　南木香　雷丸醋煮各一兩　沉香五錢

右將黑牽牛大黃檳榔和一處爲末以大皂角苦楝皮各四兩煎汁法水爲丸如菉豆大後以雷丸木香沉香和一處研末爲衣每服三四十丸五更用砂糖水送下或作末服亦可

追蟲丸

取一切蟲積

黑牽牛取頭末　檳榔各八兩　雷丸醋炙　南木香各二兩

右爲末茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁法水爲丸如菉豆大大人每服四錢小兒三錢或二錢或一錢半量人虛實五更用砂糖水吞下待

追去惡毒蟲積二三次方以粥補之

下蟲丸

追蟲取積

苦楝皮去外粗皮用根皮爲上樹皮次之

右末麪糊丸彈子大如欲服藥宜戒午飯晡時預食油煎雞子餅一二箇待上牀時滾白湯送下一丸至五更取下異蟲爲效

化蟲丸

治諸蟲

鶴蝨去土　檳榔　苦楝皮　胡粉炒各一兩

白礬枯二錢半

右爲末米糊爲丸如桐子大一歲服五丸量人大小加減丸數溫漿水入生麻油三四點打勻送下清米湯亦可不拘時其蟲細小者皆化爲水大者自下

集效方

治因臟腑虛弱或多食甘肥致蚘蟲動作心腹絞痛發則腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐

涎沫是蚘咬宜服此藥若積年不瘥服之亦愈又

治下部有蟲生痔痒痛

木香　鶴蝨炒　檳榔　訶子麪裹煨去核

蕪荑炒　附子煨去皮臍　乾薑各七錢半

大黃一兩半　烏梅十四箇去核

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸食前用陳皮湯送下婦人淡酢湯送下

祕方萬應丸

治大人小兒腹內有蟲及積氣塊痛小兒疳病

三稜酢炒　莪朮酢炒　陳皮麩炒黃色　橘紅

雷丸　乾漆炒無烟　使君子取肉　麥糵麪炒

神麴炒黃色各五錢　鶴蝨微炒　胡黃連炒

炙甘草三錢　蕪荑二錢五分　檳榔一兩

木香不見火　良薑陳壁土炒　砂仁去殼各二錢

右爲細末酢打米糊丸如菉豆大每服三五十丸空心淡薑湯送下

又方

取蟲積

檳榔　牽牛　皂角各半斤　雷丸一兩半

苦楝皮一兩　三稜　蓬朮另剉同酢煑各二兩

大黃四兩　木香隨意加入

右爲細末煎皂角膏子煑糊和丸如黍米大每服二錢四更時分冷茶送下小兒一錢蟲下以白粥補之

萬靈丸

取積追蟲

黑牽牛一斤取頭末十兩生用　蓬朮二兩煨

大腹子一斤扁者取末七兩生用如尖者是檳榔

京三稜炮　雷丸炮　廣木香煨各五兩

右爲細末研勻用好紫色皂角半斤去皮弦切碎用水兩大盞浸一宿冬月浸兩宿撈去粗滓銅磁器內熬數沸白沫出爲度放冷和藥必須揉擣爲丸如梧桐子大每服四錢重五更時砂糖水送下溫冷不妨至天明利三五行看取下是何蟲積以溫白粥補之忌食生冷魚腥硬物孕婦勿服

麥門冬湯

治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬逆氣喘或謂憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈此皆勞氣所生名曰膏肓病針灸不至

蜀椒去目及合口者微炒出汗　乾薑炮各一兩
麥門冬去心十兩　黃芪剉　百部焙　白朮
人參　桂去粗皮各一兩二錢半　遠志去心
附子炮去皮臍　細辛　炙甘草各一兩半
杏仁去皮尖雙仁焙乾麩炒令黃半兩

右爲細末煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令匀熟丸如酸棗大含化稍稍嚥津一方有檳榔一方無白朮

前胡湯

治脾勞有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔胷中欬欬即嘔而不出

前胡去蘆　白朮剉　細辛去苗葉　赤茯苓
枳殼麩炒　常山　松蘿　旋覆花各一兩半
龍膽草　杏仁去皮尖雙仁麩炒各一兩

右剉碎每服半兩水二盞入竹葉十片洗淨細切

同煎至一盞去查空心服吐之卽瘥若腹中熱滿加芒硝半錢梔子仁苦參各一兩黃芩一兩半一方用枳實無枳殼

錫灰丸

取寸白諸蟲

錫灰一兩　雞心檳榔　貫衆各半兩　輕粉　黃丹各二錢　木香二錢半

右爲細末酒酢煮麪糊爲丸如荔枝大每服一丸米泔浸輭日午先喫飯了至黃昏不饑飽時喫肉脯一片引蟲少刻溫酒嚼下至天明蟲出又喫韭菜亦治寸白蟲

又方

治寸白蟲令化爲水

狗脊　貫衆　白蕪荑　酸石榴根剉各一兩

右剉碎每服半兩以漿水一大盞煎至五分去查四更初溫服先於晚間不得喫夜飯

又方

治寸白蟲爲水瀉出永除

榧子　檳榔　蕪荑各等分

右爲細末每服二錢溫酒調服先喫燒牛肉脯後服藥

又方

治濕䘌

青黛二兩　川黃連　黃蘗　丁香各一兩

麝香二錢

右爲細末以車脂和如棗大內下部日一二度

濕䘌方

黃連　生薑各十兩　艾葉八兩　苦參四兩

右四味㕮咀以水一斗煑取三升分三服

懊憹散

治濕䘌瘡爛殺蟲除䘌

萹竹半兩　蘧蘆　雷丸　青葙子　桃仁

女青各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕亦酒服

青葙散

治熱病有䘌下部生瘡

靑葙子一兩　橘皮　萹竹各二兩　蘧蘆四兩

甘草一分

右六味治下篩米飲和每服一合日三不止稍加之

薑蜜湯

治濕䘌

生薑汁五合　白蜜三合　黃連三兩

右三味以水二升別煑黃連取一升去滓內薑蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

又方

治䘌蟲蝕下部癢穀道中生瘡

阿膠　當歸　靑葙子各二兩　艾葉一把

右四味㕮咀以水八升煑取二升半去查分三服

杏仁湯

治䘌

杏仁五十枚　苦酒二升　鹽一合

右三味和煑取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯

治蟯蟲蚘蟲及痔䘌蟲食下部生瘡

桃皮　艾葉各一兩　槐子三兩　大棗三十枚

右四味㕮咀以水三升煑取半升頓服之良

猪膽苦酒湯

治熱病有䘌上下攻移殺人

猪膽一具　苦酒半升

右二味相和火煎令沸三上三下藥成放溫空腹飲三滿口蟲死便愈

又方

治濕病下部有瘡蟲蝕人五臟

雄黃　皂莢各一分　麝香　硃砂各二分

右四味爲末蜜和擣萬杵初得病酒服如梧子大一丸日二若下部有瘡取如梧子大末內下部日二

又方

青黛　黃連　黃蘗　丁香各一兩　麝香二分

右五味治下篩以小棗大內下部日一度重者棗

大和羊脂二三合灌下部中日二服

雄黃兌散

治時氣病䘌下部生瘡

雄黃半兩　靑葙子　黃連　苦參各三兩

桃仁一兩

右五味爲末綿裹如棗核大內下部亦可棗汁服

方寸匕日三

溫臟丸

治諸蟲積旣逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健

脾胃以杜其源此方主之

人參酌用　白朮米泔浸炒　當歸各四兩

芍藥酒炒焦　茯苓　川椒去合口者炒出汗

榧肉　使君子煨取肉　檳榔各二兩　乾薑炮

吳茱萸湯炮一宿炒各一兩

右爲末神麴糊爲丸如梧子大每服五七十丸或

百丸饑時白湯下

獵蟲丸

治諸蟲積脹痛黃瘦等病

蕪荑　雷丸　桃仁　乾漆炒烟盡　雄黃微炒

錫灰　皂角燒烟盡　檳榔　使君子各等分

輕粉減半　細榧肉加倍

湯浸蒸餅爲丸菉豆大每服五七丸滾白湯下陸續服之如蟲積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百順丸

治一切陽邪積滯凡氣積蟲積血積食積傷寒實熱祕結等證但各爲湯引隨宜送下無往不利

川大黃錦紋者一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅搗丸菉豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引或用蜜爲丸亦可

掃蟲煎

治諸蟲上攻胷腹作痛

青皮　小茴香炒　吳茱萸各一錢　檳榔

烏藥各一錢半　細榧肉三錢敲碎　硃砂

雄黃各五分俱爲極細末　烏梅二箇　甘草八分

右將八味用水一鍾半煎八分去柤入雄黃硃砂二味再煎三四沸攪勻徐徐服之

單方

蟯蟲用好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煑數沸宿勿食空心頓服之（千金下同）

治三蟲方珍珠二兩亂髮如雞子大燒末治下篩以苦酒調旦起頓服之

蟯蚘蟲蘧蘆末以飲臛和服方寸匕不覺加之

熱患有蚘蟲懊憹蘧蘆十分乾漆萹竹各二分治下篩米飲和一合服之日三

蟯蚘蟲在胃中漸漸羸人用醇酒好漆白蜜各一升

三味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚入溫酒中宿勿食旦服之蟲必下未下更服之

又方取楝實醇苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中入三寸一日易之

蚘蟲攻心腹痛取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食服之蟲卽死出

又方鶴蝨苦酒空腹服方寸匕愈

又方七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕日三卽瘥

寸白蟲用胡麻一升胡粉十兩二味爲末明旦空腹以猪肉臛汁噉盡卽瘥

又方取吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿平旦分二服凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不任用

又方用石榴根如茱萸法亦可水煎

又方研大麻取汁五升分五服亦治小兒蚘蟲

又方桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服

又方檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取一升半去滓內末頓服暖臥蟲出或不盡更合服取瘥止宿勿食旦服

下部生瘡濃煎桃皮如餳內下部口中有瘡含之

濕䘌取生薑去皮斷理細切研取汁一升半又以水一升半合和平旦空腹服之仍削生薑二枚如繭大以楸葉苦桃葉數重裹訖於爐灰火中燒令極熱內下部中食頃若濕盛者三日一作無有不瘥

又方燒馬蹄灰作末以猪脂和傅綿裹內下部中日四五度

大孔蟲痒蒸大棗取膏以水銀捻和長三寸綿裹訖宿內大孔中明旦蟲皆出然水銀損腸宜慎之

蟲蝕下部胡粉雄黃二味各等分爲末著穀道中

治蚘蟲取苦楝根東引不出土者刮去皮土取內白皮二兩水三椀煎一椀半去柤以晚米三合煑糜粥空心先以炙肉一片嚼之引蟲向上次喫藥粥一二口少頃又喫漸漸加至一椀其蟲下盡而愈

傷寒熱病多睡變成濕䘌四肢煩疼不得食方用羊

桃十斤切搗令熟暖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過三度瘥

治熱病蟲毒令人欲寐不知痛處面赤如醉下利膿血當數視其人下部大小之孔稷稷然（一云搜搜然）赤則蠶瘡也劇困殺人蝕人肝肺服藥不瘥可熏之以泥作小罌令受一升竹筒一枚如指大者一頭橫穿入罌腹中一頭內入穀道中淺入可取熟艾如雞子大著罌中燃之於罌口吹煙令入人腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者不得多多亦害人日再熏不過三作蟲則死下斷亦可燒雄黃末如此熏之

治蚘蟲方取繰絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心頓服之非繰絲卽須依時收取蠶蛹曝爲細末用時以意斟酌多少和粥飲服之

寸白蟲用榧子四十九枚去皮以月上旬平旦空心服七枚七日服盡蟲消成水永瘥又云食實七枚七日滿蟲化爲水一方以百枚只燃啖之食盡佳不能者但啖五十枚經宿蟲自下幷治三尸蟲

又方用黑鉛灰炒四錢一服先喫豬肉脯少許一時

來却用砂糖濃水半盞調灰五更服蟲盡下白粥將息一日良于宣和中每覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是蟲漫依良方所說服翼日下蟲二條一條二尺五寸頭扁闊尾尖銳每寸作一節斑斑如錦紋一條皆寸斷矣

蟲蝕下部肛盡腸穿者取長股蝦蟆青背者一枚雜骨一分燒爲灰合和吹下部令深入累用效

鍼灸

靈樞經曰腸中有蟲瘕及蛟蛕皆不可取以小鍼心腸痛憹作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛕也以手聚按而堅持之無令得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼也㤘腹憹痛形中上者

黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下補足少陰

醫案

泊宅編永州通判廳軍員毛景得奇疾每語喉中必有物作聲相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍捩汁而飲之少頃吐出肉塊長一寸餘人形悉具自後無聲

遯齋閒覽楊勔中年得異疾每發言應答腹中有小聲效之數年間其聲寖大有道人見而驚曰此應聲蟲也久不治延及妻子宜讀本草遇蟲不應者當取服之勔如言讀至雷丸蟲無聲乃頓服之遂愈正敏

後至長沙遇一丐者亦有是疾環而觀之甚衆教使服雷丸丐者亦愈

丁志記齊州士曹席進儒招所親張彬秀才爲館舍彬嗜酒每夜必置數升於牀隅一夕忘設至夜半大渴求之不得忿悶躁呼俄頃嘔吐一物於地旦起視之見牀下肉塊如肝而黃上如蜂窠猶微動取酒沃之唧唧有聲始悟平生酒病根本亟投諸火中後遂不飮

庚志記趙子字景高寓居卲武軍天王寺苦寸白蟲爲撓醫者戒云是疾當止酒而以素所躭嗜欲罷不能一夕醉於外舍歸已夜半口乾咽燥倉卒無湯飮適廊廡下有甕水月色下照瑩然可愛即掬而飮之其甘如飴連飮數口乃就寢迨曉蟲出盈席覺心腹頓寬宿疾遂愈一家皆驚異驗其所由蓋寺僕日織草履浸紅藤根水也

吳少師在關外嘗得疾數月間肌肉消瘦每日飮食下咽少時腹如萬蟲攢攻且痒且痛皆以爲勞瘵也張銳是時在成都吳遣驛騎招致銳到與元旣切脈

戒云明日早且忍饑勿喫一物俟銳來爲之計旦而往天方劇暑白請選一健卒趨往十里外取行路黃土一銀盂而令廚人旋治麪將午乃得食纔放筯取土適至於是溫酒一升投土攪其內出藥百粒進於吳飲之覺腸胃掣痛幾不堪忍急登溷銳密使別坎一穴便掖吳以行須臾暴下如傾穢惡斗許有馬蝗千餘宛轉盤結其半已困死吳亦憊甚扶憩竹榻移時方餐粥一器三日而平始信去年正以夏夜出師中塗躁渴命候兵持馬盂挹澗水甫入口似有物焉未暇吐之則徑入喉矣自此遂得病銳曰馬蝗入人肝脾裏勢須滋生常日遇食時則聚丹田間吮咂精血飽則散處四肢苟唯知殺之而不能掃盡故無益也銳是以請公枵腹以誘之此蟲喜酒又久不得土味乘饑畢集故一藥能洗空之耳吳大喜厚賂以金帛送之歸

蔡定夫戢之子康積苦寸白爲孼醫者使之碾檳榔細末取石榴東引根煎湯調服之先炙肥猪肉一大臠寘口中嚼咀其津膏而勿食云蟲唯月三日以前

其頭向上可用藥攻打餘日卽頭向下縱有藥皆無益蟲聞肉香咂啖之意故空羣爭赴之覺胷中如萬箭攻攢是其候也然後飲前藥蔡悉如其戒不兩刻腹中雷鳴急登厠蟲下如傾命僕以杖挑撥皆聯綿成串幾長數尺尚蠕蠕能動舉而拋於溪流宿患頓愈

客座新聞云青陽夏戚宗陽家素業醫任江陰訓科有儒生之父患腹脹求其診視乃曰脉洪而大濕熱生蟲之象況飲食如常非水腫蠱脹之證以石榴皮椿樹各東行根加檳榔三味各五錢用長流水煎空心頓服之少頃腹作大痛瀉下長蟲一丈許遂愈

石室祕籙曰陳登之病中心悶甚面赤不能飲食子謂有蟲在胷中必得之食腥也以半夏人參甘草各三錢瓜蒂七箇陳皮各一錢吐之吐蟲三升皆赤頭而尾似魚子謂能斷酒色可長愈否則三年後必病飽滿而死登不聽吾言三年果死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十卷目錄

醫部彙考三百三十

頤養補益門一

黃帝素問（上古天眞論　四氣調神大論　生氣通天論　金匱眞言論　陰陽應象大論　靈蘭祕典論　宣明五氣論）

靈樞經（本神篇　五味篇　本臟篇　百病始生篇　九宮八風篇）

張機金匱要略（飲食禁忌）

華佗中藏經（調攝陰陽）

孫思邈千金方（養性論言　道林養性　居處法　服食法　黃帝雜忌法）
劉完素六書（攝生論）
李杲十書（安養心神調治脾胃論　脾胃將理論　遠欲論　省言箴）
朱震亨心法（不治已病治未病）
格致餘論（飲食箴　色欲箴　茹淡論）
李梴醫學入門（保養說）
趙獻可醫貫（寡欲論）
喻昌醫門法律（調和榮衛　謹節五味　和暢性情）
張介賓景岳全書（治形論）

藝術典第三百五十卷

醫部彙考三百三十

頤養補益門一

黃帝素問

上古天真論

昔在黃帝生而神靈弱而能言幼而徇齊長而敦敏成而登天乃問於天師曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年半百而動作皆衰者時世異耶人將失之耶岐伯對曰上古之人其知道

者法於陰陽和於術數

註　陰陽者萬物之終始死生之本逆之則災害生從之則苛疾不起故能取法以和調是謂得道

食飲有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去

註　食飲有節養其氣也起居有常養其神也不妄作勞養其精也能調養其神氣故能與形俱存而盡終其天年

今時之人不然也以酒爲漿以妄爲常醉以入房以欲竭其精以耗散其眞不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也

註　今人惟務快樂不能積精全神是以半百而衰

夫上古聖人之教下也皆謂之虛邪賊風避之有時恬惔虛無眞氣從之精神內守病安從來是以志閑而少欲心安而不懼形勞而不倦氣從以順各從其欲皆得所願

註　恬惔無爲是以志閑而少欲矣精神內守是以心安而不懼形勞而不倦矣眞氣從之是以氣從

以順矣衣食居處各從其欲是以皆得所願也故美其食任其服樂其俗高下不相慕其民故曰朴是以嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心智愚賢不肖不懼於物故合於道所以能年皆度百歲而動作不衰者以其德全不危也

註 上古恬惔之世民無外慕之思故淫邪不能傷其內皆全德不危故不外懼於物而合於道焉

上古有眞人者提挈天地把握陰陽呼吸精氣獨立守神肌肉若一故能壽敝天地無有終時此其道生

註 此無爲而道自合也

中古之時有至人者淳德全道和於陰陽調於四時去世離俗積精全神遊行天地之間視聽八達之外此蓋益其壽命而强者也亦歸於眞人

註 此從修煉保固得來亦能完天眞而歸大道

其次有聖人者處天地之和從八風之理適嗜欲於世俗之間無恚嗔之心行不欲離於世被服章舉不欲觀於俗外不勞形於事內無思想之患以恬愉爲務以自得爲功形體不敝精神不散亦可以百數

註　聖人亦可以優游長享百年矣

其次有賢人者法則天地象似日月辨列星辰逆從陰陽分別四時將從上古合同於道亦可使益壽而有極時

註　賢人則由人以合天超凡以至聖也

四氣調神大論

春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺與而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少

註　春陽上升發育萬物啓故從新而萬物亦以生榮夜臥早起發生氣也被髮者疎達肝木之氣舉動舒徐以應春和之氣逆謂逆其生發之氣也春生之氣逆則傷肝肝傷則至夏爲寒變之病因奉長者少故也蓋木傷而不能生火故於夏月火令之時反變而爲寒病

夏三月此爲蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起無厭於日使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在

外此夏氣之應養長之道也逆之則傷心秋爲痎瘧奉收者少冬至重病

註陽氣浮長故爲茂盛而華秀夜臥早起養長之氣也無厭於長日氣不宜惰也心屬火王於夏逆夏長之氣則傷心矣心傷至秋爲痎瘧因奉收者少故也夫陽氣原發於下焦陰臟今夏逆於上秋無以收收機有礙則冬無所藏陽不歸原是根氣已損至冬時寒水當令無溫陽以配故冬時爲病甚危險也

秋三月此爲容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少

註容盛也萬物皆盛實而平定也寒氣上升故天氣以急陽氣下降故地氣以明與雞俱興養秋收之氣神志安寧避殺肅之氣若逆秋收之氣則傷肺矣肺傷至冬爲飧泄之病因奉藏者少故也

冬三月此爲閉藏水冰地坼勿擾乎陽早臥晚起必

待日光使志若伏若匿若有私意若己有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥奉生者少

註陽氣收藏故不可煩擾以泄陽氣早臥晚起順養閉藏之氣也若伏若匿使志無外也若有私意若己有得神氣內藏也去寒就溫養標陽也夫陽氣根於至陰發於膚表外不固密則裏氣亟起以外應故無洩皮膚之陽而使急奪其根氣也腎屬水王於冬逆冬藏之氣則傷腎腎氣傷至春而爲痿厥之病因奉生者少故也

天氣清淨光明者也藏德不止故不下也天明則日月不明邪害空竅陽氣者閉塞地氣者冒明雲霧不精則上應白露不下交通不表萬物命故不施不施則名木多死惡氣不發風雨不節白露不下則菀稾不榮賊風數至暴雨數起天地四時不相保與道相失則未央絕滅

註天之氣至清淨光明然明德惟藏而健運不息故不必下而後謂之下也天之明德若不藏而彰

著於外則日月不明矣天德不藏則虛其清淨高明之體而邪乘虛以害之如天無運用不息之機則地氣上乘而昏冒其光明矣雲霧不精是地氣不升也地氣不升則天氣不降而白露不下天地之氣雖上下交通而不表彰於六合九州之外則萬物之命不能受其施化而名木多死也惡氣不發則失其勁肅嚴凛之令風雨不節則失其溫和明曜之政白露不下則無溽蒸濕澤之濡四時失序雖茂木嘉禾而亦不能榮秀故陽氣不正而太過則賊風數至陰陽不正而偏勝故暴雨乃起天地四時不相保其陰陽和平而又失其修養之道則未久而有絕滅之患矣

惟聖人從之故身無奇病萬物不失生氣不竭

註 惟聖人能順天地四時之不和而內修養其神氣故無奇暴之害外順不正之時與萬物不失其自然而生氣不絕也

逆春氣則少陽不生肝氣內變逆夏氣則太陽不長心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則

少陰不藏腎氣獨沉夫四時陰陽者萬物之根本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物浮沉於生長之門逆其根則伐其本壞其眞矣

註 少陽主春生之氣春氣逆則少陽不生致肝氣鬱而內變矣太陽主夏長之氣不長則心氣虛而內洞矣太陰主秋收之氣不收則肺熱葉焦而脹滿矣少陰主冬藏之氣不藏則腎氣虛而獨沉矣四時陰陽之氣生長收藏化育萬物故爲萬物之根本春夏之時陽盛於外而虛於內秋冬之時陰盛於外而虛於內故聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根而培養故能與萬物同歸於生長之門若逆其根則伐其本而災害生是謂壞其眞矣

故陰陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道道者聖人行之愚者佩之

註 天地陰陽四時化生萬物有始終生死如逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得陰陽之道

從陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂反順爲

逆是謂內格是故聖人不治已病治未病不治已亂治未亂此之謂也夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬭而鑄錐不亦晚乎

註天地之陰陽不外乎四時五行而人身之陰陽亦不外乎五行六氣故順之則生逆之則死內格者格拒其五臟相生之氣而反逆行也

生氣通天論

黃帝曰夫自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五臟十二節皆通乎天氣其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也

註三謂三陰三陽也三陰者寒燥濕也三陽者風火暑也如不能調養而數犯此三陰三陽之氣則邪氣傷人而爲病以其爲人壽命之本也

蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神明

註人能順此清淨之氣則身之陽氣外固雖有賊

邪弗能爲害此因四時之序而能調養者故聖人傳運其精神餐服蒼天之清氣以通吾之神明清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也

註 肌腠之氣乃五臟之元眞故宜順四時五行之氣而調養使五臟元眞通暢人卽安和不使形體有衰則邪無由入其腠理

故陽氣者一日而主外平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虛氣門乃閉是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露反此三時形乃困薄

註 朝則人氣始生故旦慧日中人氣長則勝邪夕則人氣始衰夜半人氣入臟其氣隔拒其邪無擾筋骨無煩勞也無見霧露宜清淨也若反此則形氣乃爲邪所困薄矣

是以聖人陳陰陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從如是則內外調和邪不能害耳目聰明氣立如故

註 聖人能敷陳其陰陽和平而筋脈骨髓氣血皆和順堅固則外內之陰陽調和而邪不能害邪不

外淫則陰氣內固是能耳目聰明氣立如故也

金匱眞言論

夫精者身之本也故藏於精者春不病溫夏暑汗不出者秋成風瘧

註 神氣血脉皆生於精故精乃生身之本能藏其精則血氣內固邪不外侵故春不病溫夏不汗出則暑氣伏藏至秋成風瘧

陰陽應象大論

聖人爲無爲之事樂恬憺之能從欲快志於虛無之守故壽命無窮與天地終此聖人之治身也

註 行所無事則外不勞形內無思想恬憺虛無則精神內守眞氣從之故能與天地相終始焉

靈蘭祕典論

故主明則下安以此養生則壽歿世不殆

註 五臟六腑心爲之主君主神明則十二官各安其職以此養生則壽終身而不致危殆

主不明則十二官危使道閉塞而不通形乃大傷以此養生則殃

註　心主不明則十二官皆不安神明昏亂則血脈凝泣而使道閉塞矣血脈不通而形乃大傷故殃

宣明五氣論

五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋是五勞所傷

註　上古之民形勞而不倦久視損神故傷血久臥則氣不行故傷氣脾喜運動故久坐傷肉久立則傷腰腎膝脛故傷骨行走罷極則傷筋是五勞而傷五臟所主之血氣筋骨也

靈樞經

本神篇

天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生之來謂之精兩精相搏謂之神隨神往來謂之魂並精而出入者謂之魄所以任物者謂之心心有所憶謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智故智者之養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而調剛柔如是則邪僻不至長生久視

註 故智者順承天地之性而得養生之道焉

五味篇

五味入於口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癃鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令人悗心

註 心主血腎主骨苦乃火味鹹乃水味苦走骨而鹹走血者陰陽水火之交也肺主氣故辛走氣

本臟篇

血和則經脈流行營覆陰陽筋骨勁强關節清利矣衛氣和則分肉解利皮膚調柔腠理緻密矣志意和則精神專直魂魄不散悔怒不起五臟不受邪矣寒溫和則六腑化穀風痺不作經脈通利肢節得安矣

註 血氣神志和調則五臟不受邪而形體得安

百病始生篇

喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上

註 按本經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃

病臟寒傷形乃病形風傷筋脉筋脉乃應此形氣外內之相應也

九宮八風篇

風從其所居之鄉來爲實風主生長養萬物從其衝後來爲虛風傷人者也主殺主害者謹候虛風而避之故聖人日避虛邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂也

（註）實風者春之東風夏之南風秋之西風冬之北風春夏交之東南風秋冬交之西北風此四時之正氣故主生長養萬物從其衝後來者如冬至從西南二方而來春分從西北二方而來是爲虛鄉不正之風主傷人而殺害萬物故聖人日避虛邪之道如避矢石日避者太乙出遊之一日也

漢張機金匱要略

飲食禁忌

凡飲食滋味以養於生食之有妨反能爲害自非服藥煉液焉能不飲食乎切見時人不閑調攝疾疢競起若不因食而生苟全其生須知切忌者矣所食之

味有與病相宜有與身爲害者若得宜則益體害則成疾以此致危例皆難療凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷服之

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘

春不食肝夏不食心秋不食肺冬不食腎四季不食脾春不食肝者爲肝氣王脾氣敗若食肝則又補肝脾氣敗尤甚不可救又肝王之時不可以死氣入肝恐擾魂也若非王時卽虛以肝補之佳餘臟準此

華佗中藏經

調攝陰陽

天者陽之宗地者陰之屬陽者生之本陰者死之基天地之間陰陽輔佐者人也得其陽者生得其陰者死陽中之陽爲高眞陰中之陰爲幽鬼故鍾於陽者長鍾於陰者短多熱者陽之主多寒者陰之根陽務其上陰務其下陽行也速陰行也緩陽之體輕陰之體重陰陽平則天地和而人氣寧陰陽逆則天地否而人氣厥故天地得其陽而炎熾得其陰而寒凜陽始於子前末於午後陰始於午後末於子前陰陽盛

衰各在其時更始更末無有休息人能從之亦智也金匱曰秋首養陽春首養陰陽勿外閉陰勿外侵火出於木水生於金水火通濟上下相尋人能循此永不湮沉此之謂也嗚呼凡愚豈知是理舉止失宜自致其羅外以風寒暑濕內以饑飽勞役摧殘正體消亡正神縛絆其身死生告陳死生至理陰陽中明陰氣下而不上曰斷絡陽氣上而不下曰絕經陰中之邪曰濁陽中之邪曰淸火來坎戶水到離扃陰陽相應方乃和平陰不足則濟之以水母陽不足則濟之以火精陰陽濟等各有攀陵上通三寸曰陽之神路下通三寸曰陰之鬼程陰常宜損陽常宜盈居之中者陰陽匀停是以陽中之陽天仙賜號陰中之陰下鬼持名順陰者多消滅順陽者多長生逢斯妙趣無所不靈

陰陽者天地之樞機五行者陰陽之終始非陰陽則不能爲天地非五行則不能爲陰陽故人者成於天地敗於陰陽也由五行逆從而生焉天地有陰陽五行人有血脈五臟五行者金木水火土也五臟者肺

肝心腎脾也金生水水生木木生火火生土土生金則生成之道循環無窮肺生腎腎生肝肝生心心生脾脾生肺上下榮養無有休息故金匱至眞要論云心生血血爲肉之母脾生肉肉爲血之舍肺屬氣氣爲骨之基腎應骨骨爲筋之本肝系筋筋爲血之源五臟五行相成相生晝夜流轉無有始終從之則吉逆之則凶天地陰陽五行之道中含於人人得者可以出陰陽之數奪天地之機悅五行之要無終無始神仙不死矣

唐孫思邈千金方

養性論言

扁鵲云黃帝說晝夜漏下水百刻凡一刻人百三十五息十刻一千三百五十息百刻一萬三千五百息人之居世數息之間信哉嗚呼昔人歎逝何可不爲善以自補邪吾嘗思一日一夜有十二時十日十夜百二十時百日百夜一千二百時千日千夜一萬二千時萬日萬夜一十二萬時此爲三十年若長壽者九十年只得三十六萬時百年之

內須臾之間數時之活朝菌蟪蛄不足爲喻焉可不自攝養而馳騁六情孜孜汲汲追名逐利千詐萬巧以求虛譽沒齒而無厭故養性者知其如此於名於利若存若亡於非名非利亦若存若亡所以沒身不殆也余慨時俗之多僻皆放逸以殞亡聊因暇日粗述養性篇用奬人倫之道好事君子與我同志焉

夫養性者欲所習以成性性自爲善不習無不利也性既自善內外百病自然不生禍亂災害亦無由作此養性之大經也善養性者則治未病之病是其義也故養性者不待餌藥餐霞其在兼於百行百行周備雖絕藥餌足以遐年德行不充縱服玉液金丹未能延壽故老子曰善攝生者陸行不遇虎兕此則道德之指也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以制藥餌者以救過行之人也故愚者抱病歷年而不修一行纏痾沒齒終無悔心此其所以岐和長逝彭跗永歸良有以也嵇康曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不去爲三難滋味不絕爲四難

神慮精散爲五難五者必存雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能不迴其操不夭其年也五者無於胷中則信順日躋道德日全不祈善而有福不求壽而自延此養生之大旨也然或有服膺仁義無甚泰之累者抑或其亞歟

仲長統曰王侯之宮美女兼於卿士之家侍妾數百晝則以醇酒淋其骨髓夜則於房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色讌內不出遊外不返王公得之於上豪傑馳之於下及至生產不時字育太早或童孺而擅氣或疾病而搆精精氣薄惡血脉不充旣出胞臟養護無法又蒸之以綿纊爍之以五味胎傷孩病而脆未得堅剛復縱情欲重重相生病病相孕國無良醫醫無審術姦佐其間過謬常有會有一疾莫能自免當今少百歲之人者豈非所習不純正也抱朴子曰或問所謂傷之者豈色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年當少壯而知還陰丹以補腦采七益於長俗（一作谷）者不服藥物不失一二百歲也但

不得仙耳不得其術者古人方之於菱杯以盛酒羽苞之畜火又且才所不逮而强思之傷也力所不勝而强舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也汲汲所欲傷也戚戚所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沉醉嘔吐傷也飽食卽臥傷也走跳喘乏傷也懽呼哭泣傷也積傷至盡盡則早亡盡則非道也是以養性之士唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不久處立不至疲臥不至懻先寒而衣先熱而解不欲極饑而食食不可過飽不欲極渴而飲飲不欲過多飽食過多則結積聚渴飲過多則成痰澼不欲甚勞不欲甚佚不欲流汗不欲多唾不欲奔走車馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲窮凉不欲露臥星月不欲眠中用扇大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五味尅五臟五行自然之理也凡言傷者亦不卽覺也謂久

卽損壽耳是以善攝生者臥起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方袪疾閑邪有吐納之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞佚有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽然後先服草木以救虧缺後服金丹以定無窮養性之理盡於此矣夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異端極性肆力不勞持久者聞此言也雖風之過耳電之驚目不足喻也雖身枯於留連之中氣絕於綺紈之際而甘心焉亦安可告之以養性之事哉匪惟不納乃謂妖訛也而望彼信之所謂以明鑒給矇瞽以絲竹娛聾夫者也

魏武與皇甫隆令曰聞卿年出百歲而體力不衰耳目聰明顏色和悅此盛事也所服食施行導引可得聞乎若有可傳想可密封示內隆上疏對曰臣聞天地之性惟人爲貴人知所貴莫貴於生荒唐無始刼運無窮人生其間忽如電過每一思此惘然心熱生不再來逝不可追何不抑情養性以自保惜今四海垂定太平之際又當須展才布德當由萬年萬年無窮當由修道道甚易知但莫能行臣常聞道人蒯京

已年一百七十八而甚丁壯言人當朝朝服食玉泉琢齒使人丁壯有顏色去三蟲而堅齒玉泉者口中唾也朝旦未起早漱津令滿口乃吞之琢齒二七遍如此者乃名曰鍊精

抱朴子曰一人之身一國之象也胷腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民也知治身則能治國也夫愛其民所以安其國惜其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追於既逝之後夫人難養而易危也氣難淸而易濁也故能審威德所以保社稷割嗜慾所以固血氣然後眞一存焉精神守焉百病却焉年壽延焉

道林養性

雖嘗服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道常欲小勞但莫大疲及強所不能堪耳且流水不腐戸樞不蠹以其運動故也養性之道莫久行久立久坐久臥久視久聽蓋以久視傷血久臥傷氣久立

傷骨久坐傷肉久行傷筋也仍莫強食莫強酒莫強舉重莫憂思莫大怒莫悲愁莫大懼莫跳踉莫多言莫大笑勿汲汲於所欲勿悁悁懷忿恨皆損壽命若能不犯者則得長生也故善攝生者常少思少念少慾少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少者養性之都契也多思則神殆多念則志散多慾則志昏多事則形勞多語則氣乏多笑則臟傷多愁則心懾多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百脈不定多好則專迷不理多惡則憔悴無歡此十二多不除則榮衛失度血氣妄行喪生之本也惟無多無少者幾於道矣是知勿外緣者眞人初學道之法也若能如此者可居瘟疫之中無憂疑矣既屏外緣會須守五神（肝心脾肺腎）從四正（言行坐立）言最不得浮思妄念心想欲事惡邪大起故孔子曰思無邪也常當習黃帝內視法存想思念令見五臟如懸磬五色了了分明勿輟也仍於每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀氣上入頂下達涌泉旦旦如此名曰迎氣常以鼻引氣口吐氣小微吐之不得開口復欲得

出氣少入氣多每欲食迸氣入腹每欲食氣爲主人也凡心有所愛不用深愛有所憎不用深憎並皆損性傷神亦不用深讚亦不用深毀常思運心於物平等如覺偏頗尋改正之居貧勿謂常貧居富勿謂常富居貧富之中常須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大功德勿自矜伐美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心常以深心至誠恭敬於物愼勿詐善以悅於人終身爲善爲人所嫌勿得起恨事君盡禮人以爲諂當以道自平其心道之所在其德不孤勿言行善不得善報以自怨仇居處勿令心有不足若有不足則自抑之勿令得起人知止足天遺其祿所至之處勿得多求多求則心自疲而志益苦夫人之所以多病當由不能養性平康之日謂言常然縱情恣欲心所欲得則便爲之不拘禁忌欺罔幽明無所不作自言適性不知過後一一皆爲病本及兩手摸空白汗流出口唱皇天無所逮及皆以生平粗心不能自察一至於此但能少時內省身心則自知見行之中皆畏諸痾將知四百四病身手自造本

非由天及一朝病發和緩不救方更誹謗醫藥無效神仙無靈故有智之人愛惜性命者當自思念深生恥愧誡勒身心常修善事也至於居處不得綺靡華麗令人貪婪無厭乃患害之源但令雅素淨潔無風雨寒濕爲佳衣服器械勿用珍玉金寶增長過失使人煩惱根深廚膳勿脯肉豐盈常令儉約爲佳然後行作鵝王步語作含鐘聲眠作獅子臥（右脇著地坐）每日自詠歌云美食須熟嚼生食不粗吞問我居止處大宅總林村胎息守五臟氣至骨成仙又歌曰日食三箇毒不嚼而自消錦繡爲五臟身著糞掃袍修心既平又須慎言語凡言語誦讀常想聲在氣海中（臍下也）每日初入後勿言語讀誦寧待平旦也旦起欲專言善事不欲先計較錢財又食上不得語語而食者常患胷背痛亦不用寢臥多言笑寢不得語言者言五臟如鐘磬不懸則不可發聲行不得語若欲語須住脚乃語行語則令人失氣冬至日止可語不可言自言曰言答人曰語言有人來問不可不答自不可發言也仍勿觸冷開口大語爲佳言語既慎却節飲食

是以善養性者先饑而食先渴而飲食欲數而少不欲頓而多則難消也常欲令如飽中饑饑中飽耳蓋飽則傷肺饑則傷氣鹹則傷筋酸則傷骨故每學淡食食當熟嚼使米脂入腹勿使酒脂入腸人之當食須去煩惱如食五味必不得暴嗔多令人神驚夜夢飛揚每食不用重肉喜生百病常須少食肉多食飯及少葅菜幷勿食生菜生米小豆陳臭物勿飲濁酒食麪使塞氣孔勿食生肉傷胃一切肉惟須煮爛停冷食之食畢當嗽口數過令人牙齒不敗口香熱食訖以冷酢漿漱口者令人口氣常臭作䘌齒病又諸熱食鹹物後不得飲冷酢漿水喜失聲成尸咽凡熱食汗出勿當風發痙頭痛令人目澀多睡每食訖以手摩面及腹令津液通流食畢當行步躊躇計人行數里來行畢使人以粉摩腹上數百遍則食易消大益人令人能飲食無百病然後有所修爲爲快也飽食卽臥乃生百病不消成積聚飽食仰臥成氣痞作頭風觸寒來者寒未解食熱食成刺風人不得夜食又云夜勿過醉飽食勿精思爲勞苦事有損餘虛損

人常須日在巳時食訖則不須飲酒終身無乾嘔勿食父母本命所屬肉令人命不長勿食自己本命所屬肉令人魂魄飛揚勿食一切腦大損人茅屋漏水墮諸脯肉上食之成瘕癖暴肉作脯不肯乾者害人祭神肉無故自動食之害人飲食上蜂行住食之有毒害人腹內有宿病勿食鯪鯉魚肉害人濕食及酒漿臨上看視不見人物影者勿食之成卒注若巳食腹脹者急以藥下之每十日一食葵葵滑所以通五臟壅氣又是菜之主不用合心食之又飲酒不欲使多多則速吐之爲佳勿令至醉卽終身百病不除久飲酒者腐爛腸胃漬髓蒸筋傷神損壽醉不可當風向陽令人發狂又不可當風臥不可令人扇涼皆卽得病也醉不可露臥及臥黍穰中發癩瘡醉不可强食或發癰疽或發瘖或生瘡醉飽不可以走車馬及跳躑醉不可以接房醉飽交接小者面黚欬嗽大者傷絕臟脉損命凡人饑欲坐小便若飽則立小便愼之無病又忍尿不便膝冷成痹忍大便不出成氣痔小便勿努令兩足及膝冷大便不用呼氣及强努令

人腰疼目澀宜任之佳凡遇山水隖中出泉者不可久居常食作癭病又深陰地冷水不可飲必作瘧飲食以調時愼脫著凡人旦起著衣反者便著之吉衣光者當戸三振之曰殃去吉濕衣及汗衣皆不可久著令人發瘡及風瘙大汗能易衣佳不易者急洗之不爾令人小便不利凡大汗勿偏脫衣喜得偏風半身不遂春天不可薄衣令人傷寒霍亂食不消頭痛脫著旣時須調寢處凡人臥春夏向東秋冬向西頭勿北臥及牆北亦勿安牀凡欲眠勿歌詠不祥起上牀坐先脫左足臥勿當舍脊下臥訖勿留燈燭令魂魄及六神不安多愁怨人頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目赤睛及鼻乾夜臥當耳勿有孔吹人卽耳聾夏不用露面臥令人面皮厚喜成癬或作面風冬夜勿覆頭得長壽凡人眠勿以脚懸踏高處久成腎水及損房足冷人每見十步直牆勿順牆臥風利吹人發癲及體重人臥勿跂牀懸脚久成血痹兩足重腰疼又不得晝眠令人失氣臥勿大語損人氣力暮臥常習閉口口開卽失氣且邪惡從口入久而成

消渴及失血邑屈膝側臥益人氣力勝正偃臥按孔子不尸臥故曰睡不厭蹴覺不厭舒凡人舒睡則有鬼怪邪魔凡眠先臥心後臥眼人臥一夜當作五度反覆常逐更轉凡人夜魘忽然燈喚之定死無疑間喚之吉亦不得近前急喚夜夢惡不須說旦以水面東方噀之呪曰惡夢著草木好夢成寶玉卽無咎矣又夢之善惡並勿說爲吉衣食寢處皆適能順時氣者始盡養生之道故善攝生者無犯日月之忌無失歲時之和須一日之忌暮無飽食一月之忌晦無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無燃燭行房暮常護氣也凡氣冬至起於涌泉十一月至膝十二月至股五月至腰名三陽成二月至膊三月至項四月至頂純陽用事陰亦倣此故四月十月不得入房避陰陽純用事之月也每冬至日於北壁下厚鋪草而臥云受元氣每八月一日已後卽微火煖足勿令下冷無生意常欲使氣在下不欲泄於上春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼世長生養陰收陽禍則滅門故云冬時天地氣閉血氣伏藏人不可作勞出汗

發泄陽氣有損於人也又云冬日凍腦春秋腦足俱凍此聖人之常法也春欲晏臥早起夏及秋欲侵夜乃臥早起冬欲早臥而晏起皆益人雖云早起莫在雞鳴前雖言晏起莫在日出後凡冬月忽有大熱之時夏月忽有大涼之時皆勿受之人有患天行時氣者皆由犯此也卽須調氣息使寒熱平和卽免患也每當臘日勿歌舞犯者必凶常於正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲午日剪足甲又燒白髮吉

居處法

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入少覺有風勿强忍久坐必須急急避之久居不覺使人中風古來忽得偏風四肢不隨或如角弓反張或失音不語者皆由忽此耳身旣中風諸病總集邪氣得便遭此致卒者十中有九是以大須周密無得輕之愼焉愼焉所居之室勿塞井及水瀆令人聾盲凡在家及外行卒逢大飄風暴雨震電昏暗大霧此皆是諸龍鬼神行動經過所致宜入室閉戶燒香靜坐安心以避之待過後乃出不爾損人或當時雖未

苦於後不佳矣又陰霧中亦不可遠行

凡家中有經像行來先拜之然後拜尊長每行至則峻坐焉

凡居家不欲數沐浴若沐浴必須密室不得大熱亦不得大冷皆生百病冬浴不必汗出霢霂沐浴後不得觸風冷新沐髮訖勿當風勿濕縈髻勿濕頭臥使人頭風眩悶髮禿面黑齒痛耳聾頭生白屑饑忌浴飽忌沐沐訖須進少許食飲乃出夜沐髮不食卽臥令人心虛饒汗多夢又夫妻不用同日沐浴常以晦日浴朔日沐吉凡炊湯經宿用洗體成癬洗面無光洗脚卽疼痛作甑畦瘡熱泔洗頭冷水濯之作頭風飲水沐頭亦作頭風時行病新汗解勿冷水洗浴損心包不能復

凡居家常戒約內外長幼有不快卽須早道勿使隱忍以爲無苦過時不知便爲重病遂成不救小有不好卽按摩挼捺令首節通利泄其邪氣凡人無問有事無事常須日別蹋脊背四肢一度頭項苦令熟蹋卽風氣時行不能侵入此大要妙不可具論

凡人居家及遠行隨身常有熟艾一升備急丸辟鬼丸生肌藥甘濕藥丁腫藥水銀大黃芒硝甘草乾薑桂心蜀椒不能更畜餘藥此等常不可闕少及一兩卷百一備急藥方井帶辟毒蛇蜂蠍等藥隨身也

凡人自覺十日已上康健卽須灸三數穴以泄風氣每日必須調氣補瀉按摩導引爲佳勿以康健便爲常然常須安不忘危預防諸病也灸法當須避人神

凡畜手力細累春秋皆須與轉瀉藥一度則不中天行時氣也

服食法

凡人春服小續命湯五劑及諸補散各一劑夏大熱則服腎瀝湯三劑秋服黃芪等丸一兩劑冬服藥酒兩三劑立春日則止此法終身常爾則百病不生矣

俗人見淺但知鉤吻之殺人不信黃精之益壽但識五穀之療饑不知百藥之濟命但解施瀉以生育不能閉固以頤養故有服餌方焉郄愔曰夫欲服食當尋性理所宜審冷煖之適不可見彼得力我便服之初御藥皆草木次石是爲將藥之大較也所謂精粗

相代階粗以至精者也夫人從少至長體習五穀卒不可一朝頓遺之凡服藥物爲益遲微則無充饑之驗然積年不已方能骨髓塡實五穀居然而自斷今人多望朝夕之效求目下之應腑臟未充便以絕粒穀氣始除藥未有用又將御女形神與俗無別以此致斃胡不怪哉服習大體皆有次第不知其術者非止反有所損卒亦不得其力故服餌大法必先去三蟲三蟲既去次服草藥好得藥力次服木藥好得力訖次服石藥依此次第乃得遂其藥性庶事安穩可以延齡矣

黃帝雜忌法

旦起勿開目洗面令人目澀失明饒淚清旦常言善事勿惡言聞惡事卽向所來方三唾之吉又勿嗔怒勿叱咤咄呼勿嗟嘆勿唱奈何名曰請禍勿立膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥勿舉足向火勿對竈罵詈凡行立坐勿背日吉勿面北坐久思不祥起凡欲行來常存魁罡在頭上所向皆吉若欲征戰存斗柄在前以指敵吉勿面北冠帶凶勿向西北唾犯

魁罡神凶勿欬唾唾不用遠成肺病令人手足重及背痛欬嗽亦勿向西北大小便勿殺龜蛇勿怒目視日月善令人失明行及乘馬不用迴顧則神去人不用鬼行蜡粟凡過神廟愼勿輒入入必恭敬不得舉目恣意顧瞻當如對嚴君焉乃享其福耳不爾速獲其禍亦不得返首顧視神廟勿見龍蛇勿興心驚怪亦勿注意瞻視忽見鬼怪變異之物即强抑之勿怪呪曰見怪不怪其怪自壞又路行及衆中見殊妙美女愼勿熟視而愛之此當魑魅之物使人深愛無問深山曠野稠人廣衆之中皆亦如之凡山水有沙虱處勿在中浴害人欲渡者隨驢馬後急渡不傷人有水弩處射人影即死欲渡水者以物打水其弩即散急渡不傷凡諸山有孔穴入採寶者惟三月九月餘月山閉氣交犯死凡人空腹不宜見尸臭氣入鼻舌上白起口常臭欲見尸者皆須飲酒見之能辟毒凶行觸熱途中逢河勿洗面生烏䵟

金劉完素六書

攝生論

內經謂法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人不然也以酒爲漿以妄爲常醉以入房以欲竭其精以耗散其眞不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也夫飲食起居乃人生日用之法縱恣不能知節而欲傳精神服天氣者不亦難乎又經曰飲食自倍腸胃乃傷起居如驚神氣乃浮是以聖人春木旺以膏香助胃夏火旺以膏腥助肺金用事膳膏臊以助肝水用事膳膏膻以助心所謂因其不勝而助之也故食飲之常保其生之要者五穀五果五畜五菜也脾胃待此而食稟備三焦待此而道路通榮衛待此以淸以濁筋骨待此以柔以正故經云蓋五味相濟斯無五宮之傷所以養其形也雖五味爲之養形若味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脉沮弛精神乃央所謂失五味之常而損其形也王注曰味有偏勝臟有偏絕此

之謂也飲食者養其形起居者調其神是以聖人春三月夜臥早起被髮緩形見於發陳之時且曰以使志生夏三月夜臥早起無厭於日見於蕃秀之時且曰使志無怒使氣得泄秋三月早臥早起與雞俱興見於容平之時收斂神氣且曰使志安寧以應秋氣冬三月早臥晚起去寒就溫見於閉藏之時且曰使志若伏若匿若有私意若已有得此順生長收藏之道春夏養陽秋冬養陰順四時起居法所以調其神也經所謂逆春氣則少陽不生肝氣內變逆夏氣則太陽不長心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉此失四時之氣所以傷其神也智者順四時不逆陰陽之道而不失五味損益之理故形與神俱久矣乃盡其天年而去與夫務快其心逆於生樂者何足與語此道哉故聖人行之賢者佩之豈虛語哉

元李杲十書

安養心神調治脾胃論

靈蘭祕典論曰心者君主之官神明出焉凡喜怒忿

悲憂思恐懼皆損元氣夫陰火之熾盛由心生凝滯七情不安故也心者神之舍心君不守化而爲火夫火者七神之賊也故曰陰火大盛經營之氣不能頤養於神乃脉病也神無所養津液不行不能生血脉也人心之神眞氣之別名也得血則生血生則脉旺脉者神之舍若心生凝滯七神離形而脉中惟有火矣善治斯病者惟在調和脾胃使心無凝滯或生懽欣或逢喜事或天氣暄和居溫和處或食滋味或見可欲事則慧然如無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也

脾胃將理法

或方怒不可食不可太飽太饑飲食欲相接而溫和宜穀食多而肉食少不宜食肉汁忌寒濕物令肌肉不生陽氣潛伏四肢怠惰之證疼痛沉重時當濕雨則洩利大便後有白膿血痢或腸澼下血病此乃諸陽氣不行陽道之故也

勞則陽氣衰宜乘車馬遊玩遇風寒則止

行住坐臥各得其宜不可至疲倦

日晴暖可以溫湯澡浴勿以熱湯令汗大出

勿困中飲食雖饑渴當先臥至不困乃飲食食後少動作

忌博奕勞心遇夜汗出宜避賊風

夜半收心靜坐少時此生發周身血氣之大要也

夜寢語言大損元氣須默默少時候周身陽氣行方可言語

忌浴當風汗當風須以手摩汗孔合方許見風必無中風中寒之疾

遇卒風暴寒衣服不能禦者則宜掙努周身之氣以當之氣弱不能禦而受之者病

遠行卒遇疫癘之氣飲酒者不病腹中有食者病空腹者死

白粥粳米菉豆小豆鹽豉皆滲利小便且小便數不可更利況大瀉陽氣反行陰道切禁濕麪如食之覺快勿禁

藥中不可服澤瀉茯苓猪苓燈心琥珀通草木通滑石之類皆瀉陽道行陰道也如渴小便不利或閉塞不通則服得利勿再服

忌大鹹助火邪而瀉腎水真陰及大辛味蒜韭五辢酢大料物官桂乾薑之類皆傷元氣

如衣薄而氣短則添衣於無風處居處如氣尚短則用沸湯一碗熏其口鼻即不短也

如衣厚而氣短則宜減衣摩汗孔令合於無風處居止

如久居高屋或天寒陰濕所遏令氣短者亦如前法熏之

如居周密小室或大熱而處寒凉氣短者則出就風日凡氣短皆宜食滋味湯飲令胃調和

或大熱能食而渴喜寒飲當從權以飲之然不可耽嗜如冬之喜熱飲亦依時暫飲

夜不安寢衾厚熱壅故也當急去之仍拭汗孔或薄而寒即加之睡自穩也

饑而睡不安則宜少食食飽而睡不安則宜少行坐

遇天氣變更風寒陰晦宜預避之大抵宜溫煖避風寒省言語少勞役爲上

若服升浮之藥先一日將理次日腹空方服服畢更

將理十日先三日尤甚不然則反害也

遠欲論

名與身孰親身與貨孰多以隋侯之珠彈千仞之雀世必笑之何取之輕而棄之重耶殘軀六十有五耳目半失於視聽百脉沸騰而煩心身如衆派漂流暝目則魂如浪去神氣衰於前日飲食減於曩時但應人事病皆彌甚以己之所有豈止隋侯之珠哉安於淡薄少思寡欲省語以養氣不妄作勞以養形虛心以維神壽夭得失安之於數得喪既輕血氣自然諧和邪無所容病安增劇苟能持此亦庶幾於道可謂得其眞趣矣

省言箴

氣乃神之祖精乃氣之子氣者精神之根蔕也大矣哉積氣以成精積精以全神必清必靜御之以道可以爲天人有道者能之予何人哉切宜省言而已

朱震亨心法

不治已病治未病

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先蓋疾

成而後藥者徒勞而已是故已病而不治所以爲醫家之戒未病而先治以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閉塞其涓涓之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎原之焰不能止其水火旣盛尚不能止遏況病之已成豈能治歟故宜夜臥早起於發陳之春早起夜臥於蕃秀之夏以緩其形無怒而遂其志以之食涼食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與雞俱興於容平之秋必待於日光閉藏之冬以斂神匿志而私其意以之食溫食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其脾臟之虛則木邪不能傳見右頰之赤先瀉其肺經之熱則金邪不能盛此乃治未病之法今以順四時調養神志而爲治未病者是何意邪蓋保身長全者所以爲聖人之道治病十全者所以爲上工不治已病治未病之說著於四氣調神大論厥有旨哉昔黃帝與天師難疑答問之書未嘗不以攝養爲先始論乎天

眞炁論乎調神既已法於陰陽而繼之以調於四氣既曰食飲有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生爲急務者意欲治未然之病無使至於已病難圖也厥後秦緩達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可爲也扁鵲明乎此視齊侯病至骨髓斷之曰不可救也噫惜齊晉諸侯不知治未病之理

格致餘論

飲食箴

人身之貴父母遺體爲口傷身滔滔皆是人有此身饑渴隨與迺作飲食以遂其生眷彼昧者因縱口味五味之過疾病蜂起病之生也其機甚微饞涎所牽忽而不思病之成也飲食俱廢憂貽父母醫禱百計山野貧賤淡薄是諳動作不衰此身亦安均氣同體我獨多病悔悟一萌塵開鏡淨曰節飲食易之象辭養小失大孟子所譏口能致病亦敗爾德守口如瓶服之無斁

色欲箴

惟人之生與天地參坤道成女乾道成男配爲夫婦

生育攸寄血氣方剛惟其時矣成之以禮接之以時父子之親其要在茲睠彼昧者徇縱情欲惟恐不及濟以燥毒氣陽血陰人身之神陰平陽祕我體長春血氣幾何而不自惜我之所生翻爲我賊女之耽兮其欲實多閨房之肅門庭之和士之耽兮其家自廢既喪厥德此身亦瘁遠彼帷幕放心乃收飮食甘美身安病瘳

茹淡論

或問內經謂精不足者補之以味又曰地食人以五味古者年五十食肉子今年邁七十矣盡却鹽醯豈中道乎何子之神茂而色澤也曰味有出於天賦者有成於人爲者天之所賦者若穀菽菜果自然沖和之味有養人補陰之功此內經所謂味也人之所爲者皆烹飪調和偏厚之味有致疾伐命之毒此吾子所疑之味也今鹽醯之却非眞茹淡者大麥與粟之鹹粳米山藥之甘葱薤之辛之類皆味也子以爲淡乎安於沖和之味者心之收火之降也以偏厚之味爲安者欲之縱火之盛也何疑之有內經又曰陰之

所生本在五味非天賦之味乎陰之五宮傷在五味非人爲之味乎聖人防民之具於是爲備凡人饑則必食彼粳米甘而淡者土之德也物之屬陰而最補者也惟可與菜同進經以菜爲充者恐於饑時頓食或慮過多因致胃損故以菜助其充足取其疏通而易化此天地生物之仁也論語曰肉雖多不使勝食氣傳曰賓主百拜而酒三行以避酒禍此聖人施教之意也蓋穀與肥鮮同進厚味得穀爲助其積之也久寧不助陰火而致毒乎故服食家在却穀者則可不却穀而服食未有不被其毒者內經謂久而增氣物化之常氣增而久夭之由也彼安於厚味者未之思耳或又問精不足者補之以味何不言補氣曰味陰也氣陽也補精以陰求其本也故補之以味若甘草白术地黃澤瀉五味子天門冬之類皆味之厚者也經曰虛者補之正此意也上文謂形不足者溫之以氣夫爲勞倦所傷氣之虛故不足溫者養也溫存以養使氣自充氣充則形完矣故言溫而不言補經曰勞者溫之正此意也彼爲局方者不知出此凡諸

虛損證悉以溫熱佐輔補藥名之曰溫補不能求經旨者也

明李梴醫學入門

保養說

醫家既知修德又當愛惜自己精神醫之難者難於此也倘精神昏耗察識必不能精方藥必不能當雖有濟人之心而勢不能及也若夫病有服藥針灸不效者以其不知保養之方古云與其病後善服藥莫若病前善自防

按丹溪茹淡陰火二篇病者當時目之或者議其茹淡之偏殊不知其本意爲痰火陰虛之人作也人至中年腎氣日衰加之佚慾便成虛損與陽補劑服之則潮熱不勝專服滋降之藥雖暫得清爽久則中氣愈虛血無生化所以只得於飲食上調節戒一切煎炒炙煿酒酢糟醬燥熱之物恐燥血也戒一切生冷時果時菜恐傷脾也能甘淡薄則五味之本自足以補五臟養老慈幼皆然其酒肉補陽助火內傷勞倦元氣虛者雖病所禁忌之物亦可暫食養胃東垣有

是言也但節飲食極難非惟酒肉必以禮義樽節而不可過雖飯粥亦不可飽恆言喫得三碗只喫兩碗論語云肉雖多不使勝食氣小註云肉氣勝滯穀氣穀氣勝滯元氣元氣流行者壽元氣滯者夭惟酒無量不及亂在聖人則可常人當不自有其量而後可不亂也節色非惟眼招口挑縱慾宣淫亂匹配之常經反交感之正理得罪天地鬼神雖自己妻妾亦不可以妄合大風大雨大熱大寒朔望本生之期切宜禁忌惟靜中養見端倪自然變易其心一切穢褻之事且厭之矣況肯貪戀以喪家珍哉

或問保養修養何以異曰無大異也但修養涉於方外元遠而非恆言恆道保養不外日用食息而爲人所易知易行然則修養非歟曰據方書神農起醫藥之方黃帝創導引之術後世傳之失其眞爾素問曰飲食有節起居有常不妄作勞精神內守病安從來故能盡其天年度百歲乃去此保養之正宗也蓋有節有常而不勞則氣從軌而無俟於搬運之煩如今之動功也

內動運任督者久則生癰運脾土者久則腹脹運丹田者久則尿血運頂門者久則腦泄內動固不宜矣至於六字訣雖能發散外邪而中虛有汗者忌八段錦雖能流動氣血而中虛有火者忌惟醫林集要所載古導引法間有一二明顯可行者附錄於後究而言之亦不過吾儒舞蹈意也

精神內守則身心凝定而無俟於制伏之強如今之靜功也

丹書硃砂鉛汞龍虎之說俱是借喻身心惟心息相依之說最爲直截明顯心主乎息息依乎心心息相住則精氣神滿而病却矣

盡天年度百歲乃去則自古有生必有死惟不自速其死爾烏有如今之所謂飛昇超脫住世之說耶或曰保養既若是之易且顯何今之夭者多而壽者少耶曰飲食起居動作之間安能一一由心所主而無所詿誤哉香醪美味陳於前雖病所忌也而弗顧情況意興動於中雖病且危也而難遏貪名競利之心急過於勞傷而不覺此古今之壽相遠者非氣稟之

異也實今人之不如古人重其身爾曰吾知精神內守而後飲食起居得其宜則今之內動外動皆不足取而靜功收斂精神不亦得其正乎曰若不識盡天年度百歲乃去機括雖終日閉目只是一團私意靜亦動也若識透天年百歲之有分限節度則事事循理自然不貪不躁不妄斯可以却未病而盡天年矣蓋主於氣則死生念動而昏昧錯雜愈求靜而不靜主於理則人欲消亡而心清神悅不求靜而自靜此俗之所謂靜恐亦異乎古之所謂靜也曰若然則吾儒一敬盡之矣曰聖學至大非某能知但黃帝亦古聖人也今不信古聖人名言而信盲人詭異邪說甚則喪家殞身見亦謬哉此吾所以只言保養也曰保養可勿藥乎曰避風寒以保其皮膚六腑則麻黃桂枝理中四逆之劑不必服矣節勞逸以保其筋骨五臟則補中益氣劫勞健步之劑不必服矣戒色慾以養精正思慮以養神則滋陰降火養榮凝神等湯又何用哉薄滋味以養血寡言語以養氣則四物四君十全三和等湯又何用哉要之血由氣生氣由神全

神乎心乎養心莫善於寡欲吾聞是語矣竊有志而未能敢述之以告我疲癃殘疾而不知學者相與共守乎禁戒以重此身爲萬物之本

趙獻可醫貫

寡欲論

尊生之士不須服食不須導引不須吐納能大明生死幾於道矣生死之門戶不生則不死上根頓悟無生其次莫若寡慾未必長生亦可卻病反而求之人之死由於生人之病由於慾上工治未病下工治已病已病矣繹其致病之根由於不謹急遠房幃絕嗜慾庶幾得之世人服食以圖長生惑矣甚者日服補藥以資縱慾則惑之甚也

震本坤體陽自外來交之有動乎情慾之象是以聖人於卦中凡涉乎震體者取義尤嚴洊雷震君子以恐懼修省在復則曰先王以至日閉關欲其復之靜也在隨則曰向晦入晏息欲其居之安也在頤則曰慎言語節飲食欲其養之正也明乎此義而相火不藥自伏矣

冬至一陽生夏至一陰生此二至最爲緊要至者極也陰處陽生絕處逢生自無而有陽極生陰從有而無陽變陰化之不同也若春分秋分不過從其中平分之爾然其尤重者獨在冬至故易曰先王以至日閉關閉關二字須看得廣觀月令云是月齋戒掩身以待陰陽之所定則不止關市之門矣

醫門法律（臣喻昌著）

調和榮衛

聖人陳陰陽筋脈和同骨髓堅固氣血皆從如是則內外調和邪不能害耳目聰明氣立如故可見調營衛之義爲人身之先務矣深維其機覺衛氣尤在所先焉經謂陽氣破散陰氣乃消亡是衛氣者保護營氣之金湯也謂審察衛氣爲百病母是衛氣者出納病邪之喉舌也易云一陰一陽之謂道迺其扶陽抑陰無所不至仙道亦然噫嘻鼻氣通於天者也口氣通於地者也人但知以口之氣養營惟知道者以鼻之氣養衛養營者不免縱口傷生養衛者服天氣而通神明兩者之月異而歲不同也豈顧問哉

問居常調衛之法若何曰每至日西身中陽氣之門乃閉卽當加意謹護勿反開之經謂暮而收拒毋擾筋骨毋見霧露隱括調衛之義已悉收者收藏神氣於內也拒者捍邪氣於外也如晨門者昏閉明啓尚何暴客之虞哉卽使逢年之虛遇月之空身中之氣自固虛邪亦何能中人耶

謹節五味

問味過於酸肝氣以津脾氣乃絕此何解也曰此人身消息之所在王註牽強不合乎道夫人天眞之氣全在於胃津液之多寡卽關眞氣之盛衰而胃復賴脾以運其津液一臟一腑相得益彰所以胃不至於過濕脾不至於過燥也觀下文味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚其爲脾過燥胃過濕可知然終是相連臟腑嘿相灌滲所以脾氣但言不濡病反在胃且未甚也至以過酸之故助其曲直將胃中津液日漸吸引注之於肝轉覺肝氣津潤有餘矣肝木有餘勢必尅土其脾氣坐困不至於絕不已爾若胃中津液尚充縱脾氣不濡有濡之者在也亦安得坐斃哉

問味過於苦胃氣乃厚味過於辛精神乃央註謂厚爲強厚央爲久長豈五味中酸鹹甘多所損苦辛多所益乎曰二義原不作此解王註與經文全相背謬觀於胃氣乃厚緣於脾氣不濡明係脾困不爲胃行津液胃氣積而至厚也胃氣一厚容納遂少反以有餘成其不足更難施治今人守東垣一家之學遇胃病者咸用補法其有愈補愈脹者正坐此弊如西北之人喜食生硬麪酪迨至受病投以牽牛巴豆乃始暢適即香砂橘半用且不應況用參朮之補乎內經有言胃氣實則脹虛則泄蓋可知矣至精神乃央上文既云筋脉沮弛明是筋脉得辛而緩散不收也況人之精神全貴收藏不當耗散寧有辛散既久而不爲殃害者耶曰央則其爲病且有卒暴之虞矣相傳多食辛令人夭豈不然哉

問味過於鹹大骨氣勞從前無解請一明之曰身中消息有謂心未有不正腎未有不邪者以腎爲作強之官也有謂腎未有不正心未有不邪者以心爲情慾之腑也大骨氣勞心腎兩有所涉而實有不盡然

者嘗見高僧高道棲眞習定忽焉氣動精傾乃知味過於鹹大骨氣勞之說不盡關於情慾爾蓋食鹹過多峻補其腎腰骨高大之所其氣忽積喜於作勞氣旣勃勃內動則精關勃勃欲開雖不見可欲而不覺關開莫制矣經謂強力入房腎氣乃傷高骨乃壞此因嗜慾無節者之本病奈何清修卓煉之士每於蔬菜間多食鹹藏厚味以虧道體無有以內經之理一陳其前者及病已成而食淡齋長年累月自苦亦足補偏救敝然不如當日味無過鹹之超矣因幷及之

和暢性情

飲食入胃而精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋養周身乃清氣爲天者也升已而輸膀胱行秋冬之令爲傳化糟粕轉味而出乃濁陰爲地者也若夫順四時之氣起居有時以避寒暑飲食有節及不暴喜怒以頤神志常欲四時均平而無偏勝則安不然損傷脾胃眞氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而無春夏乃生長之用陷於隕殺之氣而百病皆起或久升不降亦病焉

本神篇曰心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失邪氣臟腑病形篇曰憂愁恐懼則傷心口問篇曰悲哀憂愁則心動心動則五臟六腑皆搖可見心爲五臟六腑之大主而總統魂魄兼該志意故憂動於心則肺應思動於心則脾應怒動於心則肝應恐動於心則腎應此所以五志惟心所使也設能善養此心而居處安靜無爲懼懼無爲欣欣婉然從物而不爭與時變化而無我則志意和精神定悔怒不起魂魄不散五臟俱寧邪亦安從奈我何哉

景岳全書 臣張介賓著

治形論

老子曰吾所以有大患者爲吾有身使吾無身吾有何患余則曰吾所以有大樂者爲吾有形使吾無形吾有何樂是可見人之所有者惟吾吾之所賴者惟形爾無形則無吾矣謂非人生之首務哉但形之爲義其義甚微如言動視聽非此形乎俊醜美惡非此形乎勇怯愚智非此形乎死生安否非此形乎人事之交以形交也功業之建以形建也此形之爲義從

可知也奈人昧養形之道不以情志傷其府舍之形則以勞役傷其筋骨之形內形傷則神氣爲之消靡外形傷則肢體爲之偏廢甚至肌肉盡削其形可知其形既敗其命可知然則善養生者可不先養此形以爲神明之宅善治病者可不先治此形以爲興復之基乎雖治形之法非止一端而形以陰言實惟精血二字足以盡之所以欲祛外邪非從精血不能利而達欲固中氣非從精血不能畜而强水中有眞氣火中有眞液不從精血何以使之降升脾爲五臟之根本腎爲五臟之化源不從精血何以使之灌漑然則精血卽形也形卽精血也天一生水水卽形之祖也故凡欲治病者必以形體爲主欲治形者必以精血爲先此實醫家之大門路也使能知此則變化可以無方神用自有莫測然用此之法無逾藥餌而藥餌之最切於此者不過數味之間其他如性有偏用者唯堪佐使而已亦猶飲食於人凡可口者孰無資益求其純正無損而最宜於胃氣者則惟穀食類可見矣或問余以所宜者果屬何物余則難以顯言之

蓋善吾言者必如醴如飴而不善吾言者必反借此爲射的以資口吻之基矣余故不能顯言之姑發明此義以俟有心者之自悟

二八四二

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十一卷目錄

醫部彙考三百三十一

頤養補益門二

方　彭祖補陽固蔕長生延壽丹　小接命熏臍祕方　接命丹　溫臍種子方　溫臍兜肚方　祕傳三仙膏　秋石五精丸　醍醐湯　瓊玉膏　衞生方　遐齡萬壽丹　延齡固本丹　斑龍丸　人參固本丸　元菟固本丸　益氣固精丸　坎離丸　不老丹　靈芝丸　仙茅丸　七寶美髯丹　胡桃丸　仙方椒茶丸　異類有情丸　麋角霜丸　二至丸　小刀圭　返本丸　仙朮湯　延壽丹　添精補髓丸　滋血百補丸　沉香百補丸　滋腎百

補九　地芝丸　柏子仁丸　八物腎氣丸
益壽地仙丸　葛眞人百補交精丸　加減瑞
蓮丸　八製茯苓丸　大補陰丸　加味寧神
丸　扶桑至寶丹　藥枕方　補天大造丸
八味地黃丸　不老丹　鹿角霜丸　烏髮固
本丸　柏子養心丸　却老烏鬚健陽丹　四
聖不老丹　松梅丸　地髓煎　硫黃杯　紫
霞杯　三才丸　交藤丸　打老兒丸　還少
丹　雙芝丸　老奴丸　延生護寶丹　腽肭
臍丸　椒紅丸　補骨脂丸　地仙丸　肉蓯
蓉丸　何首烏丸　神仙一井金丹　神仙巨
勝子丸　保命延齡丸　容顏不老方　枸杞
煎　二精丸　寇相大朝湯　全鹿丸　御米
酒　斑龍二至百補丸

藝術典第三百五十一卷

醫部彙考三百三十一

頤養補益門二

方

彭祖補陽固帶長生延壽丹（入門下同）

扁鵲用此二十味浮沉升降君臣佐使治勞嗽之疾無不痊愈不惟勞疾凡一年四季各熏一次元氣堅固百病不生及久嗽久喘吐血寒勞遺精白濁陽事不舉下元極弱精神失常痰膈等疾婦人

赤白帶下久無生育子宮極冷凡用此灸則百病頓除益氣延年

人參　附子　胡椒各七錢　夜明砂　五靈脂

沒藥　虎骨　蛇骨　龍骨　白附子　朱砂

麝香各五錢　青鹽　茴香各四錢　丁香

雄黃　乳香　木香各三錢

右爲末另用白麪作條圈於臍上將前藥一料分爲三分內取一分先塡麝香末五分入臍孔內乃將一分藥入麪圈內按藥令緊中插數孔外用槐皮一片蓋於藥上以艾火灸之無時損易壯其熱氣或自上而下自下而上一身熱透患人必倦沉如醉灸至五六十壯遍身大汗上至泥丸宮下至湧泉穴如此則骨髓風寒暑濕五勞七傷盡皆拔除苟不汗則病未除再於三五日後又灸至汗出爲度學者須用小心灸至百二十壯則疾必痊灸時要愼風寒戒生冷油膩保養一月以後愈加精神健旺婦人灸臍去麝香加韶腦一錢

小接命熏臍祕方

夫人賴精血而成形其在胞胎惟有臍帶與母氣相通隨母呼吸十月脫胎漸長成人七情六慾內外交侵喪失眞元殞軀喪命良可惜也余哀閔世人特傳良方壯固根蒂保護形軀熏蒸本源除却百病其效如神每年中秋日熏蒸一次

乳香　沒藥　猳鼠糞　青鹽　續斷各二錢

麝香一分

右爲末令人食飽仰臥用蕎麥麪水和捏一圈徑過寸餘臍大則徑二寸內入藥末安臍上用槐皮一片覆圈藥之上以豆許艾壯灸之百脈和暢冷汗如雨不可令痛痛則反泄眞氣灸至行年歲數而止無病者連日灸之有病則三日一次灸至腹內作聲作痛大便有涎沫等物出爲止只服米湯兼食白肉黃酒以助藥力若患風氣有鬱熱在腠理者加女子紅鉛拌藥則汗易出而疾隨愈矣

接命丹

養丹田助兩腎添精補髓返老還童却病延年

大附子一枚切作八片　甘草　甘遂二兩搥碎

右以布包用燒酒二斤共浸半日文武火煮酒乾爲度取起附子去草遂加麝香三分搗千餘下分作二丸陰乾納一丸於臍中七日一換餘丸放黑鉛盒內養之

溫臍種子方

五靈脂　白芷　青鹽各二錢　麝香一分

右爲末用蕎麥粉水和成條做圈安於臍上以前藥末入於臍中用艾灸之婦人尤宜但覺臍中溫煖即止過數日再灸太過則生熱也

溫臍兜肚方

專治痞積遺精白濁婦人赤白帶下經脈不調久不受孕者惟有孕者忌之

白檀香　羚羊角各一兩　零陵香　馬兜鈴

馬蹄香（即沉香）　白芷　木鼈子　甘松　升麻

血竭各五錢　丁皮七錢　麝香九分

右爲末作三分以熟艾絮綿裝白綾兜肚內初用者每三日後一解至第五日又用一月後常用之

祕傳三仙膏方（神效）

治同上

人參　山藥　蓮肉　白茯苓　芡仁各四兩

蜜　沙糖各一斤刮爲雪　糯米三升　粳米七升

各搗作末右和勻蒸取出曬乾再爲末每取一大匙白湯調下

秋石五精丸（經驗方）

常服補益

秋石一兩　蓮肉六兩　川椒紅　小茴各五錢

白茯苓二兩

爲細末棗肉和丸梧子大每服三十丸鹽湯溫酒空心下

醍醐湯

止渴生津

烏梅一斤搥用水兩大椀熬一椀澄淸不犯鐵器

縮砂末二兩　白檀末一錢　麝香一字　蜜三斤

右將梅水縮砂蜜三件一處於砂石器內熬之候赤色爲度冷定入白檀麝香每用一二匙點湯服

瓊玉膏（入門）

填精補髓調眞養性返老還童補百損除百病萬神俱足五臟盈溢髮白復黑齒落更生行如奔馬日進數服終日不饑渴功效不可盡述一料分五劑可救癱瘓五人一料分十劑可救勞瘵十人若二十七歲服起壽可至三百六十若六十四歲服起壽可至五五百年

生地黃十六斤搗絞取汁　人參細末二十四兩

白茯苓細末四十八兩　白蜜煉去滓十斤

右和勻入磁缸內以油紙五重厚布一重緊封缸口置銅鍋內水中懸胎令缸口出水上以桑柴火煑三晝夜如鍋內水減則用煖水添之日滿取出再用蠟紙緊封缸口納井中浸一晝夜取出再入舊湯內煑一晝夜以出水氣乃取出先用少許祭天地神祇然後每取一二匙溫酒調服不飲酒白湯下日進二三服如遇夏熱置陰凉處或藏冰中或埋地中須於不聞雞犬聲幽淨處不令婦人喪服人見之製時終始勿犯鐵器服時忌食葱蒜蘿蔔酢酸等物

衞生方

生地黃八斤　人參三十二兩　白蜜五斤

白茯苓二十四兩

永樂中太醫院會議加天門冬麥門冬地骨各八兩進御服食賜號益壽永貞膏

遐齡萬壽丹（丹溪）

詩曰遐齡萬壽丹服食魂魄安養藥雞抱卵日期要周全修合宜深室一切人勿觀甲子庚申夜爲丸不見天一還增六十二還百廿年服藥非凡骨

壽同天地間祕之深祕之元之又更元

茯神　赤石脂　川椒微炒出汗去目并閉口者

朱砂細研水飛　乳香燈心同研各一兩別爲末

用雞卵二箇去清黃只將朱砂乳香各裝一卵內用紙糊七重以靑絹袋盛之令精壯婦人懷於肚上常令溫煖朱砂懷三十五日乳香懷四十九日再研前三味藥亦爲細末和勻以蒸棗肉和丸菉豆大每日空心溫酒吞下三十丸或人參湯下一月外加至四十丸以甲子庚申夜幽靜處修合忌

婦人雞犬見之回春名五老還童丹

延齡固本丹（回春）

治諸虛百損中年陽事不舉未至五十鬚髮先白服至半月陽事雄壯至一月顏如童子目視十里服至三月白髮還黑久服神氣不衰身體輕健可升仙位

菟絲子酒製　肉蓯蓉酒洗各四兩　天門冬
麥門冬　生地黃　熟地黃並酒製　山藥
牛膝酒洗　杜仲薑汁炒　巴戟酒浸去心
枸杞子　山茱萸肉酒蒸　人參　白茯苓
五味子　木香　柏子仁各二兩　覆盆子
車前子　地骨皮各一兩半　石菖蒲　川椒
遠志肉甘草水浸薑汁炒　澤瀉各一兩

右爲細末酒煮稀麵糊和丸梧子大空心溫酒下八十丸婦人加當歸赤石脂各一兩忌食蘿蔔葱蒜牛肉酢酸物飴糖羊肉

斑龍丸（正傳）

常服延年益壽

白茯苓　破故紙各四兩　鹿角膠　鹿角霜

菟絲子　柏子仁　熟地黃各八兩

右爲細末酒煮米糊和丸或以鹿角膠入好酒烊化和丸梧子大薑鹽湯下五十丸昔蜀中有一老人貨此藥於市自云壽三百八十歲矣每歌曰尾閭不禁滄海竭九轉金丹都謾說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血有學其道者傳得此方彼老人化爲白鶴飛去不知所終

人參固本丸（必用方）

夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚髮不白顏貌不衰延年益壽藥之滋補無出於生熟二地黃人徒知服二地黃而不知服二門冬爲引也蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相爲用又以人參爲通心氣之主

人參一兩　天門冬去心薑汁浸二日酒浸一日

麥門冬去心酒浸二日泔浸三日　生乾地黃

熟地黃竝酒浸各二兩

右以石磨磨如泥或爛搗以杏仁湯化開漉淨滓又磨淨盡如澄小粉之法撤去上面水取藥粉曬乾乃入人參末煉蜜和丸梧子大每取五七十丸溫酒鹽湯任下忌蘿蔔葱蒜

元菟固本丸（丹溪）

治同上

菟絲子酒製　熟地黃　生乾地黃並酒浸焙
天冬　麥冬並酒浸去心　五味　茯神各四兩
山藥微炒三兩　蓮肉　人參　枸杞子各二兩

右蜜丸梧子大每八九十丸溫酒或鹽湯任下

益氣固精丸（雜興方）

補血黑髮益壽有奇效

破故紙酒浸春三夏一秋二冬五日焙研末
金銀花各二兩　還筒子　芡實各半兩
各研末蜜和丸梧子大每服五十丸空心鹽湯溫酒任下

坎離丸（積善堂）

滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱

茅山蒼朮刮淨一斤分作四分一分用川椒一兩炒一分用破故紙一兩炒一分用五味子一兩炒一分用川芎藭一兩炒去同炒藥不用只取朮研末川蘗皮四斤分作四分一斤用酥炙一斤用人乳汁炙一斤用童尿炙一斤用米泔炙各十二次

研末和勻煉蜜丸梧子大每服三十丸早用酒午用茶晚用白湯下

不老丹（元戎）

補脾益腎服之七十亦無白髮

茅山蒼朮刮淨泔浸切四斤一斤用酒浸焙一斤用酢浸焙一斤用鹽四兩炒一斤用川椒四兩炒赤白何首烏各二斤油浸竹刀刮切以黑豆紅棗各五升同蒸至豆爛曝乾　地骨皮去骨一斤

右各取淨末以桑椹汁和成劑鋪盆內汁高三指日曬夜露取日月精華待乾以石臼搗末煉蜜和丸梧子大每空心酒服一百丸

靈芝丸（良方）

治脾腎氣虛添補精髓通利耳目

蒼朮一斤米泔水浸春夏五日秋冬七日逐日換水竹刀刮皮切曬

右於石臼爲末棗肉蒸和丸梧子大每服三五十丸棗湯空心服

仙茅丸（聖濟總錄）

壯筋骨益精神明目黑髭鬚

仙茅糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀刮剉陰乾　蒼朮米泔浸五日刮皮焙乾取各二斤

枸杞子一斤　車前子十二兩　白茯苓去皮

茴香炒　柏子仁去殼各八兩　生地黃焙

熟地黃焙各四兩

爲末酒煑糊丸如梧子大每服五十丸食前溫酒下日二服

七寶美髯丹（積善堂）

烏鬚髮壯筋骨固精氣續嗣延身

赤白何首烏用米泔水浸三日瓷片刮去皮

黑豆淘淨二升以砂鍋木甑重重鋪豆及首烏蒸之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸九次暴乾爲末

赤白茯苓去皮研末以水淘去筋膜及浮者取沉者捻成塊以人乳十盌浸勻曬乾研末各一斤　牛膝酒浸一日同何首烏第七次蒸之至第九次止曬乾　當歸酒浸曬　枸杞子酒浸曬　菟絲子各八兩酒浸生芽研爛曬　補骨脂四兩以黑芝麻炒香並忌鐵器

石臼內杵爲末煉蜜和丸彈子大一百五十丸每日三丸清晨溫酒下午時薑湯下臥時鹽湯下其餘並丸梧子大每日空心酒服一百丸久服極驗

忌猪肉血羊血無鱗魚解藥無力

胡桃丸（御藥院方）

益血補髓强筋壯骨延年明目悅心潤肌能除百病

胡桃仁搗膏　破故紙　杜仲　萆薢末各四兩

右杵勻丸梧子大每空心溫酒鹽湯任下五十丸

仙方椒苓丸

補益心腎明目駐顏順氣祛風延年

眞川椒一斤炒去汗　白茯苓十兩去皮

爲末煉蜜丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯下忌鐵器

異類有情丸

凡丈夫中年覺衰便可服餌蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也

鹿角霜　龜板酒浸七日酥炙研各三兩六錢　鹿茸酒洗淨酥塗炙研　虎脛骨長流水浸七日蜜塗酥炙各二兩四錢

水火煉蜜入豶猪脊髓九條搗丸梧子大每空心鹽湯下五七九十九丸如厚味善飲者加猪膽汁一二合以寓降火之義

麋角霜丸（總錄）

補元臟駐顏色

麋角一副水浸七日刮去皺皮鎊爲屑盛在一銀瓶內以牛乳汁浸一日常令乳高二寸如乳耗更添直候不耗用油單紙重密封瓶口別用大麥一斗安在別瓶內約厚三寸上安麋角瓶更用大麥周圍填實露瓶口不住火蒸一伏時如鍋內水耗即旋添熱湯

須頻看角屑粉爛如麵卽住火取出用細篩子漉去乳焙乾八兩　附子炮裂去皮臍　山藥各三兩

右爲末蒸棗肉和丸如梧子大每服十五丸至二十丸空心用溫鹽湯送下煉蜜丸亦可

二至丸（家藏方）

補虛損生精血去風濕壯筋骨

麋角鎊以眞酥二兩米酢二升煑乾慢火炒半兩　蒼耳子酒浸一宿焙半斤　山藥　白茯苓　鹿角鎊以眞酥一兩用無灰酒一升慢火炒乾　黃芪蜜炙各四兩　當歸酒浸焙五兩　遠志　蓯蓉酒浸焙　人參　沉香各二兩　熟附子一兩

通爲末酒煑糯米糊丸梧子大每服五十丸溫酒鹽湯任下日二服

小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之

小牛犢兒未交感者一隻臘月初八日或戊己日殺之去血燖毛洗淨臟腑不遺大銅鍋煑之每十斤　黃芪十兩　人參四兩　茯苓六兩　官桂

良薑各五錢　陳皮三兩　醇酒二斗　甘草

蜀椒　食鹽各二兩

同煮水以八分爲率文火煮至如泥其骨皆搥碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋於土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更玅肥犬及鹿皆可依此法作之

返本丸（乾坤生意）

補諸虛百損

黃犍牛肉去筋膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日

再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入罎內重泥封固桑柴文武火煮一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末　山藥鹽炒　蓮肉鹽炒過竝去鹽

白茯苓　小茴香炒各四兩

爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和擣丸梧子大每空心酒下五十丸日三服

仙术湯（局方）

常服延年明目駐顏輕身不老

蒼术十九兩二錢　棗肉六升　杏仁二兩四錢

乾薑炮五錢　甘草炙五兩　白鹽炒十兩

右細末每二錢沸湯點服空心

延壽丹（丹溪）

天門冬　遠志　山藥　巴戟各二兩　赤石脂

車前子　柏子仁　澤瀉　熟地　川椒炒去汗

生地　枸杞　茯苓　覆盆子各二兩　杜仲炒

菟絲子酒浸　牛膝酒浸　肉蓯蓉酒洗各四兩

當歸酒洗　地骨皮　人參　五味各一兩

右爲末蜜丸梧子大每服七十丸

添精補髓丸

赤石脂二錢　穿山甲酒炙七錢　蓯蓉四兩

茯苓　牛膝酒浸　五味子　澤瀉　熟地黃

山萸肉　厚朴　川椒去目　柏子仁　地龍

巴戟去心各一兩　山藥　杜仲　菟絲各三兩

晚蠶蛾　枸杞　破故紙　人參　白术各二兩

仙靈脾一兩半羊脂炒

右爲末蜜丸如腰痛加小茴香

滋血百補丸

熟地酒蒸　菟絲酒浸各半斤　當歸酒浸
杜仲酒炒各四兩　沉香一兩　知母酒炒
黃蘗酒炒各二兩

右爲末酒糊丸

沉香百補丸

熟地六兩　菟絲子四兩　知母炒　黃蘗酒炒
人參各二兩　沉香一兩　山藥　當歸　茯苓
杜仲炒各三兩

右爲末酒糊丸

滋腎百補丸

當歸酒浸　菟絲酒浸各四兩　青鹽一兩炒
黃蘗酒炒褐色　山藥　菊花　知母酒浸
杜仲炒　楮實各二兩　沉香五錢　熟地八兩

右爲末酒糊丸或煉蜜丸服

地芝丸

和顏色利血氣調百節黑髮堅齒逐風散氣

生地　天門冬各八兩　菊花　枳殼麩炒各四兩

右爲末酒蜜麪糊爲丸如梧子大空心服三十丸

酒下

　柏子仁丸

補益元氣充實肌膚

山萸肉四兩　柏子仁半兩微炒　遠志半兩

覆盆子　山藥各一兩取末

右爲末將山藥白麪同酒煮和丸如梧子大服三十丸溫酒下

　八物腎氣丸

平補腎氣堅齒駐顏

熟地半斤　山藥　山茱萸肉各四兩　澤瀉

牡丹皮　白茯苓各三兩　五味子　桂各二兩

右爲末蜜丸服

　益壽地仙丸

補五臟填骨髓續絕傷黑髭鬚清頭目聰耳聽

甘菊花　巴戟去心各三兩　肉蓯蓉酒浸四兩

枸杞二兩

右爲末蜜丸梧子大服三十丸空心鹽湯下溫酒亦得

葛眞人百補交精丸（中藏經）

熟地黃四兩酒浸一宿切焙乾秤　五味子六兩　杜仲三兩去粗皮剉炒斷絲　蓯蓉酒浸一宿焙　山藥　牛膝酒浸一宿焙乾各二兩　澤瀉　茯苓　山茱萸　遠志去心　巴戟　赤石脂　柏子仁微炒　石膏各一兩火燒令赤出火毒

右爲末蜜丸如梧桐子大空心酒下二十丸男女服之

加減瑞蓮丸（醫貫）

定心煖腎生血化痰益氣

蒼朮一斤酒浸四兩醋浸四兩米泔水浸四兩生用四兩　枸杞子　破故紙　五味子各二兩去梗　蓮肉一斤去心酒浸軟入犍猪肚內煑極爛取出焙乾爲末猪肚汁仍留爲丸　熟地黃三兩酒浸蒸

右共爲細末用煑猪肚膏和酒糊丸如梧桐子大空心溫酒服四五十丸

八製茯苓丸

治一切虛損壯筋骨生心血烏鬚髮明目固精女

人滋顏色煖子宮調經順氣

白茯苓二斤半去皮打碎如棗大分爲八分一分用黃芪六兩切絲水六鍾煎三鍾煑汁乾爲度一分用肉蓯蓉四兩酒洗去鱗心水六鍾煎三鍾煑如前一分用人參六錢水五鍾煎三鍾煑如前一分用秋石四兩水二鍾化開令盡煑如前一分用枸杞六兩水八鍾煎三鍾煑如前一分用破故紙五兩水八鍾煎三鍾煑如前一分用人乳半斤煑如前一分用何首烏半斤黑豆一升水三升浸春秋二日夏一日冬三日將浸過首烏黑豆汁煑如前

將製過茯苓總入石臼內搗細篩過上甑蒸熟乘熱衆手爲丸如生子者每日早晚淡湯鹽服四五十丸如烏鬚明目固齒者白湯下忌燒酒犬肉修合須用平定成開生氣續世黃道吉日先一日午時將諸藥煎汁煑茯苓搗末次日臨夜起手待子時完成微火烘乾不見風日忌孝服婦人雞犬四廢井不成日

大補陰丸

補氣血壯筋骨進飲食悅顏色

熟地三兩　山萸　牛膝酒洗　茯神　瑣陽炙
杜仲炒去絲　當歸身酒洗　懷山藥微炒
人參各一兩　枸杞二兩　五味　丹皮各五錢
黃蘗蜜炙　芍藥酒炒各七錢　菟絲子酒煮搗
虎脛骨酥炙各一兩五錢

右爲細末蜜丸每服百粒空心淡鹽湯下

加味寧神丸

養心固腎益元氣

懷生地酒洗　枸杞子各兩半　石菖蒲　人參
元參各五錢　珠母四錢（如無以細珍珠代之）　懷山藥
當歸身酒洗　柏子仁　遠志甘草水煮　麥冬
茯神人乳拌蒸　酸棗仁微炒各一兩

共爲細末煮圓眼肉搗膏丸如梧子大朱砂飛過爲衣每服七十丸清晨臨臥白湯下

扶桑至寶丹

歌曰扶桑扶桑高拂雲海東日出氣氤氳滄海變田幾億載此樹遺根今尚存結子如丹或如漆綠

葉英英翠可捫眞人採竊天地氣畱與紅霞共吐吞濯磨入鼎卽靈藥芝朮區區未許羣餐松有人已仙去我今朝夕從此君葉兮葉兮願玉汝綠陰裏面有桃源胡僧曰蠶食吐絲織成錦繡人食生脂延年除咎蓋嫩桑之葉性本和平不冷不熱服之可長生

桑葉擇家園中嫩而存樹者採十數斤洗以長流水去蔕暴乾爲末

每桑葉淨末一斤用黑芝麻四兩陰陽水煎濃汁二椀去麻存汁用蜜十二兩煉滴水成珠將汁入蜜內和藥末擣丸如梧桐子大每服百丸早鹽湯晚酒下久服不已自躋上壽起尩羸濟危弱駐容顏鬚白返黑却疾延年補髓添精功效不細此仙家服食上品祕密難逢傳匪其人當有殃咎戒之

藥枕方（保生要錄）

治頭風目眩傳曰土厚水深居之不疾故人居處隨其方所皆欲土厚水深土欲堅潤而黃水欲甘美而澄常居之室極令周密勿有細隙致風氣得

入風者天地之氣也能生成萬物亦能損人初入腠理之間漸至肌肉之內內傳經脉達於臟腑傳變尤甚盛暑不可露臥自立春後至立秋前欲東其首立秋後至立冬之前欲西其首常枕藥枕其枕藥性大熱則熱氣衝上大冷則冷氣傷腦惟理風平凉者乃爲得宜

蔓荊子　甘菊花　通草　防風　羚羊角屑
犀角　石菖蒲各八分　細辛　白芷　芎藭
藁本各六錢　白朮四分　黑豆五合揀擇淨

右件藥剉成細末相拌令均以生絹囊盛之欲其氣全次用碧羅袋盛之如枕樣內藥直令緊實置在盒子中其盒形亦如枕內藥囊令出盒子脣一寸半晚來欲枕時揭去盒蓋不枕即蓋之使藥氣不散枕之日久漸低更入藥以實之或添黑豆令如初三五月後藥氣歇則換之勿枕旬日或一月耳中微鳴是藥抽風之驗

補天大造丸（體仁彙編下同）

此方專滋養元氣延年益壽壯陽光溫坎水降離

火爲天地交泰若虛勞之人房室過度五心煩熱服之神效養生君子過四十以來服之接補以躋期頤地仙務必依法製之

側柏葉採東嫩枝隔紙焙乾　熟地黃酒蒸十九次忌鐵各二兩　生地黃酒浸透忌鐵　牛膝酒洗
杜仲酥炙斷絲　天冬　麥冬並去心各一兩半
陳皮去白炒過七錢半　乾薑炮二錢　白朮炒
五味子去梗　黃蘗酒炒　歸身酒洗　小茴炒
枸杞子去梗各一兩

右爲細末用紫河車一具取首男胎者佳如得壯盛婦亦好先用新鮮米泔水濾去米滓將河車浸輕輕擺開換洗米泔五次不動筋膜只洗淨有草屑輕手取去將竹器全盛長流水中浸一刻以取生氣以瓦小盆全盛於木甑內蒸自卯時蒸起至申酉時止用文武火緩緩蒸之極熟如糊取出先傾自然汁在藥末內略和均河車放石臼內木杵杵千下如糊樣通將河車并前藥汁末同和均搗千餘杵衆手爲丸此全天元眞氣以人補人最玅

世所少知醫用火焙酒煮及去筋膜又入龜板大悞故特出之凡藥末必秤淨及忌鐵器俱用石臼杵舂或石磨磨之不散耗且遠鐵若河車肥大量加些藥末如乾略用蜜每日空心米湯下一百丸有病者一日服二次

如骨蒸加地骨皮去木知母去毛酒炒牡丹皮去木

如血虛加當歸地黃倍之

如氣虛加人參黃芪蜜炙各一兩

如腎虛加覆盆子炒小茴香炒巴戟去木茱萸去核各一兩半此味要淨肉

如腰脚疼痛加蒼朮鹽水炒萆薢酒洗瑣陽酒洗酥炙續斷酒洗各一兩半

如婦人去黃蘗加川芎香附子實黃芩俱酒炒各一兩

八味地黃丸

滋補之功甚奇勿輕視之

熟地黃酒蒸　山茱萸酒浸去核取淨肉各八錢

丹皮　澤瀉各二錢（小便多以益智仁代）　白茯神去皮木山藥蒸各四錢　五味去梗　麥冬去心各五錢

右爲細末煉蜜爲丸每日空心白湯下七十丸冬天酒下亦宜

不老丹

延年益壽

生地黃酒浸一宿曬乾　熟地黃酒洗淨曬乾

人參　天門冬酒浸三時取出曬乾去心皮

麥門冬法同天門冬去心各三兩　白茯苓去皮切酒洗曬乾　地骨皮酒洗各五兩　何首烏半斤鮮者用竹刀刮去皮切片乾者用米泔水浸軟刮去皮切片入砂鍋內先下烏羊肉一斤烏豆三合量著水懸藥於上覆蓋蒸一二時辰取出曬乾

共爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸用酒送下淸晨服之此藥千益百補服之或十日或一月自知爲另等人也常服功效難言得此藥者不可以藥易而輕傳也

鹿角霜丸

治益同上

黃蘗八兩去粗皮用人乳拌均曬乾如此三次炒重褐色或六兩或七兩隨時加減　鹿角霜八兩

天門冬去心　麥門冬去心　人參各二兩

熟地黃三兩酒浸一宿曬乾　生地黃一兩置水中去浮酒浸一宿

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服六七十丸加至百丸空心淡鹽湯送下或酒亦佳

烏鬚固本丸

烏鬚黑髮明目固齒助精神壯筋骨

何首烏半斤米泔水浸二宿竹刀刮去粗皮切片以黑豆五升滾水同泡一時蒸熟去豆　白茯苓

黃精四兩用黑豆二升同煑熟去豆忌鐵器

天門冬去心　熟地黃酒浸　生地黃酒浸

麥門冬去心　赤茯苓　白朮　人參　五加皮

巨勝子　松子仁　柏子仁　核桃仁各二兩

枸杞一兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七八十丸空

心溫酒鹽湯任下

柏子養心丸

補血寧神滋陰壯水

柏子仁蒸曬去殼四兩　枸杞子酒洗曬三兩

麥門冬去心　當歸酒浸　石菖蒲去毛洗淨

茯神去皮心各一兩　熟地酒蒸　元參各二兩

甘草去粗皮五錢

右爲末內除柏子仁熟地黃蒸過石器內搗如泥餘藥末和勻加煉蜜爲丸如梧桐子大每服四五十丸臨睡白湯送下

却老烏鬚健陽丹

赤茯苓牛乳拌　白茯苓人乳拌各浸一宿曬乾

白首烏竹刀去皮打碎　赤首烏製同上各一斤

牛膝同何首烏用黑豆五升砂鍋內蒸三次

枸杞酒浸洗曬乾　當歸酒浸一宿　茯神

菟絲子各半斤酒浸三日曬乾　破故紙五兩炒黃

右九味各不犯鐵器另爲末煉蜜爲丸如彈子大日進三丸早一丸空心酒下午後一丸薑湯下臨

睡一丸鹽湯下初服三日小便雜色是去五臟雜病二七日脣紅口生津液再不夜起四七日身體輕健兩乳紅潤至一月後鼻頭辛酸諸風百病皆出四十九日目視光明兩手火熱精通白髮反黑齒落更生陽事强健丹田如火行走如飛氣力倍加非人不可輕泄神祕方也彭用光以煉蜜合作小丸如梧桐子大每空心酒下五十丸

四聖不老丹

强筋補益

明松脂一斤以無灰酒砂鍋內桑柴火煑數沸竹枝攪稠住火傾入水內結塊復以酒煑九遍其脂如玉不苦澀乃止爲細末十二兩　柏子仁去油取霜
白茯苓末　黃菊花末各半斤
煉蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日修合勿令婦人雞犬見之

松梅丸

健陽補中强筋潤肌大能益人

松脂以長流水桑柴煑拔三次再以桑灰汁煑七次

扯拔更以好酒煮二次仍以長流水煮二次色白不苦爲度一斤　九蒸地黃末十兩　烏梅末六兩

煉蜜丸梧子大每服七十丸空心鹽米湯下

地髓煎（千金方）

生地黃十斤洗淨搗壓取汁　鹿角膠一斤半

生薑半斤絞取汁　蜜二斤　酒四升

文武火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子四兩取汁入煎一二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器盛之每空心酒化一匕服大補益

硫黃杯

此杯配合造化調理陰陽奪天地沖和之氣乃水火旣濟之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎換骨之玅大能淸上實下升降陰陽通九竅殺九蟲除夢泄悅容顏解頭風開胷膈化痰積明耳目潤肌膚添精髓蠲疝墜又治婦人血海枯寒赤白帶下

瓷椀以胡桃擦過用無砂石硫黃生鎔成汁入白礬少許則塵垢悉浮以杖掠去綿濾過再入椀鎔化傾

入杯內盪成杯取出

埋土中一夜木賊打光用之欲紅入朱砂欲青則入葡萄研勻同煑成每用熱酒二杯清早空心溫服則百病皆除無出此方也

紫霞杯

硫黃袋盛懸砂鍋內以紫背浮萍同水煑之數十沸候乾研末十兩　珍珠　琥珀　乳香　雄黃

朱砂　陽起石　赤石脂　片腦　紫粉　白芷

甘松　三柰　木香　血竭　沒藥　韶腦

安息香各一錢　麝香七分　金箔二十片

爲末入銅杓中慢火鎔化以好樣酒杯一箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令勻投冷水中取出每日盛酒飲二三杯功同上方

三才丸（機要）

滋陰養血溫補下元

天門冬去心　生地黃二味用柳甑箄灑酒九蒸九曬乾秤各二兩　人參一兩

爲末蒸棗肉搗和丸梧子大每服三十丸食前溫

酒下日三服

交藤丸（華佗）

駐顏長算祛百病

何首烏赤白者各一斤（卽交藤根也）　白茯苓五兩

牛膝二兩

右蜜丸酒下三十丸忌食猪羊血

打老兒丸

藥最平和陰陽不偏

石菖蒲銅刀刮去皮用嫩桑枝相拌蒸曬乾去桑枝不用不可犯鐵器令人吐逆　山藥蒸曬乾

牛膝去蘆用黃精自然汁浸撈出換酒浸一宿若無黃精酒浸三日撈出焙乾　山萸肉慢火焙乾

遠志用甘草水浸一宿撈起曬乾又浸曬　巴戟用枸杞子湯浸一宿去心酒浸一宿撈起用菊花同包炭火焙令黃色去菊花不用　續斷酒浸軟去內裏筋文火炒半乾曬　五味蜜湯浸去子再以漿水浸一宿焙乾　茯苓去皮筋搗細於水中攪去浮者

楮實子水浸三日攪去浮者不用撈起曬乾酒浸一

宿濾出蒸從辰至午焙乾　枸杞子去蒂　熟地黃蒸取出放冷又以酒蒸取出令乾又拌蒸三四次勿犯鐵器　小茴香酒浸一宿炒乾　肉蓯蓉洗酒浸一宿刷去沙皮劈破中心去白膜一重如竹絲飯上蒸從寅至未再用酥炙黃　杜仲去皮酥炙炒無絲

右爲細末各等分酒糊爲丸桐子大每服二十丸空心溫酒送下服五日便覺身輕十日精神爽快二十日語言響亮一年白髮轉黑行步如飛

還少丹

山藥　牛膝酒浸　遠志去心　山萸肉　楮實

白茯苓　五味子　巴戟酒浸去心　石菖蒲

肉蓯蓉酒浸一宿　杜仲薑汁酒拌同炒去絲

舶茴香各一兩　枸杞子　熟地黃各二兩

右爲細末煉蜜同棗肉爲丸如桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常煖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老固齒無瘴瘧婦人服之容顏悅澤煖子宮去

一切病更看體候加減

雙芝丸（良方下同）

治諸虛補精氣塡骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服駐顏不老

熟地黃取末　石斛去根酒炙　肉蓯蓉酒浸

菟絲子酒浸三日炒　牛膝酒浸　黃芪各四兩

沉香三錢　杜仲蜜水浸炒斷絲　五味子焙

薏苡仁炒各二兩　麝香二錢　麋鹿角霜半斤

白茯苓去皮　天麻酒浸　乾山藥　覆盆子

人參　木瓜　秦艽各一兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三四十丸用溫酒下鹽湯米飲亦得

老奴丸

一名蒼龍丸此方成都府崔磨去無子欲服此藥修合未服而崔已卒有老奴七十之上腰脚疼痛曲脊而行褚氏與此藥服之其老奴語褚氏曰自服此藥深有靈驗諸病悉痊房事如少壯之人於是與褚氏通後有孕一日褚氏事顯其家母視之

切究其由得其實道打死此老奴因折其腿骨髓皆滿如金色多試有效故名老奴丸

木香五錢　燈心二錢　大蜘蛛七箇　蓽澄茄
胡桃肉另研　車前子炒　馬藺花酒浸　萆薢
牡蠣火煅　韭子　木通各一兩　全蠍去毒
山茱萸去核　破故紙酒浸　桑螵蛸酒浸
龍骨各一兩半　母丁香　紫梢花　蛇牀子
肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒蒸　白茯苓去皮
仙靈脾　八角茴香　巴戟去心　遠志去心
當歸各二兩　沉香七錢　乾漆炒去烟三兩
熟地黃五兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下七日見效無婦人者勿服此藥專興陽事如善解者飲凉水三口年高氣衰虛耗風濕腰腳疼痛並宜服之此藥最靈驗添精補腎傷去冷除風濕扶經更起陽老成好修合祕密莫傳揚假之保元氣延壽得安康一方無桑螵蛸當歸沉香

延生護寶丹

補元氣壯筋骨固精健陽通和血脉潤澤肌膚延年益壽

菟絲子酒浸透蒸熟碾作餅曬乾碾末三兩

肉蓯蓉酒浸切焙　晚蠶蛾酥少許慢火炒

家韭子四兩水淘淨用棗二兩同煮棗熟去棗水淘淨控乾再用酒浸一宿火炒軟各淨秤二兩

胡盧巴微炒　蓮實去皮炒熟　桑螵蛸炒香

蛇牀子水淘淨用棗三兩同煮棗熟去棗焙乾

白龍骨各淨秤一兩　乾蓮花蕊　乳香另研

鹿茸去毛酥炙　丁香　木香各半兩　麝香二錢

右除乳香麝香菟絲子末外一十二味同爲細末將前菟絲子末用浸藥酒二升文武火熬至一半入蕎麥麪一兩酒調勻下膏子內攪勻次下乳香麝香不住手攪勻輕沸熬如稠糊放冷此膏子都要用盡恐硬入酒少許與前藥末和成劑杵千餘下丸如梧桐子大每服三十丸早空心用溫酒入炒鹽少許送靜坐少時想藥至丹田以意加減丸

數如陽道衰精滑者空心臨臥各進一服

膃肭臍丸

治證同前

膃肭臍一對　鹿角膠　鹿角霜　鹿茸各二兩

熟地黃　胡盧巴　菟絲子酒蒸　巴戟去心

鍾乳粉研　乳香研　牛膝酒浸　肉蓯蓉酒浸

當歸　小茴香炒　天雄去皮　附子各一兩

沉香半兩　朱砂二錢研　麝香一錢研

右先將膃肭臍酒浸一宿煮爛搗成膏將浸藥酒化麋鹿膠霜同爲膏次下另研乳香麝香朱砂乳粉末其餘藥修製了亦研爲細末再於乳鉢內同研千百下別用羊白腰子三對羊白脊髓五條酒煮熟爛研爲膏同膃肭臍麋鹿角膠搜拌藥末成劑得所若稍乾入酒糊些少同搜和入臼內搗三五千杵丸如梧桐子大窨一宿慢火上焙乾用無油罐子盛用厚紙密封罐口每服三十丸加至五七十丸空心用溫酒送下

椒紅丸

壯筋骨益血脈悅顏色

蜀椒去目竝合口者炒出汗三兩　牛膝去苗酒浸三宿洗淨曬乾四兩　石斛去根　巴戟去心　吳茱萸湯泡焙乾　硫黃細末水飛　桂去粗皮　木香各一兩　附子炮去皮臍　菟絲子酒蒸曬　蓯蓉酒浸去皺皮炙　磁石火燒酢淬細研水飛　鹿茸去皮酥炙各二兩　生地黃五兩取汁熬爲膏

右爲細末入別研藥和勻煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用鹽湯送下

補骨脂丸

煖下元壯筋骨久服令人强健悅澤顏色

補骨脂五兩微炒香搗爲細末　白蜜四兩

胡桃肉二兩研如泥

右將蜜胡桃肉同熬如稀餳後入補骨脂末和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下一方煉蜜和勻如飴盛磁器中旦日以溫酒化服一匙熟水亦得久服延年益氣忌芸薹羊血

地仙丸

治風氣補元陽活血脉壯筋骨潤肌膚聰耳目延壽算駐容顏久服則身輕

黃芪剉炒　天南星炮　羌活去蘆　蘹香子炒
地龍去土　骨碎補炒　防風去叉　赤小豆
狗脊去毛　白蒺藜炒　烏藥去木　白附子炮
附子炮去皮臍　萆薢各半兩　牛膝酒浸切焙
肉蓯蓉酒浸切焙　何首烏去皮　覆盆子去蔕
蜀椒去目并合口者炒出汗各一兩　木鼈子三分

右爲細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯或茶酒任下

肉蓯蓉丸

久服駐容顏烏髭髮益精神生氣血

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾　菟絲子酒浸三日暴乾別碾爲末各二兩　熟地黃　鍾乳粉
天雄炮去皮臍　五味子　桂心　人參去蘆
乾薑炮　白朮　遠志去心　杜仲去粗皮炙黃
巴戟去心　牛膝去苗　山茱萸去核　覆盆子
川椒去目并合口者炒出汗各一兩　炙草半兩

天門冬一兩半去心焙

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下

何首烏丸

治男子元臟虛損髮白再黑塡精補髓

何首烏半斤　肉蓯蓉六兩　牛膝四兩

右將何首烏用棗一層何首烏甑內蒸棗軟用竹刀切焙同爲末用棗肉和丸如梧桐子大每服五七丸嚼馬藺子服酒下食前一服漸加一丸日三服至四十九丸卽止却減丸數服其效如神

神仙一井金丹

補益眞元大強腰腳久服髭鬢不白牙齒牢固進美飲食聰明耳目行步輕健

牛膝酒浸三日　川椒去目并閉口者炒出汗

白附子　黑附子炮去皮　木鼈子煨去殼

肉蓯蓉酒浸三日　何首烏水三椀黑豆半椀同煑熟去豆各三兩　烏藥二兩　羌活炒　南星炮

狗脊炙去毛　舶上茴香　萆薢黑豆同煑去豆

地龍去土炒　防風去蘆　骨碎補去毛炒
赤小豆　白蒺藜炒去刺　黃芪蜜炙　五味炒
覆盆子炒　青鹽火炮　全蠍各一兩

右爲細末用無灰酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸煎五味子湯送下空心日午各一服此藥大有功效服至百日逢火日摘白爲黑一方減川椒白附子木鼈子黑附子何首烏俱減一兩每服二十丸五味子泡湯下其他方五味子煎酒下一方黑豆半椀水二椀同羌活萆薢何首烏一處煮豆熟爲度去豆不用只用三味藥一方萆薢黑豆同何首烏一處煮

神仙巨勝子丸

安魂定魄改易容顏通神仙延壽命添髓駐精補虛益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目視有光心力無倦行步如飛寒暑不侵能除百病

巨勝子焙二兩　生地　熟地　何首烏各四兩
枸杞子　菟絲子　五味子　棗仁　破故紙炒
柏子仁　覆盆子　鷄頭實　廣木香　蓮花蕊

巴戟天去心　肉蓯蓉酒浸三日　牛膝酒浸
天門冬酒浸　韭子　官桂　人參　茯苓去皮
楮實子　天雄炮去皮臍　蓮肉　川續斷
山藥各一兩

右爲細末春夏煉蜜爲丸秋冬蒸棗肉入胡桃肉十箇搗如泥同藥末和更搗千餘杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下鹽湯亦可日二如久服去天雄用鹿茸亦得此藥耳聾復聰眼昏再明服一月元臟強勝六十日髮白變黑一百日容顏改變目明可黑處穿鍼冬月單衣不寒若將白鷄用藥拌飯喂六十日則變爲黑鷄矣

保命延齡丸

安神養氣補塡骨髓起弱扶衰潤澤肌膚聰明耳目久服烏髭髮固牙齒能夜讀細字心力不倦

巨勝子　補骨脂酒浸焙　酸棗仁　甘菊花
柏子仁去殼另研　肉蓯蓉酒浸焙　楮實子
天雄炮去皮尖　枸杞子　天冬去心　五味子
牛膝酒焙　覆盆子　白茯苓去皮　巴戟去心

人參　菟絲子酒浸一宿杵作餅焙乾入藥同研
山藥各一兩　生乾地黃半斤細切新瓦上焙乾
肉桂去粗皮四兩

右爲細末春夏白沙蜜秋冬蒸棗肉入胡桃肉十枚去皮同藥末於臼內搗千餘杵丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸空心用溫酒送下

容顏不老方

一斤生薑半斤棗二兩白鹽三兩草丁香沉香各半兩四兩茴香一處搗煎也好點也好修合此藥勝如寶每日清晨飲一杯一世容顏長不老

枸杞煎

去萬病通神明安五臟延年駐顏

枸杞子汁　生地黃汁各三升　麥門冬汁五升
杏仁去皮尖研如膏一升　人參爲末三兩
白茯苓去皮爲末二兩

右以銀鍋內慢火先熬前四味如稀餳後入人參茯苓末待煎候如膏以磁器盛之每服半匙空心溫酒化服日二

二精丸

助氣固精保鎮丹田活血駐顏長生不老

黃精去皮　枸杞子各二斤

右各於八九月間採取用清水浸黃精令淨細剉與枸杞子相和杵碎拌勻陰乾再搗爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒下

寇相大朝湯

衝冒霧氣春天不可無此空心進餌

沉香　木香　人參　肉豆蔻　茴香　草豆蔻

華澄茄　甘草各等分

右爲細末以沸湯入鹽少許點服一二錢不拘時

仝鹿丸（祕方下同）

此藥能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述製一料服之延年一紀其法四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製四年則每人爲一仝鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不存矣

中鹿一隻不拘牝牡縛死去毛肚雜洗淨聽用

鹿肉煮熟橫切片焙乾爲末　皮同雜入元湯煮膏

和藥末爲丸　骨用酥炙爲末和肉末藥末一處和膠搗不成丸加煉蜜　人參　黃芪　白朮　茯苓　當歸　川芎　生地黃　熟地黃　陳皮　天門冬　麥門冬　炙甘草　破故紙　續斷　杜仲　牛膝　枸杞子　巴戟天　胡盧巴　乾山藥　芡實子　菟絲子　覆盆子　五味子　楮實子　瑣陽　肉蓯蓉　秋石各一斤　川椒　小茴香　青鹽　沉香各半斤

右各精製爲末各秤分兩和勻一處候肉并膠成就和爲丸梧桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每條約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋黴伏天須要火烘一二次爲玅每服八九十丸空心臨臥時薑湯鹽湯沸湯任下冬月溫酒送下壯筋骨暢經絡養精元益神氣久服行步如飛延年益嗣有通仙之玅

御米酒

眞薏苡米酒一百斤　霜茄根切片　五加皮切　桑寄生剉　蒼耳子炒去刺各半斤　枸杞子淨

牛膝去蘆各一斤

右各製淨秤分兩每味分四分四罈各入藥煮三炷香取放土地上退火性一七可飲久窨尤佳早晚隨量飲微醺爲度

斑龍二至百補丸

能固本保元生精養血培復天眞大補虛損益五內而除骨蒸壯元陽而多子嗣充血脉強筋骸美顏色增齡算聰明耳目黑潤髭鬚眞王道奇方

鹿角五十兩爲則新取連腦骨者佳鋸作二寸長段長流水洗米泔浸一宿刷洗淨曬乾同後藥和入磁罈煮膠　黃精八兩　甘枸杞子　乾熟地黃

菟絲子熱水淘淨　金櫻子去毛子淨各四兩

天門冬去心　麥門冬去心　川牛膝酒洗

楮實子熱水洗各二兩　龍眼肉一兩

十味同鹿角和勻入淨罈內層層放實用新汲淡水注罈中平肩以密梭布四層封口以新磚壓之置大鍋中井字架上以木甑蓋好重湯煮三日夜毋得間斷火候旁用小鍋燒滾水不時添注罈內

幷鍋內勿使乾涸日足取起濾去滓將汁用羅底絹絞出入淨砂鍋內文武火熬成膏約一斤半再煉蜜二斤滴水成珠攙入調和後項藥杵爛爲丸

鹿角霜十兩　人參五兩　黃芪蜜炒　鷄頭粉

白茯苓去皮　山藥炒　山茱萸肉鹽水洗過

生地黃酒洗飯上蒸過　知母鹽水炒各四兩

五味子一兩去梗

夏月加川黃蘗四兩炒褐色已上十味爲細末用前膏和勻成塊石臼木杵杵千餘下爲丸如梧桐子大空心淡鹽湯送下八十丸隨用煑過蓮子肉或曬乾棗數枚以壓之俾納丹田也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十二卷目錄

醫部彙考三百三十二

頤養補益門三

單方
鍼灸
導引

藝術典第三百五十二卷

醫部彙考三百三十二

頤養補益門三

單方

服茯苓法茯苓自是神仙上藥但其中有赤筋脉若不能去服久不利人眼或使人眼小當削去皮切爲方寸塊銀石器中清水煑以酥軟解散爲度入細布袋中以冷水揉搜如作葛粉狀澄取粉而筋脉留袋中棄去不用用其粉以蜜和如濕香狀蒸過食之尤

佳純黑脂麻九蒸九暴入水爛研濾取白汁銀石器中熬如作杏酪湯更入去皮核爛研棗肉與茯苓粉一處攪和食之尤奇（東坡下同）

服地黃法肥嫩地黃一二寸截去薄紙裹兩頭以生豬腦塗其膚周匝置小槃中掛通風處十餘日自乾抖擻之出細黃粉其膚獨一一如鵝管狀其粉沸湯點或謂之金粉湯

時雨降多置器廣庭中所得甘滑不可名以潑茶煑藥皆美而有益正爾食之不輟可以長生其次井泉甘冷者皆良藥也乾以九二化坤之六二爲坎故天一爲水吾聞之道士人能服井華其效與石硫黃鍾乳等非其人亦能發背腦爲疽蓋嘗觀之又分至日取井水儲之有方後七日輒生物如雲母狀道士謂水中金可養鍊爲丹此固嘗見之者此至淺近獨不能爲兄所謂元者乎

服松脂法松脂以眞定者爲良細布袋盛清水爲沸湯煑浮水面者以新罛籬掠取置新水中久煑不出者皆棄不用入生白茯苓末不製但削去皮搗羅拌

勻每日早取三錢匕著口中用少熟水攪漱仍以脂如常法揩齒畢更啜少熟水嗽之仍漱吐如法能牢齒駐顏烏髭也

煉梟耳霜法梟耳并根苗葉實皆濯去塵土懸陰淨灑掃地上燒爲灰澄淋取濃汁泥連二竈煉之俟灰汁耗卽旋取旁釜中已梟灰汁益之經一日夜不絕火乃漸得霜乾瓷瓶盛每服早晚臨睡酒調一錢匕補暖去風駐顏不可備言尤治皮膚風令人膚華滑淨每淨面及浴取少許如澡豆用尤佳無所忌蘇昌

圖之父從諫宜州文學家居於邕服此十餘年年八十七紅潤輕健蓋專得此藥力也

服生薑法予昔監郡錢塘游淨慈寺衆中有僧號聰藥王年八十餘顏如渥丹目光烱然問其所能蓋診脈知吉凶如智緣者自言服生薑四十年故不老云薑能健脾溫腎活血益氣其法取生薑之無筋滓者然不用子薑錯之并皮裂取汁貯器中久之澄去上黃而清者其取下白而濃者陰乾刮取如麵謂之薑乳以蒸餅或飦搜和丸如梧子以酒或鹽米湯吞數

十粒或取末置酒食茶飲中食之皆可聽云山僧孤貧無力治此正爾和皮嚼爛以溫水嚥之耳初固辣稍久則否今但覺甘美而已

服雲母法上白雲母二十斤薄擘以露水八斗作湯分半淘洗二次又二斗作湯納芒硝十斤木器中漬二十日取出絹袋盛懸屋上勿見風日令燥以鹿皮爲囊揉之從旦至午篩査復揉得好粉五斗餘者棄之以粉一斗納崖蜜二斤攪糊入竹筒內薄削封口漆固埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三十日出之當成水若洞洞不消更埋三十日此水能治萬病及勞氣風疼每以溫水一合和服之日三服十日小便當變黃二十日腹中寒澼消五十日齲齒更生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙（千金）

雷斅曰凡使雲母黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須光瑩如冰色者爲上每一斤用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷堝中安置下天池水三鎰著火煎

七日夜水火勿令失度雲母自然成碧玉漿在堝底却以天池水猛投其中攪之浮如蝸涎者卽去之如此三度淘淨取沉香一兩搗作末以天池水煎沉香湯二升以水分爲三度再淘雲母漿了日曬任用抱朴子曰服五雲之法或以桂葱水玉化之爲水或以露於磁器中以原水熬之爲水或以消石合於筒中埋之爲水或以蜜搜爲酪或以秋露漬之百日韋囊挺以爲粉或以無顚草樗血合餌之服至一年百病除三年反老成童五年役使鬼神

鍊雲母粉法八九月間取雲母以礬石拌入瓦罐內封口二伏時則自柔軟去礬次日取百草頭上露水浸之百日韋囊挺以爲粉時珍曰道書言鹽湯煮雲母可爲粉又云雲母一斤鹽一斗漬之銅器中蒸一日臼中搗成粉又云雲母一斤白鹽一升同搗細入重布袋挼之令鹽味盡懸高處風乾自然成粉（胡演）

服白石英法白石英一斤打成豆大於砂盆中和粗砂著水挼二三千下洗淨又挼仍安柳箕中入蒿葉少許同水熟挼至光淨卽以綿袋盛懸門上每日未

梳前以水或酒吞七粒用飯二匙壓下小腹一切穢惡白酒牛肉石家所忌者皆不忌久則新石推出陳石石常在小腹內溫暖則氣息調和經脉通達腰腎堅强百病自除石若得力一斤即止若不得力十斤亦須服此物光滑既無浮碎著人腸胃作瘡又無石氣發作諸病也

又法澤州白石英光淨無點瞖者打小豆大去細者水淘淨袋盛懸罐內清水五大升煑汁一升澄清平旦服以汁煑粥更佳服後飲酒二三盃可行百步一袋可用二十度如無力以布裹埋南牆下三尺土內百日又堪用也

三皇眞人鍊丹方丹砂一斤研末重篩以醇酒沃之如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦女見燥則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃曝之三百日當紫色齋戒沐浴七日靜室飯丸梧子大常以平旦向日吞三丸一月三蟲出半年諸病瘥一年鬚髮黑三年神人至（太上元變經下同）

小丹服法雄黃柏子仁各二斤松脂煉過十斤合搗

爲丸每旦北向服五丸百日後狗魂制魄與神人交見

小神丹方眞丹末三斤白蜜六斤攪合日曝至可丸丸麻子大每旦服十丸一年白髮反黑齒落更生身體潤澤老翁成少（抱朴子下同）

服脂麻法上黨胡麻三斗淘淨甑蒸令氣遍日乾以水淘去沫再蒸如此九度以湯脫去皮簸淨炒香爲末白蜜或棗膏丸彈子大每溫酒化下一丸日三服忌毒魚狗肉生萊菔至百日能除一切痼疾一年身面光澤不饑二年白髮返黑三年齒落更生四年水火不能害五年行及奔馬久服長生若欲下之飮葵菜汁一方爲末未食前水或酒服方寸匕日二

服黃精法黃精根莖不限多少細剉用流水掉去苦汁九蒸九曝食之或陰乾擣末每日水調服任多少忌食梅實一年內變老爲少久久成地仙（聖惠方）

臞仙神隱者以黃精細切一石用水二石五斗煑之自旦至夕候冷以手挼碎布袋榨取汁煎之查乾爲末同入釜中煎至可丸丸如雞子大每服一丸日三

丸服之絕糧輕身除百病渴則飲水

服萎蕤法二月九月采萎蕤根切碎一石以水二石煑之從旦至夕以手挼爛布囊榨取汁熬稠其滓曬爲末同熬至可丸丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脈强筋骨治中風濕毒去面皺顏色久服延年

服菟絲法取實一斗酒一斗浸暴乾再浸又暴令酒盡乃止搗篩每酒服二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也（抱朴子）

服五味子法五六月宜常服五味子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其法以五味子一大合木臼搗細磁瓶中以百沸湯投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲

養血返精丸破故紙炒二兩白茯苓一兩爲末没藥五錢以無灰酒浸高一指煑化和末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至老不衰蓋破故紙補腎茯苓補心没藥養血三者旣壯自然身安（集驗方）

服甘菊法王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名曰長生四味並陰乾百日等分以成日合擣千杵爲末每酒服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之三年齒落再生五年八十老人變爲兒童也孟詵云正月采葉五月五日采莖九月九日采花（玉函方）

服食白菊太清靈寶方九月九日白菊花二斤茯苓一斤並擣羅爲末每服二錢溫酒調下日三服或合白朮丸散任意或以鍊過松脂和丸雞子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老

服地黃法地黃根淨洗擣絞汁煎令稠入白蜜更煎令可丸丸如梧子大每晨溫酒送下三十丸日三服亦可以青州棗和丸或別以乾地黃末入膏丸服亦可百日面如桃花三年身輕不老十年白髮更黑力如二十時令人多子神效無比夜視有光

麥門冬煎補中益心悅顏色安神益氣令人肥健取

新麥門冬根去心搗熟絞汁和白蜜銀器中重湯煑不停手攪候如飴乃成溫酒日日化服之

服蒺藜法蒺藜一石七八月熟時收取日乾舂去刺杵爲末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落更生服之三年身輕長生（神仙祕旨）

服天門冬法孫眞人枕中記云八九月采天門冬根暴乾爲末每服方寸匕日三服一云日可至十服無問山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損

偏枯不隨風濕不仁冷痹惡瘡癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出釀酒服去癥病積聚風痰顛狂三蟲伏尸除濕痹輕身益氣令人不饑百日延年耐老釀酒初服微酸久貯則香美諸酒不及也忌鯉魚

何首烏丸專壯筋骨長精髓補血氣久服黑鬚髮堅陽道令人多子輕身延年月計不足歲計有餘何首烏五斤銅刀切片乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪藥一層重重鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出去豆暴乾換豆又

蒸如此三次爲末蒸棗肉和丸梧子大每服三五十丸空心溫酒下忌葱蒜蘿蔔無鱗魚勿犯鐵器

又方用赤白何首烏各半極大者八月采以竹刀削去皮切片用米泔浸一宿曬乾以壯婦男兒乳汁拌曬三度候乾木臼舂爲末以密雲棗肉和杵爲丸如梧子大每服二十丸每十日加十丸至百日止空心溫酒鹽湯任下

服菖蒲法采緊小似魚鱗者一斤以水及米泔浸各一宿刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜和丸如梧子大稀葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨臥更服三十丸服至一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑齒落更生

又法用華山挺子茯苓削如棗大方塊安新甕內好酒浸之重紙封百日乃開其色當如餳糖可日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久腸化爲筋延年耐老面若童顏（經驗後方）

又方茯苓十斤去皮酒浸密封下五十日出之取服如博碁大日三亦可屑服方寸匕凡餌茯苓皆湯煮

四五沸或以水漬六七日

用茯苓松脂各二斤醇酒浸之和以白蜜日三服之久久通靈（嵩高記）

服食山藥法益顏色補下焦虛冷小便頻數瘦損無力用薯蕷於沙盆中研細入銚中以酒一大匙熬令香旋添酒一琖攪令勻空心飲之每旦一服（聖惠方）

服柏實法八月連房取實暴收去殼研末每服二錢溫酒下一日三服渴卽飲水令人悅澤 一方加松子仁等分以松脂和丸 一方加菊花等分蜜丸服

又方嘗以三月四日采新生松葉長三四寸許幷花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長二三寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以日未出時燒香東向平持八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣滋五臟六腑清明耳目强壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍祝曰神仙眞藥體合自然服藥入腹天地同年祝畢服藥斷諸雜肉五辛（枕中記）

又方五月五日采五方側柏葉三斤遠志去心二斤白茯苓去皮一斤爲末煉蜜和丸梧子大每以仙靈脾酒下三十丸日再服並無所忌勿示非人

服食法百煉松脂治下篩蜜和納角中勿見風日每服一兩一日三服服至百日耐寒暑二百日五臟補益五年即見西王母

又方松脂十斤鍊之五度令苦味盡每一斤入茯苓四兩每旦水服一刀圭能令不食而復延齡身輕清爽

服胡桃法凡服胡桃不得併食須漸漸食之初日服一顆每五日加一顆至二十顆止周而復始常服令人能食骨肉細膩光潤鬚髮黑澤血脉通潤養一切老病

服松子法七月取松實過時即落難收也去木皮搗如膏收之每服雞子大酒調下日三服一云服方寸匕一云一服三合百日身輕三百日日行五百里絕穀久服神仙渴即飲水亦可以煉過松脂同服之若丸如梧桐子大服十丸（聖惠方）

服蓮肉法石蓮肉蒸熟去心爲末煉蜜丸梧子大日服三十丸此仙家方也

清心寧神用蓮蓬中乾石蓮子肉於砂盆中擦去赤皮留心同爲末入龍眼點湯服之

服鹿角法鹿角屑十兩生附子三兩去皮臍爲末每服二錢空心溫酒下令人少睡益氣力通神明（彭祖方）

補益虛羸鹿骨煎用鹿骨一具枸杞根二升各以水一斗煎汁五升和勻共煎五升日二服（千金方）

補益虛寒用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉包之外用荷葉裹定於一石米下蒸熟取出去石英和葱薑作小餛飩子每日空腹以冷漿水吞一百枚甚補益（千金翼）

斬三尸法常以庚辰日去手爪甲午日去足爪每年七月十六日將爪甲燒灰和水服之三尸九蟲皆滅名曰斬三尸（太上元科）

又方甲寅日三尸遊兩手剪去手爪甲甲午日三尸遊兩足剪去足爪甲

陰陽二煉丹世之煉秋石者但得火煉一法此藥須

兼陰陽二煉方爲至藥火煉乃陽中之陰得火而凝入水則釋歸於無體蓋質去味存此離中之虛也水煉乃陰中之陽得水而凝遇曝而潤千歲不變味去質留此坎中之實也二物皆出於心腎二臟而流於小腸水火騰蛇元武正氣外假天地之水火凝而爲體服還補太陽相火二臟上爲養命之本空心服陽煉日午服陰煉此法極省力與常法功用不侔久疾服之皆愈有人得瘦疾且嗽諸方不效服此即瘳有人病顛腹鼓日久加喘滿垂困亦服此而安也陽煉法用人尿十餘石各用桶盛每石入皂莢汁一椀竹杖即攪百千下候澄去清留垽併作一桶如前攪撥澄取濃汁一二斗濾淨入鍋熬乾刮下搗細再以清湯煮化用箕鋪紙淋過再熬如此數次直待色白如雪方止用沙盒固濟火煅成質傾出如藥未成更煅一二次候色如瑩玉細研入沙盒內固濟微火養十晝夜取出於土上去火毒爲末棗膏丸梧桐子大每空心溫酒下三十丸其陰煉法用人尿四五石以水缸盛入新水一半攪千回澄定去清留查又入新水

攪澄直候無臭氣澄下如膩粉方以曝乾刮下再研以男兒乳和如膏烈日曬乾蓋假太陽眞氣也如此九度爲末棗膏和丸梧子大每午後溫酒下三十丸（水雲錄）

秋冰乳粉丸固元陽壯筋骨延年不老却百病用秋冰五錢頭生男乳曬粉五錢頭生女乳曬粉五錢乳香二錢五分麝香一分爲末煉蜜丸芡子大金箔爲衣烏金紙包黃蠟匱收勿令洩氣每月用乳汁化服一丸仍日飲乳汁助之

秋水法用童男童女尿洷各一桶入大鍋內桑柴火熬乾刮下入河水一桶攪化隔紙淋過復熬刮下再以水淋鍊之如此七次其色如霜或有一斤入罐內上用鐵燈盞蓋定鹽泥固濟升打三炷香看秋石色如玉再研再如前升起燈盞上用水徐徐擦之不可多多則不結不可少少則不升自辰至未退火冷定其盞上升起者爲秋冰味淡而香乃秋石之精英也服之滋腎水固元陽降痰火其不升者卽尋常秋石也味鹹苦蘸肉食之亦有小補（經驗方）

吳眞君服椒方椒性稟五行其葉青其皮赤其華黃其膜白其實黑煖丹府通血脈助元氣消酒食辟瘟毒祛邪氣安五臟調三焦而熱不上蒸芳草之中功皆莫及每川椒一斤揀去浮及合口者幷目銀器內炒令透地上鋪紙兩重傾在紙上用新盆合定周圍以黃土培半日許其毒成汗自出曬乾木臼內輕搗取紅皮四五兩再入鐵臼杵爲末以煉蜜爲丸如梧桐子大候乾紗袋盛掛通風處每日空心酒下十丸至十五丸半年加至二十丸一年後加至二十五丸百無所忌

人乳汁補五臟益年令人肥白悅澤取甘香乳汁入銀器內頓滾五更時熱服每一吸即以指塞鼻孔按唇貼齒而漱乳與口津相合然後以鼻引上吸使氣由明堂入腦方可徐徐嚥下凡五七次爲一度久服甚佳歌曰仙家酒仙家酒兩個壺盧盛一斗五行釀出眞醍醐不離人間處處有丹田若是乾涸時嚥下重樓潤枯朽淸晨能飲一升餘返老還童天地久

枸杞酒方枸杞根一百二十斤切以東流水四石煮

一日一夜取清汁一石清麴一如家醞法熟取清貯不津器中內乾地黃末二升半桂心乾薑澤瀉蜀椒末各一升商陸末二升以絹袋貯內酒底緊塞口埋入地三尺堅覆上三七日沐浴整衣冠再拜平曉向甲寅地日出時開之其酒赤如金色且空腹服半升十日萬病皆愈三十日瘢痕滅惡疾去

服食松葉細切更研每日食前以酒調下二錢亦可煑汁作粥食初服稍難久則自便矣令人不老輕身益氣久服不已絕穀不饑渴

餌茯苓法用白茯苓三斤細剉以絹袋盛之懸於甕中用小麥細麪七斤糯米五斗炊爲爛飯和麴末經宿入蜜一升和令勻入甕中又經一宿炊糯米二斗投之不得令熱入水六石即封其甕口春秋三七日冬五七日夏一日當出其藥袋可隔宿不食清旦取茯苓半斤服之其酒即旋旋飲之勿令勝藥若服此藥多時者永不饑渴無寒無熱身如碧玉令人身輕走如奔馬與天地相畢矣其藥袋懸於空中勿令著甕底繩繫袋頭取木橫柂之仍以紙密封旋取服之

勿令泄氣忌食米酢

葡萄酒駐顏色煖腰腎乾葡萄一斤末細麴五斤末糯米五斗炊糯米熟候冷入麪并葡萄末水三斗攪令勻入甕蓋覆候熟卽時飲一盞不拘時

甘菊花輕身耐老延年苗葉花根皆可服陰乾擣末酒調服或蜜丸久服（本草）

菊花酒壯筋骨補髓延年益壽耐老甘菊花生地黃枸杞根皮各五升水一石煮取五斗糯米五斗炊熟細麴和勻入甕候熟澄酒溫服白菊尤佳（入門下同）

天門冬酒天門冬根擣絞汁二斗糯米飯二斗拌細麴如常釀法候熟取清飲乾者作末釀之亦可忌食鯉魚

逡巡酒補氣血虛去一切風痹濕氣久服益壽耐老好顏色造法三月三日收桃花三兩三錢五月五日收馬藺花五兩五錢六月六日收芝麻花六兩六錢九月九日收黃甘菊花九兩九錢陰乾十二月八日取臘水三斗待春分取桃仁四十九枚好者去皮尖白麪十斤正同前花和作麴紙包四十九日用時白

水一瓶麴一丸麪二塊封良久成矣如淡則再加一丸

地黃酒補虛弱壯筋骨通血脉治腹痛變白髮用生地絞汁同麴末封密器中五七日啓之中有綠汁眞精英也宜先飲之乃濾汁藏貯加牛膝汁效更速亦有加羣藥者

牛膝酒壯筋骨治痿痹補虛損除久瘧用牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮服

當歸酒和血脉堅筋骨止諸痛調經水當歸煎汁或釀或浸並如上法

人參酒補中益氣通治諸虛用人參末同麴米釀酒或袋盛浸酒煑飲

黃精酒壯筋骨益精髓變白髮治百病用黃精蒼朮各四斤枸杞根柏葉各五斤天門冬三斤煑汁一石同麴十斤糯米一石如常釀酒飲

戊戌酒大補元陽其性大熱陰虛無冷病人不宜飲之用黃狗肉一隻煑糜連汁和麴米釀酒飲之

羊肉酒大補元氣健脾胃益腰腎宣和化成殿眞方

用米一石如常浸漿嫩肥羊肉七斤麴十四兩杏仁一斤同煑爛連汁拌入末入木香一兩同釀勿犯水十日熟極甘滑

又法羊肉五斤蒸爛酒浸一宿入消梨七個同擣取汁和麴米釀酒飲之

膃肭臍酒助陽氣益精髓破癥結冷氣大補益人膃肭臍酒浸擂爛同麴米如常釀酒飲之

延壽酒黃精蒼朮各四斤天門冬三斤松葉六斤枸杞五斤水三碩煑一日熬如釀酒法空心服之（中藏經）

固本酒治勞補虛益壽延年烏鬚髮美容顏生乾地黃熟地黃天門冬麥門冬並去心白茯苓人參各一兩右剉用磁缸盛好酒十壺浸藥三日文武火煑一二時以酒黑色爲度空心服三五盃（衞生方）

烏鬚酒治同上黃米三斗麥門冬八兩生地黃何首烏各四兩天門冬熟地黃枸杞子牛膝當歸各二兩人參一兩右爲末入好麴拌飯如常釀法待酒熟榨出取清每日清晨飲一二盃微醺爲度忌白酒蘿蔔葱蒜牛肉黃米卽粘黍米色黃（回春）

長松酒滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒中聖藥也熟地黃八錢生地黃黃芪蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔製半夏製天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香川椒核桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之糯米五升造酒一尊煮一袋窨久乃飲（醫通）

蓮子粥補中強志聰耳明目用蓮實半兩去皮心研末水煮熟以粳米三合作粥入末攪勻食（聖惠）

芡仁粥粳米一合雞頭實末二合煮粥空心服之補益精氣聰利耳目能駐年（本草）

巨勝子粥治五臟虛損益氣力堅筋骨用巨勝九蒸九暴收貯每服二合湯浸布裹挼去皮再用水濾汁煎飲和粳米煮粥食之

稷米粥補中益氣羊肉一脚熬湯入河西稷米葱鹽煮粥食之（飲膳正要）

白粥凡晨起食粥利膈養胃生津液令一日清爽所

補不小晚粳米濃煑令爛食之（入門）

海松子粥久服輕身延年不饑不老（本草下同）

菱實粉粥益腸胃解內熱

栗子粥補腎氣益腰脚

莙蓬菜粥健胃益脾

韭菜粥溫中暖下

茯苓粉粥淸上實下

松子仁粥潤心肺調大腸

酸棗仁粥治煩熱益膽氣

枸杞子粥補精血益腎氣

猪腎粥羊腎粥鹿腎粥並補腎虛

羊肝粥鷄肝粥並補肝虛明目

酥蜜粥養心肺

鹿角膠入粥食助元陽治諸虛

（臞仙）

地黃粥大能利血生精地黃切二合與米同入罐中煑之候熟以酥二合蜜一合同炒香入內再煑熟食

靑芝明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年

神仙（本經下同）

赤芝益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙

黃芝益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙

白芝益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙

紫芝利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年

鍼灸

醫學入門曰夫人之臍也受生之初父精母血相授凝結胞胎混沌從太極未分之時一氣分得二穴穴中如產四穴外通二腎內長赤白二脈四穴之中分爲表裏在母腹中母呼兒呼母吸兒吸是一身臍蔕如花果在枝而通蔕也一月一周眞氣漸足既產胎衣未脫臍帶且緩斷倘臍門未閉感風傷寒卽損嬰兒眞氣遂以艾火熏蒸數次則眞氣無患矣三七臍門自閉惟覺口深於是陽盛年長汨於五味溺於五

音探於五氣外耗精神內傷生冷而眞氣不得條暢所以立法蒸臍固蔕如水灌土培草木根本自壯茂也人常依法熏蒸則榮衞調和安魂定魄寒暑不侵身體可健其中有神妙也夫肺爲五臟之華蓋聲音所從生者皮毛賴之而滋潤腎水由之而生養腠理不密外感內傷乘之令人欬嗽外感發散內傷滋潤又有鬱結則當解之或傷辛燥之藥或未發散而遂使鬱遏之劑則氣不散而滯於肺中多生粘痰而作喘急欬嗽或傷房勞飲食致使吐血乍寒乍熱耳目昏昏身體倦怠拘急胷滿煩悶飲食少思精神怯弱等疾作矣醫者可急用保眞丸化痰丸等劑療之倘用之無效必須依法熏臍今將此方藥料開具於後名曰彭祖壯陽固蔕長生延壽丹其法用麝香五分引諸藥入五臟六腑周徹百節丁香三錢入肺補血實脾胃靑鹽四錢入腎以實其子使肺母無泄漏如乳母哺子益其氣血夜明砂五錢透肺孔補氣不足散內傷有餘乳香木香各三錢小茴四錢治濕瀝之證調遣周流升降其氣不致喘欬如欲斷水先尋此

源沒藥虎骨蛇骨龍骨硃砂各五錢雄黃三錢削除病根扶弱鋤強白附子五錢循各經絡有推前拽後之功人參附子胡椒各七錢補元氣行血化痰爲津液五靈脂五錢保肺氣削有餘補不足槐皮能閉押諸藥之性使無走竄艾葉取其火勢刦病去毒起死回生右爲末另用白麪作條圈於臍上將前藥一料分爲三分內取一分先塡麝香末五分入臍眼內又將前藥一分入麪圈內按藥令緊中插數孔外用槐皮一片蓋於藥上艾火灸之無時損易壯其熱氣或自上而下自下而上一身熱透患人必倦沉如醉灸至五五六十壯遍身大汗上至泥丸宮下至湧泉穴如此則骨髓風寒暑濕五勞七傷盡皆拔除苟不汗則病未愈再於三五日後又灸灸至汗出爲度學者須用小心灸至百二十壯則疾必痊灸時要愼風寒戒油膩生冷保養一月以後愈加精神健旺若婦人灸臍去麝加韶腦一錢扁鵲明此二十味浮沉升降君臣佐使其所治勞嗽之疾無不痊愈不惟勞疾凡一年四季各熏一次元氣堅固百病不生及久嗽久喘

吐血寒勞遺精白濁陽事不舉下元極弱精神失常痰膈等疾婦人赤白帶下久無生育子宮極冷凡用此灸則百病頓除益氣延年

養老書曰有人年老而顏如童子者蓋每歲以鼠糞灸臍中一壯故也

導引

千金方曰天竺國按摩法兩手攝捉紐捩如洗手法

兩手淺相叉翻覆向胷

兩手相捉共按䏶左右同

以手如挽五石力弓左右同

兩手相重按䏶徐徐捩身左右同

作拳向前築左右同

作拳却頓此是開胷左右同

如拓石法左右同

以拳反搥背上左右同

兩手據地縮身曲脊向上三舉

兩手抱頭宛轉髀上此是抽脅

大坐斜身偏欹如排山左右同

大坐伸兩脚即以一脚向前虛掣左右同

兩手拒地廻顧此虎視法左右同

立地反拗身三舉

兩手急相叉以脚踏手中左右同

起立以脚前後虛踏左右同

大坐伸兩脚當兩手相勾所伸脚著膝中以手按之左右同

右十八勢但是老人日能依此行三遍者一月後除百病行及奔馬補益延年能食眼明輕健不復疲乏

醫學入門曰導引者保養中一事也蓋人之精神極欲靜氣欲極動但後世方士亦以此惑人爲仙術所以王褒頌曰何必偃仰屈伸若彭祖吹噓呼吸如喬松渺然絕俗離世哉認眞只是舞蹈以養血脈意其

法雖粗有益閉關守病之士蓋終日屹屹端坐最是生病人徒知久行久立之傷人而不知久臥久坐之尤傷人也故錄一二最要者以備養生者擇焉

大法導引爲虛損氣血不週而設也有火者開目無火者閉目無汗者閉氣至極有汗者不必閉氣欲氣上行以治耳目口齒之病則屈身爲之欲氣下行以通大小二便及健足脛則偃身爲之欲氣達於四肢側身爲之欲引頭病者仰頭欲引腰腳病者仰足十指欲引胷中病者挽足十指欲引臂病者掩臂欲去

腹中寒熱積聚諸痛及中寒身熱皆閉氣滿腹偃臥亦可爲之但病在頭中胷中者枕高七寸病在心下者高四寸病在臍下者去枕

開關法先以左手髀骨井肩向前圓轉九數次以右手髀骨井肩向前圓轉九次復以左右髀骨井左右肩向前圓轉九次加至一九三九亦好但要從容和緩爲之或先緩後急亦可爲之此法疏通膏肓澤心包絡火與張紫丘治瘵開關藥方意同善治少勞背痛胷緊

起髀法先靜坐存中氣後挺身以兩手相叉極力扒左扒右各七次扒左則頭向右扒右則頭向左如此者三五次靜坐良久善和脾胃進飲食兼治臂腰拘攣與開關法相續行之亦可

開鬱法其法以兩手旋舞向前向後兩足作白鷺行步狀不拘數良久復以左手搭右肩右足搭左膝腕委中而行右手搭左肩左足搭右膝腕委中而行良久復以左手向前泊腹右足搭左膝蓋而行右手向後泊腰左足搭右膝蓋而行良久以兩手極力托天兩足極力踏地復以兩手向後向下兩足十指挽起仰面偃腹使氣下行良久蹲倒以兩手極力攀起足後跟足十指點起極力低頭至膝下良久立起以兩手相交掩兩臂於胷前胛上極力搖動數次善治名利不遂鬱氣爲病心腹脹滿夜睡不寧等證無病者亦可行之如外感風寒須行至汗出爲度此法比之華氏五禽戲法更易簡正大可行

古今醫統曰攝生之要莫大乎存想存謂存我之神想謂想我之心閉目見自己之目收心見自己之心

不離我身不傷我神則存想之漸也天地虛空中皆氣人身虛空中亦皆氣故呼出濁氣身中之氣也吸入清氣天地之氣也人在氣中如魚遊水中魚腹中不得水出入則死人腹中不得氣出入亦死同其理也善攝生者必明於氣之故矣欲修調氣之術者常得蚤食閉戸安牀煖席枕高二寸許正身偃臥瞑目握固兩足間相去五寸兩臂與體相去亦各五寸先須閉氣以鼻吸入漸漸腹滿乃閉之及不可忍乃從口細細吐出不可一吐即盡氣定復如前閉之始而十息或二十息不可忍漸熟漸多但能閉至八十息以上則臟腑胷膈之間皆清氣之布濩矣至於純熟當其氣閉之時鼻中唯有短息一寸餘所閉之氣四布如火蒸潤肺宮一繞則身如委蛇神在外其快其美有不可言之狀蓋一氣流通表裏上下徹澤故也其所閉之氣漸消則恍然復舊此道以多爲功但能於日夜間得行此兩度久久耳目聰明精神完固體健身輕則百疾消滅凡調氣之初務要體安氣和無與意爭若不安且止候和乃爲之

久而弗倦則善矣閉氣如降龍伏虎須達其神理胷膈常宜虛空不可飽滿若氣有結滯不得宣流覺之便當用吐法以除之如吹噓呵嘻呬噫呼之類是也不然泉源壅遏必至逆流瘡瘍中滿之患作矣

莊子曰吹噓呼吸吐故納新熊經鳥伸爲壽而已矣此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也是知導引之術傳自上世其來久矣故曰彭祖之所好其來自修養家醫家所談不下數百今取其要約切當者十六條參之諸論大槩備矣凡行導引法常以夜半及平旦將起之時爲之此時氣淸腹虛行之益人先閉目握固冥心危坐叩齒三十六通卽以兩手抱項左右宛轉二十四此可以除脅積聚風邪復以兩手相叉虛空托天抑手按項二十四此可以除胷膈間邪氣復以兩手心掩兩耳却以第二指壓第三指彈擊腦後二十四此可除風池邪氣復以兩手相促按左膝左捩身按右膝右捩身二十四此可以去肝家風邪復以左手一向前一向後如挽五石弓狀二十四此可以去臂腋積邪復大坐展兩手紉項左

右反顧肩膊二十四此可以去脾家積邪復兩手握固並拄兩肋擺撼兩肩二十四此可以去腰肋間風邪復以兩手反搥臂及膊連腰股各二十四此可以去四肢胷臆之邪復大坐斜身偏倚兩手齊向上如托天狀二十四此可以去肺間積聚之邪復大坐伸脚以兩手向前低頭攀脚二十次却鉤所伸脚屈在膝上按摩之二十四此可以去心胞絡邪氣復以兩手據地縮身曲脊向上十三舉此可以去心肝積邪復起立據牀援身向背後視左右二十四此可以去腎間風熱邪復起立徐行兩手握固左右前蹈左手擺向前右手擺向後右足前蹈右手擺向前左手擺向後二十四此可以去兩肩俞之邪復以手向背上相捉低身徐徐宛轉二十四此可以去兩脅間之邪復以足相紐而行前進十數步後退十數步復高坐伸腿將兩足紐向內各二十四以上二條可以去兩膝及兩足間風邪行此十六節訖復端坐閉目握固冥心以舌拄上齶攪取津液滿口漱三十六次作汩汩聲嚥之復閉氣想丹田火自下而上遍燒身體內

外蒸熱乃止按老子導引二十四勢婆羅門導引十二勢赤松子導引法十八勢鍾離導引法十八勢胡見素五臟導引法十二勢在諸法中頗爲妙解然撮其切要不過於此學者能日行一二遍久久體健身輕百邪皆除走及奔馬不復疲乏矣

太上玉軸六字氣訣道藏有玉軸經言五臟六腑之氣因五味熏灼不和六欲七情積久生疾內傷臟腑外攻九竅以至百骸受病輕則痼癖甚則盲廢又重則喪亡故太上憫之以六字氣訣治五臟六腑之病其法以呼而自瀉出臟腑之毒氣以吸而自採天地之清氣當日小驗旬日大驗年後萬病不生延年益算衛生之寶非人勿傳呼有六曰呵呼呬噓嘻吹也吸則一而已呼有六者以呵字治心氣以呼字治脾氣以呬字治肺氣以噓字治肝氣以嘻字治膽氣以吹字治腎氣此六字氣訣分主五臟六腑也凡天地之氣自子至巳爲六陽時自午至亥爲六陰時如陽時則對東方勿盡閉窗戶然忌風入乃解帶正坐叩齒三十六以定神先攪口濁津漱鍊二三百下候口

中成清水即低頭向左而嚥之以意送下候汨汨至腹間即低頭開口先念呵字以吐心中毒氣念時耳不得聞呵字聲聞即氣粗反損心氣也念畢仰頭閉口以鼻徐徐吸天地之清氣以補心氣吸時耳亦不得聞吸聲聞即氣粗亦損心氣也但呵時令短吸時令長即吐少納多也吸訖即又低頭念呵字耳復不得聞呵字聲呵訖又仰頭以鼻徐徐吸清氣以補心亦不可聞吸聲如此吸者六次心之毒氣漸散又以天地之清氣補之心之元氣亦漸復矣又依此式念呼字耳亦不聞呼聲又吸以補脾耳亦不可聞吸聲如此者六所以散脾毒而補脾元也次又念呬字以瀉肺毒以吸而補肺元亦須六次念噓字以瀉肝毒以吸而補肝元嘻以瀉膽毒吸以補膽元吹以瀉腎毒吸以補腎元如此並各六次是謂小周小周者六六三十六也三十六而六氣偏臟腑之毒氣漸消病根漸除膽氣漸完矣又看是何臟腑受病如眼病即又念嘻噓二字各十八遍仍每次以吸補之總之爲三十六訖是爲中周中周者第三次三十六通爲七

十二也次又再依前呵呼呬噓嘻吹六字法各爲六次並須呼以瀉之吸以補之愈當精虔不可怠廢此第三次三十六也是爲大周卽總之爲一百單八次是謂百八訣也午時屬陰時有病卽對南方爲之南方屬火所以却陰毒也然又不若子後巳前面東之爲陽時也如早起牀上面東將六字各爲六次是爲小周亦可治眼病也凡眼中諸證惟此訣能去之他病亦然神乎神乎此太上之慈旨也略見玉軸眞經而詳則得之師授也如病重者每字作五十次凡三百而六臟周矣乃漱鍊嚥液叩齒訖復爲之又三百次訖復漱鍊嚥液叩齒如初如此者三卽通爲九百次無不愈祕之祕之非人勿傳

石室祕籙曰先春養陽法每日閉目冥心而坐心注定腎中嚥津七口送下丹田起立雙手自抱兩脅微搖者三如打恭狀起立俟氣定再坐如前法嚥津七口送下丹田永無風證之侵一月行六次可也多多更妙

先夏養陰法每日閉目冥心而坐心注定心中嚥津

十四口送下心中永無暑氣之侵

先秋養陰法每日閉目冥心而坐心注肺中嚥津送下丹田者十二口以雙手攀足心者三次候氣定再如前嚥津送下丹田者七口而後止永無燥熱之病

先冬養陽法每日五更坐起心注定兩腎口中候有津水送下丹田者三口不必漱津以手擦足心大熱而後已再送津三口至丹田再睡永無傷寒之證而長生之法亦在其中矣長夏不必更有方法

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八六二

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十三卷目錄

醫部彙考三百三十三

種子門一

黃帝素問（上古天眞論）

孫思邈千金方（房中吉日　王相日　月宿日　雜忌法）

朱震亨格致餘論（房中補益論）

徐春甫古今醫統（原始要終論　陰虛論　調經種子論）

喻昌寓意草（論服種子壯陽熱藥之悞）

萬靈至寶仙酒　青娥丸　三才丸　又
方一方　種子方　五子衍宗丸　種子方
黑豆神方　九子丸　法製蝦米　鹿茸酒
沉香旣濟丸　加味青娥丸　老奴丸　延生
護寶丹　膃肭臍丸　溫臍方　資始健乾丸
資生順坤丸　巨勝子丸　瑞效丸　還少
丹　大補陰丸　虎潛丸　加味虎潛丸　滋
陰大補丸　斑龍丸　斑龍二至丸　太極丸
補腎丸　補陰丸　沉香大補丸　人參固
本丸　三才封髓丹　固眞丹

藝術典第三百五十三卷

醫部彙考三百三十三

種子門一

黃帝素問

上古天眞論

帝曰有其年已老而有子者何也岐伯曰此其天壽過度氣脈常通而腎氣有餘也此雖有子男不過盡八八女不過盡七七而天地之精氣皆竭矣

註　天壽過度先天所秉之精氣盛也氣脈常通後

天之地道尚通也是以腎氣有餘而有子此雖有子然天地之精氣盡竭於七八之數者也

帝曰夫道者年皆百數能有子乎岐伯曰夫道者能却老而全形身年雖壽能生子也

註　惟修道者能出於天地陰陽之數也

唐孫思邈千金方

房中吉日

御女之法交會者當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動若御女則損人神不吉損男百倍令女得病有子必癲癡頑愚瘖瘂聾聵攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓尸柩之旁皆所不可夫交合如法則有福德大智善人降託胎中仍令性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之應有如影響此乃必然之理可不再思之若欲求子者但

候婦人月經絕後一日三日五日擇其王相日及月宿在貴宿日以生氣時夜半後乃施瀉有子皆男必壽而賢明高爵也以月經絕後二日四日六日施瀉有子必女過六日後勿得施瀉既不得子又不成人

王相日

春甲乙　夏丙丁　秋庚申　冬壬癸

月宿日

正月　一日　六日　九日　十日　十一日
十二日　十四日　二十一日　二十四日
二十九日
二月　四日　七日　八日　九日　十日
十二日　十四日　十九日　二十二日
二十七日
三月　一日　二日　五日　六日　七日
八日　十日　十七日　二十日　二十五日
四月　三日　五日　六日　八日　十日
十二日　十五日　十八日　二十二日
二十八日

五月　一日　二日　三日　四日　五日
六日　十二日　十五日　二十日　二十五日
二十八日　二十九日　三十日
六月　一日　三日　十日　十三日　十八日
二十三日　二十六日　二十七日　二十八日
二十九日
七月　一日　八日　十一日　十六日
二十一日　二十四日　二十五日　二十六日
二十七日　二十九日
八月　五日　八日　十日　十三日　十八日
二十一日　二十二日　二十三日　二十四日
二十五日　二十六日
九月　二日　六日　十一日　十六日
十九日　二十日　二十一日　二十二日
二十四日
十月　一日　四日　九日　十日　十四日
十七日　十八日　十九日　二十日
二十二日　二十三日　二十九日

十一月　一日　六日　十一日　十四日

十五日　十六日　十七日　十九日

二十六日　二十九日

十二月　四日　九日　十二日　十三日

十四日　十五日　十七日　二十四日

若合春甲寅乙卯夏丙午丁巳秋庚申辛酉冬壬子癸亥與此上件月宿日合者尤益

雜忌法

黃帝曰人有所怒血氣未定因以交合令人發癰疽又不可忍小便交合令人淋莖中痛面失血色及遠行疲乏之來入房五勞虛損少子且婦人月事未絕而與交合令人成病得白駁也水銀不可近陰令人消縮鹿猪二脂不可近陰令人陰痿

元朱震亨格致餘論

房中補益論

或問千金方有房中補益法可用否予應之曰傳曰吉凶悔吝生乎動故人之疾病亦生於動其動之極也病而死矣人之有生心爲火居上腎爲水居下水

能升而火能降一升一降無有窮已故生意存焉水之體靜火之體動動而易靜而難聖人於此未嘗忘言也儒者立教曰正心收心養心此所以防此火之動於妄也醫者立教恬惔虛無精神內守亦所以遏此火之動於妄也蓋相火藏於肝腎陰分君火不妄動相火惟有稟命守位而已焉有燔灼之虐焰飛走之狂勢也哉易兌取象於少女兌說也遇少男艮爲咸咸無心之感也艮止也房中之法有艮止之義焉若艮而不止徒有戕賊何補益之有竊詳千金之意彼壯年貪縱者水之體非向日之靜也故著房中之法爲補益之助此可用於質壯心靜遇敵不動之人也苟無聖賢之心神仙之骨不易爲也女法水男法火水能制火一樂於與一樂於取此自然之理也若以房中爲補殺人多矣況中古以下風俗日偷資稟日薄說夢向癡難矣哉

明徐春甫古今醫統

原始要終論

大矣哉人之有生也其陰陽造化之妙乎夫陰陽生

生不息之德其在於物則本乎乾坤其在於人則根乎精血是故雖具道體之妙而實寓修用之機自其常而觀之雖愚夫愚婦固亦可以知也自其變而言之雖智士仁人亦有所不能焉是故體則陰陽精血也用則陰陽配合也精血盈足配合中時此其常也所謂愚夫愚婦之可知者亦自然之理也精血虧欠配合不時此其變也所謂智士仁人之不能者亦顛沛之勢也夫以處其常也予固知其無待形於言矣然而當其變也豈可以弗辨哉達道君子安可不以

用變之際而加之意焉者乎是理也先哲神之而愚亦得以及其意矣請詳陳於左易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生又曰陰陽合德而剛柔有體正所謂獨陽不生獨陰不成是也蓋謂人之夫婦猶天地然天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生苟或父精母血一有不及而謂有胎孕者未之有也是故欲求子者必先審其婦之月經調否經者常也如日月應期而來按期而止無易常也故曰月經期有不調者或先或後或一月兩

至或間月一來有絕閉不通有頻來不止或先痛而後行者或先行而後痛者有黑色者有紫色者有淡色者有白帶白淫白濁者是皆血氣不調者也諸如此類必按證以藥而調治之及夫男子之病亦在所當知也其有不足者有腎虛精滑有精冷精清或臨事而不堅堅卽流而不射有盜汗夢遺有便濁淋澀有腰癈不能轉搖有好色以致陰虛有勞熱者有虛寒者是皆精氣不足者也諸如此類亦必按證施藥而補益之夫男而無以上諸病然後可以獨責乎婦若此者誠男子之責也奈何歸咎於婦哉婦無恙亦未如之何也已矣婦之經脈既調男之眞精亦足所謂陰陽和氣血平則百病不生而能有子子且壽矣奚艱嗣之有哉既和之以陰陽宜按之以方法而人事亦不可不盡也訣曰三十時中兩日半二十八九君須算落紅滿地是佳期金水過期空撩亂撩亂之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但解開花能結子何愁丹桂不成叢此蓋婦人月經方止金水初生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時宜以人事

副之庶不失造化之妙也過此佳期則子宮閉而不受胎矣然男女之別各有要妙存焉月經方過一日三日五日交合者此乾道成男二日四日六日交合者坤道成女又云陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開裹精陽內陰外是則精勝其血故陽爲之主男形所由以成也若陽精先入陰血後參橫氣來助精開裹血陰內陽外是則血勝其精故陰爲之主女形所由以成也欲嗣之廣者必由斯道而得之誠由斯而求之亦由斯而得也其或不然而亦有之者特徼幸於偶然耳然男女抱患而孕者亦有之夷嘗考之雖孕多墮也雖產多難也雖子多病也何以知其然也嘗觀赤子在襁褓之中內無七情之牽擾外無六氣之相侵宜無病之可生也其患曰變蒸驚悸斑爛風癎月瘡發搐痰喘痘疹火疹赤癗解顱龜胷滯頤內弔鵝口木舌重舌等證豈不皆根父母精血之初與夫姙婦虛弱不能謹節之所致歟又或未滿百日遂與鹹酸之味未至周期輒與肥甘之餚百病由此而生也其患曰丁奚哺露五疳吐逆黃疸腹脹浮腫痞

癖瘧痢積聚飧瀉洞瀉等證豈不皆由飲食過傷調養失宜之所致歟自是觀之大半胎病而小半傷食也一本體弱而稟受不厚至又姙婦情慾動中而胎氣隨熾或好食煎炙而多味辛酸或喜怒暴寒而嗜欲無節殊不知兒在胎內一脈貫通母饑亦饑母飽亦飽動履食息而胎氣隨之故皆足以令子受患也胎前既如古者婦人之姙子寢不側坐不偏立不跛不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲夜則令瞽誦詩道正事如此則生子形容端正才過人矣何今人愛子無方姑息太過反致傷生兒多枉死而與巖牆桎梏不能盡其正命者何異焉今見溫良之婦姙娠起居皆有節度生子少病痘疹亦稀足可以爲師法矣有父母之責者寧不於是而容心哉由是觀之賢愚得失較然矣孟子曰不孝有三無後爲大然孝以事親人則知之而孰知孝之大者乃所以善繼其後也乎慨有知此而不知求子之道也良可惜哉奈何委乎自棄者甘於命過乎慮念者惑於巫忍心害理曷此甚也大抵君子當造命

不當委命愚爲是論亦理法之準者言之耳豈曰無徵而不信乎

陰虛論

格致餘論云陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不足蓋有餘之陽氣者非直指心經之元陽也諸火之謂也夫火有二心爲君火五行正一之火也腎爲相火邪妄之火也凡一有動相火隨之而燔燒爍眞陰竭枯精髓經云壯水之主以制陽光此之謂也又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味溫也者溫養其氣而調和之以靜勝夫動也經曰勞者溫之是矣味也者藥味也經曰陰之所生本在五味可見補陰一方人人之所必用自壯至老而不可缺焉者也丹溪曰因火而成疾者十有八九不因火而成疾者百無一二故夫火乃無根之物人之一身五臟六腑無所不有惟陰盛可以制伏之趙繼宗謂陰本不足故不必補補不足者而至於有餘則反有太過之害吁趙亦未之思耳助不給補不足理之自然實其實虛其虛醫之深弊危而不持顛而不扶則將焉用彼

相矣經曰諸寒之而熱者取之陰所以責其陰之不足則虛火乘之而起精血津液皆爲之枯涸而夢遺淋濁虛勞內熱之證作矣治法責其無水當以補陰之劑與夫養血調中滋陰降火之屬又云補腎者不必濟以寒强腎之陰熱之猶可此固未嘗膠於知蘗之補陰而當識其有爲知蘗之君者斯可矣不然多見苦寒傷胃執一無權身且不保而欲望其有子也烏可得乎是則滋陰之劑故雖無恙而亦可以常服矣所謂緩則治其本也兼夫澄心息慮以溫養之多服健乾斑龍等劑而於子也殆必欲之則至其如視諸掌乎夫何人多不察妄信輕依頓服辛熱香燥助陽之藥適所謂以火濟火援石拯溺抱薪救火斯何異矣高明君子幸其鑒之

調經種子論

岐伯曰女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下則有子蓋任主胞胎通則陰道之泰也衝爲血海盛則氣血俱盛也婦人腎氣全盛衝任週流如月之虧盈應期行止而有常度曰調遇交合則有子

矣否則三五錯綜皆所謂不調也不調則百病變生甚至不治孕暇言乎經曰三陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消其傳爲息賁者死不治况心屬陽而主血脾裹血以行氣若月經不通未必不由心事不足思慮傷脾有所勞倦穀氣不輸肺金失養腎水無滋經血津液日以枯涸以至三五不調漸至絕閉虛損內熱骨蒸勞瘵之證作而卒於難治也所以養心則血生健脾則氣布二者胥和則氣暢血行而調經之要斯其至矣復何患之有且夫行經之時亦必保之如産遠房勞戒浴洗毋過於寒熱喜怒一有失中疾病隨起調治之法如氣鬱血虛潮熱黃瘦而經不調者以丹桂散香附丸之類主之氣虛血熱先期而來過多不止者以鎮經湯固經丸之屬治之過期不來腰腹脹痛者以促經湯紅花散之屬行之濕痰麻木者朮附丸燥之至於虛實寒熱更詳脉法抑何有經之不正而孕之不育乎

按螽斯之道男須氣足精充女必經調血盛而後可期是宜兼求之於夫婦者也茲門只詳孕育之

道而不及乎調經之言者以婦人門中已備載之故不復贅

寓意草　臣喻昌著

論服種子壯陽熱藥之悞

人生有性分之樂有勢分之樂有形體康健之樂性分之樂四時皆春萬物同體雖環堵蕭然而樂在也雖五官弗備而樂在也雖艱苦患難而樂亦在也谿山風月有我便是主人木石禽魚相親悉爲好友何取溺情枕席肆志淫佚也哉即造物小兒無所施其播弄矣至於勢分之樂與康健難老之樂惟福厚者始兼有之蓋得貴之與得壽其源若有分合兩塗少年純樸不凋此壽基也而嫌其精采不露髫齔機神流動此貴徵也而嫌其渾敦太鑿此其間半予天半予人而後天奉若之功不知費幾許小心然後可凝休而永命故在得志以後旣知此身爲上天托畀之身自應葆精嗇神以答天眷若乃女愛畢席男歡畢輸竭身中之自有而借資於藥餌責效於眉睫致宵小無知之輩得陰操其禍人之術以冀捷獲雖前代

之覆轍皆然而今時爲益烈矣蓋今者雍熈之象變爲繁促世運已從火化復以躁急之藥濟之幾何不喪亡接踵乎此道惟岐黃言之甚悉但士宦家不肯細心究討耳其云凡陰陽之道陽密乃固兩者不和如春無秋如冬無夏是故因而同之是謂聖度此段經文被從前註解埋沒不知乃是明言聖人於男女之際其交會之法度不過使陽氣祕密乃得堅固不洩耳然而陰陽貴相和有春無秋是無陰也有冬無夏是無陽也所以聖人但調其偏以歸和同允爲交會之法度而已夫聖人太和元氣生機自握我觀夫調琴弄瑟考鐘伐鼓雖閨壼之性情克諧而況於己身之血氣禮陶樂淑仁漸義摩雖民物之殷阜坐致而況於一人之嗣息所以凡爲廣嗣之計者其用藥之準但取純王以名和無取雜霸以兆戾也而經又云陰平陽祕四字尤足互暢其義蓋陰得其平而無過不及然後陽得其祕而不走洩也此可見陽之祕密乃聖神交會所首重然後陽之祕密卽不得不予其權於陰正以陽根於陰培陰所以培陽之基也今

人以峻烈之藥刦盡其陰以爲培陽益以房幃重耗漸至髓消肉減神昏氣奪毛瘁色夭尚不知爲藥所悞可勝悼哉向見一浙醫宋姓者在京師製成大顆彈丸遍送仕宦托名臍帶胎髮其實用煉過硫黃在內服之令人陽道驟堅可喜未幾燥病百出吾鄉諸大老受其禍者歷歷可指近遊鹿城聞張鴻一孝廉以進紅鉛傷腦而日夜精流不止蓋腦爲髓海腦熱而通身之髓盡奔究竟熱未除而髓先竭骨痿艱行矣至婁過天如先生舊宅見鼻中濁涕凡落板壁者深黃之色透入木中刻刷不除詢之亦繇服種子熱藥所致後以傷風小恙竟至不起噫嘻腦熱已極蒸涕爲黃出鼻之熱尚能透木曾不省悟至熱極生風尚治外而不治內也復何言哉吾鄉劉石閭先生服熱藥而病消渴醫者鄧橘存堅令服六味地黃湯千劑果效蓋得於壯水之主以制陽光之旨也高郵袁體仁種子經驗方皆用陰陽兩平之藥蓋得於陰平陽祕之旨也此老於醫而審於藥者因并表之又方士取黑鉛之水名爲神水金丹以惑人凡痰火之病

初得其下行之力亦覺稍爽而不知鉛性至燥轉致刼陰爲害反大又有用蒸臍之藥名彭祖接命之法者夫臍爲人之命根以麝香硫黃附子等大熱散氣之藥加艾火而蒸灼幸而不中眞氣尚無大害若蒸動眞氣散越不收擾亂不寧有速斃耳聞婁中老醫穆雲谷嘗誨人曰蒸臍一法有損無益斷不可行旨哉言矣亦幷表之

方一

萬靈至寶仙酒（身經通考下同）

生精益腎助陽補陰彊發舉痿又治婦人赤白帶下月水不調肚冷臍痛未孕者卽孕

淫羊藿酒洗淨剪碎十兩　列當（如無以肉蓯蓉代之）

仙茅糯米泔浸一宿竹刀削去粗皮黑頂各四兩

雄黃研　黃蘗去粗皮　知母去尾各二兩

當歸酒洗浸八兩

右㕮咀用無灰酒十五斤裝入瓶內封固桑柴文

武火懸煑三箇時埋地內三晝夜去火毒取出待七日將藥撈出曬乾爲細末糯米粉打糊丸桐子大酒藥同服仍以乾物壓之此酒用銀壺或磁壺重湯煑熱服酒後不可妄瀉待時而動少則三月多則半年精瀉胞成屢試屢驗忌牛肉鐵器宜陰臟人

青娥丸

黑鬚育子

杜仲去粗皮切片用鹽四兩煎湯浸　破故紙一半酒浸一半薑汁浸　萆薢去節刺分四分一分人乳浸一分童便浸一分薑汁浸一分酒浸各一斤

右藥俱浸三日取出去汁不用共一處陰三日曬三日星月全夜露天之下炒乾爲末用糯米一官升煑爛飯先用核桃肉一斤去粗皮將飯與核桃肉合一處搗千槌不見核桃肉白星爲度卽於月下丸桐子大不得晒至次日失太陰之精早晚二服每服一錢五分宜陽臟人

三才丸

久服延年益子

天門冬去心蜜水洗　生地黃九蒸九曬杵爲膏

赤白茯苓人乳浸透夏一日夜春秋二日冬三日各

一斤

右煉蜜爲丸桐子大量服多寡

又方

陽不足者服此兼服三才丸妙難盡述

沙苑蒺藜淨微炒　甘州枸杞子去梗淨微炒

南魚鰾細長白淨者切豆大蛤粉炒成珠各八兩

右爲細末煉蜜丸桐子大空心好酒下二錢半

種子方

魚鰾膠淨白者麪炒成珠一斤　知母去尾酒炒

破故紙酒浸炒　韭子　鹿角霜酥炙各二兩

青鹽一兩　生地　熟地　山茱萸肉　枸杞子

沙苑蒺藜酒煑曬乾爲末各三兩　當歸身

核桃肉搗如泥各四兩

右爲細末煉蜜丸桐子大每服五十丸酒或鹽湯

下

五子衍宗丸

枸杞子　菟絲子餅各八兩　覆盆子五兩
車前子二兩　遼五味子一兩
加仙茅八兩修合春用丙丁巳午日夏用戊己辰戌丑未日秋用壬癸亥子日冬用甲乙寅卯日修合時忌鰥寡婦人雞犬見之蜜丸酒下

種子方

蒺藜細末一半粗末一半煎膏　雞頭子肉
蓮鬚黃者各四兩　山茱萸肉　覆盆子各三兩
龍骨五色者火煆
右共爲末蒺藜膏加蜜爲丸淸晨臨臥俱服

黑豆神方

延年種子

何首烏用黑豆九製八錢　當歸酒洗　五加皮
骨碎補刮去毛蜜水拌蒸　生地黃　青皮去穰
杜仲薑汁炒斷絲　遠志去骨甘草水浸一宿炒
附子童便製甘草製薑汁製　巴戟酒洗去骨
棗仁炒　瑣陽酥油塗炙　紫梢花去骨各五錢

枸杞子　槐角各一兩　蒺藜椿去刺酒拌蒸

肉蓯蓉酒洗去鱗膜　蛇牀子酒拌蒸各四錢

牛膝酒浸蒸七錢　青鹽二兩　金櫻子去毛淨

破故紙微炒各六錢

右藥入水二十椀煎至十椀滓再煎十椀共藥二十椀用小黑豆十五椀拌浸蒸曬以藥完爲乾年少者去巴戟附子瑣陽紫梢花四味

九子丸（良方下同）

強陽補腎益精氣壯筋骨種子延年

肉蓯蓉四兩酒浸三宿切焙乾　蛇牀子微炒

仙茅糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮於槐木砧子上切陰乾　遠志去心　鹿茸刮去毛酥塗炙黃色

續斷挫碎去筋膜酒浸一宿　舶上蘹香微炒

巴戟去心　車前子各一兩

右爲細末用鹿脊髓五條去血脈筋膜以無灰酒一升熬成膏更碾極爛同煉蜜少許和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒送下

法製鰕米

起陽補腎

鰕米一斤去皮殼青鹽酒炒乾至香熟爲度

眞蛤蚧青鹽酒炙脆爲度一對　茴香青鹽酒炒

淨川椒同上法製不可過各四兩

右酒須用渾濁煑酒二升帶浮蛆釃酒最佳攪入青鹽製用先製蛤蚧椒皮茴香乾却製鰕米以酒盡爲度候香熟取前三味同和勻用南木香粗末二兩同和乘熱收入磁器內四圍封固候冷取用每服一勺空心細嚼鹽酒下

鹿茸酒

治虛弱陽事不舉面色無光小便頻數不思飲食

嫩鹿茸半兩去毛切作片　乾山藥一兩爲末

右以生薄絹裹用官酒一瓶浸七日後開瓶飲食日三盞爲度酒盡再將酒一瓶浸喫了却將鹿茸焙乾留爲補藥內用之極妙

沉香既濟丸

滋補下元調順諸氣能令陽事壯健飲食加進其功異乎諸藥其方得於桑哥丞相家人所傳用無

不效

沉香　木香　青鹽各一兩　川楝子青鹽炒
枳殼去穰酒浸麸炒微黃　巴戟天去心酒浸
韭子酒浸炒各三兩　麝香二錢　白茯苓去皮
八角茴香用青鹽少許炒或用小茴香亦可
肉蓯蓉酒浸各二兩

右爲細末入別研藥末和勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五六十丸空心用好酒送下以乾物壓之大有神效忌食生葱蘿蔔豆粉諸血恐泄其眞氣也

加味青娥丸

補諸虛不足陰陽道衰滋陰氣悅容顏

杜仲三兩去粗皮切用生薑汁一兩同蜜少許拌炒斷絲　青鹽少許　破故紙鹽炒　小茴香鹽炒
胡盧巴各四兩　山甲酥炙三錢　蓮花蕊半斤
胡桃二十五枚去皮杵研如泥

右爲細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下以乾物壓之

老奴丸

一名蒼龍丸

木香五錢　燈心二錢　大蜘蛛七箇　華澄茄
胡桃肉另研　車前子炒　馬藺花酒浸　萆薢
牡蠣火煆　韭子　木通各一兩　熟地黃五兩
山茱萸去核　破故紙酒浸　桑螵蛸酒浸
全蠍去毒　龍骨各一兩半　母丁香　紫梢花
蛇牀子　肉蓯蓉酒浸　菟絲子酒蒸　白茯苓
仙靈脾　八角茴香　巴戟去心　遠志去心
當歸各二兩　沉香七錢　乾漆炒去煙三兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下七日見效無婦人者勿服專興陽事欲解者飲凉水三口年高氣衰虛耗風濕腰脚疼痛並宜服之此藥最靈驗添精補腎傷除去冷風濕扶經更起陽老誠好修合祕密莫傳揚假之保元氣延壽得安康一方無桑螵蛸當歸沉香

延生護寶丹

補元氣壯筋骨固精健陽通和血脈潤澤肌膚延

年益壽

菟絲子酒浸透蒸熟碾作餅曬乾碾作末三兩

肉蓯蓉酒浸切焙　晩蠶蛾酥少許慢火炒

家韭子四兩水淘淨用棗二兩同煑棗熟去棗水淘

淨控乾再用酒浸一宿火炒軟各二兩　白龍骨

胡盧巴微炒　蓮實去皮炒熟　桑螵蛸炒香

蛇牀子二兩水淘淨用棗三兩同煑棗熟去棗焙乾

各淨秤一兩　乾蓮花蕊　乳香另研　丁香

鹿茸去毛酥炙　木香各半兩　麝香二錢另研

右除乳香麝香菟絲子末外一十二味同爲細末將前菟絲子末用浸藥酒二升文武火熬減一半入蕎麥麪一兩以酒調勻下膏子內攪勻次下乳香麝香不住手攪勻輕沸熬如稠糊放冷此膏子都要盡恐硬入酒少許與前藥末和成劑杵千餘下丸如梧桐子大每服三十丸早空心用溫酒入炒鹽少許送下靜坐少時想藥至丹田以意加減丸數如陽道衰精滑空心臨臥各進一服

膃肭臍丸

治證同前

膃肭臍一對　沉香半兩　鹿角膠　鹿角霜碾

麋茸各二兩　熟地黃　胡盧巴　菟絲子酒蒸

巴戟　鍾乳粉碾　乳香碾　當歸　牛膝酒浸

肉蓯蓉酒浸　小茴香炒　天雄　附子各一兩

硃砂二錢碾　麝香一錢

右先將膃肭臍酒浸一宿煮爛搗成膏將浸藥酒化麋鹿膠霜同爲膏次下另碾乳香麝香硃砂乳粉末其餘藥修製了亦碾爲細末再於乳鉢內同碾千萬下別用白羊腰子三對白羊脊髓五條酒煮熟爛碾爲膏同膃肭臍麋鹿角膠搜拌藥內成劑得所若稍乾入酒糊些少同搜和入臼內搗三五千杵丸如梧桐子大窨一宿慢火上焙乾罐子盛用厚紙密封罐口每服三十丸加至五七十丸空心用溫酒送下

溫臍方（入門）

五靈脂　白芷　青鹽各二錢　麝香一分

右爲末另用蕎麥麪水和成條圈於臍上以前藥

實於臍中虛冷甚者加硫黃入麝香爲引用艾灸之婦人尤宜但覺臍中溫煖卽止過數日再灸太過則生熱也

資始健乾丸（醫統下同）

按此誠種子之良方寒熱不偏君佐不紊滋補無過丈夫少病而無子悉宜服之無不效者若或陽事痿弱精冷精清宜服巨勝丸之屬以扶陽也若水不勝火心旺腎衰熱煩精滑大補陰丸之屬以益陰焉

秋石製　鹿角霜製各四兩　人參　枸杞子

山茱萸肉　麥門冬　天門冬　生地黃酒浸

杜仲薑汁炒斷絲　熟地黃酒浸各二兩

右爲末老米麵作糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心滾白湯下一月後候女子月經方過金水正生之時男子空心服車前子湯半盞至夜交會卽有孕矣

資生順坤丸

按此方和氣調經養血清熱女人寒少熱多久無

子孕服之悉效若血海多寒子宮久冷宜服螽斯丸之屬以溫煖之若不甚寒宜用墨香丸之屬以和養之也

香附米一斤四製春秋三日夏二日冬七日曬乾爲末篩去頭末取中末半斤　川當歸酒浸微焙　白茯苓土炒各三兩　川芎　白芍藥　熟地黃　生地黃　牡丹皮　黃芩去黑朽　益母草　柴胡　臭椿根白皮各二兩

右爲末醋糊丸梧桐子大空心淡醋湯下六十丸食乾物壓之

巨勝子丸

左尺脈微而弱陽虛不舉宜服之

南木香二錢半　巨勝子　白茯苓　何首烏　川牛膝　熟地黃各四兩　生地黃　肉蓯蓉　菟絲子　天門冬　枸杞子　天雄製　柏子仁　酸棗仁　破故紙　北五味子　巴戟天　山藥　韭子　楮實子　續斷各一兩　覆盆子　芡實　川椒去目并合口者　胡盧巴　蓮花蕊各五錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服七十丸空心酒下食物壓之

瑞效丸

元氣不足腎虛陽脫易瘦易瀉尺脈俱微服之壯陽益氣補髓添精

菟絲子酒製碾　枸杞子　破故紙酒洗微炒
韭子炒　茴香鹽炒　穿山甲炮　金墨燒煙盡
遠志　蓮花蕊　紅花　蓮肉　母丁香　芡實
牛膝酒洗　木香各一兩　巴戟酒浸　益智仁
川楝肉　青鹽　沉香各五錢

右爲末酒糊丸梧桐子大每服五十丸空心酒下不飲酒者鹽湯下食乾物壓之

還少丹

陽事痿弱精氣不射尺脉微細無子者宜服之

熟地黃　枸杞子各兩半　牛膝酒洗　遠志肉
乾山藥　山茱萸肉　巴戟天去心　白茯苓
五味子　石菖蒲　肉蓯蓉酒洗　楮實子
杜仲薑汁炒　茴香炒各一兩

右爲末煉蜜和棗肉丸梧桐子大每服五十丸食前溫酒或鹽湯送下日三服

大補陰丸

左尺脈洪陰虛火動服此降陰火補腎水故能生子

黃蘗　知母並鹽酒炒各四兩　龜板酥炙

熟地黃酒洗焙乾碾各六兩

右爲末煉蜜和猪脊髓丸梧桐子大空心薑鹽湯送下七十丸

虎潛丸

左尺脈浮洪大虛此藥固精元滋陰降火

黃蘗鹽酒炒半斤　知母鹽酒炒　熟地各一兩

白芍藥炒　川牛膝酒洗　陳皮　瑣陽　當歸

虎脛骨酥炙各兩半　龜板四兩酥炙

右爲末酒煮羊肉搗爛丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯下冬加乾薑半兩

加味虎潛丸

腎脈虛數精神短少腰膝無力此藥壯筋骨補腎

塡精生子

人參　黃芪蜜炙　白芍藥煨　當歸酒洗

山藥各一兩　故紙炒　瑣陽酥炙　虎骨酥炙

龜板酥炙　菟絲子製　杜仲薑汁炒斷絲

五味子各七錢半　牛膝酒浸二兩

右爲細末煉蜜和猪脊髓丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽點湯送下

滋陰大補丸

腎脈微弱陰陽兩虛與虎潛丸相間服之所謂補陰和陽生益精血潤澤肌膚强筋骨種子嗣性味清而不寒溫而不熱非達造化之至者未足與議於斯也

牛膝　山藥各兩半　杜仲酥炙炒斷絲　巴戟

山茱萸肉　五味子　肉蓯蓉酒洗去鱗甲焙乾

白茯苓　茴香炒　遠志去心甘草同煮各一兩

石菖蒲　枸杞子各五錢　熟地黃二兩

右爲細末煉蜜和紅棗肉丸如梧桐子大每服七十丸空心酒或鹽湯送下

斑龍丸

壯精神除百病養氣血補百損育子嗣大有奇效老人虛人常服延年益壽昔蜀中有道人酣歌酒肆曰尾閭不禁滄海竭九轉金丹都慢說惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下血眞人仲源索方傳世

鹿角霜　鹿角膠　菟絲子製搗　柏子仁

熟地黃各半斤　白茯苓　補骨脂各四兩

右將膠先溶化量入無灰酒打糊丸梧桐子大每服六七十丸空心鹽湯酒任下

斑龍二至丸

治益同上

鹿角霜　鹿角膠各一斤　黃蘗酒炒　知母酒炒各半斤　生地　熟地酒浸　天門冬酒浸去心麥門冬酒浸去心各四兩　何首烏去皮切小塊乳汁拌蒸曬乾又拌九次　當歸　白茯苓

右爲細末煉蜜丸梧桐子大空心鹽酒下

太極丸

塡精補髓種子延年蓋人之五臟配天地之五行

一有不和是以爲病藥有五味各主五臟常以適調因配合諸味使人神氣精心肺腎保和無遺生化之源既清邪不能入矣故曰太極

黃蘗去皮鹽酒炒勻至褐色取淨末三兩六錢

知母去毛淨酒浸一宿微炒取淨末三兩四錢

破故紙新瓦炒香取淨末二兩八錢　胡桃仁去皮礦三兩二錢　砂仁一兩分二處以一處同花椒五錢炒去椒一處生用

右爲細末煉蜜丸梧桐子大每服五七十丸早晚沸湯茶酒任下服至三年百病消除終身服之無間可以成地仙矣

補腎丸（丹溪）

補腎生子

黃蘗製　龜板酥炙　杜仲製　牛膝酒洗

陳皮各二兩　乾薑冬加五錢　五味子五錢

右爲細末薑汁糊丸梧桐子大酒下五十丸

補陰丸（明醫雜著）

補虛種子

黃蘗製　知母製　龜板製各三兩　枸杞子
五味子　天門冬去心　白芍藥酒炒各一兩
瑣陽酥炙二兩　熟地黃酒洗五兩　乾薑炮三錢

右爲細末煉蜜入猪脊髓三條和勻丸梧桐子大每服八十丸空心淡鹽湯送下冬月炮薑用五錢溫酒下加減法於後

夢遺精滑加製牡蠣白朮各一兩山茱萸肉椿根白皮炒各七錢

有赤白濁加白朮白茯苓各二兩半山梔仁炒黃連炒各半兩

脚膝軟弱無力加牛膝酒洗虎骨酥炙各二兩防己酒洗木瓜各半兩

疝氣加蒼朮鹽炒兩半黃連薑汁炒山梔仁炒各六錢川芎一兩吳茱萸炮青皮各半兩

脾胃虛弱畏寒易泄加白朮三兩陳皮一兩乾薑炮七錢

眼目昏暗加當歸酒洗川芎菊花各二兩柴胡黃連酒炒烏犀各半兩蔓荊子防風各二錢

氣虛之人加人參黃芪炙各二兩

左尺旣虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加肉桂

黑附子製各七錢沉香五錢

沉香大補丸（直指方）

專治下焦虛弱補益元氣久服輕身健體五臟調和血脉通泰種子延年功效甚妙

黃蘗酒製四兩　知母酒製　熟地黃酒浸

龜板酥炙　人參各二兩　芍藥　牛膝酒洗

陳皮　瑣陽酒浸　當歸酒浸　山茱萸肉

山藥　白茯苓　牡丹皮　杜仲　大茴香

澤瀉　沉香各一兩　虎脛骨酥炙七錢半

右爲細末酒煮黑羊羔肉熬爲膏去骨內加猪脊髓二條再熬和藥爲丸梧桐子大每服四五十丸空心好酒送下食乾物壓之

人參固本丸（千金方）

夫人心藏血腎藏精精血充實則鬚髮不白顏色不衰老而有子延年益壽其夭者多由服熱藥不能滋生精血而藥之補精血者無出於生熟二地

黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬爲引蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之地熟地黃能補腎精用天門冬引入所補之地四味互相爲用本草又以人參爲通心氣之主故加之

生地黃　熟地黃各酒浸　天門冬酒浸去心
麥門冬酒浸去心各二兩　人參一兩

右爲末煉蜜爲丸梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下如有痰者二地黃俱用薑汁炒過恐滯膈故也

三才封髓丹

降心火益腎水久服多子

天門冬　熟地黃　人參各半兩　砂仁炒兩半
黃蘗炒褐色三兩　甘草炙七錢

右爲末麪糊丸梧桐子大每服五十丸以肉蓯蓉五錢切片酒浸一宿次日煎三四沸去査空心送丸子

固眞丹

治諸虛百損五勞七傷水火不升降下元虛冷無

子臍腹痛

熟地黃四兩酒煮搗膏　人參　山藥　當歸

黃芪　黃蘗製　白朮　杜仲　故紙炒各一兩

五味子　白茯苓　丹皮　山萸肉　澤瀉各半兩

右爲細末和地黃膏搜勻入煉蜜和丸梧桐子大

每服八十丸空心淡鹽湯送下

腰腿無力加牛膝一兩酒炒龜板兩半酥炙夏天

加龜板半兩

脈弱食少再加附子半兩

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十四卷目錄

醫部彙考三百三十四

種子門二

方二　大補天丸　延壽丹　石刻安腎丸　無比山藥丸　鹿茸丸　八味丸　十精丸　五精丸　延壽丸　神仙巨勝子丸　全鹿丸　雀卵菟絲丸　御米酒　大造丸　還元丹　七珍至寶丹　加味坎離丸　仙茅丸　斑龍二至百補丸　膃肭臍丸　黃犬肉丸　陽起石丸　韭子丸　太乙金鎖丹　螽斯丸　滋血煖宮丸　濟陰丸　妙應丸　續嗣降生丹　延年益嗣丹　壬子丸　加味養榮丸　神效黑附丸　何首烏丸　四製香附丸

（神效百子丸　勝金丸　雞頭粥　八珍益母丸　八珍益母十全丸　四物益母丸　補腎種子黑髮烏鬚奇方）

單方

導引

醫案

藝術典第三百五十四卷

醫部彙考三百三十四

種子門二

方二

大補天丸

治男婦虛損勞傷形體羸乏腰背疼痛遺精帶濁艱於子嗣

黃蘗蜜炒黃　知母乳汁炒　龜板酥炙各三兩

熟地黃五兩　牛膝酒洗　麥冬　肉蓯蓉酒洗

虎脛骨酥炙　山藥炒　茯神　黃芪炙各兩半
杜仲製　枸杞子　何首烏製　白芍酒炒（冬月減半）
人參各二兩　天冬　生地黃酒洗砂鍋煑搗爛
當歸酒洗　五味各一兩　冬加乾薑半兩炒黑
紫河車一具取初胎者米泔洗淨於小砂罐內水一椀煑沸取起待冷放竹藍中四圍紙糊密烘乾爲末入羣藥和勻

右爲細末煉蜜入猪脊髓三條和搗勻丸梧桐子大每服八十九空心淡鹽湯送下冬月酒下

延壽丹方（千金）

治諸虛百損怯弱病後虛損元氣不復凡人中年之後常服可以却疾生子延年益壽

天門冬去心　麥門冬去心　生地黃酒浸
熟地黃酒浸　當歸酒洗　山藥炒　菟絲子製
五味子　牛膝酒浸　杜仲各一兩　大茴香
人參　茯苓　澤瀉　地骨皮　鹿茸　石菖蒲
蜀椒　巴戟去心　遠志製　覆盆子　枸杞子
柏子仁各半兩　肉蓯蓉二兩

右爲細末忌鐵器蒸搗煉蜜爲丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒或薑湯送下

大便溏小便澀加車前子二兩

夢遺精滑加赤石脂山茱萸各五錢忌蘿蔔菜

石刻安腎丸（良方）

治眞氣虛憊脚膝耎弱夜夢遺精小便數滑久服多子

青鹽四錢　鹿茸製一兩　柏子仁　附子製

石斛　川烏　巴戟製　肉桂　肉蓯蓉酒浸

菟絲子製　韭子微炒　胡盧巴炒　杜仲製

破故紙酒炒　山萸肉　遠志製　赤石脂煨

川楝子肉酒蒸　川椒去目微炒出汗　茯苓

茯神　蒼术製　小茴香酒炒各二兩

右爲末山藥四兩酒煑糊爲丸梧桐子大每服七八十丸空心鹽湯下

無比山藥丸（局方）

治諸虛傷損肌肉消瘦耳聾目暗常服壯筋骨益腎水令人不老多子

赤石脂　茯神　杜仲製各二兩　肉蓯蓉酒浸
山藥各四兩　巴戟　澤瀉　牛膝　熟地黃
山茱萸肉各一兩　菟絲子製　五味子各三兩
右爲末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心溫酒
下

鹿茸丸（集驗方）

治諸虛勞倦補心腎滋氣血益陽生子
鹿茸酥炙　熟地黃　當歸　酸棗仁炒　附子
枸杞子　遠志薑汁浸炒　沉香　牛膝　山藥
肉蓯蓉酒浸各一兩　麝香五分
右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸鹽湯下

八味丸（局方）

治下元冷憊心火炎上渴欲飲水或腎水不能攝養多唾痰涎及男子消渴小便轉多婦人轉胞小便難久服益陽生子
熟地黃酒拌九蒸九曬八兩　山茱萸肉酒潤
山藥各四兩　丹皮　茯苓乳拌　澤瀉各三兩
附子製　肉桂各一兩

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心淡鹽湯下

十精丸（百一選方）

升降陰陽既濟水火平補心腎生育子嗣

遠志　青鹽炒碾　破故紙　白茯苓　益智仁

菟絲子　當歸酒浸　牛膝各一兩　石菖蒲

山茱萸肉各半兩

右爲細末用猪腰子一枚去膜和酒碾細煑麪糊丸梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯下

小便赤數者車前子湯下

心虛精神不定茯苓湯下

夜間煩躁不眠酸棗仁爲末調湯下

心氣煩渴麥門冬湯下

五精丸（澹寮方）

治腎虛瘦弱大補陽氣

秋石　鹿角霜　茯苓　山藥　陽起石各等分

右爲末酒糊丸梧桐子大每服五十丸空心飲湯下須放近火邊勿使回潤爲妙

延壽丸（祕方）

專治元陽虛憊諸虛不足行步乏力肢體酸疼

鹿茸酥製　沉香　肉蓯蓉酒浸　菟絲子製
當歸酒洗　胡盧巴炒　破故紙炒　石蓮子
枳實　續斷炒　枸杞子　五味子　杜仲製
巴戟去心各二兩　胡桃仁十四箇去衣

右爲細末羊肉或黃犬肉二斤切入青鹽花椒小茴以無灰酒煮如泥杵成膏入衆藥末和搗丸梧桐子大每服五十丸至百丸空心鹽酒下

神仙巨勝子丸

安魂定魄滋益容顏壯筋骨潤肌膚添精補髓黑髮堅牙目視有光行步如飛久服除百病廣嗣息其功不可盡述

巨勝子　生地黃　熟地黃　何首烏製各四兩
枸杞子　菟絲子　五味子　酸棗仁　柏子仁
破故紙炒　覆盆子　芡實子　廣木香　官桂
蓮花蘂　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　巴戟去心
天冬酒浸去心　人參　茯苓　楮實子　韭子

天雄製　蓮肉　續斷　山藥各一兩　菊花八錢

右爲細末春夏煉蜜爲丸秋冬蒸棗肉入胡桃肉十一箇搗如泥和藥再搗千杵丸梧桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯下日二服若久服去天雄加鹿茸此藥聰聾耳明盲目服一月元臟强勝二月白髮變黑百日容顏改變目明可以暗室穿針冬月不寒將白鷄用藥拌飯喂之六十日則成黑鷄矣

全鹿丸（祕方下同）

此藥能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年廣嗣其法四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製四年則每人爲一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不存矣

中鹿一隻不拘牝牡縛死去毛肚雜洗淨熬膏

鹿肉煑熟橫切片焙乾爲末　皮同雜入元湯煑膏和藥末爲丸　骨用酥炙爲末和肉末藥末一處和膠搗不成丸加蜜　人參　黃芪　白朮　茯苓

生地　破故紙　巴戟天　當歸　川芎　熟地

天冬　麥冬　陳皮　炙甘草　枸杞子　續斷

杜仲　牛膝　瑣陽　秋石　胡盧巴　乾山藥

芡實子　菟絲子　五味子　覆盆子　楮實子

肉蓯蓉各一斤　川椒去目子并閉口炒去汗

小茴香　青鹽　沉香各半斤

右各精製爲末各秤分兩和勻一處候鹿製膠成就和爲丸梧桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每條約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋微伏天須要火烘一二次爲妙每服八九十丸空心臨臥時薑湯鹽湯沸湯任下冬月溫酒送下

雀卵菟絲丸

助陽固精最爲奇效此方純正久服有益無損視之桂附麝沉等藥助陽取效一時久則致火大有間矣

菟絲子二斤重湯酒煑三日夜汁乾用石臼杵搗爲泥塊作餅子炕乾爲細末酒糊丸作餅子曬乾

雀卵一百枚去黃用白和菟絲淨末一斤

右煉蜜爲丸梧桐子大空心酒下七十丸

御米酒

壯筋骨暢經絡養精元益神氣久服行步如飛延年益嗣有通仙之妙

眞薏苡米酒一百斤　霜茄根切片　五加皮切
眞桑寄生剉　蒼耳子炒去刺各半斤　枸杞子
牛膝去蘆各一斤

右各製淨秤分兩每味分四劑酒一百斤亦分四罈各入藥煑三炷香取放土地上退火性一七可飲久窨尤佳早晚隨量飲微醺爲度此藥雖平易有奇效不可以其簡而忽之

大造丸

此方久服耳目聰明鬚髮烏黑延年益壽有奪造化之大功故名大造丸亦治心風失志虛勞危絕可以回生男婦無子者服之生男

紫河車一具男用男胎女用女胎初胎者尤佳以米泔洗淨新瓦上焙乾或用砂鍋銀鍋重湯煎爛搗
敗龜板乃年久自死者佳童便浸三日酥炙二兩

黃蘗鹽酒炒褐色　杜仲酥炙斷絲各一兩半

熟地黃肥實者二兩半入砂仁末六錢白茯苓二兩一塊稀絹包好酒同煑七次去茯苓不用蓋地黃得茯苓砂仁黃蘗則入足少陰腎經名天一生水

牛膝酒洗　天冬去心　麥冬去心各一兩二錢

夏加五味子七錢以上四味其性有降無升得參一兩則補而降本草云主多生子以此也

右除地黃另用石木臼舂一日餘共爲末和地黃膏再加酒米糊丸小豆大每服八十丸空心臨臥鹽湯沸湯薑湯任下冬月好酒下婦人加當歸二兩去龜板男子遺精赤白濁婦人帶下並加牡蠣兩半

還元丹

一名延年益壽不老丹此藥大補元氣廣嗣育服一月自覺異常功效不可盡述

何首烏鮮者一斤竹刀刮去皮乾者用米泔水浸軟刮去皮一次用酒芝麻蒸曬乾一次用羊肉一斤蒸曬乾一次用酒拌過蒸曬乾一次用黑豆蒸曬乾

生地黃　熟地黃並酒浸焙乾　茯苓酒浸曬乾
地骨皮童便浸曬乾各三兩（以上俱忌鐵器）　人參五錢
天門冬　麥門冬並米泔水浸去心各一兩

右俱另爲細末秤準取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前末爲膏磁器貯勿瀉氣不拘時服一二匙沸湯點

七珍至寶丹

廣嗣延年補益之功甚大莫能盡述

赤何首烏酒浸竹刀刮去皮同牛膝蒸　白何首烏製同上　赤茯苓用牛乳五升煑乳乾爲度
白茯苓製同上各一斤　破故紙炒香　菟絲製
牛膝去蘆用何首烏黑豆三升入甑重層安甑內蒸熟取出去豆共搗如泥各半斤　當歸酒浸焙乾
枸杞子各四兩

右如法製爲細末同煉蜜和勻搗極熟丸如鷄頭子大每服一丸日進三服空心溫酒午後薑湯臨臥鹽湯服初服三四日後小便多成雜色是五臟中雜病出二七日後脣紅生津液再不夜起若後

有腹痛勿懼是搜病也三七日後身體輕便兩乳間紅潤一月鼻覺辛酸是諸風百病皆出四十九日補血生精瀉火益水强筋骨黑鬚髮三月大有奇效

加味坎離丸

生精養血升水降火種子延年王道之劑也

黃蘗作四分一分用酒浸一分用鹽水浸一分用人乳浸一分用蜜水浸並曬乾炒　知母鹽酒浸炒　熟地黃各八兩用白茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入絹袋中好酒二瓶煑乾去茯苓砂仁　當歸　川芎　白芍藥各四兩酒浸一日曬乾

右剉勻鋪筐中日曬夜露三日爲度白蜜一斤半重湯煉成珠和藥末搗丸如梧桐子大每服八十丸空心鹽湯下冬月酒下

仙茅丸

壯筋骨益精神補腎種子明目黑髭

仙茅米泔浸五日去赤子用銅刀剉夏浸三日陰乾淨秤一兩　蒼朮米泔浸五日刮去皮焙乾

枸杞子各一斤　車前子十二兩微炒　白茯苓

柏子仁微炒另碾　小茴炒各八兩　生地酒洗

熟地酒浸各四兩

右爲細末酒煮糊丸梧桐子大每服五十丸漸加至八十九空心食前溫酒送下

斑龍二至百補丸方（祕驗）

此藥固本保元生精養血培復天眞大補虛損益五內而除骨蒸壯元陽而多子嗣充血脈强健筋骸美顏色增延齡筭聰明耳目黑潤髭鬚眞乃王道奇品之方難盡述其功效之妙也

鹿角五十兩新取連腦骨者佳鋸二寸長投長流水洗米泔浸一宿刷洗淨曬乾同後藥入磁罈煮膠

黃精八兩　枸杞子　熟地黃　菟絲子熱水淘

金櫻子去毛子各四兩　天冬去心　麥冬去心

牛膝酒洗　楮實子水洗各二兩　龍眼肉一兩

已上十味同角和勻入淨罈內層層放實用新汲淡水注罈中平肩以密梭布四層封口以新磚壓之置大鍋中井字架上以木甑蓋好重湯煮三日

夜毋得間斷火候旁用小鍋燒滾水不時添注罎內井鍋內勿使乾涸日足取起濾去滓將汁用絹絞出入淨砂鍋內文火熬成膏約一斤半再煉蜜二斤滴水成珠攙入和後項藥杵爛爲丸

鹿角霜十兩　人參五兩　黃芪蜜炒　雞頭粉

白茯苓去皮　山藥炒　山茱萸肉鹽水洗過

生地黃酒洗飯上蒸過　知母鹽水炒各四兩

五味子一兩去梗

夏月加川黃蘗四兩炒褐色已上十味爲細末用前膏和勻成塊石臼木杵杵千餘下爲丸如梧桐子大空心鹽湯送下八十丸隨用煑熟蓮子肉或曬乾棗數枚以壓之俾納丹田也

腽肭臍丸（濟生方下同）

治五勞七傷眞陽衰憊臍腹冷痛肢體痠痛腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目眩耳鳴口苦舌乾飲食無味腹中虛鳴脅下刺痛心常慘慼夜多異夢晝少精神小便滑數大腑溏瀉時有遺瀝陽事不舉但是風虛痼冷皆宜服之

膃肭臍一對酒蒸熟和後藥　川烏炮去皮尖
天雄炮去皮　附子炮去皮臍　陽起石煅
鍾乳粉各二兩　硃砂研細　人參
沉香不見火別研　鹿茸酒蒸各一兩

右爲細末用膃肭臍膏子入少酒糊入臼內杵和丸如桐子大每服七十丸空心用鹽酒鹽湯任下

黃犬肉丸

治眞陽衰憊臍腹冷痛小便頻數頭運耳鳴足脛痠冷步履無力腰背拘痛水穀不消飲食無味肌肉瘦悴遺瀉失精

磁石三兩煅水飛　川烏炮去皮尖　桑寄生
附子炮去皮臍　鹿茸燎去毛酒蒸　仙茅酒浸
麋茸去毛酒蒸　肉蓯蓉酒浸切焙　巴戟去心
胡盧巴炒各二兩　沉香別研　陽起石煅研細
龍骨生　青鹽　虎脛骨炙　覆盆子酒浸各一兩

右爲細末用黃犬肉二斤以酒葱茴香煮爛杵和爲丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯下

陽起石丸

治腎臟虛損陽氣全乏無子

陽起石煆　韭子炒　肉蓯蓉酒浸　青鹽別研
菟絲子水淘淨酒蒸焙別碾　沉香別碾不見火
鹿茸酒蒸　鍾乳粉　原蠶蛾酒炙　山茱萸肉
桑螵蛸酒炙　山藥剉炒各半兩

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

韭子丸

治膀胱虛冷小便白濁滑數日夜無度

赤石脂煆　韭子炒　牛膝去蘆酒浸　牡蠣煆
覆盆子酒浸　附子炮去皮臍　桑螵蛸酒炙
鹿茸酒蒸焙　肉蓯蓉酒浸　龍骨生各一兩
鷄膍胵燒灰　沉香鎊不見火各半兩

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

太乙金鎖丹（瑞竹堂方）

祕精益髓

五色龍骨　覆盆子各五兩　鷄頭子仁一百顆

蓮花蘂未開者陰乾四兩　鼓子花三兩（五月五日採之）
並爲末以金櫻子二百枚去毛木臼搗爛水七升煎濃汁一升去查和藥杵二千下丸梧子大每空心溫鹽酒下三十丸服之至百日末不瀉如要瀉以冷水調車前末半合服之忌葵菜

螽斯丸

婦人月經不調目昏頭運子宮久冷此藥溫中益氣有孕神效

人參　附子製　白茯苓　細辛各一兩　桂心
杜仲薑汁炒斷絲　防風　秦艽　厚朴　沙參
白薔薇　乾薑炮　牛膝　半夏各五錢
右爲細末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米飲或酒下已覺有孕便可止服

滋血煖宮丸

一名百子附歸丸凡陰陽不利氣血不足服此藥無不孕者

香附米十二兩童便浸一宿煮乾　當歸酒洗
川芎　白芍藥酒炒　眞阿膠蛤粉炒成珠

熟地黃酒洗　艾葉酢煑曬乾各二兩

右爲末酢糊丸梧桐子大每服百丸空心酢點湯送下食乾物壓之

濟陰丸

治婦人血虛挾火子宮乾澀不能攝精久無子服此滋陰養血有孕極妙

當歸　熟地黃　生地黃　川芎　芍藥各二兩

香附米八兩　人參八錢　肉桂七錢　黃芩一兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大食前米飲或溫酒送下五十丸

妙應丸

治婦人氣虛痰盛滿溢子宮不能受精肥胖婦人無子服此效

蒼朮米泔水浸酒炒　人參　黃芪蜜炙　橘紅

白朮土炒　地黃酒洗　半夏製　當歸酒洗

茯苓各一兩　滑石　炙甘草各七錢

右爲末糊丸梧桐子大每服五十丸空心薑湯下

續嗣降生丹

一名授仙方凡婦人稟弱胎臟虛寒服之必孕
當歸酒洗　桂心　烏藥　秦艽　吳茱萸
杜仲酒洗炒斷絲　龍骨　益智仁　茯神
乾薑半生半煨　川椒去目各一兩　防風
白芍藥　石菖蒲去毛　細辛土炒　桔梗
半夏製　牛膝酒浸各五錢　附子一枚重八錢臍
心取竅如皂角子大入朱砂一錢濕紙包裹煨
牡蠣大片者將童便浸四十九日每五日一換取出
用硫黃一兩爲末酒浸塗遍却將皮紙包用米醋浸
濕鹽泥固濟得厚候乾用炭五斤煅每一方只用二
兩餘收貯再用

右爲末取附子中朱砂畱爲衣酒米粉作糊丸梧
桐子大每服三十丸漸加至七十丸空心淡酢湯
下或溫酒鹽湯皆可

延年益嗣丹

滋補元氣益精黑髮
天門冬酒浸去心焙乾　麥門冬酒浸去心焙乾
人參各三兩　熟地酒蒸搗　生地焙乾各二兩

白茯苓酒浸曬乾　地骨皮酒洗淨各五兩

何首烏鮮者半斤

右將何首烏以竹刀刮去皮切作片乾者用泔水浸軟刮切砂鍋內用黑羊肉一斤黑豆三合量著水上加箄箄上放首烏羊肉爛爲度鍋蓋密勿令洩氣取起曬乾爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下

壬子丸

此藥要壬子日修合

白芨　白蘞　白茯苓各一兩　牛膝

細辛　菖蒲　白附子　桂心各五錢　厚朴

人參　當歸各四兩　乳香二兩　沒藥三兩

右爲細末煉蜜爲丸如豆大每服十丸空心溫酒送下

加味養榮丸

此藥能助婦人速孕且無小產之患

熟地黃　當歸酒洗　白朮各三兩　白芍藥

川芎　黃芩炒各兩半　人參　茯苓　香附子

陳皮去白　麥冬　貝母各一兩　炙甘草五錢
阿膠炒成珠七錢　黑豆四十九粒炒去殼
右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服八十丸食前溫
酒或鹽湯下忌食諸血

神效黑附丸

專治婦人久無孕育月經不調及數墮胎產甚效
香附米一斤分四製酒酢童便米泔各浸一日夜撈
起曬乾　綿艾葉去梗四兩用酢二大椀同香附一
處煑乾搗爛捻作錢大餅新瓦上焙乾研末
上品清煙墨火煆煙盡酢淬　熟地黃飯上蒸
當歸　川芎　人參　白茯苓　南木香各一兩
右爲末糊丸如梧桐子大每服五六十丸空心溫
酒送下

何首烏丸

治婦人無子
何首烏三斤竹刀切作片　牛膝一斤酒洗剉
右以黑豆一斗淘洗淨先以豆薄鋪甑底後薄鋪
何首烏又鋪豆又鋪牛膝重重鋪蓋安於釜上蒸

豆熟爲度去豆以藥曬乾又換豆依法蒸曬曬二次去豆取藥爲末蒸棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒下忌蘿蔔葱蒜

四製香附丸

調經養血順氣有孕

香附米一斤如前製　當歸酒洗　熟地黃酒洗　白芍藥酒炒　川芎各四兩　澤蘭葉　白朮　陳皮各二兩　黃蘗酒炒　甘草酒炒各一兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心白湯送下

神效百子丸

明淨硫黃一兩用銅銚甘草湯煮一日取出陰乾研如麵

右以糊丸如梧桐子大約二百粒每遇婦人月經過後空心酒下二十五丸次日下三十五丸三日下四十丸一百丸盡交合則受胎矣次日當不行經如復行經者又如法服前藥一百丸必有孕自後可服清熱養血之劑則胎固孕婦泰也此方百

發百中不可以其簡易而略之原夫受胎者要血熱硫黃亦只煖血耳或者云熱而有小毒先以甘草湯煮之所以製其性也孕後又服清熱凉血之劑得非淸其源乎製方如此可謂知道者矣

勝金丸

治婦人久虛無子及產前產後一切病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人無孕子宮冷如服二十日男女自至又治積年氣血手足麻痹半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心疼子死腹中繞臍作痛氣滿悶煩汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後痢疾消渴見鬼迷運敗血上衝寒熱頭疼面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人諸疾不問年深日近並日服之又名不換金丸又名女金丹

當歸酒洗　芍藥　川芎　人參　白朮土炒

白茯苓　炙甘草　白薇酒洗　白芷　赤石脂

牡丹皮　延胡索　桂心　藁本　沒藥各一兩

香附子酢浸三日炒香曬乾爲末一十五兩

右十六味除石脂沒藥另研外共爲末煉蜜和丸如彈子大銀器或磁器封固收貯每取七丸空心溫酒化下一丸食乾物壓之服至四十九丸爲一劑以癸水調平受妊爲度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸酢湯下尤妙

雞頭粥

多子神效

芡實肉一斗　蓮肉泡去皮心焙乾　鮮薏苡仁

乾山藥各一升　白粱米二升

右爲末依分和勻貯一處夏天以芡實三升爲主諸味遞減蓋恐久貯失氣故也每早空心將米湯和勻藥粉一二合用銀器調勻煮熟如糜粥加白糖二匙在內無銀鍋砂鍋亦可只不用銅鐵鍋或一二椀以代早粥服後不可間斷半年後有驗草石之藥不須再服專理脾胃則土旺能生萬物精

氣神皆由脾土而生未有脾土弱而精獨盛也土旺精盛自然有子此方看之殊覺平易諸方不能及嘗試有驗雖至老服之精神愈健

八珍益母丸

專治氣血兩虛脾胃並弱飲食少思四肢無力月經違期或先期而至或腰疼腹脹緩而不至或愆期不收或斷或續或赤白帶下身作寒熱服之罔不獲效一月之後卽可受胎虛甚者用藥一斤必能對期受孕

益母草四兩忌鐵器止用上半節帶葉者　人參

白朮土炒　茯苓　當歸酒洗　炙甘草　川芎

白芍藥酢炒　熟地黃酒洗各二兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大空心蜜湯下一丸如不能嚼者丸以細粒如小豆大每服七八十丸

脾胃虛寒者加砂仁一兩薑汁炒

腹中脹悶者加山楂一兩淨肉飯上蒸

多食者加香附子一兩童便製

八珍益母十全丸

資益坤元補養氣血除淋瀝帶下俾羸形體壯坐建調經受孕之功卽如樽俎折衝胎前和氣產後補虛眞婦女之聖劑超古今之妙方有室家者不可不知也

益母草五月五日或六月六日採陰乾用上半節連穗葉忌鐵器八兩　人參飯上蒸　白朮飯上蒸　白茯苓飯上蒸　白芍藥酢炒各一兩　甘草炙　川芎各五錢　當歸身酒浸　熟地酒浸各二兩　沉香四錢

右各爲極細末煉蜜和丸如梧桐子大空心蜜湯送下九十丸食乾果子壓之不善吞者化開服尤效冬月酒下婦女經脈不調者或有氣血兩虛而身體素弱服此以養血且調當年而經不通者服一料則通經不調者服一月則調素不孕者服一月卽孕

四物益母丸

治婦人經水不調小腹有塊時痛服此愈日卽孕

川當歸酒洗　熟地黃製各四兩　製香附一斤

川芎　白芍藥炒各一兩　益母草忌鐵器半斤

吳茱萸酒泡二兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸空心酒化下

如不喜化只作小丸吞服亦可

補腎種子黑髮烏鬚奇方

服過驗傳能令體肥身健固精旺氣

熟地八兩　當歸　柏子仁　楮實子酒浸（浮者不用）

五加皮　白茯苓　枸杞各三兩　山萸肉酒浸

冬青子　韭子微炒存性　巨勝子　旱蓮膏

菟絲子酒煮三日搗曬　覆盆子東流水浸一宿

沙苑蒺藜各四兩（如羊腎樣者）　肉桂　人參各一兩

何首烏六兩泔水浸去粗皮黑豆拌蒸（鮮者更佳只用一箇）

蓮蕊　川續斷去硬筋酒浸一時焙乾各二兩

升麻五錢

以上俱忌鐵器共爲細末煉蜜丸如梧子大每服六七十丸或百丸空心鹽湯白湯溫酒俱可熬旱蓮草膏法取旱蓮草不拘多少或百十斤搗汁用沙鍋熬成膏如沙糖樣磁碟曬乾

單方

立春日雨水夫妻各飲一杯還房當獲有子神效（藏器）

璧玉使人多精生子

石鍾乳久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服之令人淋（別錄）

陽起石治崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足（本經）

慈石鍊水飲之令人有子（別錄）

陽事不起慈石五斤研清酒漬二七日每服三合日

三夜一方（千金）

慈石毛令人有子宜入酒

陽事不起蛇牀子五味子菟絲子等分爲末蜜爲丸梧桐子大每服三十丸溫酒下日三服（千金下同）

陽事不起新五味子一斤爲末酒服方寸匕日三服忌猪魚葱蒜酢盡一劑即得力百日以上可御十女四時勿絕藥功能知

蓬虆安五臟益精氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老（本經）

離樓草主益氣力多子輕身延年生常山七月八月採實（別錄）

地耳明目益氣令人有子（別錄）

木麻久服令人有子（藏器下同）

枸杞蟲益陽道令人悅澤有子炙黃和地黃末爲丸服之大起陽益精

大人陰痿鯉魚膽雄雞肝各一枚爲末雀卵和丸小豆大每呑一丸（千金方）

陽事不起泥鰌煑食之（集簡方）

海馬暖水臟壯陽道消瘕塊治疔瘡腫毒（時珍）

瓦壟子溫中消食起陽（蕭炳）

黃雌雞肉治勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止洩精補水氣（日華）

益助陽氣丹雄雞冠血和天雄太陽粉各四分桂心二分丸服之（孟詵）

陰痿不起用雄雞肝三具菟絲子一升爲末雀卵和丸小豆大每服一百丸酒下日二（千金方）

英雞肉益陽道補虛損

瓦雀肉冬三月食之起陽道令人有子（藏器）

雀卵五月取之主治下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子（別錄）

雀卵和天雄菟絲子末爲丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕（孟詵）

蒿雀肉食之益陽道補精髓

石燕肉即土燕乳於巖穴中者壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴溫疫氣取石燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜臥時飲

一二盞甚能補益又令人健力能食

黃鸝肉補益陽氣助脾（汪穎）

腎虛陰痿羸瘦精衰少力用豶豬腎一對切片枸杞葉半斤以豉汁一盞用椒鹽煑羹食（經驗方）

黃犬肉補五勞七傷益陽事補血脈厚腸胃實下焦塡精髓和五味煑空心食之凡食犬不可去血則力少不益人（孟詵）

牡狗陰莖治傷中陰痿不起令强熱大生子（本經）

壯陽益腎用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙（心鏡）

白馬陰莖治傷中絕脈陰不起强志益氣長肌膚肥健生子益丈夫陰器陰乾同肉蓯蓉等分爲末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見效甄權曰主男子陰痿房中術偏用之

驢陰莖强陰壯筋（時珍）

男子陽虛鹿角霜白茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每服三十丸鹽湯下（梁氏總要）

鹿脂同蜜煎服壯陽道令人有子

麋角刮削酒服補虛勞添精益髓益血脉暖腰膝壯陽悅色療風氣偏治丈夫（日華）

山獺陰莖治陽虛陰痿精寒而清者酒磨少許服之獠人以爲補助要藥（時珍）

膃肭臍治男子宿癥氣塊積冷勞氣腎精衰損多色成勞瘦悴（藥性）

青蚨補中益陽道去冷氣令人悅澤（藏器）

種子烏鬚五加皮不拘多少銅刀刮去粗皮無灰酒浸一宿取出微炒爲細末不炒則瀉空服無灰酒下三五匙或用麪糊丸菉豆大每服七八十丸空心酒鹽湯白水任下化積氣去垢滯固腎健陽聰耳明目服未十餘日小便出汁稠粘此疾去也勿懼服月餘方見效五葉者良三葉四葉者次之（身經通考）

鹿杞膏用枸杞一斤入水鍋內桑柴煑以杞無味爲度去滓存汁再熬如麪糊入鹿膠一斤磁盂內重湯煑候筋挑一二尺高成線不斷取起俟稍凝切成片服時先用水頓化臨服酒調空心服初一錢漸加至二錢大能益壽助陽種子妙難盡述

鳳雛丸用頭窩烏骨雞雌雄一對放置一處養之勿與羣雞相混候生子時將初生子頂顛上畫一圈待生子數多抱時將初子照圈開竅用辰砂三錢當歸芍藥川芎熟地黃各二錢爲末將雞子黃傾出調和藥末仍入殼內盛不盡時另又裝一殼俱封之以厚紙於衆子內同抱雞出時將藥子取起去殼用煉蜜和藥丸空心好酒送下三四十丸藥盡有孕（醫統）

導引

千金方房中補益論曰人生四十已下多有放恣四十已上卽頓覺氣力一時衰退衰退既至衆病蜂起久而不治遂至不救所以彭祖曰以人療人眞得其眞故年至四十須諳房中之術夫房中術者其道甚近而人莫能行其法一夕御十人閉固爲謹此房中之術畢矣兼之藥餌四時勿絕則氣力百倍而智慧日新然此方之作也非欲務於淫佚苟求快意務存節欲以廣養生也非苟欲强身以淫女色以縱情意

在補益以遣疾也此房中之微旨也是以人年四十已下即服房中之藥者皆所以速禍慎之慎之故年未滿四十者不足與論房中之事欲心未止兼餌補藥倍力耗喪不過半年精髓枯竭惟向死近少年極須慎之人年四十已上常固精養炁不耗可以不老又餌雲母足以愈疾延年人年四十已上勿服瀉藥常餌補藥大佳昔黃帝御女一千二百而登仙而俗人以一女伐命知與不知豈不遠歟其知道者御女苦不多耳凡婦人不必須有顏色妍麗但得少年未經生乳多肌肉益也若足財力選取細髮目睛黑白分明體柔骨軟肌膚細滑言語聲音和調四肢骨節皆欲足肉而骨不大其體及腋皆不欲有毫有毫當軟細不可極於相者但蓬頭蠅面槌項結喉雄聲大口高鼻麥齒目睛渾濁口頷有毫骨節高大髮黃少肉隱毫多而且強又生逆毫此相不可皆賊命損壽也凡御女之道不欲令氣未感動陽氣微弱即以交合必須先徐徐調和使神和意感良久乃可令得陰氣陰氣推之須臾自強所謂弱而內迎堅急出之進

退欲令疎遲情動而止不可高自投擲顛倒五臟傷絕精脉生致日病但數交而慎密者諸病皆愈年壽日益去仙不遠矣不必九一三五之數也能百接而不施瀉者長生矣若御女多者可採氣採氣之道但深接勿動使良久氣上面熱以口相當引取女氣而吞之可疎疎進退意動便止緩息瞑目偃臥道引身體更強可復御他女也數數易之則得益多人常御一女陰氣轉弱爲益亦少陽道法火陰道法水水能制火陰亦消陽久用不止陰氣逾傷陽則轉損所得不補所失但能御十二女而不復施瀉者令人不老有美色若御九十三女而自固者年萬歲矣凡精少則病精盡則死不可不思不可不慎數交而一瀉精氣隨長不能使人虛也若不數交交而卽瀉則不得益瀉之精氣自然生長但遲微不如數交接不瀉之速也凡人習交合之時常以鼻多內氣口微吐氣自然益矣交會畢蒸熱是得氣也以菖蒲末三分白粱粉傳磨令燥既使強盛又濕瘡不生也凡欲施瀉者當閉口張目閉氣握固兩手左右上下縮鼻取氣又

縮下部及吸腹小偃脊脅急以左手中指掩抑屏翳穴長吐氣并琢齒千遍則精上補腦使人長生若精妄出則損神也仙經曰令人長生不老先與女戲飲玉漿玉漿口中津也使男女感動以左手握持思存丹田中有赤氣內黃外白變爲日月徘徊丹田中俱入泥垣兩半合成一咽閉氣深內勿出入但上下徐徐咽氣情動欲出急退之此非上士有智者不能行也其丹田在臍下三寸泥垣者在頭中對兩目直入內思作日月想合徑三寸許兩半放形而一謂日月相翕者也雖出入仍思念所作者勿廢爲佳又曰男女俱仙之道深內勿動精思臍中赤色大如鷄子形乃徐徐出入情動乃退一日一夕可數十爲定令人益壽男女各息意共存思之可猛念之御女之法能一月再瀉一歲二十四瀉皆得二百歲有顏色無疾病若加以藥則可長生也人年二十者四日一瀉三十者八日一瀉四十者十六日一瀉五十者二十日一瀉六十者閉精勿瀉若體力猶壯者一月一瀉凡人氣力自有盛而過人者亦不可抑忍久而不瀉致

生癰疽若年過六十强有數旬不得交合意中平平者自可閉固也昔正觀初有一野老年七十餘詣余云數日來陽氣益盛思與家嫗晝寢春事皆成未知垂老有此爲善惡耶余答之曰是大不祥子獨不聞膏火乎夫膏火之將竭也必先暗而後明明止則滅今足下年邁桑榆久當閉精息欲茲忽春情猛發豈非反常耶竊爲足下憂之子其勉歟後四旬發病而死此其不愼之效也如斯之輩非一且疏一人以勖將來耳所以善攝生者凡覺陽事輒盛必謹而抑之不可縱心竭意以自賊也若一度制得則一度火滅一度增油若不能制縱情施瀉卽是膏火將滅更去其油可不深自防所患哉人少年時不知道知道亦不能信行之至老乃知道便已晚矣病難養也晚而自保猶得延年益壽若年少壯而能行道者神仙速矣或曰年未六十當閉精守一爲可否曰不然男不可無女女不可無男無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念眞正無可思者則大佳長生也然而萬無一有强抑鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致

鬼交之病損一而當百也

古今醫統多男三鍊法曰天地閉萬物匝男女祕百嗣發閉祕之法不可傳傳之匪人天必罰

閉者閉藏之義在天地如冬時氣化畜藏不施在人如固閉精氣一不妄洩故萬物百嗣生育之多也此二儀闔闢之機品物流形之妙天人感通生成一道上達自能心悟下士不可言傳

左右掌連心心火暗能達分主客各相擦

言手心與心脉相通右手掌擦左手心則左爲主而右爲客左手掌擦右手心則右爲主而左爲客此乃運火於臍之術心火歸臍與腎相接合和而不走則坎離交媾眞元自固而谷神可靈矣夫谷神者虛而能應感而遂通者也谷神靈則劍氣剛勁谷神弱則劍氣鋒委此男女相感機氣發動自然之妙

數用重陰六十八須知十減四七五

此相擦之數也如一遍六十八二遍五十八三遍四十八四遍三十八五遍二十八是擦以十減五

遍遞減至四七之數也其遍至七八九遍皆擦一十八遍而止

莫教火候過離下

離屬心離下則屬腎言勿使火太過反動精也

一擦一度伏臍間九九老陽互相壓又知九息上增九八十一息純乾卦

言擦一次即將手伏壓臍中令熱氣入臍中鼻中呼吸每次九息是息以九增如一遍九息二遍十八三遍二十七九遍漸增至八十一息也乾數用九九九九則爲純乾之卦心火屬陰故擦用重陰腎氣屬陽故息取老陽其法於子後入室盤坐良久心定氣平以左手仰置左膝上用右手心擦之六十八遍即以左手心伏於臍間而以右手壓於左手之上鼻中呼吸九息用意存想使息息歸臍此第一度却以右手仰置右膝上用左手心擦之減十遍即五十八遍即以右手心伏於臍間而以左手壓於右手之上鼻中呼吸增九息成一十八息亦用意存想使息息歸臍此第二度以後左右換

手上下伏壓存想俱同但擦以十減壓以九增共九度而足如此四十九日祖氣足方可取鼎

春夏秋冬名四時二十四氣尸生化三五七九奪氣機一奪一吸深取之周而復始天不違

此房中之術言採奪女氣之機也三五七九皆陽數言與女交時但至四數皆深入其中上以鼻吸下以脅提而奪取之是女之氣過我也周而復始者三五七九既畢而又再從三起也周天之數三百六十三五七九共二十四數以合二十四氣交時先仰行六遍每遍二十四得數百四十有四後合行九遍每遍亦二十四得二百一十有六共成三百六十以合周天之數此妙理也仰合卽天地否泰男女上下互相迭施之道

坎水常勝離離火易焚滅仙草占先春得陽陰復結濃煎濕注叅仙訣離火纔欲然滿口莫入咽漱無聲吐無決煖蓆取溺壺徐將肝火瀉心慵作曝蟆虛脊凡七跌功成敵萬人眞元莫浪洩

離火易焚者言男子之精易動待其將動之時卽

將濃濃溫茗滿口含之緩漱慢吐不可使耳聞之又取夜壺小便以瀉肝火又作蝦蟆仰曝之狀以兩足兩手著牀席舉脊向上跌凡七次則精卽上升而不走矣

要算坎水潮生月信進我退投月信退我進接一二鍊法不可缺更有一言須口說左男右女肩間截

言遇女子癸水生時必俟其三日潮退方與之交合一二鍊法指奪氣機等法而言左男右女肩間截者此生男之訣也女子懷胎在左爲男在右爲女男子將洩之精必要向女子偏左施之仍以手向女子左肩上截一掌女子左邊氣卽上縮精髓入左必胎男矣

此是多男三鍊法六鍊可長生九鍊能飛越約爾他年逢建業

陰陽二氣之運坎離八卦之門天地之大盡於是焉天地生人物之散殊亦盡於是焉故離火易然坎水易竭陰陽動靜雜揉不齊眞元不固谷神不靈矣茲三鍊法易謂天地絪緼萬物化醇非天人

合一耶

採陰訣樹衰培土陽衰陰補含育元氣愼莫失度（註云）（無情）若木至衰朽卽塵土培之尚得再榮又見以嫩枝接續老樹亦得長生却爲芳嫩用意推理陽衰陰補是以宜之衰陽以少陰補而不失取其元氣津液引於我身卽顏復童矣童男少女正氣未散元和纔一遇之修煉其益百倍切忌自己元氣流奔也

醫案

褚氏遺書曰建平王妃姬等皆麗而無子擇良家未笄女入御又無子問曰求男有道乎澄對之曰合男女必當其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽氣完實而後交合則交而孕孕而育育而爲子堅壯强壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早瀉未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者

大王誠能訪求多男婦人謀置宮府有男之道也王曰善未再朞生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

身經通考曰王完虛公服萬靈至寶仙酒兩月隨獲三胎三僕服之皆孕內一人六十婦五十二矣已絕產念二年亦孕則尤異也鄒平縣一人精清無子服之生一男

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十五卷目錄

醫部彙考三百三十五

傷寒門一

黃帝素問 上古天眞論　生氣通天論　熱論

靈樞經 邪氣臟腑病形篇　熱病篇　論勇篇
百病始生篇

扁鵲難經 外感

張機傷寒論 太陽經上篇

藝術典第三百五十五卷

醫部彙考三百三十五

傷寒門一

黃帝素問

上古天眞論

上古聖人之教下也皆謂之虛邪賊風避之有時恬惔虛無眞氣從之精神內守病安從來

註 上古之人得聖人之教化內修養生之道外避賊害之邪所以年皆度百歲而動作不衰

生氣通天論

因於寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮

註 因於寒而吾身之陽氣當如運樞以外應邪客在門故起居如驚而神氣乃浮出以應之

故風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此因時之序也

註 此因四時之序而能順養者也

風客淫氣精乃亡邪傷肝也

註 風爲陽邪客於膚表則淫傷於氣陽氣傷則陰寒精自出風木之邪內通肝氣肝主藏血肝氣受邪則傷其血矣

因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣畱連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥冬傷於寒春必病溫

註 陰陽不能固密則在天陰陽之邪傷吾身之陰陽而爲寒熱病矣洞泄上逆而欬乃陰陽上下之相乘也痎瘧溫病乃陰陽出入之氣也

熱論

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也不知其解願聞其故岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死

註 外淫之邪始傷表陽皆得陽氣以化熱故曰凡病熱者皆傷寒之類也死於六七日之間者六經之氣已終而不能復也愈於十日已上者七日不作再經十三日六氣已復故愈本寒邪而反爲熱病反以凉藥治之是病太陽之標熱而不病天之陰寒是以熱雖甚不死也傷寒一日太陽受之二日陽明三日少陽是陰寒之邪得陽氣以化熱雖傳入於三陰而亦爲熱病七日來復於太陽不作再經而其病自愈若兩感於寒者陰陽交逆榮衞不通故不免於死

帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊强二日陽明受之陽明主肉其脉俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也三日少陽受之少

陽主膽其脈循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衞不行五臟不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚔十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

註太陽之氣主皮毛故傷寒一日太陽受之陽氣在上故頭項痛背爲陽故腰脊強陽明之氣主肌肉身熱者病陽明之氣也病雖在氣而陽明之脈俠鼻絡目屬胃故目疼鼻乾胃不和故不得臥也少陽之氣主樞主膽膽氣升則諸陽之氣皆升胷脅痛而耳聾者病在氣而見有形之經證也三陽皆受邪熱之病然在形身之外而未入於裏陰故

可汗而解也六氣相傳雖入於裏陰而皆爲熱證故嗌乾而口燥渴也厥陰木火主氣故煩滿脉循陰器故囊縮榮衞血氣皆傷以致臟腑俱病故不免於死若止於氣分相傳六日已周七日來復則漸愈也

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其臟脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

註 病傳六氣故當調其六經經氣和調則榮衞運行而不內干臟腑矣前三日在陽分故當從汗解後三日在陰分故當從下解

帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣

註 脉浮者以汗解之脉沉者以下解之是謂調其逆從也

帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死

註 表裏陰陽俱受其邪臟腑皆病榮衞不行故盡氣終而死也

帝曰五臟已傷六腑不通榮衞不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑暑當與汗皆出勿止

註 榮衞血氣臟腑精神皆陽明之所資生如胃氣先絕者不待六氣之終三日乃卽死矣凡傷於寒則爲熱病者此卽病之傷寒也如邪氣留連而不卽病至春時陽氣外出邪隨正出而發爲溫病

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

黃帝問於岐伯曰邪氣之中人也奈何岐伯答曰邪氣之中人高也黃帝曰高下有度乎岐伯曰身半以上者邪中之也身半以下者濕中之也故曰邪之中人也無有常中於陰則溜於腑中於陽則溜於經

註 邪氣者風雨寒暑天之邪也故中人也高濕乃水土之氣故中身半以下然無有恆常或中於陰或中於陽或溜於經或溜於腑或入於臟

黃帝曰陰之與陽也異名同類上下相會經絡之相貫如環無端邪之中人或中於陰或中於陽上下左右無有恆常其故何也岐伯曰諸陽之會皆在於面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中於邪中於面則下陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽其中於膺背兩脅亦中其經黃帝曰其中於陰奈何岐伯答曰中於陰者常從臂胻始夫臂與胻其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷於陰黃帝曰此故傷其臟乎岐伯答曰身之中於風也不必動臟故邪入於陰經則其臟氣實邪氣入而不能容故還之於腑故中陽則溜於經中陰則溜於腑

註 上下左右頭面手足也或在頭面而中於陽或在背胻而中於陰故無有常恆也諸陽之會皆在於面者精陽之氣皆上於面而走空竅也中於面則下陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽此三陽絡脈所循之處外之皮膚即三陽之分部下者謂三陽皮部之邪下入於三陽之經故曰中於陽則溜於經臂胻者手背足胻之內側乃三陰絡脈所循之處外側爲陽內側爲陰其陰皮薄其肉淖澤故中於陰者常從臂胻始邪入於經其臟氣實邪氣入而不能容故還之於腑散於腸胃陽明居中土爲萬物之所歸邪歸於陽明之腸胃而無所復傳矣

黃帝曰邪之中人臟奈何岐伯曰愁憂恐懼則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不下積於脅下則傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎黃帝曰五臟之中風奈何岐伯曰陰陽俱感邪乃

得往黃帝曰善哉

註　夫邪中於陰而溜腑者臟氣實也臟氣者神氣也神氣內藏則血脈充盛若臟氣內傷則邪乘虛而入矣風爲百病之長善行而數變陰陽俱感外內皆傷也

黃帝曰邪之中人其病形何如岐伯曰虛邪之中身也灑淅動形正邪之中人也微先見於色不知於身若有若無若亡若存有形無形莫知其情黃帝曰善哉

註　虛者八正之虛邪氣形者皮肉筋脈之有形

熱病篇

熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治

熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病者脈尚躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生

註　外雖汗出而裏熱不解此內熱之極也死其得汗而脈靜者熱已清而脈平和故生熱病者脈尚

躁病外因之熱而及於經也不得汗者不得從乎外解此外熱之極也故死脉盛躁得汗而脉靜者外淫之邪從表汗而散故生

論勇篇

黃帝問於少俞曰有人於此並行並立其年之長少等也衣之厚薄均也卒然遇烈風暴雨或病或不病或皆病或皆不病其故何也少俞曰帝問何急黃帝曰願盡聞之少俞曰春青風夏陽風秋凉風冬寒風凡此四時之風者其所病各不同形黃帝曰四時之風病人如何少俞曰黃色薄皮弱肉者不勝春之虛風白色薄皮弱肉者不勝夏之虛風青色薄皮弱肉不勝秋之虛風赤色薄皮弱肉不勝冬之虛風也黃帝曰黑色不病乎少俞曰黑色而皮厚肉堅固不傷於四時之風其皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風者病矣其皮厚而肌肉堅者長夏至而有虛風不病矣其皮厚而肌肉堅者必重感於寒內外皆然乃病

註 薄皮弱肉則臟眞之氣虛不能勝四時之虛風

矣不傷於四時之風者謂土旺於四季也不病長夏之風者謂土主於長夏也設有皮厚肉堅而傷於四時之風者必重感於寒也

百病始生篇

黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫泆不可勝數

註　清氣在下者言清濕地氣之中人也必從足始故清氣在下也是風雨清濕之邪病在外而傷於形之上下喜怒不節則傷臟而病起於陰

扁鵲難經

外感

何以知中風得之然其色當赤何以言之肝主色自入爲青入心爲赤入脾爲黃入肺爲白入腎爲黑肝

爲心邪故知當赤色其病身熱脅下滿痛其脉浮大而弦

何以知傷寒得之然當譫言妄語何以言之肺主聲入肝爲呼入心爲言入脾爲歌入腎爲呻自入爲哭故知肺邪入心爲譫言妄語也其病身熱灑灑惡寒甚則喘欬其脉浮大而濇

傷寒有幾其脉有變否然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脉陽浮而滑陰濡而弱濕溫之脉陽浮而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱盛而緊濇熱病之脉陰陽俱浮浮之而滑沈之散濇溫病之脉行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之

傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之卽死陽盛陰虛汗出而死下之而愈

漢張機傷寒論

太陽經上篇（凡風傷衛之證列於此篇法五十三條）

喻昌曰王叔和當日編次仲景傷寒論以辨痙濕

暍脈證爲第一以辨太陽病脈證爲第二謂痙濕暍雖太陽經之見證然宜應別論故列之篇首此等處最不妥當豈有別論反在正論之前者况既應別論即當明言所指而故虛懸其篇此叔和不究心之弊也至於太陽經中一槩混編合病併病溫病壞病過經不解病以及少陽諸病如理棼絲不清其脈寸寸補接所以不適於用徒令觀者嘆息此更叔和不究心之弊也宋林億成無己輩以脈法及傷寒例居前次痙濕暍次太陽病分上中下三篇其意以桂枝證麻黃證彙上篇大青龍證及汗後下後諸證彙中篇結胷及痞證彙下篇究竟上篇混中下下篇混上中不能清也更可笑者下篇結胷例中凡係結字一槩收入如陽微結陰微結脈代結之類悉與結胷同彙尤可笑者上篇第六條傷寒大義未及什一何所見即彙溫病中篇下篇太陽本證未及什七何所見即彙少陽證及合病併病過經不解諸病如此割裂原文後人縱思研窮無門可入矣夫足太陽膀胱病主表也

而表有營衛之不同病有風寒之各異風則傷衛寒則傷營風寒兼受則營衛兩傷三者之病各分疆界仲景立桂枝湯麻黃湯大青龍湯鼎足大綱三法分治三證風傷衛則用桂枝湯寒傷營則用麻黃湯風寒兩傷營衛則用大青龍湯用之得當風寒立時解散不勞餘力矣乃有病在衛而治營病在營而治衛病在營衛而治其一遺其一與夫病已去營衛而復汗病未去營衛而誤下以致傳經錯亂展轉不已源頭一差末流百出於是更出種種節目輔三法而行正如八卦之有六十四卦八陣之有六十四陣分統於乾坤震巽坎離艮兌天地風雲龍虎鳥蛇之下始得井井不紊仲景參伍錯綜以盡病之變態其統於桂枝麻黃青龍三法夫復何疑但文辭奧約義例互陳雖顓敏之士讀之不解其意實繇當時編次潦草糊塗不察來意仲景一手一目現爲千手千目編者反將千手千目掩爲一手一目悠悠忽忽沿習至今昌不得已而僭爲尚論太陽經中仍分三篇以風傷衛爲

上篇寒傷營爲中篇風寒兩傷營衛爲下篇一一以膚淺之語括大義於前明奧旨於後其溫病合病等名逐段清出另立篇目俾讀者了無疑惑於心庶隨所施而恰當矣

太陽之爲病脉浮頭項强痛而惡寒

註先挈太陽病之總脉總證統中風傷寒爲言也太陽膀胱經乃六經之首主皮膚而統營衛所以爲受病之始

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

註風爲陽衛亦陽故病起於陽寒爲陰營亦陰故病起於陰無熱惡寒指寒邪初受未鬱爲熱而言也少頃鬱勃於營間則仍發熱矣病發於陽其愈宜速乃六日傳經已盡必至七日方愈者陽數七主進故也病發於陰其愈宜遲乃至六日經盡即愈者陰數六主退故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也

若欲再作經者鍼足陽明使經不傳則愈

註 七日而云已上者該六日而言也六日傳至厥陰六經盡矣至七日當再傳太陽病若自愈則邪已去盡不再傳矣設不愈則七日再傳太陽八日再傳陽明故鍼足陽明以竭其邪乃得不傳也在他經則不然蓋陽明中土萬物所歸無所復傳之地邪易解散故耳然必鍼以竭其邪始得歸併陽明不犯他界也舊謂奪其傳路而遏之則經經皆可遏矣何獨取陽明也哉

太陽病欲解時從巳至未上

註 凡病欲解之時必從其經氣之王太陽者盛陽也故從巳午未之王時而病解

欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脉浮故知汗出解也

註 天地鬱蒸而雨作人身煩悶而汗作氣機之動也氣機一動其脉必與其證相應故脉浮而邪還於表纔得有汗而外邪盡從外解設脉不以浮應則不能作汗其煩即爲內入之候又在言外矣已

上四條先挈太陽經始病終愈風寒之總法

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名爲中風

註　既有第一條脉浮頭項強痛惡寒之總證更加發熱汗出惡風脉緩則其病乃是觸冒於風所致即名中風中字與傷字無別即謂傷風亦可風性屬陽從衞而入以衞爲陽氣所行之道從其類也此一條又中風病之總稱以後凡言中風病三字而發熱汗出惡風脉緩即括在內

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

註　陽浮陰弱與下文衞強營弱同義陽浮者陽邪入衞脉必外浮陽性本熱風又善行所以發熱快捷不待閉鬱自發也陰弱者營無邪助比衞不足脉必內弱陰弱不能內守陽強不爲外固所以致汗直易不待覆蓋自出也嗇嗇惡寒內氣餒也淅淅惡風外體疎也雖寒與風並舉義重惡風惡風未有不惡寒者所以中篇傷寒證中亦互云惡風

又見惡寒未有不惡風者後人相傳謂傷風惡風傷寒惡寒苟簡辨證誤人多矣翕翕發熱乃氣蒸濕潤之熱比傷寒之乾熱不同息鳴者陽邪上壅也乾嘔者陽邪上逆也故取桂枝湯解散肌表之陽邪而與發汗驅出陰寒之法迥乎角立也

服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗重服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一晝一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

註 桂枝氣味俱薄服過片頃其力即盡所以能解肌者妙用全在歠稀熱粥以助藥力穀氣內充則邪不能入而熱歠以繼藥之後則邪不能留法中之法若此按衛行脈外風傷衛之證皆傷其外外者肌膚也故但取解肌以散外不取發汗以內動血脈更不取攻下以內動臟腑所以服桂枝時要

使周身漐漐然似乎有汗者無非欲其皮間毛竅暫開而邪散也然恐藥力易過又藉熱稀粥以助其煖如此一時之久肌竅不致速閉則外受之邪盡從外解允爲合法矣不識此意者汗時非失之太過卽失之不及太過則邪未入而先擾其營甚則汗不止而亡陽不及則邪欲出而早閉其門必致病不除而生變

桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也當須識此勿令誤也

註已見寒傷營之脈證卽不可誤用風傷衛之治法用之則寒邪漫無出路留連肉腠貽患無窮故爲首禁

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

註桂枝辛甘本胃所愛服之反吐其人濕熱素盛可知矣濕熱更服桂枝則兩熱相合滿而不行勢必上逆而吐吐逆則其熱愈淫溢於上焦蒸爲敗濁故必吐膿血此一大禁也其誤服未至於吐者上焦清氣未傷熱雖漸消亦蹈險矣

酒客病不可與桂枝得湯則嘔以酒客不喜甘故也

註　酒爲濕熱之最故卽於上條文意重引酒客以示戒嘔吐乃互詞勿泥按辛甘發散爲陽內經之旨也仲景遵之製方重申辛甘之戒可謂慮周千變矣如酒客平素濕與熱搏結胷中纔挾外邪必增滿逆所以辛甘之法不可用用辛凉以徹其熱辛苦以消其滿自不待言矣後人不察偏詆桂枝爲難用葛根雖酒客所宜然犯太陽經禁又不可用

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止

註　此一條從來諸家錯會扯入桂枝四禁謂已用桂枝致逆若更用桂枝則其變愈大粗疎極矣蓋爲逆是言水逆未嘗說到其變愈大爲凶逆也且原文不云更與桂枝而云更發汗者見水藥俱不得入則中滿已極更發汗以動其滿凡是表藥皆可令吐下不止不獨是桂枝當禁所以仲景於太陽水逆之證全不用表藥惟用五苓散以導水服後隨漑熱湯以取汗正與此條互相發明也設只

單禁桂枝將麻黃葛根柴胡等類在所不禁而誤用以致吐下不止恬不知爲犯禁矣

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

註　頭痛見第一條發熱汗出惡風見第六條重互其文以叮嚀辨證用法首宜識此也

太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

註　浮弱卽陽浮陰弱之謂外證未解脉見浮弱卽日久必當以汗解然汗解必當遵桂枝湯之法不可誤行發汗之法也至於不可誤下更不待言

太陽病發熱汗出者此爲營弱衛强故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯主之

註　衛得邪助而强營無邪助故爲弱也卽前陽浮陰弱之義而重挈明之耳須知營弱與血虛無涉邪風卽風邪勿鑿看

病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者此爲衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

註　臟無他病四字櫽括人身宿病卽動氣不可發汗亦在內見裏無病而但表中風邪乃有汗出不

愈者必是衞氣不和也設入於營則裏已近災未可宴然稱無病矣時發熱者有時發熱有時不熱也故先於未發熱時主用解肌之法邪自不留也病嘗自汗出者此爲營氣和營氣和者外不諧以衞氣不共營氣和諧故爾以營行脈中衞行脈外復發其汗營衞和則愈宜桂枝湯

註　此明中風病所以衞受邪風營反出汗之理見營氣本和但衞强不與營和復發其汗俾風邪從肌竅外出斯衞不强而與營和正如中酒發狂酒去其人帖然矣營受寒邪不與衞和宜麻黃湯亦然

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈

註　中風之證凡未傳變者當從解肌舍解肌無別法也然服桂枝湯以解肌而反加熱悶者乃服藥時不如法也其法維何即歠熱稀粥以助藥力不使其不及但取周身漐漐微似有汗不使其太過之謂也此云服湯反煩者必微似汗亦未得肌竅

未開徒用藥力引動風邪漫無出路勢必內入而生煩也刺風池風府以瀉風熱之暴甚後風不繼庶前風可熄更與桂枝湯引之外出則愈矣可見解肌當如法也

風家表解而不了了者十二日愈

註風家表解已用桂枝湯之互詞也用桂技湯表解已勝其任矣而不了了者風爲陽邪衛爲陽氣風邪雖去而陽氣之擾攘未得遽寧即欲治之無可治也七日不愈俟十二日則餘邪盡出正氣復理必自愈矣見當養靜以需不可喜功生事也已

上七條曲盡用桂枝湯妙義一條辨用桂枝之證二條辨用桂枝之脈三條辨衛強營弱宜用桂枝兩和營衛四條辨衛氣不和宜在未發熱前用桂枝和衛五條辨營氣不和宜仍用桂枝和衛六條辨陽邪熾盛服桂枝轉煩者先刺風穴再行桂枝七條辨用桂枝表已解宜俟勿藥

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之多服煖水汗出愈

註 傷風證原有汗以其有汗也延至日久不行解肌之法汗出雖多徒傷津液表終不解轉增煩渴邪入於腑飲水則吐者名曰水逆乃熱邪挾積飲上逆以故外水格而不入也服五苓散後頻溉熱湯得汗則表裏俱解蓋表者陽也裏之屬腑者亦陽也所以一舉兩得也然亦以未經誤治邪不內陷故易爲力耳

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

註 不行解肌反行發汗致津液內耗煩躁不眠求救於水若水入不解脉轉單浮則無他變而邪還於表矣脉浮本當用桂枝何以變用五苓耶蓋熱邪得水雖不全解勢必衰其大半所以邪既還表其熱亦微兼以小便不利證成消渴則腑熱全具故不從單解而從兩解也凡飲水多而小便少者謂之消渴裏熱熾盛何可復用桂枝之熱故導濕滋乾清熱惟五苓有全功耳

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之

註此本爲誤服大青龍湯因而致變者立法然陽虛之人纔發其汗便出不止卽用麻黃火刧等法多有見此證者所以仲景於桂枝湯中垂戒不可令如水流漓益見解肌中且有逼汗亡陽之事矣太陽下篇大青龍證中垂戒云若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤正與此段互發振振欲擗地五字形容亡陽之狀如繪諸家竟不加細繹妄取詩經註擗拊心貌爲解噫是何言歟仲景論中心下悸欲得人按與夫叉手自冒心間且與拊心之義不協何得妄指擗地爲拊心耶蓋擗者闢也避也汗出過多衞氣解散其人似乎全無外廓故振振然四顧彷徨無可置身思欲闢地而避處其內也陰證似陽者欲坐井中避熱就冷也汗多亡陽者欲入土中避虛就實也試觀嬰孩出汗過多神虛畏怯嘗合面偎入母懷者豈非振振欲擗地之一驗乎從來皆以爲驚風誤治實

繇未透傷寒證中之大關耳

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

註　大發其汗致陽氣不能衛外爲固而汗漏不止卽如水流漓之互詞也惡風者腠理大開爲風所襲也小便難者津液外泄而不下滲兼以衛氣外脫而膀胱之化不行也四肢微急難以屈伸者筋脈無津液以養兼以風入而增其勁也此陽氣與陰津兩亡更加外風復入與前條亡陽一證微細有別故用桂枝加附子以固表驅風而復陽斂津也

太陽病中風以火刼發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿而喘口乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治

註　風陽也火亦陽也邪風更被火熱助之則血氣沸騰所以失其常度熱勢瀰漫所以蒸身爲黃然

陽邪盛於陽位者尚或可從衄解可從汗解至於陽邪深入陰分勢必劫盡精津所以劑頸以下不能得汗口乾咽爛肺焦喘促身體枯燥小便難大便祕手足擾動譫妄噦逆乃是一團邪火內熾眞陰頃刻立盡之象有非藥力所能勝者必其人小便尚利陰未盡傷始得以行驅陽救陰之治也噫亦危矣按仲景以小便利一端辨眞陰之亡與未亡最細蓋水出高源小便利則津液不枯肺氣不逆可知也腎以膀胱爲腑小便利則膀胱之氣化行腎水不枯可知也再按此證陽邪挾火擾亂陰分而亡其陰與前二條亡陽證天淵懸絕觀陽盛欲衄身體枯燥等語明是失汗所致失汗則陽必內入何反外亡耶註家泥陰陽俱虛竭一語遂謂小便利者陰未甚虛則陽猶可回是認可治爲回其陽大失經旨不知此證急驅其陽以存陰氣之一綫尚恐不得況可回陽以更劫其陰乎且頭汗乃陽邪上壅不下通於陰所以劑頸以下不能得汗設見衄血則邪從衄解頭間且無汗矣設有汗

則邪從汗解又不衄矣後條火邪深入必圊血一證亦似身體枯燥而不得汗者必致圊血設有汗便不圊血矣讀古人書全要會意豈有得汗而加衄血圊血之理哉又豈有遍身無汗而頭汗爲亡陽之理哉

太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者此爲欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞕小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也

註　火邪入胃中十餘日不解忽振慄自下利者火邪從大腸下奔其候本爲欲解然而不解者以從腰已下不得汗邪雖下走終不外走故不解也上條從頸已下不得汗其勢重此從腰已下不得汗其勢較輕足下惡風見陽邪在下也小便不得見陽邪閉拒陰竅也與不得汗正同所以大便亦鞕益見前之下利爲火勢急奔火勢衰減則仍鞕也反嘔者邪欲從上越也欲失溲者邪欲從前陰

出也皆餘邪欲散之徵也胃火既滅小便當數復不數則津液可回及至津回腸潤則久積之大便必盡出矣大便出多則小便之當數者始數矣腸胃之間邪熱既散而不留則腰已下之得汗並可知矣得汗則陰分之陽邪盡從外解然後身半已下之陰氣得上而反頭痛身半已上之陽氣得下而反足心熱欲愈之狀尚類病狀火邪助虐爲何如哉

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血名爲火邪

註火邪入胃胃中水液多者必奔迫下利其漸解悉如上條矣若胃中津液素乏之人復受火邪則漫無可禦必加躁擾不寧繇是深入血室而圊血也蓋陽邪不從汗解得以襲入陰中動其陰血倘陽邪不盡其圊血必無期止故申之曰名爲火邪示人以治火邪而不治其血也

微數之脈愼不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

註　脉微而數陰虛多熱之徵也此而灸之則虛者益虛熱者益熱不至傷殘不止矣凡病皆然不獨傷寒宜戒也

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加桂湯更加桂

註　奔豚者腎邪也腎邪一動勢必自少腹上逆而衝心狀若豕突以北方亥位屬猪故也北方腎邪惟桂能伐之所以用桂三倍加入桂枝湯中外解風邪內泄陰氣也嘗即此例推之凡發表誤入寒藥服後反加壯熱肌膚起赤塊畏寒腹痛氣逆而喘者或汗時蓋覆未周被風寒復侵紅腫喘逆其證同者用此法良驗

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中饑口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致此爲小逆

註　解肌之法解散肌表風邪全不傷動脾胃乃天

然不易之法也若舍此而妄用吐法吐中亦有發散之義故不惡寒發熱一二日病在太陽吐之則腹中饑口不能食三四日病在陽明吐之則不喜糜粥欲食冷食皆胃氣受傷之故也然且朝食暮吐脾中之眞陽亦傷而不能消穀是則外感雖除脾胃內傷卒未易復故爲小逆也

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也

註 此以吐而傷胃中之陰較上條兩傷脾胃之陰陽者稍輕故內煩不欲近衣雖顯虛熱之證比關上脉細數已成虛熱之脉者亦自不同然以吐而傷其津液雖幸病不致逆醫者能無過乎可見用吐法時亦當相人之津液矣

太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之

註 下之爲逆卽指結胸等證而言欲解外者必無出桂枝一法叮嚀無已之辭也外邪未解下必爲逆然則欲下未下之時亟解其肌俾下之而不爲

逆也不亦可乎

太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宐桂枝湯主之

註 已下其脉仍浮證未增變者仍當亟解其外

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

註 誤下而陽邪下陷然無他變但仍上衝陽位則可從表裏兩解之法故以桂枝湯加於前所誤用下藥之內則表邪外出裏邪內出即用桂枝大黄湯之互詞也若不上衝則表裏兩解之法不可與也

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之

註 誤下則致裏虛裏虛則外熱乘之變而爲利不止者裏虛不守也痞鞕者正虛邪實中成滯礙否塞而堅滿也以表未除故用桂枝以解之以裏適虛故用理中以和之此方即理中加桂枝而易其

名亦治虛痞下利之聖法也

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

註 太陽病原無裏證但當用桂枝解外若當用不用而反下之利遂不止則熱邪之在太陽者未傳陽明之經已入陽明之腑所以其脉促急其汗外越其氣上奔則喘下奔則泄故舍桂枝而用葛根專主陽明之表加芩連以清裏熱則不治喘而喘自止不治利而利自止又太陽兩解表裏之變法也

太陽病下之後脉促胷滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

註 誤下脉促與上條同以無下利不止汗出等證但見胷滿則陽邪仍盛於陽位幾與結胷同變然滿而不痛且諸證未具胷未結也故取用桂枝之芳甘以亟散太陽之邪其去芍藥之意酸收二字不足盡之以誤下故不敢用恐其復領陽邪下入腹中也設微見惡寒則陽虛已著而非陽邪上盛

之比去芍藥方中即當加附子以回其陽是雖不言汗出然繇此條之微惡寒合上條觀之則脈促胷滿喘而汗出之內原伏有虛陽欲脫之機故仲景於此條特以微惡寒三字發其義可見陽虛則惡寒矣又可見汗不出之惡寒即非陽虛矣傷寒證中多有下後魄汗不止而釀亡陽之變者必於此等處參合以求神髓庶幾可進於道耳

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

註 凡下後利不止而加上氣喘急者乃是上爭下奪之象危候也但驟病之人中氣足供上下之用邪盡而喘與利自止若中氣素餒加以上下交征立盡之數矣此證不云下利但云微喘表未解則是表邪因誤下上逆與虛證不同故仍用桂枝以解表加厚朴杏仁以利下其氣亦微裏之意也此訣風邪誤下作喘治法之大要其寒邪誤下作喘當用麻黃石膏即此可推

太陽病下之其脈促不結胷者此爲欲解也脈浮者

必結胷也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脅拘急脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱利脉浮滑者必下血

註　脉促爲陽邪上盛反不結聚於胷則陽邪未陷可勃勃從表出矣故爲欲解也脉浮者必結胷卽指促脉而申之見脉促而加之以浮邪氣瀰漫於陽位故必結胷也浮字貫下四句見浮而促必結胷浮而緊必咽痛浮而弦必兩脅拘急浮而細數必頭痛未止皆太陽本病之脉故主病亦在太陽之本位設脉見沉緊則陽邪已入陰分但入而未深仍欲上衝作嘔其無結胷咽痛等證從可知矣秪因論中省用一箇促字三箇浮字後之讀者遂眩謂緊爲下焦屬在少陰惑之甚矣觀本文下句卽指出沉緊者必欲嘔一語正見前緊字指浮緊言也沉緊方是陽邪入陰上逆作嘔豈有浮緊咽痛反爲少陰寒邪上衝之理明明太陽誤下之脉證何緣插入少陰攙亂後人耶至於滑脉居浮沉之間亦與緊脉同推故沉滑則陽邪入陰而主下

利浮滑則陽邪正在營分擾亂其血而主下血也夫太陽誤下之脉主病皆在陽在表卽有沉緊沉滑之殊亦不得以裏陰名之

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

註　邪熱搏血結於膀胱膀胱者太陽寒水之經也水得熱邪必沸騰而上侮心火故其人如狂見心雖未狂有似乎狂也血自下者邪熱不留故愈若少腹急結則膀胱之血畜而不行先解外乃可攻其攻法亦自不同必用桃仁增入承氣以達血所仍加桂枝分解外邪正恐餘邪少有未解其血得以留戀不下耳

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

註　此條之證較前條更重且六七日表證仍在曷

爲不先解其外耶又曷爲攻藥中不兼加桂枝耶以脉微而沉反不結胷知邪不在上焦而在下焦也若少腹鞕滿小便自利則其人之發狂者爲血畜下焦無疑矣故下其血自愈然畜血而至於發狂則熱勢攻心桃仁承氣不足以動其血桂枝不足以散其邪非用單刀直入之將必不能斬關取勝蓋邪結於胷則用陷胷以滌飲邪結少腹則用抵當以逐血設非此一法少腹中所結之血既不附氣而行更有何藥可破其堅壘哉所以一峻攻斯血去而邪不留并無藉桂枝分解之力耳

太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

註 此一條乃法中之法也見血證爲重證抵當爲重藥恐後人辨認不清不當用而誤用與夫當用而不敢用故重申其義言身黃脉沉結少腹滿三者本爲下焦畜血之證然只現此尚與發黃相鄰必如前條之其人如狂小便自利則血證無疑而舍抵當一法別無他藥可代之矣然小便不利何

以見其非血證耶蓋小便不利乃熱瘀膀胱無形之氣病爲發黃之候也小便自利則膀胱之氣化行然後少腹滿者允爲有形之畜血矣

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也

註　小便清利本爲邪不在裏若因飲水過多致小便之利則水未入腹先與邪爭必主心下悸也小便少者卽小便短赤裏證已具之意但本文云必苦裏急明是謂飲水多而小便少者邪熱足以消水故直指爲裏證已急也以飲水多三字貫下其旨躍然

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈　凡病若發汗若吐若下若亡血亡津液陰陽自和者必自愈

註　泉之竭矣不云自中古今通弊醫事中之操霸術者其人已亡津液復強責其小便究令膀胱之氣化不行轉增滿鞕脹喘者甚多故宜以不治治之俟其津液回小便利必自愈也於此見汗下恰

當津液不傷爲措於不傾藏於不竭之良圖矣

太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出則自愈所以然者汗出表和故也得裏未和然後下之

註 神識不清似有物蒙蔽其外也所以必須得汗俾外邪先從外徹然後辨其二便之和否再一分解其邪也然而表裏俱虛之證其兩解之法宜輕而且活所以說汗出自愈未嘗指定服藥也又說得裏未和然後下之但示其意並不出方後人孰察其遵內經虛者責之之義乎若論用藥表無過桂枝裏無過大柴五苓矣

太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下之宜調胃承氣湯主之

註 病久而外邪不解不過是入陽入陰之二途既陰陽兩停初無偏勝可以解矣猶必先振慄始得汗出而解虛可知也其有不爲振汗邪無出機者辨脈用法要與初病不同蓋初病皆邪氣勝則實

之脉病後皆正氣奪則虛之脉所以最虛之處便是容邪之處故陽脉微者邪乘其陽汗之而解陰脉微者邪乘其陰下之而解必須透此一關始得用藥與邪相當邪去則正自復不補虛而自補耳至於虛者責之之意前條已露一班此云若欲下之宜調胃承氣湯意更輕活其無取於大汗大下具在言外矣

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

（註）此證與結胷頗同但結胷者邪結於胷其位高此在心下及脅其位卑然必表解乃可攻之亦與攻結胷之戒不殊也其人漐漐汗出發作有時而非晝夜俱篤即此便是表解之徵雖有頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣諸證乃邪結之本證不得以表證名之若待本證盡除後乃攻之不坐誤時日乎故復申其義見汗出不惡寒便是表解可攻之候慮何深耶蓋外邪挾飲兩相摶結設外

邪不解何緣而得汗出津津乎攻藥取十棗湯者正與結胷之陷胷湯相倣因傷寒門中種種下法多爲胃實而設胃實者邪熱爍乾津液腸胃俱結不得不用苦寒以蕩滌之今證在胷脅而不在胃則胃中津液未經熱耗而蕩滌腸胃之藥無所取矣故取蠲飲逐水於胷脅之間以爲下法也

太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利止必作結胷未止者四日復下之此作協熱利也

註二三日不能臥但欲起陽邪熾盛逼處心胷擾亂不寧所以知其心下必結然但顯欲結之象尚未至於結也若其人脉微弱者此平日素有痰飲積於心膈之分適與外邪相名外邪方熾其不可下明矣反下之若利止則邪勢乘虛欲結者愈益上結利未止因復下之俾陽邪不復上結亦將差就錯因勢利導之法但熱邪從表解極易從裏解極難協熱下利熱不盡其利漫無止期亦危道也合上條外邪摶飲之證反覆提誨深切著明從來

疑是闕文可爲嘆息

病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之因作痞所以成結胷者以下之太早故也

註 風爲陽邪病發於中風陽邪未從外解而反下之其熱勢乘虛陷入必鞕結於胷上寒爲陰邪病發於傷寒陰邪未從外解而反下之其熱勢乘虛陷入必痞塞於心間二證皆繇下早皆是熱入省文以見意也太早則邪方熾盛既未外解又未傳經此而下之其變安得不大耶

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃也

註 中風病見浮動數之三脉主風主熱主痛更主虛虛故邪持日久頭痛發熱惡寒表終不解醫不知其邪持太陽未傳他經反誤下之於是動數之

脈變遲而在表之證變結胷矣動數變遲三十六字形容結胷之狀殆盡蓋動數爲欲傳之脈而變遲則力綿勢緩而不能傳且有結而難開之象膈中之氣與外入之邪兩相格鬬故爲拒痛胃中水穀所生之精悍因誤下而致空虛則不能藉之以衝開外邪反爲外邪衝動其膈於是正氣往返邪逼之界覺短氣不足以息更躁煩有加於是神明不安方寸之地覺剝膚近災無端而生懊憹凡此皆陽邪內陷所致陽本親上故據高位而心下鞕痛爲結胷也

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心上至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胷湯主之

註　不大便燥渴日晡潮熱少腹鞕滿證與陽明頗同但小有潮熱則不似陽明大熱從心上至少腹手不可近則陽明又不似此大痛因是辨其爲太陽結胷兼陽明內實也緣誤汗復誤下重傷津液不大便而燥渴潮熱雖太陽陽明亦屬下證但太

陽痰飲內結必用陷胷湯由胷脅以及腸胃蕩滌始無餘若但下腸胃結熱反遺胷上痰飲則非法矣

結胷者項亦强如柔痓狀下之則和宜大陷胷丸

註 結胷而至頸項亦强證愈篤矣蓋胷間邪結緊實項勢常昂有似柔痓之狀然痓病身手俱張此但項强原非痓也借此以驗胷邪十分緊逼耳胷邪緊逼以大陷胷湯下之恐過而不留卽以大陷胷丸下之又恐滯而不行故煑而連滓服之然後與邪相當而可施戰勝攻取之略觀方中用大黃芒硝甘遂可謂峻矣乃更加葶藶杏仁以射肺邪而上行其急煑時又倍加白蜜以留戀而潤導之而下行其緩必識此意始得用法之妙

結胷證其脉浮大者不可下下之則死

註 胷既結矣本當下以開其結然脉浮大則表邪未盡下之是令其結而又結也所以主死此見一病不堪再誤也

結胷證具煩躁者亦死

註亦字承上見結胷證全具更加煩躁卽不下亦主死也煩躁曷爲主死耶蓋邪結於胷雖藉藥力以開之而所以載藥力上行者胃氣也胃氣充溢於津液之內汗之津液一傷下之津液再傷至熱邪搏飲結於當膺而津液又急奔以應上征有不盡不已之勢煩躁者津液已竭胃氣垂絕之徵也此陷胷諸法見幾於蚤兢兢以滌飲爲先務飲滌則津液自安

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒鍼因胷煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足溫者易愈

註凡表裏差誤證變危篤有陰已亡而陽邪尚不盡者有陽邪盡而陽氣亦隨亡者有外邪將盡未盡而陰陽未致全虧者此可愈不可愈所繇分也大率心下痞與胷間結雖有上下之分究竟皆是陽氣所治之位觀無陽則陰獨一語正見所以成痞之故雖曰陰陽氣並竭實繇心下無陽故陰獨痞塞也無陽陰獨蚤已括傷寒誤下成痞大義安

得草草讀過無陽亦與亡陽有別無陽不過陽氣不治復加燒鍼以逼刦其陰陽乃成危候其用藥逼刦即可同推又中風誤下結胷傷寒誤下成痞者證之常也然中風誤下間有痞證傷寒誤下間有結胷證不可不明故次此條於結胷證後至太陽中篇亦次結胷於痞證後以求合作者之圓神也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十六卷目錄

醫部彙考三百三十六

傷寒門二

張機傷寒論 太陽經中篇 太陽經下篇

藝術典第三百五十六卷

醫部彙考三百三十六

傷寒門二

漢張機傷寒論

太陽經中篇（凡寒傷營之證列於此篇法五十八條）

喻昌曰按上風傷衛之證用桂枝湯解肌者乃是不欲發汗以擾動其營也不擾其營但治其衛嘗有不及之弊不及則邪不盡去勢必傳入於裏故篇中兩解表裏之法居多此篇寒傷營之證用麻

黃發汗者乃亟驅其邪盡從表出不使停留之法嘗有太過之弊太過則未免因邪傷正而虛候易生設有餘邪不盡者多未敢再汗但可和其營衞或俟其津回自然得汗故兩解表裏之法差少其誤下之證亦不比上篇之陽邪多變但發汗之後其人津液已虛更加誤下則津液重虛所以或邪少虛多而傷其陽或邪盛熱熾而傷其陰源同流異各造其偏以故治法亦錯出不一必先會大意然後一展卷而了然於心目也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體重嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒

（註）發熱惡寒體重嘔逆脈陰陽俱緊凡是傷寒病必具此五者故以爲總稱或未發熱者寒邪初入尚未鬱而爲熱頃之卽熱矣多有服表藥後反增發熱者病必易解蓋熱鬱未久藥卽領邪外出無裏證故也仲景恐見惡寒體重嘔逆又未發熱認爲直中陰經之證操刃殺人早於辨證之先揭此一語慮何周耶

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

註　上條已言傷寒之脉證矣此復以頭疼發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘互發其義蓋惡寒未有不惡風者頭身腰節疼痛即體重之應無汗而喘亦即嘔逆脉陰陽俱緊之應也汗乃血之液血爲營營强則腠理閉密雖熱汗不出也麻黃發汗散邪其力最猛故以桂枝監之甘草和之而用杏仁潤下以止喘逆然亦但取微似汗不須歠熱稀粥正如馭六馬執轡惟謹恆虞其泛軼耳

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐若躁煩脉數急者爲傳也傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

註　脉靜者邪在本經且不能遍故不傳經頗欲吐外邪內搏身煩脉數寒邪變熱必傳經也二三日陽明少陽證不見即誤治亦止留連於太陽也

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之嘔家不可用建中湯以甜故也

註欲傳未傳之證其人內實差可無慮若陽氣內虛而心悸陰氣內虛而心煩將來邪與虛搏必至危困建立其中氣則邪不易入卽入亦足以禦之

太陽傷寒者加溫鍼必驚也

註溫鍼欲以攻寒孰知鍼用火溫營血得之反增其熱營氣通於心引熱邪以內逼神明必致驚惶而神亂也

脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也

註外邪挾火勢上炎必不下通陰分故重而痺

脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯脈浮而數者可發汗宜麻黃湯

註傷寒之脈陰陽俱緊其脈但浮及浮數而不兼緊似可不用麻黃湯然寒既入營舍麻黃湯定法別無他藥可代故重申其義見脈緊固當用麻黃湯而脈浮不緊者乘其邪方在表當用麻黃湯托出其邪不使得入卽脈浮數不緊者乘其勢正欲傳當用麻黃湯擊其半渡而驅之使出參看中風

證脉浮宜用桂枝湯可見

傷寒發汗已解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂枝湯

註 發汗後病解半日許復煩脉復浮數明係汗後表踈邪風襲入所致卽不可再用麻黃湯宜更變發汗之法改用桂枝可耳用桂枝者一以邪重犯衞一以營虛不能復任麻黃也

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

註 脉浮數而煩與上同也加之以渴則津液爲熱所耗而內燥裏證具矣津液內耗卽非細故宜用四苓以滋其內而加桂以解其外比上更用桂枝之法又大不同者以無復感故也然旣云兩解表裏之邪熱則五苓散中朮用蒼桂用枝從可推矣

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

註 傷寒以無汗故煩汗出則不煩可知矣但汗出而渴則上條五苓兩解表裏之法在所必用若汗出而并不渴則裏證本輕故用桂枝湯中之三五

苓湯中之一少示三表一裏之意名曰茯苓甘草湯以消息病情而分解微邪

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也

註　脉浮而緊遍身疼痛乃傷寒正病亟當發汗以驅逐外邪者也設其人元氣素薄尺中脉遲則城郭不完兵甲不堅米粟不多根本先欲動搖尚可背城一戰乎此所以必先建中而後發汗也

脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈

註　脉浮數者法當從乎汗解故有更藥發汗及兩解表裏之法設經誤下而身重心悸縱脉仍浮數亦不可復發其汗但宜靜調俟其汗自出乃解耳所以然者以尺脉微裏陰素虛故也必須津液自和卽爲表裏俱實便自汗出而愈此亦先建中而後發汗之變法要知仲景云尺脉微者不可發汗又云尺微者不可下無非相人津液之奧旨

咽喉乾燥者不可發汗

註　咽喉乾燥其人平日津液素虧可知故不可發汗以重奪其津液也

淋家不可發汗發汗則便血

註　小便淋者膀胱爲熱所閉氣化不行也更發其汗則膀胱愈擾而血從小便出矣

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痓

註　身疼痛爲寒傷營之證本當發汗然瘡瘍之人肌表素虛營血暗耗更發其汗則外風襲虛內血不榮必致頸項强身手張而成痓痓亦膀胱病也

衄家不可發汗汗出必額上陷脉緊急目直視不能眴不得眠

註　目得血而能視汗爲血液衄血之人清陽之氣素傷更發其汗則額上必陷乃上焦枯竭之應也諸脉者皆屬於目筋脉緊急則目上瞪而不能合故不得眠也傷寒發煩目瞑者必衄宜用麻黃湯發汗此言素慣衄血之人戒發汗以虛其虛宜兩諦之

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

註 亡血卽亡陰也亡陰發汗本當生熱乃反寒慄而振者何耶蓋陰亡則陽氣孤而無偶纔一發汗其陽必從汗盡越所以寒慄有加陰陽兩竭也

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸

註 心主血汗者心之液平素多汗更發其汗則心臟血傷而心神恍惚小腸腑血亦傷而便已陰疼禹餘糧丸原方闕然生心血通水道可意會也

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之發汗後惡寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

註 惡寒者汗出營衞新虛故用法以收陰固陽而和營衞不惡寒者汗出表氣未虛反加惡熱則津乾胃實可知故用法以泄實和中然曰與似大有酌量其不當徑行攻下以重虛津液從可識矣

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯主之

註 傷寒發汗後身反疼痛者乃陽氣暴虛寒邪不

能盡出所致若脉見沉遲更無疑矣脉沉遲者六部皆然與尺遲大異尺遲乃素虛此爲發汗新虛故於桂枝方中倍加芍藥生薑各一兩以去邪用人參三兩以輔正名曰新加湯者明非桂枝湯中之舊法也

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黄杏仁甘草石膏湯主之發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

註 誤用桂枝固衛寒不得泄氣逆變喘本當用大青龍湯乃於湯中除去桂枝薑棗者以已經一誤不可再誤馭藥之嚴也然有大熱者恐兼裏證若無大熱其爲表邪實盛可知故變青龍之制爲麻杏甘石允爲的對也飲水多者內有大熱則能消之汗後裏證未具內無大熱故飲水多者水氣上逆必爲喘也以水灌其外冷氣侵膚與內邪相搏亦主喘也即形寒飲冷傷肺之意但傷肺乃積漸所致此不過偶傷耳治法要不出麻杏甘石之外見內飲水多外行水灌皆足以歛邪閉汗不獨誤

行桂枝湯爲然矣

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯

註　易桂枝以石膏少變麻黃之法以治誤矣乃誤下而喘亦以桂枝爲戒而不越此方者何耶蓋太陽中風與太陽傷寒一從桂枝一從麻黃分途異治由中風之誤下而喘者用厚朴杏仁加入桂枝湯中觀之則傷寒之誤下而喘者用石膏加入麻黃湯中乃天造地設兩不移易之定法仲景所以諄諄告戒者正恐人以傷寒已得汗之證認爲傷風有汗而誤用桂枝故特出誤汗誤下兩條示以同歸麻黃一治之要益見營衛分途而成法不可混施矣

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

註　發汗過多陽氣虛衰陽本受氣於胷中胷中陽氣不足故叉手冒心不說到陰血上方用桂枝甘草固表緩中亦未說到養血上方註謂汗多則血

傷血傷則心虛反置陽虛不理所謂迂闊而遠於事情也

未持脉時病人叉手自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

註 此示人推測陽虛之一端也陽虛耳聾宜急固其陽與少陽傳經邪盛之耳聾迥別矣

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

註 汗本心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動也腎邪欲上陵心故臍下先悸取用茯苓桂枝直趨腎界預伐其邪所謂上兵伐謀也

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

註 吐後腹脹與下後腹脹多爲實以邪氣乘虛入裏爲實也若發汗後外已解而腹脹滿知非裏實之證繇脾胃氣虛津液搏結陰氣內動壅而爲滿也故以益胃和脾降氣滌飲爲治也

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脅

下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

註　汗後外邪雖解然必胃氣安和始得脫然無恙以胃主津液故也津液因邪入而內結因發汗而外亡兩傷告匱其人心下必痞鞕以伏飲摶聚胃氣不足以開之也胃病故乾噫食臭食入而噯餕酸也胃病故脅下有水氣水入而旁滲脅肋也胃中水穀不行腹中必雷鳴而搏擊有聲下利而清濁不分也雖不緣誤下而且成痞設誤下其痞結又當何似耶

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之

註　此條痞證傷寒與中風互言大意具見下利完穀腹鳴嘔煩皆誤下而胃中空虛之互辭也設不知此義以爲結熱而復下之其痞必益甚故重以胃中虛客氣上逆昭揭病因方用甘草瀉心湯者卽生薑瀉心湯除生薑人參不用而倍加甘草乾

薑也客邪乘虛結於心下本當用人參已誤而再誤其痞已極人參仁柔無剛決之力故不用也生薑辛溫最宜用者然以氣薄主散恐其領津液上升客邪從之犯上故倍用乾薑代之以開痞而用甘草爲君坐鎭中州庶心下與腹中漸致泰寧耳今人但知以生薑代乾薑之僭孰知以乾薑代生薑之散哉但知甘草能增滿孰知甘草能去滿哉

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

註 大下之後復發汗先裏後表顚倒差誤究竟已陷之邪痞結心下證兼惡寒表邪不爲汗衰卽不可更攻其痞當用桂枝解肌之法先解其外外解已後乃以大黃黃連瀉心湯攻去其心下之痞也

脉浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

註　傷寒脈浮而緊即不可下誤下而緊反入裏則寒邪轉入轉深矣故作痞外邪與內飲搏結故心下滿鞕若按之自濡而不滿鞕則證不挾飲其所挾者乃身中之陰氣上逆而痞聚於心下也陰氣上逆惟苦寒可瀉之上條大黃黃連瀉心之法即爲定藥若惡寒汗出前方必加入附子以救陽虛蓋否者乾往居內坤往居外所以宜切陰盛陽微之慮今惡寒汗出其事著矣故三黃湯內另煎附子汁和服以各行其事而共成傾否之功即一瀉心方中其法度森森若此

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡湯不中與之宜半夏瀉心湯

註　上篇論結胷有陽明之兼證矣此復論結胷及痞有少陽之兼證見五六日嘔而發熱爲少陽之本證然太陽未罷亦間有之所以陽明致戒云嘔

多雖有陽明證不可攻以嘔屬太陽故也且發熱而非往來之寒熱尤難辨識果係少陽證則太陽證將罷不似陽明之不可攻若係太陽遷延未罷誤下卽成痞結其爲害更大矣方用半夏瀉心湯者卽生薑瀉心湯去生薑而君半夏也去生薑者惡其辛散引津液上奔也君半夏者瀉心諸方原用以滌飲此因證起於嘔故推之爲主君耳

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

註　瀉心諸方開結蕩熱益虛可謂具備乃服之而痞不解更加渴而口燥煩小便不利者前第八條五苓兩解表裏之法正當主用蓋其功擅潤津滋燥導飲蕩熱所以亦得爲消痞滿之良治也

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

註　湯藥者蕩滌腸胃之藥卽下藥也誤下而下利

不止心下痞鞕服瀉心湯爲合法矣乃復以他藥下之他藥則皆蕩滌下焦之藥與心下之痞全不相涉縱痞鞕微除而關閘盡撤利無休止反取危困用理中以開痞止利原不爲過其利益甚者明是以鄰國爲壑徒重其奔迫也故用赤石脂禹餘糧固下焦之脫而重修其關閘倘更不止復通支河水道以殺急奔之勢庶水穀分而下利自止耳

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之

註外邪不解轉入於裏心下痞鞕嘔吐下利攻之則礙表不攻則裏證已迫計惟主大柴胡一湯合表裏而兩解之耳

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋復代赭石湯主之

註此亦伏飲爲逆但因胃氣虧損故用法以養正而兼散餘邪大意重在噫氣不除上既心下痞鞕更加噫氣不除則胃氣上逆全不下行有升無降所謂弦絕者其聲嘶土敗者其聲噦也故用代赭

領人參下行以鎮安其逆氣微加散邪滌飲而痞自開耳

病脅下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

註　傷寒有臟結之證乃陰邪結於陰也若加痛引少腹入陰筋則悖亂極矣故主死也無陽證者無表證也不往來寒熱者無半表半裏之證也其人反靜者并無裏證也既無表裏之證而舌上仍有胎滑此爲何故則以丹田有熱胷中有寒耳夫丹田陰也反有熱胷中陽也反有寒是則其病不在表裏而在上下上下之邪相悖而不相入所以不可攻也

問曰病有結胷有臟結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胷也何謂臟結答曰如結胷狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治

註　臟結一證最難辨識復設問答借結胷以詳其

脉證而明外邪熾盛者爲難治結胷者陽邪結於陽也臟結者陰邪結於陰也然胷位高臟位卑其脉之寸浮關沉兩俱無異乃臟結之關脉更加小細緊者以關脉居上下二焦之界外邪繇此下結積氣繇此上干實往來之要衝所以病在下而脉反困於中也此證全以外受之邪定輕重若舌上有白胎滑則所感深重其互結之勢方熾單表單裏及兩解表裏之法俱不可用所以難治然溫中散邪俾陰氣漸下而內消客邪漸上而外散兩相開解則良工之爲其所難乎

傷寒六七日結胷熱實脉沉緊心下痛按之石鞕者大陷胷湯主之

註 傷寒誤下雖成痞亦時有結胷之候痞者十之八九結胷者十之一二也故亦傷寒結胷於痞證之後上條言寸脉浮關脉沉此言脉沉緊更明葢緊脉有浮沉之別浮緊主傷寒無汗沉緊主傷寒結胷與中風之陽邪結胷迥殊此所以不言浮也精矣精矣

小結胷病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胷湯主之

註　小結胷病正在心下則不似大結胷之高在心上也按之則痛比手不可近則較輕也而脉之浮又淺於沉滑又緩於緊可見其人外邪陷入原微但痰飲素盛挾熱邪而內結所以脉見浮滑也黃連半夏苦蔞實藥味雖平而泄熱散結亦是突圍而入所以名爲小陷胷湯也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胷無大熱者此爲水結在胷脅也但頭微汗出者大陷胷湯主之

註　治結胷之證用陷胷之法者以外邪挾內飲搏結胷間未全入於裏也若十餘日熱結在裏則是無形之邪熱蘊結必不定在胷上加以往來寒熱仍兼半表當用大柴胡湯以兩解表裏之熱邪於陷胷之義無取矣無大熱與上文熱實互意內陷之邪但結胷間而表裏之熱反不熾盛是爲水飲結在胷脅其人頭有微汗乃邪結在高而陽氣不

能下達之明徵此則用大陷胷湯允爲的對也

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之

註 此一條又足緯上三條而明其意心下支結者邪結於心下之偏旁不正中也比小結胷之正在心下又較輕矣傷寒至六七日宜經傳已遍乃發熱微惡寒肢節煩疼微嘔其邪尚在三陽之界未入於裏雖心下支結而外證未除卽不可用大陷胷湯以大陷胷湯主裏而不主表也亦不可用小陷胷湯以小陷胷湯主飲而不主表也夫支結之邪其在外者方盛其陷入者原少故但合用柴胡桂枝和解二法以治其表表邪去而支結自開矣後人謂支結乃支飲結於心下夢語喃喃吾不識支飲爲何物也

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

註 此伏飲素積爲變之最鉅者蓋積飲之人津液素結原不足以充灌週身及遇外感一切汗吐下

定法漫難輕試其誤下之變更有進於結胷者似此一證八九日過經乃下之可謂慎矣孰知外邪未盡乘虛而陷積飲挾之塡滿胷中胷中既滿則膻中之氣不能四布而使道絕使道絕則君主孤危所以心驚而神亂也煩與譫語本屬胃此則兼心小便不利本屬津液內竭此亦兼小腸火燔一身盡重不可轉側者又神明內亂治節不行百骸無主之明徵也夫邪方在表裏其患已及神明於此而補天浴日寧復尋常表裏所辦故用人參茯苓之補以益心虛丹鉛之重以鎮心驚龍骨牡蠣之澀以爲載神之舟楫一方而批郄導窾全收安內攘外之功後人不察謂是總三陽而和之之法豈其然哉按傷寒雖云傳足不傳手其實原無界限此證手少陰心主爲邪所逼神明內亂因致譫語無倫較他證譫語之屬胃實者相去懸絕若復以治足經之法治之必無幸矣方中藥止九味用入心藥五種不以爲複且入悍藥三種不以爲猛蓋都城震動勢必悉力入援非孤注可圖僥倖也

至於痰飲搏膈最爲剝牀者但用半夏一味表邪內襲首發難端者但從太少之例用桂枝柴胡二味陽邪入陰最宜急驅者但用大黃一味是則治傷寒喫緊之處咸落第二義止從治心諸藥之後一案共結其局此等手眼豈凡近可識耶

傷寒脉結代心動悸者炙甘草湯主之一名復脉湯

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治

註病而至脉結代心動悸眞陰已亡微邪搏聚者欲散不散故立炙甘草湯補胃生津潤燥以復其脉少加桂枝以和營衞少加清酒以助藥力內充胃氣外達肌表不驅邪而邪自無可容矣至於後段本爲結代二脉下註脚後人不解疑爲闕文但以虛多實少混說殊不知脉者氣血之先仲景於津液內亡之脉名之爲結陰代陰又名無陽原有至理何得懵然不識聊爲四言俚句以明其義胃

藏津液水穀之海內充臟腑外灌形骸津多脈盛津少脈衰津結病至津竭禍來脈見微弱宜先建中汗則津越下則津空津耗脈和不可妄攻小便漸減大便自通陽明內實急下救焚少緩須臾津液無存陽明似實少用調承驅熱存津此法若神腎中眞陽陰精所栽胃中眞陽津液所胎津枯精盛洌泉可溉陰精衰薄瓶罄罍哀何謂結陰無陽脈闔何謂代陰無陽脈奪經揭無陽津液所括較彼亡陽天地懸闊

傷寒醫下之續得下利淸穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛淸便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

註下利淸穀者脾中之陽氣微而飲食不能腐化也身體疼痛者在裏之陰邪盛而筋脈爲其阻滯也陽微陰盛凶危立至當急救其在裏之微陽俾利與痛而俱止救後小便淸大便調則在裏之陽已復而身痛不止明是表邪未盡營衛不和所致又當急救其表俾外邪仍從外解而表裏之辨始

爲明且盡耳救裏與攻裏天淵若攻裏必須先表後裏必無倒行逆施之法惟在裏之陰寒極盛恐陽氣暴脫不得不急救其裏俟裏證少定仍救其表初不敢以一時之權宜更一定之正法也厥陰篇下利腹脹身體疼痛者先溫其裏乃攻其表曰先溫曰乃攻形容不得已之次第足互此意

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之

註　滿而不煩卽裏證已具之實滿煩而不滿卽表證未罷之虛煩合而有之且臥起不安明是邪湊胷表腹裏之間無可奈何之象故取梔子以快湧其邪而合厚朴枳實以泄腹中之滿亦表裏兩解之法也

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

註　丸藥大下徒傷其中而不能蕩滌其邪故梔子合乾薑用之亦溫中散邪之法也

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之發汗若下之而煩熱胷中窒者

梔子豉湯主之發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹者梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之凡用梔子湯病人舊微溏不可與服之

註 香豉主寒熱惡毒煩躁滿悶下後身熱不去心中結痛則表邪昭著與前條之微煩不同故以梔子合香豉解散餘邪又主表而不主裏之法也然此梔豉一法諸凡汗下後證顯實煩虛煩之不同要皆可用以其胷中窒塞即名實煩窒比心中結痛則較輕也以其身外熱除心中不窒止是虛熱內壅即名虛煩虛煩不得眠亦即臥起不安之互詞反覆顛倒心中懊憹熱邪逼處無法可除故用梔豉湯以湧其餘熱乃因汗吐下後胷中陽氣不足最虛之處便是容邪之處正宜因其高而越之耳若慮津液內竭正氣暴虛餘邪不盡則仲景原有炙甘草湯一法寧敢妄湧以犯虛虛之戒耶

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也

註 治傷寒有先汗後下之次第原不得已之法設下之後外邪不盡復不得已而發其汗其人身必振寒脉必微細邪雖去而內外俱虛所傷滋大矣良工於汗下之際已不無臨谷之懼況以悞治致虛更可再悞而犯虛虛之戒乎

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

註 上條但言振寒及微細之脉未定所主之病以虛證不一也然振寒脉微細陽虛之故已露一班設晝日煩躁不得眠其爲虛陽擾亂可知矣其人夜反安靜不嘔不渴則虛陽擾亂不兼外邪可知矣乃復以脉沉微身無大熱重加辨別者仲景意中恐新邪乘虛暗襲耳外無邪襲則煩躁爲亡陽之候而乾薑附子在所必用矣即此而推其人日中安靜夜多煩躁則陽不病而陰病可知矣然陰病乃傷寒後之本證自有陽邪入陰及陰氣內虧津液未復之條故不復互言之也

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉

沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝朮甘草湯主之

註　心下逆滿氣上衝胷寒邪摶飲塞湧於膈所以起則頭眩脉見沉緊明係飲中留結外邪若但發汗以强解其外外雖解而津液盡竭反足傷動經脉有身爲振搖之患矣蓋人身經脉賴津液以滋養吐下而津液一傷更發其汗津液再傷坐令經脉失養身爲振搖貽害深矣所以遇此等證必一方之中滌飲與散邪並施乃克有濟太陽篇中用小青龍湯全是此意但彼證風寒兩受不得不重在表此證外邪已散止存飲中之邪故以桂枝加入制飲藥內俾飲中之邪盡散津液得以四布而滋養其經脉

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿

註　此即上條之證而明其增重者必致廢也曰虛煩曰脉甚微則津液內亡求上條之脉沉緊爲不可得矣曰心下痞鞕曰脅下痛較上條之心下逆

滿更甚矣曰氣上衝咽喉較上條之衝胷更高矣外證痰飲搏結有加而脉反甚微不與病情相協爲日既久則四屬失其滋養此後非不有飲食漸生之津液然久不共經脉同行其旁滲他溢與飲同事可知其不能復榮經脉可知所以竟成痿也

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

註　傷寒畜血較中風畜血更爲凝滯故變上篇之抵當湯爲丸煑而連滓服之與結胷項强似柔痓用大陷胷丸同意蓋湯者蕩也陽邪入陰一蕩滌之卽散丸者緩也陰邪入陰恐蕩滌之不盡故緩而攻之所以求功於必勝也其曰不可餘藥者卽本湯不變爲丸不可得矣

傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者與桂枝附子湯主之若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白朮湯主之

註　風木濕土雖天運六氣中之二氣然而濕土實地之氣也經云地氣之中人也下先受之其與風

相搏結止是流入關節身疼極重而無頭疼及嘔渴等證故雖浸淫於遍身軀殼自難犯高巔臟腑之界耳不嘔者上無表邪也不渴者內非熱熾也加以脉浮虛而濇則爲風濕搏於軀殼無疑故用桂枝附子疾馳經絡水道以迅掃而分竭之也

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

註　此條復互上條之意而辨其證之較重者痛不可近汗出短氣惡風不欲去衣小便不利或身微腫正相搏之最劇處故於前方加白术以理脾而下滲其濕減薑棗之和中以外泄其風要皆藉附子之大力者負之而走耳

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

註　傷寒發汗已熱邪解矣何繇反蒸身目爲黃所以然者寒濕搏聚適在軀殼之裏故爾發黃也裏者在內之通稱非謂寒濕深入在裏蓋身目正屬

軀殼與臟腑無關也於寒濕中求之卽下文三法
也

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之

註　傷寒之邪得濕而不行所以熱瘀身中而發黃
故用外解之法設泥裏字豈有邪在裏而反治其
表之理哉

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵
陳蒿湯主之

註　黃色鮮明其爲三陽之熱邪無疑小便不利腹
微滿乃濕家之本證不得因此指爲傷寒之裏證
也方中用大黃者取佐茵陳梔子建驅濕除熱之
功以利小便非用下也

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

註　熱已發出於外自與內瘀不同正當隨熱勢清
解其黃俾不留於肌表間也前條熱瘀故用麻黃
此條發熱反不用麻黃者蓋寒濕之證難於得熱
熱則其勢外出而不內入矣所謂於寒濕中求之
不盡泥傷寒定法此非一徵歟夫用三法以驅傷

寒發黃於寒濕中求之能事畢矣設不知此妄行攻下其邪乘虛陷入陽明中土日與水穀相蒸身目之黃有加無已漸致沉錮不返者多矣此仲景所爲叮嚀不可下之意乎

太陽經下篇（凡風寒兩傷營衛之證列於此篇法二十四條）

喩昌曰按上篇太陽中風乃衛病而榮不病之證中篇太陽傷寒乃榮病而衛不病之證然天氣之風寒每相因人身之榮衛非兩截病則俱病者恆多逌俱病則邪勢孔熾其人必增煩躁非發汗不解故仲景取用青龍之法乃內經陽之汗以天地之雨名之之義也但青龍爲神物最難駕馭必審其人無少陰脈證乃可用之以少陰亦主煩躁故也因是更立眞武一湯以救青龍之誤投白虎一湯以匡青龍之不逮神方畢用所謂神乎其神者矣有志精義入神之學者請自兹篇證入

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也以眞武湯救之

註 天地鬱蒸得雨則和人身煩躁得汗則解大青龍湯證爲太陽無汗而設與麻黃湯證何異因有煩躁一證兼見則非此法不解蓋風爲煩寒爲躁故用之發汗以解其煩躁也究竟本方原於無汗者取微似汗若有汗者之煩躁全非鬱蒸之比其不藉汗解甚明加以惡風脉微弱則是少陰亡陽之證若脉浮弱汗出惡風而不煩躁即是太陽中風之證皆與此湯不相涉也誤服此湯寧不致厥逆惕瞤而速其陽之亡耶仲景不能必用法者盡如其法更立眞武一湯以救其誤學者能識其鄭重之意卽百用不致一誤矣特爲剖析疑義相與明之按解肌兼發汗而取義於青龍者龍升而雲興雲興而雨降鬱熱頓除煩躁乃解匪龍之爲靈何以得此乎觀仲景製方之意本是桂枝麻黃二湯合用但因芍藥酸收爲興龍致雨所不宜故易以石膏之辛甘大寒辛以散風甘以散寒寒以勝熱一藥而三善具備且能助青龍升騰之勢所以爲至當至神之法也然而去芍藥之酸收增石膏

之辛散外攻之力猛而難制在寒多風少及風寒兩停之證則用當而通神其有風無寒之證及微弱之脈若不知辨而概用之有厥逆惕瞤而亡陽耳此疎庸之輩所爲望而畏之乎詎知仲景於風多寒少之證而見微弱之脈有用桂枝二越婢一之法桂枝全方不去芍藥取用其二全是不欲發汗之意復改麻黃一湯爲越婢一者略用麻黃石膏二物示微發於不發之中耳夫婢女子之卑者也女子固以順爲正況於婢則惟所指使更無專擅矣以大青龍之升騰變化不可駕馭之物約略用之乃至性同女婢之卑柔此仲景通天手眼也只一方中忽焉去芍藥爲大青龍而升天與雲雨忽焉存芍藥爲小青龍而蟠泥潤江海忽焉用桂枝二越婢一而細雨濕泥沙精義入神之道比仙經較著矣後人不窺作者之藩安望其能用之也哉再按誤服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤者既有亡陽之逆矣亡陽即當用四逆湯以回陽乃置而不用更推重眞武一湯以救之者其意何居蓋眞武

乃北方司水之神龍惟藉水可能變化而水者眞武之所司也設眞武不與之以水青龍之不能奮然升天可知矣故方中用茯苓白朮芍藥附子行水收陰醒脾崇土之功多於回陽名之曰眞武湯乃收拾分馳離絕之陰陽互鎮於少陰北方之位其所收拾者全在收拾其水使龍潛而不能見也設有一毫水氣上逆龍即得遂其升騰變化縱獨用附子乾薑以回陽其如魄汗不止何哉夫人身陽根於陰其亡陽之證乃少陰腎中之眞陽飛越耳眞陽飛越亟須鎮攝歸根陽既歸根陰必翕然從之陰從則水不逆矣陰從則陽不孤矣豈更能飛越乎

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

註　前條太陽中風四字括上篇而言此條傷寒二字括中篇而言風寒之脉證錯見則桂枝湯與麻黃湯爲不可用不待言矣故二條反覆互明大青龍湯允爲風寒兩兼的對之藥也無少陰證成註

謂不久厥吐利無少陰裏證蔓語喃喃誤人最大仲景來文但重作有輕時六字蚤已挈明言但身重而無少陰之欲寐其爲寒因可審況作有輕時不似少陰之晝夜俱重又兼風因可審所以敢恣行無忌力驅其在表之風寒若脉微弱身重欲寐則內顧少陰且不遑矣敢發之乎細玩二條文意傷風脉本浮緩反見浮緊傷寒脉本浮緊反見浮緩是爲傷風見寒傷寒見風兩無疑矣旣無可疑又當辨無少陰證相雜則用青龍萬舉萬當矣故脉見微弱卽不可用大青龍湯以少陰病脉必微細也方註泥弱字牽入中風之脉陽浮陰弱爲解大失仲景叮嚀垂戒之意不思中風之脉以及誤汗等證太陽上篇已悉此處但歸重分別少陰以太陽膀胱經與少陰腎經合爲表裏膀胱邪勝腎切震鄰其在陰精素虛之人表邪不俟傳經蚤從膀胱之腑襲入腎臟者有之況兩感夾陰等證臨病尤當細察設少陰不虧表邪安能飛渡而見身重欲寐等證耶故少陰證者不得已而行表散自

有溫經散邪兩相綰炤之法豈可徑用青龍之猛立劑孤陽之根乎仲景塈此一義用法之妙已竭盡無餘後人顛倒無傳妄行註釋致令察脈辨證之際懵然不識要妙祇覺仲景之堂無階可升其治虛勞發熱骨蒸多汗每輕用升柴恣行表散遵依東垣升陽散火乃至百不救一

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

註此風多寒少之證服藥已微除則藥不勝病可知劇則熱甚於經必迫血妄行而爲衄衄則熱隨血散而解也陽氣重者風屬陽而入衛氣爲寒所持故重也所以雖得衄解仍主麻黃湯以發其未盡之沉滯而大變乎中風之例也

太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

註此即前條風多寒少之證但無身疼痛則寒證較輕又無發煩目瞑則陽氣亦不重自衄即愈比前衄乃解亦易安所以既衄則不更主麻黃湯也

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

註　此寒多風少之證也寒多不發汗所以致衄既衄則風邪得解所以惟用麻黃湯以發其未散之寒而但從傷寒之例也

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉微緩者爲欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

註　此亦風多寒少之證以其風雖外薄爲寒所持而不能散所以面顯怫鬱之熱色宜總風寒而兩解之也

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗宜桂枝二越婢一湯

註　此亦風多寒少之證無陽二字仲景言之不一後人不解皆置爲闕疑不知乃亡津液之通稱也故以不可更汗爲戒然非汗則風寒終不解惟取桂枝之二以治風越婢之一以治寒乃爲合法越

婢者石膏之辛凉也胃得之則熱化津生以此兼解其寒柔緩之性比女婢猶爲過之可用之無恐矣

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯

註 此亦風多寒少之證服桂枝湯治風而遺其寒汗反大出脈反洪大似乎風邪再襲故重以桂枝湯探之若果風邪之故立解矣若形如瘧日再發則邪本欲散又且淺而易散其所以不散者終爲微寒所持故略兼治寒而汗出必解也

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

註 六七日不大便明係裏熱況有熱以證之更可無疑故雖頭痛可用承氣下之若小便清者邪未入裏即不可下仍當發汗以散表邪然頭疼有熱多是風邪上壅勢必致衄若兼寒邪則必身疼痛目瞑何以但頭痛而無身目之證耶故惟用桂枝

湯以解風邪與用麻黃湯之法各別也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮湯主之

註 服桂枝湯治風而遺其寒所以不解而證變設更下之則邪勢乘虛入裏益誤矣在表之風寒未除而在裏之水飲上逆故變五苓兩解表裏之法而用茯苓白朮爲主治去桂枝者以已誤不可復用也然桂枝雖不可用其部下諸屬皆所必需倘幷不用芍藥以收陰甘草薑棗以益虛而和脾胃其何以定誤汗誤下之變耶故更一主將而一軍用命甚矣仲景立方之神也

傷寒脉浮醫以火迫刧之亡陽必驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

註 篇首誤服大青龍湯厥逆筋惕肉瞤而亡陽者乃汗多所致故用眞武湯救之此以火迫刧而亡陽者乃方寸元陽之神被火迫刧而飛騰散亂故驚狂起臥不安有如此者少緩須臾馳馬莫追神

丹莫挽矣故用此湯救之桂枝湯中除去芍藥人皆不知其故或謂其酸收非也夫神散正欲其收何爲見惡耶設不宜於芍藥之酸又何宜於龍骨牡蠣之濇耶蓋陽神散亂當求之於陽桂枝湯陽藥也然必去芍藥之陰重始得疾趨以達於陽位既達陽位矣其神之驚狂者漫難安定更加蜀漆爲之主統則神可賴之以攸寧矣緣蜀漆之性最急丹溪謂其能飛補是也更加龍骨牡蠣有形之骨屬爲之舟楫以載神而返其宅亦於重以鎮怯濇以固脫之外行其妙用如是而後天君復辟也

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

註　此證誤而又誤雖無驚狂等變然煩躁則外邪未盡之候亦眞陽欲亡之機故但用桂枝以解其外龍骨牡蠣以安其內不用蜀漆者以元神未至飛越無取急追以滋擾也

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐

逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

註　脉浮自汗固是在表之風邪而小便數心煩則邪又在裏加以微惡寒則在裏爲寒邪更加脚攣急則寒邪頗重矣乃用桂枝獨治其表則陽愈虛陰愈無制故得之便厥也桂枝且誤麻黃更可知矣大青龍更可知矣陰寒內凝總無攻表之理也甘草乾薑湯復其陽者即所以散其寒也厥愈足溫不但不必治寒且慮前之辛熱有傷其陰而足攣轉錮故隨用芍藥甘草以和陰而伸其脚設胃氣不和而讝語則胃中津液亦爲辛熱所耗故少與調胃承氣湯以和胃而止其讝多與則爲下而非和矣若不知此證之不可汗而重發其汗復加燒鍼則陽之虛者必造於亡陰之無制者必至犯上無等此則用四逆湯以回其陽尚恐不勝況可兼陰爲治乎

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脉浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脛伸以承氣湯微溏則止其譫語故知其病可愈

註 或問於喻昌曰證象陽旦成註謂是桂枝之別名方註謂陽以風言旦曉也似中風分曉以不啻中風故設難詳申其義一主藥一主證二家未知孰是曰主藥則既名桂枝云何別名陽旦是必一百一十三方方皆有別名然後可主證則既似中風復云不啻中風果爲何證且訓旦爲曉尤爲牽强不通二家於此等大關係處尚且昏昏後學安得不面牆耶夫仲景之圓機活法妙在陽旦陰旦二湯陽旦者天日晴暖以及春夏溫熱之稱也陰旦者風雨晦冥以及秋冬涼寒之稱也只一桂枝

湯遇時令溫熱則加黃芩名陽旦湯遇時令涼寒則加桂名陰旦湯後世失傳紛紛謂桂枝不宜於春夏者皆繇不識此義耳卽如此證旣象陽旦又云按法用之卽是按用桂枝加黃芩之法也所以病人得之便厥明明誤在黃芩助其陰寒若單服桂枝湯何至是耶故仲景卽行陰旦之法以救其失觀增桂令汗出一語豈不昭昭耶陰旦不足更加附子溫經卽咽中乾陽明內結讝語煩亂渾不爲意且重飲甘草乾薑湯以俟夜半陽囘足熱後果如其言豈非先有所試乎惟黃芩入口而便厥未幾卽以桂附乾薑尾其後因知其厥必不久所以可斷云夜半手足當溫況咽乾讝語熱證相錯其非重陰沍寒可知故纔得足溫卽便以和陰爲務何其審哉

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

註 煩躁本大青龍湯證然脈弱汗出惡風者誤服之則厥逆筋惕肉瞤首條已諄諄致戒矣此條復申其辨見汗下不解轉增煩躁則眞陽有欲亡之

機溫補兼行以安和其欲越之陽俾虛熱自退煩躁自止乃爲合法若因煩躁更加散邪則立斃矣夫不汗出之煩躁與發汗後之煩躁毫釐千里不汗出之煩躁不辨脉而誤投大青龍尚有亡陽之變是則發汗後之煩躁卽不誤在藥已誤在汗矣此仲景所爲見微知著倣眞武之例更加人參之補以默杜其危哉下後煩躁較未下之煩躁亦殊

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

註　胷中有熱風邪在上也胃中有邪氣寒邪在中也腹中痛陽邪欲下而不得下也欲嘔吐陰邪欲上而不得上也此所以知其熱邪中上寒邪中下陰陽各不相入失其升降之恆故用黃連湯以分理陰陽而和解之也嘗因此法而推及臟結之證舌上有胎者又爲寒反在上熱反在下陰陽悖逆既成危候仲景但戒以不可攻未言治法然非先之以和解將立視其死乎學者請於黃連湯著眼

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱

刺期門

註　肝木乘脾土名曰縱其證腹滿譫語其脉寸口浮而緊寸口即氣口脾胃脉之所主也浮而且緊即弦脉也肝木過盛所以脾胃之土受制也

傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

註　肝脉乘肺金名曰橫發熱嗇嗇惡寒者太陽之本證也大渴飲水者木盛則熱熾而求水以潤之也木得水助其勢益橫反侮所不勝而乘乎肺水勢泛溢其腹必滿然肺金素無他病者必能暗爲運布或自汗而水得外滲或小便利而水得下行其病欲解也亦繇但腹滿而不譫語故易解耳刺期門穴者以賊土侮金皆繇木盛腹滿譫語證涉危疑故亟以瀉木爲主治也

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

註　風寒不解心下有水氣水即飲也水寒相搏必傷其肺或爲多證者人身所積之飲或上或下或

中或熱或冷各不相同而肺同爲總司但有一二證見卽水逆之應也於散風寒滌水飲藥中加五味子之酸以收肺氣之逆乾薑之辛以瀉肺氣之滿名曰小青龍湯蓋取其翻波逐浪以歸江海不欲其興雲升天而爲淫雨之意也後人謂小青龍湯爲發汗之輕劑毋乃昧其旨乎

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

註　風寒挾水飲上逆津液不下行故不渴渴則可知津液不逆爲寒去欲解之徵也寒去欲解仍用小青龍湯與上篇脈見單浮用桂枝湯中篇脈見單浮用麻黃湯同意大率以輕劑助其欲解之勢耳

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

註　大汗出則津液外亡大煩渴則燥熱內極脈轉洪大則凶變將起青龍湯爲不對矣計惟白虎湯可兩解表裏之熱加人參可潤燥止渴也

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

註　傷寒之脉陰陽俱緊此云浮滑則兼風可知滑爲裏熱浮滑則表亦熱矣裏有寒者傷寒傳入於裏更增裏熱但因起於寒故推本而曰裏有寒實則表裏俱爲熱極也

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

註　白虎但能解熱不能解表必惡寒頭身疼痛之表證皆除但熱渴而求救於水者方可與之

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

註　表裏熱極燥渴心煩全無惡寒頭疼身痛諸表證者固當行白虎矣若脉浮滑背微惡寒此爲表熱少裏熱多之證仍可與之蓋以脉滑明係裏熱而背爲至陰之地雖表退尚有餘寒不當牽泥也設脉但浮而不滑證兼頭疼身痛則雖表裏俱熱而在表之邪渾未退白虎湯卽不可用以白虎辛凉不能解表故也按此條辨證最細脉滑而帶浮

渾身無大熱又不惡寒但背間微覺惡寒是表邪已將罷其人口燥渴心煩是裏熱已大熾更不可姑待而當急爲清解恐遲則熱深津竭無救於事耳或問用白虎湯則表熱不解用青龍則裏熱轉增試擬議於二者之間不識當用何法曰惟於大青龍湯中倍增石膏少減麻桂或見寒多風少則用麻杏甘石湯亦倍增石膏少減麻黃斯固圓機然亦卽可爲定法矣

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

註 玩此條表證比前較重何以亦用白虎耶本文熱結在裏表裏俱熱二句已自酌量惟熱結在裏所以表熱不除況加大渴飲水安得不以清裏爲急耶按寒與風俱傷宜從辛甘發散矣而表與裏又俱熱則溫熱爲不可用欲并風寒表裏之熱而俱解之不其難乎故立白虎湯一法以輔青龍之不逮其藥乃石膏知母辛涼之二物也辛者西方

金也凉者秋令也酷熱之時欲求金風薦爽萬不可得計惟虎嘯則山谷間習習風生風生則熱解耳所以取辛凉二物偶而成方以象白虎之陰也夫青龍變化莫測方無定體故各用制伏之法若白虎則地獸之靈得風從而其威愈震亦不易制伏之物況裏熱已極津液垂亡元氣所存無幾而領西方之肅殺以入胃中能無慮乎於是以甘草之甘緩和其猛性而入米同煎以助胃中水穀之氣虛者更加人參以助胃中天眞之氣乃可用之而無患制法早具於一方之內矣夫石膏以一物之微入甘溫隊中則爲青龍從淸凉同氣則爲白虎惟文武聖神之哲乃能用之恰當此龍虎所爲慶風雲之會也設在表之風寒未除當用青龍而反用白虎設在裏之熱渴已逼當用白虎而反用青龍則用者之誤竟與倒行逆施者同類寧不敗乃事乎

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十七卷目錄

醫部彙考三百三十七

傷寒門三

張機傷寒論（陽明經上篇　陽明經中篇　陽明經下篇）

藝術典第三百五十七卷

醫部彙考三百三十七

傷寒門三

漢張機傷寒論

陽明經上篇（凡外邪初入陽明地界未離太陽淨盡者謂之太陽陽明列於此篇）

喻昌曰傷寒之證無如太陽一經風寒參錯表裏差殊難於辨認昌分三篇先列鄙語以引其端後隨仲景原文闡其立言精意俾學者得其門而入庶足以窺其富美也而陽明一經之病治之尤難

蓋胃爲水穀之海五臟六腑之大源多氣多血之衝乃吉凶死生所攸關仲景著論精詳後人讀之憒憒今僭爲尚論請得而要言之也夫陽明者胃也陽明以胃實爲正胃實則皆下證也然陽明之邪其來路則繇太陽凡陽明證見八九而太陽證有一二未罷卽從太陽而不從陽明可汗而不可下也其去路則趨少陽凡陽明證縱見八九而少陽證略見一二卽從少陽而不從陽明汗下兩不可用也惟風寒之邪已離太陽未入少陽恰好在陽明界内之時用藥亟爲攻下則渙然冰釋而不再傳他經津液元氣兩無虧損何快如之此等機會間不容髮庸愚無識妄守顚門必俟七日傳經已盡方敢言下縱不危殆而津液元氣所喪滋多矣况太陽一經早有十餘日不解者若不辨經而但計日其誤下仍在太陽至陽明二三日内卽顯下證反以計日當面錯過及陽明已趨少陽又以計日妄行攻下乃至少陽復轉陽明更全不識其證以致熱邪在胃爍盡津液輕者重而重者死矣

所闕顧不鉅耶謹將陽明之證亦比太陽之例分爲三篇俾觀者了無疑惑斯臨病不致差誤耳其太陽與陽明兩經各半謂之合病兩經連串謂之併病另自名篇於三陽經後不在此例此乃邪入陽明而太陽將盡未盡之證也

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

註　仲景此二條之文前條云風未解後條即不云寒未解者互文也前條云宜發汗後條云發汗則愈者亦互文也蓋外邪初入陽明用桂枝湯解肌則風邪仍從衞分出矣用麻黃湯發汗則寒邪仍從營分出矣營分之邪深於衞分且從外出而愈則衞分更不待言矣論中每用互文處其妙義大率若此

陽明病能食者爲中風不能食者爲中寒

註　風則傷衞寒則傷營一定之理是則足三陽經太陽行身之背陽明行身之前少陽行身之側皆

可言營衛受邪何仲景於陽明經但以能食不能食分風寒而不以營衛分風寒耶蓋營衛交會於中焦論其分出之名則營爲水穀之精氣衛爲水穀之悍氣論其同出之源混然一氣何繇分其孰爲營孰爲衛哉惟風爲陽陽能消穀故能食寒爲陰陰不能消穀故不能食以此而辨風寒之邪庶幾確然有據耳仲景析義之精若此如習矣不察者何

脈陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲太過陽脈實因發其汗出多者亦爲太過太過爲陽絕於裏亡津液大便因鞕也

註陽微者中風之脈陽微緩也陽實者傷寒之脈陽緊實也陽絕卽亡津液之互辭仲景每於亡津液者悉名無陽本文陽絕於裏亡津液大便因鞕甚明註家認作汗多而陽亡於外大謬按傷寒發太陽膀胱經之汗卽當顧慮陽氣以膀胱主氣化故也發陽明胃經之汗卽當顧慮陰津以胃中藏津液故也所以陽明多有熱越之證謂胃中津液

隨熱而盡越於外汗出不止耳然則陽明證不論中風傷寒脉微脉實汗出少而邪將自解汗出多則陰津易致竭絕醫者可不謹持其柄而用重劑發汗以刼人之津液耶觀仲景於太陽發汗之重劑以青龍名之可見亢旱得之則爲甘霖若淫雨用之則沉竈產蛙傷禾害稼有載胥及溺已耳此陽明所以有桂枝麻黃湯證而無大青龍湯證也噫微矣哉

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

註以此辨陽明中風之外證正兼太陽也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

註以此辨陽明中風之裏證按此屬正陽陽明可下者當置中篇以全文不便分割讀者識之可也

問曰病有一日得之不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

註　以此辨陽明傷寒之外證正兼太陽也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

註　以此辨陽明傷寒之裏證按此屬正陽陽明可下者已上八條見仲景於太陽傳入陽明之證其辨認之法卽少變太陽之定例矣蓋太陽有營衛之兩路風則傷衞寒則傷營而陽明則營衛難以辨別辨之全藉於脈與證風邪之脈傳至陽明則緩去而遲在寒邪之脈傳至陽明則緊去而浮在風邪之脈輕高而上前者風邪本微殊無內向之意雖汗出少而不爲過也寒邪之脈已至於實則將去太陽而成可下之證故發其汗太多反爲過也至其辨證則以能食不能食爲諦蓋陽邪能化穀陰邪不能化穀之義也又設四問以辨風寒之在表在裏而定汗下之權衡何其明且盡耶繇是推之病已傳經而太陽邪有未盡其用桂枝麻黃二湯卽當狹小其制不可使太過明矣太陽邪已盡其用承氣諸湯卽當竭蹶從事不可使不及又

明矣或問經言一脉分爲二病謂營衞不同也是則十二經脉中以營衞之故分爲二十四病矣乃仲景於陽明一經獨以能食不能食分營衞至於少陽以後更不申營衞之辨其義何居答曰明哉問也道之原也叔和以後諸賢俱有未徹果識各經皆有營衞曷爲將仲景少陽經之文編入太陽經中乎後人更添蛇足謂邪至陽明則已過營衞無復可言果爾則邪至少陽與三陰其過營衞不更遠乎靈樞謂營氣起於中焦衞氣起於下焦而行至中焦胃中正是營衞所起之源混然未分而外入之風寒自難辨別也至於少陽以下諸經內經明有一脉分爲二病之旨仲景可以不贅況始先中衞其傳經必不轉中於營始先中營其傳經必不轉中於衞然則能食爲中風不能食爲中寒自可繇陽明而類推三陰各經矣此等處須細心體會一鹵莽謬迷多矣

本太陽病初得時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

註　發其汗兼解肌發汗二義汗出不徹則未得如法故邪不服而轉入陽明也

若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

註　表未解而腹大滿則裏亦急故用小承氣湯

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈

註　微煩小便數大便因鞕皆是邪漸入裏之機故用小承氣湯和之少變不可下之例然曰和則與用下之意不同矣

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

註　吐後而腹脹滿則邪不在胷其爲裏實可知然但脹滿而不痛自不宜用急下之法少與調胃承氣可耳此亦和法非下法也觀正陽陽明篇中腹滿不減減不足言如是之急者止言當下自可類推

陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死

利止者愈

註 心下鞕滿邪聚陽明之膈正兼太陽也故不可攻攻之利不止則邪氣未盡眞氣先脫故主死利止則邪去而眞氣猶存故自愈也

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

註 嘔屬太陽嘔多則太陽未除縱有陽明諸證在所不計故戒攻下

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

註 此條復辨嘔有太陽亦有陽明本自不同若食穀欲嘔則屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原爲熱證者相遠正恐誤以寒藥治寒嘔也然服吳茱萸湯轉劇者仍屬太陽熱邪而非胃寒明矣

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也

註 此條陽明中風俱該傷寒而言俱太陽未除之候但以腹滿一端知爲熱入陽明然終與大實大滿不同若悞下則外邪乘虛內陷而腹愈滿矣小

便難者亡津液也

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒反讝語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

註　發熱以上與前條同而汗出不惡寒反惡熱身重四端則皆陽明之見證所以汗下燒鍼俱不可用而舌上胎則膈熱甚故湧以梔子豉而徹去其膈熱則治太陽而無碍陽明矣若前證更加口乾舌燥則宜用白虎湯以解熱生津更加小便不利則宜用猪苓湯以導熱滋乾也

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

註　太陽證中有用五苓散兩解表裏一法矣而太陽入陽明證中復有猪苓湯導熱滋乾一法然汗出多而渴者不可服蓋陽明胃經主津液者也津

液充則不渴津液少則渴矣故熱邪傳入陽明必先耗其津液加以汗多而奪之於外復利其小便而奪之於下則津液有立亡而已故示戒也

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞕不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

註　寸緩關浮尺弱發熱汗出復惡寒純是太陽未罷之證也設非誤下何得心下痞結耶如不悞下則心下亦不痞而太陽證必漸傳經乃至不惡寒而渴邪入陽明審矣然陽明津液既偏滲於小便則大腸失其潤而大便之鞕與腸中熱結自是不同所以旬日不更衣亦無苦也以法救之救其津液也與水及用五苓即其法也夫五苓利水者也其能止渴而救津液者何也蓋胃中之邪熱既隨小水而滲下則利其小水而邪熱自消矣邪熱消則津回而渴止大便且自行矣正內經通因通用

之法也前段汗出多而渴者不宜用猪苓湯重驅津液此段仍有汗仍渴但汗出不至於多而渴亦因熱熾其津液方在欲耗未耗之界故與水而用五苓爲合法也今世之用五苓者但知水穀偏注於大腸用之利水而止泄至於津液偏滲於小便用之消熱而囘津液者則罕故詳及之

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

註 陽明脉之浮緊即太陽寒傷營之脉也單浮即

太陽風傷衛之脉也但傳至陽明仲景不欲以營衛辨證而姑變其文耳至於太陽證有未罷各條雖悉尚恐未明再舉潮熱及盜汗陽明之必至者辨之確然無疑矣從前註解皆是斷章取義而不會其大意不知脉緊與潮熱脉浮與盜汗非的對之證也不過藉以辨陽明八九太陽一二之候耳至謂浮爲陽盛陽盛則陰虛陰虛則盜汗出節外生枝幾於說夢矣

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久

按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

註 此條陽明中風之證居七八而中寒之證亦居二三觀本文不得汗及用麻黃湯其義自見也然此一證爲陽明第一重證何以知之太陽證既未罷而少陽證亦兼見是陽明所主之位前後皆邪而本經之瀰滿留連更不待言矣蓋陽明脈本大兼以少陽之弦太陽之浮則陽明之大正未易衰也腹滿鼻乾嗜臥一身面目悉黃潮熱陽明之證既盡見兼以少陽之脅痛太陽之膀胱不利乃至時時噦耳前後腫則陽明之諸證正未易除也所以病過十日外證不解必審其脈證或可引陽明之邪從少陽出則用小柴胡湯或可引陽明之邪從太陽出則用麻黃湯方合法若不尿腹滿加噦則眞氣垂盡更無力可送其邪故知藥不能治也

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此

欲作穀癉雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

註　脉遲則表證將除似乎可下然得食而微煩仍是外邪助其內熱也熱蒸食而上攻故頭眩小便必難者濕熱上攻水道必不順也欲作穀癉者水穀之濕得熱蒸而四迄遍身發黃勢所必至下之腹滿如故病既未除其脉之遲者愈益難復故以爲戒註謂下之則外邪內陷殊不切要蓋腹滿已是邪陷寧俟下之始陷耶所以然者脉遲則胃不實徒下其糟粕不惟無益而反害之耳然則脉復其常然後膀胱之氣化行濕熱自除穀癉自退又不言可知矣

陽明病若中寒不能食小便不利手足濈然汗出此欲作固瘕必大便初鞕後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

註　註謂固爲堅固瘕爲積聚大謬蓋大便初鞕後溏因成瘕泄瘕泄卽溏泄久而不止則曰固瘕也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翕然如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解者此水不

勝穀氣與汗共併脉緊則愈

註　此段文義本明註謂得汗則外邪盡解脉緊且愈全非本文來意觀上二條一以小便少而成穀癉是濕熱繇胃上攻胷腦則頭眩而身發黃一以小便不利而成固瘕是濕熱繇胃下滲大腸則手足汗出而成溏泄此條小便反不利本當成穀癉及瘕泄之證況其人骨節疼濕勝也翕然如有熱狀熱勝也濕熱交勝乃忽然發狂濈然汗出而解者何以得此哉此是胃氣有權能驅陽明之水與熱故水熱不能勝與汗共併而出也脉緊則愈言不遲也脉緊疾則胃氣强盛所以肌肉開而濈然大汗若脉遲則胃中虛冷偏滲之水不能透而爲汗卽手足多汗而周身之濕與熱又未能共併而出此胃强能食脉健之人所以得病易愈耶

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦

脉浮而遲表熱裏寒下利淸穀者四逆湯主之若胃中虛冷不能食者飲水則噦

註表熱裏寒法當先救其裏太陽經中下利不止身疼痛者已用四逆湯不爲過其在陽明之表熱不當牽制更可知矣此證比前一條虛寒更甚故不但攻其熱必噦卽飲以水而亦噦矣按前云能食者爲中風不能食者爲中寒矣此上五條一云食難用飽一云欲食似乎指中風爲言一云中寒不能食及後二條之不能食又明指中寒爲言所以後人拘執其說而誤爲註釋也不知此五條重舉風寒證中之能食不能食辨胃氣之強弱非辨外邪也故五證中惟水不勝穀氣脈緊則愈一證爲胃氣勝其四條俱是脈遲胃冷反爲水熱所勝之證夫傷寒之證皆熱證也而其人胃中虛冷者又未可一例而推蓋胃既虛冷則水穀混然無別熱邪傳入必不能遽變爲實也胃不實則不可下而熱邪既入轉蒸水穀之氣蘊崇爲病卽下之而水熱不去徒令胃氣垂絕而作噦耳仲景一一挈出而於後條下利清穀一證主之以四逆湯則前條之較輕者宜主之以溫胃更不待言惟合五條

而總會其立言之意始不致於傳訛耳門人問濈然汗出而病解乃手足濈然汗出者反作固瘕何手足不宜於汗耶答曰胃氣虛寒之人外邪入之必轉增其熱胃熱故膀胱亦熱氣化不行小便因之不利小便不利而盡注於大腸則爲洞泄卽末條之下利清穀者是也小便不利乘胃熱而滲於脾則四肢先見色黃乃至遍身發黃而成穀癉者是也今手足濈然得汗則脾中之濕熱行而色黃穀癉之患可免但汗從手足而出水熱之氣未得遍泄於周身不過少分大腸奔迫之勢故不爲洞泄而爲瘕泄耳無病之人小便不行尚漬爲他病況傷寒證極赤極熱之小便停畜不行能無此三種之變耶一遡其源而輕重自分矣

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛

註　此胃熱協風邪而上攻之證也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也

註　此胃熱協寒邪而鬱於肌膚之證也言久虛者明所以不能透出於肌表之故也非謂當用補也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

註　陽明證本不頭痛若無汗嘔欬手足厥者得之寒因而邪熱深也然小便利則邪熱不在內而在外不在下而在上故知必苦頭痛也若不欬不嘔不厥而小便利者邪熱必順水道而出豈有逆攻巓頂之理哉

陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

註　下之而外有熱心中懊憹饑不能食幾成結胷矣然手足溫則陽氣未至傷陷不結胷則外邪原屬輕微若其人頭汗出者亦是膈中鬱熱上蒸所致宜因其高而揚之用梔子豉湯以徹其熱則陽得下通於陰而周身濈然汗解幷可知矣按此二條皆濕熱上攻之證

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥此必衄

註　口中乾燥與渴異漱水不欲嚥知不渴也陽明氣血俱多以漱水不欲嚥知邪入血分陽明之脉起於鼻故知血得熱則妄行必繇鼻而出也

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

註　脉浮發熱口乾鼻燥陽明邪熱熾矣能食爲風邪風性上行所以衄也

陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

註　合四條觀之陽明病濕停熱鬱而煩渴有加勢必發黃然汗出熱從外越則黃可免小便多熱從下泄則黃可免若悞攻之其熱邪愈陷津液愈傷而汗與小便愈不可得矣悞火之則熱邪愈熾津液上奔額雖微汗而周身之汗與小便愈不可得

矣發黃之變安能免乎發黃與前穀癉本同一證但彼因脈遲胃冷而得則與固瘕及噦同源而與此異派

陽明病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出則愈

註 婦人病傷寒經水適來適斷則邪熱乘之而入於血室讝語如見鬼狀當刺期門乃男子陽明經病下血而讝語者亦爲熱入血室亦刺期門詳後少陽篇末

陽明病其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑宜抵當湯下之

註 太陽經熱結膀胱之證輕者如狂重者發狂如狂者血自下但用桃核桂枝加入承氣湯因勢利導血去則愈發狂者血不下須用抵當湯亟下其血乃愈詳太陽上篇此條陽明喜忘之證本差減於如狂乃用藥反循發狂之例者何耶蓋太陽少血陽明多血陽明之血一結則較太陽更爲難動

所以宜用抵當湯峻攻之法耳但太陽云主之則確乎不易此云宜用則證有輕重不等在於臨時酌量矣

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血也宜抵當湯若脉數不解而下利不止必協熱而便膿血也

註　雖云無表裏證然發熱脉浮數表證尚在也其所以可下者以七八日爲時旣久而發熱脉數則胃中熱熾津液盡亡勢不得不用下法如大柴胡湯之類是也若下後脉數不解可知果胃中熱熾其候當消穀善饑然穀食旣多則大便必多乃至六七日竟不大便其證非氣結而爲血結明矣所以亦宜於抵當湯也若數不解而下利不止註謂用抵當湯下之數仍不解大謬此乃對假令已下脉數不解五句之文見已下脉數不解反六七日不大便則宜抵當以下其血若已下脉數不解而下利不止則不宜抵當之峻但當消息以淸其血

分熱邪若血分之邪不除必協熱而便膿血矣合三條總是熱入血室故隨下血與不下血而異治也然要知陽明尚兼太陽則不但胃中熱熾而膀胱隨經之熱亦未盡解此所以宜於抵當湯乎

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宐發汗下之與大承氣湯發汗宐桂枝湯

註 病人得汗後煩熱解太陽經之邪將盡未盡其人復如瘧狀日晡時發熱則邪入陽明審矣蓋日晡者申酉時乃陽明之王時也發熱即潮熱乃陽明之本候也然雖已入陽明尚恐未離太陽故必重辨其脈脈實者方爲正陽陽明宜下之若脈浮虛者仍是陽明而兼太陽更宜汗而不宜下矣發汗宜桂枝湯宜字最妙見前既得汗而煩熱解此番只宜用桂枝和營衛以盡陽明兼帶之邪斷不可悞用麻黃湯矣

陽明經中篇（凡外邪已離太陽未接少陽謂之正陽陽明列於此篇）

喩昌曰凡外感之邪全入陽明所轄地界已離太

陽未接少陽此際當用下法確無疑矣然其邪復有在經在腑之不同在經者與太少爲鄰仍是傳經之邪在腑者則入於胃而不傳經但在經者之用下常恐胃有未實篇中無限消息遲徊若在腑則胃已大實惟有急下以存津液而已

陽明之爲病胃家實是也

註　以胃家實揭正陽陽明之總見邪到本經遂入胃而成胃實之證也不然陽明病其胃不實者多矣於義安取乎

傷寒三日陽明脉大

註　傷寒一日太陽二日陽明三日少陽乃傳經之次第其實不以日拘也此云三日陽明脉大正見二日之陽明傳自太陽必兼乎浮緊浮緩未定是正陽陽明也若正陽陽明氣血俱多其脉必大而與太陽別矣言外見三日證兼少陽則其脉大而弦又不得爲正陽陽明也噫微矣哉

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也

傷寒轉繫陽明者其人濈濈然微汗出也

註　濈濈者肌肉開而微汗不乾之貌發熱無汗嘔不能食皆傷寒之證也傷寒無汗何以反濈濈汗出耶可見證已轉屬正陽陽明矣既濈然汗出則熱除嘔止可知矣

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

註　蒸蒸者熱勢自內騰達於外如蒸炊然胃實之驗也其熱蒸蒸勢必其汗濈濈矣妙哉形容乎惟熱在胃故用承氣以調其胃胃調則病渙然除矣

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞕故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可爲導

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下（後半節入陽明上篇）

註　脈遲汗出不惡寒身重短氣腹滿喘潮熱八者乃陽明之外邪欲解可以攻裏而不爲大悞之候也然曰欲解曰可攻不過用小承氣及調胃承氣之法耳必手足濈然汗出方可驗胃實便鞕外邪盡解而當從大承氣急下之法也申酉戌間獨熱餘時不熱者爲潮熱若汗多微發熱惡寒是陽明證尚兼太陽縱腹大滿胃終不實只可微和胃氣以從權而已

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也宜大承氣湯

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

註轉失氣者屁出也腹中之氣得攻藥不爲轉動則屬虛寒所以悮攻而證變脹滿不能食及噦也攻後重復發熱又是胃熱至此方熾大便因可得鞕但爲時未久必少耳仍以小承氣湯和之若腹中氣仍不轉則不但用大承氣大差卽用小承氣亦小差矣

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

註 以小承氣湯試其可下而用大承氣湯下之矣設下後心中懊憹而煩又屬熱重藥輕當再進大承氣以協濟前藥亟驅熱邪則悶煩自解也一云胃中有燥屎者一云若有燥屎者俱指試其轉失氣及繞臍痛腹滿痛小便不利煩躁時有微熱喘冒不能臥七證言也

得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可攻之宜大承氣湯

註 無太陽少陽之證則煩躁心下鞕屬正陽陽明之可下無疑矣乃其人脈弱雖是能食亦止可少用小承氣微和胃氣和之而當必覺小安俟隔日再以小承氣稍稍多進總因脈弱故爾遲徊也至六七日竟不大便似乎胃實乃小便復少正恐胃弱而膀胱氣化之源窒轉滲大腸初鞕後溏耳所以小便利屎定鞕乃可攻之按此段之雖能食雖

不能食全與辨風寒無涉另有一義見雖能食者不可以爲胃强而輕下也雖不能食者不可以爲胃中有燥屎而輕下也後九條云讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚與此互發

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

註　胃氣及津液既不繇吐下而傷則心煩明係胃中熱熾故可與調胃承氣以安胃氣而全津液也合九條總是以外證之解與不解氣之轉與不轉臍腹之痛與不痛脉之弱與不弱汗出之多與不多小便之利與不利邪熱之熾與不熾津液之乾與不乾而辨腹中之燥屎多與不多溏與不溏以消息微下之法故惟手足濈然汗出大便已鞕者主之以大承氣湯其他諸證一則曰宜用導法再則曰不可攻之再則曰宜小承氣湯再則曰少與小承氣湯再則曰明日更與一升再則曰宜大承氣湯全是商量治法聽人臨時斟酌以祈無悞所以不用主之二字此等處關係安危最大葢熱邪入胃不以寒藥治之則胃傷然寒藥本以救胃也

不及則藥不勝邪邪太過則藥反傷正况乎不勝其邪勢必盡傷其正徒傷其正又未必盡去其邪此仲景所爲諄復於二者之間也

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不大便脉反微澀者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也

註　讝語而發潮熱陽明之下證審矣更兼其脉滑疾復與脉弱者不倫故主之以小承氣湯一定之法也然尚未知其裏證若何必轉失氣方可再服若服後不轉失氣并不大便脉反微而且澀又是裏氣虛寒之證蓋陽明居於中土其表虛表實來自太陽至此已明其裏虛裏實茫然未卜故用法不可令虛者益虛有如此之鄭重也

夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲重語也

註　鄭聲者鄭重之聲正氣不足聲出重濁也亦辨裏實裏虛之一端也

直視讝語喘滿者死下利者亦死

註此條當會意讀謂譫語之人直視者死喘滿者死下利者死其義始明蓋譫語者心火亢極也加以直視則腎水垂絕心火愈無制故主死也喘滿者邪聚陽位而上爭正不勝邪氣從上脫故主死也下利者邪聚陰位而下奪正不勝邪氣從下脫故主死也

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脈短者死脈自和者不死

註擬此爲太陽經脫簡不知太陽經無譫語之例必日久而兼陽明少陽方有譫語故此言太陽經得病時發汗過多及傳陽明時重發其汗亡陽而譫語之一證也亡陽之人所存者陰氣耳故神魂無主而妄見妄聞與熱邪乘心之候不同況汗多則大邪必從汗解止慮陽神飛越難返故脈短則陰陽不附脈和則陰陽未離其生死但從脈定耳其脈既短安問藥之長哉門人問亡陽而譫語四逆湯可用乎答曰仲景不言方而子欲言之曷不詳之仲景耶蓋亡陽固必急回其陽然邪傳陽

明胃熱之熾否津液之竭否裏證之實否俱不可知設不辨悉欲回其陽先竭其陰竟何益哉此仲景不言藥乃所以爲聖也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語小承氣湯主之若一服讝語止更莫復服

註 此條舉讝語之因汗多津越者爲言

傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則讝語

註 此舉讝語因誤汗而致者其曰裏實亦卽上文胃中燥大便必鞕之互辭其不出方者亦卽上文小承氣湯之互意也

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生澀者死微者但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利止後服

註 此條舉讝語之勢重者爲言而勢重之中復分二等劇者生死仍憑乎脉微者則主以大承氣湯

比上條之小承氣爲更進矣前云讝語脉短者死此云脉弦者生前云讝語脉滑疾者用小承氣此云脉澀者死更互一字而大意躍然

汗出讝語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯

註 此條之文似淺而實深仲景懼人不解已自爲註脚不識後人何故茫然胃有燥屎本當用下以讝語而兼汗出知其風邪在胃必俟過經下之始不增擾所以然者風性善行數變下之若早徒引之走空竅亂神明耳然胃有燥屎下之不爲大悞其小悞止在未辨證兼乎風若此者必再一大下庶大腸空而風邪得以併出故自愈此通因通用之法亦將差就錯之法也

陽明病讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞕耳宜大承氣湯

註 有燥屎則腸胃熱結故不能食若能食則腸胃未結故但鞕耳前條云其後發熱者必大便鞕而

少也此云但鞕耳不更言其少乃於胃中有燥屎者言其五六枚之多亦互舉以辨微細之意不可忽也俱宜大承氣湯者已結者開其結未結者滌其熱不令更結同一讝語潮熱故同一治至於藥制之大小必有分矣合九條觀之既云實則讝語矣乃其用治遲徊審諦始以和法爲攻法俟服藥後重辨脉證不敢徑情急攻即攻之又一服利止後服何其鄭重耶可見所謂實者乃邪氣實也邪氣實正氣未有不虛況津液爲邪所耗而至於讝語方寸幾於無主其虛爲何如哉邪實不可不下正虛不可太下斟酌於邪正之間以權宜而善其治良工苦心要當三復於聖言矣

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

（註）胃中止一津液汗多則津液外滲加以發熱則津液盡隨熱勢蒸蒸騰達於外更無他法可止其汗惟有急下一法引熱勢從大腸而出庶津液不致盡越於外耳前條云發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之可見調胃之義乃和緩其

胃中之熱以存津液也此證發熱而至於汗多明是始先未行調胃所致故宜急下無取緩調

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

註 發汗不解而反腹中滿痛則邪不在表而在裏亦惟有急下一法庶滿痛去而病自解也減不足言四字形容腹滿如繪見滿至十分即減去一二分不足殺其勢也此所以縱有外邪未解而當下無疑耳

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯

註 此一條辨證最微細大便難則非久祕裏證不急也身微熱則非大熱表證不急也故曰無表裏證只可因是而驗其熱邪在中耳熱邪在中亦不爲急但其人目中不了了睛不和則急矣以陽明之脉絡於目絡中之邪且盛則在經之盛更可知故惟有急下之而已按少陰經有急下三法以救腎水一本經水竭一木邪涌水一土邪凌水而陽

明經亦有急下三法以救津液一汗多津越於外一腹滿津結於內一目睛不慧津枯於中合兩經下法以觀病情生理恍覺身在冰壺腹飲上池矣

陽明病欲解時從申至戌上

脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕

註 其陽則絕即無陽之互辭謂津液內亡也當下不下故至此耳

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

註 脾約之證在太陽陽明已當用麻仁丸潤下失此不用延至正陽陽明胃中津液甕乾杯罄下無及矣然則浮濇之脉轉爲浮芤不可類推乎

陽明經下篇（凡外邪已趨少陽未離陽明謂之少陽陽明列於此篇其少陽陽明合病另有專條附三陽經後）

喻昌曰凡屬正陽陽明之證病已入於胃腑故下之則愈其有胃不實而下證不具者病仍在經在經之邪不解必隨經而傳少陽口苦咽乾目眩耳

聾胷脅滿痛之證必兼見一二故謂之少陽陽明其實乃是陽明少陽也少陽主半表半裏陽明證中纔兼少陽即表裏皆不可攻故例中止用和法

陽明病發潮熱大便溏小便自可胷脅滿不去者小柴胡湯主之

註潮熱本陽明胃實之候若大便溏小便自可則胃全不實更加胷脅滿不去則證已傳入少陽矣纔兼少陽即有汗下二禁惟小柴胡一方合表裏中而總和之乃少陽一經之正法故陽明少陽亦取用之無別法也

陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然而汗出解也

註不但大便溏爲胃未實即使不大便而見脅下鞕滿嘔與舌胎之證則少陽爲多亦當從小柴胡湯分解陰陽則上下通和濈然汗出而胎嘔脅滿之外證一時俱解矣既云津液得下則大便自行亦可知矣此一和而表裏俱徹所以爲貴也按上

焦得通津液得下八字關係病機最切風寒之邪協津液而上聚於膈中爲喘爲嘔爲水逆爲結胷嘗十居六七是風寒不解則津液必不得下倘悞行發散不惟津液不下且轉增上逆之勢愈無退息之期矣此所以和之於中而上焦反通也至於雜病項中如痰火哮喘欬嗽瘰癧等證又皆火勢熏蒸日久頑痰膠結經隧所以火不內熄則津液必不能下灌靈根而精華盡化爲敗濁耳夫人之得以長享者惟賴後天水穀之氣生此津液津液結則病津液竭則死矣故治病而不知救人之津液者眞庸工也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

註 註謂脾約乃太陽之邪徑趨入胃而成胃實貽悞千古

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是

也

註　病已傳到少陽經而去陽明經遠矣乃從少陽經治法發汗利小便已其人方纔胃中燥煩實大便難者是少陽重轉陽明而成可下之一證也此下二條與陽明兼帶少陽之證迥殊故另揭出

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

註　此條亦互上條之意解見少陽

傷寒脉浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者爲陽明病也

註　脉浮而緩本爲表證然無發熱惡寒外候而手足自溫者是邪已去表而入裏其脉之浮緩又是邪在太陰以脾脉主緩故也邪入太陰勢必蒸濕爲黃若小便自利則濕行而發黃之患可免但脾濕既行胃益乾燥胃燥則大便必鞕因復轉爲陽明內實而成可下之證也

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

註　少陰之證自利者最多虛寒則下利清穀滑脫

則下利膿血故多用溫法此以六七日不大便而腹脹可見熱邪轉歸陽明而爲胃實之證所以宜於急下也

下利讝語者有燥屎也宜小承氣湯

註 下利則熱不結胃不實何得讝語耶此必邪返於胃內有燥屎故雖下利而結者自若也半利半結所以不宜大承氣而宜於小承氣微動其結耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十八卷目錄

醫部彙考三百三十八

傷寒門四

張機傷寒論（少陽經全篇　合病　併病　壞病　痰病　太陰經全篇　少陰經前篇　少陰經後篇）

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

則下利膿血故多用溫法此以六七日不大便而腹脹可見熱邪轉歸陽明而爲胃實之證所以宜於急下也

下利讝語者有燥屎也宜小承氣湯

註　下利則熱不結胃不實何得讝語耶此必邪返於胃內有燥屎故雖下利而結者自若也半利半結所以不宜大承氣而宜於小承氣微動其結耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十八卷目錄

醫部彙考三百三十八

傷寒門四

張機傷寒論

少陽經全篇　合病　併病　壞病　痰病　太陰經全篇　少陰經前篇　少陰經後篇

藝術典第三百五十八卷

醫部彙考三百三十八

傷寒門四

漢張機傷寒論

少陽經全篇

喻昌曰仲景少陽經之原文叔和大半編入太陽經中昌殊不得其解豈以太陽行身之背少陽行身之側其營衛顯然易辨非如陽明與三陰之屬腑臟者營衛難窺故將少陽之文彙入太陽耶此

等處竊不敢仍叔和之舊蓋六經各有專司乃引少陽之文與三陽合病併病過經不解及壞病諸條悉入太陽篇中適足以亂太陽之正也在太陽一經之病已倍他經辨之倍難而無端蔓引混收此後人所爲多岐亡羊乎茲將治少陽之法悉歸本篇其合病併病壞病痰病另隸於三陽經後庶太陽之脈清而少陽之脈亦清耳

傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具若胷中煩而不嘔去半夏人參加苦蔞實若渴者去半夏加人參苦蔞根若腹中痛者去黃芩加芍藥若脅下痞鞕去大棗加牡蠣若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓若不渴外有微熱者去人參加桂枝溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子乾薑

註　軀殼之表陽也軀殼之裏陰也少陽主半表半

裏之間其邪入而併於陰則寒出而併於陽則熱往來寒熱無常期也風寒之外邪挾身中有形之痰飲結聚於少陽之本位所以胷脅苦滿也胷脅既滿胃中之水穀亦不消所以默默不欲食卽昏昏之意非靜默也心煩者邪在胷脅逼處心間也或嘔不嘔或渴不渴諸多見證各隨人之氣體不盡同也然總以小柴胡之和法爲主治而各隨見證以加減之耳

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

註　口苦咽乾者熱聚於膽也目眩者木盛生風而旋運也

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讝語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註　少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義互舉其旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宜於發汗者尚不可汗則傷風之不可汗更不待言矣傷風之胷滿而煩痰飲上逆似可吐下者尚不可吐下則傷寒之不可吐下更不待言矣蓋脈弦細者邪欲入裏

其在胃之津液必爲熱耗重復發汗而驅其津液外出安得不讝語乎胃和者邪散而津回也不和者津枯而飲結所以煩而悸也

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

註 風熱上壅則耳無聞目赤無形風熱與有質痰飲摶結則胷滿而煩此但從和解中行分竭法可也若誤汗下則胷中正氣大傷而邪得以逼亂神明所喪不滋多乎

傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食不嘔此爲三陰不受邪也

註 能食不嘔與胃和則愈之義互發

傷寒三日少陽脈小者欲已也

註 脈不弦大邪微欲解之先徵也

少陽病欲解時從寅至辰上

註 受病之經正氣虛衰每藉力於時令之王此趨三避五所繇來乎

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故

也

註　陽去入陰則邪勢得以留連轉致危困者多矣有治傷寒之責者線索在手於邪在陽經之日亟從外奪不亦善乎

傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

註　身熱惡風太陽證也頭項強太陽兼陽明證也脅下滿少陽證也本當從三陽合併病之例而用表法但其手足溫而加渴外邪輻輳於少陽而向裏之機已著倘更用辛甘發散之法是重增其熱而大耗其津也故從小柴胡之和法則陽邪自罷而陰津不傷一舉而兩得矣此用小柴胡湯當從加減法不嘔而渴者去半夏加苦蔞根爲是

傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛者先用小建中湯不差者與柴胡湯主之

註　陽脈濇陰脈弦渾似在裏之陰寒所以法當腹中急痛故以小建中之緩而和其急腹痛止而脈不弦澀矣若不差則弦爲少陽之本脈而澀乃汗

出不徹腹痛乃邪欲傳太陰也則用小柴胡以和陰陽爲的當無疑矣

傷寒五六日已發汗而復下之胷脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

註 少陽證尚兼太陽所以誤下而胷間微結也太陽中篇結胷條內頭微汗出用大陷胷湯以其熱結在裏故從下奪之法也此頭汗出而胷微結用柴胡桂枝乾薑湯以裏證未具故從和解之法也

小柴胡方中減半夏人參而加桂枝以行太陽加乾薑以散滿苦蔞根以滋乾牡蠣以耎結一一皆從本例也

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

註 風寒之邪從陽明而傳少陽起先不渴裏證未具及服小柴胡湯已重加口渴則邪還陽明而當調胃以存津液矣然不曰攻下而曰以法治之意味無窮蓋少陽之寒熱往來間有渴證倘少陽未罷而恣言攻下不自犯少陽之禁乎故見少陽重

轉陽明之證但云以法治之其法維何卽發汗利小便已胃中燥煩實大便難之說也若未利其小便則有猪苓五苓之法若津乾熱熾又有人參白虎之法仲景圓機活潑未易言矣

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡湯不中與之宜半夏瀉心湯

註 二條互發前略後詳悞下雖證未變然正氣先虛故服柴胡湯必蒸蒸而振始得發熱汗出而邪從表解也若悞下而成結胷與痞則邪尚在太陽而柴胡非所宜矣結胷及痞太陽經各有顯條

本發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆本先下之而反汗之此爲逆也若先下之治不爲逆

註 少陽雖有汗下二禁然而當汗當下正自不同

本當發汗而反下之則爲逆若先汗後下則不爲逆本當下之而反發汗則爲逆若先下後汗則不爲逆全在辨其表裏差多差少之間矣

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

註陽微結者陽邪微結未盡散也註作陽氣衰微故邪氣結聚大差果爾則頭汗出爲亡陽之證非半表半裏之證矣果爾則陰結又是陰氣衰微矣玩本文假令純陰結等語謂陽邪若不微結純是陰邪內結則不得復有外證其義甚明得屎而解即取大柴胡爲和法之意也

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈

註汗吐下三法難於恰當若悞用之則病未去而

胃中之津液已先亡凡見此者診視其脈與證陰陽自和則津液復生必自愈也

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胷脅下滿如結胷狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脅下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之

註　四條皆互文見意也一云經水適來一云經水適斷一云七八日熱除而脈遲身涼一云七八日續得寒熱發作有時一云胷脅下滿一云邪氣因入與正氣相搏結於脅下一云如結胷狀一云邪高痛下一云譫語一云晝日明了暮則譫語如見

鬼狀一云如瘧狀一云往來寒熱休作有時一云刺期門一云用小柴胡湯一云毋犯胃氣及上二焦皆互文以明大義而自爲註脚也學者試因此而紬繹全書思過半矣又如結胷狀四字仲景尚恐形容不盡重以臟腑相連邪高痛下之語暢發病情蓋血室者衝脈也下居腹內厥陰肝之所主也而少陽之膽與肝相連腑邪在上臟邪在下胃口逼處二邪之界所以默默不欲飲食而但喜嘔耳期門者肝之募也隨其實而瀉之瀉肝之實也又刺期門之註脚也小柴胡湯治少陽之正法也毋犯胃氣及上二焦則舍期門小柴胡更無他法矣必自愈見腑邪可用小柴胡湯而臟邪必俟經水再行其邪熱乃隨血去又非藥之所能勝耳

合病

喻昌曰合病者兩經之證各見一半如日月之合朔如王者之合圭璧界限中分不偏多偏少之謂也

太陽病項背强几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯

主之

太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之

註 二條以有汗無汗定傷風傷寒之別蓋太陽初交陽明未至兩經各半故仲景原文不用合病二字然雖不名合病其實乃合病之初證也几几者頸不舒也頸屬陽明既於太陽風傷衞證中纔見陽明一證卽於桂枝湯內加葛根一藥太陽寒傷營證中纔見陽明一證卽於麻黃湯內加葛根一藥此大匠天然不易之彀率也然第二條不用麻黃全方加葛根反用桂枝全方加麻黃葛根者則幷其巧而傳之矣見寒邪既欲傳於陽明則胷間之喘必自止自可不用杏仁況頸項背俱是陽位易於得汗之處設以麻黃本湯加葛根大發其汗將毋項背強几几者變爲經脈振搖動惕乎此仲景之所謂精義入神也

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

註 二條又以下利不下利辨別合病主風主寒之不同也風者陽也陽性上行故合陽明胃中之水飲而上逆寒者陰也陰性下行故合陽明胃中之水穀而下奔然上逆則必加半夏入葛根湯以滌飲止嘔若下利則但用葛根湯以解兩經之邪不治利而利自止耳葛根湯卽第一條桂枝湯加葛根不用麻黃者是也

太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下麻黃湯主之

註 兩經合病當合用兩經之藥何當偏用麻黃湯耶此見仲景析義之精蓋太陽邪在胷陽明邪在胃兩邪相合必上攻其肺所以喘而胷滿麻黃杏仁治肺氣喘逆之顓藥用之恰當正所謂內舉不避親也何偏之有

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯

註 太陽陽明合病下利表證爲多陽明少陽合病下利裏證爲多太陽少陽合病下利半表半裏之證爲多故用黃芩甘草芍藥大棗爲和法也

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

註 土木之邪交動則水穀不停而急奔故下利可必也陽明脈大少陽脈弦兩無相負乃爲順候然兩經合病陽明氣衰則弦脈獨見少陽勝而陽明負矣下之固是通因通用之法而土受尅賊之邪勢必藉大力之藥急從下奪乃爲解圍之善著然亦必其脈滑而且數有宿食者始爲當下無疑也設脈不滑數而遲軟方慮土敗垂亡尚敢下之乎

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者白虎湯主之

註 三陽合病五合之表裏俱傷故其脈浮大其證欲眠而目合則汗中州之擾亂可知矣此時發汗則偏於陽而陽明之津液倍竭故譫語益甚將成無陽之證也下之則偏於陰而眞陽以無偶而益

孤故手足逆冷而額上生汗將成亡陽之證也旣不宜於汗下惟有白虎一湯主解熱而不得表裏在所急用然非自汗出則表猶未解尚未可用此證夏月最多當與痓濕暍篇參看按三陽經之受外邪太陽頭疼腰脊痛陽明目痛鼻乾不眠少陽寒熱往來口苦嘔渴各有專司合病者卽兼司二陽三陽之證也仲景但以合之一字括其義而歸重在下利與嘔喘胷滿之內證蓋以邪旣相合其人腹內必有相合之徵驗故也後人於此等處漫不加察是以不知合病爲何病耳再按少陽篇第九條云傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡桂枝湯主之一條其證全是太陽與少陽合併之病但內無下利其嘔復微卽不謂之合病心下支結又與心下痞鞕時如結胷者不同卽不謂之併病乃知合併之病重在內有合併之徵驗非昌之臆說矣後人謂三陽合病宜從中治此等議論似得仲景表邪未散用小柴胡湯裏熱已極用白虎湯之旨然未可向癡

人說夢也設泥此則仲景所用麻黃湯大承氣湯之妙法萬不敢從矣

併病

喻昌曰併病者兩經之證連串爲一如貫索然即兼併之義也併則不論多寡一經見三五證一經見一二證即可言併病也然太陽證多陽明少陽證少如秦之併六國者乃病之常若陽明少陽證多太陽證少則太陽必將自罷又不得擬之爲六國併秦矣

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便

難而譫語者下之則愈宜大承氣湯

註按二陽併病二條皆是太陽與陽明併也上條證初入陽明而太陽仍未罷宜小汗此條證已入陽明而太陽亦隨罷宜大下但上條之文從前未有註釋茲特明之太陽初得寒傷營之病以麻黃湯發其汗汗出而邪去病不傳矣因汗出不徹故傳陽明續自微汗出不惡寒陽明熱熾似乎當用下法以太陽之邪未徹故下之爲逆謂其必成結胷等證也如此者可小發汗然後下之設面色緣緣正赤者寒邪深重陽氣怫鬱在表必始先未用麻黃湯或已用麻黃湯而未得汗所以重當解之熏之又非小發汗所能勝矣若是發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越也畢竟當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得方是陽氣不得越耳短氣者因汗而氣傷也脈濇者因汗而血傷也汗雖未徹其已得汗可知其不怫鬱又可知所以宜更他藥以小發其汗更字讀平聲與太陽中篇傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者

可更發汗互發然則彼更桂枝湯此更桂枝加葛根湯并可推矣

太陽與少陽併病頭項强痛或眩冒時如結胷心下痞鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讝語脈弦五六日讝語不止當刺期門

註　少陽之脈絡脅脅間併入太陽之邪則與結胷證似是而實非也肝與膽合刺肝俞所以瀉膽也膀胱不與肺合然肺主氣刺肺俞以通其氣斯膀胱之氣化行而邪自不能留矣發汗則讝語與合病木盛尅土之意同註謂木盛則生心火節外生枝反失正意脈弦亦即合病內少陽勝而陽明負之互詞此所以刺期門隨木邪之實而瀉之也

太陽少陽併病心下鞕頸項强而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

註　重申不可下之禁與上條不可汗互發

太陽少陽併病而反下之成結胷心下鞕下利不止水漿不下其人心煩

註　悞下之變乃至結胷下利上下交征而陽明之

居中者水漿不入心煩待斃傷寒顧可易言哉併病即不悞用汗下已如結胷心下痞鞕矣况加悞下乎此比太陽一經悞下之結胷殆有甚焉其人心煩似不了之語然仲景太陽經謂結胷證悉具煩躁者亦死意者此謂其人心煩者死乎

壞病

喩昌曰壞病者已汗已吐已下已温鍼病猶不解治法多端無一定可擬故名之爲壞病也壞病與過經不解大異過經不解者連三陰經俱已傳過故其治但在表裏差多差少宜先宜後之間若壞病則病在三陽未入於陰故其治但在陽經其證有結胷下利眩冒振惕驚悸譫妄嘔噦躁煩之不同其脈有弦促細數緊滑沉微濇弱結代之不同故必辨其脈證犯何逆然後得以法而治其逆也

太陽病三日已發汗若吐若下若温鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

註 相傳傷寒過經日久二三十日不痊者謂之壞

病遂與過經不解之病無辨此古今大悞也仲景止說病三日卽五六日亦未說到且此條止說太陽病連少陽亦未說到故謂桂枝偏表之法不可用觀下條太陽轉入少陽之壞證有柴胡證罷四字可見此爲桂枝證罷故不可復用也設桂枝證仍在卽不得謂之壞病與少陽篇中柴胡證仍在者此雖已下之不爲逆復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解之文又互相綰照也豈有桂枝柴胡之證尚未罷而得指爲壞病之理哉故必細察其脈爲何脈證爲何證從前所悞今犯何逆然後隨其證而治之始爲當耳

本太陽病不解轉入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫鍼譫語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之

註　兩條文意互發其旨甚明叔和分彙致滋疑惑茲合而觀之乃知上條云桂枝湯不中與則其所犯要不離於太陽一經之悞吐悞下悞發汗悞燒

鍼之諸逆也此條云柴胡湯不中與則其所犯要不離於少陽一經之悞吐悞下悞發汗悞燒鍼之諸逆也

痰病

喩昌曰慨自傷寒失傳後人乃以食積虛煩痰飲脚氣牽合爲類傷寒四證此等名目一出凡習傷寒之家苟簡粗疎已自不識要妙況復加冬溫溫病寒疫熱病濕溫風溫霍亂痓內癰畜血爲類傷寒十四證頭上安頭愈求愈失茲欲直遡淵源不得不盡闢岐泒蓋仲景於春夏秋三時之病旣以冬月之傷寒統之則十四證亦皆傷寒中之所有也若痰之局外漫不加察至臨證模糊其何以應無窮之變哉昌於春夏病中逐段拈出茲於三陽經後特立痰病一門凡痰飲素積之人有挾外感而動者有不繇外感而自動者仲景分別甚明挾外感之邪摶結胷脅三陽篇中已致詳矣此但舉不繇外感之痰病昭揭其旨俾學者辨證以施治焉耳

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胷中痞鞕氣上冲咽喉不得息者此爲胷有寒也當吐之宜瓜蔕散諸亡血虛家不可與

註　寒者痰也痰飲內動身必有汗加以發熱惡寒全似中風但頭不痛項不强此非外入之風乃內蘊之痰窒塞胷間宜用瓜蔕散以湧出其痰也

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘

註　寒亦痰也此卽上條之互文上條辨非桂枝之證此條辨不可發汗蓋痰從內動無外感與俱誤

發其汗必至迷塞經絡畱連不返故示戒也設兼外感如三陽證中諸條則無形之感挾有形之痰結於一處非汗則外邪必不解卽强吐之其痰飲亦必不出所以小青龍一法卓擅奇功耳此言有痰無感悞發其汗重亡津液卽大損陽氣其人胃冷而吐蚘有必至也

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胷中心中滿而煩饑不能食者病在胷中當須吐之宜瓜蔕散

註　手足厥冷與厥陰之熱深厥深相似其脈乍緊

則有時不緊殊不似矣可見痰結在胷故滿煩而不能食亦宜瓜蔕爲吐法也合三條總見痰證可吐不可汗合食積虛煩脚氣四證論之勿指爲類傷寒但指爲不可發汗則其理甚精蓋食積胷中陽氣不布更發汗則陽氣外越一團陰氣用事愈成危候虛煩則胃中津液已竭更發汗則津液盡亡矣脚氣即地氣之濕邪從足先受者正濕家不可發汗之義耳奈何舍正路而趨曲徑耶

太陰經全篇

喻昌曰仲景傷寒論六經中惟太陰經文止九條方止二道後人致惜其非全書昌細繹其所以約畧之意言中風即不言傷寒言桂枝即不言麻黃言當溫者則曰宜四逆輩全是引伸觸類之妙可見治法總不出三陽外但淸其風寒之原以定發汗解肌更於腹之或滿或痛間辨其虛實以定當下當溫而已了無餘義矣

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胷下結鞕

註　腹滿自利太陰之本證也吐而食不下則邪迫於上利甚而腹痛則邪迫於下上下交亂胃中空虛此但可行溫散設不知而悞下之其在下之邪可去而在上之邪陷矣故胷下結鞕與結胷之變頗同胃中津液上結胷中陽氣不布卒難開也

太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長者爲欲愈

註　四肢煩疼者脾主四肢亦風淫末疾之驗也陽脈微陰脈濇則風邪已去而顯不足之象但脈見不足正恐元氣已漓暗伏危機故必微濇之中更察其脈之長而不短知元氣未漓其病爲自愈也註不審來意謂濇爲血凝氣滯大謬豈有血凝氣滯反爲欲愈之理耶

太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

註　太陰脈尺寸俱沉細今脈浮則邪還於表可知矣故仍用桂枝解肌之法也夫太陽經中以浮緩爲中風浮緊爲傷寒故此不重贅但揭一浮字其義即全該風邪用桂枝湯其脈之浮緩不待言矣然則寒邪之脈浮緊其當用麻黃湯更不待言矣

況少陽篇中云設胷滿脅痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯早已挈明用麻黃湯之義故於太陰證中但以桂枝互之乃彌全現全彰也不然同一浮脈何所見而少陽當用麻黃太陰當用桂枝也哉

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜服四逆輩

註 謂自利不渴濕勝也故用四逆輩以燠土燥濕此老生腐談非切要也仲景大意以自利不渴者屬太陰以自利而渴者屬少陰分經辨證所關甚鉅蓋太陰屬濕土熱邪入而蒸動其濕則顯有餘故不渴而多發黃少陰屬腎水熱邪入而消耗其水則顯不足故口渴而多煩燥

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實穢腐當去故也

註 太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風然手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之四逆

與厥所以繫在太陰允爲恰當也太陰脈見浮緩其濕熱交盛勢必蒸身爲黃若小便自利者濕熱從水道暗泄不能發黃也前陽明篇中不能發黃以上語句皆同但彼以胃實而便鞕其證復轉陽明此以脾實而下穢腐其證正屬太陰耳至七八日暴煩下利日十餘行其證又與少陰無別而利盡穢腐當自止則不似少陰之煩躁有加下利漫無止期也況少陰之煩而下利手足反溫脈緊反去者仍爲欲愈之候若不辨晰而悞以四逆之法治之幾何不反增危困耶雖陽明與太陰腑藏相連其便鞕與下利自有陽分陰分之別註家歸重於脾謂脾爲胃行津液則如此不爲胃行津液則如彼似是而非全失仲景三陰互發之旨

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

註　太陽病之悞下其變皆在胷脅以上此之悞下而腹滿時痛無胷脅等證則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升舉陽邪但

倍芍藥以收太陰之逆氣本方不增一藥斯爲神耳

大實痛者桂枝加大黃湯主之

註 大實大滿宜從急下然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但於桂枝湯中少加大黃七表三裏以分殺其邪可也

太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也

註 此段叮嚀與陽明篇中互發陽明曰不轉失氣曰先鞕後溏曰未定成鞕皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱便利減用大黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也

太陰病欲解時從亥至丑上

少陰經前篇（凡本經宜溫之證悉列此篇）

喻昌曰傳經熱邪先傷經中之陰甚者邪未除而陰已竭獨是傳入少陰其急下之證反十之三急溫之證反十之七而宜溫之中復有次第不同毫釐千里粗工不解必於曾犯房勞之證始敢用溫

及遇一切當溫之證反不能用詎知未病先勞其腎水者不可因是遂認爲當溫也必其人腎中之眞陽素虧復因汗吐下擾之外出而不能內返勢必藉溫藥以回其陽方可得生所以傷寒門中亡陽之證最多即在太陽已有種種危候至傳少陰其辨證之際仲景多少遲徊顧惜不得從正治之法淸熱奪邪以存陰爲先務也今以從權溫經之法疏爲前篇正治存陰之法疏爲後篇俾學者免臨岐之惑云

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

註脈沉爲在裏證見少陰不當復有外熱若發熱者乃是少陰之表邪即當行散表之法者也但三陰之表法與三陽迥異三陰必以溫經之藥爲表而少陰尤爲緊關故麻黃與附子合用俾外邪出而眞陽不出纔是少陰表法之正也

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

註 得之一二日即上條始得之之互文口中和者不渴不燥全無裏熱其背惡寒則陽微陰盛之機已露一班故灸之以火助陽而消陰主之以附子湯溫經而散寒也

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

註 不吐利煩躁嘔渴爲無裏證旣無裏證病尙在表可知故以甘草易細辛而微發汗又溫散之緩法也

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

註 欲吐不吐心煩腎氣上逆之徵也自利而渴加以口燥舌乾引水自救似乎傳經熱病之形悉具然腎熱則水道黃赤若小便色白又非腎熱證乃下焦虛寒不能制水仍當從事溫法不可誤認爲熱而輕用寒下也

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

註 陰陽俱緊傷寒之脈也傷寒無汗反汗出者無陽以固護其外所以邪不出而汗先出也少陰之邪不出則咽痛吐利一一顯少陰之本證卽當用少陰溫經散邪之法不言可知矣

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱濇者復不可下之

註 亡陽不可發汗與上條互法亡與無同無陽則其邪爲陰邪陰邪本宜下然其人陽已虛尺脈弱濇者復不可下其當亟行溫法又可見矣

少陰病下利若利自止惡寒而踡臥手足溫者可治

註 惡寒踡臥證本虛寒利止手足溫則陽氣未虧其陰寒亦易散故可用溫法也

少陰病惡寒而踡時自煩欲去衣被者可治

註 自煩欲去衣被眞陽擾亂不寧然尚未至出亡在外故可用溫法也

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈

緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

註 三條互見此則邪解陽回可勿藥自愈之證卽緊去入安之互詞也

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

註 身體痛手足寒骨節痛脈沉皆寒邪入少陰之本證卽當用附子湯行溫經散寒之定法也

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

註 吐利厥冷而至於煩躁欲死腎中之陰氣上逆將成危候故用吳茱萸以下其逆氣而用人參薑棗以厚土則陰氣不復上干此之溫經兼用溫中矣

少陰病下利白通湯主之

註 下利無陽證者純陰之象恐陰盛而隔絕其陽故用白通湯以通其陽而消其陰也

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

註 與白通湯反至厥逆無脈乾嘔而煩此非藥之

不勝病也以無鄉導之力宜其不入耳故復加人尿猪膽汁之陰以引陽藥深入然脈暴出者死微續者生亦危矣哉故上條纔見下利蚤用白通圖功於未著眞良法也

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者眞武湯主之

註陰寒內持濕勝而水不行因而內滲外薄甚至水穀不分或欬或利泛溢無所不之非賴眞武坐鎮北方之水寧有底哉太陽篇中厥逆筋惕肉瞤而亡陽者用眞武之法已表明之矣茲少陰之水濕上逆仍用眞武一法以鎮攝之可見太陽膀胱與少陰腎一臟一腑同居北方寒水之位腑邪爲陽邪藉用麻桂爲青龍臟邪爲陰邪藉用附子爲眞武得此二湯以滌痰導水消陰攝陽其神功妙濟眞有不可思議者矣

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利

此脈不出者通脈四逆湯主之其脈卽出者愈

註　下利裏寒種種危殆其外反熱其面反赤其身反不惡寒而手足厥逆脈微欲絕明係羣陰隔陽於外不能內返也故倣白通之法加葱入四逆湯中以入陰迎陽而復其脈也前條云脈暴出者死此條云脈卽出者愈其辨最細蓋暴出則脈已離根卽出則陽已返舍繇其外反發熱反不惡寒眞陽尚在軀殼然必通其脈而脈卽出始爲休徵設脈出艱遲其陽隨熱勢外散又主死矣

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯

註　外邪入少陰宜與腎氣兩相搏擊乃脈見沉而不鼓卽內經所謂腎脈獨沉之義其人陽氣衰微可知故當急溫之以助其陽也

少陰病飲食入口卽吐心下溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胷中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯

註　飲食入口卽吐猶曰胃中不能納穀也若不飲食之時復欲吐而不能吐明係陰邪上逆矣此等

處必加細察若始得之便手足寒而脈弦遲即非傳經熱邪其爲陰邪上逆無疑當從事乎溫經之法也若胷中實者是爲陽邪在胷而不在腹即不可用下而當吐以提之也然必果係陽邪方可用吐設膈上有寒飲乾嘔即是陰邪用事吐必轉增其逆計惟有急溫一法可助陽而勝陰矣

少陰病下利脈微澀嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

註 下利而脈見陽微陰澀爲眞陰眞陽兩傷之候矣嘔者陰邪上逆也汗出者陽虛不能外固陰弱不能內守也數更衣反少者陽虛則氣下墜陰弱則勤努責也是證陽虛本當用溫然陰弱復不宜於溫一藥之中既欲救陽又欲護陰漫難區別故於頂之上百會穴中灸之以溫其上而升其陽庶陽不致下陷以逼迫其陰然後陰得安靜不擾而下利自止耳此證設用藥以溫其下必逼迫轉加下利不止而陰立亡故不用溫藥但用灸法有如此之回護也前條用吳茱萸湯兼溫其中此條用

灸法獨溫其上妙義天開令人舞蹈

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

註 既吐且利手足逆冷者其常也若反發熱則陽氣似非衰憊然正恐眞陽越出軀殼之外故反發熱耳設脈不至則當急溫無疑但溫藥必至傷陰故於少陰本穴用灸法以引其陽內返斯脈至而吐利亦將自止矣前條背惡寒之證灸後用附子湯者陰寒內凝定非一灸所能勝此條手足反熱止是陰內陽外故但灸本經以招之內入不必更用溫藥也絲絲入扣

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治

註 陰盛無陽即用四逆等法回陽氣於無何有之鄉其不能回者多矣故曰不治

少陰病吐利煩躁四逆者死

註 上吐下利因至煩躁則陰陽擾亂而竭絕可虞更加四肢逆冷是中州之土先敗上下交征中氣立斷故主死也使蚤用溫中之法寧至此乎

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

註　下利旣止其人似可得生乃頭眩時時自冒者復爲死候蓋人身陰陽相爲依附者也陰亡於下則諸陽之上聚於頭者紛然而動所以頭眩時時自冒陽脫於上而主死也可見陽回利止則生陰盡利止則死矣

少陰病四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死

註　四逆惡寒身踡更加脈不至陽已去矣陽去故不煩然尚可施種種回陽之法若其人復加躁擾則陰亦垂絕卽欲回陽而基址已壞不能回也

少陰病六七日息高者死

註　諸陽主氣息高則眞氣上逆於胷中本實先撥而不能復歸於氣海故主死也六七日三字辨證最細見六七日經傳少陰而息高與二三日太陽作喘之表證迥殊也

少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

註　脈微沉細但欲臥少陰之本證也汗出不煩則

陽證悉能而當顧慮其陰矣乃於中兼帶欲吐一證欲吐明係陰邪上逆正當急溫之時失此不圖至五六日自利有加復煩躁不得臥寐非外邪至此轉增正少陰腎中之眞陽擾亂頃刻奔散卽溫之亦無及故主死也

少陰經後篇（凡少陰傳經熱邪正治之法悉列此篇）

少陰之爲病脈微細但欲寐也

註　陽脈滑大陰脈微細外邪傳入少陰其脈必微細而與三陽之滑大迥殊衞氣行陽則寤行陰則寐邪入少陰則氣行於陰不行於陽故但欲寐也此少陰之總脈總證也

少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗

註　沉細之中加之以數正熱邪入裏之徵熱邪入裏卽不可發汗發汗則動其經氣而有奪血亡陽之變故示戒也

少陰病欬而下利讝語者被火氣刦故也小便必難以強責少陰汗也

註　少陰之脈從足入腹上循喉嚨縈繞舌根故多

咽痛之證其支別出肺故間有欬證今以火氣强刦其汗則熱邪挾火力上攻必爲欬以肺金惡火故也下攻必爲利以火勢逼迫而走空竅故也內攻必讝語以火勢燔焫而亂神識故也小便必難者見三證皆妨小便蓋肺爲火熱所傷則膀胱氣化不行大腸奔迫無度則水穀併趨一路心胞燔灼不已則小腸枯涸必至耳少陰可强責其汗乎

少陰中風陽微陰浮者爲欲愈

註　風邪傳入少陰仍見陽浮陰弱之脈則其勢方

熾必陽脈反微陰脈反浮乃爲欲愈蓋陽微則外邪不復內入陰浮則內邪盡從外出故欲愈也少陰傷寒之愈脈自可類推

少陰病欲解時從子至寅上

註　各經皆解於所王之時而少陰獨解於陽生之時陽進則陰退陽長則陰消正所謂陰得陽則解也即是推之而少陰所重在眞陽不可識乎

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也

註　少陰病難於得熱熱則陰病見陽故前篇謂手足不逆冷反發熱者不死然病至八九日陰邪內解之時反一身手足盡熱則少陰必無此候當是臟邪傳腑腎移熱於膀胱之證也以膀胱主表一身及手足正軀殼之表故爾盡熱也膀胱之血爲少陰之熱所逼其出必趨二陰之竅以陰主降故也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

註　強發少陰汗而動其血勢必逆行而上出陽竅以諸發汗藥皆陽藥故也或口鼻或耳目較前證血從陰竅出者則倍危矣下厥者少陰居下不得汗而熱深也上竭者少陰之血盡從上而越竭也少陰本少血且從上逆故爲難治然則上條不言難治者豈非以膀胱多血且從便出爲順乎

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之

註　心煩不得臥而無躁證則與眞陽發動迥別蓋

眞陽發動必先陰氣四布爲嘔爲下利爲四逆乃致煩而且躁魄汗不止耳今但心煩不臥而無嘔利四逆等證是其煩爲陽煩乃眞陰爲邪熱煎熬如日中纖雲頃刻消散安能霾蔽靑天也哉故以解熱生陰爲主治始克有濟少緩則無及矣

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

註　腹痛小便不利少陰熱邪也而下利不止便膿血則下焦滑脫矣滑脫卽不可用寒藥故取乾薑石脂之辛澀以散邪固脫而加糯米之甘以益中虛葢治下必先中中氣不下墜則滑脫無源而自止也註家見用乾薑謂是寒邪傷胃欠淸葢熱邪挾少陰之氣塡塞胃中故用乾薑之辛以散之若混指熱邪爲寒邪寧不貽誤後人耶

少陰病下利便膿血者桃花湯主之少陰病便膿血者可刺

註　證兼下利便膿血則用桃花湯若不下利而但便膿血則可刺經穴以散其熱卽上文之互意也

少陰病下利咽痛胷滿心煩者猪膚湯主之

註　下利咽痛胷滿心煩少陰熱邪充斥上下中間無所不到寒下之藥不可用矣又立猪膚湯一法以潤少陰之燥但用外皮去其內層之肥白爲是此藥大不可忽陽微者用附子溫經陰竭者用猪膚潤燥溫經潤燥中同具散邪之義比而觀之思過半矣

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

註　邪熱客於少陰故咽痛用甘草湯者和緩其勢也用桔梗湯者開提其邪也此在二三日他證未具故可用之若五六日則少陰之下利嘔逆諸證蠭起此法又未可用矣

少陰病咽中痛半夏散及湯主之少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

註　熱邪挾痰攻咽當用半夏滌飲桂枝散邪若劇者咽傷生瘡音聲不出桂枝之熱旣不可用而陰邪上結復與寒下不宜故用半夏雞子以滌飲潤

咽更有藉於苦酒之消腫斂瘡以勝陰熱也

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

註　傳經熱邪至於手足四逆最當辨悉若見欬利種種之證其爲熱證無疑矣然雖四逆而不至於厥其熱未深故主此方爲和解亦如少陽經之用小柴胡湯爲一定之法也

少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

註　下利六七日本熱去寒起之時其人尚兼欬渴心煩不眠等證則是熱邪搏結水飲以故羈留不去用猪苓湯以利水潤燥不治利而利自止也

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

註　得病纔二三日即口燥咽乾則腎水之不足上供可知延至五六日始下必枯槁難回矣故宜急下以救腎水也

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下

之宜大承氣湯

註　熱邪傳入少陰逼迫津水注爲自利質清而無查滓相雜色青而無黃赤相間可見陽邪暴虐之極反與陰邪無異但陽邪傳自上焦其人心下必痛口必乾燥設係陰邪必心下滿而不痛口中和而不燥必無此枯槁之象故宜急下以救其陰也

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

註　六七日腹脹不大便則胃土過實腎水不足以上供有立盡之勢又非少陰負趺陽反爲順候之比此時下之已遲安得不急

少陰負趺陽者爲順也

註　少陰水也趺陽土也諸病惡土尅水而傷寒少陰見證惟恐土不能制水其水反得以泛溢水一泛溢則嘔吐不利無所不至究令中州土敗而眞陽外越神丹莫救矣故予其權於土則平成可幾予其權於水則昏墊立至此脈法中消息病情之奧旨也按少陰水臟也水居北方原自坎止惟挾外邪而動則波翻浪湧橫流逆射無所不到爲嘔

爲欬爲下利爲四肢沉重仲景不顧外邪惟以眞武一法坐鎭北方之水水不橫溢則諸證自止而人之命根賴以攸固命根者何卽父母搆精時一點眞陽伏藏於腎水之中者是也水中火發所以其證雖陰其人反煩躁多汗而似陽仲景每用乾薑附子白通之法以收攝其陽初不慮夫外感蓋陽出則腠理大開外感先出所以一回陽而了無餘義也若用寒凉以助水則眞陽不返而命根斯斷矣其有腎水衰薄邪入不能橫溢轉而內挾眞

陽蘊崇爲患外顯心煩舌燥咽痛不眠等證卽不敢擅用汗下諸法以重傷其陰但用黃連阿膠湯苦酒湯猪苓湯猪膚湯四逆散之類以分解其熱而潤澤其枯於中雖有急下三證反無當下一證所以前方俱用重劑潤下一日三服始勝其任設熱邪不能盡解傳入厥陰則熱深者其厥亦深而咽痛者轉爲喉痹嘔欬者轉吐癰膿下利者轉便膿血甚者發熱厥逆躁不得臥仍是腎氣先絕而死也必識此意然後知仲景溫經散邪之法與清

熱潤燥之法微細曲折與九轉還丹不異後人窺見一斑者遇陰邪便亟溫遇陽邪便亟下其鹵莽滅裂尚不可勝言況於聾瞶之輩乎茲分前後二篇暢發其義有知我者諒不以爲僭也

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百五十九卷目錄

醫部彙考三百三十九

傷寒門五

張機傷寒論（厥陰經全篇　過經不解　差後　勞復陰陽易病）

王叔和脉訣（傷寒凴脉　陽毒　陰毒）

嚴用和濟生方（傷寒總論）

朱肱活人書（論治法　辨經絡　識陰陽　察脉候　分表裏　詳藥證）

藝術典第三百五十九卷

醫部彙考三百三十九

傷寒門五

漢張機傷寒論

厥陰經全篇

喻昌曰厥陰雖兩經交盡之名然厥者逆也腎居極下逆行而上以傳於肝故名曰厥陰也邪傳厥陰其熱深矣熱深多發厥厥證皆屬於陽以陽與陰不相承接因致厥也厥後發熱陽邪出表則易

愈厥多熱少則病進熱多厥少則病退所以仲景雜用三陽經治法卽讝語之當下者但用小承氣湯微和胃氣他證皆不用下正欲其熱多而邪從外出耳然厥證多兼下利則陽熱變爲陰寒者十居其七蓋木盛則胃土受尅水穀奔迫胃陽發露能食則爲除中木盛則腎水暗虧汲取無休腎陽發露面赤則爲戴陽繇是陽微則厥愈甚陽絕則厥不返矣所以溫之灸之以回其陽仍不出少陰之成法也但厥而下利陰陽之辨甚微不便分爲二篇故發其奧於篇首俾讀者先會其意云

厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食則吐蚘下之利不止

註 消渴者飲水多而小便少也厥陰屬木厥陰邪甚則腎水爲之消腎消則引水以自救故消而且渴其渴不爲水止也氣上撞心心中疼熱者肝氣通於心也饑不能食者木邪橫肆胃土受制也食則吐蚘者胃中饑蚘嗅食則出也下之利不止者邪屬厥陰下則徒虛陽明陽明虛木益乘其所勝

也此條文義形容厥陰經之病情最著蓋子盛則母虛故腎水消而生渴母盛則子實故氣撞心而疼熱然足經之邪終與手經有別雖仰關而攻究不能入心之郛廓也至胃則受俯凌之勢無可逃避食則吐而下則利不止矣亦繇邪自陽明傳入胃氣早空故易動耳

厥陰中風脈微浮爲欲愈不浮爲未愈

註　厥陰之脈微緩不浮中風病傳厥陰脈轉微浮則邪還於表而爲欲愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

註　丑寅卯厥陰風木之王時故病解

厥陰病欲飲水者少少與之愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然凡厥者陰陽不相順接便爲厥厥者手足逆冷者是也

註　厥卽四逆之極陰陽既不相順接下則必至於脫絕也夫厥陰證仲景總不欲下無非欲邪還於表而陰從陽解也此但舉最不可下之二端以嚴其戒耳按手之三陰與手之三陽相接於手足之

三陰與足之三陽相接於足陰主寒陽主熱故陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷也然四肢屬脾脾爲陰與胃之陽不相順接亦主逆冷所以厥證雖傳經熱邪復有不盡然者最難消息

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲爲寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反能食此名除中必死

註　脈遲爲寒寒則胃中之陽氣已薄不可更用寒藥矣腹中卽胃中胃煖乃能納食今胃冷而反能食則是胃氣發露無餘其陽亦必漸去而不能久存故爲必死

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食者恐爲除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此爲熱氣有餘必發癰膿也

註　少陰經中內藏眞陽最患四逆故云吐利手足不逆冷反發熱者不死厥陰經中內無眞陽不患其厥但患不能發熱與夫熱少厥多耳論中恐暴熱來出而復去後三日脉之其熱尚在形容厥證重熱之意然得熱與厥相應尤無後患若熱氣有餘病勢雖退其後必發癰膿以厥陰主血熱與血久持不散必至壅敗也

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉爲痹發熱無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不痹

註　先厥後熱下利止其病爲欲愈矣乃反汗出咽中痛是熱邪有餘上攻咽喉挾濕痰而爲痹也然既發熱即無汗而邪亦外出所以利必自止若不止則無汗明係邪不外出仍在於裏必主便膿血也便膿血者其喉不痹見熱邪在裏即不復在表在下即不復在上也

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥

厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

註　前云諸四逆厥者不可下矣此云厥應下之者其辨甚微蓋先四逆而後厥與先發熱而後厥者其來迥異故彼云不可下此云應下之也以其熱深厥深當用苦寒之藥清解其在裏之熱即名爲下如下利讝語但用小承氣湯止耳從未聞有峻下之法也若不用苦寒反用辛甘發汗寧不引熱勢上攻乎口傷爛赤與喉痹互意

傷寒厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈

註　厥終不過五日即上句之註脚見熱與厥相應陰陽一勝一復恰恰相當故可勿藥自愈

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲臟厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘今病者靜而復時煩者此爲臟寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅圓主之又主久利

註　此條微旨千百年來全無識者昌於篇首總括大意挈出腎陽胃陽二端原有所自臟厥者正指腎而言也蚘厥者正指胃而言也曰脈微而厥則陽氣衰微可知然未定其爲臟厥蚘厥也惟膚冷而躁無暫安乃爲臟厥臟厥用四逆及灸法其厥不回者主死若蚘厥則時煩時止未爲死候但因此而馴至胃中無陽則死也烏梅圓中酸苦辛溫互用以安蚘溫胃益虛久利而便膿血亦主此者能解陰陽錯雜之邪故也

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胷脅煩滿者其後必便血

註　熱少厥微指頭微寒其候原不重然默默不欲食煩躁數日胃中津液傷而坐困矣若小便利色白則胃熱暗除故欲得食若厥而嘔胷脅滿不去則邪聚中焦其後陰邪必走下竅而便血以厥陰主血也

傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病

當愈四日至七日熱不除者必便膿血傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也

註 以陰陽進退之義互舉其旨躍然

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

註 脉微而厥更加煩躁則是陽微陰盛用灸法以通其陽而陽不回則死也

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

傷寒發熱下利至甚厥不止者死

註 厥證但發熱則不死以發熱則邪出於表而裏證自除下利自止也若反下利厥逆煩躁有加則其發熱又爲陽氣外散之候陰陽兩絕亦主死也

發熱而厥七日下利者爲難治

註 厥利與熱不兩存之勢也發熱而厥七日是熱者自熱厥利者自厥利兩造其偏漫無相協之期故雖未現煩躁等證而已爲難治蓋治其熱則愈厥愈利治其厥利則愈熱不至陰陽兩絕不止矣

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

註 六七日不利忽發熱而利渾是外陽內陰之象此中伏有亡陽危機所以仲景蚤爲回護用溫用灸以安其陽若俟汗出不止乃始圖之則無及矣可見邪亂厥陰其死生全關乎少陰也不然厥陰之熱深厥深何反謂之有陰無陽哉

病者手足厥冷言我不結胷小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

註 陽邪必結於陽陰邪必結於陰故手足逆冷腹滿按之痛者邪不上結於胷其非陽邪可知其爲陰邪下結可知則其當用溫用灸更可知矣關元在臍下三寸爲極陰之位也

傷寒五六日不結胷腹濡脈虛復厥者不可下此爲亡血下之死

註 傷寒五六日邪入厥陰其熱深矣乃陽邪不上結於胷陰邪不下結於腹其脈虛而復厥則非熱深當下之比緣其陰血素虧若誤下之以重亡其

陰必主死也此厥陰所以無大下之法而血虛之人尤以下爲大戒矣

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之

註 前條之脉虛此條之脉細互見其義虛細總爲無血不但不可用下幷不可用溫蓋脉之虛細本是陽氣衰微然陰血更爲不足故藥中宜用歸芍以濟其陰不宜用薑附以刦其陰也卽其人素有久寒者但增吳茱萸生薑觀之是則乾薑附子寧不在所禁乎

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

註 大汗出而熱反不去正恐陽氣越出軀殼之外若內拘急四肢疼更加下利厥逆惡寒則在裏純是陰寒宜急用四逆湯以回其陽而陰邪自散耳

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

註 此證較上條無外熱相錯其爲陰寒易明然旣云大汗大下利則陰津亦亡但此際不得不以救

陽爲急俟陽回尚可徐救其陰所以不當牽制也

傷寒脉促手足厥逆者可灸之

註 傷寒脉促則陽氣跼蹐可知更加手足厥逆其陽必爲陰所格拒而不能返故宜灸以通其陽也

傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

註 滑爲陽脉其裏熱熾盛可知故宜行白虎湯以解其熱與三陽之治不殊也

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胷中心下滿而煩饑不能食者病在胷中當須吐之宜瓜蔕散

註 手足厥冷疑似陰邪其脉有時乍緊則是陽邪而見陽脉也陽邪必結於陽所以邪結在胷中心下煩滿饑不能食也此與太陽之結胷迥殊其脉乍緊其邪亦必乍結故用瓜蔕散湧載其邪而出斯陽邪仍從陽解耳

傷寒厥而心下悸者宜先治水當用茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

註 太陽篇中飲水多者心下必悸故此厥而心悸者明係飲水所致所以乘其水未漬胃先用茯苓

甘草湯治水以清下利之源後乃治厥庶不致厥與利相因耳

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治麻黃升麻湯主之

註此表裏錯雜之邪最爲難治然非死證也大下後寸脉沉而遲手足厥逆則陽氣陷入陰中下部脉不至則陰氣亦復衰竭咽喉不利唾膿血又因大下傷其津液而成肺痿金匱曰肺痿得之被快藥下利重亡津液者是也泄利不止未是下焦虛脫但因陽氣下陷所致故必升舉藥中兼調肝肺乃克有濟此麻黃升麻所以名湯而謂汗出愈也

按寸脉沉而遲明是陽去入陰之故非陽氣衰微可擬故雖手足厥逆下部脉不至泄利不止其不得爲純陰無陽可知況咽喉不利唾膿血又陽邪搏陰上逆之徵驗所以仲景特於陰中提出其陽得汗出而錯雜之邪盡解也

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利

也

註　腹中痛多屬虛寒與腹中實滿不同若更轉氣下趨少腹則必因腹寒而致下利明眼見此自當圖功於未著矣

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口卽吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

註　本自寒下是其人之平素胃寒下利也較上條之轉氣下趨少腹者更爲已然之事矣所以纔病傷寒卽不可妄行吐下與病人舊微溏不可服梔子湯互意舊微溏而用梔子則易湧易泄本自寒下而施吐下則吐下更逆其理甚明註家不會其意寒格者因誤施吐下之寒藥致成格拒也若食入口卽吐格拒極矣故用乾薑人參以溫補其胃用黃連黃芩之苦以下逆氣而解入裏之熱邪也

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

註　下利脉沉遲裏寒也面少赤有微熱則仍兼外

邪必從汗解但戴陽之證必見微厥汗中大伏危機其用法即迴異常法下條正其法也

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之

註 上條辨證此條用藥兩相互發然不但此也少陰病下利清穀而色赤者已用其法矣要知通之正所以收之也不然豈有汗出而反加葱之理哉

下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死

註 灸之不溫脉不還已爲死證然或根柢未絕亦未可知設陽氣隨火氣上逆胷有微喘則孤陽上脫而必死矣與少陰病六七日息高者死正同

下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者死

註 厥利無脉陽去而難於返矣然在根本堅固者生機尚存一綫經一週時脉還手足復溫則生否則死矣此即互上條用灸之意所以不重贅灸法也少陰下利厥逆無脉服白通湯脉暴出者死微續者生厥陰下利厥逆脉絕用灸法晬時脉還者

生不還者死可見求陽氣者非泛然求之無何有之鄉也根深寧極之中必有幾微可續然後藉溫灸爲鸞膠耳

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

註 此與太陽中篇下利身疼用先裏後表之法大同彼因誤下而致下利此因下利而致腹脹總以溫裏爲急者見晛曰消之義也身疼痛有裏有表必清便已調其痛仍不減方屬於表太陽條中已悉故此不贅

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

註 此條重舉下利清穀不可攻表以示戒正互明上條所以必先溫裏然後攻表之義也見誤攻其汗則陽出而陰氣彌塞胷腹必致脹滿而釀變耳

傷寒下利日十餘行脈反實者死

註 實爲邪盛必正脫也

下利有微熱而渴脈弱者令自愈下利脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也下利脈數有

微熱汗出令自愈設復緊爲未解

註　微熱而渴證已轉陽然正恐陽邪未盡也若脈弱則陽邪已退可知故不治自愈脈數與微熱互意汗出與脈弱互意脈緊則不弱矣邪方熾盛其不能得汗又可知矣

下利寸脈反浮數尺中自濇者必圊膿血

註　脈見浮數若是邪還於表則尺脈自和今尺中自濇乃熱邪摶結於陰分雖寸口得陽脈究竟陰邪必走下竅而便膿血也

下利脈沉弦者下重也脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死

註　下利而脈沉弦主裏急後重成滯下之證即所稱痢證也脈大者即沉弦中之大脈微弱數者即沉弦中之微弱數也脈微弱數雖發熱不死則脈大身熱者其死可知矣

熱利下重者白頭翁湯主之

註　熱利下重互上文即傷寒轉痢之謂也

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之

註　此從上條另申一義見凡下利欲飲水者與臟寒利而不渴自殊乃熱邪內耗津液縱未顯下重之候亦當以前湯勝其熱矣

下利譫語以有燥屎也宜小承氣湯

註　此與陽明經譫語胃中有燥屎正同乃不用大承氣而用小承氣者以下利腸虛兼之厥陰臟寒所以但用小承氣微攻其胃全無大下之條耳

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯

註　已下利而更煩似乎邪未盡解然心下濡而不滿則爲虛煩與陽明誤下胃虛膈熱之證頗同故俱用湧法也

嘔而發熱者小柴胡湯主之

註　厥陰之邪上逆而兼發熱乃肝膽臟腑相連之證也故用小柴胡湯分解其陰臟陽腑之嘔熱也

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

註　嘔而脈弱小便利裏虛且寒身有微熱證兼表裏其人見厥則陰陽互錯故爲難治然不難於外

熱而難於內寒也內寒則陽微陰盛天日易霾故當用四逆湯以回陽而微熱在所不計也況乾薑配附子補中有發微熱得之自除耳

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

註厥陰之邪上逆而乾嘔吐涎沫可用吳茱萸湯以下其逆氣若陰邪上逆結而爲癰潰出膿血即不可復治其嘔正恐人誤以吳茱萸湯治之耳識此意者用辛凉以開提其膿亦何不可耶

過經不解

喻昌曰過經不解者由七八日已後至十三日已後病過一候二候猶不痊解也然邪在身中日久勢必結聚於三陽太陽爲多少陽次之陽明又次之及至三陰則生死反掌不若此之久持矣

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

註過經十餘日而不知太陽證有未罷反一二三下

之因致變者多矣後四五日柴胡證仍在未有他變本當行大柴胡兩解表裏但其邪屢因悞下而深入即非大柴胡下法所能服故必先用小柴胡提其邪出半表然後乃用大柴胡始合法也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胷中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

註　此條註解不得仲景叮嚀之意茲特明之太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而不吐其人胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩者此有二辨若曾經大吐大下者邪從吐解且已入裏可用調胃承氣之法若未經吐下但欲嘔不嘔胷中痛微溏者是痛非吐所傷溏非下所致調胃之法不可用矣豈但調胃不可用即柴胡亦不可用以邪尚在太陽高位徒治陽明少陽而邪不服耳解太陽之邪仲景言之已悉故此但示其意也若其人能嘔則是爲吐下所傷而所主又不在太陽矣

傷寒十三日不解胷脅滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡以解外後以柴胡加芒硝湯主之

註 胷脅滿而嘔邪在少陽表裏之間也發潮熱裏可攻也微下利便未鞕也以大柴胡分解表邪蕩滌裏熱則邪去而微利亦自止矣若悞用圓藥則徒引熱邪內陷而下利表裏俱不解也故先用小柴胡分提以解外邪後加芒硝以滌胃中之熱也

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞕而反下利脉調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之

註 二條俱見微利之證難辨其內虛內實上條胷脅滿而嘔邪湊少陽之表故欲下之必用柴胡湯爲合法若以他藥下之表邪內入卽是內虛此條原無表證雖圓藥悞下其脉仍和卽爲內實也按仲景下法屢以用圓藥爲戒惟治太陽之脾約乃

用麻仁圓因其人平素津枯腸結必俟邪入陽明下之恐無救於津液故雖邪在太陽卽用圓藥之緩下潤其腸俾外邪不因峻攻而內陷乃批郄導窾遊刃空虛之妙也此等處亦須互察再按傷寒證以七日爲一候其有二候三候不解者病邪多在三陽經留戀不但七日傳之不盡卽十日十三日二十餘日尚有傳之不盡者若不辨證徒屈指數經數候汗下展轉差悞正虛邪湊愈久愈難爲力與內經至七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少歇九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止舌潤而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧之恆期迴異矣所以過經不解當辨其邪在何經而取之仲景云太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也卽內經七日太陽病衰頭痛少愈之旨也可見太陽一經有行之七日以上者矣其欲作再經者鍼足陽明使經不傳則愈以太陽旣羈留多日則陽明少陽

亦可羈留過經漫無解期矣所以早從陽明中土而奪之俾其不傳此捷法也若謂六經傳盡復傳太陽必無是理後人墮落成無己阱中耳豈有厥陰兩陰交盡於裏復從皮毛外再入太陽之事耶請破此大惑

差後勞復陰陽易病

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚

註勞復乃起居作勞復生餘熱之病方註作女勞復大謬女勞復者自犯傷寒後之大戒多死少生豈有反用上湧下泄之理耶太陽中篇下後身熱或汗吐下後虛煩無奈用本湯之苦以吐徹其邪此非取吐法也乃用苦以發其微汗正內經火淫所勝以苦發之之義觀方中用清漿水七升空煑至四升然後入藥同煑全是欲其水之熟而趨下不致上湧耳所以又云覆令微似汗精絕

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沉實者以下解之

註　差已後更發熱乃餘熱在內以熱名熱也然餘熱要當辨其何在不可泛然施治以虛其虛如在半表半裏則仍用小柴胡湯和解之法如在表則仍用汗法如在裏則仍用下法然汗下之法卽互上條汗用枳實梔豉微汗下用枳實梔豉加大黄微下也

大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

註　腰以下有水氣者水漬爲腫也金匱曰腰以下腫當利小便此定法矣乃大病後脾土告困不能攝水以致水氣泛溢用牡蠣澤瀉散峻攻何反不顧其虛耶正因水勢未犯身半以上急驅其水所全甚大設用輕劑則陰水必襲入陽界驅之無及矣庸工遇大病後悉用溫補自以爲善孰知其爲鹵莽滅裂哉

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之宜理中丸

註　身中津液因胃寒凝結而成濁唾久而不淸其人必消瘦索澤故不用湯藥蕩滌而用圓藥緩圖

也理中圓乃區分陰陽溫補脾胃之善藥然仲景差後病外邪已盡纔用其方在太陽邪熾之日不得已合桂枝用之即更其名曰桂枝人參湯又云醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦非其治也於此見用法之權衡矣

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之

註 身中津液爲熱邪所耗餘熱不清必致虛羸少氣難於康復若更氣逆欲吐是餘邪復挾津液滋擾故用竹葉石膏湯以益虛清熱散逆氣也

病人脈已解而日暮微煩以病新差人强與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

註 脈已解者陰陽和適其無表裏之邪可知也日暮微煩者日中衞氣行陽其不煩可知也乃因脾胃氣弱不能消穀所致損穀則脾胃漸趨於旺而自愈矣註家牽扯日暮爲陽明之王時故以損穀爲當小下不知此論差後之證非論六經轉陽明之證也日暮即內經日西而陽氣已衰之意所以不能消穀也損穀當是減損穀食以休養脾胃不

可引前條宿食例輕用大黃重傷脾胃也合六條觀之差後病凡用汗下和溫之法但師其意不泥其方恐元氣津液久耗不能勝藥耳豈但不能勝藥抑且不能勝穀故損穀則病愈而用藥當思減損并可識矣其腰已下有水氣峻攻其水亦以病後體虛膀胱氣化不行若不一朝迅埽則久困之脾土必不能隄防水逆不至滔天不止所以仲景云少陰負趺陽者爲順故亟奪少陰之水以解趺陽之圍夫豈尋常所能測識耶

傷寒陰陽易之爲病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒裩散主之

註　陰陽易之病註家不明言乃致後人指爲女勞復大謬若然則婦人病新差與男子交爲男勞復乎蓋病傷寒之人熱毒藏於氣血中者漸從表裏解散惟熱毒藏於精髓之中者無繇發泄故差後與不病之體交接男病傳不病之女女病傳不病之男所以名爲陰陽易卽交易之義也其證眼中

生花身重拘急少腹痛引陰筋暴受陰毒又非薑桂附子辛熱所能驅故燒裩襠爲散以其人平昔所出之敗濁同氣相求服之小便得利陰頭微腫陰毒仍從陰竅出耳此條叔和彙於差後勞復之前因起後人女勞復之疑今移附勞復後益見熱病之爲大病差後貽毒他人其惡而可畏有如此也

晉王叔和脉訣

傷寒憑脉

傷寒熱病同看脉滿手透關洪拍拍出至風門過太陽一日之中見脫厄過關微有慢騰騰直至伏時重候覓掌內迢迢散漫行乾瘥伶仃多未的大凡當日問程途遲數洪微更消息

熱病須得脉浮洪細小徒費用神功汗後脉靜當便瘥喘熱脉亂命應終

陽毒

陽毒健亂四肢煩面赤生花作點斑狂言妄語如神鬼下痢頻多喉不安汗出徧身應大瘥魚口開張命

欲翻有藥不辜但與服能過七日便相安

陰毒

陰毒傷寒身體重背强眼痛不堪任小腹急痛口青黑毒氣冲心轉不禁四肢厥冷惟思吐不利咽喉脉細沉若能速灸臍輪下六日看過見喜深

宋嚴用和濟生方

傷寒總論

夫人生天地之間以氣血藉其眞是故天無一歲不寒暑人無一日不憂苦故有傷寒天行瘟疫之病焉蓋冬令爲殺厲之氣君子善攝生者當嚴寒之時行住坐臥護身周密故不犯寒毒彼奔馳荷重房勞辛苦之徒當陽閉藏而反擾動之則鬱發腠理津液强漬爲寒所薄膚腠緻密寒毒與榮衛相渾當是之時壯者氣行則已怯者則著而成病矣不卽病者寒氣藏於肌骨之間春則病溫夏則病熱此皆一氣使然也古之治法一日在皮當摩膏而火灸之二日在膚依法以鍼解肌發散之汗出則愈三日在肌亦以發汗愈四日在胷宜吐之五日在腹六日在胃宜下之

此華佗之治法也若按三陰三陽之法傳變無出仲景之書蓋治傷寒有法治雜病有方雜病之方可以異其傳調理傷寒當按定法也茲不復叙今具四時大略用藥於後

春病風寒頭痛發熱身體强痛宜進香蘇散或十神湯或欲發汗加葱白薑豉煎

夏感風暑頭痛發熱身疼煩渴宜用五苓散或煎葱白湯調服

秋感風冷身熱頭痛鼻塞欬嗽宜進金沸草散

冬冒風寒身熱頭痛無汗惡寒宜進五積散

朱肱活人書

論治法

古人治傷寒有法非雜病之比五種不同六經各異陰陽傳受日數淺深藥劑溫凉用有先後差之毫釐輕者危殆況不識法者乎傷寒惟兩感不治其餘證候雖感異氣能消息之無不愈者其有差失仲景所謂醫殺之耳知其法者若綱在網如此而汗如此而吐如此而下桂枝承氣瓜蔕四逆用之無不差惟其

應汗而下爲痞爲結胷爲懊憹應下而汗爲亡陽爲讝語爲下厥上竭又有當溫反吐療熱以溫變證百出無復紀律擾擾萬緒起矣大抵傷於寒爲病熱孫眞人云服承氣湯得利差愼不中補也熱氣得補復成王叔和云虛熱不可大攻之熱去則寒起二人之論疑若相戾然熱氣有實有虛非深得仲景之意豈能至此耶

辨經絡

治傷寒先須識經絡不識經絡觸途冥行不知邪氣之所在往往病在太陽反攻少陰證是厥陰乃和少陽寒邪未除眞氣受斃又况傷寒看外證爲多未診先問最爲有准孫眞人云問而知之別病淺深名爲巧醫病家云發熱惡寒頭項痛腰脊强則知病在太陽經也身熱目疼鼻乾不得臥則知病在陽明經也胷脅痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛則知病在太陰經也引飲惡寒或口燥舌乾則知病在少陰經也煩滿囊縮則知病在厥陰經也然後

切脉以辨其在表在裏若虛若實以汗下之古人所以云問而知之爲中工切而知之爲下工若經隧支絡懵然不分按寸握尺妄意疾證豈知坐受明堂藏室金蘭者耶

識陰陽

治傷寒須識陰陽二證手足各有三陰三陽合爲十二經在手背者爲陽屬表爲腑在手掌裏者爲陰屬裏爲臟足經倣此傷寒只傳足經不傳手經素問熱論亦只說足三陰三陽受病巢氏言一日太陽屬小腸誤矣足之陽者陰中之少陽足之陰者陰中之太陰足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹陽務於上陰務於下陽行也速陰行也緩陽之體輕陰之體重陰家脉重陽家脉輕陽候多語陰證無聲陽病則旦靜陰病則夜寧陽虛則暮亂陰虛則夜爭陰陽消息證狀異名然而物極則反寒暑之變重陽必陰重陰必陽陰證似陽陽證似陰陰盛隔陽似是而非若同而異明當消息以法治之

太陽陽明少陽皆屬陽證也太陽者膀胱也發熱惡

寒頭疼腰痛而脉浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濈濈汗出大便祕潮熱而脉長也少陽者膽也口苦咽乾脅下滿發熱而嘔或往來寒熱而脉弦也麻黃湯大青龍湯桂枝湯治太陽經傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後證也陰病不當發汗發汗卽動經然太陰脉浮少陰發熱亦須微微取汗但不正發汗耳大抵風寒中人與榮衛俱薄而發熱又未會行諸汗藥雖無陽證須少汗解逐之王叔和云表中風寒入裏則不消故知初病脉沉細數雖裏不消本表中風寒須宜溫覆少汗而解仲景太陰證脉浮可汗宜桂枝湯少陰病發熱脉沉宜麻黃附子細莘湯少陰二三日常見少陰證無陽證者宜麻黃附子甘草湯微發汗皆陰證表藥也要知脉沉細數病在裏不可發汗此大略之言耳脉應裏而發熱在表宜以小辛之藥取微汗而溫散也

察脉候

治傷寒先須識脉若不識脉則表裏不分虛實不辨

仲景猶誚當時之士按寸不及尺握手不及足必欲診衝陽按太谿而後無歉況於寸關尺耶大抵問而知之以觀其外切而知之以察其內證與脉不可偏廢且如傷寒脉緊傷風脉緩熱病脉盛中暑脉虛人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食率以脉別之非特此也病人心下緊滿按之石鞕而痛者結胷也結胷證於法當下雖三尺之童皆知用大黃甘遂陷胷湯下之然仲景云結胷脉浮者不可下下之則死以此推之若只憑外證便用陷胷湯則誤矣況傷寒尤要辨表裏脉浮爲在表脉沉爲在裏陽動則有汗陰動則發熱得汗而脉靜者生汗已而脉躁者死陰病陽脉則不成陽病陰脉則不末生死吉凶如合龜鏡其微至於禍福休咎修短貴賤無不可考然古人乃以切脉爲下者特以脉理精微其體難辨而傷寒得外證爲多故也外證易見切脉難明弦緊之混淆遲緩之參差沉與伏相類濡與弱相似非得之於心超然領解孰能校疑似於錙銖者哉苟知浮芤滑實弦緊洪屬於表遲緩微濇沉伏濡弱屬於裏表裏內外陰

陽消息以經處之亦過半矣

分表裏

治傷寒須辨表裏表裏不分汗下差誤古人所以云桂枝下咽陽盛卽斃承氣入胃陰盛以亡傷寒有表證有裏證有半在表半在裏有表裏兩證俱見有無表裏證在表宜汗在裏宜下半在裏半在表宜和解表裏俱見隨證滲泄無表裏證用大柴胡湯下之又四逆湯證有先溫裏乃發表桂枝湯證有先解表乃攻裏仲景云下利清穀身體疼痛急當救裏身體疼痛清便自調急當救表如響應桴間不容櫛非特此也均是發熱身熱不渴爲表有熱小柴胡加桂枝主之厥而脉滑爲裏有熱白虎加人參主之均是水氣乾嘔微利發熱而欬爲表有水小青龍加蕘花主之身體凉表證罷欬而脅痛爲裏有水十棗湯主之均是惡寒發熱而惡寒者發於陽也麻黃桂枝小柴胡主之無熱而惡寒者發於陰也附子四逆湯主之均是身體痛脉浮發熱頭疼身體痛者爲表未解麻黃湯主之脉沉自利身體痛者爲裏不和四逆湯主之

以此觀之仲景之於表裏亦詳矣學者宜深究之雖然傷寒六七日目中不了了無表裏證脉雖浮亦有下之者少陰病二三日無陽證亦有發汗者非表裏之所能拘又不可不知也

詳藥證

藥證者藥方前有證也如某方治某病是也傷寒有證異而病同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審知某證者某經之病某湯者某證之藥然後用之萬全矣又況百問中一證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是治下利而心下痞其方有冷有熱仔細詳藥證以對治之則無不中矣所謂藥方幷加減法者仲景傷寒方一百十三道病與方相應乃用正方稍有差別即隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳爲名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取

效速一服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白术小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白术治濕茯苓利水故腎氣動者去白术小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病須是隨證加減今於逐方下說病證用藥加減庶幾修合之際便見治法兼古方凡稱㕮咀者直云剉如麻豆大云一升者只云一大白盞以古准今易曉而通用也尋常疾勢輕者只抄粗末五錢匕水一盞半入薑棗煑七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古

劑法

古之三兩即今之一兩也二兩即今之六錢半也古之三升即今之一升也料例大者只合三分之一是也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十卷目錄

醫部彙考三百四十

傷寒門六

朱肱活人書

太陽經脈證治　發汗和解之殊
寒傷營　風傷衞　風見寒脈
寒見風脈　表證發熱　惡寒　惡風　熱
多寒少　下之而熱不退　頭疼　身疼　身
痒　無汗　自汗　筋惕肉瞤　頭眩　身搖　喘
渴　鼻衄　汗出　脅痛　煩躁　欬嗽　小便
數　畜血　嗜臥　發黃　陽明經脈證治
裏證　潮熱　譫狂　潮熱　自汗　頭汗　但嗽
水不欲嚥　口燥咽乾　譫語　發狂　嘔
吐　欬逆　吐血　少陽經脈證治　往來寒

熱　發斑　陽毒　結胸　痞滿　咽喉痛
太陰經脈證治　腹痛　腹脹滿　汗後寒熱
少陰經脈證治　吐利　下利　欬嗽　咽痛　咽乾　衄血　煩躁　厥陰經脈證治
手足逆冷　陰毒　吐長蟲

藝術典第三百六十卷

醫部彙考三百四十

傷寒門六

宋朱肱活人書

太陽經脈證治

足太陽膀胱經從目内眥上額連於風府分爲四道下項并正別脈上下六道以行於背與身爲經太陽之經爲諸陽主氣或中寒邪必發熱而惡寒緣頭項腰脊是太陽經所過處今頭項痛身體疼腰脊強其

脈尺寸俱浮者故知太陽經受病也

傷寒一二日發熱惡寒頭項痛腰脊強尺寸脈俱浮此足太陽膀胱經受病也太陽病頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯輕者只與柴胡桂枝湯太陽病頭痛發熱無汗惡寒宜麻黃湯輕者只與桂枝麻黃各半湯麻黃湯桂枝湯二者均爲解散正分陰陽不可不愼也仲景所謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃常須識此勿令誤也今人纔見身熱頭痛便發汗不知汗空閉而用麻黃汗空疎而用桂枝傷寒傷風其治不同古人有汗者當解肌無汗者可發汗

發汗和解之殊

傷寒表證須看榮衞淺深故仲景有正發汗湯劑如麻黃湯桂枝湯大青龍湯是也有和解其表如小青龍湯桂枝麻黃各半湯白虎湯桂枝二越婢一湯柴胡桂枝湯小柴胡湯之類是也後人不能深究寒熱淺深藥性緊慢一槩用藥因茲夭殤其間縱獲生全往往汗後虛乏遂致勞復或變生百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陰陽並竭血氣羸損以致

此禍如遇病輕但當和解之所謂和其榮衛以通津液令其自解也

寒傷營

脈浮而緊澀頭疼身體拘急惡寒無汗寒多熱少面色慘而不舒腰脊疼痛手足指末微厥不煩躁此名傷寒傷寒之候發熱惡寒頭疼腰脊痛脈緊無汗宜發汗而解麻黃湯主之輕者只與桂枝麻黃各半湯又人參順氣散葱豉湯蒼朮散麻黃葛根湯可選而用之

然太陽病亦有熱多寒少者須仔細看脈與證也熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯若脈浮者雖熱多寒少自可發汗若脈弱者無陽也桂枝二越婢一湯主之熱多寒少而尺脈遲者榮氣不足血少故也先以小建中湯加黃芪最良尺脈尚遲再作一劑

或太陽證宜汗而其人適失血及下利則頻頻與少桂枝湯使體潤漐漐連日當自解

假如淋家衄血家法不可汗亦可以小柴胡之類和

解之

風傷衛

脉浮而緩寸大而尺弱自汗體熱頭疼惡風熱多寒少其面光不慘煩躁手足不冷此名傷風也傷風之候頭疼發熱脉緩汗出惡風當須解肌宜桂枝湯主之輕者只與柴胡桂枝湯敗毒散獨活散可選用之

治太陽中風有汗用桂枝湯

凡脉緊必無汗惟濡而緊却有汗勿誤用小建中湯須是脉浮而緩者方可用桂枝

項背強者桂枝湯加葛根也

本草葛根主傷風有濕開竅解肌蓋桂枝加葛根者謂中風有濕當加之去其風濕取微汗者風濕去也

裏寒者桂枝去芍藥加附子湯也

不飲水者是也

凡發汗後汗不止爲漏風桂枝加附子湯主之腹滿者太陰證脉浮者可服桂枝湯微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯也

雖然桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗自江淮間唯冬及春初可行自春末及夏至已前桂枝證可加黃芩半兩

陽旦湯是也

夏至後有桂枝證可加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者正用古方不在加減也岐伯所謂同病異治者此也大抵用溫藥當避春用熱藥當避夏素問所謂用溫遠溫用熱遠熱者也

問傷寒與傷風何以別之答曰傷寒者脈緊而澀傷風者脈浮而緩傷寒者無汗傷風者有汗脈緩故也傷寒者畏寒不畏風傷風者畏風不畏寒大抵太陽病者必脈浮發熱惡風惡寒也惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也六經皆有傷寒傷風其證各異太陽脈浮有汗爲中風脈緊無汗爲傷寒陽明善饑爲中風不食爲傷寒少陽兩耳聾目赤胷滿而煩爲中風口苦咽乾目眩爲傷寒若三陰傷風無變異形證但四肢煩疼餘證同三陽

風見寒脉寒見風脉

有發熱惡寒煩躁手足溫而脉反浮緊者有寒多熱少不煩躁手足微冷而脈反浮緩者此名傷風見寒脉傷寒見風脈也蓋發熱惡風煩躁手足溫爲中風候脈浮緊爲傷寒脈是中風見寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥爲傷寒候脈浮緩爲中風脉是傷寒見風脉也中風見寒脈傷寒見風脈宜服大青龍湯蓋大青龍證脉似桂枝反無汗病似麻黃反煩躁是也

脉弱有汗爲桂枝證脉緊不煩躁爲麻黃證

大青龍湯治病與麻黃湯證相似但病尤重而又加煩躁者用大青龍湯也以其中風并傷寒俱盛故青龍湯添麻黃作六兩又似合桂枝湯藥味在內添石膏所以爲緊此治榮衞俱病若證不審誤用大青龍湯則發汗多傷人

以其有煩躁一證故可用大青龍湯

大抵感外風者爲傷風感寒冷者爲傷寒故風則傷衞寒則傷榮桂枝主傷衞麻黃主傷榮大青龍主榮

衞俱傷故也

風傷衞者病在皮膚之間也以衞行脉外爲陽主外皮膚之間衞氣之道路故其病淺寒傷榮者寒氣中於肌肉也以榮行脉中爲陰主內肌肉之間榮氣之道路故其病深所以桂枝與麻黃所施各異戒勿誤用以有淺深之別風寒之殊醫者當宜審諦大青龍尤宜愼用仲景云脉微弱汗出惡風者不可服青龍服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也類纂云凡發汗過多筋惕肉瞤振搖動人或虛羸之人微汗出便有此證俱宜服眞武湯以救之羸甚者芍藥或量多少與之惡熱藥者去附子餘依加減法仲景製眞武湯乃爲合用桂枝却用麻黃之類發汗多亡陽有此證故用眞武湯若調理順者無此證也

表證

發熱惡寒身體痛而脉浮者表證也

浮表陽也其脉按之不足舉之有餘素問云寸口脉浮而盛曰病在外寸口脉沈而緊曰病在中仲

景云脉浮者病在表可發汗又曰表有病者脉當浮又曰結胷證脉浮者不可下則知脉浮者表證也

表證者惡寒是也惡寒者表之虛此屬太陽宜汗之然傷寒發表須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和解之者兼四時發汗亦自不同

發熱

發熱而惡寒者屬太陽也

太陽病必發熱而惡寒蓋太陽主氣以溫皮膚分肉寒氣留於外皮膚緻密則寒慄而發熱宜發其汗麻黃湯大青龍湯主之若發熱微惡寒者柴胡桂枝湯桂枝二越婢一湯主之若吐利而發熱惡寒者霍亂也太陽病發熱而渴不惡寒爲溫病若發汗已身灼熱者爲風溫也

又有太陽證合用桂枝却用麻黃之類發汗多亡陽仍發熱者眞武湯主之

太陽有潮熱乎仲景大陷胷湯一證結胷有潮熱者爲大結胷屬太陽也

大抵傷寒八日已上大發熱者此爲難治

仲景云脈陰陽俱虛熱不止者死

又有醫人多用圓子藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

若傷寒得汗後病解虛羸微熱不去可行竹葉石膏湯隨其虛實而治之

惡寒

大抵太陽病必發熱而惡寒惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脈道沉伏愈令病人寒不可遏但去被徹火兼飲以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚鍼藥所不能治矣

惡寒有二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脈必浮數屬桂枝湯桂枝二越婢一湯麻黃湯青龍湯證也

發汗後反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯脈微而惡寒者此陰陽俱虛也不可更吐下也發汗面色

赤有熱者爲欲解宜桂枝麻黄各半湯傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黄黄連瀉心湯雖然太陽陽明少陰皆有惡寒要之太陽病或已發熱或未發熱必惡寒也

問有汗出惡寒者有汗出多而微惡寒者有頭汗出而微惡寒者何也答曰仲景云太陽病其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯也頭汗出而微惡寒者屬少陽宜小柴胡湯也

惡風

惡風者衞中四時之虛風所以惡風也其人當汗出而脉緩也數與桂枝湯桂枝加葛根湯使遍體微潤連日當自解矣

又有太陽病發汗多亡陽遂漏不止衞虛而惡風者當溫其經也其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子也

風濕相薄骨節疼煩掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

熱多寒少

太陽熱多寒少有三證有熱多寒少而不嘔清便自可者有熱多寒少而脉微弱者有熱多寒少而尺脉遲者其用藥皆不同也

太陽病八九日如瘧狀熱多寒少不嘔清便自可宜桂枝麻黃各半湯

熱多寒少而脉都大微弱者無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯主之

若脉浮雖熱多寒少亦自可發汗也

熱多寒少而尺中遲者血少也先以小建中加黃芪以養其血尺尚遲再作一劑然後晬時用小柴胡湯桂枝二越婢一湯輩小劑隨證治之

大抵傷寒寒多易治熱多難愈傷寒發熱者以其寒極則生熱治法多用冷藥故令熱不去仲景熱多寒少用桂枝二越婢一湯不渴外有微熱者用小柴胡加桂湯皆溫表之義也近時多用小柴胡湯不問陰

陽表裏凡傷寒家皆令服之此藥差寒不可輕用雖不若大柴胡湯小承氣湯之緊然藥病不相主其爲害一也往往因服小柴胡湯而成陰證者甚多仲景雖云傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具此爲是少陽證當服小柴胡不必少陽證悉具耳況本方又有加減隨證增損古人方治審諦如此後人妄投豈可怪也

傷寒太陽證發熱惡寒宜發其汗然熱多寒少其脉微弱或尺脉遲者不可表也

下之而熱不退

仲景云病人脉微而濇爲醫所病大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時蓋陽微則惡寒陰弱則發熱陽微惡寒四逆湯主之陰弱發熱爲內熱葶藶苦酒湯主之

頭疼

頭疼者陽證也太陽證頭疼必發熱惡寒無汗者麻黃湯有汗者桂枝湯若已發汗或未發汗頭疼如破者連鬚葱白湯服湯不止者葛根葱白湯主之

病人頭疼鼻塞而煩者何證也此屬濕家頭中寒濕故鼻塞而頭疼也內瓜蔕末鼻中則愈

身疼

太陽證表未解脈浮緊法當身體痛宜麻黃湯汗之脈浮緊當身體疼痛宜以汗解假令尺脈遲者不可發汗何以知其然榮氣不足血少故也尺脈遲者先以小建中湯以養之脈浮者麻黃湯主之

問發汗後身疼痛脈沉而遲當用何藥答曰仲景有桂枝加芍藥生薑人參新加湯蓋爲此證也小建中湯兼治汗後身疼脈沉而遲者若霍亂吐瀉止而身疼痛不休者少與桂枝湯即愈金匱要略云瘡家雖身體痛不可發汗汗出則痓

身癢

問身癢者何也答曰脈浮而遲遲爲無陽不能作汗其身必癢太陽病七八日脈微而惡寒以陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也小柴胡湯主之若反重發汗則氣虛必兩耳聾無聞素無熱人可芍藥甘草附子湯素有熱人可黃芪建中湯面赤有熱者未欲解

也以其不能得小汗出身必當癢宜桂枝麻黃各半湯

無汗自汗

傷寒連服湯劑而汗不出者死如中風法蒸之溫熱之氣於外迎之無不得汗也

其法用薪火燒地良久掃除去火可以水洒之取蠶砂柏葉桃葉糠麩皆可用相和鋪燒地上可側手厚上鋪席令病人當上臥溫覆之夏月熱只布單覆之汗移時立至俟周身至腳心皆汗漐漐乃用溫粉撲止汗移上牀最得力者蠶沙桃柏葉也無蠶沙亦得單桃葉亦得蒴藋亦可用麩糠乃助添令多爾不用亦得

傷寒亦有氣虛不能作汗者仲景云脈浮而遲遲爲無陽不能作汗其身必癢宜桂枝麻黃各半湯主之

衞不和自汗傷風自汗亡陽自汗

別經有汗無汗俱載本篇中

筋惕肉瞤頭眩身搖

太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤動欲擗地者

屬眞武湯大凡發汗過多卽身瞤動振搖虛羸之人微發汗便有此證俱宜服眞武湯羸甚者去芍藥或少用之有熱證惡熱藥者去附子餘依本方加減法詳之

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此爲逆難治且先服防風白朮牡蠣散次服建中湯

喘

傷寒喘只有太陽陽明二證

陽明喘正方載陽明篇中

太陽病頭疼發熱身疼惡風無汗而喘者宜汗屬麻黃湯

桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯也太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏子湯也發汗後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃

杏子甘草石膏湯也

又發汗後飲水多欬而微喘者水停心下腎氣乘心故也小青龍去麻黃加杏仁小腹滿者去麻黃加茯苓也

問麻黃主喘何故去之答曰此治心下有水而喘不留汗也小便不利小腹滿故去麻黃加茯苓也

渴

脉浮而渴屬太陽

陽明少陽少陰渴證俱載本經篇中

切戒太陽證無汗而渴者不可與白虎湯

問太陽病渴終不可與白虎耶答曰太陽證得汗後脉洪大而渴者方可與之也

凡病非大渴不可與水若小渴咽乾者只小呷滋潤之令胃中和若大渴煩躁甚能飲一斗者與五升飲之若全不與則乾燥無由作汗發喘而死常人見因渴飲水得汗小渴遂劇飲之致停飲心下滿結喘死者甚衆當以五苓散或陷胸丸與之

金匱云得時氣至五六日而渴欲飲水不得多不

當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更爲人作病矣至七八日大渴欲飲水猶當依證與之常令不足勿極意也凡人但見仲景云得病反能飲水此爲欲愈遂小渴者乃強飲之因成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲水過多所致水停心下氣上乘心則爲悸爲喘結於胷脅則爲水結胷胃中虛冷則爲嘔爲噦冷氣相薄則爲噎上迫於肺則爲欬漬入腸中則爲利邪熱所薄畜於下焦則爲小便不利小腹滿或裏急溢於皮膚則爲腫

鼻衄

傷寒太陽證衄血者乃解蓋陽氣重故也仲景所謂陽盛則衄若脈浮緊無汗服麻黃湯不中病其人發煩目瞑劇者必衄小衄而脈尚浮緊者宜再與麻黃湯也衄後脈已微者不可行麻黃湯也若脈浮自汗服桂枝湯不中病桂枝證尚在必頭疼甚而致衄小衄而脈尚浮者宜再與桂枝也衄後脈已微者不可行桂枝湯也大抵傷寒衄血不可發汗者爲脈微故也治法衄家不可發汗汗出額上陷脈緊急直視不

能瞬不得眠然而無汗而衄脉尚浮緊者須再與麻黄湯有汗而衄脉尚浮緩者須再與桂枝湯脉已微者黄芩芍藥湯犀角地黄湯衄血不止者茅花湯若衄而渴心煩飲則吐水先服五苓散次服竹葉湯

汗出脅痛

身凉汗出兩脅疼痛或乾嘔此十棗湯證也仲景云太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心中痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之大抵脅下痛者此爲有飲須分表裏乾嘔微利發熱而欬爲表有水小青龍湯加蕘花主之身體凉表證罷乾嘔而脅下痛爲裏有水十棗湯主之十棗湯非小青龍湯之比須量人虛實不可妄投

煩躁

傷寒煩躁太陽與少陰經爲多

蓋太陽與少陰爲表裏

大抵陰氣少陽氣勝則熱而煩故太陽經傷風多煩

而躁也

陽虛陰盛亦發煩躁陽氣弱爲陰所乘而躁故少陰病亦煩躁學者當以外證與脉別之

然有汗之而煩者有下之而煩者又有病已解而反微煩者此由病新差不勝穀損穀則愈

欬嗽

傷寒太陽證欬嗽小青龍小柴胡也大抵熱在上焦其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬而微喘仲景云傷寒表不解心下有水乾嘔發熱而欬小青龍湯主之

小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓少陽少陰欬證俱載本經篇中

小便數

小便數者何也曰腎與膀胱俱虛而有客熱乘之也太陽陽明二經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澀澀則小便不快故令數起也診其趺陽脉數胃中熱即消穀引飲大便必鞕小便即數也太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡

寒脚攣急若小便數者慎不可行桂枝也宜與甘草乾薑湯芍藥甘草湯也大抵溲數則大便難仲景云趺陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相薄大便則鞕其脾爲約麻子仁丸主之太陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便因鞕者與小承氣湯和之愈又云傷寒脉浮自汗小便數若胃中不和譫語者少與調胃承氣湯

畜血

太陽證下焦有熱小腹必滿應小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之

嗜臥

病人脉浮頭項强痛而惡寒者太陽證也十日已去脉浮細而嗜臥者外已解也設胷滿脅痛者與小柴胡湯脉但浮者麻黃湯主之

發黃

太陽病一身盡痛發熱身如熏黃者何曰太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之太陽

中濕一身盡痛發熱身黃小便不利病人中濕因而傷風風濕相薄一身痛重是名風濕當於風濕中求之

寒濕在裏不散熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相薄鬱蒸不消化故發黃發黃與瘀血外證及脈俱相似但小便不利爲黃小便自利爲瘀血要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脈必浮滑而緊數若瘀血證卽如狂大便必黑此爲異耳凡病人身體發熱頭面汗出身無汗齊頸而止渴引水漿小便不利如此必發黃茵陳蒿湯加五苓散也

茵陳蒿湯十分五苓散五分三件拌和每服一錢

溫水調下日三服

病人服湯得小便利如皂莢汁赤一宿腹減則黃從小便中出也古人云治濕不利小便非其治也梔子蘗皮湯麻黃連軺赤小豆湯可選而用之又方傷寒欲發黃者急用瓜蔕末口含水搐一字許入鼻中出黃水甚驗卽用茵陳蒿湯調五苓散服之最良大抵發黃者瘀熱在裏由小便不利而致之也

以上太陽經脉證治也

陽明經脉證治

足陽明胃之經從鼻起俠於鼻絡於目下咽分爲四道并正別脉六道上下行腹綱維於身蓋諸陽在表陽明主肌肉絡於鼻故病人身熱目疼鼻乾不得臥其脉尺寸俱長者知陽明經受病也

問傷寒何以須診衝陽脉耶答曰衝陽穴是足陽明胃之經人受氣於穀穀入於胃乃傳與五臟六腑臟腑皆受氣於胃其清者爲榮濁者爲衞榮行脉中衞行脉外陰陽相貫如環無端胃爲水穀之海主稟四時皆以胃氣爲本是謂四時之變病死生之要會故傷寒必診衝陽以察其胃之有無也衝陽二穴一名會源在足趺上五寸骨間動脉上去陷骨三寸

傷寒二三日身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脉俱長此足陽明胃經受病也傷寒二日陽明經受病可發其汗非正陽明也

正陽明者身熱汗出不惡寒反惡熱故可下也

今言一二日傳陽明經身熱目疼鼻乾不得臥其脉

俱長者是太陽陽明可表而已若無汗尚惡寒宜升麻湯有汗微惡寒者表未解也宜桂枝湯無汗脉浮其人喘者與麻黃湯

又問十二經皆一而陽明有三何也有太陽陽明有少陽陽明有正陽陽明也太陽陽明者本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥實大便難也正陽陽明者病人本風盛氣實也三陽明俱宜下唯惡寒及中寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脉必浮大而長外證必頭疼腰痛肌熱目痛鼻乾也脉浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也尚惡寒者可升麻湯汗之若不惡寒反惡熱大便不祕者可白虎湯解利之不惡寒反惡熱大便祕或譫語者屬胃家實也可調胃承氣湯下之身熱汗出濈濈然者屬陽明也

裏證

不惡寒反惡熱手掌心幷腋下濈濈汗出胃中乾涸

燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘或讝語脈沉而滑者裏證也裏證者內熱是也內熱者裏之弱此屬陽明也宜下之

傷寒始發熱惡寒今汗後不惡寒但倍發熱而躁始脈浮大今脈洪實或沉細數始惺靜今狂語此爲胃實陽盛再汗卽死須下之卽愈

發汗後不敢再表者爲脈沉實耳脈若浮者須再汗也發汗後不惡寒只發熱脈沉實或狂語此爲胃實陽盛卽不可再汗也須當下之設令下後又不解表裏邪亦衰矣

陽明證頭疼不惡寒反惡熱胃實故也陽明氣實故攻頭也調胃承氣湯主之

病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數宜大柴胡湯下之

大便祕者加大黃

亦有始得病便變陽盛之證便須下之不可拘以日數

更有心胷連臍腹大段疰悶腹中疼坐臥不安冒悶

喘急極者亦不候他證便下之

凡大便祕妨悶恐尚有表證者亦須少少飲小承氣湯微解之不可過多令大泄也

失下則氣血不通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察也

潮熱讝狂

仲景云傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視但發熱讝語者大承氣湯主之若一服利則止後服脈弦者生澀者死

弦者陽也澀者陰也陽證見陰脈者死病人有陽證而脈澀者慎不可下

下證悉具服湯已更衣者止後服不爾盡劑服之下後慎不中服補藥孫眞人云服大承氣湯得利差慎不中服補藥也熱氣得補復成更復下之是重困也宜消息安養之

仲景有宜下者有微和其胃氣者蓋傷寒裏證須看

熱氣淺深故仲景有宜下之如大承氣湯小承氣湯十棗湯大柴胡湯是也有微和其胃氣如調胃承氣湯脾約圓少與小承氣微和之之類是也金匱玉函云虛者十補勿一瀉强實者瀉之虛實等者瀉勿大瀉之故王叔和序傷寒有承氣之戒

又問轉藥孰緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣湯又次之大柴胡又次之仲景治法蕩滌熱積皆用湯液不得用圓子藥不可不知也

大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方爲轉藥蓋爲病輕者設也

潮熱

潮熱者大率當下仲景云潮熱者實也大承氣湯證云其熱不潮未可與也則知潮熱當下無疑矣雖然更看脈與外證脈若弦若浮及外證惡寒猶有表證且與小柴胡湯以解之若腹大滿不通者可與小承氣微和其胃氣勿令大泄也

仲景云日晡發熱者屬陽明也脈實者大承氣大柴胡也脈虛者桂枝也

縱使潮熱當行大承氣亦須先少與小承氣若不轉失氣不可攻之後發熱復鞕者大柴胡下之

若胷脅滿而嘔日晡發潮熱者小柴胡加芒硝主之

又有日晡發潮熱已而微利者又有微發潮熱而大便溏者或潮熱而欬逆者皆當用小柴胡也

冬陽明潮熱當行黃芩湯

冬陽明病脈浮而緊必發潮熱發作有時但脈浮者必盜汗黃芩湯主之

陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜下屬承氣湯

陽明證俱宜下唯惡寒中寒爲病在經與太陽合病屬表發其汗耳若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡寒者白虎證也

自汗頭汗

陽明病自汗

不惡寒反惡熱濈濈然汗自出者屬陽明也

有汗而渴屬陽明

陽明病法多汗而陽明亦有反無汗之證不可不察

也

病人但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃宜五苓散茵陳湯

陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

心下緊滿無大熱頭汗出者茯苓湯主之

陽明病下血譫語者爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之汗出則愈

汗出譫語者有燥屎也過經乃可下也下之早語言必亂以表實裏虛故也

陽明證汗多而渴者不可與五苓散

汗多胃中燥猪苓復利其小便故也薏苡竹葉湯可與之仲景云陽明病發作有時汗出多者急下也

問陽明病渴終不可與五苓耶答曰陽明證小便不利汗少脉浮而渴者方可皆仲景之妙法也

仲景猪苓湯證亦云脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯與之

病人表實裏虛元府不開則陽氣上出汗見於頭凡頭汗出者五內乾枯胞中空虛津液少也愼不可下下之者謂之重虛然頭汗出者有數證傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脈細者此爲陽微結必有表復有裏也脈沉亦有裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也小柴胡湯主之

傷寒五六日已汗下胸脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此表未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

但漱水不欲嚥

陽明證頭疼身熱口燥但漱水不欲入咽者必衄也若病人無表證不發寒熱胸腹滿脣燥但欲漱水不欲嚥者此爲有瘀血必發狂也輕者犀角地黃湯甚者抵當湯

口燥咽乾

脾臟有熱則津液枯少故令口燥而舌乾仲景云傷寒無大熱口燥渴而煩背微惡寒者白虎湯加人參

讝語

病人有讝語有鄭聲二證鄭聲爲虛當用溫藥白通湯主之讝語爲實當須調胃承氣湯主之服調胃承氣而讝語止或更衣者停後服不爾再與之仲景云實則讝語虛則鄭聲鄭重也重語也世多不別然讝語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脉別之若大小便利手足冷脉微細者必鄭聲也大便祕小便赤手足溫脉洪數者必讝語也以此相參然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗卽讝語讝語屬胃和中則愈不和則煩而躁宜調胃承氣湯然亦有三陽合病讝語者有胃實讝語者或發汗多亡陽讝語者有下利讝語者有下後讝語者有婦人熱入血室讝語者問仲景云無犯胃氣何也答曰熱因經水適來乘虛入室故血室有熱遂令讝語當以小柴胡解之却與胃實讝語不同胃實有燥糞故宜調胃承氣湯下之若血實有熱讝語非胃家實仲景恐人作胃實攻之

故曰無犯胃氣也大抵譫語是熱屬陽而反見陰證者逆

發狂

發狂有二證陽毒發狂畜血如狂其外證與脉皆不同病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼狀此陽毒也病人無表證不發寒熱脣燥但欲漱水不欲入咽其脉微而沉小腹鞕滿小便反利大便必黑身黃發狂此血證譫也

病人如熱狀煩滿口燥其脉反無熱此爲陰伏其血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下下者愈若外不解者尚未可攻當先解其表宜桂枝湯外已解但小腹急結者乃可攻之屬桃仁承氣湯主之

大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化爲血其人喜忘而如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭甚則抵當湯抵當圓輕者桃仁承氣湯犀角地黃湯須取盡黑物爲效

夫血熱畜在膀胱經若用抵當湯更須仔細審其

有無表證若有畜血證而外不解亦未可便用抵當湯先用桂枝湯以解其外緣熱在膀胱太陽經故也

又有火邪發驚狂者醫以火於臥牀下或周身用火迫劫汗出或熨而成火邪其人亡陽煩躁驚狂臥起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

凡灸及燒鍼後證似火劫者並用劫法治之金匱風引湯尤良柴胡加龍骨牡蠣湯更捷

嘔

無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃之經足陽明之氣下行今厥而上行故爲氣逆氣逆則嘔仲景云嘔多雖不大便不可下可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣相和浹然汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯尤相主當耳與小柴胡湯胷脅滿而嘔日晡發潮熱者可小柴胡湯加芒硝也若嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯也大便祕者方加大黃

大柴胡治嘔最妙爲內有枳實故也枳實去穢壓虛氣須是去大黃仲景云嘔多雖有陽明病愼不可下官局桔梗湯最良亦用枳實耳

古人治嘔多用半夏生薑孫眞人云生薑是嘔家聖藥仲景治嘔皆用之金匱治諸嘔吐穀不得下者小半夏湯小半夏加茯苓湯小半夏加橘皮湯皆可選用也嘔而發熱者小柴胡湯主之嘔而發渴者猪苓湯主之先嘔却渴者此爲欲解急與之先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家仲景云本渴飲水而嘔者柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓湯主之若少陰證而嘔者眞武湯去附子加生薑也若汗若吐若下後虛煩不得眠若嘔者梔子生薑湯主之傷寒差後嘔者有餘熱在胃脘竹葉湯加生薑主之

問有乾嘔者何也答曰大凡嘔者飲食不下乾嘔者今人所謂啘也或因汗出或因有水或因下利脾胃有熱故使乾嘔官局中桔梗湯最佳仲景治法汗自出乾嘔者桂枝證也表不解心下有水氣乾嘔發熱者小青龍也身凉汗出兩脅痛或乾嘔者十棗湯也

少陰下利脉微與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯也少陰下利裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔者通脉四逆湯也乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯也

若病人直患嘔吐而復脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之

吐

吐有冷熱二證寸口脉數手心熱煩渴而吐以有熱在胃脘五苓散主之

傷寒有表證渴欲飲水水入口即吐者名曰水逆由心經受熱而小腸不利故也宜服五苓散發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止

小半夏加茯苓湯大半夏加橘皮湯主之

胃經汗下關脉遲胃中虛冷而吐乾薑黃芩黃連人參湯主之寒多不飲水而吐者理中湯去术加生薑主之少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胷中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四

逆湯吐利手足逆冷煩躁甚者吳茱萸湯主之若傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之

欬逆

傷寒欬逆此證極惡仲景經中不載孫眞人云欬逆遍尋方論無此名稱深窮其狀欬逆者噦逆之名蓋古人以欬逆爲噦耳大抵欬逆者古人所謂噦是也啘者今人所謂乾嘔是也

扁鵲中藏經治傷寒欬逆丁香散丁香柿蔕各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱猛喫極效

三因又有竹茹湯等方亦丁香散方竹茹湯治陽證也

本事方治傷寒候欬逆豆蔻湯治陰證欬逆丁香茴香肉豆蔻等藥若陽證不可用

凡欬逆多有先熱而後喫生冷或涼藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏林人之僕本發大熱以涼藥下之熱太甚欬逆四五日竟至於服丁香柿蔕而後却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈

吐血

傷寒吐血由諸陽受邪熱初在表應發汗而不發汗熱毒入深結於五臟內有瘀積故吐血也瘀血甚者抵當圓輕者桃仁承氣湯兼服犀角地黃湯三黃圓假令已下脈數不解今熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血也抵當湯主之

以上陽明經脈證治也

少陽經脈證治

足少陽膽之經起目外眥絡於耳遂分爲四道下缺盆循於脅井正別脈六道上下主經營百節流氣三部故病人胷脅痛而耳聾或口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脈尺寸俱弦者知少陽經受病也

傷寒三四日胷脅痛而耳聾或口苦舌乾或往來寒熱而嘔其尺寸脈俱弦此足少陽膽經受病也太陽病不解轉入少陽脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未可吐下診其脈弦緊者小柴胡湯主之蓋脈弦細頭痛發熱屬少陽少陽受病口苦咽乾目眩宜小柴胡湯以解表不可發汗發汗則讝語讝語屬胃胃和則愈胃不和則煩而躁宜調胃承氣湯此屬少陽

陽明也

脉細頭疼嘔而發熱者屬少陽也小柴胡湯主之

病人不渴外有微熱者小柴胡加桂枝也

小柴胡加桂主表熱最良此法不特傷寒也仲景云表有熱者小柴胡加桂也裏有熱者白虎加人參也大抵身熱不飲水者爲表熱也口燥煩渴者爲裏熱也二藥均治發熱然分表裏不可不知

脉弦細頭痛發熱者屬少陽也少陽不可發汗小柴胡主之

頭汗出而微惡寒者屬少陽宜小柴胡湯也

假令病人心下滿口不欲食大便鞕脉沉細是裏證當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩證俱見者仲景所謂半在裏半在表也小柴胡湯主之

病人脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時欬嗽者少陽中風也小柴胡湯主之

若傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者小柴胡湯也

往來寒熱

往來寒熱者陰陽相勝也陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒然寒熱有三證小柴胡湯大柴胡湯柴胡桂枝乾薑湯有表證而往來寒熱者用小柴胡也有裏證而往來寒熱者大柴胡也已表或已下而往來寒熱者皆可用柴胡桂枝乾薑湯也仲景云血弱氣虛腠理開邪氣因入與正氣分爭往來寒熱休作有時小柴胡主之又云傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿默默不欲食心煩喜嘔或胷煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者大柴胡主之傷寒五六日已發汗復下之胷脅滿小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱心煩柴胡桂枝乾薑湯也

往來寒熱胷脅滿痛或欬者小柴胡湯主之

傷風寒熱或發熱惡風而渴屬少陽

發斑

發斑有兩證溫病發斑熱病發斑溫病發斑者冬月

觸冒寒毒至春始發或已汗下表證未除毒氣未解故發斑黑膏主之或冬月溫暖人感乖戾之氣至春初爲積寒所折毒氣未得泄迨天氣暄暖溫毒始發肌肉斑爛癮疹如錦紋而欬心悶嘔清汁葛根橘皮湯屢用之驗黃連橘皮湯亦佳熱病發斑者與時氣發斑同或未汗下或已汗下熱毒不散表虛裏實熱毒乘虛出於皮膚遂發斑瘡癮疹如錦紋俗呼瘡麩素問謂之胗

發斑者下之太早熱氣乘虛故也下之太遲熱留胃中亦發斑服熱藥過多亦發斑微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生

大抵發斑不可用表藥表虛裏實若發汗開泄更增斑爛也皆當用化斑湯元參升麻湯阿膠大青湯猪膽梔子湯或與紫雪大妙可下者與調胃承氣湯

暑月陽氣重者常宜體候才有赤點如蚊蚤咬卻急治之

陽毒

傷寒病若陽氣獨盛陰氣暴絕必發躁狂走妄言面

赤咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃脉洪實或滑促者此名陽毒也宜用酸苦之藥令陰氣復而大汗解矣葶藶苦酒湯陽毒升麻湯大黃散梔子仁湯黑奴圓可選而用之

若陽毒倍常躁盛大渴者黑奴圓主之

結胷

夫結胷與痞蓋以病發於陽下之早卽爲結胷發於陰下之早卽爲痞然結胷與痞相似但以痛不痛爲異耳心下滿而鞕痛者爲結胷但按之滿不痛者爲痞醫家不審一有差誤立致危殆結胷屬陷胷證痞屬瀉心證其詳各於逐門備論之矣

心下緊滿按之石硬而痛此名結胷也傷寒本無結胷應身熱下之早熱氣乘虛而入痞結不散便成結胷

若已誤轉了初未成結胷者急頻與理中湯服自然解了更不作結胷蓋理中治中焦故也此古人亦說不到後因人消息得之若大段轉損有厥證者兼與四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者卽候

日數足可下却以承氣再下之蓋前來下得未是故也

其證心下緊滿按之石硬而痛項强如柔痓狀發熱汗出不惡寒名曰柔痓

其脉寸口浮關尺皆沉或沉緊名曰結胷也治結胷大率當下然脉浮與大皆不可下下之則死尚宜發汗也

仲景云結胷脉浮者不可下只可用小陷胷湯大抵脉浮是尚有表證兼以小柴胡湯等先發表表證罷方用下結胷藥便安

西晉崔行功云傷寒結胷欲絶心膈高起手不得近用大陷胷湯皆不差者此是下後虛逆氣已不理而毒復上攻氣毒相薄結於胷中當用枳實理中圓先理其氣次療諸疾古今用之如神應手而愈

結胷有三種有大結胷

不按而痛胷連臍腹堅硬爲大結胷大陷胷丸主之

有小結胷

按之心下痛爲小結胷小陷胷湯主之

有水結在胷脅間亦名結胷

頭微汗出但結胷無大熱此水結在胷脅證小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之

又有寒熱二證有實熱結胷

胷中煩躁心內懊憹舌上燥渴脉沉滑者皆熱證也大陷胷湯主之

有寒實結胷

寒實結胷無熱證者三物白散枳實理中丸主之

近世治結胷多行金鍼丸用硫黃陽起石者若寒實結胷行之或有差者若熱實結胷行之必死也

問大陷胷湯與大陷胷丸如何曰大陷胷用甘遂太峻不可輕用須量虛實輕重不得已卽大陷胷丸最穩問聖餅子灸臍中如何曰此尤不可用也

又云臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也二者病人脅下舊有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者亦名臟結死不治

痞滿

問心下滿而不痛此名痞也傷寒本無痞應身冷醫反下之遂成痞枳實理中丸最良

仲景治痞氣諸湯中有生薑瀉心湯半夏瀉心湯二方平和宜常用之

仲景云滿而不痛者爲痞柴胡不中與也半夏瀉心湯主之

此湯藥味蓋本理中人參黃芩湯方也

審知是痞先用桔梗枳殼湯尤妙緣桔梗枳殼行氣下膈先用之無不驗也結胷與痞關脉須皆沉

若關脉浮者大黃黃連黃芩瀉心湯主之

關浮則結熱三黃以瀉肝

若復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

病人心下痞與瀉心湯痞不解發渴口燥煩小便不利者五苓散主之

汗出表解而胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿此以醫下之也若復下之其痞益甚甘草瀉心湯主之蓋此非結

熱以胃中虛客氣上逆故使鞕也下利而心下痞服生薑瀉心湯甘草瀉心湯利不止者當治其下焦赤石脂禹餘糧湯主之蓋生薑瀉心甘草瀉心皆治中焦此利在下焦若只治中焦則利益甚耳服赤石脂禹餘糧湯利復不止當利其小便五苓散主之

凡痞服瀉心湯不愈然後可用陷胷丸下之不可用陷胷湯蓋太猛耳

大抵結胷與痞皆應下然表未解者不可攻也仲景云當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

外證未解心下妨悶者非痞也謂之支結柴胡桂枝湯主之胷脅滿微結小柴胡湯加乾薑牡蠣湯主之

若太陽證未除而數下之遂協熱而利利不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之十棗湯大柴胡湯皆治心下痞此方尤難用須是表證罷不惡寒身涼其人漐漐汗出發作有時頭疼心下痞鞕滿引脅下疼乾嘔短氣者乃可行十棗湯表未解者慎不可

用也大柴胡湯治傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者非大柴胡湯不可也

若發汗吐下後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭湯主之

有旋覆代赭湯證其人或欬逆氣虛者先服四逆湯胃寒者先服理中丸次服旋覆代赭湯爲良

旋覆代赭湯是解後心下痞鞕證

咽喉痛

咽喉痛有陰陽二證脉浮數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血者此陽毒也

少陰伏氣亦有咽喉證備本經篇中以上少陽經證脉治法也

太陰經脉證治

足太陰脾之經爲三陰之首其脉布於脾胃絡於嗌喉故病人腹滿而嗌乾尺寸俱沉細者知太陰經受病也

傷寒四五日腹滿咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛尺寸脉俱沉細此足太陰脾經受病也傷寒

手足必微冷若手足自溫者繫太陰也自利不渴屬太陰也腹滿時痛屬太陰也自利不渴者臟寒也當溫之宜四逆湯理中湯也腹滿脉浮者可桂枝微發汗腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯

問古人以四日太陰證病在胷膈可吐而愈何也答曰不然有太陰證脉大胷滿多痰者可吐之脉大而無吐證者可汗而已大抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄之瓜蔕梔豉隨證施用不可拘以日數也

胷膈不快䐜滿閉塞脣青手足冷脉沉細少情緒或腹痛此名太陰也近人多不識陰證纔見胷膈不快便投食藥非其治也大抵陰證者由冷物傷脾胃陰經受之也主胷膈䐜滿面色及脣皆無色澤手足冷脉沉細少情緒亦不因嗜慾但內傷冷物或損動胃氣遂成陰證復投巴豆之類胷膈愈不快或吐而利經一二日遂致不救蓋不知寒中太陰也太陰者脾之經也

問萬一飲食不節胷膈不快寒中陰經何法以治之

答曰急作理中湯加青橘陳橘剉如麻豆大服一二劑胷膈即快枳實理中圓五積散

病有無熱惡寒者發於陰也發於陰者宜溫裏脉必沉細屬理中湯四逆湯證也若發熱微惡寒者屬柴胡桂枝湯也

太陰脾之經主胷膈滿甲乙經云邪生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食居處陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入腑陰受之則入臟入六腑則身熱不時上爲喘呼入五臟則䐜滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼

腹痛

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛是有表復有裏仲景所以用桂枝加芍藥湯主之痛甚者加大黃桂枝加芍藥即是小建中也太陰脉弱自利設當行芍藥大黃者宜減之其人胃虛陽氣易動故也

下利者先煎芍藥十餘沸

難經云痛爲實大抵痛宜下

腹痛有二證有熱痛有冷痛尺脉弦腸鳴泄利而痛者冷痛也小建中湯主之仲景云陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯陰證腹痛卽四逆散通脉四逆加芍藥湯腹痛小便不利者眞武湯關脉實腹滿大便祕按之而痛者實痛也桂枝加大黃湯黃連湯大承氣湯主之

太陰大約可溫然須有積證方可下也何謂積證太陰腹滿時痛

腹脹滿

腹脹滿者陰陽不和也桔梗半夏湯最良仲景論太陽證發汗後腹脹滿也厚朴生薑半夏甘草人參湯下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

汗後寒熱

太陰證發汗後依前寒熱者須看脉如何若脉浮數或洪大則表證猶在當再表也如桂枝湯或桂枝二麻黃一之類醫人爲見已汗或已下而發寒熱不敢再表誤矣蓋脉浮爲在表表之必愈也

少陰經脈證治

足少陰腎之經其脈起於小指之下斜趨足心別行者入足跟中上至股內後廉貫腎絡膀胱直行者從腎上貫肝膈入肺中繫舌本傷寒熱氣入於臟流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後臟腑空虛津液枯竭腎有餘熱亦渴故病人口燥舌乾而渴其脈尺寸俱沉者知少陰經受病也

問傷寒何以須診太谿脈耶答曰太谿穴是足少陰腎之經男子以右腎爲命門女子以左腎爲命門主生死之要病人有命門脈者活無者死仲景云少陰病手足逆冷發熱者不死脈不至者灸太谿七壯故傷寒必診太谿以察其腎之盛衰也太谿二穴在足內踝後跟骨上動脈陷中

問脈微細欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴答曰此名少陰也少陰之爲病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制

水故令色白也四逆湯主之

少陰病若口燥舌乾而渴者須急下之不可緩也大承氣湯主之若脈沉而遲者須溫之四逆湯主之蓋以口燥而渴者知其熱脈沉而遲者別其寒也

少陰屬腎古人謂之腎傷寒也腎傷寒口燥舌乾而渴固當急下大抵腎傷寒亦多表裏無熱但苦煩憒默默而極不欲見光明有時腹痛其脈沉細舊用四順湯古人恨其熱不堪用云腎病而體猶有熱者可服仲景四逆散若已十餘日下利不止手足徹冷乃無熱候可增損四順湯

少陰病若惡寒而踡時時自煩不欲厚衣者用去大黃大柴胡湯

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃細辛附子湯微汗之

少陰病得之二三日常見少陰無陽證者亦須微發汗宜麻黃附子甘草湯此學者不可不知也

少陰腎之經主脈微細心煩但欲寐或自利而渴問經云一二日少陰病者何也謂初中病時腠理寒便

入陰經不經三陽也

傷寒雖是三陰三陽大抵發於陽則太陽也發於陰則少陰也此二經爲表裏其受病最爲多陽明太陰受病頗稀至於少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二三日太陽證不罷者但治太陽有元得病便見少陰證者直攻少陰亦不必先自太陽次傳而至

蓋寒氣入太陽卽發熱而惡寒入少陰經只惡寒而不發熱也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利卽乾薑甘草湯

手足指頭微寒冷謂之淸此未消喫四逆蓋疾輕故也只可服理中乾薑之類

大段重者用四逆湯無脈者用通脈四逆湯也

傷寒五六日尺寸脈俱沉或口燥舌乾而渴或口中和而惡寒此足少陰腎經受病也少陰病口燥舌乾者急下之宜大承氣湯若不渴不口燥舌乾而脈沉者急溫之宜四逆湯太陰厥陰俱不惡寒只有少陰有惡寒之證不可不知也少陰病得之一二日口中

和其背惡寒者宜著灸幷服四逆湯也大抵傷寒陽明證宜下少陰證宜溫然仲景於少陰證口燥咽乾即云急下之蓋少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於臟流於少陰之經腎汁乾咽絡焦故口燥咽乾而渴須宜急下之非若陽明證宜下而可緩也雖然陽明亦有一證發熱汗出多急下之陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下也

問仲景少陰四逆湯又有四逆散何也答曰大抵少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲景謂之晚發熱用麻黃細莘之類以發汗終不成少陰證便不得發汗耶今少陰病四肢冷亦有內熱者仲景用四逆散是也四逆湯用附子乾薑而四逆散主四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重已上病皆熱證耳

問陰證有發熱者乎答曰太陰厥陰皆不發熱只少陰發熱有二證仲景謂之反發熱也少陰病初得之發熱脈沉者麻黃細莘附子湯主之

少陰病脈沉發汗則動經此大略之言耳脈應裏

而發熱在表亦當以小辛之藥泄汗而溫散也仲景云傷寒之病從風寒得之表中風寒入裏則不消須用溫藥少汗而解

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥冷脉不出者通脉四逆湯主之大抵陰證發熱終是不同脉須沉或下利手足厥也病人尺寸脉俱沉細但欲寐者少陰證也急作四逆湯復其陽不可緩也

少陰不得有汗而少陰亦有反自汗出之證

陰證四支逆冷額上及手背冷汗濈濈者亡陽也

吐利

嘔吐下利仲景云傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯下之吐利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥冷者四逆湯主之少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死吳茱萸湯主之吐利止而身體痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯

仲景大柴胡一證云傷寒發熱汗出不解心中痞嘔吐而下利者大柴胡主之此非霍亂也

吐利已汗出而厥四支拘急不解脉微欲絕者通脉

四逆加猪膽湯自利而渴屬少陰

傷寒熱入於臟流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲少陰下利欬而嘔渴猪苓湯主之下利欲飲水者以有熱也白頭翁湯主之若脉沉自利而身體痛者陰證也急當救裏宜四逆湯附子湯眞武湯之類以溫之

大抵大便利而身體疼者當救裏大便如常而身體痛者急當救表此不可不知也少陰證四逆而小便自利者虛寒證也四逆湯眞武湯去茯苓主之

下利

傷寒下利多種須辨識陰陽勿令差互

三陽下利則身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱以此別之大抵下利挾太陽脉證便不得用溫藥俗醫但見下利便作陰證用溫熱藥鮮不發黃生斑而死也

大抵傷寒下利須看脉與外證下利而脉大者虛也脉微弱者爲自止下利日十餘行脉反實者逆下利

脈數而滑者有宿食也下之愈脈遲而滑者實也其利未得便止宜更下之下利三部脈皆平按其心下鞕者急下之協熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩寒毒入胃則臍下必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濕毒氣盛則下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁也下利欲飲水者以有熱也下利譫語者有燥屎也寒毒入胃者四逆湯理中湯白通湯加附子四逆散加薤白主之協熱利者黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂圓濕毒下膿血者桃花湯地榆散黃連阿膠散雖然自利而渴屬少陰然三陽下利亦有飲水者乃有熱也三陰下利宜溫之然少陰自利清水心下痛口乾燥者却宜下之此又不可不知也

少陰泄利下重不可投熱藥先濃煎薤白湯內四逆散緣四逆散用枳實芍藥之類又尋常胃中不和腹痛腸鳴下利生薑瀉心湯最妙此二法不特傷寒證也

欬嗽

有少陰證欬嗽眞武湯四逆散猪苓湯也大抵熱在上焦其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬而微喘

若少陰證欬嗽四支沉重疼痛小便不利自下利而欬眞武湯主之

眞武加五味子乾薑大抵傷寒水氣皆因飲水過多古人治水氣而欬者病在陽則小青龍湯主之病在陰則眞武湯主之

四支厥逆腹中痛或泄利而欬四逆散主之

四逆散加五味子乾薑

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之又古今錄驗橘皮湯治嗽佳

咽痛咽乾

脈沉遲手足厥冷或吐利而咽中痛此少陰證也病源云此爲下部脈都不至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上衝故咽喉不利或痛而生瘡也傷寒脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利此候汗下熏熨俱不可汗出者藁本粉傳之

咽喉痛者甘草湯桔梗湯猪膚湯半夏散通脉四逆去芍藥加桔梗湯麻黃升麻湯可選而用之

又有伏氣之病謂非時有暴寒中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脉微弱法先咽痛似傷寒非喉痹之病次必下利始用半夏桂甘湯次四逆散主之此病只一二日便差古方謂之腎傷寒也

少陰大約可溫然須有少陰口燥咽乾或腹滿不大便或下利清水心下痛皆積證也

衄血

問陰證有衄血者乎答曰陰證自無熱何緣有衄若少陰病但厥無汗强發之必動血未知從何道出或從口鼻或從耳目是謂下厥上竭爲難治

煩躁

傷寒陰盛格陽者病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服霹靂散須臾躁止得睡汗出即差此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈火焰散丹砂丸並主之

傷寒陰證似陽者陰發躁熱發厥物極則反也大率

以脉爲主諸數爲熱諸遲爲寒無如此最驗也假令身體微熱煩躁面赤其脉沉而微者皆陰證也身微熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴陽者下虛故也若醫者不看脉以虛陽上格之躁誤以爲實熱反與凉藥則氣消成大病矣外臺祕要云陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之仲景少陰證面赤者四逆加葱白主之

以上少陰經脉證治也

厥陰經脉證治

足厥陰肝之經厥者盡也靈樞曰亥爲左足之厥陰戌爲右足之厥陰兩陰俱盡故曰厥陰夫陰盡爲晦陰出爲朔厥陰者以陰盡爲義也其脉循陰器而絡於舌本也脉弗營則筋急筋急則引舌與卵故脣青舌卷而卵縮凡病人煩滿而囊縮其尺寸俱微緩者知厥陰經受病也

傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微緩此足厥陰肝經受病也厥陰病其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈宜小建中湯脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒

似痞爲欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸脉俱沉短者必是囊縮毒氣入臟宜承氣湯下之

大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故次第傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木爲微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣剋於脾土脾再受賊邪則五臟六腑皆困而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五死一生古人云脾熱病則五臟危又云土敗木賊則死若第六七日傳厥陰脉得微緩微浮爲脾胃脉也故知脾氣全不再受剋邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

厥陰肝之經主消渴氣上衝心中疼熱饑不欲食食則吐蚘下之利不止也若陰氣獨盛陽氣暴絕則爲陰毒其證四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脉沉疾或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復而大汗解矣古人云辛甘發散爲陽謂桂枝甘草乾薑附子之類能復其陽氣也微用辛甘甚則用辛苦陰極

發躁陰證似陽學者當以脈別之

手足逆冷

手足逆冷此名厥也厥者逆也陰陽不相順接故手足逆冷也陽氣衰陰氣盛陰勝於陽故陽脈爲之逆不通於手足所以逆冷也傷寒熱多厥少者其病當愈厥多熱少者其病爲進然有冷厥有熱厥當仔細辨認

冷厥者初得病日便四肢逆冷脈沉微而不數足多攣臥而惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調或小便數外證多惺惺而靜脈雖沉實按之遲而弱者知其冷厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆湯當歸四逆加茱萸生薑湯白通加豬膽湯皆可選用也

熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽證至二三日乃至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深則方能發厥須在二三日後也若微厥卽發熱者熱微故也其脈雖沉伏按之而滑爲裏有熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便祕

小便赤外證多昏憒者知其熱厥也白虎湯承氣湯隨證用之仲景云傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤

熱厥當下故云厥應下之者若反發汗必口傷爛赤也

又有下證悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑是陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便用承氣湯下之不可拘忌也

諸手足逆冷皆屬厥陰不可下不可汗然有須下有須汗證者謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消息之

若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也多用綿衣包手足令溫煖急服五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之晬時必大汗而解矣

或傷寒厥逆而心下怔忡者宜先治水當服茯苓甘

草湯却治厥不爾水漬入胃必下利也

又有病人手足厥冷脈乍結者邪氣結在胷也心下滿而煩饑不能食者病在胷中當吐之宜瓜蔕散蓋病在胷中亦能令人手足厥但認脈乍結者是也

陰虛則結脈來緩時一止復來曰結主胷滿煩躁

若傷寒發厥至七八日膚冷而躁無時暫安者爲臟厥此爲難治

若厥陰證大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

太陰少陰經從足至胷俱不至頭唯厥陰經挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頏顙連目出額故太陰少陰並無頭疼之證仲景只有厥陰一證吳茱萸湯治乾嘔吐涎沫頭疼而已大抵屬三陽者頭疼爲多也

孫眞人云陽傷寒者體熱頭疼是也陰傷寒者不壯熱不頭痛是也

若非次頭疼胷中滿及發寒熱脈緊而不大者即是膈上有涎宜用瓜蔕末一錢煖水調下吐涎立愈

夫重陽必陰重陰必陽寒暑之變也假令手足逆冷

而大便祕小便赤或大便黑色其脉沉而滑者皆陽證似陰也輕者白虎湯甚者承氣湯傷寒失下血氣不通令四肢逆冷此是伏熱深故厥亦深速用大承氣加分劑下之汗出立瘥

仲景所謂厥應下之者此也

熱厥與陰厥自不同熱厥者微厥即發熱若陰厥即不發熱四肢逆冷惡寒脉沉而細大小便滑泄矣

陰毒

手足逆冷臍腹築痛咽喉疼嘔吐下利身體如被杖或冷汗煩渴脉細欲絕此名陰毒也陰毒之爲病初得病手足冷背強咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹痛短氣四肢厥逆嘔吐下利體如被杖宜服陰毒甘草湯白术散附子散正陽散肉桂散回陽丹返陰丹天雄散正元散退陰散之類可選用之

大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物傷脾外傷風寒內既伏陰外又感寒或先感外寒而內伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭疼腰重腹痛眼睛疼身體倦怠四肢逆冷額上手背冷汗不止或多煩渴精神恍

惚如有所失三二日間或可起行不甚覺重診之則六脉俱沉細而疾尺部短小寸口脉或大

六脉俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰證也大抵陽毒傷寒其脉多弦而洪數陰毒傷寒其脉沉細而弦疾不可不知也

若誤服涼藥則渴轉甚躁轉急有此病證者便須急服辛熱之藥一日或二日便安

若陰毒漸深其候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或咽喉不利心下脹滿結鞕躁渴虛汗不止

陽盛則身熱而無汗陰盛則身冷而有汗岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘粗爲之俛仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥

或時鄭聲指甲面色青黑六脉沉細而疾一息七至已來有此證者速於氣海或關元二穴灸三二百壯以手足和煖爲效仍兼服正陽散肉桂散回陽丹返陰丹天雄散白朮散內外通遂令陽氣復而大汗解矣

陰獨盛而陽氣暴絶則爲陰毒若陽獨盛而陰氣

暴絕則爲陽毒大凡陰陽離絕非大汗不能復其正氣也

若陰毒已深疾勢困重六脉附骨取之方有按之卽無一息八至已上或不可數至此則藥餌難爲功矣但於臍中用葱熨法或灼艾三五百以來手足不溫者不可治也如得手足溫更服前熱藥以助之若陰氣散陽氣來卽減熱藥而調治之

陽氣乍復往往却煩躁愼不可投凉藥煩躁甚者再與返陰丹卽定當須識此勿令誤也

或身重背強腹中絞痛咽喉不利身如被杖者當作陰毒治之

吐長蟲

此名蚘厥也蚘厥者臟寒蚘上入膈其人吐蚘也此是厥陰證或病人有寒復發其汗胃中冷及因發汗後身熱重發其汗胃中虛冷故長蟲逆上先服理中圓次用烏梅圓

以上厥陰經脉證治也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十一卷目錄

醫部彙考三百四十一

傷寒門七

朱肱活人書（大便　小便　似瘧　多眠　不得眠　表裏證　無表裏證　表熱裏寒表寒裏熱　論傷寒溫病熱病同異　陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈　論汗下法　可汗　不可汗　可下　不可下　合病併病　兩感傷寒　壞病　勞復食復　陰陽易　狐惑　百合）

劉完素六書（傷寒論　解利傷寒論　心要論　心要餘論　主療說　傷寒表

證

傷風表證　風寒俱中　裏證　表裏證

汗後不解　下後不解

藝術典第三百六十一卷

醫部彙考三百四十一

傷寒門七

宋朱肱活人書

大便

傷寒數日不大便大便鞕及有燥屎皆知用大柴胡大承氣小承氣攻之然仲景論大便不通亦有數種不可攻者

仲景又有陽結陰結之論不可不別也其脈浮而數

能食不大便此爲實名曰陽結宜用小柴胡湯所謂和其榮衛以通津液縱不了了得屎而解也其脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結宜用金液丹所謂陽盛則促陰盛則結促結同也

問大便溏者何也答曰古人云歲火不及寒乃大行民病騖溏大率病人腸中有寒即大便鴨溏蓋溏者胃中冷水穀不別故也華佗云寒即溏熱即垢仲景說初鞕後溏有二證小便不利小便少皆水穀不分耳陽明證自汗出應小便少而小便自利者津液內竭也屎雖鞕不可攻也當用蜜煎導之

問白虎證亦身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃答曰白虎與發黃證相近遍身汗出此爲熱越白虎證也頭面汗出頸以下都無汗發黃證也

小便

傷寒發汗後汗出多亡津液胃中極乾故小便不利醫見小便不利往往利之之誤矣類纂云胃中乾則無小便愼不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通脈浮

者五苓散脈沉者猪苓湯也表不解心下有水發熱而欬少腹滿小便不利者小青龍湯去麻黃加茯苓也傷寒無汗翕翕發熱頭項强痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也嘔而發熱胷脅滿心下怔忪小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓少陰病小便不利者四逆散加茯苓也

傷寒有所不利者行之取其滲泄也有渴而飲停者有躁而煩渴者有病氣去而水氣不得行者其表裏得見煩躁口燥欲飲水水入卽吐病名水逆及霍亂頭痛發熱身疼痛欲飲水者有發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者並宜五苓散其脈浮發熱渴欲飲水小便不利少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者宜與猪苓湯其大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散此利水道滲泄之義也

大抵中濕與發黃以利小便爲先陽明汗多以利小便爲戒

問小便難何也答曰陰虛故也陰虛者陽必湊之爲陽所湊也故小便黃者中有熱也宜瞿麥滑石之類

瀉之太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之陽明中風脈弦浮大短氣腹都滿脅下及心痛鼻乾不得汗嗜臥身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓主之

似瘧

形證似瘧有太陽證有陽明證有婦人熱入血室證

太陽證服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯傷寒八九日如瘧狀熱多寒少其人不嘔清便欲自可日一二發者麻黃桂枝各半湯

太陽證形似瘧寒熱等者與桂枝二麻黃一湯熱多寒少者麻黃桂枝各半湯

有陽明證病人煩熱汗出如瘧狀日晡發熱而脈浮虛者與桂枝湯脈實者宜承氣湯

婦人熱入血室其血必結故使如瘧狀小柴胡湯主之

或得汗而解復如瘧狀日晡而發者此屬陽明也若脈實者可下之宜大柴胡大承氣也

若發汗後只惡寒者虛也發汗後只發熱者實也只惡寒屬芍藥甘草附子湯只發熱屬調胃承氣湯

多眠

多眠有四證有風溫證有小柴胡證有少陰證有狐惑證

各載本證中

不得眠

問傷寒差後不得眠何也答曰蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以病後仍不得睡也梔子烏梅湯主之

表裏證

假令太陽病表證未除而醫數下之遂協熱而利利不止心下痞硬仲景謂之表裏不解桂枝人參湯主之

本太陽病醫反下之因而腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯此皆仲景治傷寒有表復有裏之法學者當以意推之也

傷寒表證當汗裏證當下不易之法也發表攻裏本自不同甘遂神丹不可以合飲桂枝承氣安可以並

進然而假令病人脈浮而大是表證當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此是表裏證俱見五苓散主之假令傷寒不大便六七日頭痛有熱者是裏證當下其人小便清者知不在裏仍在表當須發汗此是兩證俱見卽不可下宜與桂枝湯

無表裏證

傷寒四五日後以至過經無表證又於裏證未可下者但非汗證亦非下證者皆可用小柴胡隨證加減用之以至十餘日者亦可用十餘日外用小柴胡湯不愈者若大便鞕看證可下則用大柴胡下之已過經其人氣稍虛當下者用大柴胡湯則穩蓋恐承氣湯太緊病人不禁也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱此爲實也當下之宜大承氣湯又云病人無表裏證發熱七八日脈雖浮數可大柴胡下之假令已下脈數不解至六七日不大便爲有瘀血也屬抵當湯

表熱裏寒表寒裏熱

病人有身大熱反欲得衣有身大寒反不欲近衣者

此名表熱裏寒表寒裏熱也病人身大熱反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無治法宜先與陰旦湯寒已次以小柴胡加桂以溫其表病人身大寒反不欲近衣寒在皮膚熱在骨髓也仲景亦無治法宜先與白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外大抵病有標本治有先後表熱裏寒者脈須沉而遲手或微厥下利清穀也所以陰證亦有發熱者四逆湯通脈四逆湯主之表寒裏熱者脈必滑而厥口燥舌乾也所以少陰惡寒而踡時時自煩不欲厚衣用大柴胡下之而愈此皆仲景之餘議也

論傷寒溫病熱病同異

素問云冬三月是謂閉藏水冰地坼無擾乎陽又云彼春之煖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒是以嚴寒冬令爲殺厲之氣君子善攝生當嚴寒之時行住坐臥護身周密故不犯寒毒彼奔馳荷重勞房之人皆辛苦之徒也當陽閉藏而反擾動之則鬱發腠理津液強漬爲寒所薄膚腠緻密寒毒與榮衞相渾當是之時壯者氣行則已怯者則著而成病矣其即時而

病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不卽時而病者寒毒藏於肌膚之間至春夏陽氣發生則寒毒與陽氣相薄於榮衛之間其病與冬時卽病無異但因春溫氣而變名曰溫病因夏熱氣而變名曰熱病溫熱二名直以熱之多少爲義陽熱未盛爲寒所制病名爲溫陽熱已盛寒不能制病名爲熱故均謂之傷寒也

陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈

素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則內熱陰盛則外寒故治傷寒者陽虛陰盛汗之則愈下之則死陽盛陰虛汗之則死下之則愈也陰陽虛盛非謂分脈尺寸也表陽也裏陰也外臺云表病裏和汗之則愈表和裏病下之則愈亦只是論表裏陰陽以汗下之

大抵榮衛爲表屬陽胃腑爲裏屬陰寒毒爭於榮衛之中必發熱而惡寒尺寸俱浮大內必不躁設有微煩其人飲食欲溫而惡冷爲陽虛陰盛也汗之則愈

誤下則死

若寒毒相薄於榮衞之內而陽盛陰衰極陰變陽寒盛生熱而陽熱之氣盛而入裏熱毒居胃水液乾涸燥糞結聚其人外不惡寒必蒸蒸發熱而躁甚則譫語其脈浮滑而數或洪實爲陽盛陰虛也下之則愈

誤汗則死

論汗下法

古人云未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此大略之言耳病人有虛有實邪氣傳受遲速不等豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮者猶宜發汗日數雖少若有裏證而脈沉者卽宜下之正應隨脈以汗下之

傷寒固有始得病便變陽盛之證須便下之又有腠理寒一二日便成少陰病者須急溫之

又況六氣之邪乘虛入經自背得之則入太陽或入少陰緣少陰有伏脈在背自面感之則入陽明之類不必皆始於太陽兼寒邪有首尾止在一經或間傳一二經不可以一理推但據脈與外證治之此活法

也假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每日如此不以日數多少止是太陽經受之其餘經絡皆倣此大抵傷寒憑脈與外證以汗下之若過日多脈尚大浮數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實者汗之必死須下之而愈也若始得病脈細沉數外證或腹滿咽乾或口燥舌乾而渴爲正責屬裏可下之而愈若無此證但發熱脈沉者誤下必死須行麻黃附子甘草湯麻黃細辛附子湯小發汗此皆仲景之確論也

可汗

太陽表證者惡寒是也宐發汗

春不可大發汗以陽氣尚弱不可亟奪使陰氣勝於時天寒初解榮衛腠理緩可用小柴胡湯之類

冬不可汗者以陽氣伏藏不可妄擾不問傷寒中風以輕藥解利之傷寒無汗者只與桂枝麻黃各半湯傷風有汗只與柴胡桂枝湯或得少汗而解或無汗自解病勢甚者不拘此

夏月天氣大熱元府開脈洪大宐正發汗但不可用

麻黃桂枝熱性藥須是桂枝麻黃湯加黃芩石膏知母升麻也夏月有桂枝麻黃證不加黃芩輩服之轉助熱氣便發黃斑出也白虎湯雖可用然治中暑與汗後一解表藥耳一白虎未能驅逐表邪況夏月陰氣在內或患熱病而氣虛人妄投白虎往往有成結胷者以白虎性寒非治傷寒藥也

凡發汗欲令手足俱周濈濈然一時許爲佳不欲如水淋漓服湯中病即止不必盡劑然發汗須如常覆腰以上厚衣覆腰以下蓋腰以上流漓而腰以下至足心微潤病終不解凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰脚周遍爲度

問三陰有可汗者乎答曰陰病不當發汗發汗即動經然太陰脈浮少陰發熱亦須微微取汗但不正發汗耳大抵風寒中人與榮衞俱薄而發熱又未會行諸汗藥雖無陽證須少汗解逐之王叔和云表中風寒入裏則不消故知初病脈沉細數雖裏不消本表中風寒須宜溫覆少汗而解仲景太陰證脈浮可汗宜桂枝湯少陰病發熱脈沉宜麻黃附子細辛湯少

陰二三日常見少陰證無陽證者宜麻黃附子甘草湯微發汗皆陰證表藥也要知脈沉細數病在裏不可發汗此大略之言耳脈應裏而發熱在表宜以小辛之藥取微汗而溫散也

不可汗

其人當汗而衄血下血者不可表也

太陽病脈浮而緊發熱身無汗自衄者愈不可汗汗出必額上陷脈緊急直視不得瞬又云太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈不愈宜桂枝湯

壞病者不可表也

太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者爲壞病桂枝不中與也當犯何逆隨證治之又云太陽病不解傳入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之

婦人經水適來者不可表也

婦人病經水適下而發其汗則鬱冒不知人此爲表裏俱虛故令鬱冒也

風溫者不可表也

脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗體重其息必喘其形不仁嘿嘿但欲眠者風溫證也復發其汗者死宜萎蕤湯

濕溫者不可表也

兩脛逆冷胷腹滿頭目痛苦妄言必多汗者濕溫證也不可發汗發汗者名曰重暍如此死者醫殺之耳宜桂附湯白虎加蒼朮湯

虛煩者不可表也

諸虛煩熱與傷寒相似然不惡寒身不疼故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊故知非裏實也不可下宜服竹葉湯

病人腹間左右上下有築觸動氣者不可表也

動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此爲逆難治先服防風白朮牡蠣湯汗止次當服建中湯動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心

苦煩飲則吐水先服五苓散一二服次服竹葉湯動氣在上不可發汗發汗則氣上衝止在心端宜服李根湯動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩骨節疼煩目運惡寒食卽反吐穀不得化先服大橘皮湯吐止後服小建中湯

以此見古人愼用表藥如此

可下

陽明裏證者內熱是也宜下之

傷寒始發熱惡寒今汗後不惡寒但倍發熱而躁始脈浮大今脈洪實或沉細數始惺靜今狂語此爲胃實陽盛再汗卽死須下之卽愈亦有始得病便變陽盛之證須便下之不可拘以日數更有心胷連臍腹大段疰悶腹中疼坐臥不安冒悶喘急極者亦不候他證便下之

凡大便祕妨悶恐尚有表證者亦須少少飲小承氣湯微解之不可過多令大泄也

失下則氣血不通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察也

問三陰有可下者乎三陰大約可溫然須有積證方可也何謂積證太陰腹滿時痛

桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯

少陰口燥咽乾或腹滿不大便或下利清水心下痛皆積證也下證悉具服湯已更衣者止後服不爾盡劑服之

下後慎不中服補藥孫眞人云服大承氣湯得利差慎不中服補藥也熱氣得補復成更復下之是重困也宜消息安養之

不可下

大抵傷寒最慎於下若表證未罷不可亂投湯劑虛其胃氣

仲景云表解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除也表已解而內不消大滿大實堅有燥屎乃可下之雖四五日不能爲禍若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣古人所以傷寒有承氣之戒

脈浮者不可下

仲景云脈浮者病在表可發其汗應汗而下爲懊憹爲痞爲結胷

脈虛細者不可下

王叔和云脈微不可吐虛細不可下

惡寒者不可下

惡寒者表之虛雖是陽明證尚惡寒卽與太陽合病屬表可發其汗少陰惡寒當溫之

嘔吐者不可下

仲景云嘔多雖有陽明證不可下陽明病脅下硬滿不大便而嘔舌上白胎者宜與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出得尿而解

不轉失氣者不可下

傷寒論云陽明病不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也又云陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與小承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣者

勿更與之仲景無治法今詳宜與小柴胡湯明日又不大便脈反微濇者裏虛也爲難治仲景亦無治法宜與黃芪建中湯

大便堅小便數不可用承氣湯攻之

趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相薄大便則硬其脾爲約麻子仁丸主之千金云脾約者大便堅小便利宜枳實丸太陽陽明者脾約乃是也

小便清者不可下

仲景云傷寒不大便六七日者頭疼有熱與承氣湯小便清者知不在裏

大便鞕小便少者未可攻

恐津液還入胃必先鞕後溏也小便自如乃可攻之當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

陽明病自汗出若發汗小便自利者不可下

此爲津液內竭雖鞕不可攻之當須自大便蜜煎

導之若土瓜根大猪膽汁皆可導之

以此知古人愼用轉藥如此

合病併病

腹滿身重難以轉側口中不仁面垢讝語遺尿此三陽經合病也白虎湯主之不可發汗汗之則讝語下之則額上生汗手足逆冷若自汗者白虎加人參也三陽合病背惡寒者口中不仁口燥舌乾也白虎加人參湯主之

問三陽有合病有併病何也答曰脈浮大而長頭疼腰痛肌熱目疼鼻乾者合病也太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者併病也三陽皆有合病惟三陰無合病不可不知也

兩感傷寒

傷寒一日頭疼口乾煩滿而渴二日腹滿身熱不欲食讝語三日耳聾囊縮而厥水漿不入不知人此名兩感傷寒也兩感者表裏俱病也太陽與少陰爲表裏陽明與太陰爲表裏少陽與厥陰爲表裏陰陽雙傳臟腑俱病此爲難治六日而死矣故一日太陽與

少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥仲景無治法但云兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同尋至第三卷中言傷寒下之後復下利不止身疼痛者當急救裏宜四逆湯復身體疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯遂以意尋比倣效治兩感有先後宜先救裏若陽氣內正卽可醫也內才正急當救表蓋內尤爲急才溫內則急救表亦不可緩也

壞病

仲景云太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者爲壞病桂枝不中與也當知何逆隨證治之又云太陽病不解轉入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下其脈沉緊者可與小柴胡湯若已吐下發汗小柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之蓋爲病中又感異氣變爲壞病以時令寒暑燥濕風氣不節脈息與少陽相異證候與傷寒不同明當消息其由以法治之若脈尺寸俱盛重感於寒變

爲溫瘧陽脈浮滑陰盛濡弱更遇於風變爲風溫陽脈洪數陰脈實大更遇溫熱變爲溫毒爲病最重陽脈濡弱陰脈弦緊更遇溫氣變爲溫疫脈證之變方治不同仲景謂溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經而取之也又有傷寒過經再受熱邪留畜臟腑病後多變久而不差陰陽無復綱紀及傷寒解後虛羸少氣皆名壞傷寒也知母麻黃湯鱉甲散黑奴圓檢方與病證相參選用之若傷寒解後虛羸少氣氣逆吐者竹葉石膏湯主之

勞復食復

問傷寒差後發熱者何也答曰此名勞食復也病新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱熱氣既還復入經絡名曰勞復仲景云傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之

脈浮者以汗解宜柴胡桂枝湯脈實者以下解宜大柴胡湯

又大病差後勞復者枳實梔子湯主之麥門冬湯雄鼠屎湯七味葱白湯皆可選用

又食復者大病新差脾胃尚弱穀氣未復强食過多停積不化因爾發熱名曰食復

大抵新病差多因傷食便作痞乾噫食臭腹中雷鳴下利等證可與生薑瀉心湯

仲景於枳實梔子湯證云若有宿食內大黃如博棊子五六枚服之愈

陰陽易

病人身體重少氣陰腫入裏腹內絞痛熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花婦人則裏急腰胯連腹內痛此名陰陽易也傷寒病新差陰陽氣未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰胯連腹內痛名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病名曰陽易其婦人病新差未平復男子與之交接得病名曰陰易所以呼爲易者陰陽相感動其毒疫著於人如換易然其病狀身體重熱上衝胷頭重不能舉眼中生花四支拘急小腹絞痛手足拳則皆死其亦有不卽死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓枯竭便

恍恍翕翕氣力轉小著牀而不能搖動起止仰人或引歲月方死燒褌散豭鼠糞湯竹皮湯乾薑湯青竹茹湯當歸白朮湯可選用之

狐惑

病人默默欲眠目不能閉起居不安其聲嗄或咽乾此名狐惑傷寒也狐惑與濕䘌皆蟲證初得狀如傷寒或因傷寒變成其疾其候默默欲眠目不能閉起居不安蟲蝕其喉爲惑其聲嗄蟲食下部爲狐其咽乾狐惑之病並惡飲食面目乍赤乍白乍黑是其證也大抵傷寒病腹內熱入食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部爲䘌病其候齒無色舌上盡白甚者脣黑有瘡四支沉重忽忽喜眠蟲蝕其肛爛見五臟則死當數看其上下脣上脣有瘡蟲食其臟也下脣有瘡蟲食其肛也殺人甚急多因下利而得

治䘌桃仁湯黃連犀角湯雄黃銳散主之

少陰證口燥咽乾者急下之病人默默欲眠目不能閉起居不安其聲嗄或咽乾者當作狐惑治之

百合

百合傷寒者百脈一宗悉致其病無復經絡也其狀欲食復不能食常默默欲得臥復不能臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不恢飯時如强健人而臥不能行如有寒如無寒如有熱復無熱口苦小便赤百合之病諸藥不治藥入即吐利如有神靈此多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也百合知母湯滑石黛赭湯雞子湯百合地黃湯百合洗方苦蔞牡蠣散滑石散主之

金劉完素六書

傷寒論

夫風寒者百病之始也是四時八節不正疫癘之氣故云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽乃四時之正氣冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳春應煖而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣是以辛苦之人一歲之中病無少長始自一日巨陽膀胱受之巨陽者三陽之首故先受之二日陽明胃受之三日少陽膽受之未入於臟可汗之四日太

陰脾受之五日少陰腎受之六日厥陰肝受之其入臟可泄之經云其未滿三日汗之而已其滿三日泄之而已故聖人論汗下大概言之以脈分別三四日脈沉伏亦當下六七日脈浮滑亦可汗故傷寒傳足經不傳手經未詳耳且人身十二經絡分布上下手足各有三陰三陽稟天地之氣天樞之上同天之陽天樞之下同地之陰至眞要大論云身半以上其氣三矣天之分也天氣主之身半以下其氣三矣地之分也地氣主之常陰之分冷病歸之常陽之分熱病歸之有八節邪氣所中於人陽邪爲病傳手經陰邪爲病傳足經其邪自風池而入脊骨兩旁一寸五分是十二經之俞穴春夏應陽秋冬應陰至眞要大論云寒暑溫涼盛衰之用其在四維故陽之動始於溫盛於暑陰之動始於涼盛於寒春夏秋冬各差其分易云水流濕火就燥熱論云熱病者皆傷寒之類也人之傷於寒則爲病熱太陰陽明論云陽受風氣陰受濕氣同氣相求耳又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之陽氣炎上故受風陰氣潤下故受

濕蓋同氣相合耳故風熱火爲陽寒濕燥爲陰刺熱論云五臟俱有熱病肝熱病左頰先赤心熱病顏先赤脾熱病鼻先赤肺熱病右頰先赤腎熱病頤先赤甲乙熱論云有手足太陰熱病有手足少陰熱病有手足厥陰熱病熱論其三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通則死矣未嘗云只傳足經不傳手經也

解利傷寒論

傷寒之治先言表裏更有緩急三陽表當急裏當緩三陰表當緩裏當急又曰脈浮當汗脈沉當下脈浮汗急而下緩謂三陽表也脈沉下急而汗緩謂三陰裏也麻黃湯謂之急麻黃附子細莘湯謂之緩內經云有漬形以爲汗爲汗之緩裏之表也又曰在皮者汗而發之爲汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是臟腑之輸應也假令麻黃附子細莘湯是少陰證始得發熱脈沉裏和無汗故漬形以爲汗假令麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脈浮無汗裏和也在皮者汗而發之經曰治主以緩治客以急是也

心要論

夫傷寒者前三日在表法當汗可用雙解散連進數服必愈若不解者病已傳變後三日在裏法當下殊不知下之太早則表邪乘虛入裏遂成結胷虛痞懊憹斑疹發黃之證輕者必危危者必死但當以平和之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗而未愈或無汗而愈當用二小柴胡涼膈天水三藥合而服之病若半在表半在裏法亦當和解三小柴胡涼膈主之若裏熱微者則當微下四大柴胡合解毒湯主之熱勢未退以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏之熱七八日裏證已甚表熱漸微脈雖浮數則以三一承氣合解毒下之其病胷膈滿悶喘嘔陽脈緊甚者可用瓜蔕散涌之汗吐下後別無異證者涼膈散調之病熱已去微熱者益元散服之無令再病此傷寒治法之大要也或傷風自汗脈浮緩者雙解去麻黃以汗之其病半表半裏白虎湯和解之病在裏脈沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿讝語煩躁畜熱內盛但是

脈沉者並用承氣合解毒下之或中暑自汗解以白虎湯白虎解後以五苓合天水調之多進數服無妨或腹脹滿脈沉者亦當承氣合解毒微下之或發汗之後熱不解脈尚浮者白虎加蒼朮再解之或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此證以致身冷脈微昏憒將死切不得以寒藥下之誤下即死又一輩庸醫妄言是陰厥便欲易換用元武四逆溫熱之劑投之下咽立死殊不知此證乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥厥極深謂之竭畜熱怫鬱將欲絕者當此之證寒劑熱劑俱不可投但進涼膈解毒以養陰退陽宣散畜熱脈氣漸生得大汗而愈有無汗氣和而愈者未愈却用解毒合承氣下之次以解毒凉膈天水合而爲一調和陰陽洗滌臟腑則其他別證自不生矣有大下之後熱不退再三下之熱愈甚若下之不愈脈微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脈息斷絕必不可救似此之證是下之亦死不下亦死醫者到此活人殺人一彈指間其不至手足失措者幾希矣經云三下而

熱不退者卽死後人有四五次下以十數行而生者此乃誤中耳活者未一二死者千百後學者切不可以爲法但當依前用解毒合凉膈調之使陽熱徐退陰脈漸生庶不失人命若傷飲不解散成結胷之證臨時擇用大小陷胷湯丸累下之脈浮者不可下是表證未出小柴胡合小陷胷湯投之脈雖浮而熱太極者承氣徐徐疎利之或有留飲過度濕熱內生自利不止其熱未退解毒湯治之陽毒生斑凉膈加當歸佛鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外相搏遂成發黃茵陳湯調五苓散甚者茵陳合承氣下之煩心不得臥梔子湯誤下太早遂成結胷虛痞凉膈加枳殼桔梗剛柔二痓讝語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛者承氣合解毒下之汗下之後煩渴飲水則凉膈減桂五苓甘露益元選而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥婦人亦然惟孕婦三四月并七八月不用硝餘月用之無妨小兒減劑服之

心要餘論

傷寒失下始病時又誤服麻黃熱劑太甚必致熱極或有陽厥極深身冷脈微陽極似陰之證庸醫以爲陰證是也須當急救其陰以白虎涼膈日進三服脈氣漸生身體漸溫然後以大承氣下之夫大承氣救急之妙劑如咽膈吐逆不利當令熱服開其鬱結利而即愈也如傷寒汗下之後自汗虛熱不止於白虎湯加人參蒼朮一服如神汗止身涼此法至妙不容詳盡如赤白痢先服黃連阿膠丸次服解毒湯傷寒瘡瘍破傷風與傷寒治法一同但以雙解涼膈白虎承氣臨時斟酌用之雙解涼膈白虎瀉心此皆傷寒之妙劑孕婦臨月可服益元涼膈產後仍服如血不盡則以涼膈與四物合煎調理經血甚者大承氣合四物乃瀉中有補也涼膈同四物名玉燭散婦人產後之妙劑涼膈四物合大承氣湯名三和湯大承氣合四物治婦人一切血積血聚等疾加紅花尤妙初生小兒五七日有熱證不得已只以益元散時時灌之如小兒夜啼用涼膈調之肚饑臨睡服

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗半在表半在裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦佳表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之或天水凉膈散甚良表裏熱勢俱盛者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水一凉膈半和解之裏熱多表熱少未可下之者凉膈一天水半調之勢更甚者小承氣湯下之表證解但有裏證者大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之發汗不解下後前後別無異證者通宜凉膈散調之以退其熱兩感倣此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之

傷寒表證

傷寒之證頭項痛腰脊强身體拘急發熱惡寒不煩躁無汗或頭面目痛肌熱鼻乾或胷滿而喘手足指末微厥脈浮數而緊者邪熱在表皆宜麻黃湯或天水散之類甚佳無使藥不中病而益加害也

傷風表證

夫傷風之證頭痛項強肢節煩疼或目疼肌熱乾嘔鼻塞手足溫自汗出惡風寒其脈陽浮而緩陰浮而弱此爲邪熱在表皆宜桂枝湯或汗出惽風而加項背強痛者宜桂枝湯加葛根湯傷風及無汗者雖已服桂枝反煩不解而無裏證者先刺風池風府却與桂枝葛根湯服之不若通用雙解散五十一免致有桂枝麻黃之悞傷風自汗白虎湯二十二金匱方太陽病無汗而渴者不可與白虎湯

風寒俱中

頭項痛肢體疼手足溫爲中風也反無汗惡寒脈浮緊者爲陰寒也或頭項痛腰脊強身體拘急指末微厥不自汗爲傷寒也反煩躁而脈緩者爲傷風也風則傷衛而寒則傷榮

裏證

凡裏證脈實而不浮不惡寒不惡風身不疼自汗譫語不大便或咽乾腹滿者可下之不可汗也以上之證宜小承氣湯大承氣湯調胃承氣湯選而用之又

一法不問風寒暑濕或表裏兩證俱不見但無表證而有可下者通用三一承氣湯下之此藥雖峻攻使無表熱入裏而無結胷及痞之衆疾也或熱結極深而諸藥數下畢竟不能通利以致將死者宜大承氣湯加甘遂一錢匕下之病在裏脈沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫妄煩躁畜熱內盛但是脈沉者皆宜三一承氣湯合解毒湯下之解毒調胃湯承氣湯能瀉大熱

表裏證

表裏俱見之證或半在表或半在裏之證者謂前表裏二證病在相兼有欲汗之而有裏病欲下之而表病未解汗之不可吐之又不可法當和解傷風白虎湯傷寒中風或兩感小柴胡湯一法不問風寒暑濕用凉膈散天水散二藥合一服用煎解之或表熱多裏熱少天水一凉膈半或裏熱多表熱少凉膈一天水半表熱極裏有微熱身疼頭痛或眩或嘔不可汗吐下者天水凉膈散合和解之解之又不能退其熱

者用黃連解毒湯表裏之熱俱微者五苓散表裏之熱俱盛者大柴胡湯微下之更甚者大柴胡合大承氣湯下之雙除表裏之熱服雙解散之後若不解病已傳變後三日在裏法當下之殊不知下之太早則表熱乘虛而入裏遂成結胷虛痞懊憹發黃之證輕者必危危者必死但宜和平之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗而愈或無汗氣和而愈用小柴胡凉膈天水合和主之病在半表半裏用小柴胡凉膈散合和而解之或小柴胡合解毒湯如服熱勢未退者大柴胡合三一承氣湯表裏俱微半表半裏若裏微者宜大柴胡合黃連解毒湯合服諸小柴胡湯證後病不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿而痛或無表裏證但發熱七八日雖脈浮而數脈在肌肉實數而滑者並宜大柴胡湯病至七八日裏熱已甚表邪漸微脈雖浮數用三一承氣湯合解毒下之下證未全不可下者用白虎湯或知母石膏湯脈洪躁

裏有微熱不可汗者用黃連解毒湯

汗後不解

凡是表證法當汗之依法汗之其病又不解汗後不解其證前後別無異證者通宜凉膈散調之以退其熱無使熱甚危極也除此之外遠勝小柴胡湯兩感至此而已汗後餘熱用益元散或小柴胡湯宣武人參石膏湯傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尚浮者蒼朮白虎湯解之傷寒用桂枝湯發汗後半日許復熱煩脈浮者再宜桂枝湯汗後不解下證未全者白虎湯汗後煩躁不得眠微熱而渴五苓散汗後不解中外有熱口乾煩渴柴胡飲子解表之後尚未愈者解毒凉膈天水散能調順陰陽洗滌臟腑

下後不解

凡是裏證法當下之依法下之其病又不解或大下後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能實擬更下之恐下脫而立死不下之則熱極而死寒凉諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脈

弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澀大便溏泄頻併少腹急痛者必欲作痢也通宜黃連解毒湯以解之傷寒下之太過胃中無熱飲水無力白朮散又有大下之後其熱不退再三下之熱愈甚若下之不止其人脈微氣虛血弱不加以法無可生之理至此下之亦死不下亦死但用涼膈合解毒湯調之陽熱退除陰脈漸生爲之妙法下之前後無問日數餘熱不解小柴胡湯汗下後胃虛大橘皮湯汗下後胷膈滿悶赤茯苓湯

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十二卷目錄

醫部彙考三百四十二

傷寒門八

成無己傷寒明理論（發熱　惡寒　惡風　寒熱　潮熱　自汗　盜汗）

頭汗　手足汗　無汗　頭痛　項強　頭眩

胷脅滿　心下滿　腹滿　少腹滿　煩熱

虛煩　煩躁　懊憹　舌上胎　衄血

噦　欬　喘　嘔吐　悸　渴　振　戰慄

四逆　厥　鄭聲　譫語

藝術典第三百六十二卷

醫部彙考三百四十二

傷寒門八

金成無己傷寒明理論

發熱

傷寒發熱何以明之發熱者謂怫怫然發於皮膚之間熇熇然散而成熱者是與潮熱寒熱若同而異與煩躁相類而非煩躁者在內者也潮熱之熱有時而熱不失其時寒熱之熱寒已而熱相繼而發至於發

熱則無時而發也有謂翕翕發熱者有謂蒸蒸發熱者此則輕重不同表裏之區別爾所謂翕翕發熱者謂若合羽所覆明其熱在外也故與桂枝湯發汗以散之所謂蒸蒸發熱者謂若熏蒸之蒸明其熱在內也故與調胃承氣湯攻下以滌之其發熱屬表者即風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致也其發熱屬裏者即陽氣下陷陰中所致也觀其熱所從來而汗下之證明其辨焉若熱先自皮膚而發者知邪氣之在外也若熱先自裏生而發達於表者知邪氣之在裏也舉斯二者爲邪氣在表在裏而發熱也惟其在表在裏俱有發熱故邪在半表半裏者亦有發熱之證何者以表證未罷邪氣傳裏裏未作實是爲半表半裏其發熱者或始自皮膚而漸傳裏熱或始自內熱而外連於表蓋邪氣在表發熱者則表熱裏不熱也邪氣在裏發熱者則裏熱甚而達於表也其在半表半裏發熱者則表裏俱發熱而但熱又輕於純在表者也經雖云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也然少陰病始得之亦有反發熱者蓋亦屬其表也

特與麻黃細莘附子湯發汗者是已發熱爲傷寒之常也一或陰陽俱虛與下利新汗後又皆惡其發熱也經云脉陰陽俱虛熱不止者死下利發熱亦死內經云汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食此名陰陽交交者死也斯亦發熱也豈可與尋常發熱一概而論耶

惡寒

傷寒惡寒何以明之惡寒者風寒客於榮衛之中也惟其風寒客於榮衛則灑淅然惡寒也惟其榮衛之受風寒則嗇嗇然不欲舒也其惡寒者非寒熱之寒也又非惡風也且惡風者見風至則惡矣得以居密室之內幃帳之中則坦然自舒也至於惡寒者則不待風而寒雖身大熱而不欲去衣者是也寒熱之熱謂寒熱更作熱至則寒無矣其惡寒雖發熱而不欲去衣也甚則至於向火被覆而猶不能遏其寒也所以然者由陰氣上入陽中或陽微或風虛相搏之所致也惡寒一切屬表雖裏證悉具而微惡寒者亦是表未解也猶當先解其外俟不惡寒爲外解乃可攻

裏也經曰發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也謂如傷寒或已發熱或未發熱必惡寒者謂繼之以發熱此則發於陽也若惡寒而踡脈沉細而緊者此則發於陰也在陽者可發汗在陰者可溫裏惡寒雖悉屬表而在表者亦有虛實之別若汗出而惡寒者則爲表虛無汗而惡寒者則爲表實表虛可解肌表實可發汗又有止稱背惡寒者背者胷中之腑諸陽受氣於胷中而轉行於背內經曰人身之陰陽者背爲陽腹爲陰陽氣不足陰寒氣盛則背爲之惡寒若風寒在表而惡寒者則一身盡寒矣但背惡寒者陰寒氣盛可知也經所謂少陰病一二日口中和而背惡寒者當灸之處以附子湯者是矣又或乘陰氣不足陽氣內陷入陰中表陽新虛有背微惡寒者經所謂傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之者是也二者一爲陰寒氣盛一爲陽氣內陷又何以明之也且　　能消耗津液故於少陰病則曰口中　　則熱燥爍津液爲乾故於太陽病則口燥舌乾而渴也二

者均是背惡寒要辨陰陽寒熱不同者亦於口中潤燥可知

惡風

傷寒惡風何以明之黃帝鍼經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也風邪中於衛也則必惡風何則以風則傷衛寒則傷榮爲風邪所中於分肉不溫而熱矣皮毛不充而緩矣腠理失其肥則疎而不密開闔失其司則泄而不固是以惡風也是惡風惡寒二者均爲表證其惡風則比之惡寒而輕惡

寒者嗇嗇然憎寒也雖不當風而自然寒矣惡風者謂常居密室之中幃帳之內則舒緩而無所畏也一或用扇一或當風淅淅然而惡者爲惡風也惡寒則有屬於陽者有屬於陰者其惡風則悉屬於陽非若惡寒之有陰陽也三陰之證並無惡風者以此也惡風雖悉在表而發散又自不同若無汗而惡風者則爲傷寒當發其汗若汗出而惡風者則爲中風當解其肌裏證雖具而惡風未罷者皆當先解其外也又有發汗多亡陽與其風濕皆有惡風之證蓋以發汗

多漏不止則亡陽外不固是以惡風也必以桂枝加附子湯溫其經而固其衛風濕相搏骨節疼煩濕勝自汗而皮膚不密是以惡風也必以甘草附子湯散其濕而實其衛由是觀之惡風屬乎衛者可知矣

寒熱

傷寒寒熱何以明之寒熱者謂往來寒熱也經曰邪正分爭往來寒熱者言邪氣之入也而正氣不爲之爭則但熱而無寒也乃有熱而寒者謂其正氣與邪氣分爭於是寒熱作矣爭則氣鬱不發於外而寒熱爭焉爭甚則憤然而熱故寒已而熱作焉茲乃寒熱之理也或謂寒熱者陰陽爭勝也陽勝則熱陰勝則寒此陰陽之爭也何則蓋以寒爲陰而熱爲陽裏爲陰而表爲陽邪之客於表者爲寒邪與陽相爭則爲寒矣邪之入於裏者爲熱邪與陰相爭則爲熱矣其邪半在表半在裏外與陽爭而爲寒內與陰爭而爲熱矣表裏之不拘內外之不定或出或入由是而寒熱且往且來也是以往來寒熱屬半表半裏之證邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪氣半在表半在

裏則寒熱亦半矣審其寒熱多少見其邪氣淺深矣小柴胡湯專主往來寒熱而又立諸加減法亦爲邪氣在半表半裏未有定處往來不常又寒熱如瘧與夫發熱惡寒皆似而非也然寒熱如瘧者作止有時者也及往來寒熱則作止無時或往或來日有至於三五發者甚者十數發與瘧狀有以異也至於發熱惡寒者爲發熱時惡寒並不見惡寒時熱不見也此則熱已而寒寒已而熱者雖然應往來寒熱屬半表半裏當和解之又有病至十餘日而結熱在裏復往來寒熱者亦可與大柴胡湯下之不可不知也

潮熱

傷寒潮熱何以明之若潮水之來不失其時一日一發按時而發也若日三五發者即是發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃爲潮熱陽明者胃屬土應時則王於四季應日則王於未申經曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳蓋邪氣入胃謂之入腑腑之爲言聚也若府庫之府焉邪氣入於胃而不復傳邪氣鬱而爲實熱隨王而發於日晡者屬陽明

也惟其屬陽明故爲可下之證經曰潮熱者實也又曰潮熱者此外欲解也可攻其裏又曰其熱不潮未可與承氣湯卽此觀之其屬於胃者昭然可見雖然潮熱爲裏實可下之證其或脉浮而緊與其潮熱而利或小便難大便溏者皆熱未全入腑猶帶表邪當和解其外外解已而小便利大便鞕者乃可攻之或謂有屬太陽少陽者乎少陽王於寅卯太陽王於巳午若熱於此時發者爲邪未入胃豈得謂之潮熱必待日晡所發者乃謂之潮熱見其邪在胃也遇疾值病詳而驗之始見得眞也

自汗

傷寒自汗何以明之自汗者謂不因發散而自然汗出者是也內經曰陽氣衞外而爲固也衞爲陽言衞護皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄汗者干之而出邪干衞氣氣不能衞固於外則皮膚爲之緩腠理爲之疎由是而津液妄泄濈濈然潤漐漐然出謂之自汗也如發熱自汗出而不愈此衞氣不和風邪干於衞也太陽中暍汗出惡寒身熱而渴者暑邪干於

衞也多汗出而濡此其風濕甚者濕邪干於衞者也是知衞氣固護津液不令妄泄必爲邪氣干之而出也風寒暑濕之毒爲四時之氣中人則爲傷寒風與暑濕爲邪皆令自汗惟寒邪傷人獨不汗出寒傷榮而不傷衞衞無邪氣所干則皮膚得以密津液得以固是以汗不出也及其寒漸入裏傳而爲熱則亦使自汗出也蓋熱則榮衞通腠理開而汗泄矣然自汗之證又有表裏之別與虛實之異焉若汗出惡風及微惡寒者皆表未解也必待發散而後愈至於漏不止而惡風及發汗後惡寒者又皆表之虛也必待溫經而後愈諸如此皆邪氣在表也若汗出不惡寒者此爲表解而裏未和也經曰陽明發熱汗出此爲越熱又曰陽明病發熱汗多者急下之又非若邪氣在表而汗出之可緩也傷寒自汗之證爲常也設或汗出髮潤與其出之如油或大如貫珠著身出而不流皆爲不治之證也必手足俱周遍身悉潤漐漐然一時間許煩熱已而身涼和乃爲佳矣此則陰陽氣和水升火降榮衞通流邪氣出而解者也內經曰陽之

汗以天地之雨名之此之謂也

盜汗

傷寒盜汗何以明之盜汗者謂睡而出汗者也自汗則不拘睡與不睡自然而出也夫盜汗者不睡則不能出方其睡也湊湊然出焉覺則止而不復出矣雜病盜汗者責其陽虛也傷寒盜汗者非若雜病之虛是由邪氣在半表半裏使然也何者若邪氣一切在表干於衞則自然汗出也此則邪氣侵行於裏外連於表邪及睡則衞氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄故但睡而汗出覺則氣散於表而汗止矣經曰微盜汗出反惡寒者表未解也又陽明病當作裏實而脈浮者云必盜汗是猶有表邪故也又三陽合病目合自汗是知盜汗爲邪氣在半表半裏之間明矣且自汗有爲之虛者有爲之實者其於盜汗之證非若自汗有實者悉當和表而已不可不知也

頭汗

傷寒頭汗何以明之頭者諸陽之會也邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭也邪熱內畜蒸發腠理遍身汗

出者謂之熱越若身無汗則熱不得越熱蒸於陽故但頭汗出也何者以三陰之經皆上至頸胸中而還不循於頭獨諸陽脉上循於頭爾經曰但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃爲熱不得越而上達者也又熱入血室與其虛煩或陽明被火及水結胸皆但頭汗出也俱是熱鬱於內而不得越者也此數者或吐或下皆欲除其熱也或謂頭汗之證悉屬陽明而爲裏熱也而有不屬陽明屬表者乎且邪但在表者則無頭汗之證必也寒濕相搏與邪氣半在表半在裏者乃有頭汗也傷寒五六日已發汗而復下之胸脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩及傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞕脉細者皆邪氣半在表半在裏令頭汗出也濕家但頭汗出欲得被覆向火者寒濕相搏令頭汗出也茲數者皆邪所干令頭額自然汗出又不謂之逆其小便不利則惡見頭汗出濕家下後亦惡見頭汗出也茲二者乃爲頭汗之逆者何則以小便不利而成

關格若頭汗出陽脫也經云關格不得尿頭無汗者生有汗者死濕家下後若額上汗出而微喘者亦陽脫也經云濕家下之額上汗出小便不利者死下利不止者亦死脉經曰陽氣上出汗見於頭者蓋陽脫也則知可治而治知其不可治而不治皆得十全之上者在於明辨而審的也

手足汗

傷寒手足汗出何以明之四肢者諸陽之本而胃主四肢手足汗出者陽明之證也陽經邪熱傳併陽明則手足爲之汗出陽明爲津液之主病則自汗出其有身汗出者有但頭汗出者有手足汗出者悉屬陽明也何以使之然也若一身自汗出者謂之熱越是熱外達者也但頭汗出者是熱不得越而熱氣上達者也及手足汗出者爲熱聚於胃是津液之旁達也經曰手足濈然汗出者此大便必鞕也手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈由此觀之手足汗出爲熱聚於胃可知矣或謂熱聚於胃而手足爲之汗出其寒聚於胃而有手足汗出者乎經曰陽明中寒

者不能食小便不利手足濈然汗出此欲作痼瘕即是中寒者也且熱聚於胃爲可下之證其寒聚於胃爲不可下又何以明之要明於此二者必曰大便初鞕後溏以胃中冷水穀不別故也是以不可下者也若大便難讝語者爲陽明證具則是可下之證臨病之際宜須兩審

無汗

傷寒無汗何以明之腠理者津液湊泄之所爲腠文理縫會之中爲理津液爲風暑濕氣所干外湊皮腠者則爲自汗出若寒邪中經腠理緻密津液內滲則無汗無汗之由又有數種如傷寒在表及邪行於裏或水飲內畜與亡陽久虛皆令無汗其傷寒無汗則腠理緻密也風中於衛則腠理開而自汗寒中於榮則無汗謂腠理閉也經所謂太陽病惡風無汗而喘及脉浮緊無汗發熱及不汗出而煩躁陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥苦頭痛鼻乾不得汗脉浮無汗而喘與其剛痓無汗是數者皆寒邪在表而無汗者也其邪氣行於裏無汗者爲邪氣在

表熏發腠理則汗出邪氣內傳不外熏發者則無汗經所謂陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃及傷寒發熱無汗渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之與夫三陰爲病不得有汗是數者皆邪行於裏而無汗者也其水飲內畜而無汗者爲水飲散而爲津液津液布滲而爲汗既水飲內畜而不行則津液不足而無汗經所謂服桂枝湯或下之仍頭項强痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之是津液內滲而無汗者也其陽虛無汗者諸陽爲津液之主陽虛則津液虛少故無汗經所謂脉浮而遲遲爲無陽不能作汗其身必癢陽明病反無汗其身如蟲行皮中之狀此亦久虛故也皆陽虛而無汗者也如是者理之常也又焉得爲異哉一或當汗而不汗服湯一劑病證仍在至於服三劑而不汗死病也又熱病脉躁盛而不得汗者黃帝謂陽脉之極也死茲二者以無汗爲眞病証可與其餘無汗者同日而語也

頭痛

傷寒頭痛何以明之頭痛謂邪氣外在經絡上攻於頭所致也難經曰三陽經受風寒伏留而不去則名厥頭痛言三陽之經上於頭爾然傷寒頭痛者太陽專主也何者以太陽之經起於目內眥上額交巔上入絡腦經所謂太陽受病者頭項痛腰脊強又曰七日病衰頭痛少愈雖然陽明少陽亦有頭痛不若太陽之專主也蓋太陽爲病屬表而頭痛專爲主表證雖有風寒之不同必待發散而後已太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風寒無汗而喘者傷寒也麻黃湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風者中風也桂枝湯主之雖有傷寒六七日不大便頭痛有熱者而與調胃承氣湯下之者又云若小便清者知熱不在裏仍在表也當與桂枝湯以頭痛未去雖不大便六七日其小便清者猶爲在表是知頭痛屬乎表者明矣頭痛一切屬三陽經也而陰病亦有頭痛乎太陰少陰二經之脉皆上至頸胷中而還不上循頭則多頭痛之證惟厥陰之脉循喉嚨之後上入頏顙連目眥上出額與督脉會於巔亦有頭痛經曰乾嘔吐

涎沫者吳茱萸湯主之者是矣夫頭者精明之府也神明居之小小邪氣作爲頭痛者必曰發散而可也其或痛甚入連於腦而手足寒者又爲眞頭痛豈能發散而已哉嗚呼頭痛爲外疾猶有不可治者又矧臟腑之疾乎

項強

傷寒項強何以明之太陽脉起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中經曰太陽之病項背強痛而惡寒以太陽感受風寒則經脉不利而項爲之急頸爲之強爾傷寒頸項強急者太陽表證也必發散而解之可也太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之是皆發散之劑也二者均是項背強而發散又有輕重者蓋發熱汗出惡風者爲表虛表虛者可解肌無汗惡風者爲表實表實者可發汗是以爲治不同也桂枝加葛根湯方是桂枝加麻黃葛根又葛根湯方亦是桂枝湯中加麻黃葛根深詳究之無汗惡風爲表實正可發汗則

於桂枝湯中加葛根麻黃爲當矣汗出惡風爲表虛表虛者可解肌恐是桂枝湯中但加葛根而不加麻黃也几几引頸貌又短羽鳥也短羽之鳥不能飛騰動則先伸引其頭爾項背強者動亦如之非若几按之几而偃屈也太陽傷寒項背強其或太陽中風加之寒濕而成痓者亦項強也經曰病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搖卒口噤背反張者痓病也金匱要略曰太陽病其證項背強几几然脈反沉遲者此爲痓桂枝加苦蔞湯主之雖項背强屬太陽病表證悉當發散又有結胷病者項亦强如柔痓狀下之則和宜大陷胷圓主之臨病之際審其表裏可汗可下隨證投湯則萬全矣

頭眩

傷寒頭眩何以明之眊非毛而見其毛眩非元而見其元眊爲眼花眩爲眼黑眩也運也冒也三者形俱相近有謂之眩運者有謂之眩冒者運爲運轉之運世謂之頭旋者是矣冒爲蒙冒之冒世謂之昏迷者是矣少陽之爲病口苦咽乾目眩以少陽居表裏之

間表邪所傳漸行於裏表中陽虛故時時目眩也二陽併病頭項强痛或眩運眩冒者以少陽與太陽併病故眩者責其虛也傷寒有起則頭眩與眩冒者皆發汗吐下後所致是知其陽虛也故鍼經有曰上虛則眩下虛則厥眩雖爲虛而風家亦有眩者蓋風主運動故爾傷寒陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛爲陽明中風是風亦主頭眩也諸如此者皆非逆也及其諸逆發汗劇者言亂目眩者死命將難全嗚呼病勢已成可得半愈及病勢已深雖神醫其能已之耶

胷脅滿

傷寒胷脅滿何以明之胷脅滿者謂胷膈間氣塞滿悶也非心下滿者也脅滿者謂脅肋下氣脹塡滿也非腹滿者也邪氣自表傳裏必先自胷膈已次經心脅而入胃邪氣入胃爲入腑也是以胷滿多帶表證脅滿者當半表半裏證也經曰下後脉促胷滿者桂枝去芍藥湯主之又曰太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下宜麻黃湯是胷滿屬表而須發汗者也蓋

胷中至表猶近也及脅者則更不言發汗但和解而已經曰設胷滿脅痛者與小柴胡湯又曰胷滿不去者小柴胡湯主之本太陽病不解傳入少陽者脅下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱脉沉緊者與小柴胡湯主之是知脅滿屬半表半裏明矣大抵胷脅滿以邪氣初入裏未停留爲濕氣鬱積而不行致生滿也和解斯可矣若邪氣留於胷中聚而爲實者非湧吐則不可已故華佗曰四日在胷吐之則愈是邪氣已收斂而不散漫者則可吐之內經曰其高者因而越之病在胷膈之上爲高越之爲吐也經曰病在胷中當吐之發汗若下之而煩熱胷中窒者則以梔子豉湯吐之若胷中痞鞕氣上衝咽喉不得息者此爲胷中有寒也則以瓜蔕散吐之二者均是吐劑梔子豉湯吐胷中虛煩客熱也瓜蔕散吐胷中痰實宿寒也若能審明藥劑之輕重辨別邪氣之深淺對證投湯不爲效者未之有也

心下滿

傷寒心下滿何以明之心下滿者謂正當心下高起

滿鞕者是矣不經下後而滿者則有吐下之殊若下後心下滿者又有結胷痞氣之別經曰病人手足厥冷脉乍緊邪結在胷中心中滿而煩饑不能食者病在胷中當須吐之又曰脉浮而大心下反鞕有熱屬臟者攻之不令發汗屬腑者不令溲數茲二者爲不經汗下而心下滿者或吐之或下之看其邪氣之高下高者則因而越之下者則因而竭之要在泄其邪也至於陽明病雖心下鞕滿又未可攻經曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈是邪氣自表傳裏至於心下留結爲實者則不可下乃吐之可也若未全爲實者則不可下故有此戒也又邪氣在表未應下而强下之邪氣乘虛結於心下實者鞕滿而痛爲結胷虛者滿而不痛爲虛痞經曰嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却復發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胷但滿而不痛者此爲虛痞蓋實邪留結則爲鞕爲痛虛邪留滯則但滿而不鞕痛也結胷熱實脉沉而

緊心下痛按之石鞕者大陷胷湯主之明其邪熱可知矣脉浮而緊而反下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳明其邪氣可知矣病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之因作痞表邪未罷醫反下之胃中空虛客氣動膈陽氣內陷心中因鞕則爲結胷須陷胷湯圓攻之可也傷寒中風醫反下之心下痞鞕而滿醫見心下痞爲病不盡而復下之其痞益甚此非結熱但以胃中空虛客氣上逆故使鞕也須諸瀉心湯散可也二者俱是心下滿鞕一爲虛一爲實凡投湯者大須詳審結胷雖爲實邪衆皆共知當用陷胷湯圓下之或脉浮大者則不可下下之則死卽是猶帶表邪未全結實下之重虛其裏邪深結則死設或結胷形證悉具而加煩躁者又爲不治之疾藥之所以能勝邪者必待胃氣施布藥力始能溫汗吐下之以逐其邪氣邪氣勝胃氣絕者湯藥縱下胃氣不能施布雖神丹其能爲效耶

腹滿

傷寒腹滿何以明之腹滿者俗謂之肚脹是也華佗

曰傷寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胷五日在腹六日入胃入胃謂入腑也是在腹也猶未全入裏也雖腹滿爲裏證故亦有淺深之別經曰表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除是其未全入腑若大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能爲禍謂之邪氣已入腑也傷寒邪入腹是裏證已深故腹滿乃可下之者多矣如經曰其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯發汗不解腹滿痛者急下之本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之少陰病腹脹不大便者急下之諸如此者皆爲裏證是也雖曰腹中滿痛者此爲實也當下去之然腹滿不減者則爲實也若腹滿時減者又爲虛也則不可下經曰腹滿不減減不足言當下之金匱要略曰腹滿時減復如故此虛寒從下上也當以溫藥和之蓋虛氣留滯亦爲之脹但比之實者不至堅痛也大抵腹滿屬太陰證也陽熱爲邪者則腹滿而咽乾陰寒爲邪者則腹滿而吐食不下自

利益甚時腹自痛太陰者脾土也治中央故專主腹滿之候又發汗吐下之後因而成腹滿者皆邪氣乘虛內客爲之而所主又各不同經曰發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之傷寒吐後腹脹滿者調胃承氣湯主之傷寒下後心煩腹脹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之三者有當溫者有當下者有當吐者何邪氣不一也且發汗後腹滿當溫之邪氣在表因發散則邪去胃爲津液之主發汗亡陽則胃氣虛而不能敷布諸氣壅滯而爲脹滿是當溫散可也吐後腹滿可下之邪氣在胷者則可吐之吐之邪去則安若吐後邪氣不去加之腹脹滿者是胷中之邪下傳入胃擁而爲實故生脹滿當須下之可也下後腹滿可吐者邪氣在表未傳入腑而妄下之邪自表乘虛而入鬱於胷中而爲虛煩氣上下不得通利者腹爲之滿故當吐之可也凡爲醫者要識邪氣所起所在審其所起知邪氣之由來觀其所在知邪氣之虛實發汗吐下之不差溫補鍼灸之適當則十全之功自可得也

少腹滿

傷寒少腹滿者何以明之少腹滿者臍下滿是也少腹者下焦所治難經曰下焦者當膀胱上口主分別清濁其治在臍下邪氣自上而下至於下焦結而不利故少腹滿也胷中滿心下滿皆氣爾卽無物也及腹滿者又有燥屎爲之者至於少腹滿者非止氣也必有物聚於此而爲之滿爾所以然者身半以上同天之陽清陽歸之身半已下同地之陰濁陰歸之清者在上而濁者在下內經謂清陽出上竅濁陰出下竅當出不出積而爲滿是在上而滿者氣也在下而滿者物也所謂物者溺與血爾邪氣聚於下焦則津液不得通血氣不得行或溺或血留滯於下是生脹滿而鞕痛也若從心下至少腹皆鞕滿而痛者是邪實也須大陷胷湯下之若但少腹鞕滿而痛小便利者則是畜血之證小便不利者便是溺濇之證經曰少腹滿應小便不利今反利者爲有血也又曰少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也其小便利而少腹滿者爲太陽隨經瘀血在

裏太陽自入腑者也經曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外未解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之桃仁承氣湯主之是少腹鞕滿爲物聚於下可知矣滲之利之參酌隨宜可爲上工

煩熱

傷寒煩熱何以明之煩者熱也與發熱若同而異也發熱者怫怫然發於肌表有時而已者是也煩者爲煩而熱無時而歇者是也二者均是表熱而煩熱爲熱所煩非若發熱而時發時止也故謂之煩熱經曰病人煩熱汗出則解又曰發汗已解半日許復煩脈浮數者再與桂枝湯又曰服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈卽此觀之煩爲表熱明矣故又有煩疼卽是熱疼又有煩渴卽是熱渴也以煩爲熱又何疑焉至於胷中煩心中煩內煩虛煩皆以煩爲熱設傷寒至六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁擾者與脈和大煩目重瞼內際黃者又皆爲欲解所以言大煩者以肌表大熱

則是邪熱欲去泄達於外也故爲欲解內經曰謹熟陰陽以意調之

虛煩

傷寒虛煩何以明之虛煩者心中鬱鬱而煩也有胷中煩有心中煩有虛煩諸如此者皆熱也若止云煩者表熱也及其邪熱傳裏故有胷中煩心中煩虛煩之別三者要在觀其熱所從來審其虛實而治爲不同也如不經發汗吐下而煩者則是傳經之熱不作膈實者但多和解而已故經曰心煩喜嘔或胷中煩而不嘔者小柴胡湯主之少陰病二三日心中煩不得臥者黃連阿膠湯主之少陰病胷滿心煩者猪膚湯主之是皆和解而徹熱者也若因吐下發汗後而煩者則是內陷之煩但多湧吐而已發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹者梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯主之圓藥大下後身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之是皆取吐而湧其熱者也虛煩之狀心中溫溫然

欲吐憒憒然無奈欲嘔不嘔擾擾亂亂是名煩也非吐則不能已經曰下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜梔子豉湯脉乍結心中滿而煩饑不能食者病在胷中瓜蔕散二者證均是煩也藥均是吐也而有輕重之不同吐下發汗後邪氣乘虛而入爲煩者則謂之虛煩與梔子豉湯則是吐劑之輕者不因吐下發汗後邪氣結於胷中則爲膈實與瓜蔕散則是吐劑之重者又陽明病不吐不下心煩者則是煩之實者也與調胃承氣湯下之傷寒二三日心中悸而煩者則是煩之虛者也與小建中湯補之煩爲熱也悸而煩復爲主者以悸爲虛悸甚而煩故爲虛也少陽之邪入腑者煩而悸則爲熱也大抵先煩而悸者是爲熱也先悸而煩者是爲虛也內經曰治病必先求其本誠哉是言也

煩躁

傷寒煩躁何以明之煩爲擾擾而煩躁爲憤躁之躁合而言之煩躁爲熱也析而分之煩也躁也有陰陽之別焉煩陽也躁陰也煩爲熱之輕者躁爲熱之重

者更有煩疼煩悶煩渴虛煩皆以煩爲熱也有不煩而躁者爲佛佛然便作躁悶此爲陰盛隔陽也雖大躁欲於泥水中臥但飲水不得入口者是矣所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而迤邐復煩者也煩躁之由又爲不同有邪氣在表而煩躁者有邪氣在裏而煩躁者有因火劫而煩躁者有陽虛而煩躁者有陰盛而煩躁者皆不同也經曰當汗不汗其人煩躁太陽中風脈浮而緊不汗出而煩躁大青龍湯主之是邪氣在表而煩躁者也病人不

大便五六日繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎也是邪氣在裏而煩躁者也太陽病以火熏之不得汗其人必躁太陽病二日反躁火熨其背令大汗出大熱入胃煩躁者火劫令煩躁者也陽微發汗躁不得眠與之下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之及發汗若下之病仍不去煩躁者茯苓四逆湯主之陽虛煩躁者也少陰病吐利手足冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之陰盛而煩躁者也諸如此者證之常也

非逆也設或結胷證悉具煩躁者死發熱下利厥逆躁不得臥者死少陰病吐利躁煩四逆者死少陰病四逆惡寒而身踡脉不至不煩而躁者死少陰病五六日自利復煩躁不得臥寐者死是數者又皆爲不治之證嗚呼煩躁爲常有之疾復有諸不治之證臨病者之側又當熟審焉

懊憹

傷寒懊憹何以明之懊者懊惱之懊憹者鬱悶之貌卽心中懊懊惱惱煩煩憹憹鬱鬱然不舒暢憒憒然無奈比之煩悶而甚者懊憹也由下後表中陽邪乘虛內陷鬱而不發結伏於胷心之間故如是也經曰表未解醫先下之胃中空虛客氣動膈心中懊憹又曰下之益煩心中懊憹如饑卽是陽氣內陷爲諸懊憹也其治之法或吐之或下之若發汗吐下後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊憹與陽明病下之其外有熱手足溫而不結胷心中懊憹饑不能食但頭汗出二者爲邪熱鬱於胷中當須梔子豉湯吐之以湧其結熱也陽明病下之心中懊憹而煩胃中有

燥屎者與陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃二者爲邪熱結於胃中當須大承氣茵陳湯攻之以滌其內熱也識諸此者吐下之不差湯劑之適當則無不愈者一或當汗反吐療熱以溫則變證百出斑出黃生者多矣

舌上胎

傷寒舌上胎何以明之舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或燥或濇或黃或黑是數者熱氣淺深之謂也邪氣在表者舌上即無胎及邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎也寒邪初傳未全成熱或在半表或在半裏或邪氣客於胷中者皆舌上胎白而滑也經曰舌上如胎者以丹田有熱胷上有寒邪初傳入裏者也陽明病脅下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯是邪氣在半表半裏者也陽明病若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之是邪客於胷中者也藏結宜若可下舌上胎滑者則云不可攻也是邪未全成熱猶帶表寒故也及其邪

傳爲熱則舌之胎不滑而澀也經曰傷寒七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之是熱耗津液而滑者已乾也若熱聚於胃則舌爲之黃是熱已深也金匱要略曰舌黃未下者下之黃自去若舌上色黑者又爲熱之極也黃帝鍼經曰熱病口乾舌黑者死以心爲君主之官開竅於舌黑爲腎水見於心部心者火腎者水邪熱已極鬼賊相刑故知必死觀其口舌亦可見其逆順矣

衄血

傷寒衄者何以明之鼻中血出者是也雜病衄者責熱在裏傷寒衄者責熱在表何以言之病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅於鼻血得熱則散隨氣上從鼻中出則爲衄是雜病者責在裏熱也經曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者宜麻黃湯傷寒不大便六七日頭痛有熱者與小承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯以此觀之是傷寒衄者責其表熱也千金翼曰吐血有三

種一曰肺衄二曰傷胃三曰內衄既吐血家謂之內衄則其鼻中出血者可謂之外衄是經絡之血妄行也經絡熱盛陽氣擁重迫血妄行出於鼻則爲衄經曰其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也又曰陽盛則欲衄陰虛則小便難言衄爲經中陽盛也凡傷寒脉浮鼻中燥口燥但欲漱水不欲嚥者是欲衄也經曰陽明病口乾鼻燥能食者則衄又有不應發汗而強發汗因致衄者經曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治是也衄家雖爲邪熱在經而又不可發汗經曰衄家不可發汗發汗則額上陷脉急緊直視不能眴不得眠前云桂枝湯麻黃湯治衄者非治衄也卽是發散經中邪氣耳若邪氣不得發散擁盛於經逼迫於血則因致衄也卽非桂枝麻黃湯專治衄也太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈是經中之邪隨而散則解矣故知衄者不待桂枝麻黃湯發散之也衄者若但頭汗出身無汗及汗出不至足者死黃帝又皆以爲不治之疾臨

病之際審而治之則不失矣

噦

傷寒噦者何以明之噦者俗謂之欬逆者是也若餉則但胷喉間氣塞滯不得下通然而無聲也噦則吃吃然有聲者是也二者相近皆胃之疾但輕重有差爾虛寒相搏反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即餉言胃氣虛竭也傷寒大吐大下之後極虛復發汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也又胃中虛冷不能食者飲水則噦即是觀之皆胃疾可知矣經曰趺陽脉浮則爲餉脉滑則爲噦此爲醫咎責虛取實之過也大抵妄下之後胃虛氣逆而成噦濕家若下之太早或其人本虛悞攻其熱或陽明病不能食悞攻其熱諸如此者皆下之後胃虛而噦者也然餉爲水寒相搏必曰小青龍湯去麻黃加附子而可至於噦者則又熱氣擁鬱氣不得通而成者也輕者有和解之證重者有攻下之候經曰有潮熱時時噦與小柴胡湯者即是和解之證也噦而腹滿視其前後知何

部不利利之則愈卽可攻下之候也傷寒有此則病已極矣非若渴煩等輕緩之候如太陽中風以火劫發汗陰陽俱虛竭身體枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讝語甚者至噦是言其極也又不尿腹滿加噦者不治是爲眞病其若是者雖有神醫之術當斯脫絕之候又何以措其手足哉

欬

傷寒欬者何以明之欬者謦欬之欬俗謂之嗽者是也肺主氣形寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中淫淫如癢習習如梗是令欬也甚者續而不已連連不止坐臥不安語言不竟動引百骸聲聞四近矣欬之由來有肺寒而欬者有停飲而欬者有邪氣在半表半裏而欬者雖同曰欬而治各不同也內經曰肺之令人欬何也皮毛者肺之合也皮毛先受寒氣寒氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則爲欬嗽者是肺寒而欬也傷寒表不解心下有

水氣乾嘔發熱而欬小青龍湯主之少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬者眞武湯加五味子細辛乾薑主之二者是停飲而欬者也雖皆爲水飲所作而小青龍湯所主爲水飲與表寒相合而欬者眞武湯所主爲水飲與裏寒相合而欬者又不可不知也傷寒中風往來寒熱胷脅苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或欬者小柴胡湯去人參大棗生薑加乾薑五味子主之少陰病四逆其人或欬者四逆散加乾薑五味子主之二者是邪氣自表傳裏而欬者雖皆爲邪氣傳裏而小柴胡湯所主爲陽邪傳裏動肺而欬者四逆散所主爲陰邪傳裏動肺而欬者又不可不識也表寒也裏寒也協水飲則必動肺以形寒寒飲則傷肺故也陽邪也陰邪也自表傳裏則必動肺以臟眞高於肺故也欬爲肺疾治之必發散而可矣而又有不可發汗者經曰欬而小便利者不可發汗發汗則四肢厥逆冷又曰欬而發汗踡而苦滿腹中復堅茲雖逆也又脉散者爲心火刑於肺金鬼賊相刑必死

喘

傷寒喘者何以明之肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而氣急喝喝而息數張口擡肩搖身滾肚是爲喘也傷寒喘者有邪氣在表氣不利而喘者有水寒之氣射肺而喘者各不同也喘家作桂枝加厚朴杏仁湯太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者小青龍湯去麻黃加杏仁主之是欲發散水寒也經曰喘而汗出者與葛根黃芩黃連湯以利之汗出而喘者與麻黃杏仁甘草石膏湯以發之二者如何而然也且邪氣內攻氣逆不利而喘者因喘而汗出見其邪氣在裏也雖表未解未可和之若邪氣外盛壅遏使氣不利而喘者雖汗而喘不已見其邪氣在表也雖經汗下亦可發之此亦古人之奧義傷寒止於邪氣在表而喘者心腹必濡而不堅設或腹滿而喘則又爲可下之證經曰短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也爲因脹滿而喘矣又或邪氣內盛正

氣欲脫氣壅上逆亦主喘也經曰直視讝語喘滿者死又汗出髮潤喘不休者此爲肺絕身汗如油喘而不休此爲命絕皆爲不治之喘也省疾問病更宜消息

嘔吐

傷寒嘔吐何以明之嘔者有聲者也俗謂之噦吐者吐出其物也故有乾嘔而無乾吐是以於嘔則曰食穀欲嘔及吐則曰飲食入口卽吐則嘔吐之有輕重可知矣傷寒嘔有責於熱者有責於寒者至於吐家則悉言虛冷經曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛又曰胃中虛冷故吐也嘔家則不然嘔有熱者有寒者有停飲者有胃脘有膿者皆當明辨之嘔而發熱者柴胡湯證具與其嘔不止心下鬱鬱微煩大柴胡湯主之者是邪熱爲嘔者也膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之與其乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之是寒邪爲嘔者也先嘔後渴者此爲欲解先渴後嘔者爲水停心下此屬飲家是停飲嘔者嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是胃脘有

臟而嘔也諸如此者雖有殊别大抵傷寒表邪欲傳裏裏氣上逆則爲嘔也是以半表半裏證多云嘔也傷寒三日三陽爲盡三陰不受邪是知邪氣傳裏者必致嘔也至於乾薑附子湯證云不嘔不渴爲裏無熱十棗湯證云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也卽此觀之其嘔爲裏熱明矣嘔家之爲病氣逆者必散之痰飲者必下之千金曰嘔家多服生薑此是嘔家聖藥是要散其逆氣也金匱要略曰嘔家用半夏以去其水水去嘔則止是要下其痰飲也嘔多雖有陽明證不可攻者謂其氣逆而未收斂爲實也其嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者已爲難治蓋謂其虛寒之甚也醫者必審其邪氣之虛實疾證之逆順爲施治則當矣

悸

傷寒悸者何以明之悸者心忪是也築築惕惕然動怔怔忪忪不能自安者是矣心悸之由不越二種一者氣虛也二者停飲也傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之少陰病四逆其人或悸者四逆散加

桂五分是氣虛而悸者也飲水多必心下悸是停飲而悸者也其氣虛者由陽氣內弱心下空虛正氣內動而爲悸也其停飲者由水停心下心爲火而惡水水旣內停心不自安則爲悸也又有汗下之後正氣內虛邪氣交擊而令悸者與氣虛而悸者則又甚焉太陽病發汗過多其人叉手自冒心心下悸太陽病若下之身重心下悸者不可發汗少陽病不可吐下吐下則悸而驚少陽病不可發汗發汗則讝語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸是數者皆汗後協邪者與其氣虛而悸者有以異也或鎮固或化散之皆須定其浮氣也又飲水過多水飲不爲宣布留於心下甚者則悸金匱要略曰食少飲多水停心下甚者則悸飲之爲悸甚於他邪雖有餘邪必先治悸何者以水停心下若水氣散則無所不之浸於肺則爲喘爲欬傳於胃則爲噦爲噎溢於皮膚則爲腫漬於腸間則爲利下不可緩之也經曰厥而心下悸宜先治水與茯苓甘草湯後治其厥不爾水漬於胃必作利也厥爲邪之深者猶先治水況其邪氣淺者乎

渴

傷寒渴者何以明之渴者裏有熱也傷寒之邪自表傳至裏則必有名證隨其邪淺深而見焉雖曰一日在皮二日在膚三日在肌四日在胷五日在腹六日入胃其傳經者又有證形焉太陽主氣而先受邪當一二日發頭項痛而腰脊強者是矣太陽傳陽明則二三日發身熱目疼鼻乾不得臥也陽明傳少陽則三四日發胷脅痛而耳聾此三陽皆受病爲邪在表而猶未作熱故不言渴至四五日少陽傳太陰經邪氣漸入裏寒邪漸成熱當是時也津液耗少故腹滿而嗌乾至五六日太陰傳少陰是裏熱又漸深也當此之時則津液爲熱所搏漸耗而乾故口燥舌乾而渴及至六七日則少陰之邪傳於厥陰厥陰之爲病消渴爲裏熱已極矣所謂消渴者飲水多而小便少者是矣謂其熱能消水也所以傷寒病至六七日而渴欲飲水爲欲愈之病以其傳經盡故也是以厥陰病云渴欲飲水少少與之愈者是也邪氣初傳入裏熱氣散漫未收熏蒸焦膈搏耗津液遂成渴也病人

雖渴欲得飲水又不可多與之若飲水過多熱少不能消故復爲停飲諸疾經曰凡得時氣病至五六日而渴欲飲水飲不能多勿多與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也若大渴欲飲水猶當依證與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升又曰渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散至於大渴欲飲水數升者白虎加人參湯主之皆欲潤其燥而生津液也凡得病反能飲水此爲欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自差小渴者乃強與飲之因成大禍不可復救然則悸動也支結也喘欬噎噦乾嘔腫滿下利小便不利數者皆是飲水過傷而診病之工當須識此勿令誤也

振

傷寒振者何以明之振者森然若寒聳然振動者是也傷寒振者皆責其虛寒也至於欲汗之時其人必虛必蒸蒸而振却發熱汗出而解振近戰也而輕者爲振矣戰爲正與邪爭爭則爲鼓慄而戰振但虛而不至爭故至聳動而振也下後復發汗振寒者謂其

表裏俱虛也亡血家發汗則寒慄而振者謂其血氣俱虛也諸如此者止於振聳爾其振振欲擗地者有身爲振振搖者二者皆發汗過多亡陽經虛不能自主持故身爲振振搖也又非若振慄之比經曰若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之太陽病發汗不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之二湯者皆溫經益陽滋血助氣之劑經虛陽弱得之未有不獲全濟之功者

戰慄

傷寒戰慄何以明之二者形相類而實非一合而言之非二也析而分之有內外之別焉戰者身爲之搖者是也慄者心戰是也二者有內外之診也昧者通而爲一而不知有逆順之殊焉經曰胃無穀氣脾濇不通口急不能言戰而慄者卽此觀之二者豈不異哉戰之與振振輕而戰重也戰之與慄戰外而慄內也戰慄者皆陰陽之爭傷寒欲解將汗之時正氣內實邪不能與之爭則便汗出而不發戰也邪氣欲出

其人本虛邪與正爭微者爲振甚者則戰戰退正勝而解矣經曰病有戰而汗出因得解者何也其人本虛是以發戰者是也邪氣外與正氣爭則爲戰乃其愈者也邪氣內與正氣爭則爲慄是爲甚者也經曰陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也方其裏氣不守而爲邪中於正氣正氣怯弱故成慄也戰者正氣勝慄者邪氣勝也傷寒六七日欲解之時當戰而汗出其有但心慄而鼓頷身不戰者已而遂成寒逆似此證多不得解何者以陰氣內盛正氣大虛不能勝邪反爲邪所勝也非大熱劑與其灼灸又焉得而禦之

四逆

傷寒四逆何以明之四逆者四肢逆而不溫者是也積涼成寒積溫成熱非一朝一夕之故其所由來者漸矣傷寒始者邪在皮膚當太陽陽明受邪之時則一身手足盡熱當少陰太陰受邪之時則手足自溫是表邪漸緩而欲傳裏也經曰傷寒四五日手足溫而渴者小柴胡湯主之是太陽之邪傳之少陰也傷

寒脈浮手足自溫者是爲繫在太陰是少陽邪傳於太陰也是知邪氣在半表半裏則手足不熱而自溫也至於邪傳少陰爲裏證已深雖未至厥而手足又加之不溫是四逆也若至厥陰則手足厥冷矣經曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆是寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之證也又有四逆諸湯亦治四逆手足寒方用乾薑附子熱藥者厥有旨哉若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之若始得之手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯溫之當須識此勿令誤也四逆與厥相近而非也經曰諸四逆厥者不可下是四逆與厥有異也吐利煩躁見四逆者死是惡見其四逆也診視之間熟詳究之

厥

傷寒厥者何以明之厥者冷也甚於四逆也經曰厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也謂

陽氣內陷熱氣逆伏而手足爲之冷也經曰傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微是知內陷者手足爲厥矣少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭亦是言發動其熱先熱而後厥者熱伏於內也先厥而後熱者陰退而陽氣得復也若始得之便厥者則是陽氣不足而陰氣勝也大抵厥逆爲陰所主寒者多矣而又有進退之別經曰病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈發熱四日厥反三日復厥四日厥少熱多其病自愈厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也病至厥陰傳經盡也當是之時陽氣勝陰厥少熱多其病則愈若或陰氣反勝陽不得復厥多熱少其病則逆厥爲陰氣至也熱爲陽氣復也至於下利則曰先厥後發熱而利必自止見厥復利厥者復爲熱爲陽氣得復而利必自止熱者便爲厥厥是陰氣還勝也故復下利矣諸陽受氣於胷中邪氣客於胷中鬱鬱留結則陽氣不得敷布而

手足爲之厥經曰手足厥冷脈乍緊邪結在胷中心中滿而煩饑不能食病在胷中當吐之者是矣厥爲陰之盛也若更加之惡寒而踡者陰氣之極也則難可治經曰少陰病惡寒身踡而利手足厥冷者不治是厥冷之逆者神丹其能生乎

鄭聲

傷寒鄭聲爲邪音也孔子曰惡鄭聲之亂雅樂也又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆是謂鄭聲爲不正之音也傷寒鄭聲者則其聲如鄭衛之音轉不正也經曰虛則鄭聲今汗後或病久人聲轉者是也以此爲虛從可知矣又鄭聲者重語也正爲聲轉也若聲重而轉其本音者亦是矣昧者殊不知此妄以重爲重疊之語與讝語混而莫辨遂止以身熱脈數煩渴便難而多言者爲讝語以身涼脈小自利不渴而多言者爲鄭聲如此則有失仲景之本意兼鄭聲淫則語以正之則鄭聲不爲重疊正爲不正也况仲景之書三百九十餘證曲盡傷寒形候未有脫落而不言者若是鄭聲爲多言則於三陰門中亦須條見所以

鄭聲別無證治者是不與讝語爲類也雖曰虛矣止爲正氣虛而不全故使轉聲而不正也明者鑒此幸詳究之

讝語

傷寒讝語何以明之讝者謂呢喃而語者也又作讝謂妄有所見而言也此皆眞氣昏亂神識不清之所致夫心藏神而主火病則熱氣歸焉傷寒胃中熱盛上乘於心心爲熱冒則神昏亂而語言多出識昏不知所以然遂言無次而成讝妄之語輕者睡中呢喃重者不睡亦語言差繆有讝語者有獨語者有狂語者有語言不休者有言亂者此數者見其熱之輕重也讝語與獨語雖間有妄錯之語若與人言有次是熱未至於極者也經曰獨語如見鬼狀若劇者發則不識人是病獨語未爲劇也狂語者熱甚者也由神昏而無所見覺甚則至於喊叫而言語者也言語不休又其甚也至於亂語者謂妄言罵詈善惡不避親踈爲神明已亂也經曰諸逆發汗微者難差劇者言亂是難可復制也讝語之由又自不同皆當明辨之

有被火刦而致者有汗出而致者有下利而致者有下血而致者有燥屎在胃而致者有三陽合病而致者有過經而致者有亡陽而致者經曰火熱入胃中水竭躁煩必發讝語又腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讝語是因被火刦而致也汗出讝語此爲風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也是汗出而致者也下利讝語者有燥屎也小承氣湯主之是下利而致者也下血讝語者此爲熱入血室當刺期門隨其實而瀉之是下血而致者也讝語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也是燥屎在胃而致者也腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿是三陽合病而致者也過經讝語者熱也當以湯下之是過經而致者也發汗多亡陽讝語者不可下與柴胡湯桂枝湯和其榮衛是以有通津液後自愈是亡陽而致者也諸如此者脈短則死脈自和則愈又身微熱脈浮大者生逆冷脈細沉不過一日死實則讝語氣收斂在內而實者本病也或氣上逆而喘滿或氣下奪而自利者皆爲逆

也經曰直視譫語喘滿者死下利者亦死謂其正氣脫絕也能知虛實之診能識從逆之要治病療病則不失矣

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八四八

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十三卷目錄

醫部彙考三百四十三

傷寒門九

成無己傷寒明理論 短氣 搖頭 瘛瘲 不仁 直視 鬱冒 動氣 自利 筋惕肉瞤 熱入血室 發黃 發狂 霍亂 畜血 勞復

張從政儒門事親 解利傷寒

李杲十書 辨陰陽 辨脈 辨內外 辨寒熱 辨手心手背 辨口鼻 辨氣 辨頭痛 辨筋骨四肢 辨飲食 辨渴 傷寒之源 冬傷於寒春必溫病 論兩感 論

表裏中三證　論傳經　太陽證　太陽頭痛
治不可越經　太陽禁忌　當汗　不當汗
當汗不汗　發汗過多　不當汗而汗　血
證　知可解　證知解不解　脈知解不解
九味羌活湯解利法　當汗而下成協熱利
裏傳表　誤下變有輕重　五苓散爲下藥
藥有標本陰陽　加減凉膈散　陽明證　陽
明禁忌　論汗下　論諸白虎湯　煩躁　讝
妄　傷寒雜證發熱相似　狂言讝語鄭聲
陽證發斑　傷寒有九經　三陽從中治　論
下　少陽證　少陽禁忌　論半表半裏　熱
有虛實　潮熱　太陰證　可汗　可溫　可
下　知可解　太陰禁忌　少陰證　下利
少陰禁忌　六經發熱治法

藝術典第三百六十三卷

醫部彙考三百四十三

傷寒門九

金成無己傷寒明理論

短氣

傷寒短氣何以明之短氣者氣短而不能相續者是矣似喘而非喘者有氣上衝而實非氣上衝也喘者張口擡肩搖身滾肚謂之喘也氣上衝者腹裏氣時時上衝也所謂短氣者呼吸雖數而不能相續似喘

而不搖肩似呻吟而無痛者短氣也經所謂短氣者衆實爲難辨之證愚醫莫識之爲治有誤者多矣要識其短氣之眞者氣急而短促謂之氣短者是也短氣有責爲虛者有責爲實者要當明辨之經曰趺陽脉微而緊緊則爲寒微則爲虛微緊相摶則爲短氣此爲短氣之虛者也短氣腹滿而喘有潮熱此外欲解可攻裏也此爲短氣之實者也又有屬表又有屬裏者要當審視之經曰短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈與其風濕相摶汗出短氣小便不利惡風不欲去衣甘草附子湯主之者是邪在表而短氣者也乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之與其太陽病醫反下之短氣煩躁心懊憹陽氣內陷心下因鞕則爲結胷大陷胷湯主之是邪氣在裏而短氣者也虛也實也在表也在裏也皆作短氣又何以辨虛實也大凡心腹脹滿而短氣者邪在裏而爲實也腹濡滿而短氣者邪在表而爲虛也大抵短氣爲實金匱要略曰短氣不足以息者實也又水停心下亦令短氣金匱要略曰食少飲多水停

心下微者短氣即此觀之短氣之由亦衆矣必審其形候使的而不惑必審其邪氣在表裏之不差隨證攻之了無不愈者矣

搖頭

傷寒搖頭何以明之頭者諸陽之會也諸陽之脉皆上於頭諸陰脉皆至頸胷中而還陽脉不治則頭爲之搖傷寒搖頭有三皆所主不同也有曰搖頭言者裏痛也以裏有痛者言語則劇欲言則頭爲之戰搖也有曰獨搖頭卒口噤背反張者痓病也以風盛於上風主動搖故也裏痛非邪也痛使之然痓病非逆也風使之然至於陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者又謂之心絕蓋心藏神而爲陰之本陽根於陰陰根於陽陰陽相根則榮衞上下相隨矣絕則神去而陰竭陽無根者則不能自主持故頭爲之搖矣王冰曰滋苗者宜固其根伐下者必枯其上內絕其根外作搖頭又何疑焉心絕者眞病也風痓裏痛者邪氣也觀其頭搖又當明其臧否焉

瘛瘲

傷寒瘛瘲何以明之瘛者筋脉急也瘲者筋脉緩也急者則引而縮緩者則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘛瘲俗謂若搐者是也黃帝內經曰病筋脉相引而急名曰瘛瘲瘛謂之契合之契也行則緩臥則緊從則縱瘲疾之縱者謂若放縱之縱也以急爲瘛以緩爲瘲理至明矣瘛瘲者風疾也而癲癇則瘛瘲焉傷寒瘛瘲者邪熱氣極也熱盛則風搏併經絡風主動故四肢瘛瘲而不寧也故風溫被火者曰發微黃色劇者如驚癇時瘛瘲言其熱氣之劇盛也傷寒病至於發瘛瘲者疾勢已過矣多難可制內經曰太陽終者戴眼反折瘛瘲絕汗乃出大如貫珠著身不流是見其瘛瘲爲已過之疾也又有四肢漐習爲四肢動而不止似瘛瘲而無力不得伸縮者也此爲肝絕瘛瘲之證雖難已若能以祛風滌熱之劑折其大勢則瘛瘲亦有生者若妄灼火或飲以發表之藥則死不旋踵經曰一逆尚引日再逆促命期

不仁

傷寒不仁何以明之仁柔也不仁謂不柔和也癢不

知也痛不知也寒不知也熱不知也任其屈伸灸刺不知所以然者是謂不仁也由邪氣擁盛正氣爲邪氣閉伏鬱而不發榮衛血氣虛少不能通行致斯然也內經曰榮氣虛則不仁鍼經曰衛氣不行則爲不仁經曰榮衛不能相將三焦無所仰身體痹不仁卽是言之知榮衛血氣虛少不能通行爲不仁者明矣經曰諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁言此厥者是正氣爲寒氣所乘爲厥氣也非四肢逆冷之厥也何者蓋以鬱冒爲昏冒不仁爲不知痛癢得不爲尸厥之厥耶經曰少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促逼上入胷膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥其乘寒之厥鬱冒不仁卽此尸厥可知矣昔越人入虢診太子爲尸厥以鬱冒不仁爲可治刺之而得痊濟者實神醫之診也嗚呼設或脈浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁此又爲命絕雖越人其能起之歟

直視

傷寒直視何以明之直視者視物而目睛不轉動者

是也若目睛轉動者非直視也水之精爲志火之精爲神目者心之使也神所寓焉肝之外候也精神榮焉鍼經曰五臟六腑之氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑睛血之精爲絡氣之精爲白睛肌肉之精爲約束裏擷筋骨血氣之精與脉幷爲系上屬於腦五臟血氣調和精氣充榮則目和而明矣傷寒目直視者邪氣壅盛冒其正氣使神智不慧藏精之氣不上榮於目則目爲之直視傷寒至於直視爲邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗汗出則額上陷脉急緊直視不能眴不得眠以肝受血而能視亡血家肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽俱虛所致也此雖錯逆其未甚也逮乎狂言反目直視又爲腎絕直視搖頭又爲心絕皆臟氣脫絕也直視譫語喘滿者死下利者亦死又劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死皆邪氣盛而正氣脫也其或有目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者是非直視也此爲內實也可用大承氣湯大柴胡湯

下之直視爲不治之疾目中不了了爲可治之候二者形證相近其爲工者宜熟視之

鬱冒

傷寒鬱冒何以明之鬱爲鬱結而氣不舒也冒爲昏冒而神不淸也世謂之昏迷者是也鬱冒之來皆虛極而乘寒則有之矣經曰諸乘寒者則爲厥鬱冒不仁又曰太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也是知因虛乘寒乃生鬱冒金匱要略曰新產婦人有三病一者病痓二者病鬱冒三者大便難亡血復汗寒多故令鬱冒又曰產婦鬱冒其脉微弱嘔不能食大便堅所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出即此觀之鬱冒爲虛寒可知矣又或少陰病下利止而頭眩時時自冒者又爲死證蓋謂其虛極而脫也觀其鬱冒幸無忽焉

動氣

傷寒動氣何以明之動氣者爲築築然動於腹中者是矣臟氣不治隨臟所主發泄於臍之四旁動跳築

築然謂之動氣難經曰肝內證臍左有動氣按之牢若痛心內證臍上有動氣按之牢若痛肺內證臍下有動氣按之牢若痛是臟氣不治腹中氣候發動也動氣應臟是皆眞氣虛雖有表裏攻發之證卽不可汗下經曰動氣在左不可發汗汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤是發汗而動肝氣者也動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踡是下之而動肝氣者也動氣在上不可發汗汗則氣上衝正在心端是發汗而動心氣者也動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌是下之而動心氣者也動氣在右不可發汗汗則衄而渴心苦煩飲卽吐水是發汗而動肺氣者也動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸是下之而動肺氣者也動氣在下不可發汗汗之則無汗心中大煩骨節苦痛目運惡寒食則反吐穀不得下是發汗而動腎氣者也動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞是下之而動腎氣者也且臍內證當臍有動氣經特曰

臍之四旁動氣不可汗下獨不言脾候當臍有動氣者以脾者中州爲胃以行津液發汗吐下猶先動脾況脾家發動氣者詎可動之也所以特不言之也傷寒所以看外證爲當者蓋不在脉之可見必待問之可得者發汗吐下務要審諦舉此動氣類可知矣

自利

傷寒自利何以明之自利者有不經攻下自然溏泄者謂之自利也傷寒自利多種須知冷熱虛實消息投湯無致失差雜病自利多責爲寒傷寒下利多由協熱其與雜病有以異也表邪傳裏裏虛協熱則利不應下而便攻之內虛協熱遂利是皆協熱也又合病家皆作自利太陽與陽明合病必自下利葛根湯主之太陽與少陽合病必自下利黃芩湯主之陽明與少陽合病必自下利大承氣湯主之三者皆合病下利一者發表一者攻裏一者和解所以不同者蓋六經以太陽陽明爲表少陽太陰爲在半表半裏少陰厥陰爲在裏太陽陽明合病爲在表者也雖曰下利必發散經中邪氣而後已故以葛根湯以汗之太

陽與少陽合病爲在半表半裏者也雖曰下利必和解表裏之邪而後已故與黃芩湯以散之陽明少陰合病爲少陽邪氣入腑者也雖曰下利必逐去胃中之實而後已故與承氣湯以下之是三者所以有異也下利家何以明其寒熱耶且自利不渴屬太陰以其臟寒故也下利欲飲水者以有熱也故大便溏小便自可者此爲有熱自利小便色白者少陰病形悉具此爲有寒惡寒脉微自利清穀此爲有寒發熱後重泄色黃赤此爲有熱皆可理其寒熱也凡腹中痛轉氣下趣少腹者此欲自利也自利家身凉脉小爲順身熱脉大爲逆少陰病脉緊下利脉暴微手足反溫脉緊反去者此爲欲解下利脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自止雖發熱不死是知下利脉大爲逆而脉小爲順也自利宜若可溫理中白通諸四逆輩皆溫臟止利之劑又有腸胃有積結與下焦客邪皆溫劑不能止之必也或攻泄之或分利之而後已經曰理中者理中焦此利在下焦宜赤石脂禹餘糧湯復利不止當利其小便是泄在下焦滲泄而聚利者

也少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥與下利三部皆平按之心下鞕或脉沉而滑或不欲食而讝語或差後至年月日復發此數者皆腸有積結而須攻泄者也內經註曰大熱內結注泄不止熱宜寒療結伏須除以寒下之結散利止大寒凝內久利泄溏愈而復發綿歷歲年以熱下之寒去利止謂之通因通用下利雖有表證又不可發汗以下利爲邪氣內攻走津液而胃虛也故經曰下利不可攻其表汗出必脹滿者是矣大抵下利脫氣至急五奪之中此爲甚者其或邪盛正虛邪擁正氣下脫多下利而死何以言之經曰下利日十餘行脉反實者死發熱下利至甚厥不止者死直視讝語下利者死下利手足厥冷無脉者灸之不溫脉不還者死少陰病自利復煩躁不得臥寐者死此數者皆邪擁正氣下脫而死者也金匱要略曰六腑氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利下不禁嗚呼疾成而後藥雖神醫不可爲已氣既脫矣孰能治之

筋惕肉瞤

傷寒筋惕肉瞤何以明之然在傷寒中非常常有者必待發汗過多亡陽則有之矣內經曰陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液枯少陽氣大虛筋失所養故惕然而跳瞤然而動也太陽病脈微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也太陽病發汗汗出不解其人仍發熱頭眩身瞤動振振欲擗地者眞武湯主之動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤即是觀之其由發汗多亡陽陽虛可見矣茲雖逆也止於發汗亡陽而表虛治以溫經益陽則可矣或因吐下發汗表裏俱虛而有此狀者又非但發汗後所可同也經曰傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞕脅下痛氣上衝咽喉眩冒筋脈動惕者久而成痿此爲逆之甚者也太陽病發汗復下之後表裏俱虛復加燒鍼因胷煩面色青黃膚瞤者難治茲爲逆之甚者也發汗吐下庸可忽諸

熱入血室

傷寒熱入血室何以明之室者屋室也謂可以停止

之處人身之血室者榮血停止之所經脈留會之處卽衝脈是也衝脈者奇經八脈之一脈也起於腎下出於氣衝並足陽明經俠臍上行至胷中而散爲十二經脈之海王冰曰衝爲血海言諸經之血朝會於此男子則運行生精女子則上爲乳汁下爲月水內經曰任脈通衝脈盛月事以時下者是也王冰曰陰靜海滿而去血謂衝脈盛爲海滿也卽是觀之衝是血室可知矣傷寒之邪婦人則隨經而入男子由陽明而傳以衝之脈與少陰之絡起於腎女子感邪太陽隨經便得而入衝之經並足陽明男子陽明內熱方得而入也衝之得熱血必妄行在男子則下血譫語在婦人則月水適來陽明病下血譫語此爲熱入血室者斯蓋言男子不止謂婦人而言也婦人傷寒經水適來與經水適斷者皆以經氣所虛宮室不闢邪得乘虛而入鍼經有言曰邪氣不得其虛不能獨傷人者是矣婦人熱入血室有須治而愈者有不須治而愈者又各不同也婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼和胷脅下滿如結

胷狀譫語者此爲熱入血室當刺期門隨其實而瀉之與其婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之二者是須治而愈者也婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈是不須治而愈者也譫語爲病邪之甚者何不須治而愈耶且胷脅滿如結胷譫語是邪氣留結於胷脅而不去者必刺期門隨其實而瀉之寒熱如瘧發作有時者是血結而不行也須小柴胡湯散之二者既有留邪必須治之可也若發熱經水適來晝日明了暮則譫語此則經水既來以裏無留邪但不妄犯熱隨血散必自愈經曰血自下下者愈故無犯胃氣及上二焦必自愈所謂妄犯者謂恐以譫語爲陽明內實攻之犯其胃氣也此無胷脅之邪恐刺期門犯其中焦也此無血結恐與小柴胡湯犯其上焦也小柴胡湯解散則動衛氣衛出上焦動衛氣是犯上焦也刺期門則動榮氣榮出中焦動榮氣是犯中焦也脉經有曰

無犯胃氣及上二焦豈謂藥不謂鍼耶此其是歟

發黃

傷寒發黃何以明之經曰濕熱相交民當病癉癉者黃也單陽而無陰者也傷寒至於發黃爲病之甚也濕也熱也甚者則發黃內熱已盛復被火者亦發黃也邪風被火熱兩陽相熏灼其身必發黃陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃是由內有熱而被火致發黃者也陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃是由陽明熱盛致發黃者也傷寒發汗已身目爲黃所以然者寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之是由寒濕致發黃者也濕亦令黃也熱亦令黃也其能辨之乎二者非止根本元來有異而色澤亦自不同濕家之黃也身黃如似熏黃雖黃而色暗不明也至於熱盛之黃也必身黃如橘子色甚者勃勃出染著衣正黃如蘗是其正黃色也由是觀之濕之與熱豈不異哉大抵黃家屬太陰太陰者脾之經也脾者土黃土色也脾經爲濕熱蒸之則色見於外必發身黃經曰傷寒脈浮緩手足自溫

者是爲繫在太陰太陰當發身黃者是矣熱雖內盛若已自汗出小便利者則不能發黃必也頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿此爲瘀熱在裏身必發黃黃家爲熱盛而治法亦自有殊傷寒八九日身如橘子色小便不利小腹滿者茵陳蒿湯主之此欲泄滌其熱也傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之此欲解散其熱也傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之此欲解散其熱也此數者泄滌解散乃爲之不同亦皆折火徹熱之劑也一或身黃脈沉結少腹鞕而小便自利其人如狂者又爲畜血在下焦使之黃也必須抵當湯下之而愈黃家旣爲病之已極是以有不治之者多矣非止寸口近掌無脈鼻氣出冷爲不治之疾又若形體如煙熏直視搖頭者是爲心絕環口黧黑柔汗發黃是爲脾絕皆不治之診醫者更詳視之

發狂

傷寒發狂何以明之狂者猖狂也謂其不寧也難經曰狂之始發也少臥不饑而自高賢也自辨智也自

貴倨也妄笑好歌樂也妄行走不休也狂家所起皆陽盛致然內經曰陰不勝其陽脈留薄疾并乃狂也又曰邪入於陽則狂邪入於陰則瘖難經曰重陽者狂重陰者癲脈經曰陰附陽則狂陽附陰則癲病源曰陽邪并於陽則狂陰邪併於陰則癲卽諸經之狂爲陽盛也明矣又陽明之病惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走踰垣上屋其所上之處皆非素能者是謂陽邪并於陽明也傷寒熱毒在胃并於心臟使神不寧而志不定遂發狂也傷寒至於發狂邪熱至極也非大吐下則不能已又有熱在下焦其人如狂者經曰熱入膀胱其人如狂謂之如狂則未至於狂但臥起不安爾其或狂言目反直視又爲腎之絕汗出輙復熱狂言不能食又爲失志死若此則殆非藥石之所及是爲眞病焉

霍亂

傷寒霍亂何以明之上吐而下利揮霍而撩亂是也邪在上焦者但吐而不利邪在下焦者但利而不吐

若邪在中焦胃氣不治爲邪所傷使陰陽乖隔遂上吐而下利若止嘔吐而利經止謂之吐利必也上吐下利躁擾煩亂乃謂之霍亂其與但稱吐利者有以異也傷寒吐利者邪氣所傷霍亂吐利者飲食所傷也其有兼傷寒之邪內外不和者加之頭痛發熱而吐利也經曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止復更發熱也是霍亂兼傷寒者也霍亂頭痛發熱熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中圓主之以其中焦失治陰陽乖隔必有偏之者偏陽則多熱偏陰則多寒許仁則曰病有乾霍亂有濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出泄雖霍亂甚則止於胃中水穀泄盡則止矣所以死者少及其乾霍亂而死多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出泄擁閉正氣關隔陰陽煩擾悶亂躁無所安喘脹乾霍亂而死嗚呼食飲有節起居有常者豈得致霍亂耶飲食自倍腸胃乃傷喪身之由實自致爾

畜血

傷寒畜血何以明之畜血者血在下焦結聚而不行畜積而不散者是也血菀於上而吐血者謂之薄厥畱於下而瘀者謂之畜血此由太陽隨經瘀熱在裏血爲熱所搏結而不行畜於下焦之所致經曰太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胷其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈抵當湯主之者是也大抵看傷寒必先觀兩目次看口舌然後自心下至少腹以手揣按之覺有滿鞕者則當審而治之如少腹覺有鞕滿便當問其小便若小便不利者則是津液畱結可利小便若小便自利者則是畜血之證可下瘀血經曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也又曰太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也皆須抵當圓下之愈陽明證其人喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑亦是畜血之證畜血於下所以如狂者經所謂熱結膀胱其人如狂者是也血瘀於下所以喜忘者內經曰血幷於下亂

而喜忘者是也二者若有其一則爲畜血證明矣畜血之證又有輕重焉如狂也喜忘也皆畜血之甚者須抵當湯圓以下之如外已解但小腹急結者則爲畜血之輕也須桃仁承氣湯以利之醫之妙者何也在乎識形證明脉息曉虛實知傳變其於形證之明者衆人所共識又何以見其妙必也形證之參差衆人所未識獨識之乃所以爲妙且如病人無表裏證發熱七八日雖浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者此有瘀血抵當湯主之當不大便六七日之際又無喜忘如狂之證亦無少腹鞕滿之候當是之時與承氣湯下者多矣獨能處以抵當湯下之者是爲醫之妙者也若是者何以知其有畜血也且脉浮而數浮則傷氣數則傷血熱客於氣則脉浮熱客於血則脉數因下之後浮數俱去則已若下之後數去其脉但浮者則榮血間熱去而衛氣間熱在矣爲邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀潮熱發渴也及下之後浮脉去而數不解者則衛氣間熱去而榮血間熱在矣熱氣合并迫血

下行胃虛協熱消穀善饑血至下焦若下不止則血得以去泄必便膿血也若不大便六七日則血不得出泄必畜在下焦爲瘀血是須抵當湯下之此實疾證之奇異醫法之元微能審諸此者眞妙醫也

勞復

傷寒勞復何以明之勞爲勞動之勞復爲再發也是傷寒差後因勞動再發者是也傷寒新差後血氣未平餘熱未盡勞動其熱熱還經絡遂復發也此有二種一者因勞動外傷二者因飲食內傷其勞動外傷者非止强力搖體持重遠行之勞至於梳頭洗面則動氣憂悲思慮則勞神皆能復也況其過用者乎其飲食內傷者爲多食則遺食肉則復者也內經曰熱病已愈而時有遺者何也以熱甚而强食之病已衰而熱有所藏因其穀氣留薄兩陽相合故有所遺經曰病已差尚微煩設不了了者以新虛不勝穀氣故令微煩損穀則愈夫傷寒邪氣之傳自表至裏有次第焉發汗吐下自輕至重有等差焉又其勞復則不然見其邪氣之復來也必迎奪之不待其傳也經曰

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有宿食加大黃且枳實梔子豉湯則吐之豈待虛煩懊憹之證加大黃則下之豈待腹滿譫語之候經曰傷寒差後更發熱者小柴胡湯主之脉浮以汗解之脉沉實者以下解之亦是便要折其邪也蓋傷寒之邪自外入也勞復之邪自內發也發汗吐下隨宜施用焉嗚呼勞復也食復也諸勞皆可及御內則死矣若男女相易則爲陰陽易其不易自病者謂之女勞復以其內損眞氣外動邪熱眞虛邪盛則不可治矣昔督郵顧子獻不以華敷之診爲信臨死致有舌出數寸之驗由此觀之豈不與後人爲鑒誠哉

元張從政儒門事親

解利傷寒

人冒風時氣濕病傷寒三日以裏頭痛身熱惡寒可用通聖散益元散各五七錢水一大椀入生薑十餘片連鬚葱白十餘莖豆豉一撮同煎三五沸去滓稍熱先以多半投之良久用釵子於喉中探引吐了不宜漱口次用少半亦稍熱投之更用葱醋酸辣湯投

之衣被蓋覆汗出則愈矣如遇世亂內經曰歲火太過炎暑流行火氣太盛肺金受邪上應熒惑大而明現若用辛涼之劑解之則萬舉萬全也若遇治世可用升麻湯葛根湯敗毒散辛溫之劑解之亦加葱根白豆豉上涌而表汗內經曰因其輕而揚之揚者發揚也吐汗發揚寒熱之邪既吐汗之後必大將息旬日之後其邪不復作矣

又一法或於無藥之處可用酸虀汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽喉中探引吐了如此三次後煎葱酸粹湯投之以衣被蓋覆汗出卽解內經曰酸苦涌泄爲陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不臥散解之於兩鼻內嗃之連嚏噴二三十次以衣被蓋覆用此藥時當於煖室中嚏罷以酸粹漿粥投之汗出如洗嚏噴者同吐法也此法可與雙解散爲表裏也

傷寒溫疫時氣冒風中暑俱四時不正之氣也人若

初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊强是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豆豉煎雙解散上涌及汗出則解如不解者至五六日或不大便喘滿讝語實熱兩手脉沉可用調胃大小承氣湯下之愼不可用銀粉巴豆霜杏仁芫花熱藥下之則必死此先外而後治內也如大汗之後愼不可食葵羹藿菜羊猪雞犬魚兎等肉惟不先明必致重困後必難治也傷寒七八日發黃有斑潮熱腹滿者或痰實作止雖諸承氣湯下過者仲景曰寸口脉浮滑者可用瓜蔕散吐之然傷寒寸口脉浮滑者可用雜病寸口脉沉者可吐叔和云寸脉沉兮胃有痰啓元子曰上盛不已吐而奪之是也

李杲十書

辨陰陽

陰證身靜重語無聲氣難布息目睛不了了鼻中呼不出吸不入口鼻中往來氣冷水漿不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮

陽證身動輕語有聲目睛了了口鼻中呼吸出入能

往能來

身表涼知在陰經也名曰陰證身表熱知在陽經也名曰陽證

辨脉

古人以脉上辯內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口爲外傷氣口脉大於人迎爲內傷此辯固是但其說有所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役不節皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉丁與壬合內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若飲食不節勞役過甚則心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏

者是也故氣口脉急大而澀數時一代而澀也澀者肺之本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨大於五脉數中顯緩時一代也如飲食不節寒溫失所則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑者有宿食也以此辯之豈不明白易見乎但恐山野間卒無醫者何以診候故復說病證以辯之

辨內外

外感八風之邪乃有餘證也內傷飲食不節勞役所傷皆不足之病也其內傷亦惡風自汗若在溫暖無風處則不惡矣與外傷鼻流清涕頭痛自汗頗相似細分之特異耳外感風邪其惡風自汗頭痛鼻流清涕常常有之一日一時增加愈甚及至傳入裏作下證乃罷語聲重濁高厲有力鼻息壅塞而不通能食腹中和口知味大小便如常筋骨疼痛不能動搖便著牀枕非扶不起其內傷與飲食不節勞役所傷然

亦惡風居露地中遇大漫風起却不惡也惟門窗隙中些小賊風來必大惡也與傷風傷寒俱不同矣況鼻流淸涕頭痛自汗間而有之鼻中氣短少氣不足以息語則氣短而怯弱妨食或食不下或不欲食三者互有之腹中不和或腹中急而不能伸口不知五穀之味小便頻數而不渴初勞役得病食少小便赤黃大便常難或澀或結或虛坐只見些少白膿時有下氣或泄黃如糜或溏泄色白或結而不通若心下痞或胷中閉塞如刀劃之痛二者亦互作不併出也有時胃脘當心而痛上支兩脅痛必臍下相火之勢如巨川之水不可遏而上行使陽明之經逆行亂於胷中其氣無止息甚則氣高而喘熱傷元氣令四肢不收無氣以動而懶倦嗜臥以其外感風寒俱無此證故易爲分辨耳

傷風鼻中氣出粗合口不開肺氣通於天也傷食口無味多涎不納鼻息氣匀脾氣通於地也

外傷一身盡熱先太陽也從外而之內者先無形也

內傷手足不和兩脅俱熱先少陽也從內之外者先

有形也內外俱傷人迎氣口俱盛或舉按皆實大表發熱而惡寒腹不和而口液此內外兩傷也凡診則必捫手心手背手心熱則內傷手背熱則外傷次以脉別之

辨寒熱

外傷寒邪之證與飲食失節勞役形質之病及內傷飲食俱有寒熱舉世盡將內傷飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪表實有餘之證反瀉其表枉死者豈勝言哉皆由其不別其寒熱耳今細爲分解之外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又謂之拂拂發熱發於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也是寒邪犯高之高者也皮膚毛腠者陽之分也是衞之元氣所滋養之分也以寒邪乘之鬱遏陽分陽不得伸故發熱也其面赤鼻氣壅塞不通心中煩悶稍似袒裸露其皮膚已不能禁其寒矣其表上虛熱止此而已其惡寒也雖重衣下幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待傳入裏作下證乃罷其寒熱齊作無有間斷也其內傷飲食不節或

勞役所傷亦有頭痛項強腰痛與太陽表證微有相似餘皆不同論中辯之矣內傷不足之病表上無陽不能禁風寒也此則常常有之其躁熱發於腎間者間而有之與外中寒邪略不相似其惡風寒也蓋脾胃不足榮氣下流而乘腎肝此痿厥氣逆之漸也若胃氣平常飲食入胃其榮氣上行以輸於心肺以滋養上焦之皮膚腠理之元氣也既下流其心肺無所稟受皮膚間無陽失其榮衛之外護故陽分皮毛之間虛弱但見風見寒或居陰寒處無日陽處便惡之也此常常有之無間斷者也但避風寒及溫煖處或添衣蓋溫養其皮膚所惡風寒便不見矣是熱也非表傷寒邪皮毛間發熱也乃腎間受脾胃下流之濕氣閉塞其下致陰火上衝作蒸蒸而躁熱上徹頭頂旁徹皮毛渾身躁熱作須待袒衣露居近寒涼處即已或熱極而汗出亦解彼外傷惡寒發熱豈有汗出者乎若得汗則病愈矣以此辨之豈不如黑白之易見乎當內虛而傷之者躁熱也或因口吸風寒之氣鬱其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入爲膈上衝

脉之火所拒使陰氣不得入其胷中之氣爲外風寒所過而不得伸令人口開目瞪極則聲發於外氣不能上下塞於咽中而氣欲絕又或因噦因嘔因吐而躁熱發必有所因方有此證其表虛惡風寒之證復見矣表虛之弱爲陰火所乘躁發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其躁熱則間而有之此二者不齊躁作寒已寒作躁已非如外傷之寒熱齊作無有間斷也百病俱有身熱又謂之肌熱又謂之皮膚間熱以手捫之方知者是也乃肌體有形之熱也亦須皆待陰陽既和汗出則愈矣慎不可於此上辨之以其虛實內外病皆有之故難辨耳只依此說病人自覺發熱惡寒之熱及躁作之熱上辨之爲準則矣

辨手心手背

內傷及勞役飲食不節病手心熱手背不熱外傷風寒則手背熱手心不熱此辨至甚皎然

辨口鼻

若飲食勞役所傷其外證必顯在口必口失穀味必

腹中不和必不欲言縱勉強對答聲必怯弱口沃沫多唾鼻中清涕或有或無卽陰證也外傷風寒則其外證必顯在鼻氣不利聲重濁不清利其言壅塞盛而有力口中必和傷寒則面赤鼻壅塞而乾傷風則鼻流清涕而已內經云鼻者肺之候肺氣通於天外傷風寒則鼻爲之不利口者坤土也脾氣通於口飲食失節勞役所傷口不知穀味亦不知五味又云傷食惡食傷食明矣

辨氣

外傷風寒者其氣壅盛而有餘內傷飲食勞役者其口鼻中皆氣短促不足以息何以分之蓋外傷風寒者心肺元氣初無減損又添邪氣助之使鼻氣壅塞不利面赤不通其鼻中氣不能出併從口出但發一言必前輕而後重其言高其聲壯厲而有力是傷寒則鼻乾無涕面壅色赤其言前輕後重其聲壯厲而有力此乃有餘之驗也傷風則決然鼻流清涕其聲嗄其言響如從瓮中出亦前輕而後重高揭而有力皆氣盛有餘之驗也內傷飲食勞役者心肺之氣先

損爲熱所傷熱皆傷氣四肢無力以動故口鼻中皆短氣少氣上喘懶語人有所問十不欲對其一縱勉強答之其氣亦怯其聲亦低是其氣短少不足之驗也明白如此雖婦人女子亦能辨之豈有醫者反不能辨之乎

辨頭痛

內證頭痛有時而作有時而止外證頭痛常常有之直須傳入裏實方罷此又內外證之不同者也

辨筋骨四肢

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既爲熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨爲寒肝主筋爲風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨爲之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形又云寒則筋攣骨痛此之謂也

辨飲食

仲景傷寒論云中風能食傷寒不能食二者皆口中和而不惡食若勞役所傷及飲食失節寒溫不適三者俱惡食口不知五味亦不知五穀之味只此一辨足以分內外有餘不足二證也傷寒證雖不能食而不惡食口中和知五味亦知穀味蓋無內證則心氣和脾氣通知五穀之味矣

辨渴

外感風寒之邪三日已外穀消水去邪氣傳裏始有渴也內傷飲食失節勞役久病者必不渴是邪氣在血脉中有餘故也初勞役形質飲食失節傷之重者必有渴以其心火熾上尅於肺金故渴也又當以此辨之雖渴欲飲冷水者當徐徐少與之不可縱意而飲恐水多峻下則胃氣愈弱輕則爲脹重則傳變諸疾必反覆悶亂百脉不安夜加增劇不得安臥不可不預度也

傷寒之源

冬傷於寒春必溫病蓋因房室勞傷與辛苦之人腠

理開泄少陰不藏腎水涸竭而得之無水則春木無以發生故爲溫病至長夏之時時强木長因絕水之源無以滋化故爲大熱病也傷寒之源如此四時調神論曰逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉廣成子云無勞汝形無搖汝精金匱眞言曰夫精者身之本也故藏於精者春不病溫註云冬不按蹻精氣伏藏陽不妄升故春不病溫又經云不妄作勞又云不知持滿又云水冰地坼無擾乎陽又云無泄皮膚使氣亟奪啓元子云腎水王於冬故行夏令則腎氣傷春木王而水廢故病於春也逆冬氣則傷腎故少氣以奉春生之令也是以春爲溫病夏爲熱病長夏爲大熱病其變隨乎時而已邪之所感淺者其病輕而易治深者其病重而難治尤深者其病死而不治

冬傷於寒春必溫病

冬傷於寒者冬行秋令也當寒而溫火勝而水虧矣水既已虧則所勝妄行土有餘也所生受病木不足也所不勝者侮之火太過也火土合德濕熱相助故爲溫病使民腠理開泄少陰不藏惟房室勞傷辛苦

之人得之若此者皆爲溫病所以不病於冬而病於春者以其寒水居卯之分方得其權大寒之令復行於春腠理開泄少陰不藏房室勞傷辛苦之人陽氣泄於外腎水虧於內當春之月時強木長無以滋生化之源故爲溫病耳故君子周密於冬少陰得藏於內腠理以閉拒之雖有大風苛毒莫之能害矣何溫病之有哉人肖天地而生也冬時陽氣俱伏於九泉之下人之陽氣俱藏於一腎之中人能不擾乎腎則六陽安靜於內內既得安邪無自而入矣此傷寒之源非天之傷人乃人自傷也傷於寒者皆爲病熱爲傷寒氣乃熱病之總稱故曰傷寒爲熱邪明矣六陰用事於冬陽氣在內周密閉藏可矣反勞動之而泄於外時熱已傷於水矣至春之時木當發生陽已外泄孰爲鼓舞腎水內竭孰爲滋養此兩者同爲生化之源源既已絕水何賴以生乎身之所存者獨無熱也時强木長故爲溫病矣

論兩感

問兩感邪從何道而入答曰經云兩感者死不治一

日太陽與少陰俱病頭痛發熱惡寒口乾煩滿而渴太陽者腑也自背俞而入人之所共知少陰者臟也自鼻息而入人所不知也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎爲水也水流濕故腎受之經曰傷於濕者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏旣不能一治故死矣故云兩感者不治然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣夫未有不治而獲生者也予嘗用解利兩感神方間有生者十得二三故立此方以待好生君子

論表裏中三證

假令少陽證頭痛往來寒熱脉浮弦此三證但有一者是爲表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有一者是爲裏也如無上下表裏證餘者皆虛熱也是在其中矣

論傳經

陽中之陰水太陽是也爲三陽之首能循經傳亦能

越經傳陽中之陽土陽明是也夫陽明爲中州之土主納而不出如太陽傳至此名曰循經傳也陽中之陽木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽傳至此爲越經傳也陰中之陰土太陰是也上傳少陽爲順下傳少陰爲逆此爲上下傳也如太陰傳太陽爲誤下傳也陰中之陽水少陰是也上傳太陰爲順下傳厥陰爲生如太陽傳至此乃表傳裏也陰中之陰木厥陰也上傳少陰爲實再傳太陽爲自愈也

太陽者乃巨陽也爲諸陽之首膀胱經病若渴者自入於本也名曰傳本太陽傳陽明胃土者名曰循經傳爲發汗不徹利小便餘邪不盡透入於裏也太陽傳少陽膽木者名曰越經傳爲元受病脈浮無汗當用麻黃而不用之故也太陽傳少陰腎水者名曰表傳裏爲得病急當發汗而反下汗不發所以傳也太陽傳太陰脾土者名曰誤下傳爲元受病脈緩有汗當用桂枝而反下之所致也當時腹痛四肢沉重太陽傳厥陰肝木者爲三陰不至於首唯厥陰與督脈上行與太陽相接名曰循經得度傳

太陽證

太陽證頭項痛腰脊强發熱惡寒無汗脉尺寸俱浮而緊是發於陽陽者衛也麻黃湯主之

太陽證頭項痛腰脊强發熱惡寒自汗脉尺寸俱浮而緩者榮也桂枝湯主之

太陽證頭痛發熱自汗惡風脉當緩而反緊傷風得傷寒脉也太陽證頭痛發熱無汗惡寒脉當急而反緩傷寒得傷風脉也二證脉不同本經大青龍湯主之易老桂枝麻黃各半湯此言外之意楊氏云非明脉者不可用大青龍湯以其有厥逆筋惕肉瞤及亡陽之失也故易老改爲九味羌活湯而不用桂枝麻黃也羌活湯不論有汗無汗悉宜服之但有緩急不同矣

太陽證發熱惡寒自汗脉緩太陽證發熱惡風無汗脉緩此二證易老元將桂枝二麻黃一治之後復改用羌活湯

太陽頭痛

太陽膀胱脉浮緊直至寸口所以頭痛者頭與寸口

俱高之分也兼厥陰與督脉會於巔逆太陽之經上而不得下故壅滯爲頭痛於上也左手浮弦胷中痛也沉弦背愈痛右手浮弦者亦然頭痛者木也最高之分惟風可到風則溫也治以辛凉秋尅春之意故頭痛皆以風藥治之者總其體之常也然各有三陰三陽之異焉故太陽則宜川芎陽明則宜白芷少陽則宜柴胡太陰則宜蒼朮少陰則宜細辛厥陰則宜吳茱萸也

治不可越經

假令治太陽陽明不可遺太陽而只用陽明藥餘倣此用三陽經解藥後身反覆重者若煩則是有陽明也若不煩而反覆輕者知不傳三陰也不傳三陰則爲解也大抵三陰之體靜重與濕相同傷寒五日後發無汗謂穀消水去形亡故下之三日前謂內有水穀故汗之

太陽禁忌

小便不利不可更利之利之是謂犯本則邪氣入裏不能解此犯之輕也以是五苓散不可妄用

大便不可易動動之是謂動血是謂犯禁此犯之重也表在不可下下之是爲犯禁此犯之尤重也下之爲惡風惡寒頭痛待表證悉罷方可下之也脉浮緊者犯之必結胷脉浮緩者犯之必痞氣

當汗

不咽乾不衄不淋不渴小便自利不經發汗則當發之

不當汗

咽乾淋渴鼻衄小便不利已經發汗不得重發如無已上忌證雖發汗邪氣未盡亦得重發之

當汗不汗

其證爲風寒所傷陽氣下陷入於內而排風水上行經絡之間本當發汗以徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合而生黃也

發汗過多

其證因發汗太過腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸

不當汗而汗

燥火也當益津液爲上而反汗以亡其津液其毒擾陽之極則侵陰也故燥血而畜於胷中也

血證

太陽病入膀胱小便利而赤畜血證也血自下者愈也

知可解

戰而汗解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也若先差經必不爾矣

太陽傳陽明其中或有下證陽明證反退而熱兼不渴却退顯少陽證是知可解也

太陽證知可解者爲頭不痛項不强肢節不痛則知表易解

陽明知可解者爲無發熱惡寒知裏易解也

少陽證知可解者寒熱日不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之於晏晏移之於早氣移之於血血移之於氣是邪無可容之地知可解也

證知解不解

服解藥而去沉困只頭痛目悶是知濕去而風不去

則欲解也若風去而濕不去則不解何以然風則高濕則下而入重也

脉知解不解

可解之脉浮而虛不可解之脉浮而實浮而虛者只是在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽明也傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛者知邪在經也

九味羌活湯解利法

經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若差服則其變不可勝數故立此法使不犯三陽禁忌解利神方

夫九味雖爲一方然亦不可執執中無權猶執一也當視其經絡前後左右之不同從其多少大小輕重之不一增損用之其效如神㕮咀水煎服若急汗熱服以羹粥投之若緩汗溫服而不用湯投之也脉浮而不解者先急而後緩脉沉而不解者先緩而後急

當汗而下成協熱利

當各隨三陽本證表藥發之發之表解下利自愈若

不愈者方可以利藥治之

裏傳表

太陽病反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之至於大實痛者胃也桂枝加大黃湯主之已傳戊婦告夫也所以爲裏傳表即名誤下傳也

誤下變有輕重

或問曰傷寒雜證一體若誤下之甚者變大答曰非一體也傷寒誤下變無定體雜病誤下變有定體何以然傷寒自外而入陽也陽主動雜病自內而出陰也陰主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞與腹脅痛而已故變無窮者爲重痞與腹脅痛者爲輕也

五苓散爲下藥

五苓散爲下藥乃太陽裏之下藥也太陽高則汗發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也腎燥膀胱熱小便不利此藥主之小便利者不宜用然太陽病熱而渴小便雖利亦宜五苓散下之

當服不服則生何證答曰當服不服則穀消水去形亡必就陽明燥火聚胃發黃故有調胃湯證此太陽入本失下也由不曾服五苓散

不當服而服之當生何證答曰不當服而服之是爲犯本小便强利津液重亡侵陽之極則侵陰而成血證也輕則桃仁承氣湯重則抵當湯故五苓散爲利小便主藥乃太陽陽明之間故爲調和之劑

藥有標本陰陽

假令太陽證傷寒自外入標本有二說以主言之膀胱爲本經絡爲標以邪言之先得者爲本後得者爲標此標先受之卽是本也後入於膀胱本却爲標也此乃客邪之標本也治當從客之標本

寒毒之氣從標入本邪與手經相合而下至膀胱五苓散主之桂枝陽中之陽茯苓陽中之陰相引而下入於本道出邪氣

火邪之氣從下之上以內爲本水中有火火爲客氣當再責其本兩腎相通又在下部責在下焦如瀆相火明也生地黃黃蘗主之邪氣本受下焦火邪遺於

小腸是熱在下焦塡塞不便自內而之外也

桂朮澤瀉猪苓茯苓爲陽中之陰生地黃黃蘗黃連爲陰中之陽

加減凉膈散

易老法凉膈散減大黃芒硝加桔梗同爲舟楫之劑浮而上之治胷膈中與六經熱以其手足少陽之氣俱下胷膈中三焦之氣同相火遊行於身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載亦至高之劑故能於無形之中隨高而走去胷膈中及六經熱也

陽明證

陽明證身熱目疼鼻乾不得臥不惡風寒而自汗或惡熱脈尺寸俱長白虎湯主之

陽明禁忌

不當發汗不當利小便若發汗利小便竭其津液則生畜血證也唯當益津液爲上以其火就燥也益津液者連鬚葱白湯是也汗多亡陽下多亡陰小便重利之走氣三者之變雖異而亡津液則一也

論汗下

汗多亡陽汗者本所以助陽也若陽受陰邪寒結無形須當發去陰邪以復陽氣所謂益陽而除風寒也若陰邪已去而復汗之反傷陽也經曰重陽必陰故陽去自亡汗多亡陽此之謂也

下多亡陰下者本所以助陰也若陰受陽邪熱結有形須當除去其敗壞者以致新陰此所謂益陰而除火熱也若陽邪已去而復下之反亡陰也經曰重陰必陽故陰氣自亡下多亡陰此之謂也

汗無太早非預早之早乃早晚之早也謂當日午以前爲陽之分當發其汗午後陰之分也不當發汗故曰汗無太早汗不厭早是爲善攻

下無太晚非待久之晚乃當日巳後爲陰之分也下之謂當巳前爲陽之分也故曰下無太晚下不厭晚是爲善守汗不亡陰以其汗多陽亦隨陰而走下本瀉陽以其下多陰亦隨陽而走故曰汗多亡陽下多亡陰也若犯發汗多畜血上焦爲衄若犯利小便多畜血下焦爲發狂其人如狂也

論諸白虎湯

傷寒脈尺寸俱長自汗大出身表如冰石至脈傳入於裏細而小其人動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加桂枝湯主之然脈雖細小亦當以遲疾別之此證脈疾而非遲故用此法

煩躁

煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎故梔子豉湯用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁煩躁者懊憹不得眠也少氣虛滿者加甘草如若嘔噦者加生薑橘皮下後腹滿而煩者梔子厚朴枳實湯下後身熱微煩者梔子甘草乾薑湯

火入於肺煩也火入於腎躁也煩躁俱在上者腎子通於肺母也髮潤如油喘而不休總言肺絕鼻者肺之外候肺氣通於鼻鼻中氣出粗大是肺也髮者血之餘腎氣主之髮潤如油火迫腎水至高之分是水將絕也仲景以髮潤喘大爲肺絕兼其腎而言之髮在高巔之上雖屬腎肺爲五臟之至高故言肺絕兼腎也大抵肺腎相通肺既已絕則腎不言而知其絕矣或曰煩者心爲之煩躁者心爲之躁何煩爲肺躁

爲腎耶夫心者君火也與邪熱相接上下通熱金以之而燥水以之而虧獨存者火爾故肺腎與心合而爲煩躁焉此煩雖肺躁雖腎其實心火爲之也若有宿食而煩躁者梔子大黃湯主之

讝妄

問邪入陽明爲讝語妄言錯失此果陽明乎答曰足陽明者胃也豈有其言哉傷寒始自皮毛入是從肺中來肺主聲入於心則爲言胃卽戊也戊爲火化下從腎肝

傷寒雜證發熱相似

傷寒表證發熱惡寒而渴與下證同但頭痛身熱目疼鼻乾不得臥白虎湯主之乃陽明經病也正陽陽明氣病脉大先無形也雜病裏證發熱惡熱而渴但目赤者臟病也手太陰肺不足不能管領陽氣也宜以枸杞生地黃熟地黃之類主之脉洪大甚則嘔血先有形也

狂言讝語鄭聲

狂言者大開目與人語語所未嘗見之事卽爲狂言

也讝語者合目自言所日用常行之事卽爲讝語也鄭聲者聲戰無力不相接續造字出於喉中卽鄭聲也

陽證發斑

有下之早而發者有失下而發者有胃熱胃爛而發者然得之雖殊大抵皆戊助手少陰心火入於手太陰肺也故紅點如斑生於皮毛之間耳白虎瀉心湯調胃承氣湯從所當而用之及當以脉別也

傷寒有九經

傷寒之經凡九太陽陽明少陽太陰少陰厥陰是爲六也有太陽陽明有少陽陽明有正陽陽明是爲三也非九而何陽明者太陽少陽俱入於胃故曰正陽陽明也前三經者陽明自病不入於裏者謂之在經不爲正陽陽明矣

三陽從中治

太陽陽明大承氣湯少陽陽明小承氣湯正陽陽明調胃承氣湯以汗證言之以少陽居其中謂太陽證爲表當汗陽明證爲裏當下少陽居其中故不從汗

下和之以小柴胡湯從少陽也以下證言之陽明居其中謂太陽經血多氣少陽明經氣血俱多少陽經氣多血少若從太陽下則犯少陽從少陽下則犯太陽故止從陽明也此三陽合病謂之正陽陽明不從標本從乎中也緣陽明經居太陽少陽之中此經氣血俱多故取居其中是以不從太陽少陽而從陽明也陽明自病調胃承氣湯主之三陽併病白虎湯主之是從乎中也

論下

如何是入陰可下答曰陽入於陰者可下非入太陰少陰厥陰之三陰也乃入三陽也三陽者非太陽少陽陽明之三陽也乃胃與大小二腸之三陽也三陽皆爲腑以其受盛水穀傳導有形故曰入於陰也仲景云已入腑者可下此之謂也仲景太陽陽明大承氣少陽陽明小承氣正陽陽明調胃承氣是三陽已入於臟者泄之太陰也桂枝湯少陰麻黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三陰未入於腑者汗之也

少陽證

少陽證胷脅痛往來寒熱而嘔或欬而耳聾脉尺寸俱弦小柴胡湯主之須各隨仲景本條下加減用之則可矣藥如本法

少陽禁忌

忌發汗忌利小便忌利大便故名三禁湯乃和解之劑若犯之則各隨上下前後本變及中變與諸變不可勝數醫者宜詳之

論半表半裏

如何是半表半裏答曰身後爲太陽太陽爲陽中之陽陽分也身前爲陽明陽明爲陽中之陰陰分也陽爲在表陰爲在裏卽太陽陽明二分邪在其中矣治當不從標本從乎中治此乃治少陽之法也太陽膀胱水寒也陽明大腸金燥也邪在其中近後膀胱寒水則惡寒近前陽明燥金則發熱故往來寒熱也此爲三陽之表裏非內外之表裏也但不可認作當下之裏故以此藥作和解之劑非汗非下也

邪在榮衛之間謂之半表裏也太陽陽明之間少陽居身之半表裏也五苓散分陰陽膀胱經之半表裏

也理中湯治吐瀉上下之半表裏也

熱有虛實

五臟陰也所主皆有形骨肉筋血皮毛是也此五臟皆陰足是爲實熱陰足而實不能起理也陰足而熱反勝之是爲實熱若骨痿肉爍筋緩血枯皮聚毛落五陰不足而爲熱病是虛熱

潮熱

熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣中之火熱在行陰之分腎氣主之故用地骨皮飲以瀉血中之火白虎湯其狀洪故抑之使秋氣得以下降也地骨皮飲其脉弦故舉之使春氣得以上升也

太陰證

腹滿咽乾手足自溫自利不渴時腹痛脉尺寸俱沉細

可汗

太陰病脉浮者可汗宜桂枝湯

可溫

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜四

逆輩此條雖不言脉當知沉遲而弱仲景理中湯丸暨易老人參黃芪湯量其輕重或溫或熱視人之强弱虛實所可宜者選而用之

可下

太陰有可下者乎答曰有經云本太陽證醫反下之因爾腹滿時痛者太陰也桂枝芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯易老云此非本有是證以其錯下脾傳於胃故爲誤下傳

知可解

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長者爲欲愈表少裏和脉長者爲陽漸生也此一證太陰便從外感太陰病欲解時從亥至丑上也

太陰禁忌

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之則胷下結鞕太陰爲病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也傷寒而脉浮緩手足自溫者繫在太陰小便自利者則不發黃日久利益甚必自止者便鞕乃入腑傳

陽明也

少陰證

少陰證口燥舌乾而渴脉尺寸俱沉疾則大承氣湯沉遲則四逆湯

少陰邪入於裏上接於心與火俱化而尅金惡候或上氣死入胃脉沉細而疾疾則大承氣下之下於本與水俱化而爲寒厥逆或見身冷靜重脉沉細而遲遲則四逆湯溫之疾雖可下若疾而無力者亦不可下爲陽將盡也

少陰證口燥舌乾而渴身表凉脉沉細而虛瀉心湯主之此有形無形之藥也

傷寒外證全在下證大熱而脉反細小不可下瀉心湯主之少陰受病身凉無汗體沉或體輕脉沉有頭痛不厥麻黄附子瀉心湯主之

其人病身熱而煩躁不寧大小便自利其脉浮洪而無力按之全無者附子瀉心湯主之

其人病上吐下瀉不止當渴而反不渴其脉微細而弱理中湯主之渴而脉沉有力而疾者五苓散主之

少陰證發熱脉沉者必當汗若緩汗之用麻黃附子細莘湯若微汗之用麻黃附子甘草湯

下利

色青者當下色不青者當溫口中和者當溫口乾燥者當下

少陰禁忌

脉細沉數病爲在裏不可發汗脉微者不可發汗尺脉微弱濇者便不可下麻黃附子細莘湯體沉加防己蒼朮乃勝濕也體輕加石膏知母乃勝熱也

六經發熱治法

表熱惡熱而渴者白虎湯皮膚如火燎而以手重取之不甚熱者肺熱也或目白睛赤煩躁引飲單黃芩一物湯兩脅肌熱脉浮弦者柴胡飲子一身熱或日晡潮熱皆血熱也四順飲子夜則行陰若發熱者血熱也四順飲桃仁湯選而用之當視其有表入裏腹痛血刺腹痛中無轉失氣之類晝則明了夜則譫語熱入血室無犯胃氣及上中二焦不治自愈若甚則四順飲子桃仁承氣湯證相似當下者用之寅申發

熱兩脅不盛亦爲柴胡證表裏內外俱熱者大柴胡湯晝則行陽氣也柴胡夜則行陰血也四順治之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十四卷目錄

醫部彙考三百四十四

傷寒門十

朱震亨心法（傷寒　傷風）

王履溯洄集（仲景傷寒立法考　傷寒溫病熱病說　三陰病或寒或熱辨　陽虛陰盛陽盛陰虛論　三百九十七法辨　四逆厥辨）

藝術典第三百六十四卷

醫部彙考三百四十四

傷寒門十

元朱震亨心法

傷寒傷風

凡證與傷寒相類者極多皆雜證也其詳出內經熱論自長沙以下諸家推明甚至千世之下能得其粹者東垣也其曰內傷極多外傷間而有之此發前人之所未發後人徇俗不能眞切雷同指爲外傷極謬

其或可者蓋亦因其不敢放肆而多用和解及平和之藥散之耳若粗率者則必殺人初有感冒等輕證不可便認作傷寒妄治西北二方極寒肅殺之地故外感甚多東南二方溫和之地外傷極少雜病亦有六經所見之證故世俗混而難別

正治溫散宜桂枝湯四逆湯輩甚者三建湯霹靂散從治用熱藥加凉劑引之或熱藥須俟冷飲最妙經曰從而逆之此之謂也反攻用烏頭煎之類

傷風屬肺者多宜辛溫或辛凉之劑散之戴云新欵嗽鼻塞聲重者是也

王履泝洄集

仲景傷寒立法考

讀仲景之書當求其所以立法之意苟得其所以立法之意則知其書足以爲萬世法而後人莫能加莫能外矣苟不得其所以立法之意則疑信相雜未免通此而礙彼也嗚呼自仲景以來發明其書者不可以數計然其所以立法之意竟未聞有表章而示人者豈求之而不得之歟將相循習而不求歟抑有之

而余未之見歟予雖不敏僭請陳之夫傷於寒有卽病者焉有不卽病者焉卽病者發於所感之時不卽病者過時而發於春夏也卽病謂之傷寒不卽病謂之溫與暑夫傷寒溫暑其類雖殊其所受之原則不殊也由其原之不殊故一以傷寒而爲稱由其類之殊故施治不得以相混以所稱而混其治宜乎貽禍後人以歸咎於仲景之法而委廢其大半也吁使仲景之法果貽禍於後人傷寒論不作可也使仲景之法果不貽禍於後人傷寒論其可一日缺乎後人乃不歸咎於己見之未至而歸咎於立法之大賢可謂溺井怨伯益失火怨燧人矣夫仲景法之祖也後人雖移易無窮終莫能越其矩度由莫能越而觀之則其法其方果可委廢大半哉雖然立言垂訓之士猶不免失於此彼碌碌者固無足誚矣夫惟立言垂訓之士有形乎著述之間其碌碌者當趦趄猶豫之餘得不靡然從令爭先快覩而趨簡略之地乎夫其法其方委廢大半而不知近日之簡便是趨此民生之所以無藉而仲景之心之所以不能別白矣嗚呼法

也方也仲景專爲卽病之傷寒設不兼爲不卽病之溫暑設也後人能知仲景之書本爲卽病者設不爲不卽病者設則尚恨其法散落所存不多而莫能禦夫粗工妄治之萬變果可憚煩而或廢之乎是知委廢大半而不覺其非者由乎不能得其所以立法之意故也今人雖以治傷寒法治溫暑亦不過借用耳非仲景立法之本意也猶六書假借雖移易無窮終非造字之初意夫仲景立法天下後世之權衡也故可借焉以爲他病用雖然豈特可借以治溫暑而已凡雜病之治莫不可借也今人因傷寒治法可借以治溫暑遂謂其法通爲傷寒溫暑設吁此非識流而昧原者歟苟不余信請以證之夫仲景之書三陰經寒證居熱證什之七八彼不卽病之溫暑但一於熱耳何由而爲寒哉就三陰寒證而詳味之然後知余言之不妄或者乃謂三陰寒證本是雜病爲王叔和增入其中又或謂其證之寒蓋由寒藥誤治而致若此者皆非也夫叔和之增入者辨脈平脈與可汗可下等諸篇而已其六經病篇必非叔和所能贊辭也

但厥陰經中下利嘔噦諸條却是叔和因其有厥逆而附遂併無厥逆而同類者亦附之耳至若以藥誤治而成變證則惟太陽爲多縱使三陰證亦或有寒藥誤治而變寒者然豈應如是之衆乎夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑設遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用韓祇和雖覺桂枝湯之難用但謂今昔之世不同然未悟仲景書本爲卽病之傷寒設也且其著微旨一書又純以溫暑作傷寒立論而卽病之傷寒反不言及此已是捨本徇末全不能窺仲景藩籬又以夏至前胷膈滿悶嘔逆氣塞腸鳴腹痛身體拘急手足逆冷等證視爲溫暑謂與仲景三陰寒證脈理同而證不同遂別立溫中法以治夫仲景所敘三陰寒證乃是冬時卽病之傷寒故有此證今欲以仲景所敘三陰寒證求對於春夏溫暑之病不亦惽乎雖然祇和未悟仲景立法本旨而又適當溫暑病作之際其爲惑也固宜以余觀之其胷膈滿悶嘔逆氣塞等證若非內傷冷物則不正暴寒所中或過服寒藥所變或內外俱傷於寒之病也且祇和但曰寒而當溫

然未嘗求其所以爲寒之故能求其故則知溫暑本無寒證矣攷之仲景書雖有陰毒之名然其所敘之證不過面目青身痛如被杖咽喉痛而已並不言陰寒極甚之證況其所治之方亦不過升麻甘草當歸鼈甲而已並不用大溫大熱之藥是知仲景所謂陰毒者非陰寒之病乃是感天地惡毒異氣入於陰經故曰陰毒耳後之論者遂以爲陰寒極甚之證稱爲陰毒乃引仲景所敘面目青身痛如被杖咽喉痛數語併而言之却用附子散正陽散等藥以治竊謂陰寒極甚之證固亦可名爲陰毒然終非仲景所以立名之本意觀後人所敘陰毒與仲景所敘陰毒自是兩般豈可混論後人所敘陰毒亦只是內傷冷物或不正暴寒所中或過服寒藥所變或內外俱傷於寒而成耳非天地惡毒異氣所中者也朱奉議作活人書累數萬言於仲景傷寒論多有發明其傷寒卽入陰經爲寒證者諸家不識而奉議識之但惜其亦不知仲景專爲卽病者立法故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論竟無所別況又視傷寒論爲全書遂將

次傳陰經熱證與卽入陰經寒證牽合爲一立說且謂大抵傷寒陽明證宜下少陰證宜溫而於所識卽入陰經之見又未免自相悖矣夫陽明證之宜下者固爲邪熱入胃其少陰證果是傷寒傳經熱邪亦可溫乎況溫病暑病之少陰尤不可溫也自奉議此說行而天下後世蒙害者不少矣迨夫成無己作傷寒論註又作明理論其表章名義纖悉不遺可謂善羽翼仲景者然卽入陰經之寒證又不及朱奉議之識況卽病立法之本旨乎宜其莫能知也惟其莫知故於三陰諸寒證止隨文解義而已未嘗明其何由不爲熱而爲寒也至於劉守眞出亦以溫暑作傷寒立論而遺卽病之傷寒其所處辛凉解散之劑固爲昧者有中風傷寒錯治之失而立蓋亦不無桂枝麻黃難用之惑也既惑於此則無由悟夫仲景立桂枝麻黃湯之有所主用桂枝麻黃湯之有其時矣故其原病式有曰夏熱用麻黃桂枝之類熱藥發表須加寒藥不然則熱甚發黃或斑出矣殊不知仲景立麻黃湯桂枝湯本不欲用於夏熱之時也苟悟夫桂枝麻

黃湯本非治溫暑之劑則羣疑氷釋矣何也夫寒之初客於表也閉腠理鬱陽氣而爲熱故非辛溫之藥不能開腠理以泄其熱此麻黃湯之所由立也至於風邪傷表雖反疎腠理而不能閉然邪既客表則表之正氣受傷而不能流通故亦發熱也必以辛甘溫之藥發其邪則邪去而腠理自密矣此桂枝湯之所由立也其所以不加寒藥者蓋由風寒在表又當天令寒冷之時而無所避故也後人不知仲景立法之意故有惑於麻黃桂枝之熱有犯於春夏之司氣而不敢用於是有須加寒藥之論夫欲加寒藥於麻黃桂枝湯之中此乃不悟其所以然故如此耳若仲景爲溫暑立方必不如此必別有法但惜其遺佚不傳致使後人有多岐之患若知仲景傷寒論專爲卽病傷寒作則知麻黃桂枝所以宜用之故除傳經熱證之外其直傷陰經與太陽不鬱熱卽傳陰經諸寒證皆有所歸著而不復疑爲寒藥誤下而生矣若乃春夏有惡風惡寒純類傷寒之證蓋春夏暴中風寒之新病非冬時受傷過時而發者不然則或是溫暑將

發而復感於風寒或因感風風寒而動乎久鬱之熱遂發爲溫暑也仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病觀此則知溫病不當惡寒而當渴其惡寒而不渴者非溫病矣仲景雖不言暑病然暑病與溫病同但復過一時而加重於溫病耳其不惡寒而渴則無異也春夏雖有惡風惡寒表證其桂枝麻黃二湯終難輕用勿泥於發表不遠熱之語也於是用辛凉解散庶爲得宜苟不愼而輕用之誠不能免夫狂躁斑黃衄血之變而亦無功也雖或者行桂枝麻黃於春夏而效乃是因其辛甘發散之力偶中於萬一斷不可視爲常道而守之今人以敗毒散參蘇飲通解散百解散之類不問四時中風傷寒一例施之雖非至正之道較之不愼而輕用麻黃桂枝於春夏以致變者則反庶幾然敗毒散等若用於春夏亦止可治暴中風之證而已其冬時受傷過時而發之溫病暑病則不宜用也用則非徒無益亦反害之矣縱或有效亦是偶然彼冬時傷寒用辛凉發表而或效者亦偶然也凡用藥治病其既效之後須要明其當然與偶

然能明其當然與偶然則精微之地安有不至者乎惟其視偶然爲當然所以循非踵弊莫之能悟而病者不幸矣若夫仲景於三陰經每用溫藥正由病之所必須與用之有其時耳餘有別論茲不再具若槩以三陰寒證視爲雜病而外之得無負於仲景濟人利物之至仁而誤後世乎自近代先覺不示傷寒溫暑異病之端緒但一以寒涼爲主而諸溫熱之劑悉在所略致使後之學者視仲景書欲仗焉而不敢以終決欲棄焉則猶以爲立法之祖而莫能外甚則待爲具文又甚則束之高閣而謂其法宜於昔而不宜於今由治亂動靜之殊治靜屬水亂動屬火故其溫熱之藥不可用於今屬火之時也噫斯言也其果然耶否耶但能明乎仲景本爲卽病者設法則桂枝麻黃自有所用諸溫熱之劑皆不可略矣若謂仲景法不獨爲卽病者設則凡時行及寒疫溫瘧風溫等病亦通以傷寒六經病諸方治之乎傷寒例曰冬溫之毒與傷寒大異爲治不同又曰寒疫與溫及暑病相似但治有殊耳是則溫暑及時行寒疫溫瘧風溫等

仲景必別有治法今不見者亡之也觀其所謂爲治不同所謂溫瘧風溫溫毒溫疫脈之變證方治如說豈非亡其法乎決不可以傷寒六經病諸方通治也夫素問謂人傷於寒則爲病熱者言常而不言變也仲景謂或熱或寒而不一者備常與變而無遺也仲景蓋言古人之所未言大有功於古人者雖欲偏廢可乎叔和搜採仲景舊論之散落者以成書功莫大矣但惜其既以自己之說混於仲景所言之中又以雜脈雜病紛紜並載於卷首故使玉石不分主客相亂若先備仲景之言而次附己說明書其名則不致惑於後人而累仲景矣昔漢儒收拾殘編斷簡於秦火之餘加以傳註後之議者謂其功過相等叔和其亦未免於後人之議歟余嘗欲編類其書以傷寒例居前而六經病次之相類病又次之差後病又次之診察治法治禁治誤病解未解等又次之其雜脈雜病與傷寒有所關者采以附焉其與傷寒無相關者皆刪去如此庶幾法度純一而玉石有分主客不亂矣然有志未暇姑敘此以俟他日

傷寒溫病熱病說

有病因有病名有病形辨其因正其名察其形三者俱當始可以言治矣一或未明而曰不誤於人吾未之信也且如傷寒此以病因而爲病名者也溫病熱病此以天時與病形而爲病名者也由三者皆起於感寒或者通以傷寒稱之夫通稱傷寒者原其因之同耳至於用藥則不可一例而施也何也夫傷寒蓋感於霜降後春分前然不即發鬱熱而發於春夏者也傷寒即發於天令寒冷之時而寒邪在表閉其腠理故非辛甘溫之劑不足以散之此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也溫病熱病後發於天令暄熱之時怫熱自內而達於外鬱其腠理無寒在表故非辛凉或苦寒或酸苦之劑不足以解之此仲景桂枝麻黃等湯獨治外者之所以不可用而後人所處雙解散大黃湯千金湯防風通聖散之類兼治內外者之所以可用也夫即病之傷寒有惡風惡寒之證者風寒在表而表氣受傷故也後發之溫病熱病有惡風惡寒之證者重有風寒新中而表氣亦受傷故也若

無新中之風寒則無惡風惡寒之證故仲景曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病溫病如此則知熱病亦如此是則不渴而惡寒者非溫熱病矣然或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之證者蓋病人表氣本虛熱達於表又重傷表氣故不禁風寒非傷風惡風傷寒惡寒也但衞虛則惡風榮虛則惡寒耳且溫病熱病亦有先見表證而後傳裏者蓋怫熱自內達外熱鬱腠理不得外泄遂復還裏而成可攻之證非如傷寒從表而始也或者不悟此理乃於春夏溫病熱病而求浮緊之脈不亦疏乎殊不知緊爲寒脈有寒邪則見之無寒邪則不見也其溫病熱病或見脈緊者乃重感不正之暴寒與內傷過度之冷食也豈其本然哉又或者不識脈形但見弦便呼爲緊斷爲寒而妄治蓋脈之盛而有力者每每兼弦豈可錯認爲緊而斷爲寒夫溫病熱病之脈多在肌肉之分而不甚浮且右手反盛於左手者誠由怫熱在內故也其或左手盛或浮者必有重感之風寒否則非溫病熱病自是暴感風寒之病耳凡溫病熱病若無重感表

證雖間見而裏病爲多故少有不渴者斯時也法當治裏熱爲主而解表兼之亦有治裏而表自解者余每見世人治溫熱病雖誤攻其裏亦無大害誤發其表變不可言此足以明其熱之自內達外矣其間有誤攻裏而致大害者乃春夏暴寒所中之疫證邪純在表未入於裏故也不可與溫病熱病同論夫惟世以溫病熱病混稱傷寒故每執寒字以求浮緊之脈以用溫熱之藥若此者因名亂實而戕人之生名其可不正乎又方書多言四時傷寒故以春夏之溫病熱病與秋冬之傷寒一類視之而無所別夫秋冬之傷寒眞傷寒也春夏之傷寒寒疫也與溫病熱病自是兩塗豈可同治吁此弊之來非一日矣歷攷方書並無救弊之論每每雷同良可痛哉雖然傷寒與溫病熱病其攻裏之法若果是以寒除熱固不必求異其發表之法斷不可不異也況傷寒之直傷陰經與太陽雖傷不及鬱熱卽傳陰經爲寒證而當溫者又與溫病熱病大不同其可妄治乎或者知一不知二故謂仲景發表藥今不可用而攻裏之藥乃可用嗚

呼其可用不可用之理果何在哉若能辨其因正其名察其形治法其有不當者乎彼時行不正之氣所作及重感異氣而變者則又當觀其何時何氣參酌傷寒溫熱病之法損益而治之尤不可例以仲景即病傷寒藥通治也

三陰病或寒或熱辨

嘗讀張仲景傷寒論於太陰有曰自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宐服四逆輩於少陰有曰少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之少陰病下利白通湯主之少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之少陰病脈沉者急溫之宐四逆湯於厥陰有曰手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之觀仲景此論則傷寒三陰必有寒

證而宜用溫熱之劑也及讀劉守眞之書有曰傷寒邪熱在表腑病爲陽邪熱在裏臟病爲陰俗妄謂有寒熱陰陽異證誤人久矣寒病有矣非汗病之謂也寒病止爲雜病終莫能爲汗病且造化汗液之氣者乃陽熱之氣非陰寒之所能也雖仲景有四逆湯證是治表熱裏和誤以寒藥下之太早表熱入裏下利不止及或表熱裏寒自利急以四逆溫裏利止裏和急解其表也故仲景四逆湯證復有承氣湯下之者由是傷寒汗病經直言熱病而不言寒也經言三陰證者邪熱在臟在裏以臟與裏爲陰當下熱者也素問論傷寒熱病有二篇名曰熱竟無寒理兼素問幷靈樞諸篇運氣造化之理推之則爲熱病誠非寒也觀守眞此論則傷寒無問在表在裏與夫三陽三陰皆一於爲熱而決無或寒者矣兩說不同其是非之判必有一居此者由是彼此反覆究詰其義而久不能得雖至神疲氣耗不舍置者自謂此是傷寒大綱領此義不明則千言萬語皆未足以爲後學式況戕賊民生何有窮極也哉意謂成無己之註必有所發

明者遂因而求之然亦止是隨文而略釋之竟不明言何由爲熱何由爲寒之故此非其不欲言也蓋止知傷寒皆是傳經故疑於六經所傳俱爲熱證而熱無變寒之理遂不敢別白耳以寒爲本臟之寒歟安得當熱邪傳裏入深之時反獨見寒而不見熱者且所用溫熱藥能不助傳經之熱邪乎以寒爲外邪之寒歟則在三陽已成熱矣豈有傳至三陰而反爲寒哉成氏能潛心乎此則必悟其所以然矣自仲景作傷寒論以來靡或遺之而弗宗至於異同之論興而漁者走淵木者走山矣宜乎後人不能決於似是而非之際故或謂今世並無眞傷寒病又或以爲今人所得之病俱是內傷又昧者至謂傷寒論中諸溫藥悉爲傳經熱邪而用者以三陰經屬陰故也又其大謬者則曰論中凡有寒字皆當作熱字看嗚呼末流之弊一至此乎於是澄心靜慮以涵泳之一旦豁然若有所悟者然亦未敢必其當否也姑陳之以從有道之正夫三陽之病其寒邪之在太陽也寒鬱其陽陽不暢而成熱陽雖人身之正氣既鬱則爲邪矣用

麻黃發表以逐其寒則腠理通而鬱熱泄故汗而愈苟或不汗不解其熱不得外泄則必裏入故傳陽明傳少陽而或入腑也若夫三陰之病則或寒或熱者何哉蓋寒邪之傷人也或有在太陽經鬱熱然後以次而傳至陰經者或有太陽不傳陽明少陽而便傳三陰經者或有寒邪不從陽經而始直傷陰經者或有雖從太陽而始不及鬱熱卽入少陰而獨見少陰證者或有始自太陽卽入少陰而太陽不能以無傷者或有直傷卽入而寒便變熱及始寒而終熱者其鬱熱傳陰與變熱則爲熱證其直傷陰經及從太陽卽入少陰則爲寒證其太陽不能無傷則少陰脈證而兼見太陽標病其始爲寒而終變熱則先見寒證而後見熱證此三陰之病所以或寒或熱也苟卽三陰經篇諸條展轉玩繹以求之理斯出矣夫其或傳經或直傷或卽入或先寒後熱者何也邪氣暴卒本無定情而傳變不常故耳故經曰邪之中人也無有常或中於陽或中於陰夫守眞者絕類離倫之士也豈好爲異說以駭人哉蓋由其以溫暑爲傷寒而仲

景之方每不與溫暑對故略乎溫熱之劑而例用寒涼由其以傷寒一斷爲熱而無寒故謂仲景四逆湯爲寒藥誤下表熱裏和之證及爲表熱裏寒自利之證而立又謂溫裏止利急解其表又謂寒病止爲雜病嗟乎仲景傷寒論專爲中而卽病之傷寒作不兼爲不卽病之溫暑作故每有三陰之寒證而溫熱之劑之所以用也以病則寒以時則寒其用之也固宜後人不知此意是以愈求愈遠愈說愈鑿若知此意則猶庖丁解牛動中肯綮矣且如寒藥誤下而成裏寒者固不爲無矣不因寒藥誤下而自爲裏寒者其可謂之必無乎殊不知陰經之每見寒證者本由寒邪不由陽經直傷於此與夫雖由太陽而始不及鬱熱卽入於此而致也雖或有因寒藥誤下而致者蓋亦甚少仲景所用諸溫熱之劑何嘗每爲寒藥誤下而立況表裏寒之證亦何嘗每有急解其表之文乎夫裏寒外熱之證乃是寒邪入客於內迫陽於外或是虛陽之氣自作外熱之狀耳非眞熱邪所爲也觀仲景於裏寒外熱之證但以溫藥治裏寒而不治外

熱則知其所以爲治之意矣若果當急解其表豈不於裏和之後明言之乎且三陰寒病既是雜病何故亦載於傷寒論以惑後人乎其厥陰病篇諸條之上又何故每以傷寒二字冠之乎夫內經所敘三陰病一於爲熱者言其常也仲景所敘三陰病兼乎寒熱者言其變也並行而不相悖耳後人謂傷寒本無寒證得非知常而不知變歟然世之恪守局方好用溫熱劑者乃反能每至於寒證無他其守彼雖偏治此則是學者能知三陰固有寒邪所爲之證則仲景創法之本意可以了然於心目之間而不爲他說所奪矣或曰傷寒之病必從陽經鬱熱而傳三陰今子謂直傷陰經卽入陰經而爲寒證其何據乎余曰據夫仲景耳仲景曰病發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈夫謂之無熱惡寒則知其非陽經之鬱熱矣謂之發於陰則知其不從陽經傳至此矣謂之六日愈則知其不始太陽而止自陰經發病之日爲始數之矣仲景又曰傷寒一二日至四五日而厥者必發熱傷寒病

厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進夫得傷寒未爲熱即爲厥者豈亦由傳經入深之熱邪而致此乎今世人多有始得病時便見諸寒證而並無或熱者此則直傷陰經即入陰經者也苟不能究夫仲景之心但執凡傷於寒則爲病熱之語以爲治其不夭人天年者幾希矣

陽虛陰盛陽盛陰虛論

難經曰傷寒陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈嗟乎其傷寒汗下之樞機乎夫邪之傷於人也有淺深焉淺則居表深則入裏居表則閉腠理發怫熱見惡寒惡風頭痛等證於斯時也惟辛溫解散而可愈入裏則爲燥屎作潮熱形狂言譫語大渴等證於斯時也惟鹹寒攻下而可平夫寒邪外客非陰盛而陽虛乎熱邪內熾非陽盛而陰虛乎汗下一差生死反掌吁是言也謂之傷寒汗下樞機其不然歟惜乎釋者旁求厥義滋隱外臺祕要曰此陰陽指身之表裏言病者爲虛不病者爲盛表

病裏和是陽虛陰盛也表和裏病是陽盛陰虛也竊意陰陽之在人均則寧偏則病無過不及之謂均過與不及之謂偏盛則過矣虛則不及矣其可以盛爲和乎故內經云邪氣盛則實精氣奪則虛且謂陽虛當汗陰虛當下乃遺邪氣而反指正氣爲言得無晦乎傷寒微旨曰此陰陽指脈之尺寸言尺脈實大寸脈短小名陰盛陽虛可汗寸脈實大尺脈短小名陽盛陰虛可下苟汗證已具而脈未應必待尺脈力過於寸而後行下證已具而脈未應必待寸脈力過於尺而後用竊意越人設難以病不以脈其所答也何反以脈不以病乎且脈固以候病也倘汗下之證已急不可稍緩待脈應而未應欲不待則惑於心欲待之則慮其變二者之間將從病歟將從脈歟吾不得無疑於此也或詰余曰仲景傷寒論引此而繼以桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡之語夫桂枝表藥承氣裏藥反則爲害是固然矣然麻黃湯亦表藥也其不言之何歟且子以陰盛爲寒邪寒邪固宜用麻黃也今反舉桂枝又何歟余曰何不味仲景之

言乎其曰凡傷寒之病多從風寒得之又曰脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒又桂枝湯條而曰嗇嗇惡寒淅淅惡風麻黃湯條而曰惡風夫風寒分言則風陽而寒陰風苟行於天地嚴凝凜冽之時豈得謂之陽乎是則風寒常相因耳故桂枝麻黃皆溫劑也以溫劑爲治足以見風寒之俱爲陰邪矣但傷衞則桂枝傷榮則麻黃榮衞雖殊其爲表則一耳仲景此言但以戒汗下之誤爲主不爲榮衞設也與桂枝則麻黃在其中矣所謂陽盛卽斃者是言表證已罷而裏證旣全可攻而不可汗所謂陰盛以亡者是言裏證未形而表證獨具可汗而不可攻由是觀之則越人仲景之本旨庶乎暢然於其中矣

三百九十七法辨

余自童時習聞此言以爲傷寒治法如是之詳且備也及攷之成無己註本則所謂三百九十七法者茫然不知所在於是詢諸醫流亦不過熟誦此句而已欲其條分縷析以實其數則未遇其人遂乃反覆而推尋之以有論有方諸條數之則不及其數以有論

有方有論無方諸條通數之則過其數除辨脈法平脈法并傷寒例及可汗不可汗可吐不可吐可下不可下諸篇外止以六經病篇中有論有方有論無方諸條數之則亦不及其數以六經病篇及痓濕暍霍亂陰陽易差後勞復病篇中有論有方有論無方諸條數之則亦過其數至以六經病痓濕暍霍亂陰陽易差後勞復篇有論有方諸條數之則又太少矣竟不能決欲以此句視爲後人無據之言而不從則疑其或有所據而或出仲景叔和而勿敢廢欲尊信而必從之則又多方求合而莫之遂宋林億等校正傷寒論其序曰今校定張仲景傷寒論十卷總二十篇證外合三百九十七法余於是就其十卷二十二篇而求之其六經篇霍亂篇陰陽易差後勞復篇中有方治諸條以數爲計又重載於各篇之前又謂疾病至急倉卒難尋復重集諸可與不可方治分爲八篇亦以數爲計繼於陰陽易差後勞復篇之後其太陽上篇註曰一十六法太陽中篇註曰六十六法太陽下篇註曰三十九法陽明篇註曰四十四法少陽篇

不言法太陰篇註曰三法少陰篇註曰二十三法厥陰篇註曰六法不可發汗篇註曰一法可發汗篇註曰四十一法發汗後篇註曰二十五法可吐篇註曰二法不可下篇註曰四法可下篇註曰四十四法汗吐下後篇註曰四十八法以其所註之數通計之得三百八十七法然少陽篇有小柴胡湯一法其不言者恐脫之也又可吐篇却有五法其止言二法者恐誤也併此脫誤四法於三百九十七法之中亦僅得三百九十一法耳較之序文之說猶欠六法乃參之脈經其可汗可吐等篇外比傷寒論又多可溫可灸可刺可水可火不可刺不可灸不可水不可火諸篇欲以此補其所欠則又甚多而不可用元泰定間程德齋又作傷寒鈐法其自序曰若能精究是編則知六經傳變三百九十七法在於指掌矣又曰六經二百一十一法霍亂六法陰陽易差後勞復六法痓濕暍九法不可汗二十六法宜汗四十一法不可吐五法不可下五法可汗五法可吐五法餘亦以其說通計之却止得三百一十八法於三百九十七法中尚

欠七十八法觀其序文乃如彼考其所計乃如此則知其猶未能灼然以得其實數而無疑也故下文細數中止重敘六經霍亂痓濕暍陰陽易差後勞復諸法而已彼可汗不可汗等諸法再不重敘也近批點傷寒論者何不攷其非乃一宗其所鈐字號而不敢少易乎余由是屏去其說但卽論之本文寢食與俱以細繹之一旦豁然始悟其所計之數於理不通而非仲景叔和之說矣夫傷寒論仲景之所作也至叔和時已多散落雖叔和搜采成書終不能復其舊然則今之所傳者非全書也明矣後之昧者乃不察此必欲以全書視之爲鈐爲括斷之曰某經幾證某經幾證以謂傷寒治法略無餘蘊矣殊不知其間有論無方者甚多至若前篇引內經所敘六經病證除太陽少陰證爲後篇所有外其陽明篇無目疼少陽篇言胷脅滿而不言痛太陰篇無嗌乾厥陰篇無囊縮若此者非皆本無也必有之而脫之耳雖然爲鈐括者膠柱調瑟但知叔和之重載而莫知其所以重載之意也夫叔和既撰次於搜采之餘復重載各篇方

治并諸可與不可方治者非他不過慮人惑於紛亂故示之以簡便而已林億乃不解其意遂不問重與不重一概通數之以立總目何不觀重載八篇之中其方治者止有一十五條爲六經篇之所無其餘一百五十三條皆六經篇已數過者安有一法而當兩數之理乎雖程德齋去取與林億頗異然亦五十步笑百步耳其不重數發汗後并吐汗下後諸法固爲是矣至於宜汗四十一法却又俱是一法當兩數者與林億所計何以異哉推原其意似亦不見林億所計細數止聞三百九十七法之目遂自就論中尋而數之欲以實其總數然而卒不能實故爲此含糊之說以欺後人反又不逮林億所言也竊嘗思之縱使三百九十七法之言不出於林億等而出於億之前亦不足用此言既出則後之聞者必當覈其是非以歸於正而乃遵守聽從以爲千載不易之定論悲夫余今於三百九十七法內除去重複者與無方治者止以有方治而不重複者計之得二百三十八條并以治字易法字而曰二百三十八治如此則庶或可

通也若以法言則仲景一書無非法也豈獨有方者然後爲法哉且如論證論脈與夫諄諄敎戒而使人按之以爲望聞問切之準則者其可謂之法乎其不可謂之法乎雖然六經之外諸條其二家去取不同固不必辨然其於六經之中尤每有悖理而不通者姑陳一二如太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此爲壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與之也常須識此勿令誤也若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也林億所校本則自太陽病止勿令誤也爲一法自若酒客病止杏子佳爲一法自凡服桂枝湯止吐膿血也則爲證不爲法程德齋鈐法則自太陽病止隨證治之爲一法自桂枝本爲解肌止必吐膿血也爲一法又林億本於病脅下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死一條則數爲一法於其餘死不治者則皆不數程德齋鈐法於陽明

病下血讝語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濈然汗出愈一條則不數而太陽刺肝俞肺俞期門諸條却又數之而勿遺餘如兩條同類一云當汗而無方一云當汗而有方則取其有方者而略其無方者又如當取而不取不當取而取者蓋亦甚多不可悉舉若此者悖理不通二家皆所不免所謂楚固失矣齊亦未爲得也苟熟玩論之本文以較其言則罅漏出矣

四逆厥辨

成無己註傷寒論有云四逆者四肢不溫也厥者手足冷也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不溫及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆經曰少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之方用柴胡枳實芍藥甘草四者皆寒冷之物而專主四逆之疾是知四逆非虛寒之證也四逆與厥相近而非經曰諸四逆厥者不可下是四逆與厥有異也吁斯言也所謂彌近理而大亂眞者歟竊

嘗攷之仲景言四逆與厥者非一或曰四逆或曰厥或曰厥逆或曰厥冷或曰厥寒或曰手足逆冷或曰手足厥逆或曰手足厥冷或曰手足厥逆冷細詳其義俱是言寒冷耳故厥逆二字每每互言未嘗分逆爲不溫厥爲冷也然四肢與手足却有所分其以四字加於逆字之上者是通指手足臂脛以上言也其以手足二字加於厥逆厥冷等之上及無手足二字者是獨指手足言也既曰不溫卽爲冷矣尚何異乎仲景所謂諸四逆厥者不可下蓋以四逆爲四肢通冷厥爲手足獨冷而臂與脛以上不冷耳不謂逆厥有不溫與冷之別也故又曰厥者手足逆冷是也以逆冷二字釋厥字足見逆卽厥厥卽逆也故字書曰厥者逆也雖然逆厥雖俱爲寒冷而却有陰陽之殊焉熱極而成逆厥者陽極似陰也寒極而成逆厥者獨陰無陽也陽極似陰固用寒藥獨陰無陽固用熱藥仲景以四逆散寒藥治四逆一條此陽極似陰之四逆也其無四逆湯熱藥治四逆之條者安知其非本有而失之乎且四逆湯之名由四肢之冷而立也

今以四逆湯治手足厥冷豈非逆厥之不異乎旣以四逆爲四肢不溫厥爲手足獨冷何故不名治厥之藥爲四厥湯乎成氏於四逆散治四逆條下謂四逆爲熱邪所爲及於明理論謂四逆非虛寒之證矣至於少陰病死證二條下却謂四逆爲寒甚若此者得不自悖其說乎是知四逆亦猶厥之有寒有熱固不可謂四逆專爲熱邪所作也但四肢通冷比之手足獨冷則有間耳故仲景曰少陰病吐利躁煩四逆者死又曰少陰病四逆惡寒而身踡脈不至不煩而躁者死又曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之此三條者二爲死一爲可治雖通由諸證兼見而然然死者以四逆言可治者以厥冷言則亦可見四逆與手足厥冷之有輕重淺深矣夫四肢通冷其病爲重手足獨冷其病爲輕雖婦人小子亦能知之成氏乃謂厥甚於逆何邪若能知四逆厥之所以異者在於獨指手足言與兼指臂脛以上言則不勞創爲不溫與冷之曲說而自然貫通矣

六四九

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十五卷目錄

醫部彙考三百四十五

傷寒門十一

陶華全生集

提綱　統論　標本　傳足不傳
手論　三陰無傳經　辨正傷寒
溫病熱證　辨傷寒傷風中寒不同　審證問
因察形正名　傳經證治脈要　辨內外傷
察色　聽聲　觀形　視鼻　詳口唇齒牙
驗耳　看目　審舌　按心胷有無痛處　問
大小便通利　問渴與不渴　持脈手法　浮
中沉三候脈形狀主病

藝術典第三百六十五卷

醫部彙考三百四十五

傷寒門十一

明陶華全生集

提綱

傷寒一證原有活人書明理論指掌圖傷寒論其中有論闕方者有方闕論者有脉無證者有證無法者蓋仲景之書歷年既久遺失頗多王叔和以斷簡殘編而補方造論成無己乃順文註釋而苴集成書所

以遺禍至今而未止也今之治傷寒者一二日不問屬虛屬實便用麻黃桂枝之類汗之三四日不問在經在腑便用柴胡葛根之類和之五六日不問在表在裏便用承氣之類下之以致內外俱虛變證蜂起殊不知人之表裏虛實不同邪之傳變有異豈可以日數爲準耶蓋風寒乃天之客邪其中於人也或入於陰或入於陽原無定體非但始太陽而終厥陰也或有自太陽始日傳一經六日傳至厥陰邪氣自衰不傳而愈者或有不罷再傳者或有即傳者或有間經而傳者或有傳至二三經而止者或有始終只在一經者或有越經而傳者或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成寒證者或有直中陰經而成眞寒證者或有足經客熱而傳入手經者或有證變者或有脈變者或有取證不取脈者或有取脈不取證者皆緣經無明文後人妄治使蒙害者多矣夫麻黃桂枝二湯仲景原爲冬月正傷寒立也今人乃以之通治非時暴寒溫暑又將傳經陰證與直中陰經之陰證混同立論豈不誤乎蓋暴寒溫暑原別有方直中陰

經必有別法今皆亡失而無徵也古人引領後進書不盡言言不盡意要在學者心領神會活潑潑地如珠走盤如見太陽證者宜直攻太陽如見少陰證者宜直攻少陰此活法也仲景云日數雖多但見表證而脉浮者尤宜汗之日數雖少但有裏證而脉沉者亦宜下之况其取方立論甚嚴曰可溫曰可下曰少與曰急下與夫先溫其裏乃攻其表先解其表乃攻其裏此確論也切不可執定一二日發表三四日和解五六日方下必須審脉驗證辨名定經一一親切無疑方可下手眞知其表邪而汗之眞知其裏邪而下之眞知其爲直陰經中而溫之如此而汗如此而下又如此而溫則桂枝承氣投之不差薑附理中發而必當若投劑少差死證立見矣可不深思而熟慮哉嗟夫常病用常法不見爲難設有感冒非時而認作正傷寒者有直中陰經眞寒證而認作傳經之熱證者有夾陰傷寒夾陰中寒而作正傷寒者有內傷寒而作外傷寒者有類傷寒之雜證而作眞傷寒者有寒疫而作時疫者有濕溫而作風溫者有中濕而

作風濕者有暑證而作傷寒者有如狂而作發狂者有血證發黃而作濕熱發黃者有蚊迹而作發斑者有動少陰血而作鼻衄者有譫語而作狂言者有獨語而作鄭聲者有女勞復而作陰陽易者有短氣而認作發喘者有痞滿而認作結胷者有傷寒下利純清水而俗呼爲漏底者有噦而認作乾嘔者有併病而作合病者有正陽明腑病而作陽明經病者有太陽無脉而便認作死證者有裏惡寒而認作表惡寒者有表發熱而認作裏發熱者有陰躁而認作陽狂者有少陰發熱而認作太陽證者有標本全不曉者嗚呼胷中若不以證脉講明論方得法但執成方以治人一匕妄施禍如反掌此殺人不用刀耳

統論

夫傷寒三百九十七法無出於表裏虛實陰陽冷熱八者而已若能明此八者則三百九十七法可得一定於胷中也何以言之有表實表虛有裏實裏虛有表裏俱實有表裏俱虛有表寒裏熱有表熱裏寒有表裏俱寒有表裏俱熱有陰證有陽證其所治各不

同要當明辨而治之也其表實者脉浮緊頭疼發熱惡寒體痛而無汗也治宜發表汗之表虛者脉浮緩頭疼發熱惡風體痛而有汗也治宜實表散邪其裏實者腹中硬滿或痛大便不通潮熱譫語妄言發渴脉實有力治宜下之裏虛者腹鳴自利嘔吐有寒有熱詳見自利嘔吐條下如表裏俱實者內外皆熱脉數有力而無汗輕用通解散重用三黃石膏湯通解表裏也若夫燥熱飲水而脉洪數者用人參白虎湯大便不通者下之半表半裏之證宜和解之如表裏俱虛者自汗自利而或吐內外皆虛脉必浮細無力宜溫補之如表寒裏熱者身寒厥冷脉滑數口燥渴輕則四逆散人參白虎湯重則承氣湯下之如裏寒表熱者發熱下利身痛面赤煩躁脉沉足冷治宜溫補如陽證發熱則脉洪數而有力陰證發熱則脉沉細而無力或陰證發熱亦有脉來大者按之必無力而散乃虛陽伏陰也當明辨之

標本

夫傷寒標本不明如瞽者夜行無路可見也然標者

病之梢末本者病之根源先受病謂之本次受病謂之標標本相傳先以治其急者此良法也假如先起頭痛惡寒就爲本已後發熱乃爲標此受病之標本也浮沉爲本虛實爲標此脉之標本也

傳足不傳手論

傳足不傳手者此庸俗之謬論豈有是哉人之充滿一身無非血氣所養晝夜循環運行不息焉有止行於足不行於手之理乎况風寒中人先入榮衛其傷寒者乃冬時感寒卽病之名冬乃坎水用事其氣嚴凝水冰地凍在時則足太陽少陰正司其令觸冒之者則二經受病其次則足少陽厥陰繼冬而司春令亦受傷何也蓋風木之令起於大寒節正當十二月至春分後方行溫令故風寒亦能傷之足陽明太陰中土也與冬時無預而亦受傷寒者緣土無定位無成名無專氣寄王於四時能始終萬物故四時寒熱溫凉之氣皆能傷之也況表邪傷寒必歸於脾胃而爲燥屎宜承氣下之則胃氣和矣手之六經主於夏秋故不傷也足之六經蓋受傷之方分境界也若言

傷足不傷手則可以爲傳足不傳手則不可也設或不傳氣逆作喘何經而來仲景設有麻黃桂枝乃肺經藥也請試思之又傷寒至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語一二句目赤脣焦口乾不飲水稀粥與之則嚥終日不與則不思六脉沉數而不洪心下不痞腹中不滿大小便如常或至十日以來形如醉人醫見神昏不語多用承氣下之則誤矣蓋不知此熱傳少陰心也然未知是何經而來答曰太陽傷風風爲陽邪陽邪傳衞陰血自燥熱入膀胱壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火上而逼肺金所以神昏也謂肺爲清虛之臟內有火邪宜梔子黃芩黃連湯若熱在丙宜導赤散熱在丁宜瀉心湯若誤用凉膈散乃氣用血藥也如左手寸脉沉滑有力者則可下之或用犀角地黃湯近於是也若無犀角以升麻代之且陽明經藥也此解陽明經血中熱也若浮沉俱有力者是丙丁中俱有熱也可用導赤瀉心各半服之宜矣此證膀胱傳丙足傳手經也又謂腑傳臟也又下傳上也丙傳丁者表傳裏也壬傳丁者坎傳

離也名曰經傳活人書云傷寒只傳足經不傳手經者此言不盡之意又從足經而傳手經者何以知之經曰傷寒止傳一經或間一二經不可一途取之但憑外證與脉叅之此活法也與食則噦者知邪不在胃也不與則不思者以其神昏故也熱邪既不在胃悮與承氣下之其死必矣豈虛語哉

三陰無傳經

凡傷寒自三陽傳進三陰入裏爲盡無所復傳故言無傳經若言再傳者足傳手經也其三陰直中眞寒證一身受邪無分經絡亦不再傳也

辨正傷寒溫病熱證

夫傷寒者自霜降後至春分前天令嚴寒水冰地凍而成殺厲之氣人觸犯之卽時病者爲正傷寒若雖冬月而天令溫煖感之則爲冬溫如至春分節後天令溫煖人感壯熱而病者爲溫病若雖至春分而天令尚寒冰雪未解而感寒者亦傷寒也若三四五六七八月之間天道忽有暴寒感之而爲病者此時行寒疫也卽感冒傷寒若夏至後人感壯熱脉洪大者

爲熱病若四時天令不正感而爲病長幼率皆相似互相傳染者此名時氣夫時氣者一曰時疫蓋受天行疫癘之氣而爲病乃非傷寒比也然又有溫瘧風溫濕溫溫毒溫疫中風傷風中濕風濕中暑中暍等證一皆發熱狀似傷寒故醫家通以傷寒稱之其通稱傷寒者因發熱傳變皆相類也至於用藥則不同矣故發表解肌略有分別其冬月爲正傷寒者人之著寒而卽病也壯者氣行則愈怯者著而成病若不卽病至春變爲溫病至夏變爲熱病夫溫熱二病乃冬月伏寒之所變既變之後不得復言寒矣其寒疫者乃天之暴寒與冬時嚴寒但有輕重之別略可通稱傷寒而治也經云名正則言順名不正則言不順矣故傷寒乃病之總名識其名則其效雖有遲速亦無失矣不識其名而妄治以中暑作熱病而復加燥熱之劑以濕溫作風溫而復加發汗豈不死哉

辨傷寒傷風中寒不同

傷寒者冬月寒邪傷於足太陽經卽時病者爲正傷寒其證便有頭疼發熱惡寒脈浮緊而無汗治宜發

表自然熱退身凉若傳陽明經便有目痛鼻乾不眠脉微洪之證治宜解肌若傳至少陽便有脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦脉弦數之證治宜和解表裏若表證皆除傳進三陰反見怕熱揭去衣被躁渴譫語潮熱斑黃狂亂大便不通脉沉實而有力治宜急下大便通而其熱愈矣若傷風者初起頭疼發熱惡寒脉浮緩自汗鼻塞聲重此名傷風亦是太陽病起若傳至各經依前傷寒條下治之其春夏秋三時雖有惡寒身熱微頭疼卽爲感冒非時暴寒之輕非比冬時正傷寒爲重

若中寒者寒邪卒時直中陰經卽發而暴也一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解比之傷寒爲尤甚如寒中太陰中脘腹痛嘔吐滿悶其脉遲緩宜藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰則臍腹疼痛或吐瀉厥冷踡臥其脉沉細宜五積散加茱萸寒甚足冷加附子四逆湯如寒中厥陰則小腹至陰疼痛口吐涎沫其脉沉遲用茱萸附子四逆湯寒甚手足指甲唇皆青舌捲囊縮脉伏絕者用蒸臍法及

大劑薑附以溫之不然則死矣

審證問因察形正名

夫審證問因察形正名與脈俱當乃可以言治也若不明證而治則害人於彈指間矣凡至病家未診先問最爲有準故當問其得病之因所有輕重之異且四時天令惟冬寒爲重暴寒爲輕傷寒爲重感寒爲輕中寒尤甚重也中寒者寒邪直中陰經故曰尤重也有因空腹而著寒有因脫著衣服而著寒有因汗出當風而著寒有因睡臥傍風而著寒有因勞力辛苦而著寒有因慾事不謹而著寒有因先傷於食而後傷於寒此問因之大法也其審證察形者蓋傷寒有一病則有一形證見於外可察而知之舉其六經形證者言之以證所生之病證脈相同藥無不應矣太陽病家如言病人發熱惡寒頭項痛腰脊強惡心拘急體痛骨節疼則知是太陽經表證標病也若加發熱煩渴小便不利則知是太陽經傳裏證本病熱結膀胱也若或有汗惡風不惡寒則知是傷風而非傷寒也其脉浮緊有力爲傷寒浮緩無力爲傷風其

要在脉靜爲不傳脉躁盛爲傳也傷風脉當浮緩而反緊盛者其證熱盛而煩手足皆溫則知是傷風而得傷寒脉躁盛爲傳也傷寒脉當浮緊而反浮緩者其證不煩少熱四肢厥冷則知是傷寒元氣虛而得傷風脉也若或身熱惡寒頭疼而脉反沉則知是太陽得少陰脉也若無頭疼但有身熱惡寒而脉沉則知其病還在少陰經也陽明病家如言身熱微惡寒頭額目痛鼻乾不眠則是陽明經表證標病也若加身熱煩渴欲飲汗出惡熱則知是陽明經傳裏證本病也若潮熱自汗讝語發渴不惡寒而反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂大便燥實不通或手足乍溫乍冷腹滿硬痛喘急則知是正陽明胃腑傳裏本實病也其脉微洪爲標洪數爲本沉數爲實也少陽病家如言頭角痛而目眩胷脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦心下滿悶則知是少陽經病也其脉乃弦數焉太陰病家如言身體壯熱腹痛咽乾手足溫或自利不渴則知是陽經熱邪傳太陰經標病也若加燥渴腹滿身目黃小水赤大便燥實不通則知是太

陰經傳本病也若初病起頭不疼口不渴身不熱就便怕寒手足冷中脘腹滿痛吐瀉小便清白或嘔噦則知是太陰經直中本病也若初病起無熱不渴止有胷膈䐜脹滿悶面脣皆無光澤或嘔胷腹急痛手足冷自覺不舒快少情緒則知是太陰經因生冷傷於脾胃而爲內傷寒也其脉沉緩爲標沉實爲本沉細直中也其內傷寒亦沉細爲少陰病家如言引衣踡臥而惡寒或舌乾口燥讝語發渴大便不通則知是陽經熱邪傳少陰標病若或身熱面赤足冷脉沉則知是腎經自受夾陰傷寒標與本病也若加煩躁欲坐臥泥水井中雖欲飲而不受面赤脉沉足冷則知是陰極發躁本病也若身熱面赤足冷煩躁欲飲揭去衣服脉數大無力則知是虛陽伏陰標與本病也若初病起頭不疼口不渴身不熱就便怕寒厥冷踡臥或臍腹痛而吐瀉或戰慄面如刀刮則知是腎經直中本病也若無熱惡寒面色青小腹絞痛足冷脉沉踡臥不渴或吐利甚則舌卷囊縮昏沉不省手足指甲皆青冷過肘膝心下脹滿湯藥不受則知是

腎經夾陰中寒本病也若身熱面赤足冷脈沉身疼痛下利清穀則知是陰利寒證俗呼漏底也其脈沉實有力爲陽經熱邪傳入少陰標病也脈沉細無力爲直中寒證數大無力爲虛陽伏陰其夾陰傷寒陰極發躁脈皆沉也厥陰病家如言發熱惡寒似瘧狀則知是陽經熱邪傳入厥陰經標病也若煩滿囊拳消渴舌卷譫妄大便不通手足乍溫乍冷則知是陽經熱邪傳入厥陰經傳標病也若初病起頭不疼口不渴身不熱就便怕寒四肢厥冷或小腹至陰疼痛或吐瀉體痛嘔噦涎沫甚則手足指甲面唇皆青冷過肘膝不溫舌卷囊縮則知是厥陰經直中本病也其脈浮緩爲標微浮微緩不嘔清便標病自愈也沉實有力爲標微細無力或伏絕爲直中也又有頭痛發熱惡寒身不痛或噯氣或作酸或惡聞食臭或欲吐而不出或吐之而不盡或惡心或短氣或痞滿或䐜脹或胃口作痛或腹中痛或心下痞塞按之則痛則知是飲食內傷之證若頭疼身熱惡寒拘急惡心中脘痞滿或吐或嘔或痛或瀉則知是夾食傷寒也

若頭疼身熱惡寒微汗微渴踡臥懶言脅痛骨腿痠疼則知是勞力傷寒也若身熱惡寒隱隱頭痛喘欬煩悶胷脅體痛左脉緊盛右脉洪滑或寸脉沉伏者則知是夾痰傷寒也若頭痛身熱惡寒脅痛脹滿體痛氣鬱不舒左脉緊盛右脉沉者則知是夾氣傷寒也若心胷脅痛小腹有痛處不移一般頭疼身熱惡寒煩渴則知是血鬱內傷外感也大凡陽證則身熱脉大有力而足煖陰證則身寒脉小無力而足冷然少陰雖有身熱六脉無力而足寒故少陰得太陽證也夫正其名者蓋名正則言順名不正則言不順矣傷寒有傷風傷暑傷濕溫病熱病時氣寒疫冬溫溫毒風濕濕溫中暍等證皆以傷寒稱之殊不知傷寒乃病之總名也各從本條下治之夫以傷寒言證不言病者有明證見證之義存焉就如婦證奸而贓證盜與兩證殺則病對證之義明不得逃其情矣且人之心肝脾肺腎藏而不見若夫耳目口舌鼻則露出而可見者也五臟受病人豈能知之蓋有諸中必形諸外故肝病則目不能視心病則舌不能言脾病則

口不知味肺病則鼻不聞香臭腎病則耳不能聽聲以此言之其證最親切可知矣緣太陽受病則證見出頭疼發熱惡寒一有傷之本經之證立見矣以此首經推之餘經不言可知故言證不言病耳設若脈證不明誤用麻黃令人汗多亡陽若誤用承氣令人大便不禁若誤用薑附令人失血發狂寒冷耗其胃氣燥熱助其邪氣辛熱損其津液庸醫殺人莫此爲甚傷寒實無定體或入陽經氣分則太陽爲首或入陰經血分則少陰爲先脈有浮沉虛實證乃傳變不常治之之法先分表裏虛實陰陽寒熱標本此爲上工問證以知其外察脈以知其內全在活法不可拘於日數但見一二證在便作主張不必悉具當如何處治若同而異者明之似是而非者辨之在表者汗之散之在裏者利之下之在上者因而越之下陷者升而舉之從乎中者和解之直中陰經者宜溫補之但解表不開不可攻裏日數雖多但見表證而脈浮者尚宜汗之此理不明攻之爲逆經云一逆尚引日再逆促命期表既解而裏證具者不可不攻裏也日

數雖少但見裏證而脉沉實者亦宜下之此理不明禍如反掌經云邪氣未除復加燥熱卽抱薪救火也如直中陰經眞寒證則無熱惡寒腹痛吐瀉厥冷急宜溫補切禁寒凉此理不明殺人甚速經云非徒無益而又害之或有病在一經有用熱藥者有用寒藥者如少陰證用白虎湯四逆散寒藥也少陰證用四逆湯眞武湯熱藥也庸俗狐疑詎能眞知而措手哉嗚呼能察傷寒之正名得傷寒之方脉如此親切乃爲良醫必能知寒藥治少陰乃傳經熱證也熱藥治少陰乃直中寒證也傷寒以日數言者此大約之法非活法也內經云人傷於寒則爲病熱而無寒者此言常而不言變也仲景論或寒或熱者言其變也合常與變而弗遺者正所謂道並行而不相悖而反相爲用也此其所以爲萬世之準繩歟夫其傳變者其邪熱乘虛入經則傳也若經實則不受邪而不傳也太陽乃諸陽之首傳至厥陰厥者盡也正氣將復而邪氣將解水升火降寒邪去而大汗解矣若正氣不復邪無所解陽勝陰極則舌捲耳聾囊縮不知人事

而死矣邪在陽經則易治傳入陰經則危殆蓋陽盛而陰微正虛而邪實也又有正氣虛極陰氣獨盛則四肢厥冷舌捲囊縮而死矣此指寒證而言也皃誤下邪陷誤汗經壞至害也歟然又有婦人胎產而傷寒者不與男子同治法無胎產者治相同過經不解者但當見證施治也

凡冬間正傷寒須依此書用藥看脉無有不應若瘟疫時證不須論脉但無怪脉則不妨切不可發汗此病定一七或二三七自然汗出身凉而愈只須小柴胡見熱甚合解毒湯只要扶之使正便是醫之功也若發汗雖汗而熱不退益重其虛切戒切戒

傳經證治脉要

凡察傷寒脉法得其綱領如拾芥耳求之多岐則支離破碎如涉海問津矣蓋脉與證理一而已浮大動數滑爲陽沉濇弱弦微爲陰然脉理精深今人何能到此田地夫脉者天眞委和之氣乃榮衞之道路實先天後天之造化人之陰陽爲先天人之氣血爲後天無所窮盡指下難明者眞言也誇言通曉者但能

言而不能行也乎專以浮中沉三脉候而治之察其陰陽表裏虛實如見其肺肝然無所逃其情矣原夫傷寒因寒邪自外入內而傷之其入則有淺深次第自表達裏先入皮膚肌肉次入筋骨腸胃以此推之不難也且風寒初入或先在太陽寒水之經此經本寒標熱便有惡風惡寒頭疼發熱之證見矣蓋寒鬱皮毛是爲表證若在他經則無此證矣脉若浮緊無汗爲傷寒當發表得汗爲解脉若浮緩有汗爲傷風當實表散邪汗止爲解若無頭疼惡寒脉又不浮此表證罷而在中中者何也即半表半裏之間乃陽明少陽之分脉不浮不沉在乎肌肉之間即皮膚之下然亦有二焉若脉微洪而長陽明脉也其證則目痛鼻乾不眠微惡寒微頭疼用解肌便宜和解表裏若脉弦數少陽經脉也其證胷脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦頭角微痛如見此證此脉便宜和解表裏蓋陽明少陽二經不從標本從乎中治過此邪傳入裏爲熱脉不浮而沉沉則按至筋骨之間而得者方是若脉來沉實有力外證不惡風寒而反惡熱譫語躁熱

燥渴或潮熱自汗或腹滿硬痛喘急或揭去衣被揚手擲足五六日不通大便明其熱入於裏腸胃燥實宜下之大便旣通其熱自愈若脉來沉遲無力此爲直中陰經眞寒也其證無頭疼無身熱初病起怕寒手足厥冷或戰慄踡臥不渴或兼腹痛嘔吐瀉痢或口吐涎沫面如刀刮者乃陰經自中之寒不從陽經傳入故不在傳經熱證治例更當量輕重以溫之若脉沉足冷面赤微熱此皆夾陰傷寒也又有脉沉足冷面青小腹絞痛無熱者此皆夾陰中寒也重則舌捲囊縮蓋此二者先因慾事勞傷腎經虛損復感寒邪急宜溫經散寒爲當也其中緊要關節吾再表而出之太陽者陽證之表陽明者陽證之裏少陽者二陽三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證然三陰俱是沉脉妙在指下有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒最爲心妙其三陽經證前旣已言不再多錄若夫三陰傳經熱證脉雖開明證猶未決重言發明如腹滿咽乾屬太陰舌乾口燥屬少陰煩悶滿囊拳屬厥陰此三者俱

從陽經傳入陰經之熱證脉見沉實有力但當攻裏下之如下後利不止身疼痛脉反無力者又當救裏溫之三陰傳經熱證與三陰直中寒證脉沉雖同有力無力則異證有異而治各不同是其大法也如其正陽明胃腑病本風壓氣實見潮熱自汗讝語發渴手足乍溫乍冷脉見沉數有力大便不通者亦當攻裏下之乃因陽經邪熱傳入胃腑而有燥屎此指腑病亦屬裏而言也實證治之奇功指法之元妙祕之不與俗人言可也今將持脉手法并將浮中沉三圖圖下就註證治之法使因脉以知證緣證以明治比此達彼由粗入精永爲後人之宗驗也

辨內外傷

內傷外感俱有寒熱醫家不能明脉得證呼作傷寒妄施汗下吐溫之法輕變重而死者多矣夫外傷有餘者則寒熱齊作而無間外傷惡寒雖近烈火不除外傷惡風乃禁一切之風外傷顯在鼻故鼻氣不利擁盛有力外傷則邪氣有餘發言壯厲且先輕後重外傷則手背熱而手心不熱左手脉來緊盛而右手

平和此是外感傷寒證也當作正傷寒治之必矣內傷不足者則寒熱間作而不齊內傷惡寒得溫煖卽解內傷惡風微惡些少諸風內傷顯在口故口不知味而腹中不和內傷則元氣不足出言懶怯且先重後輕內傷則手心熱而手背不熱右手脈來空大無力而左手寸口或微或濇此是內傷不足之證當用補中益氣法例治之必矣大抵有內傷而無外感者有外感而無內傷者以此別之則其證判然免致重實重虛醫殺之患也苟或內傷外感兼病而相挾出者則脈證必並見而難辨若顯內證多者則是內傷重外感輕當以補養爲先微以解表爲次若顯外證多者則外感重而內傷輕當以發散爲先補養爲次凡此外感夾內傷者甚多經云邪之所湊其氣必虛脈來左手必緊盛右手雖數大無力只因勞力辛苦內傷血氣又兼外感寒邪其證骨腿痠疼脅痛微汗惡寒身熱頭疼微渴倦臥懶言此是勞力傷寒必以溫補元氣兼發散藥中求之有下證者宜緩下之有痰挾外感者左寸緊盛右關洪滑其證喘欬身熱惡

寒頭疼骨節痛卽是夾痰傷寒必以痰藥兼發散藥中求之後以消痰降火之劑有食鬱夾外感者其脉左右俱緊盛有力其證必噫氣作酸惡聞食臭或胃口作痛心下痞滿惡心或欲吐不吐或吐之不盡必身熱頭疼惡寒卽是夾食傷寒必以解表藥爲先後以消食藥爲次其夾陰傷寒伏陰傷寒眞陰傷寒備開前條不錄凡此數者醫家之心妙也

察色

凡看傷寒察其色爲先觀其形爲次切脉審證參合以決死生吉凶也夫色有青黃赤黑白隱於面部皮裏氣有如亂絲亂髮之狀隱於皮裏也蓋五臟有五色六經有六色皆見於面以應五行相生者吉相尅者凶滋榮者生枯夭者死自命宮印堂年壽準頭髮會人中等處皆有氣色其滋潤而明亮者吉暗而枯燥者凶又當分四時生尅之理而通察之故以傷寒五色之要者備開覽焉

青色屬木主風主痛乃足厥陰肝經之色見也凡面青脣青陰寒極也若舌卷囊縮急溫之如夾陰中寒

小腹絞痛面色青者亦當溫散青如翠羽者吉青如滋草者死青而黑青而紅者相生而吉如青而白青而枯燥者死若脾病見青氣則難治也

赤色屬火主熱乃手少陰心經之色見也在傷寒見之則有一陰三陽之分如足太陽屬水寒則水黑熱則紅也面色緣緣正赤者此陽氣怫鬱在表汗不徹故也當發其汗陽明面合赤色者不可攻之合則遍也謂表未解不可攻裏宜解肌合正陽明內實惡熱不惡寒或蒸蒸發熱或日晡潮熱讝語大便祕結脈沉數有力面赤此裏內熱宜下之如表裏俱熱口燥舌乾飲水脈數面赤裏未實者未可下宜人參白虎湯和之如少陽病半表裏脈弦數而面赤者宜小柴胡和解少陰病下利清穀裏寒外熱脈沉細而面赤者四逆湯溫之此陰寒內極逼其浮火上行於面故發赤色非熱也誤投寒藥即死又夾陰傷寒虛陽泛上面色亦赤但足冷脈沉者是也及陰極發躁欲坐臥泥水井中脈沉足冷微熱面赤雖欲飲不受即陰證似陽也若足冷脈沉細雖煩躁不飲水面赤者即

陰盛隔陽也其伏陰脉數大無力煩躁引飲此虛陽上升面色亦赤此四者俱當溫之悞投寒藥即死再若病久虛人午後面與顴頰赤色此陰火上升不可作傷寒妄治然三陽之氣皆會於頭額上至頂巔絡腦後者屬太陽從額至鼻下於面屬陽明從頭角下耳中前後者屬少陽但有紅氣赤腫者蓋是大頭傷寒正要知此部分凡心熱則額先赤脾熱則鼻先赤肝熱則左頰赤肺熱則右頰赤腎熱則兩頤赤若赤而青赤而黃相生而吉赤而黑則相尅而凶赤如鷄冠者生赤如衃血者死若命宮印堂年壽準頭髮會人中等處赤氣明潤者生枯夭者死若肺病色赤則難治也

黃色屬土主濕乃足太陰脾經之色見也凡脾胃濕熱所蒸而目身黃小水短濇者屬濕熱發黃宜分利之若小腹滿硬而痛而目身黃小水自利者屬畜血證發黃宜下盡黑物則愈若黃而白黃而紅者相生而吉黃而青相尅而死黃如蟹腹者生黃如枳實者死病欲愈者目皆黃長夏見黃白則吉黃青則凶或

腎病若見黃色則難治也

白色屬金主氣血不足乃手太陰肺經之色見也白如豬膏者吉白如枯骨者死凡命宮印堂年壽準頭髮會人中等處白而枯夭者凶白而光潤者吉若白而黃白而黑者相生而吉白而赤者相尅而凶凡傷寒面白爲無神因發汗過多或脫血所致凡面白人不宜大汗爲血少故也若肝病見白色則難治也

黑色屬水主寒主痛乃足少陰腎經之色見也凡黑而白黑而青者相生則吉黑而黃相尅則凶黑如烏羽者生黑如炭煤者死若命宮印堂年壽準頭髮會人中等處黑氣枯夭者死閃亮者生黑氣自魚尾相牽入太陽者死黑氣自髮會人中入口者死黑氣自入耳目口鼻枯夭者死凡傷寒面黑之人不宜參芪大補心病見黑氣則難治也

聽聲

凡治傷寒若見病人寒熱交作出言壯厲先輕後重此是外感陽證有餘看在經在腑當發表攻裏若見寒熱間作語言懶怯倦臥且先重後輕此是內傷陰

證不足當溫補元氣若見病人身熱口渴大便不通脉來有力口出無倫語曰讝語無稽妄亂曰狂言分虛實看身不熱口不渴脉沉細無力便不實自利言語不接續者曰鄭聲宜溫補若病人初起頭疼身熱惡寒欬嗽鼻塞聲重曰傷風當疎風解表聲嘶者肺有風熱宜清肺經若見脣口生瘡聲啞者曰狐惑若見口噤難言手足攣搐曰風證治法各開本條若見卒中風痰涎湧盛口噤不言或脉絕目直視遺尿者難治聲如鼻鼾者亦難治但見病人喉中漉漉有聲者即痰也宜吐之

觀形

凡看病人身輕自能轉動者易治身重不能轉動者難醫若見口渴揭去衣被脉來有力手足露直揚手擲足者此爲陽證法當下之若身無熱欲得衣蓋踡臥不渴脉沉細昏倦者曰陰寒法當溫之若見口噤難言手足牽引者曰風證治在本條若見病人叉手冒心因汗過多陰虛法當消熱養心血若見兩手尋衣摸牀曰撮空雖云死證此肝熱乘於肺金元氣不

能自主神去魂亂當明可治與不可治若見身重足冷踡臥惡寒好向壁臥閉目不欲見光明懶見人言此屬陰寒法當溫之若見身如被杖疼重如山不能轉側此爲陰毒若身重痛脚手難移小水短濇此名風濕治法各開本條下若見身輕手足和煖開目欲見人言此名陽證分表裏治之若見病人身汗如油喘而不休形體不仁乍靜乍亂脉浮而洪此爲命絕若見病人頭重視身此名天柱骨倒而元氣敗矣若見皮膚潤澤者生枯燥者死形如枯骨脉脫者死屍臭者死大肉脫敗者死形瘦脉大胷中氣多者死形盛脉細短氣不足以息者危也

視鼻

凡見病人鼻頭色青腹中痛若冷者死微黑者有水氣黃者小便難白者屬氣虛赤者屬肝熱鮮明有畱飲鼻孔乾燥者必衄血鼻燥如烟煤屬陽毒熱極鼻孔冷滑而黑屬陰毒冷極鼻燥息如鼾睡屬風溫鼻塞濁涕者屬風熱鼻流清涕者屬肺寒鼻孔癖脹者屬肺熱有風乃肺絕而不治鼻衄者分點滴成流而

治之也

詳口脣齒牙

凡見病人口脣焦乾爲脾熱焦而紅者吉焦而黑者凶脣口俱腫赤者是熱極脣口俱靑黑者是寒極口苦者是膽熱口甜者是脾熱口燥咽乾者是腎熱舌乾口燥者是心熱口噤咬牙者是風痓脣口生瘡聲啞者是狐惑齒燥無津液是陽明熱極前板齒燥脈虛者是中暑脣口舌胎斷紋者難治齒如熱齒者難治脣口燥裂是脾熱若脣靑舌卷脣吻反靑環口黧黑口張直氣口如魚口脣口顫搖不止氣出不返者死證也

驗耳

若見病人耳聾脅痛寒熱嘔而口苦屬少陽宜和解冬病耳聾屬氣虛得元氣復實耳自聰也耳聾耳腫耳痛皆屬少陽風熱耳黑枯燥曰腎憊若見舌卷脣靑囊縮耳聾者難治原傷寒溫熱病耳聾者此乃爲常例也

看目

凡治傷寒先觀兩目若見目赤脣焦舌黑屬陽毒脈洪數有力大便實大渴讝語者法當下之設或大便如常脈浮洪者三黃石膏湯主之若見目黃者如小便短濇發渴惡熱熏黃色暗者屬濕熱發黃法當分利陰陽兼小腹脹滿不痛燥渴大便不通者重則茵陳湯輕則五苓散利之小便淸白其黃自退若見小水自利大便黑小腹滿硬而痛目黃者屬畜血發黃宜桃仁承氣下盡黑物則愈其黃自退二證身目俱黃者用薑柤擦法甚良開在發黃條下大抵發黃色明者專主熱也暗者主濕熱相兼如痓病則目發赤如衄血目瞑白睛黃者必發黃如身冷無熱不渴脈沉細而黃者屬陰黃法當溫之兩眦黃者病欲愈也開目見人屬陽閉目不見人屬陰若睛自明能識見者可治若睛昏不識人或目上視或眼小目瞪直視或目邪視或目睛正圓或戴眼反折或眼泡陷下皆死證也若見病人目睛微定暫時稍轉動者屬痰眼也宜吐痰出其眼珠自然流動光明也凡見目中不了了者睛不和不明白謂見一半不見一半是也此

因邪熱結實於內上蒸於目但大便得通目自明活也

治傷寒病證須先觀病人兩目次看口舌已後以兩手按其心胷至小腹有無痛處再復問其大小便通與不通渴與不渴服過何藥或久或新察其病之端的脉證相同方可以言吉凶庶得用藥無差此數件看法最爲緊關切要醫家之心法也

審舌

凡看口舌有無胎狀濕滑者吉燥澀者凶舌上白胎者胷中有寒丹田有熱故胎白而滑未入乎腑邪在半表半裏間法當和解舌上黃胎者必燥渴胃腑有邪法當下之舌上黑胎燥生芒刺者必燥渴亢極則難治也法當下之若不燥渴身不熱舌上黑胎而滑者屬陰寒法當急溫若舌卷焦黑而燥者陽毒熱極亦當下之若舌青而胎滑無熱不渴者陰毒寒極亦當溫之凡看舌鮮紅者吉青黑者凶青而紫者爲陰寒赤而紫者爲陽熱黑者乃水尅火故難治舌乃心之苗紅色應南方火本色見故吉凡見黑者屬北方

壬癸腎水來尅心火也但見舌硬舌腫舌卷舌短舌強囊縮者必難治也間有可生如舌短縮語言不清神氣昏亂脈脫者死陰陽易舌出數寸者死其夏熱病舌上黑胎燥渴者可治乃時火與邪火內外合而炎燒故舌上易生胎刺不在必死之例若黑胎刮不去易生刺裂者必死無醫冬月黑胎者實難治之此不傳之心妙也

舌胎者若邪熱在表而未入裏則無胎也邪熱在裏則生胎刺舌上津液搏結或黃或白或黑或濇或滑或生芒刺之狀凡胎白而滑者表邪猶未解也宜葛根湯解之若寒熱往來口苦而渴脈弦舌上白胎者屬少陽也小柴胡加知母天花粉葛根去半夏若舌胎黃而澀此邪傳裏漸深也宜小柴胡湯去半夏加天花粉黃連知母若熱聚於胃舌上黃胎而燥渴飲水表裏俱熱人參白虎湯加黃連天花粉山梔竹葉若內實不大便者調胃承氣湯下之若舌上黑胎而燥飲水不止讝語大便不通者急用大承氣湯下之此火熱亢極反兼水化故有此象若證未全具猶未

可下只用小柴胡湯去半夏合白虎湯加黃連若見熱極飲水不止舌上黑胎生芒刺刮不去易生刺者難治此熱毒入深十有九死是腎水來尅心火乃陽熱之胎必舌燥裂或腫或赤或澀或黃或黑或芒刺或胎白脉必沉數有力口渴蓋舌者心之苗也應南方火鮮紅濕者吉熱之故也紫腫燥者凶水尅火也又有陰寒證水極反來尅心火亦生黑胎辨其胎必濕冷滑不燥不濇不渴不熱脉必沉細足冷又當四逆湯溫之此陰寒之胎也臟結下利舌上得胎者不治熱病口乾舌黑者死舌上如白胎者不治丹田有熱而胷中有寒四者似胎未成之狀臟結脉陰陽俱緊口中氣出脣口乾燥嘔者小柴胡湯痛者理中湯踡臥足冷鼻中涕出舌上滑胎者勿妄治也到七八日已來其人微熱手足溫者此爲欲解或八日以上反大熱者此難治惡心必欲嘔也腹中痛者必欲利也一切胎狀濕滑者易治燥澀者難醫但用薄荷水浸靑布於舌上洗淨後用生薑薄片蘸水時時擦之其胎自退如夏月人病生黑胎者因時火與邪火內

外合而炎燒故舌易生胎刺不在必死之例未可斷言死證尚有可生冬月黑胎者難治此不傳之妙也

按心胷有無痛處

以手按病人心胷有無痛處若按當心下痛手不可近燥渴譫語大便實脈沉有力爲結胷證量病輕重輕則用小陷胷湯加枳桔下之重則大陷胷湯下之量元氣虛弱宜從緩治如不渴身無熱脈沉無力爲寒結胷宜理中湯溫散之若口渴有熱欲水多而心胷停飲不散有聲作痛者爲水結胷宜四苓散合小半夏湯滲利消之若欬喘發渴喉中漉漉有聲胷脅滿痛爲痰結胷用加減二陳湯消之俱用炒薑柤揉熨法若心胷雖滿悶不痛是痞滿也乃表邪塡於胷中只消小柴胡加枳殼桔梗以治其悶如未效本方對小陷胷湯一服最神速世俗皆所未識若按當心下脹滿不痛者宜瀉心湯加枳桔是治痞滿也亦用薑柤揉熨法甚良按小腹有無痛處若小腹痛而小水自利大便黑兼或身黃譫語燥渴而脈沉實者爲畜血宜桃仁承氣下盡黑物而愈按小腹雖脹滿不

硬痛小水不利卽溺澀也以五苓散利之不可大利恐傷耗津液而反燥渴如按而小腹遶臍硬痛渴而小水赤讝妄大便不通有燥屎也傷寒結胷痞滿今醫不分會下與未下便呼爲結胷便與枳桔湯反成眞結胷者有之殊不知乃因下早而成滿硬痛者爲結胷未經下者非結胷也雖滿悶不硬痛者爲痞氣乃表邪傳至胷中未入於腑證雖滿悶尚爲在表證屬少陽部分治法開結胷痞滿條下宜從緩治不宜峻利上焦乃清道至高之氣分若過下之則傷元氣也原太陽證無汗此寒傷榮血當服發汗藥爲當醫者不達而反下之榮血重傷而成痞滿太陽證自汗此風傷衛氣當服實表散邪藥爲當醫者不達而反下之衞氣重傷而成結胷蓋言榮衛陰陽也若言寒熱陰陽證者則悞之甚矣治法亦錄後條

問大小便通利

問得病人大便不通但元氣壯實熱極渴甚讝妄不候他證急宜下之無疑若病稍久元氣虛弱大便不通者宜蜜煎導法通之若或遶臍硬痛或渴甚喘急

或下利純清水心下硬痛者此皆有燥屎結實於內俱當急下如其下後利不止身疼痛踡臥沉重脈反沉遲無力又當四逆湯加參朮救裏溫之此權變之法若病人大便自利不渴無熱或下利清穀身疼痛踡臥脈來沉細無力或伏絕手足厥冷急宜四逆湯加參朮薑桂升麻肉果以溫補之若陽證協熱下利者又宜小柴胡湯合四苓散清之治法錄於後條若病人小便不通口渴或小便赤色難通者乃熱結膀胱其人如狂者俱用五苓散加減利之外用熏法不可過用利藥空耗傷津液而反燥渴也若不當利而反利之恐引邪熱入膀胱而致如狂病也

問渴與不渴

問得病人若大渴譫妄揭去衣被揚手擲足舌生胎刺脈來有力大便不通者急宜下之若大便如常小水赤澀壯熱口渴脈洪數與汗後大渴脈洪數者用人參白虎湯俱加乾薑天花粉麥冬竹葉治之若身熱躁渴嘔而口苦脅痛脈來弦數者用小柴胡加乾薑天花粉治之若病人面赤脈數大無力或沉細足

冷或躁渴不飲水雖飲水反不納者此陰極發躁又當四逆湯加麥門冬人參五味調辰砂末入蜜以溫之不可用寒涼之劑若誤用之則渴甚躁急而死若非深得仲景之妙豈能至此如見病人口不渴者知其熱邪未傳於裏裏無病也若病人渴欲飲水便知熱邪傳裏也因內水消竭欲得外水自救大渴欲飲一升止可一椀宜少少與之可令不足不可令太過若恣飲過量使水停積心下則爲水結胷等證矣射於肺爲喘爲欬畱於胃爲噫爲噦澀於皮膚爲腫畜於下焦爲癃滲於腸間則爲利下皆飲水多之過也不可不與不可強與經云若還不與非其治爲其津液枯竭無由作汗必加喘渴而死强飲須教別病生爲其成水結胷噦嘔利腫喘欬癃閉等證大抵病人飲水後用手按揉心胷脅下免致停畜爲前患也如燥渴欲飲喫生冷宜用梨子西瓜甘蔗白蜜食之如瀉利則不可食也

持脉手法

凡持脉之時必先調平自己氣息正心誠意以診之

不可思別事也男先審左女先審右以中指先按手掌後高骨下動脉應指乃關部也次下前後二指前指按寸口陽也後指按尺部陰也關爲陰陽中爲關界也若人長則疎排三指人短則密排三指人瘦則肌肉薄宜輕取人肥則肌肉厚宜重取一呼一吸爲一息大抵脉來一息四至爲平脉則無病也六部之中獨大獨小偏遲偏速此爲病脉凡脉來有力卽爲有神宜攻不宜守脉來無力卽爲無神宜補不宜瀉如輕重按之應指而起此爲有力如輕按雖應指而重按不應指起者此爲無力浮中沉六部皆然大則病進小則病退此指陽證而言沉伏病進遲緩病退此指陰證而言脉來乍大乍小乍疎乍數此爲怪脉汗下後脉當安靜而反躁亂身熱者死溫後脉當漸出而反歇止者死暴出者亦凶傷寒過經眞臟脉見者死傷寒見表證而脉伏者有邪汗也表解邪自除正如欲雨而天鬱熱晴霽而天反凉傷寒病後別無刑尅證或昏沉目昧脉或伏或靜者此欲汗也勿攻之當生脉補元氣元氣復來一汗而凉此重陰欲陽

之義便如久旱將雨六合陰晦雨後庶物皆甦此換陽吉兆傷寒腹痛脈必伏或吐瀉脫元而無脈者隨病而施將薑汁磨木香調麝香半分入獨參湯服下脈至者生不至者死傷寒之脈陰陽俱調停無偏勝三部同等脈證皆同安之兆也傷寒脈無單至必曰浮而弦浮而數沉而緊沉而細之類六部皆然浮沉之脈輕重指而取之遲數之脈呼吸息數而取之中脈者不輕不重而取之浮爲表表屬陽中爲半表半裏屬陰陽相半遲爲寒數爲熱傷寒脈來數大無力爲陽中伏陰法當溫補浮數有力此爲純陽法當助陰而抑陽浮緊有力此爲寒在表法當發散沉實有力陰中伏陽法當攻下沉細無力此爲純陰法當退陰而助陽沉數有力此爲熱邪傳裏法當清解邪熱如浮而遲濇浮而軟散凡此皆虛如浮而緊數浮而洪滑凡此皆實如沉而細弱沉而遲伏凡此皆虛如沉而滑數沉而實大凡此皆實脈虛者正氣自虛脈實者邪氣自實不實不虛自爲平脈雖困當愈但傷寒初病先以尺寸斷之若過經元氣虛則於關部取

胃氣凡此數者脉之眞元醫之切要得心應指自然神效豈有殘人之生者乎

浮中沉三候脉形狀主病

浮　初排指於皮膚上輕手按之則得曰浮此寒邪初入足太陽膀胱經病在表之標可發而去之雖然治之則有二焉寒傷榮則無汗法當表風傷衞則自汗法當實表散邪一通一塞不可同也蓋風則傷衞氣者氣本屬陽風亦屬陽陽則從陽故傷衞氣陽主開泄皆令自汗故用辛甘溫之劑則實表散邪也其寒則傷榮血者血本屬陰寒亦屬陰陰則從陰故傷榮血陰主閉藏皆令無汗用輕揚之劑以發表散邪正謂水流濕火就燥雲從龍風從虎各從其類也

浮緊有力無汗發熱惡寒頭項痛腰脊强惡心拘急體痛骨節疼此爲傷寒邪在表宜發汗冬時用麻黃湯三時用芎蘇散羌活沖和湯類傷寒證者宜從別治

浮緩無力有汗惡風發熱頭痛惡心拘急體痛腰脊强背骨節疼此爲傷風邪在表宜實表散邪冬月用

桂枝湯三時加減沖和湯腹痛小建中湯痛甚桂枝大黃湯

中　按至皮膚之下肌肉之間略重按之而得是爲半表半裏證然亦有二焉蓋陽明少陽二經不從標本從乎中治也

長而有力即微洪此名爲陽明胃經微頭疼身熱目痛或眼眶痛鼻乾不眠無汗用葛根解肌湯若渴而有汗不解或已經發汗後渴不解者用人參白虎湯無汗不可服此藥大忌

弦而長多此爲少陽膽經脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦目眩心下滿悶頭角微疼用小柴胡湯本方自有加減法或兩經合病則脉弦而長此湯加乾葛芍藥有神效緣膽無出入有三禁不可汗下吐也止宜小柴胡解表裏再無別湯

沉　重指按至肌肉之下筋骨之間方得者曰沉脉然亦有二焉陰陽寒熱在沉脉中分無人知此實祕訣也夫陰陽寒熱表裏虛實之理皆出乎浮中沉三字其可不謹察乎

沉數有力則爲陽明胃腑本病此表解而熱傳入裏其惡寒頭疼悉除反見怕熱燥渴譫語狂妄揭去衣被揚手擲足或潮熱自汗或喘急悶痛五六日大便不通輕則大柴胡湯重則大承氣湯選用大便通而熱愈矣設有頭疼因大便不通熱氣上蒸於頭也下後痛自愈然大便不結豈敢下乎

沉遲無力爲寒此三陰自中眞寒證無頭疼無身熱口不渴初病起怕寒手足厥冷踡臥或兼腹痛吐瀉或戰慄面如刀刮者或吐涎沫輕則理中湯重則四逆湯溫之若脉浮足冷面青小腹絞痛此夾陽中寒也急用茱萸四逆湯溫之若脉沉足冷面赤身熱或躁此蓄夾陰傷寒也急用麻黃附子細莘湯溫經散寒夫夾陰之證醫者不識悮死者多矣若非眞得仲景心妙焉能識此證也醫當愼之診脉須當分三部九候每部必先浮診三候輕下指於皮膚之上按之以候三動也中診三候略重指於皮膚之下肌肉之上候三動也沉診三候重指於肌肉之上筋骨之間候三動也三三而成九候然後知病淺深表裏以爲

處治之標的也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十六卷目錄

醫部彙考三百四十六

傷寒門十二

陶華全生集

內外傷　脈法　憑證不憑脈　憑脈
不憑證　傷寒見風脈　傷風見寒脈
脈禁忌　足太陽經證治　足陽明經證治
足少陽經證治　足太陰經證治　足少陰
經證治　足厥陰經證治　合併病　兩感誤
治　急下　急溫　脈浮可下　脈沉可汗　可汗
不可汗　可下　不可下　可吐　不可吐
可溫　不可溫　用藥寒溫相得　發熱
惡寒　汗後不徹　本熱　惡風　潮熱　寒
熱往來　煩熱　煩躁　頭痛　頭眩　項背

強　頭搖　無汗　自汗　盜汗　頭汗　手

足腋下汗

藝術典第三百六十六卷

醫部彙考三百四十六

傷寒門十二

明陶華全生集

內外傷脈法

夫內外傷證與傷寒相似甚多而脈本有以異也今之庸醫罔知其源惟圖己利竟不按脈察病一槩呼爲傷寒妄施汗下吐溫之法以致虛者愈虛實者愈實醫殺之也深可悲夫今遂將心要脈法備開於後

云

左手脈來緊盛卽是傷寒外感右手平和

右手脈來緊盛卽是飲食內傷左手平和

左右手脈俱緊盛卽是夾食傷寒此爲飲食內傷外感

左手脈來空大右手脈來緊盛卽是勞力傷寒亦爲內傷外感

左右手脈來沉細或沉伏面色青手足冷小腹絞痛甚則吐利舌卷囊縮者卽是夾陰中寒此是眞陰證

左右手脈來沉細身熱面赤足冷卽是夾陰傷寒此爲色慾內傷外感若加煩躁欲飲面赤足冷脈沉或兼吐利者此是陰極發躁

左右手脈來數大無力若身熱足冷燥渴此爲虛陽伏陰

左手脈來緊盛右手脈來洪滑或寸脈沉伏一般身熱惡寒隱隱頭痛喘欬煩悶胷脅體痛此是夾痰傷寒

左手脈緊盛右手脈沉一般身熱惡寒脅痛脹滿頭

疼體痛氣鬱不舒此是夾氣傷寒左手脈緊濇右手脈沉數若心胷脅下小腹有痛處不移一般身熱惡寒頭疼煩渴此是血鬱內傷外感

憑證不憑脈憑脈不憑證

人之脈道乃氣血之會臟腑經絡寒熱虛實俱現於此察脈對證理所必然然傷寒則有證脈不相符者醫人至此執脈執證競競紛紛矣豈知仲景有憑證不憑脈憑脈不憑證之說乎余特表而出之以示學者如經曰脈浮大心下鞕有熱屬臟者攻之不令發汗此又非表邪可汗之法也如脈促爲陽盛若下利喘而汗出用葛根黃芩黃連湯若厥冷脈促則爲虛脫非灸非溫不可此又非陽盛之脈也如陽明脈遲不惡寒身體濈濈然汗出則用大承氣此又非諸遲爲寒之脈法也但不惡寒三字爲主經云桂枝下咽陽盛則斃此定法也如讝語而惡寒必用桂枝先解之已而下之但看有表無表爲辨耳少陰病始得之反發熱脈沉宜麻黃細辛附子湯微汗之此又非脈沉在裏之脈法也此仲景憑證不憑脈之治法也如

經所謂結胷證應下之其脈浮者不可下此又非發熱七八日雖脈浮數者可下之證也譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯因與一升明日不大便脈反微澀者不可與承氣湯此又非湯入腹中轉失氣者乃可攻之之證也仲景云若不轉失氣者不可與承氣也發熱惡寒脈微弱尺脈遲者俱不可汗此又非在表宜汗之證也此仲景憑脈不憑證之治法也

傷寒見風脈傷風見寒脈

傷風脈當浮緩而反浮緊者其證熱盛而煩手足自溫此傷風得寒脈也宜羌活神朮湯內有熱而渴者五味羌活湯天寒有汗用神朮湯加桂枝芍藥若夫傷寒脈當浮緊而反浮緩者其證不煩少熱四肢厥冷此傷寒得風脈也宜人參羌活湯熱多無汗者十味芎蘇散加人參大抵脈來浮緩蓋元氣虛也沖和湯加人參在內

禁忌

凡見傷寒吐蚘者雖有大熱忌用凉劑犯之必死蓋胷中有寒則蚘上膈大凶之兆人皆未知先當溫劑

以定蚘後用凉劑以退熱開吐蚘條下

凡治傷寒若經十餘日以上尚有表證當汗者宜羌活沖和湯微汗之十餘日有裏證宜下者當大柴胡微下之蓋傷寒過經正氣多虛恐麻黃承氣太峻若悞用麻黃令人汗多亡陽悞用承氣令人大便不禁故有此戒若表證未除裏證又急不得不下者只得以大柴胡湯通表裏而緩下之又老弱及血氣兩虛之人有下證者亦宜微下之或蜜導法不傷元氣如元氣壯實不在禁例隨病制宜

凡見傷寒尺脈弱而無力切禁汗下寸脈弱而無力切忌發吐宜用小柴胡和之

凡治傷寒若汗下後不可用參芪大補之劑宜小柴胡和之若用大補使邪氣得補而熱愈盛變生他證矣所謂治傷寒無補法也如曾汗下後果是虛弱之甚脈見無力方用人參三白湯加柴芪甘溫補之其勞力內傷不在禁補之例看消息用之也

足太陽經證治

夫足太陽膀胱經乃諸陽之首主氣爲四通八達之

衞故多傳變受病爲先其經起於目內眥睛明穴從頭下後項連風府行身之背絡於足小指至陰穴也其證有頭項痛腰脊强惡心拘急體痛骨節疼發熱惡寒此是太陽經表證標病若有一毫頭疼身熱惡寒不拘日數多少便宜發散自然熱退身涼有何變證要在脈靜爲不傳脈躁盛爲傳也治之一差變證百出若或發熱煩渴小便不利者此是足太陽傳本病宜利小便若小便自利如常者不可利之若利之則引熱入裏爲熱結膀胱其人如狂等證又不可下下之使表邪乘虛傳裏則爲痞滿結胷脅熱利不止等證如當發汗不可太過過則爲亡陽肉瞤筋惕等證故有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝有汗不可再發汗汗多不得利小便也

辨脈法浮緊有力是傷寒浮緩無力是傷風脈浮煩渴小便不利是熱結膀胱是傳本經宜利小便尺寸俱浮者太陽受病也

辨證法自汗因表虛乃風寒衞氣是標病宜實表散邪無汗因表實乃寒傷榮血是標病宜發汗身熱煩

渴小便不利因熱結膀胱是傳本病宜利小便

用藥法冬月正傷寒無汗用麻黃湯傷風自汗用桂枝湯三時無汗用芎蘇散冲和湯正氣散選用三時有汗用加減冲和湯羌活散熱結膀胱用五苓散

足陽明經證治

足陽明胃經乃兩陽合病於前腑居中土萬物所歸其經起於鼻頞絡於目循於面行身之前終於足大指次指也其證目痛鼻乾不眠頭額痛身微熱惡寒此是陽明經之標病不拘日數多少便宜解肌若身熱煩渴欲飲水汗出惡熱者此陽明經本病也當清解邪熱若潮熱自汗讝語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂大便燥實不通或手足乍冷乍溫腹滿硬痛喘急此是正陽明胃腑本實病也宜急以調胃承氣湯下之凡自汗不宜利小便利之則津液枯竭也

辨脈法微洪熱在經洪數熱在腑沉數熱在裏尺寸俱長者陽明受病也

辨證法身熱目痛鼻乾不眠者是標病宜解肌身熱

煩渴欲飲汗出惡熱者是本病宜清解邪熱潮熱自汗譫語發渴或發斑黃狂亂大便不通惡熱者是本實病宜急下若元氣本虛弱者宜蜜導法

用藥法解肌用葛根湯清解邪熱用白虎湯急下用調胃承氣湯

足少陽經證治

足少陽膽經前有陽明後有太陽兩陽交中名曰少陽主半表半裏緣膽無出入其脈起於目銳眥瞳子窌上上頭角絡耳中循胷脅行身之側終於足小指次指竅陰穴也其證頭角疼而目眩胷脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦胷滿而或心下痞悶此是少陽經半表半裏證本經不從標本從乎中治有三禁不可吐不可汗不可下利小便也只宜和解表裏隨手而愈凡頭角疼耳中痛耳邊腫耳中洪洪而鳴耳中上下腫痛或脅滿痛皆是少陽部分邪火爲之若口苦少陽膽熱也脅下腫痛者少陽邪結也治之得法有何壞證常須識此宜詳審之

辨脈法脈見弦數本經病也

辨證法頭角痛而目眩胷脅痛而耳聾寒熱嘔而口苦心下滿悶者卽是半表半裏證不從標本從乎中治

用藥法本經證俱用小柴胡湯隨證加減再無別湯

足太陰經證治

足太陰脾經乃三陰之首名曰太陰中宮坤土其脈始於足大指隱白穴上行至腹絡於咽連舌本循身之前也其證身熱腹滿咽乾手足溫或自利不渴此是陽經熱邪傳入太陰標病宜柴胡桂枝湯不熱若腹滿痛燥渴身目黃茵陳湯小便赤大便燥實不通亦是陽經熱邪傳入太陰本病宜桂枝大黃湯下之若初病起身不熱口不渴頭不疼就便怕寒中脘腹滿痛或吐瀉手足冷小便清白或嘔噦此是本經直中寒邪本病宜理中湯溫之若初病起無熱不渴止有胷膈腹脹滿悶面脣皆無光澤或嘔而胷腹急痛手足冷自覺不舒快少情緒其脈沉細此證不因嗜慾皆因生冷之物傷於脾胃故爲內傷寒也治宜治中湯溫散內有寒熱兩端不可混治用在得宜

辨脈法沉緩熱在經沉實熱在腑沉細寒在臟尺寸俱沉者太陰受病也

辨證法身熱腹滿咽乾手足溫者是傳經熱證標病宐平熱若腹滿痛燥渴大便不通或身目黃者是傳腑熱證本病宐下之若逆冷腹痛吐瀉者是中臟寒證本病宐溫之若生冷內傷寒證宜溫散

用藥法平熱用柴胡桂枝湯若下之用桂枝大黃湯若身目黃用茵陳湯若溫之用理中湯溫散用治中湯

足少陰經證治

足少陰腎經乃人之根蒂也三陰交中名曰少陰其經始於足心湧泉穴上行貫脊循喉絡舌本下注心胷行身之前也其證引衣踡臥而惡寒或舌乾口燥譫語發渴大便不通此因陽經熱邪傳入少陰本病宐急下之若初起身熱面赤足冷脈沉此是本經自受夾陰傷寒標與本病也宜麻黃附子細辛溫經散寒若加煩躁欲坐臥於泥水井中雖欲飲而不受面赤脈沉足冷此是陰極發躁本病宜四逆合生脈散

退陰回陽溫補若身熱面赤足冷煩躁欲飲揭去衣被脈數大無力此是虛陽伏陰標與本病宜溫解表裏若初病起頭不疼口不渴身不熱就便怕寒厥冷踡臥或臍腹痛而吐瀉或戰慄面如刀刮此是本經直中寒邪本病宜四逆湯急溫之若無熱惡寒面色青小腹絞痛足冷脈沉踡臥不渴或吐利甚則舌卷囊縮昏沉不省手足指甲皆青冷過肘膝心下脹滿服藥不受此乃夾陰中寒本病宜人參四逆湯溫補之其前少陰有身熱者是未離於表也六經之中惟此一經難辨大要以口燥渴脈沉實有力或大便不通者知其熱脈沉而遲別其寒至陰經則難拘定法或可溫而或可下因分直中傳經此法發前人之所未發也

辨脈法沉實有力熱在臟沉細無力寒在臟數大無力是虛陽伏陰其夾陰傷寒夾陰中寒陰極發躁脈皆沉也尺寸俱微沉者少陰受病也

辨證法引衣踡臥而惡寒或舌乾口燥大便不通者是傳經熱證本病宜應下四肢厥冷臍腹痛瀉利者

是直中寒證宜溫溫之伏陰是標與本病宜溫解表裏夾陰傷寒是標與本病宜溫經散寒夾陰中寒是本病宜溫補陰極發躁證是本病宜退陰回陽宜急下之大承氣湯急溫四逆湯溫解表裏加減五積散溫經散寒麻黃附子細辛湯溫補人參四逆湯加茱萸退陰回陽用四逆合生脈散

足厥陰經證治

足厥陰肝經三陰交盡名曰厥陰乃六經之尾凡傷寒至厥陰邪勢已極其經始於足大指大敦穴上環陰器抵小腹貫膈上口脣與督脈會於項巔行身前之側也其證煩滿囊縮消渴舌卷譫妄大便不通手足乍溫乍冷此是陽經熱邪傳入厥陰本病宜大承氣急下之若發熱惡寒似瘧狀此是熱邪在經標病宜柴胡桂枝麻黃各半湯和緩若不嘔清便病自愈若初病起身不熱口不渴頭不疼就便怕寒四肢厥冷或小腹至陰疼痛或吐瀉體痛嘔噦涎沫甚則手足指甲面脣皆青冷過肘膝不溫舌卷囊縮此是本經直中眞寒本病宜茱萸四逆湯急溫之本經有寒

熱臨病制宜不可執一法也

辨脈法沉實有力熱在臟微細無力或伏絕寒在臟浮緩熱在經微浮微緩病自愈尺寸俱微緩者厥陰受病也

辨證法煩滿囊縮消渴舌卷讝妄大便不通是傳經熱證本病宜急下四肢厥冷或小腹至陰疼痛或吐瀉體痛嘔噦涎沫者甚則手足指甲面脣皆青冷過肘膝舌卷囊縮是直中眞寒證本病宜急溫發熱惡寒似瘧狀是傳經熱證表病宜和緩如不嘔清便病自愈用藥急下大承氣湯急溫茱萸四逆湯和緩柴胡桂枝麻黃各半湯

合併病

合病併病二證世所難明若非得其精專焉能識此證也其合病者兩陽經或三陽經齊病不傳者爲合病併病者一陽經先病未盡又過一經而傳者爲併病且如太陽陽明併病一證若併未盡仲景所謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得發越煩躁短氣是也是傳未盡尚有表證法當汗之麻黃湯桂枝

各半湯若併之已盡是爲傳過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便硬而譫語法當下之以承氣湯是知傳則入腑不傳則不入腑言其傳變如此也三陽互相合病皆自下利太陽陽明合病主葛根湯太陽少陽合病主黃芩湯少陽陽明合病主承氣湯三陽合病無表證俱可下但三陽經合病仲景無背惡寒語句雖則有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽而非三陽合病也三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無合併病例也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治之三陽經合病必用三陽經藥合治之如人參羌活湯乃三陽經之神藥麻黃湯神朮湯太陽經藥葛根湯白虎湯陽明經藥小柴胡湯少陽經之藥也

合病若冬月正傷寒照此例用藥若時證其脈多有二經三經合病者治議小柴胡兼內傷治如勞力合補中益氣之類不得過治致生別病先用合病藥不愈然後如此治

兩感誤治

兩感者陰陽雙傳也雖爲必死然亦有可救者虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治大羌活湯主之蓋用藥先後發表攻裏本自不同活人書救裏四逆湯攻表桂枝湯殊不知仲景云太陽與少陰俱病頭疼惡寒爲太陽邪盛於表口乾而煩爲少陰邪盛於裏陽明與太陰俱病身熱譫語爲陽明邪盛於表不欲食腹滿爲太陰邪盛於裏少陽與厥陰俱病則耳聾寒熱嘔而口苦爲少陽邪盛於表煩滿囊拳爲厥陰邪盛於裏也三陽頭疼身熱耳聾脅痛惡寒而嘔邪在表者已自不可下之其三陰如腹滿乾嘔口渴囊縮譫語便實在裏者可不下乎活人書引下利身疼痛虛寒救裏之劑而欲施治於煩渴腹滿囊縮譫語實熱之證豈不差乎原仲景所謂發表者葛根麻黃是也攻裏者調胃承氣是也活人書却謂救裏則是四逆救表則是桂枝今以救爲攻豈不相背若用四逆是以火濟火而腹滿囊縮等證何由而除臟腑何由而通榮衛何由而行故死者多矣蓋表裏不可並攻陰陽難同一治也然用藥之法助正除邪

之理可不一定於胃中乎

急下急溫

急下急溫者病勢危篤將有變也非若常病可緩如少陰口燥舌乾而渴因邪熱內消腎水津液乾枯故當急下以救腎家將絕之水少陰自利純清水心下硬痛口燥渴者急下之少陰腹脹滿硬或繞臍硬痛不大便土勝水也急下之陽明汗多熱甚恐胃汁乾急下以存津液陽明腹滿痛爲土實急下之熱病目不明熱不止者多死目睛不明腎水已竭不能照物則危甚矣急下之六者俱大承氣湯少陰急溫有二證內寒已甚陽和之氣欲絕急溫之少陰膈上有寒飲乾嘔不可吐者急溫之用四逆湯此急救之功也

脈浮可下脈沉可汗

夫脈浮當下脈沉當汗固其宜也然其脈雖浮亦有可下者謂邪熱入腑爲大便難也假若大便不難豈敢下乎脈雖沉而亦有可汗者謂少陰病爲身有熱也假若身不熱豈敢汗乎此正所謂取證不取脈也

可汗

凡頭項體痛者或腰痛背強者或身痛拘急者或灑灑惡寒者或翕翕發熱者及尺寸脈浮緊者與脈浮數者或病人煩熱不解者悉皆汗之已上皆屬表證而得表脈無汗者卽宜發汗若汗後不解表證尚在再宜汗之如表證已解其熱不退者此是傳經也宜從別治

不可汗

凡口燥舌乾者或口苦咽乾者或咽喉痛者或吐衄下血者或淋血者或小便淋瀝者或大便瀉利者或內傷勞倦者或尺脈微弱者或房勞陰虛者或夢遺洩精者或動氣者或風溫濕溫中暑者或瘡痛者或婦人經水適來適斷者或氣血兩虛者或脈微細者或新產血虛者悉皆不可發其汗也

可下

凡蒸蒸發熱大便不通者或潮熱自汗譫語煩渴大便不通者或潮熱腹痛者或潮熱腹脹硬滿者或潮熱譫語者或陽明自汗多胃中必燥大便必鞕而譫語者或能食不大便者或譫語脈滑而疾者或潮熱

手足濈濈然汗出大便難者或五六日不大便繞臍腹硬痛燥發作有時者此有燥屎也或目中不了了睛不和大便不通者或病人小便不利乍難乍易微熱喘滿不臥亦有燥屎者或吐後腹脹滿不減者或下利脈滑而數者此有宿食也或下利脈三部皆平甚則心下硬痛者或腹中滿痛者或胷痛者或內實燥滿及發斑黃狂亂揚手擲足揭去衣被不大便者或汗吐下後微煩小便數大便難者或轉屎氣者或發熱大渴不大便者或小腹硬滿而痛小水自利大便黑此有畜血者或潮熱不解脈沉數大便難者悉皆可下之也大抵一切下證要知舌乾口中燥渴大便不通及脈沉實沉數沉疾沉滑有力者方可下之再以手按臍腹胷脅硬滿而痛手不可近者急下之無疑也如下不盡亦宜再下之若下後腹中虛軟脈無力者此爲虛也以參胡三白湯加當歸身和之若下後發熱潮熱往來寒熱不解者宜小柴胡加減和之若煩熱不得眠者溫膽湯加竹葉石膏主之如下後利不止或身體疼痛脈無力者又當溫補之此家

傳之活法也

不可下

脈沉有表證者不可下及惡風惡寒者或頭項腰背强痛拘急者或手足逆冷不溫者或尺脈弱者或六脈虛細者或嘔吐者或腹中時滿時減者或不轉屎氣者或腹脹可揉可按者或臍之左右有動氣者或腹如雷鳴者或陽明面冷赤色者或咽中閉塞者或血虛氣虛者或內傷勞役者或陰虛勞倦者或經水適來適斷者或胎前崩漏者或小便清白者或夾陰面赤者或心下硬者或脈雖大而無力者悉皆不可下之也

可吐

凡病在膈上者及脈大胷滿多痰者或食在胃口脈滑者或胷滿鬱鬱微煩者或胷中懊憹者或胷中鬱鬱痛不能食欲使人按之而反涎沫者或下利日數行寸口脈滑者吐之利自止也或病人手足厥冷脈乍結以寒氣在胷中則心下滿而煩欲食不能食者或傷寒三四日邪在胷中者寸口脈沉伏或浮滑有

痰者或喉中有痰聲者或乾霍亂心腹刺痛欲死者或中風寒痰涎壅塞者悉皆可吐正所謂在上者因而越之也

不可吐

凡病人元氣羸及老弱血氣兩虛或房勞或勞倦內傷或婦人胎產崩漏或脈虛細無力或經水適來適斷者悉皆不可吐之也

可溫

凡中寒者及直中陰經者或無熱惡寒者或口出涎沫者或脈虛細無力者或脈沉遲者或腹痛泄瀉者或戰慄踡臥面如刀割者或四肢逆冷者或膈上有寒乾嘔者或嘔吐不止者或面戴陽者或夾陰中寒面脣青者或下後利不止清穀不化脈弱者或陰證舌卷囊縮手足厥冷者或胃寒欬逆者或清穀瀉利不止者其要在乎脈來沉細沉遲或伏絕者悉皆當溫之無疑矣

不可溫

凡口燥咽乾及舌燥而渴者或身熱小便赤者或揭

去衣被揚手擲足者或喜飲冷者或大便實者或身發斑黃狂亂者或妄語潮熱者或面赤大便實煩躁譫語者或身熱脈來有力者或小水短赤者要在知其脈來沉實沉數沉滑洪大有力者悉皆不可溫之也

用藥寒溫相得

夫發表之藥用溫攻裏之藥用寒溫裏之藥用熱者各有所宜也蓋表既有邪則爲陽虛陰盛溫之乃以助陽陽有助則陽長而陰邪所由以消故用辛甘發散之以爲陽也此指表藥用溫者而言之也裏既有邪則爲陰虛陽盛寒之乃以助陰而抑陽陽受其抑則微而眞陰所由以長故用酸苦湧泄之以爲陰也此指裏藥用寒者而言之也至於陰經直受寒邪則爲臟病主陽不足而陰有餘故用辛熱之劑以溫之所以助陽而抑陰也則陰消陽長此則指言溫裏之藥亦明矣若表有邪而不汗之其邪何從而解裏有邪而不下之其邪何從而出臟有邪而不溫之其寒何從而除以此三者故用藥有溫涼寒熱之別其於

熱藥寒服寒藥熱服中和之劑溫而服之此則寒因熱用熱因寒用不寒不熱溫而用之之義也且藥之相得也如麻黃得桂枝則能發汗蘇葉得葱白豆豉亦能發汗芍藥得桂枝則能止汗黃芪得白朮則能止虛汗防風得羌活則治諸風蒼朮得羌活則止身痛柴胡得黃芩則寒附子得乾薑則熱羌活得川芎止頭疼川芎得天麻止頭眩乾葛得天花粉則止渴石膏得知母亦止渴香薷得扁豆則消暑黃芩得連翹則消毒桑皮得蘇子則定喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂乾薑則止呃乾薑得半夏則止嘔半夏得薑汁則囘痰貝母得苦蔞則開結痰竹瀝得薑汁則行經絡桔梗得升麻則開提氣血枳實得黃連則消心下痞枳殼得桔梗能使胷中寬知蘗得山梔則降火豆豉得山梔治懊憹神砂得棗肉安神白朮得黃芩則安胎陳皮得白朮則補脾人參得麥冬五味則生脈蒼朮得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草果得山楂消肉積神麯得麥芽能消食烏梅得乾葛則消酒砂仁得枳殼則寬中木香得薑汁則散氣烏

藥得香附則順氣白芍得甘草則治腹痛茱萸得良薑亦止腹痛乳香得沒藥大止諸疼芥子得青皮則治脅痛參芪得附子則補陽知蘗得當歸則補陰當歸得生地則生血薑汁磨京墨則止血紅花得當歸則活血歸尾得桃仁則破血大黃得芒硝則潤下皂莢得麝香則通竅訶子得肉果則止瀉木香得檳榔則止後重澤瀉得猪苓則能利水澤瀉猪苓得白朮則能收濕此用藥相得之大端醫家之心妙也

發熱

夫傷寒翕翕發熱者乃風寒客於皮膚邪氣怫鬱於外表熱而裏不熱也此太陽經表證頭疼項强腰背脊痛身體骨節疼或已發熱未發熱惡寒脈浮緊無汗冬月用麻黃湯三時用芎蘇散羌活沖和湯人參羌活散正氣散選用脈浮緩自汗冬月用桂枝湯三時用加減沖和湯神术湯選用若脈浮發熱煩渴小便不利者此熱傳太陽膀胱本病也用五苓散利之若陽明經發熱目痛鼻乾不眠微惡寒微有頭額痛脈微洪宜葛根湯若表熱未罷邪熱傳裏裏未作實

則表裏俱熱口渴飲水脈洪數者宜白虎湯此但輕於純在表純在裏也若表證皆除而反見怕熱燥渴譫語大便實而脈沉數蒸蒸發熱者此爲裏熱是陽邪陷入陰中裏熱甚而達於外也用調胃承氣湯下之若少陽經耳聾脅痛寒熱嘔而口苦頭角痛脈弦數此熱在半表半裏用小柴胡湯和之三陰無表熱惟少陰有表熱之證但其脈沉足冷用麻黃附子細辛湯或下利厥冷裏寒外熱用人參四逆湯其陰陽俱熱而不止者汗後復發熱脈躁疾者下利大熱不止者皆死證又有三陽傳裏實熱證口必燥渴飲水不止揭去衣被揚手擲足胷腹滿痛斑黃狂亂譫語大便不通脈必沉實有力甚則舌卷囊縮者難治但當三一承氣湯攻裏下之方開別條與前表熱不同也

惡寒

傷寒則惡寒理必然也雖居密室帳幕之中亦憎寒拘急自然嗇嗇而惡之若見風尤甚怕也如寒氣甚重者使人毫毛畢直而鼓頷戰慄雖向火不能遏其

寒也如已發熱者雖大熱而不欲去衣被也且惡寒者乃寒邪客於榮衞則灑淅惡寒雖一切惡寒多屬表證尚有陰陽所分無汗爲表實有汗爲表虛若發熱惡寒頭疼脈浮緊者邪入太陽表證也宜發汗冬用麻黃湯三時用芎蘇散羌活湯正氣散選用有汗惡風脈浮緩者冬用桂枝湯三時用加減沖和湯選用若欲攻其裏者但有惡寒表不解者不可攻裏要當先解其表也如不惡寒而反惡熱者此爲表解乃可攻裏也又有少陰無熱惡寒踡臥足冷脈沉細者此寒邪直入足少陰腎經裏證也宜四逆湯溫之經云發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰又有汗後惡寒脈浮無力者亦爲表虛宜桂枝芍藥湯和之有大便不通燥渴微惡寒脈實者用大柴胡湯下之至於背有惡寒者背爲陽腹爲陰背惡寒者陽不足也陽氣不足陰氣即盛陰盛則口中和背上寒附子湯溫之陽氣內陷者口乾燥渴心煩獨背上微惡寒者此裏實熱也人參白虎湯和之蓋微者乃不盛之謂也非比少陰之寒甚也少陰之病若惡寒踡臥手足厥

冷自利煩躁脈不至者則又爲不治之證矣前所用麻黃湯桂枝湯芎蘇散羌活湯正氣散加減沖和湯神术湯

汗後不徹

傷寒表證雖經發汗不解此因汗不盡故寒熱似瘧一日二三發或面赤身痒或骨節煩疼大熱者皆因汗出不徹故也故傷寒熱多寒少似瘧一日二三發面赤身痒者此不得汗出宜桂枝麻黃各半湯傷寒若面色緣緣正赤者此陽氣怫欝在表當發其汗其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不知若短氣者此汗不徹故也宜更發汗則愈若服發汗藥汗出似解至半日許復發煩熱不解其脈浮數者更發汗則愈又若傷寒八九日不解脈浮緊無汗發熱身疼者此爲表證仍在太陽經而不傳宜麻黃汗之又若傷寒十日熱已去脈浮細而嗜臥者外已解矣

若胷脅滿痛者屬少陽也宜小柴胡湯脈但浮而不弦無胷脅痛者還屬太陽無汗則麻黃湯有汗則桂

枝湯

若發汗後惡寒有表證不解脈浮者宜桂枝湯和之

汗後不惡寒反惡熱者此內實也用調胃承氣湯下之

本熱

傷寒太陽病脈浮發熱渴小便不利者此太陽邪熱傳於膀胱裏病也用五苓散利之

惡風

傷寒則惡風理必然也蓋風邪傷衞腠理不密所以自發汗而惡風也由是觀之惡風悉屬於陽非比惡寒乃有陰陽之別也微惡風者居於密室之中衣被之內坦然自舒而不惡也若見風則惡矣惡風有汗爲表虛而脈浮緩冬用桂枝湯三時用加減沖和湯惡風發熱而喘用桂枝沖和湯若發汗過多遂漏不止衞虛亡陽惡風脈浮者用桂枝术附湯惡風小便難四肢拘急難以屈伸上同若風濕相搏骨節疼痛自汗惡風短氣小便不利身微腫者用甘草附子湯惡風自汗而喘用桂枝加厚朴杏仁湯惡風無汗而

喘者用麻黃湯汗後七八日不解表裏俱熱時時惡風大渴舌乾口燥而煩者以人參白虎湯主之

潮熱

潮熱屬陽明旺申未一日一發日晡時作如潮候之有信故曰潮熱專主胃腑實熱燥糞使然渴甚不大便譫語脈洪數有力者用調胃承氣湯攻之如熱不潮口不渴大便不實者不可攻也如熱甚煩渴飲水脈洪數大便如常者人參白虎湯解之若潮於寅卯屬少陽脈弦數小柴胡和之若潮於巳午屬太陽或脈浮緊小便難大便溏熱未入腑猶帶表證先用柴胡桂枝以解表候小便利而大便鞕方可攻之蓋攻須料量要切脈之實大或沉實有力或沉數有力或洪數有力再審病人腹硬滿痞或繞臍硬痛以手按之則痛或轉屎氣或手足心并腋下濈濈然有汗此內實有燥屎也若大實大熱大渴大滿大堅用大承氣下之若小實小渴小滿小堅小熱以大柴胡甚者小承氣攻之若腹中不堅滿止燥渴大便不通脈實有力用調胃承氣湯凡欲行大承氣當先與小承氣

服下良久病人腹中轉屎氣者此有燥屎也可與大承氣攻之不轉屎氣者初鞕後溏不定愼勿攻之攻之則腹脹不食爲難治也陽明發潮熱大便溏小便自利胷痛不止小柴胡主之又脅下硬滿不大便而嘔舌上白胎者用小柴胡則濈然汗出而解也若大結胷有潮熱屬太陽大陷胷湯若欬逆潮熱大便自利潮熱並屬小柴胡病人煩渴汗出卽解又如瘧狀日晡潮熱脈實者可下用大柴胡湯大便利而脈虛者不可下用桂枝柴胡湯凡有潮熱必先用小柴胡若熱不除內實燥渴者則用大柴胡甚者用承氣湯可也

寒熱往來

往來寒熱陰陽相勝邪正分爭故也此屬少陽半表半裏證若陽不足陰邪出表與爭故陰勝而爲寒若陰不足陽邪入裏與爭故陽勝而爲熱邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半裏半表則寒熱相半乍往乍來而間作也小柴胡專主往來寒熱寒多加桂枝熱多加黃芩太陽證八九日如瘧狀一日二三

度而發不嘔清便脈浮緩者爲自愈不浮緩爲未愈用桂麻各半湯病至十日熱結在裏燥渴大便實往來寒熱大柴胡下之若往來寒熱胷脅滿而不痛屬半表半裏未入於腑小柴胡枳桔湯未效用小柴胡入小陷胷湯婦人中風八九日續得寒熱發作有時經水適來適斷此爲熱入血室用小柴胡加生地紅花當歸丹皮桂枝若心煩喜嘔胷膈滿不飲食寒熱往來小柴胡湯汗下後不嘔不渴頭汗出胷膈滿小便不利寒熱往來柴胡桂薑湯熱多寒少尺脈遲者榮血不足黃芪建中湯候尺脈不遲小柴胡湯經曰血虛氣弱腠理開邪氣入與正氣相搏結於脅下邪正分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食藏腑相連其痛必下痛攻上故使嘔也小柴胡湯若小柴胡證醫以他藥下之其柴胡證不罷者復與小柴胡湯必蒸蒸而振則發熱汗出而解也若傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下有結柴胡桂枝湯若寒熱往來多者加桂枝芍藥熱多倍用柴胡若胷滿微結小便不利渴而不飲但頭汗出往來寒熱心

煩者柴胡桂枝湯主之寒熱汗多亦治之

煩熱

煩熱者乃邪熱傳裏不經汗吐下則爲煩熱乃熱而煩擾不安也與發熱若同而異病人煩熱汗出則解如未作膈實乃但和解微汗而已若心下滿而煩則有吐下之殊先煩後悸者爲實先悸後煩者爲虛煩欲吐不吐鬱悶之貌但表有熱不得汗出而煩者脈必浮數宜發汗卽愈發汗後解半日許復發煩熱脈浮數者宜再汗之又服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯愈也太陽病心煩自汗小便數者不可與桂枝湯宜芍藥甘草湯太陽病服湯後汗出煩渴脈洪大者用白虎人參湯陽明病心煩喜嘔吐寒熱往來心下悸小便不利小柴胡加茯苓湯衄血煩渴飲水則吐五苓散不愈竹葉石膏湯下後晝煩夜靜不嘔不渴無表證脈微沉薑附湯若汗下後病仍不解而煩躁者茯苓四逆湯大下後六七日不大便煩躁不解腹滿硬痛而煩渴者有燥屎也大承氣湯汗吐下後心下滿氣上冲胷頭眩身振搖而煩

者茯苓桂枝白朮甘草湯瘥後不能勝穀氣微煩損穀則愈小柴胡加枳殼不愈大便實者加大黃又有腎傷寒表裏無熱但煩憒不欲見光明者時有腹痛脈沉細四逆湯凡傷寒身體煩疼即是熱疼不得汗故也若脈浮數者宜汗之此表證而煩也若煩渴脈弦數此半表半裏證而煩也加之寒熱脅痛而嘔宜小柴胡去半夏加天花粉至於胷中煩即胷中熱而煩也又心中煩亦心中熱而煩也並宜小柴胡湯加炒梔連陽明病煩渴脈洪數飲水不止者白虎湯大便實者調胃承氣湯此裏證而煩也若內傷勞役陰虛火動而煩者其人身倦無力自汗尺脈浮虛宜補中益氣湯加炒梔連生地麥冬黃蘗知母若不得睡而心煩者兼服硃砂安神丸納其浮游之火而安神明也大抵傷寒六七日三部脈皆至大煩而口禁不能言其人躁擾欲作汗而解也若脈和大煩目重瞼內際黃者此亦欲作汗而解也一切肌表大熱而煩蓋欲作汗而再無疑矣一如天道亢熱人皆不安或時大雨至人皆凉爽但脈不應者爲難治如足冷

脈沉細者此陰證之煩也急用人參四逆湯溫之又不可不知也若發汗出煩熱不得眠者此爲胃中乾燥也飲水者宜少與之以救胃汁乾也若傷寒二三日心悸而煩者此虛煩也小建中湯又少陰病二三日心煩不得眠臥黃連阿膠湯主之

煩躁

煩爲擾亂而煩躁爲憤怒而躁謂煩躁者有陰虛陽實之別也心熱則煩腎熱則躁煩爲熱輕躁爲熱重所謂煩躁者先發煩而後至躁也所謂躁煩者先發躁而漸至煩也太陽病頭疼發熱惡寒體痛脈浮緊煩躁因不得汗出此邪在表而煩躁也冬用大青龍湯三時用十味芎蘇散加石膏麻黃天道煖盛九味沖和湯加麻黃六神通解散亦可經云傷寒當汗不汗則人煩躁此之謂也凡傷寒肌表熱甚脈浮數不得汗出而煩躁者速宜汗之爲當也若表邪傳裏讝語大渴面赤飲水不止者脈洪數而煩躁人參白虎湯陽明經腑病五六日不大便遶臍腹硬痛讝語渴甚煩躁發作有時者此內有燥屎而煩躁也宜調胃

承氣湯下之元氣虛者蜜導法通之若病大熱錯語呻吟或乾嘔不眠而煩躁口渴脈數者此邪在裏而煩躁也黃連解毒合白虎加竹葉若太陽不得汗醫以火刧取汗不出大熱入胃而煩躁者此刧令煩躁也小柴胡加龍骨牡蠣湯入黃連山梔凡傷寒陽微發汗煩躁不眠或汗下後晝夜煩躁不得眠夜安靜身無熱脈沉微者薑附湯或汗下之後病仍不去煩躁者茯苓四逆湯要在脈沉細無力口不渴方可用此湯此陽虛而煩躁也若得病二三日脈微弱無力大柴胡證煩躁心下硬能食小承氣微利之心中悸而煩躁者小建中湯惡風自汗脈弦而煩躁者不用此湯若熱六七日煩渴欲飲水者用五苓散無熱狂言煩躁不安精采不與人相當者亦宜五苓散又少陰病吐利嘔逆煩躁欲死者脈必沉細吳茱萸湯若陰證身微熱脈沉細手足冷而煩躁者四逆湯面赤加葱白無脈乾嘔用猪膽汁又有不煩便作躁悶者乃陰極發躁欲坐臥於泥水井中其脈沉細足冷飲水不得入口者用霹靂散不若生脈四逆湯尤妙此

陰盛拒陽而煩躁也余以艾湯調硫黃末二三錢立時出汗乃愈此祕方也累用累效其結胸煩躁悉具者死吐利四逆而煩躁者死發熱下利厥逆而煩躁不眠者死惡寒踡臥脈不出而煩躁者死又五六日自利後煩躁不眠者死此皆煩躁之不治也又有久病陰虛發熱惡寒午後面頰顴赤煩躁引飲肌熱燥熱至夜尤甚脈洪大按之無力此皆血虛而煩躁也用當歸補血湯又有痰火升作喘欬嗽氣急煩悶不得安臥或時心煩或時躁亂不寧此名痰躁用溫膽湯加辰砂苦蔞桔梗竹瀝薑汁少許爲要藥也不在傷寒煩躁治例

頭痛

頭痛者寒邪入足太陽上攻於頭此表證也頭疼脈浮緊無汗用發汗脈浮緩有汗宜解肌照時令用藥三陽經雜證雖俱有頭疼不若太陽專主也太陽則頂巔腦後痛連風府陽明則頭額痛少陽則頭角痛三陰無頭痛者其脈至頸胷而還不至於頭故無頭疼惟厥陰有頭痛者是脈經於頂巔也陽明頭額痛

目痛鼻乾發熱不眠脉微洪者用葛根解肌湯加川芎白芷升麻葱白本經邪熱傳裏不惡寒反惡熱讝語面赤大渴飲水不止脉洪數者人參白虎湯若大便不通潮熱讝語揭去衣被胃熱燥渴此因熱氣上攻頭目脉沉數有力調胃承氣湯下之甚者大承氣下之少陽頭角痛耳中痛往來寒熱脅痛而耳聾嘔而口苦身熱脉弦數者用小柴胡加川芎蓋川芎乃膽經藥也又有肺家鼻塞頭疼者瓜蔕散搐鼻黃水出乃愈又痰涎頭疼胸滿寒熱喘急者亦瓜蔕散吐之又厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯脉沉厥冷加附子此數者傷寒頭痛也其雜證亦有頭痛者頭乃諸陽之首凡血虛頭痛四物湯倍加川芎蔓荊氣虛頭痛四君子加川芎藁本氣血俱虛頭痛八物湯加藁本蔓荊脉大無力用補中益氣湯加蔓荊細辛有風頭痛用羌活湯加天麻荊芥有濕痰頭痛用二陳湯加蒼朮芎芷細辛有痰火痛者二陳湯加酒炒芩連山梔川芎蔓荊竹瀝薑汁少許又陰火上衝頭痛者用四物湯加黃蘗知母蔓荊荊芥炒芩

連山梔有暴感風寒頭痛芎蘇散加蒼朮白芷各湯中俱加桔梗開提諸藥上行不可缺也其食積亦有頭痛開食積傷寒各條故不錄大抵眞頭痛連於腦手足俱青者爲眞頭痛必死

頭眩

頭眩者少陽半表半裏間表邪傳裏表中陽虛故至頭眩用小柴胡黃芪川芎天麻爲君又汗下後而眩冒者亦陽虛所致用人參養榮湯加川芎天麻少陰下利不止而頭眩時時自冒者此虛極而眩也人參四逆湯加川芎天麻太陽病若下之因復發汗此表裏俱虛其人必冒冒家汗出自愈用眞武湯加川芎天麻太陽中風頭眩頭搖其脈浮緊用羌活神朮湯加川芎天麻太陽發汗後汗出不解心下悸頭眩肉瞤筋惕振振欲擗地者宜眞武湯加川芎天麻太陽發汗二三次汗出過多肉瞤筋惕頭眩身振身熱脈虛數者人參養榮湯加蔓荊炒黃蘗川芎天麻乃愈陽明病頭眩不惡寒能食而欬茯苓白朮甘草生薑湯加川芎天麻少陽嘔而口苦寒熱頭眩目運脈弦

數小柴胡加川芎天麻若汗吐下之後虛而脈數無力心下痞滿脅痛氣冲咽不得息身振搖肉瞤筋惕久則成痿頭眩目運者茯苓白朮桂枝甘草湯加川芎天麻又有血虛頭目眩運用四物湯加人參蔓荆天麻若氣虛頭眩目運四君子湯加川芎當歸天麻伏痰頭眩目運用二陳湯苦蔞仁桔梗枳實蒼朮川芎天麻竹瀝薑汁痰火上攻頭眩目運用二陳湯加酒炒芩連山梔蔓荆川芎天麻竹瀝薑汁陰火上冲頭眩目運用四物湯加炒黃蘗知母天麻勞役內傷頭眩目運用補中益氣湯加蔓荆天麻若下元氣脫頭眩目運人參養榮湯加升麻川芎天麻大抵治頭眩目運非天麻不能除也

項背強

項背強者太陽表邪也無汗脈浮緊宜發汗麻黃湯有汗脈浮緩宜解肌桂枝湯用羌活沖和湯太陽風痓角弓背反張獨頭搖卒口噤用小續命湯治在痓證條下有加減法項背強几几無汗用發汗有汗用實表几几如短羽之鳥不能飛騰動則伸縮其頸而

兩翅聳動欲飛之貌其病者頭項一伸一縮故几几也

頭搖

頭搖者裏病也內有痛則頭搖宜察痛而治之一者風痓獨頭搖卒口噤二者心絕則頭搖形狀如烟煤直視者死凡頭搖多屬於風風主動搖風脈必弦用神术湯加天麻羌防全蠍殭蠶之類是也

無汗

無汗者寒邪中經腠裏固密津液內滲而無汗也風暑濕皆有汗惟寒邪獨不汗出太陽證無汗者冬用麻黃湯三時用芎蘇散沖和湯六神湯選用太陽證無汗脈弱無陽難作汗者血少也黃芪建中湯加术附剛痓無汗治在痓條下少陰脈沉發熱無汗麻黃附子細辛湯陽明當自汗若無汗身如蟲行皮中此久虛無汗故也熱病熱盛躁急不得汗出此陽脈極也死證矣又溫病不得汗出必發狂也有汗者生無汗者死其三陰證與陰陽毒者皆無汗也按陰毒額上手背冷汗出者此雖陰證亦有汗也用人參四逆

湯原太陽表邪當汗之證用麻黃湯二三劑發汗不出者必死然發汗頭面半身以上雖出其下半身無汗及不至足者必死蓋寒自傷足經而起汗出不至足者是太陽膀胱氣絕也凡溫熱病傷寒不得汗用搗薑汁緜裹周身擦之其汗自出此良法也

自汗

自汗者衛爲邪干不能固密腠理疎而汗出不由發而自出也有表裏虛實之分若風傷衛氣太陽表未解脈浮緩自汗者冬用桂枝湯三時神术湯若汗後惡風寒皆爲表虛汗不止用黃芪建中湯太陽發熱汗過多汗出遂漏不止爲亡陽用术附湯若陽明腑病自汗出不惡風寒而反怕熱躁渴譫語飲水不止大便不通脈沉數者調胃承氣湯下之陽明自汗小便不利者津液少也急下調胃承氣湯大抵傷風則惡風自汗傷濕則身重自汗中暑則脈虛自汗中暍則煩渴自汗濕溫則妄言多汗風溫則鼾睡自汗霍亂則吐利自汗柔痓則搐搦自汗陽明則惡熱潮熱自汗陰虛勞力則身倦自汗亡陽則遂漏不止自汗

治開各條下惟衞氣不與榮氣和諧臟無他病發熱惡風而汗自出宜桂枝和合榮衞使邪氣無所容之地則邪自出而汗自止矣言桂枝發汗者非發也實閉汗孔也發字當作出字論

凡陰證四肢厥冷額上手背汗出者脈必沉細用四逆湯溫之自汗出小便難身無熱脈沉足冷者四逆加桂枝白朮茯苓若吐利厥冷脈沉或伏或身痛大汗出者人參四逆加桂枝白朮黃芪

凡發熱下利大汗不止者死若大汗出髮潤如油喘不止者死若大汗出熱反盛狂言不食者死若汗冷如氷四肢厥冷脈脫者死柔汗發黃環口黧黑者死

凡傷寒溫熱病汗不止將髮披水盆中足露於外宜少蓋可用炒麩皮糯米粉龍骨牡蠣煅爲細末和勻周身撲之其汗自止免致亡陽而死此良法也方開各條不錄

盜汗

傷寒盜汗者睡中出而醒則止也緣邪在半表半裏間故知膽家有熱也用小柴胡湯若雜病寸脈虛浮

尺脈數大無力乃陰虛火動宜當歸六黃湯辰砂白芷散兼用小柴胡湯

頭汗

諸陽經絡循於頭三陰但到項而還頭汗者邪搏諸陽之首則汗見於頭也若遍身自汗出爲熱越今熱不得越而陽氣上冲津液上湊故但頭汗耳夫裏虛則不可下內涸則不可汗頭既有汗不可再汗也蓋陽明病脈洪數熱甚但頭汗出劑頸而還渴飲水漿小便不利必發黃也此因熱不得越用茵陳五苓散若瘀血在內小便利而大便黑小腹滿硬頭汗出者爲畜血桃仁承氣湯下盡黑物則愈也往來寒熱胷脅痛頭汗出者屬少陽小柴胡湯和之太陽中濕發黃小便難渴欲飲水漿頭汗出者茵陳五苓散重則茵陳湯陽明病煩渴飲水多胷滿怔忡頭汗出者爲水結胷五苓散利之中濕欲面向火亦汗出者治在中濕條下

凡頭汗出小便不利者死

凡關格不得尿屎頭汗出者死若元氣下脫額上汗

出如貫珠不流者死與夫悞下濕家汗出額上而喘小便難大便利者亦陽脫也俱死證矣

凡頭汗到頸而還必發黃證也

手足腋下汗

傷寒潮熱手足心腋下濈濈汗者此爲實也手足乃諸陽之本熱聚於胃則津液旁達於四肢蘊熱則燥屎讝語手足汗出者大承氣湯下之挾寒則水穀不化手足冷汗出者理中湯溫之是有承氣理中之不同也陰毒寒證手足額上冷汗出者四逆湯溫之

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十七卷目錄

醫部彙考三百四十七

傷寒門十三

陶華全生集（身體痛　動氣　口渴　口燥舌乾　吐血　衄血　畜血　嘔吐）

乾嘔　噦噫氣　呃逆　胷脅滿　結胷

心下痞　自利　便膿血　譫語　鄭聲　懊憹

發斑　發黃

藝術典第三百六十七卷

醫部彙考三百四十七

傷寒門十三

明陶華全生集

身體痛

身體痛者雖曰太陽表邪未解又有溫經發汗之不同如發熱惡寒頭疼身體痛脉浮緊無汗屬太陽表證冬用麻黃湯發汗餘月沖和湯汗之有汗脉浮緩身體痛者亦表證也冬用桂枝湯餘月加減沖和湯

少陰身體痛或吐利手足冷者四逆湯有陰證下利或嘔吐身體痛發熱脈沉遲先救裏用四逆湯後救表用桂枝湯或陰證厥冷下利脈沉身體痛如被杖嘔逆者茱萸四逆湯溫之陽證發汗後身體痛脈沉遲桂枝芍藥人參湯一身盡痛發熱面黃熱結在裏小便自利大便或祕此爲畜血證輕則犀角地黃湯重則桃仁承氣湯大抵傷寒煩熱身疼卽是熱疼汗出則解醫當識此無熱吐利身疼卽是虛寒溫之則愈勿令悞也

凡風濕一身盡痛身重不可轉側中濕亦身重而疼俱小便不利五苓散加羌活蒼朮利之霍亂則吐瀉作而身體痛脈沉者桂枝湯表裏俱寒則下利清穀身疼痛先救裏四逆湯後救表桂枝湯又有勞倦亦身體疼痛則脈虛困甚也用補中益氣湯加羌活蒼朮桂枝湯不愈又用人參養榮湯加羌活桂枝芍藥若身熱自汗身疼痛者屬陽明有風也用葛根解肌湯加羌活防風桂枝芍藥治之有血虛發熱身疼痛脈浮數無力者用四物湯加羌活知母黃蘗痰證亦

有身疼痛者治在痰證類傷寒條下故不錄於此

動氣

凡病人有動氣者即氣痛也臟氣不調築築然跳動隨所主而形見於臍之左右上下也其人必先痞氣而後感於傷寒醫人不知患者有痞積在內妄施汗下之法致動其氣故曰動氣凡治不可輕舉之也若治傷寒須問病人臍之上下左右有動氣否但言有此以手按其處牢而若痛築築動氣者是也便不可汗下動氣在左若汗之則頭眩汗不止筋惕肉瞤先防風白朮牡蠣湯汗止則小建中湯不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇身雖熱反欲倦先宜甘草乾薑湯後與小建中湯動氣在右不可汗汗之則衄心煩飲水則吐先宜五苓散後與竹葉石膏湯不可下若下之津液枯竭咽燥鼻乾頭眩心悸宜人參白虎湯加川芎動氣在上不可汗汗之則氣上衝心宜李根湯不可下下之則掌握熱煩身熱汗自出欲得水自濯也宜竹葉湯動氣在下不可汗汗之則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐先宜

大橘皮湯後與小建中湯不可下下之則腹滿下利清穀心痞頭眩宜甘草瀉心湯可見傷寒以看外證爲當者蓋不待脉可見必待問證而可得也又有腎臟之氣內虛水結不散氣與水搏即發奔豚以其走動衝突如奔豚之狀皆不宜汗下通宜理中加桂枝去白朮緣白朮燥腎閉氣故去之桂能泄奔豚故加然而獨不言當臍有動氣者是可以不言而喻也左右上下尚不宜汗況中州乎

動氣俱用理中湯去白朮加桂枝又一法用（缺二字）桂枝湯亦良二法須看有熱無熱

口渴

渴者裏有熱也津液爲熱邪所耗分六經治之太陽標熱在表則無渴邪熱入膀胱之本則煩渴脉浮數小便不利五苓散利之不可與白虎湯太陽病發渴表未解心下有水氣小青龍去半夏加苦蔞天花粉太陽病服桂枝湯汗出後煩渴甚者白虎湯太陽病身熱惡風手足溫脅痛而渴小柴胡去半夏加天花粉經云太陽證無汗喜渴忌白虎凡陽明經病脉長

而微洪標熱無汗而渴葛根解肌湯若陽明病傳熱於胃本熱惡熱自汗面赤譫語發渴飲水脉洪數者人參白虎湯加天花粉黃連若陽明本熱內實或蒸蒸內熱或潮熱大渴飲水不止譫語揭去衣被或發斑黃狂亂或成大結胷舌上燥胎大便不通脉沉數者三承氣湯量輕重選用若內熱未實且未可下宜白虎湯合小柴胡去半夏加天花粉黃連

若陽毒證目赤脣焦鼻如煙煤發黃狂亂罵詈叫喊大渴飲水不止舌胎乾燥內實或下利赤黃脉大有力三黃石膏湯或黑奴丸大便不通渴甚者宜急下之大承氣湯經云陽明自汗而渴戒五苓散利小水恐津液枯竭故戒也

若少陽脉弦數口苦咽乾發熱而渴者小柴胡去半夏加天花粉葛根

若心煩喜嘔而渴胷滿脅痛而渴日晡潮熱而渴往來寒熱而渴俱屬少陽並用小柴胡去半夏加天花粉黃連渴甚加石膏知母凡先嘔後渴此爲欲解當與水解先渴後嘔爲水停心下則爲水結胷下利喘

欬等證隨證治之

凡太陰虛寒自利則不渴惟少陰舌乾口燥而渴有大便不通讝語脉沉實者急下之用大承氣湯厥陰熱極消渴能飲水脉沉細四肢微厥乍溫甚則大便不通舌卷囊縮讝妄者急下之用大承氣湯厥陰消渴謂能飲水多而小便少蓋熱能消水若厥陰證熱微厥亦微四逆散若厥深熱亦深消渴者大承氣湯下之有少陰證口渴欲飲水不能飲小便白色脉沉足冷者此下虛有寒人參四逆湯溫之有陰毒下利身如被杖自汗厥逆脉沉疾煩渴或腹痛胷滿燥渴者茱萸四逆湯溫之不可用凉劑甚則脣青厥逆舌卷囊縮脉沉伏者急灸關元氣海蒸臍法仍用薑附大劑以溫之又有陽證下利脉數而渴者自愈此渴因瀉枯津液故渴必自愈瀉止則不渴不愈者必清血宜黃芩湯陽證發黃頭汗出渴飲水漿者茵陳五苓散大便實者茵陳湯一切傷寒時氣熱病欲飲水者因內水枯竭欲得外水自救宜少與之以全胃氣氣和則愈蓋得水能和其胃氣汗出而解也不可太

過若太過則水停心下爲水結胷下利喘欬等證若全不與飲則內水乾燥無由作汗必加喘渴躁亂而死

若病人飲水必須令人以手摩挼心胷脅下使水氣行散不至停畜也大渴舌乾胎燥者用薄荷搗浸涼水時時噙漱以免乾燥而渴其雜證陰火動而渴者用四物湯加黃蘗知母天花粉黃連若中暑脈虛而渴身熱者白虎湯加香薷黃連辰砂調服

口燥舌乾

舌乾口燥者因邪熱聚胃消耗津液屬正陽明胃腑病乃胃汁乾也調胃承氣湯下之其少陰舌乾口燥者因內水枯竭即熱消腎汁乾也用大承氣湯急下之其少陽口苦乾者小柴胡湯加天花粉乾葛和之陽明身熱背惡寒口燥舌乾者白虎湯加人參若脈沉足冷舌乾胎燥者多死

吐血

吐血者口中出血也諸陽受熱當汗失汗使熱毒入深積畜於臟遂成吐血也凡見眼閉目紅神昏語亂

眩目迷妄煩躁漱水驚狂讝語背冷足寒四肢厥冷心胷腹脅滿痛小水自利大便黑者皆瘀血證也雖有多般不必悉具但見一二證便作主張血證治之初得此證急宜用藥有畜血上焦漱水不嚥者犀角地黃湯若吐鮮血血不止燥渴者黃連解毒湯加丹皮生地磨京墨呑下四生丸

若血結滿硬而痛燥渴者桃仁承氣湯下盡黑物則愈矣

凡病神昏者多死此證神昏亦宜速下遲之亦殺人切記切記

衄血

衄血者經絡熱盛逆血妄行於鼻者爲衄也是雖熱盛邪猶在經然亦不可發汗以桂枝麻黃治衄者非治衄也乃發散經中邪氣耳且衄固爲欲解其或頭面汗出

若身無汗及汗出不至足者難治太陽證衄血及服桂枝後至衄者爲欲解犀角地黃湯無汗而衄脉浮緊再與麻黃湯有汗而衄脉浮緩再少與桂枝湯此

二者蓋爲浮脈而設也鼻衄分點滴成流者不須服藥少刻自解當與水解若滴點不成流者邪猶在經還須發散用藥無疑經曰奪血者無汗奪汗者無血俗人以血爲紅汗厥有旨哉若得衄而解者邪之輕也得衄不解者邪之重也太陽病口乾鼻燥脈浮緊必衄血黃芩湯傷寒八九日不解表證仍在其人發煩目瞑劇者必衄熱乃解若不解陽氣重故也宜汗之衄家不可大發汗汗之必額上陷脈浮緊直視不能眴不得眠芍藥地黃湯陽明漱水不欲嚥必衄犀角地黃湯陽明口乾鼻燥脈浮數者必衄犀角地黃湯加乾葛脈來輕輕在皮肉之間尺中浮目睛暈黃必衄脈浮數者口乾鼻燥必衄並用犀角地黃湯凡鼻衄無表證脈不浮緊者尚不可發汗醫當愼之若衄而煩渴飲水卽吐先宜五苓散次服竹葉石膏湯凡衄血不止者茅花湯加芩連京墨用刼法止之若傷寒表證衄血將解不可用凉水及寒藥止住必成畜血結胷難治宜用犀角地黃湯加當歸紅花甚者加桃仁大黃下盡黑物則愈少陰但厥無汗强發之

必動其血必從口目鼻耳齊出者名上厥下竭者難治當歸四逆湯仍灸太谿三陰交湧泉一法黑錫丹治之若人虛衄血不止者三黃補血湯加茅花京墨及刼法甚良一切諸失血證脉沉小身涼者生脉浮大身熱者死吐衄後脉微者易治衄後復大熱脉反躁急者死凡血得熱則行得冷則凝血屬南方丙丁火見黑則止腎屬北方壬癸水蓋水能制火故失血藥中加墨則效也若衄而頭汗出或身有汗不至足者爲難治矣

畜血

夫畜血者瘀血畜結於內也表證當汗不汗瘀血在裏必血結也大抵看傷寒必察病人心下兩脅小腹以手按之則硬痛者便當問其小便何如若小便不利乃水與氣若小便自利者乃爲畜血也經云太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈若不愈小腹急結痛者用桃仁承氣湯下之有表證者先用桂枝湯以解外後下盡瘀血爲愈又太陽病六七日脉微沉反不結胷其人發狂者以熱在下焦小腹當硬

滿小便自利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀血在裏故也桃仁承氣湯下盡黑物乃愈太陽病身黃脉沉細小腹硬小便不利者爲無血也小便自利者爲有血也宜桃仁承氣湯下之

又傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利之爲有血也當下血爲愈

陽明病其人喜忘者必有畜血也所以然者內有瘀血故令人喜忘也屎雖鞕大便反易其色必黑宜下血則愈喜忘好忘有所見而如狂也若畜血在上焦胷中手不可近而痛者犀角地黃湯中脘手不可近桃仁承氣湯臍下小腹手不可近抵當湯蓋傷寒畜血醫多不識若能識者則唾手取效也血未下犀角地黃湯中加大黃枳實桃仁紅花蘇木

嘔吐

嘔者聲物俱有而出也吐者無聲有物而頓出也若有聲無物爲乾嘔也較之輕重則嘔甚於吐矣蓋表邪傳裏裏氣上逆則爲嘔也大抵邪在半表半裏則多嘔若初得病嘔逆嘔噦清水嘔吐飲食者宜加減

藿香正氣散虛者人參養胃湯加香附砂仁若已發熱者十味芎蘇散汗之天寒少加麻黃乾葛若有汗者不可汗宜正氣散去蘇葉以和之

凡陽明壯熱目痛鼻乾嘔無汗者用葛根半夏生薑湯太陽陽明合病下利而嘔者用半夏葛根生薑湯太陽少陽合病下利而嘔者黃芩湯加半夏生薑

凡食穀欲吐者屬陽明也吳茱萸湯得湯反劇屬上焦也用葛根半夏生薑湯凡胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之凡嘔多者不可下下之則利利不止者死利止者愈故經云嘔多雖有陽明病不可攻之攻之爲逆爲其逆氣尚未收斂爲實也

凡發熱口苦脈弦數而嘔者屬少陽也若心煩喜嘔胷脅滿而嘔往來寒熱而嘔日晡發熱而嘔皆屬少陽並用小柴胡倍加半夏生薑主之熱少去黃芩加乾加乾葛心煩喜唾加薑炒黃連心下痞滿加枳實若潮熱內實不大便嘔不止心下鬱鬱微煩者大柴胡下之凡嘔吐胃家有熱脈弦數口苦煩渴胃有寒

脈弦遲逆冷不食有水氣先渴後嘔腹滿怔忡有膿血喉中腥氣奔逆上衝不須治之嘔膿盡爲愈此四者不可不辨也

凡太陰腹滿水穀不下或腹痛嘔吐脈沉遲理中湯加半夏陳皮厚朴藿香生薑之類寒甚加附子凡少陰飲食入口卽吐心下兀兀欲吐復不能吐手足寒脈沉細者四逆湯加半夏生薑陳皮之類

凡厥陰嘔吐涎沫逆冷脈沉微者茱萸四逆湯加半夏生薑陳皮厚朴之類

若膈上有寒飲乾嘔吐涎沫四逆湯

若吐利手足逆冷煩躁甚者茱萸四逆湯少陰欲吐不吐但欲寐五六日利而渴小便色白四逆加生薑

若似嘔似噦似喘心下憒憒無奈大橘皮湯

若汗下後關脈遲緩而吐爲胃寒理中湯甚者加附子

若吐後水藥不入口者爲嘔逆半夏茯苓湯病瘥後虛煩嘔吐竹葉石膏湯加生薑陳皮清嘔吐穀不下小半夏湯

凡嘔吐脉滑數或洪大發熱者茅根湯

若三陽發熱而嘔通用小柴胡湯加陳皮生薑

凡先嘔後渴此爲欲解宜與水解

凡先渴後嘔爲水停心下宜茯苓半夏湯加陳皮生薑小便不利者五苓散有水氣或欬或悸身痛自利眞武湯去附子加陳皮生薑

凡病後餘熱在胃口虛羸少氣嘔逆欲吐者竹葉石膏湯

若胃中有痰熱而嘔者橘皮竹茹湯加薑炒黃連山梔

凡胃寒嘔吐不止者藿香安胃湯合理中湯主之甚者加丁附

凡胃熱嘔吐不止者用小柴胡加竹茹乾葛陳皮薑炒黃連山梔石膏主之

凡胃實嘔吐者用香砂平胃散去甘草加枳實靑皮主之

胃寒脛冷面浮者尻骨痛

胃熱煩渴頰痛口乾不合

胃實則右關脉實胃虛則右關脉虛

若嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯加生薑主之

若下利無脉乾嘔煩者白虎湯加猪膽汁主之

其痰嘔吐不止用二陳加薑汁炒黃連梔子乾薑主之

凡治嘔吐不可缺生薑薑乃嘔家之聖藥嘔家不喜甘甜之物蓋甘能發嘔故也一切嘔吐不止者各湯中俱加薑汁調服隨用生薑嚼之過藥不可用棗子甜物服藥徐徐服之不可急

乾嘔

乾嘔者但嘔而無物也大抵熱在胃脘與穀氣併熱氣上熏心下痞結則有此證太陽汗出乾嘔桂枝湯主之自汗也少陰下利乾嘔薑附湯主之下利也厥陰吐涎沫乾嘔吳茱萸湯主之涎沫也邪去嘔則止又有水氣二證又當以表裏別之傷寒表不解心下有水氣身微熱乾嘔微喘或自利小青龍湯不發熱不惡寒脅痛欬而利乾嘔者十棗湯膈上有寒飲乾

嘔屬少陰四逆湯胃熱煩渴乾嘔者小柴胡加薑汁炒黃連山梔陳皮口苦脉弦數身熱而嘔者屬少陽也小柴胡加減治之

少陰下利乾嘔脉微白通湯主之下利不止乾嘔而煩厥逆無脉白通加猪膽汁湯

乾嘔吐痰沫頭痛吳茱萸湯得此湯反劇者與小柴胡湯乾嘔自利黃芩湯半夏生薑湯

太陽中風陽浮陰弱自汗惡風寒發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯乾嘔噦若手足厥者橘皮湯

噦噫氣

噦者氣忤也忤敵也卽乾嘔之甚其聲濁惡而長嘔則聲短而小較之於嘔爲重皆有聲而無物出經云木衰者枝葉枯落病深者其聲噦其人本虛攻其熱則噦或因汗下太過胃中虛寒而然或恣飲冷水水寒相搏而然此胃中虛寒故也理中湯主之甚者加丁附經曰脉滑則噦此爲醫咎責虛取實之過也又有熱氣鬱塞上下不通而致輕則和解之疏引之甚則溫散之噦則腹滿當看何部不利前部不利者五

苓散加青皮木通後部不利者大承氣湯人虛脈弱者用大柴胡小承氣或蜜導法若口苦脈弦數煩熱而嘔者小柴胡加陳皮竹茹和之渴加知母連梔手足冷者小橘皮湯加薑附煩者橘皮竹茹湯有鬱熱在胃中者加味竹茹湯噦不止者乾薑橘皮湯加半夏附子溫病有熱暴飲水而致者茅根乾葛湯溫病胃寒變噦茅根橘皮湯若屬病後胃虛冷脈沉遲者理中湯加丁香附子又有初病陰寒入胃無熱不渴便作虛噦或有清水而噦不止脈沉遲者用薑附理中湯加藿香陳皮半夏薑汁又有眞陰證初起無熱惡寒厥冷踡臥脈沉細作噦者用四逆湯加丁香陳皮吳茱萸半夏溫之有生冷飲食傷在胃口作噦不止用藿香安胃湯加丁香砂仁香附甚者加附子薑汁又有陰虛火動而噦者用四物湯加黃蘗知母梔連佐以薑汁竹瀝大抵病後嘔噦或久病胃虛不食嘔噦足冷脈微遲及噦家不尿者皆難治也其噫氣者胷中氣不交通也寒氣客胃厥逆上行復出於胃故噫氣也理中湯加陳皮香附丁香半夏溫之傷寒

汗下後不解心下痞噫氣者旋覆黛赭湯主之

呃逆

夫呃逆者俗謂呃忒是也纔發聲於咽喉則遽止軋軋然連續數聲其聲短促不長古謂之噦非也噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長比之呃忒大有徑庭矣若將呃逆紊爲噦與欬逆悞人尤多然呃逆有因胃中實熱失下而作有因胃中痰飲而作有因服寒涼之藥過多胃中虛冷而作且其氣皆從胃中起至胷嗌之間而爲呃忒矣胃熱失下大便不通者承氣湯下之便軟者以瀉心湯主之有潮熱小柴胡湯胃虛有熱者橘皮竹茹湯主之有痰飲者橘皮半夏生薑湯主之加茯苓枳實陳皮桔梗若胃冷者橘皮乾薑湯主之甚者丁附理中湯加吳茱萸主之若過服寒涼藥多胃寒呃忒者丁附理中湯加吳茱萸木香薑汁主之凡其氣自臍下直衝於胷嗌間呃忒者此陰證呃忒也其病不在胃矣其病下虛內伏陰火或悞服寒藥遂至冷極於下迫其相火上衝卒集於胷中而爲呃忒亦欲盡也病人煩躁自覺甚熱他人以手

按其肌膚則冷此爲無根失守之火散亂爲熱非實熱也乃水極反似火陰證類似陽也若不識此悞用凉藥下咽卽死當用羌活附子湯加官桂人參木香陳皮半夏砂仁急溫其下令其陽回陰火降呃忒乃止也若陰證及因胃寒呃忒不止者外用乳香硫黃散嗅法內用丁香柿蔕散服之則止再灸期門中脘氣海關元此良法也但手足溫煖脉重者爲有生矣又瘀血有形之物壅塞其間而呃雖柿蔕亦不應

胷脅滿

胷脅滿者胷滿乃腹間氣塞滿悶非心下滿也脅滿者脅肋脹滿非腹中滿也蓋表邪傳裏必先胷以至腹入胃是以胷滿多帶表證宜微汗脅滿多在半表半裏之間宜和解之又有邪熱或痰食結在胷中爲實者必須湧吐之也傷寒胷滿心煩者柴胡陷胷湯脅下硬加青皮牡蠣粉往來寒熱胷脅滿者小柴胡加桂白芍藥脅下痛加青皮川芎木香若胷中痞氣滿悶小柴胡加枳桔未效加苦蔞黃連渴去半夏加貝母乾葛渴甚加天花粉治痞滿須用枳殼桔梗爲

要藥經云病人手足冷脉乍緊邪結在心中心下滿而煩饑不能食病在胷中宜吐之又寸脉微浮或伏胷中痞硬氣上衝咽喉不得息此爲胷中有寒者宜吐之有痰實結胷中者亦吐之用瓜蔕散若胷脅不快腹滿悶脣青手足冷脉沉細少情緒或腹痛欲嘔者此因生冷傷於太陰脾土用理中湯去參朮加砂仁枳殼木香內寒甚者加丁附兼有外感寒者用五積散加減治之大抵枳殼瀉至高之氣枳實瀉至低之氣故心之上胷之分枳殼瀉之心之下胃之分枳實瀉之苦蔞仁能瀉肺洗滌胷中痰垢之要藥故胷滿而煩者加之外用生薑搗柤去汁炒熱揉熨胷脅大抵陽證不可太熱絹包漸漸揉熨胷脅或痰或氣或滿或痛或硬或食或寒俱用此法以辛散之自然寬矣若悞服寒凉藥過多反成寒實結胷脹滿不通湯藥不入者又當用薑附丁桂以溫開之及中寒邪結胷脅間與此治法同

結胷

結胷痞氣雖開前條恐論未盡故再明之蓋結胷者

緣太陽證自汗當服桂枝湯散其邪悞用承氣下之表邪乘虛內陷結於心胷間反成眞結胷也當分輕重治之未經下者非結胷也乃表邪傳至胷中未入乎腑證雖滿悶尚爲在表正屬少陽部分只須小柴胡加枳桔以治其表如未效以小陷胷合小柴胡去半夏一服如神世俗皆不知其妙若眞結胷不按自痛連臍腹硬手不可近大熱大渴者名大結胷用大陷胷湯若按之方痛心下硬名小結胷用小陷胷湯若懊憹發熱煩渴心下痛硬大便祕昏悶名熱結胷少與大陷胷湯加黃連若懊憹滿悶身無熱口不渴者名寒結胷用枳實理中湯重則三物白散若心下怔忡頭汗出無大熱先渴後悶痛揉之有聲汩汩者名水結胷用半夏茯苓湯傷寒陽證吐衄血不盡畜在上焦胷腹脹滿硬痛身熱漱水不嚥喜忘如狂大便黑小便利名血結胷用犀角地黃湯又有食結支結微結痰結治各不同要在明辨治之凡結胷證悉具煩躁者死結胷脉浮大者不可下下之則死陽明病心下硬滿不可下下之利不止者死此邪氣自表

傳裏全未爲實宜吐之凡結胷有兼發黃發斑有兼發狂或呃忒者最重但脉微細沉小而手足冷者皆難治也若脉沉緊沉滑沉實或數大有力乃可攻之一切結胷證先理其氣用枳殼桔梗以寬之外用薑柤揉熨法甚良其食結開在食積條下

心下痞

痞者太陽證當服麻黃湯發汗而悮用承氣下之而成痞滿此因虛邪留滯若欲下之必待表證罷而後可宜用柴胡枳桔湯如惡寒汗出痞滿者附子瀉心

湯服後小便不利者五苓散表未解心下滿悶者名支結柴胡桂枝湯如熱甚而痞者大黃黃連瀉心湯如冷熱偏勝者附子瀉心湯寒多熱少者半夏瀉心湯要知瀉心非瀉心火之熱乃瀉心下之痞滿也謂氣鬱不通泰故也若下早而成者則表邪乘虛內陷結於心胷間但滿而不痛者爲痞氣若不因下早而爲痞者乃表邪傳至胷中未入乎腑證雖滿悶尚爲在表只用小柴胡枳桔湯未效只以小柴胡合小陷胷湯如神效

自利

傷寒自利者不因攻下而自瀉利俗呼漏底傷寒是也蓋下利者有協熱協寒之別要在明辨治之夫傷寒下利多責於熱熱邪傳裏裏虛協熱亦爲下利雜病下利多責於寒傷寒三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身涼無熱此其大槩耳要知瀉青白爲寒瀉黃赤黑爲熱大抵瀉利如小便清白不澀大便清完穀不變有如鶩溏或吐利腥穢小便澄清口不燥渴其脉沉細無力或遲或微或伏或身雖發熱手足厥冷或惡寒踡臥皆屬寒也若渴飲水漿口中乾燥小便或赤或黃或澀或不利大便利下之物皆如垢膩之狀其色或黃或赤或黑去後皆熱臭氣煖如湯後重如滯其脉多數或浮有力或濇或弦或洪或實此皆屬熱也亦有邪熱不殺穀消化者但脉數而身熱口燥渴而小便赤黃或澀以此別之夫寒因寒中臟腑熱因熱邪傳裏表因胃受風邪木來侮土故令暴下或溫或攻或固下焦或利小便隨證施治但凡下利切不宜發汗若汗之使邪氣內攻復

泄其津液胃氣轉虛必成脹滿也當先治利利止內實正氣得復邪氣自解則微汗出而愈蓋下利爲內虛若發其汗則內外俱虛變證出矣若夫下利譫語目直視者下利厥逆煩躁不眠者下利發熱厥逆自汗者下利厥冷無脉者灸之不溫脉不出者下利一日十數行脉反實者下利脉弦大熱不止者五者之中最急也蓋五臟氣俱絕利不止六腑氣俱絕手足寒此名言也太陽與陽明合病必自下利葛根湯其脉浮而長太陽證悞下早利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黄芩黄連湯太陽與少陽合病必自下利者黄芩湯其脉浮而弦陽明與少陽合病必自下利其脉弦長而滑乃有宿滯也宜小承氣湯下之太陽證未解而悞下之遂協熱利心下痞硬表裏未解人參桂枝湯凡下利煩熱而渴小便不利者五苓散內熱心煩加炒黄連腹痛加炒芍藥陽明下利心煩不得眠小便不利者猪苓湯下利熱甚飲水下重者白頭翁湯下利脉滑而數者有宿食也小承氣湯下利譫語者有燥屎也小承湯氣下利更心煩

心下滿而按之軟者虛也梔子豉湯凡濕熱水瀉注下小便不利而口渴者五苓散加滑石木通車前腹痛加炒芍藥凡內虛胃熱煩渴瀉利脈弱者七味人參白朮散若發熱者用參胡三白湯去黃芩加炒黃連凡下利純清水心下硬痛口中燥渴脈沉實有力者急下之大承氣湯此利乃自飲湯藥而利是旁流糞水自有燥屎結實在內非寒利也凡協熱則利下赤黃腸垢膩者臍下必熱黃芩湯熱毒入胃下利赤黃垢膩者黃芩湯協熱下利不止三黃熟艾湯已上皆陽證之下利也

太陰下利而不渴脈沉者理中湯寒甚脈細加附子若腹滿小便不利者五苓散合理中湯若嘔加藿香半夏生薑濕多而瀉不止者倍加蒼白朮如腹脹加厚朴腹痛加炒芍藥及肉桂木香以溫之也少陰自利而渴小便色白者虛故引水自救下虛有寒故便色白也附子湯治之凡泄利下重四逆者四逆散脈沉者加附子凡傷寒四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利者此有水也眞武湯治之凡下利脈微

者白通湯若厥逆乾嘔煩躁無脈者白通加猪膽汁湯服後脈暴出者死微續者生若下利咽痛胷滿心煩者猪膚湯凡下利清穀裏寒外熱手足冷脈微欲絕其人面赤或咽痛者通脈四逆湯凡下利惡寒而踡臥手足溫者可治逆冷無脈者不治若下利止而頭眩時時自冒者死吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

厥陰傷寒先厥冷發熱者下利必自止再厥者必復利也凡厥逆而利當不能食反能食者爲除中脈不出者死大汗出熱不去內拘急四肢冷又下利厥逆惡寒者茱萸四逆湯大汗出大下利厥冷者四逆湯下利有微熱脈弱者令自愈下利脈數有微熱汗出者令自愈設脈緊者爲未解也凡下利脈沉弦者下重也脈大者爲未止脈弱者爲欲愈也雖發熱不死下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解也若微厥面戴陽利不止者附子湯凡下利脈數而渴者令自愈設不愈者必便膿血以有熱故也凡下利脈絕手足厥冷卒時脈還手足

溫者生脈不還者死若傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死蓋有陰無陽故也凡發熱而手足厥冷七日下利者爲難治傷寒下後續得清穀下利裏寒外熱身疼痛者當先救裏四逆湯清便自調急當救表桂枝湯尺脈弦腸鳴泄利腹痛者冷痛也小建中湯寒毒下利面戴陽者下虛也四逆湯胃寒下利鴨溏色白臍下必冷腹脹滿小便清白四逆湯寒毒入胃下利或如鴨溏色理中湯甚者加附子凡傷寒傷水作利脈浮表未解者仲景以小青龍湯去麻黃加芫花蓋散表邪兼治水也若小便不利大便瀉水作利者五苓散甚不止加芫花蓋水去則利止也凡傷寒上二部脈皆平心下硬而利者腸胃有宿積也大承氣湯下之下利脈大者虛也以其強下之故設若脈來浮因爾腸鳴者當歸四逆湯下利瘥至期年月復發者以其病根不盡故也宜下之大承氣湯陽明少陽合病下利頭痛胷滿乾嘔往來寒熱脈長大而弦爲負負者死若長大不弦爲順宜下之下利嗽而嘔煩不得眠猪苓湯凡傷寒下利清穀者

卽米穀未化此胃虛內寒口不渴身不熱蓋不變而下也宜溫之以四逆湯主治也

便膿血

衝脉爲血之海卽血室也男女俱有此血氣亦俱有此衝脉得熱血必妄行在男子則下血譫語其邪熱由陽明而傳在婦人則寒熱似瘧邪乃隨經而入此爲熱入血室迫血下行則協熱而動也挾血之脉乍澀乍數或沉或伏血熱交併則脉洪盛大抵男多於左手女多於右手見之又有陰寒爲病下利膿血者乃下焦虛寒腸胃不固清濁不分而下利膿血也一爲協熱一爲陰寒臨證精別古人謂血熱無寒又云得熱則行得冷則凝皆大概言之耳大抵十分中有八九分屬熱一二分屬寒不可一例取之陽證內熱則下鮮紅之血陰證內熱則下紫黑成塊或如豚肝狀夫陽證則脉數若數而有力爲實熱用苦寒之藥若數而無力爲虛熱不可用苦寒之藥須補血藥內少佐一二味寒藥可也若陰證則脉遲若遲而有力爲有神可治遲而無力爲無神難治也凡下利膿血

身熱脉大爲難治身凉脉小爲易治凡下血脉洪大急硬不和者死脉雖大而和者乃可治也太陽之病不解熱結膀胱其人如狂而血自下者可用桂枝湯若瘀血用桃仁承氣湯陽明下血讝語胷脅滿如結胷狀夜則見鬼此爲熱入血室小柴胡加生地丹皮當歸血不止加黃連地楡有瘀血加紅花桃仁少陰下利膿血用桃花湯腹滿或痛身熱下利膿血或如魚腦或如爛肉汁或如豆汁者此濕氣毒氣入胃並用桃花湯黃連阿膠湯選用下利無表裏證脉數不解消穀易饑數日不大便此有瘀血輕則小柴胡加桃仁大黃重則用桃仁承氣湯下焦有瘀血如狂或喜忘小腹滿硬小水自利大便黑或身目黃桃仁承氣湯下之

讝語

讝語者經云邪氣盛則實精氣奪則虛故脉實則讝語虛則鄭聲胃中實熱上乘於心心爲熱入胃則神思昏迷妄有所見而言也輕則睡中呢喃重則不睡妄語有錯語有獨語有狂語有亂語有語言不休此

數者可見其熱之輕重也大抵熱入胃胃中水涸糞燥必發讝語若其脈沉數大便不通燥渴讝語者此爲邪氣實也若其脈來沉遲而無力大便下利或清穀無熱不渴及亡陽火刧讝語者此爲正氣虛故也且夫讝語蓋非一端有潮熱自汗內實者有腹滿喘急內實者有舌乾口燥內實者有下利純清水心下硬痛者有三陽倂病有三陽合病者有表虛裏實者有熱入血室者有汗多亡陽者有大熱入胃胃燥屎結實者有過經不解有下後驚惕有火刧等證有陽厥大便實皆發讝語也又有不可治者直視下利讝語者死汗多亡陽脈短讝語者死舌強舌硬舌黑讝語者死與夫喘滿氣逆上奔自利氣脫而下奪俱死證也若陽證讝語妄言身當有熱脈當洪大而反手足逆冷脈沉細而微者不過一日死矣

若陽病內實者其人日晡發潮熱讝語大便祕實手足乍冷乍溫面赤煩渴手心腋下濈濈然汗出其脈沉實或滑數揚手擲足揭去衣被大渴讝語者但當大柴胡湯下之若轉屎氣者急用承氣湯下之凡潮

熱譫語未可下者且與小柴胡減半夏枳實若渴欲飲水口乾舌燥者人參白虎湯若表裏大熱煩渴譫語脉洪數者以小柴胡合白虎主之若胃熱大便結者調胃承氣主之腹滿譫語者以手按之病人腹中硬痛或喘滿燥渴手不可近者此乃燥屎內實宜小承氣湯下之若腹滿按之軟者或時滿時減者為裏虛不可下也宜理中湯溫之下利譫語者脉若滑數有宿食也用承氣下之此燥屎結實心下有硬痛燥渴此利乃稀水或湯飲汁旁流大腸而為利也要在脉滑數者乃可下之此通因通注陽明併病譫語者與太陽病罷但發熱手足熱而汗出大便難而譫語者下之則愈此陽明內實故下之也調胃承氣湯陽明合病譫語者腹滿身重難以轉側口中不仁面垢遺尿自汗譫語者白虎湯

表虛裏實譫語者傷寒四五日至六七日喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便難譫語者此表虛裏實也宜調胃承氣湯下之若未可下者人參白虎湯主之

熱入血室譫語者在男子因邪熱傳入陽明病則失血而致在婦人則寒熱似瘧邪乃隨經而入此爲熱入血室小柴胡加生地丹皮當歸主之若血畜下焦其人喜忘如狂小腹硬滿而痛小便自利大便黑與夫下利無表裏證脉數不解入穀易飢會不大便此爲畜血譫語宜下血則愈用桃仁承氣湯

若男婦畜血上焦結胷硬痛燥渴漱水不欲嚥或身黃者口出譫語經云挾血如見祟用犀角地黃湯重則桃仁承氣湯下之

大抵當汗失汗熱畜在裏熱化爲血其人喜忘如狂血上逆則喜忘血下畜則內爭是必小腹痛俱當下血爲愈

得病無熱但狂言煩躁不安精采不與人相當此太陽本病邪結膀胱其人如狂與五苓散利之加辰砂末

亡陽譫語者因發汗過多不止而爲亡陽不可下宜柴胡桂枝湯和其榮衛以通其津液則愈與夫濕溫風溫重發其汗亦爲亡陽前湯主之其亡陽譫語脉

短者死脉自和者愈

大熱入胃讝語者太陽病一二日煩躁以火熨烘其背而大汗出此大熱入胃胃中水竭躁擾至十餘日振慄自下利者此爲難解故其汗從腰以下不得出欲小便不得而反嘔又欲失溲足下惡風大便硬小便當數而反不數及多大便也其頭卓然而痛其人足下必熱此穀氣下流故也此證最難治

過經讝語者十三日不解謂之過經讝語以有熱也當下之宜從緩治調胃承氣湯元氣弱者大柴胡湯

虛甚用蜜導法

驚惕讝語者傷寒八九日下之胷當煩滿小便不利一身盡痛不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯

火刧讝語者因傷寒不得汗以火刧取汗因發讝語用小柴胡加龍骨牡蠣湯

錯語者乃語意差錯而胡說也若自知覺者邪之輕也如差錯而自不知者此邪熱甚而正氣衰也若錯語呻吟乾嘔不得眠黃連解毒湯或發熱或日晡潮熱往來寒熱口苦胷滿錯語者小柴胡加黃連主之

不得眠加山梔若脉洪數潮熱煩渴心煩錯語者人參白虎湯若脉滑數潮熱煩渴口乾舌燥大便不通讝語者大柴胡湯下之凡脉弱人虛精神不足讝語者竹葉石膏湯虛甚讝語柴胡三白湯加黃連麥門冬五味子主之

獨語者傷寒十餘日日晡發潮熱獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀而不安微喘直視脉弦小便利者生脉濇不利者死若病熱輕其脉滑數有力大便不通大柴胡下之加芒硝如未可下者用小柴胡合白虎湯加黃連芩桂主之

狂言者謂邪熱亢盛發狂叫喊而言也或棄衣而走登高而歌此陽明內實也宜大承氣湯下之備詳發狂條下

傷寒痰結胷中難出亦有煩躁亂語而言也開後痰證類寒條下

鄭聲

鄭聲如鄭衞之音轉不正也蓋汗下後病人失本音而正氣虛則鄭重語散不知高下乃精氣奪之候大

抵鄭聲乃因汗下後或自利正氣內虛將脫或手足並冷脉息沉細無力口鼻氣息短少語言輕微無力接續出入之氣且促或短氣難以布息者皆是元氣將脫是鄭聲也若昏沉上氣喘促或發呃不止不知人事者死也如氣息不促手足頗溫其脉沉細者急以白虎湯加人參五味麥門冬助其元氣或濃煎獨參湯徐徐呷之亦良法也

懊憹

懊憹者鬱悶不舒之貌蓋表證誤下正氣內虛陽邪內陷於心胷之間重則爲結胷也邪在胷中則宜吐熱結胃腑則宜下凡傷寒汗吐下後虛煩不眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯若氣少加炙甘草若嘔者加生薑凡發汗或下之而煩熱胷中窒者梔子豉湯凡傷寒五六日大下後身熱不去心下結痛者梔子豉湯若下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯若傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯陽明病無汗小便不利心中懊憹者必發黃治在發黃條下陽明病脉浮而長口燥咽乾腹滿發

喘身熱汗出不惡寒反惡熱身重者下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯又陽明下之心中懊憹而煩此胃中燥屎內實不大便宜小承氣湯下之若腹滿大便初鞕後溏者不可下也

發斑

夫熱則傷血血熱不散裏寒表虛熱氣乘虛出於皮膚而爲斑也輕則如疹子重則如錦紋或本屬陽悞投熱藥或當汗不汗當下不下下後未解皆能致此也愼不可發汗重令開泄更加斑爛也然斑之纔萌與蚊跡相類發斑多見於胷腹蚊跡只見於手足陽脈洪大病人昏憒先紅後赤者斑也脈不洪大病人自靜先紅後黃者蚊也其或大便自利怫鬱短氣燥屎不通黑斑如果實靨者此雖盧醫復生不能施其巧矣凡汗下後不解足冷耳聾煩悶欬嘔便是發斑之候也

傷寒發斑者蓋因汗下失當熱毒蘊於胷中乃發斑也紅赤爲胃熱紫色爲熱甚紫黑爲胃爛故赤斑五死五生黑斑十死一生大抵鮮紅起發稀朗者吉雖

大亦不妨但忌發如針頭稠密成片紫赤者難治雜黑爛斑者死也凡斑既出須得脈洪數有力身溫足溫易治若脈沉小足冷元氣虛弱者難醫凡斑欲出未出之際且與升麻湯先透其毒若脈虛加人參若食少大便不實加白朮若斑已出不宜再發也夫斑不可汗汗之則增加斑爛不宜下下之則斑毒內陷如脈洪數熱盛煩渴者人參化斑湯若消斑毒犀角元參湯及大青四物湯如熱毒內盛心煩不眠錯語呻吟者黃連解毒湯加元參升麻大青熱甚煩渴喘欬者解毒合化斑湯若斑勢稍退內實不大便譫語潮熱者大柴胡加芒硝甚者用調胃承氣湯曾治一人傷寒八九日發斑四肢强硬昏沉譫語不知人事大便四五日不通以調胃承氣湯一下而愈如未可下有潮熱煩渴者宜以小柴胡去半夏加苦蔞合解毒湯若解胃熱斑爛之毒必用黃連大青犀角元參升麻石膏知母黃芩山梔黃蘗之類要在察其病情合宜則用也

時氣發斑者乃天行時疫之氣也人感者則憎寒壯

熱身體拘急或嘔逆喘嗽或胷中煩悶躁熱起臥不安或頭疼鼻乾呻吟不得眠此斑候也一切斑來勢急者發熱一二日便出斑來勢緩者發熱四五六日而出也凡治斑必察病人元氣虛實脉來有力無力爲主若脉微弱元氣虛者以柴胡三白湯次察斑欲出未透者以升麻葛根湯如胃弱以四君子合升麻葛根名升君湯也如斑不透加紅花若斑疹初出有表證憎寒壯熱頭疼骨痛拘急胷滿者加味羌活散加紅花若發出斑而稠密或咽痛不利者犀角解毒飲元參升麻湯凡斑出脉數煩渴潮熱不解者小柴胡隨證加減若斑出嘔逆用解毒湯加陳皮生薑山梔若喘嗽不止小柴胡加貝母苦蔞知母石膏若咽痛用黃連解毒湯加連翹牛蒡元參升麻桔梗甘草若斑出毒甚黃連解毒湯加元參大青犀角石膏知母宜避忌香臭蓋恐觸其斑也凡斑已出未出之時候不可急投寒涼之藥併寒冷之物恐致胃寒必發嘔吐又不宜汗下虛其表裏若脉弱者必先因有房事要在審問明白如有夾寒者必先助其元氣爲要

也

溫毒發斑即時氣也蓋冬時應天寒冷而反大溫人感不正之氣而爲病也治例與時氣同法但溫毒尤盛用元參升麻湯犀角大青湯人參化斑湯青黛一物湯黃連解毒湯選用其溫熱二證發斑者治與傷寒同法此由怫鬱之極自內而發於外亦非輕也

陽毒發斑者其證狂言下利咽痛斑如錦紋用陽毒升麻湯犀角元參湯黃連解毒湯人參化斑湯選用備詳陽毒條下

內傷寒發斑者因暑月得之先因傷暑次食寒凉之物幷以凉處內外皆寒逼其暑火浮遊於外而發斑也曾治一人病發寒熱間作有斑三五點鼻中微血出兩手脈沉濇皮膚按之殊無大熱此內傷寒發斑也用調中湯數服而愈若夾暑用香薷扁豆主之

陰證發斑者亦出胷背手足但稀少而淡紅色也此人元氣素虛先因慾事內損腎經或悞服凉藥太過遂成陰證伏寒於下逼其無根失守之火聚於胷中熱上熏肺傳於皮膚而發斑點但如蚊蚋蚤虱咬痕

然斑大紅點俱以調中湯溫胃加以茴香炒芍藥寒熱脉微者大建中湯則其陽回陰火自降其病乃愈此治本不治標也凡見斑不可專以斑治須察其脉之浮沉病之虛實則爲善治斑也

發黃

發黃濕熱交併民多病癉癉者單陽而無陰也太陰脾土濕熱所蒸色見於外必發身黃濕氣勝則如熏黃而晦熱氣勝則如橘黃而明傷寒至發黃熱勢已極且與畜血證大抵相類但小便不利爲黃小便自利爲畜血又有內傷陰證亦有發黃者須當明辨之不可混作濕熱而治一切發黃設或寸口無脉鼻中冷氣與夫形如煙煤搖頭直視環口黧黑舉身發黃此皆眞臟絕也瘀熱在裏但頭汗出劑頸而還身無汗渴飲水漿小便不利此爲瘀熱在裏因汗不越必發黃其色如橘子色之黃明也大便不通者茵陳湯小便不利者茵陳五苓散

濕熱發黃一身盡痛發熱口渴小便不利色如熏黃暗而不明也用茵陳五苓散大便實者茵陳湯

寒濕發黃者病人身疼發熱而黃頭疼鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕用瓜蔕散搐鼻中取黃水出則愈或用神术湯加麻黃茵陳微汗之濕家發黃一身盡痛不能轉側身熱色如熏黃小便不利茵陳五苓散小便自利术附湯身煩疼麻黃湯加蒼术

痞氣發黃病人心下滿硬按之不痛者是也宜半夏瀉心湯加茵陳枳實小便不利宜茵陳五苓散加山梔蓋痞消則黃自退也

結胷發黃病人心胷滿硬按之痛或手不可近大陷胷湯加茵陳蓋結去則黃自退也

畜血發黃者其人身黃脉沉結小腹滿硬小便自利大便黑色其人如狂此爲畜血在下焦用桃仁承氣湯下之蓋血下則黃退也

內傷寒發黃者其人脾胃素虛或食寒涼生冷之物或傷食結搏停滯不散中州變寒而發黃也或嘔吐或腹滿或腹痛或自利小便短少者宜調中湯加茵陳或理中湯加枳實茵陳靑皮陳皮草果逆冷脉沉

加附子溫之而愈也

陰證發黃者其人兩手脉沉細遲肢體逆冷肉上粟起或氣促嘔悶舌上白胎而滑遍身發黃或時煩躁面赤或時欲投泥水中或欲坐井中者此陰黃也輕用理中加茵陳重用四逆湯加茵陳

凡治陰黃須用熱湯溫之或以湯盛盆中將病人坐於上以布蘸熱搭其黃上乃愈

凡發黃如合麴相似濕熱瘀血血證發黃者則多有之其內傷寒發黃陰證發黃者則間或有之也經云脉沉渴欲飲水者必發黃陽明病無汗而小便不利心中懊憹者必發黃

又被火刼額上微汗出小便不利心中懊憹者必發黃

太抵身熱煩渴無汗小便不利者必發黃也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十八卷目錄

醫部彙考三百四十八

傷寒門十四

陶華全生集

發狂　心下滿　欬嗽　喘　心
下悸　身振　戰慄　腹滿　腹
痛　小腹滿　小便不通　小便數　小便難
少　小便自利　不大便　無表裏證　陰陽
證　陽證似陰　陰證似陽　太陽脈似少陰
少陰證似太陽　陰證身熱面赤　陰毒　冐
中冷厥　除中　寒熱二厥　蚘厥　冷結膀
胱　短氣　多眠　晝夜偏劇　不眠　咽痛
佛鬱　驚惕　奔豚　狐惑　漱水不欲嚥
百合　瘛瘲　肉瞤筋惕　肉苛　鬱冒

過經不解　目直視

藝術典第三百六十八卷

醫部彙考三百四十八

傷寒門十四

明陶華全生集

發狂

傷寒發狂最爲惡候其例多般要在明辨治之陽盛發狂者陽盛則四肢實實則登高而歌也此傷寒熱毒入胃併入於心遂使神不寧而志不定始得少臥不安妄語悲歎甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋

罵詈叫喊不避親疎大渴欲飲獨陽亢盛重陽者狂此神明之亂皆非素所能爲乃病之使然也一切發狂奔走勢不可遏者須於病人處生火一盆用醋一碗傾於火上其煙衝入病人鼻內仍將薑汁噴於病人頭面身體手足卽安方可察其陽狂陰躁用藥若病初起頭疼發熱惡寒體痛表證皆除已後熱邪傳裏大渴飲水目赤脣焦舌乾齒燥狂妄不寧脉來洪數有力大便實者急宜大承氣下之不大下之何能止也如熱勢輕未可大下者宜加減三黃石膏湯治之但見舌卷囊縮難治間有可生亦宜急下不可緩也與陰證囊縮者大不侔矣若發狂直視便溺自遺與夫汗後大熱脉躁疾狂言不能食死也陽明經病欲作汗而狂者病人欲食小便反不利大便自調骨節痛翕然如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解此水不勝土穀氣與汗共併故發狂脉緊者則汗出而愈也

若畜血發狂者傷寒六七日或八九日其人發狂脉沉數乃熱在下焦小腹硬滿而痛或身黃小水自利

以其有畜血也宜桃仁承氣湯下盡黑物則愈熱輕者喜忘如狂脉微身黃脣痿舌青口燥或但漱水而不飲嚥者又無寒熱小便自利大便黑色此亦畜血證也輕用犀角地黃湯甚者桃仁承氣湯下血則愈若太陽不解熱結膀胱其人如狂而血自下者愈若外不解與桂枝湯外已解內不消但小腹急結或硬痛滿小便自利大便黑亦畜血證也桃仁承氣湯此三者雖如狂未至於狂也

驚狂者傷寒脉浮無汗醫以火逼取汗必驚狂臥起不安宜桂枝救逆湯調辰砂末溫病發狂者乃冬月伏寒所化至春時因溫氣而發也表證在者芎蘇散合羌活沖和湯加柴葛若半表半裏者小柴胡湯若脉大胷滿多痰發狂者小柴胡加枳桔苦蔞山梔升麻吐之若脉浮數壯熱而不得汗出者宜六神通解散汗之若表裏俱實熱盛者宜三黃石膏湯主之

若邪熱傳裏燥渴譫妄大便祕實者當用大承氣湯下之

若熱病發狂者乃冬月伏寒所化至夏月因炎暑而

發其熱勢比之溫病尤加盛也

若發表用神术湯加芎蘇

若發狂無汗脉數大者六神通解散汗之熱甚者三黄石膏湯主之裏熱燥渴譫妄大便實脉洪大者大承氣下之

一切熱證發狂切不可掩閉牀帳務用揭開放入爽氣良久隨用銅鏡按在心胷間熱勢稍退即除若傷寒溫熱勢太盛發狂燥渴不止者將硝半斤研細用水一盆用青布方圓一尺許三五塊浸於硝水中微攪半乾搭在病人胷膛并後心上頻易冷者搭之如得睡汗乃愈如熱極盛此法不能解當用解結湯開在結胷條下服後作寒戰汗出乃愈

若熱極舌出不收者用麻黄湯洗淨將冰片牛黄麝香研末點舌上即收此爲良法時行發狂者與此同治法大抵通治傷寒溫熱病及時行發狂者

若得汗出者生不得汗出者死

若脉小逆冷者難治正謂溫熱時氣不得汗出則發狂也要在察而治之

陽毒發狂者其人素有積熱於內因患傷寒又失汗下乃熱溫爲病六脉洪大而數其人舌捲目赤脣黑鼻如烟煤或面赤咽痛狂言下利赤黃大渴欲死或發斑黃頭面脅背狀如錦紋或如豌豆之類而發狂者七日內可治七日外則難治也宜陽毒升麻湯甚者三黃石膏湯大抵與陽盛發狂治例相同因有發斑咽痛故曰毒也

陽厥怒病發狂者因陽氣暴折而難決故善怒也病名陽厥蓋陽暴折鬱而多怒則發狂也治以鐵落飲者以金制木之法也取鐵性沉重之義最能墜熱開結倍以平肝降火之劑若兼痰火內盛而狂者宜入竹瀝薑汁加芩連降之調辰砂末

又有陰證發躁如發狂狀實非狂也其病初起無頭疼不煩躁悶蓋陰極發躁欲坐臥於泥水井中者或欲陰凉處坐躁亂不安者皆如狂也但手足逆冷脉沉細雖煩渴不能飲水者是也用霹靂散溫之宜冷服甚則身寒微熱面赤戴陽足冷煩躁不安脉數大無力乃裏寒下虛此虛陽伏陰而躁宜人參四逆湯

冷服但見厥冷下利煩躁不眠厥不出者難治庸醫不識陰證似陽又不詳陰脉虛陽上隔而躁見其面赤身熱而悞作陽狂實熱反與凉藥則反成大害矣用凉水半盞試之入口卽吐出而不納者是也蓋水性則寒故知陰極而躁也須詳脉有力無力此爲定法

心下滿

心下滿者正在心之下胃之上此自滿也非下之而滿也若因下早而致滿者此爲痞氣也別有治條凡心下滿以手按之則散而硬者此虛氣也如不發熱者以木香和中湯主之若發熱者以小柴胡加枳實薑炒黃連去黃芩治之若按之汩汩有聲而軟者此停水也用小半夏湯合減桂五苓散主之

若按之硬痛者有宿食也輕則消導重則用承氣下之其少陽證寒熱嘔而口苦脅痛脉弦心下滿者若未曾下乃表邪傳至胷中未入乎腑證雖滿悶尚爲在表正屬少陽部分只用小柴胡加枳桔以治其悶如未效仍以小柴胡合小陷胷湯一服豁然神效世

俗皆所未知也

若寒在胷中心下滿而煩饑不能食宜瓜蔕散吐之

陽明病心下硬滿者不可下下之則利利不止者死

又脈浮大有力心下滿硬有熱燥渴讝語大便實者此屬臟病宜攻之按此言屬臟者宿屎在臟也故可下若食在胃口未入於胃亦未可下也備詳食積類傷寒條下

大抵腹中滿心下滿胷中滿俱不可用甘草糖棗甘甜之物蓋甘能補氣填實故也外用前擦法甚良

欬嗽

欬者俗呼爲嗽肺爲邪干氣逆不下有肺寒而欬有停飲而欬有邪在半表半裏而欬治各不同凡表寒欬者脈浮緊惡寒身痛拘急無汗用麻黃湯三物湯汗之痰吐如膠者金沸草散主之

若有熱者參蘇飲去半夏木香加桑皮杏仁麻黃汗之察時令用藥若表寒未解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青龍湯主之若虛人感冒風寒而欬或惡風頭疼乾嘔宜人參杏仁湯主之凡傷寒三四日傳少

陽經脉弦口苦發熱惡寒而欬者小柴胡去參加五味乾薑少許麥冬知母貝母若發熱胷中滿而欬者加苦蔞黃連若渴加天花粉去半夏若胷脅滿發熱而欬者加枳殼桔梗凡少陰病脉沉四肢逆冷而欬者四逆散加乾薑細辛五味若少陰病四肢沉重痛而自利而欬者此裏有水也眞武湯主之凡太陽病若身熱欬嗽乾嘔微喘而利惡寒腹痛小青龍湯主之若身凉欬嗽乾嘔微利心下滿脅下痛十棗湯主之按小青龍湯治太陽表寒停水也十棗湯治太陽裏寒停水也眞武湯治少陰裏寒停水也各有加減法凡陰證手足逆冷脉沉而欬者四逆湯加五味主之大抵傷寒欬嗽不與雜病同也按仲景治法有嗽者不分陰陽二證俱用五味乾薑病初起卒難便用五味恐其酸收閉住邪氣故也然後用五味者葢收肺氣保肺金而止嗽以乾薑之辛溫肺金而散逆氣先入肺矣用者詳之

喘

喘者有邪在表而喘有邪在裏而喘有水飲而喘在

表者心腹滿而不堅脉浮緊惡寒身痛無汗而喘宜麻黃湯汗之若表有風邪發喘脉浮緩有汗宜桂枝湯更加厚朴杏仁主之經云喘而汗出宜和之汗不出而喘宜發之凡汗後飲水者水停心下有水氣乾嘔發熱而喘或欬者小青龍湯主之凡發汗後汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯主之凡太陽病悞下之利不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯主之凡陽明病內實不大便潮熱腹堅滿自汗燥渴而喘者大柴胡加厚朴杏仁主之甚

者用承氣湯下之凡太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下宜麻黃湯主之凡陰證厥逆脉沉細氣短促喘而無汗者可治宜四逆湯加五味杏仁主之若冷汗自出如油或汗出髮潤或額汗出如珠不流喘而不休者皆死證也凡虛人脉伏若手足厥冷而喘者五味湯主之凡暴感風寒脉浮緊無汗而喘者蘇陳九寶湯主之凡熱盛有痰脉弦數而喘者不可汗下用小柴胡加知母苦蔞貝母桔梗陳皮和之胷脅滿加枳殼桔梗青皮去甘草心下滿加枳實黃連去甘

草舌燥飲水而喘者加石膏知母天花粉去半夏然雖發喘病之常也其或直視讝語或目上視或目斜視汗出喘滿者俱不治也

心下悸

悸者怔忡也心中築築然動氣而不安也其證有二焉一者氣虛一者停飲其氣虛者陽氣內弱心中虛空而悸又汗下後正氣內虛亦令人悸與氣虛而悸則又甚矣治法皆須實其浮氣也其停飲者因飲水過多停滿心下心火惡水不能自安而爲悸也治法須分水氣雖有餘邪必先治悸與水免使水氣散之而成他證也故經有云傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯少陰病四肢逆冷而心中悸者四逆散加茯苓桂主之凡飲水過多而悸者宜茯苓甘草湯合五苓散分利之太陽病發汗過多其人叉手自冒心下悸惕欲得按者宜桂枝甘草湯凡厥而心下悸者此有水氣當先治水茯苓甘草湯不然水入胃中必作利也凡汗下後內虛而悸者小建中湯合人參三白湯主之若脉沉細者眞武湯主之經云先煩後悸

爲熱竹葉石膏湯加參先悸後煩者爲虛宜小建中湯若太陽病小便利者以飲水多故心下悸茯苓桂枝白朮甘草湯小便少者必裏急猪苓湯陽明病壯熱往來心下悸小便不利心煩喜嘔小柴胡加葛根猪苓太陽汗後臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝白朮甘草湯太陽汗不解仍發熱心下悸頭眩肌體瞤動振振欲擗地者眞武湯少陽耳聾目赤胷滿而煩妄加吐利則悸而驚與小建中湯有熱小柴胡湯主治也

身振

振者身振振而動搖也葢汗吐下後太過使氣血虛而作也若汗吐下後心下逆滿氣衝胷起則頭眩身振振動搖者茯苓桂枝白朮甘草湯太陽發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地眞武湯大抵氣血俱虛不能榮養筋骨其身不能主持故爲振搖也須大補氣血曾用人參養榮湯數服甚效又一人身搖不得眠者以十味溫膽湯倍用人參得效

戰慄

戰慄陰陽相爭故身爲之搖也邪氣外與正氣爭則爲戰邪氣內與正氣爭則爲慄傷寒六七日欲解之時必發戰而汗出解也戰則正氣勝故得汗而解慄則不戰而但心戰頭搖鼓頷遂成寒逆者有之此陰氣內勝正氣虛極不能勝邪宜薑附四逆湯故經云陰中於邪必內慄而戰邪在上焦陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出皆此類也凡戰主外其人森然寒聳則身戰搖慄主內則心戰也經云寒之傷人使人毫毛畢直鼓頷戰慄而無汗者此表寒而戰慄也當發汗病有戰而汗出因得解者蓋其脈浮而緊按之反芤此爲本虛故戰而汗出得解也又云脈陰陽俱停謂無偏勝以其寸關尺三部大小脈沉同等雖劇當愈必先戰慄汗出而解也若脈浮數按之不芤其人元本不虛若欲自解則汗自出而解不發戰也夫戰者邪氣將出邪正交爭其人本虛是以發戰且正氣勝邪則戰已發熱大汗出而解也若正氣不能勝邪雖戰無汗爲難治若得半日或至夜有汗者亦爲解也凡小柴胡湯證而以他藥下之柴胡證不罷而仍在

者復與小柴胡湯服之此不爲逆服湯良久必蒸蒸而振發寒熱汗出而解也若不發戰而心慄者此陰中於邪必內慄也凡正氣怯弱寒邪在內是必爲慄蓋戰者正氣勝邪欲解也慄者邪氣勝正故爲重也又有傷寒厥陰逆至第六七日脉得微緩微浮爲有脾胃脉也故知脾氣全不再受剋邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

腹滿

腹滿者腹中脹滿也脾爲中央之土所以腹滿多屬太陰也腹滿不減者爲裏實須下之腹滿時減者爲裏虛當溫之若解表內不消非大滿猶生寒熱亦未可下是邪未全入腑也若大滿大實大堅有燥糞雖得四五日亦可與下謂邪已入腑也若太陰腹滿時減復如故此虛寒從下上也宜理中湯加厚朴木香若太陰證悞下因時腹滿而痛桂枝芍藥湯痛甚者桂枝大黃湯陽明證潮熱譫語躁渴喘滿不大便者大柴胡湯大實大滿者用調胃承氣湯噦而腹滿小便難者小柴胡加茯苓三陽合病腹滿身痛難以轉

側譫語口中不仁小柴胡湯有汗白虎湯凡太陽吐食腹滿食不下枳實理中湯加丁香厚朴木香治之少陰六七日不大便腹脹滿痛急下之大承氣湯腹皮痛者脾不勝水水與氣搏皮肉之間腹滿而鳴漉漉有聲小半夏茯苓湯加桂下利腹滿身疼痛先溫裏以四逆湯後攻表以桂枝湯汗後腹滿當溫厚朴半夏生薑人參湯吐後腹滿內實當下少與調胃承氣湯下後腹滿臥起不安當吐梔子豉湯加厚朴腹脹滿者陰陽不和也宜桔梗半夏湯大抵陽熱爲邪則腹滿而咽乾陰寒爲邪則腹滿而吐利食不下也

一切腹滿以手按之而痛或手按之不可近者此爲內實若按之可揉而軟者皆爲內虛也

腹痛

凡腹中痛邪氣入裏正氣相搏則爲腹痛陽邪傳裏而痛者其痛不常當以辛溫之劑和之陰寒在裏而痛者則痛無休時欲作利也當以熱劑溫之有燥屎宿食而痛者則煩而不大便腹滿而痛也當以苦寒之劑下之諸痛爲實則痛隨利減此爲裏實凡太陽

證下早因爾腹痛者屬太陰桂枝加芍藥湯大實痛者桂枝大黃湯凡中脘痛屬脾土太陰證脈沉遲內寒者理中湯加木香砂仁若下利清穀或欲絕者四逆湯小腹痛屬厥陰茱萸四逆湯加當歸木香凡內實腹痛幷遶臍硬滿刺痛煩躁發作及燥屎痛宜下之小承氣湯若潮熱不大便從心下至小腹硬滿而痛手不可近者用大陷胷湯凡胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯如脈弦腹痛無寒熱者芍藥甘草湯凡脈弦口苦發熱腹中痛者小柴胡去參加炒芍藥若寒熱交作腹痛加肉桂芍藥寒多去芩倍加桂熱多去桂倍加芩連柴胡凡少陰發熱手足冷腹痛或欬或悸或小便不利或泄瀉後重四逆散加附子炒芍藥官桂吳茱萸若發熱脈洪弦腹痛者芍藥黃芩湯傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨小腹者欲作利也四逆湯主之大抵腹痛有虛有實若可按可揉而軟者爲虛若不可按不可揉而硬者爲實又有寒有熱有血有食當明辨之治法先將凉水一盃與病人飲之其痛若緩身有熱者屬熱痛當用

涼藥清之清之不已而遶臍硬痛煩熱譫語大便實者屬燥屎痛當用寒藥下之如食積痛必噫氣惡食酸臭如痛處不移或在脅下或小腹必硬滿小水自利大便黑此皆痛隨利減之法也若飲水愈加作痛者屬寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷腹痛吐瀉者急用熱藥投之須詳脈來有力無力乃爲良法也

小腹滿

小腹滿者臍下滿也若胷滿心下滿腹痛滿皆爲邪氣而非物今小腹滿則爲有物而非氣矣若小便利者則爲畜血之證小便不利者乃溺澀之證滲利之劑宜分兩途太陽病不解熱結膀胱其人如狂小腹急滿者小便自利用桃仁承氣湯下盡黑物則愈太陰身黃小腹滿小便不利者與五苓散利之小便清白爲愈有陰虛寒證小腹滿痛者又當茱萸四逆湯溫之甚者灸關元氣海穴又有病人手足厥冷脈沉不結胷小腹滿按之則痛者此冷結膀胱宜四逆湯及灸關元穴凡病人素有痞氣連在臍旁痛引陰筋

者名臟結死證也大抵以手按小腹硬滿而痛者爲實不痛者爲虛乃良法也

小便不通

邪氣聚於下焦結而不散甚則小腹滿痛此小便不通也大抵有所不利者行之使其滲泄也若引飲過多下焦畜熱或中熱發黃水飲停滯皆以利小便爲先惟汗後亡津液則以利小便爲戒設或小便不利見頭汗出者乃爲陽脫關格病也

太陽經發熱脈浮無汗煩渴小便不利五苓散若自汗多不可用也若引飲過多小便不利下焦畜熱脈浮五苓散脈沉猪苓湯若太陽身黃脈沉結小腹滿小便不利者爲畜血茵陳五苓散甚者茵陳湯

陽明病發潮熱汗多者小便固少不可利恐胃汁乾也若利之必喘渴而死脈洪大舌乾口燥飲水不止者人參白虎湯若大便乍易乍難小便不利而熱者此有燥屎也調胃承氣湯下之若頭汗出壯熱渴飲水漿小便不利及陽明無汗心中懊憹小便不利此二者必發黃茵陳湯加木通滑石去大黃大便不通

加大黃下之

少陽證發熱口苦咽乾或嘔或心下悸胷滿小便不利脉弦數者小柴胡去芩加茯苓口渴加竹葉麥冬天花粉去半夏

太陰腹滿自利若小便不利無熱脉沉者理中合五苓散加厚朴木通分利其小便大便自止也

少陰四五日小便不利四肢沉重大便自利者眞武湯若四肢冷或欬或悸小便不利或泄利下重者四逆散加熟附

厥陰寒閉厥冷脉伏囊縮入腹小便不利四逆湯加通草茯苓茱萸當歸再灸關元丹田氣海兼熨法甚良

凡治風温風濕小水不利者詳見本條陰虛火動小便赤澀不利者四苓散加木通滑石生地黃蘗知母若內熱甚大便不通小水赤澀不利者八正散若不渴小便不利者熱在血分也四苓散加黃蘗知母生地當歸木通白芍

夫膀胱爲津液之腑氣化則能出也若有汗多者津

液外泄小便固少不可利恐重傷津液也待汗止小便自行矣凡小便自利不可妄利恐引熱入膀胱則變畜血證也

小便數

小便數者頻欲便而不多也腎與膀胱虛而挾熱滑則水道澀則小便難故澀淋而數起也若自汗而小便數者雖有表證不可用桂枝爲亡陽走津液也太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒脚攣急小便數悞服桂枝湯得之便厥者與甘草乾薑湯加芍藥太陽病吐汗下後小便數大便鞕而讝語者有燥屎也小承氣下之若陽明自汗而小便數脉浮數胃不和而讝語者調胃承氣湯若太陽陽明小便數而大便祕此名脾約約者束也儉也爲約束津不行也用脾約丸陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大便則難是爲脾約用前脾約麻仁丸又有腎虛陰少小便頻數者清心蓮子飲加黃蘗知母麥冬治之

小便難少

陰虛則小便難陰虛者陽必湊之因膀胱受熱故小

便赤澀而不能流利也又云雖不大便六七日小便少者但初鞕後溏不定或鞕攻之必溏須小便多屎定鞕方可攻之乃胃中水穀不分雖通而不多也陽明中風脈浮緊身黃鼻乾氣短腹滿潮熱而噦心脅痛小便難小柴胡加茯苓大便不通者用調胃承氣湯下之太陽病小便難者以飲水多必心下悸茯苓桂枝白朮甘草湯小便少者必苦裏結也猪苓湯主之

小便自利

小便自利者爲津液偏滲大便必鞕宜大柴胡下之陽明自汗者復發其汗使津液內竭屎雖鞕猶不可攻須蜜導法太陰發熱身黃其小便自利則濕熱內泄不能發黃惟血證則小腹急而如狂腎與膀胱俱虛不能約制水液二者皆令小便自利也又有少陰病四逆小便自利或色白爲下虛有寒眞武湯去茯苓甚者用四逆湯三陽合病腹滿身輕口中不仁面垢遺尿者不可汗下用白虎湯若寒邪中於下焦陰氣爲慓足膝逆冷便溺妄出用四逆湯治之及灸關

元穴甚良法也

不大便

不大便者謂大便不通皆因發汗利小便耗其津液所以腸胃乾燥而轉屬陽明裏證多矣有陽經邪熱傳入正陽明胃腑大便不通者有邪熱傳入少陰經而大便不通者有傳入厥陰大便不通者俱當急下之三承氣選用大便通而熱愈也有不當便下者在於脉虛浮惡寒舌上白胎或嘔此猶帶表邪未解不可攻其嘔者因邪全未入腑雖有陽明證亦不可攻也小便淸者知邪不在裏仍在表也亦不可攻若不轉屎氣者內無燥屎也俱不可攻但初鞕後溏脉浮而數大便不通躁渴雖能食者此爲實熱也名曰陽結若目中不明者得屎卽解也宜大柴胡下之甚者用小承氣湯

脉沉而遲不渴不能食身體重大便反鞕不通者此爲虛寒也名曰陰結用四物麻仁湯加熟附若嘔者用金液丹外用蜜導法

若陽脉浮而濇小便數而大便難者名曰脾約宜麻

仁丸

太陽證曾經汗下吐後微煩小便數大便鞕用蜜導法若再下之必清穀不化若陽明自汗過多或已經發汗而小便自利大便不通者此爲津液內竭不可攻之宜蜜導法若元氣實者宜承氣下之

凡傷寒陽證大便五六日不通頭疼身熱躁渴者又宜下之以大柴胡甚者用大承氣湯此因大便燥結不通邪熱之氣上攻於頭而痛也

無表裏證

夫無表裏證者又非表證之可發又非裏證之可下俱宜用小柴胡湯和解之

陰陽證

凡治傷寒須辨陰陽二證不可誤治也且以陽證論之則太陽陽明少陽三陽也如病在太陽則熱在皮膚之分便有頭疼惡寒體痛等證其脈必浮而緊如病在陽明則熱在肌肉之分或壯熱或蒸蒸發熱或皜皜發熱便有頭額痛或潮熱自汗等證其脈必微而洪如病在少陽則在肌或半表半裏熱或往來寒

熱便有頭角痛口苦嘔而胷脅滿痛等證其脉必弦而數蓋陽證面紅光彩脣紅口乾舌燥能飲水漿其人身輕易以轉動常欲開目見人喜欲言語其聲響亮口鼻之氣往來自然小便或赤或黃大便或祕或硬手足自然溫煖爪甲俱紅活此皆陽證也如以陰證論之則太陰少陰厥陰三陰也如病在太陰手足溫而微冷脉息漸沉或自利腹滿嘔吐不渴如病在少陰雖則發熱手足自冷脉必沉細如病在厥陰則手足厥冷脉微而緩甚則脣青舌卷囊縮大抵陰證則面青黑或有虛陽泛上面雖赤色而不紅活光彩其人身重難以轉側或向壁臥或踡臥欲寐或閉目不欲見人而懶言語或氣少而難以布息或口鼻之氣往來自冷其聲音不響亮或前輕後重或時躁熱煩渴不能飲水脣口或青或紫舌色或青或紫或白胎鋪滿而滑不見紅色手足自冷爪甲或青或紫血自不紅活小便青白或淡黃大便不實而或溏或熱在肌表之分以手按之殊無大熱陰甚者則冷透手也陰證發熱自與陽證發熱有異不可以面赤煩渴

爲論要在明辨治之

陽證似陰

陽證似陰者乃火極似水也蓋傷寒熱甚失於汗下陽氣亢極鬱伏於內反見勝己之化於外故其身涼手足逆冷而乍溫狀若陰證大抵脣焦舌燥能飲水漿大便閉硬小便赤澀設有稀糞水利出此內有燥屎結聚乃旁流之物非冷痢也再審有屁極臭者是也其脈雖沉切之必滑數有力或時躁熱不欲衣被或揚手擲足或譫語有力此陽證也輕則用四逆散合小柴胡湯渴用白虎合解毒湯潮熱大便實者用大柴胡湯重則燥熱堅硬痞滿全具者用大承氣湯下之故經云身寒厥冷其脈滑數按之鼓擊於指下者非寒也此則陽盛拒陰也

陰證似陽

陰證似陽者乃水極似火也蓋傷寒傳變或悞服寒涼藥攻熱太速其人素本腎虛受寒遂變陰證冷極於內逼其浮陽之火發見於外其人面赤煩躁欲坐井中身有微熱渴欲飲水復不能飲大便閉結不通

或自利小水淡黃或嘔逆或氣促或鄭聲或咽痛所以狀似陽證庸醫不識見其面赤煩渴便結認作陽證妄投寒冷之劑下咽遂斃可不謹哉切其脈若沉細遲微以通脈四逆湯倍加參附以接眞陽之氣設或救遲遂至陰盛陽衰雖使參附亦不能救此與陰盛格陽例同內經所謂身熱脈數按之不鼓擊於指下者此乃陰盛格陽非熱也又云面赤目赤煩渴引飲脈來七八至而按之則散者此無根之脈用人參四逆湯治之而愈此陰陽幽顯之奧水火徵兆之微傷寒須得傳受講明庶獲效矣

太陽脈似少陰少陰證似太陽

蓋太陽脈似少陰少陰證似太陽所謂相反而治有異也深究其旨均自脈沉發熱以其有頭疼故名太陽病陽證其脈當浮今反不浮而沉者裏虛必寒正氣衰微之所致今身體痛故宜救裏使正氣內强逼邪出外而用乾薑生附亦能出汗而解假若裏不虛寒則見脈浮而正屬太陽麻黃湯證也均自脈沉發熱以其無頭疼故名少陰病陰證當無熱今反熱寒

邪在表未傳在裏但皮膚鬱閉而爲熱如在裏無熱用麻黃附子細辛湯麻黃發表間之汗附子溫少陰之經假使寒邪在裏則外必無熱當見吐利厥逆等證而正屬少陰四逆湯證也以此觀之少陰表邪浮淺發熱之反爲輕太陽正氣衰微脈沉之反爲重此四逆爲劑不爲不重於麻黃附子細辛湯也可見熟附配麻黃發中有補生附配乾薑補中有發所謂太陽少陰脈沉發熱雖同而受病有無頭疼用藥有別故併論之耳

陰證身熱面赤

夫傷寒頭不疼身不熱口不渴初起怕寒戰慄便四肢厥冷嘔吐瀉利踡臥小腹痛或口吐涎沫六脈沉細無力此葢直中陰經眞寒證用薑附湯溫之人皆知是陰證必矣若初起惡寒厥冷踡臥不渴小腹絞痛面脣赤色六脈沉細重則昏沉不省舌卷囊縮手足指甲皆青四肢厥冷過乎肘膝心下脹滿湯藥不受入口則吐或利六脈沉細或伏絕此葢夾陰中寒先用蒸臍灸關元氣海法急用人參四逆湯倍加茱

萸薑汁溫之爲當矣至於身熱面赤足冷脉沉此蓋夾陰傷寒正用麻黃附子細莘湯倍加人參乾薑溫經散寒爲當矣若其身熱面赤足冷脉沉如煩躁欲坐臥於泥水井中者此陰極發躁正用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷服爲當也若身熱面赤足冷脉沉下利清穀身體疼痛此爲陰利寒證俗呼漏底傷寒正用四逆加人參茯苓白朮肉桂肉果砂仁木通燈心升麻少許服之爲當矣若身熱面赤足冷煩躁揭去衣被脉來數大無力此蓋虛陽伏陰正用加減五積散冷服之爲當矣藥服下咽冷體旣消熱性乃發此熱因寒用也此幾證中醫不識足冷脉沉或數大無力中無主斷見其身熱面赤煩躁便認作陽證誤投涼藥死者多矣殊不知陰證不分熱與不熱面赤與不赤憑脉下藥最爲切當不拘脉之浮沉大小但指下無力重按全無便是陰證故足冷也雖有身熱不可與涼藥服之則渴甚而急死當用五積散溫解表裏之寒隨手而愈內有虛寒必須薑附以溫之切忌發泄凡下手脉來雖洪大而數按之不鼓

擊於指下者卽無力也重按全無者卽空大而散是無根之脉也面赤戴陽者乃虛陽泛上下虛故也身微熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也此蓋取脉不取證也原夫夾陰伏陰眞陰陰躁陰利等證皆爲色慾內傷腎經虛損復受寒邪陰氣獨盛陽氣以衰故有此證此脉諺云傷寒偏死下虛人誠哉是言也腎經眞氣者人命之根也可不謹養乎

陰毒

陰毒者其人腎經本虛素有積寒在下或又先因慾事已後著寒或悞服寒凉藥或食生冷物內既伏陰復加外寒內外皆寒遂成陰毒蓄積寒伏於下微陽消於上陰氣極甚陽氣衰微而成毒也陰毒傷寒則額上手背冷汗自出其毒氣漸深則鼻如烟煤舌上黑胎而滑其候目睛疼身重如被杖痛背強小腹裏急絞痛或咽喉不利致毒氣攻心心下脹滿結硬如石四體堅冷如氷湯藥不受或氣促嘔悶或冷汗不止或煩躁吐利甚則神思昏沉手指甲青脣青舌卷囊縮六脉沉細而疾或六脉伏絕此皆陰寒毒氣入

深先用薑汁好酒各半盞熱服脉來可治察其虛寒伏陰用藥又當知病人有無痛處若痛甚者脉必伏急用蒸臍熨法灸關元氣海法灌入煎藥此爲斡旋之功矣

胷中冷厥

凡手足厥冷脉乍緊者此邪結在胷中也故心中滿而煩饑不能食者此病在胷中宜吐之用瓜蔕散主之

除中

凡傷寒脉遲厥深下利當不能食若反能食者名曰除中此證必死也

寒熱二厥

陰陽二厥治之一差死證立判陽厥者先自三陽氣分因感寒邪起於頭疼發熱惡寒已後傳進三陰血分變出四體厥冷乍溫大便燥實讝語發渴揚手擲足不惡寒反惡熱脉沉有力此是傳經熱病謂之陽厥陽極發厥者卽陽證似陰外雖有厥冷內有邪熱耳蓋因大便結實失下使血氣不通手足乍溫乍冷

也如火煉金熱極金反化水水寒極而反成冰反能載物厥微熱亦微四逆散厥深熱亦深大承氣正謂亢則以害其物承乃以制其物倘若醫人不識疑是陰厥復進熱藥如抱薪救火矣夫陰厥者因三陰血分自受寒邪其初病起無身熱無頭疼就便惡寒四肢厥冷直至臂脛以上過乎肘膝不溫引衣踡臥不渴兼或腹痛吐瀉或戰慄面如刀刮口出涎沫脈沉遲無力此爲陰經自中寒證不從陽經傳入謂之陰厥也輕則理中湯重則四逆湯溫之

傷寒寒熱而厥面色不澤冒昧兩手無脈或一手無脈此時要有汗出如重陰欲雨之狀多用綿衣蓋暖手足或用火磚布包放於足下急用熱薑汁調稀米湯服之溫覆取汗乃愈若汗出不止者用人參熟附子乾薑桂枝麻黃根五味子麥門冬煎湯救之若汗不止脈不至者死

蚘厥

蚘厥者其人手足冷而吐蚘也厥陰病其人素有寒妄發其汗或汗後身熱以致胃中虛冷臟寒饑不能

食食即吐蚘蚘入胷故乍靜乍煩須臾復止得食而嘔又煩蚘聞食即出輕者吐小蟲重者吐長蟲舌乾口燥常欲飲水浸舌不欲嚥蚘上煩躁昏亂欲死兩手脈沉遲足冷至膝甚者連蚘幷屎俱出或大便祕而不行此證雖出多端可救治也加味理中安蚘湯主之又有胃中空虛蟲無所安反食其眞臟之血病人心胷脅下有痛陣必撮眉呻吟或時下血如豚肝色或如濕毒膿狀或如鮮血色或下利急迫或昏沉不省人事者一切吐蚘雖身火熱不可與凉劑服之必死俱用理中安蚘湯加減治之待蚘定却以小柴胡退熱夫蟲者上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以肉汁或糖蜜引蟲頭向上然後用藥中病則止又有厥陰病消渴氣上冲心饑不能食食即吐蚘既曰胃寒復有消渴之證蓋熱在上焦而中下焦則俱寒而無熱此實至言也若大實者用理中湯加大黃入蜜少許微利之

冷結膀胱

凡手足厥冷脈沉細無結胷但小腹脹滿按之痛者

此冷結膀胱須灸關元穴宜服茱萸四逆湯滋陰湯

短氣

短氣者乃鼻中呼吸之氣出入短少而不相接續也表證不解汗出不徹其人面色緣緣正赤煩躁不安其身不知痛處而短氣者宜發汗則愈心腹堅滿自汗多短氣者邪在表而爲虛宜用桂枝湯實表則愈陽明內實不大便潮熱自汗躁渴譫語心腹堅滿而短氣者邪在裏而爲實宜大柴胡下之重者用調胃承氣湯陰證脉沉細手足冷惡寒面如刀刮尸鼻之氣難以布息而短氣者宜人參四逆湯溫之因汗吐下後元氣虛弱脉微細氣不能相接而短少者宜人參養榮湯乾嘔短氣痛引脅下汗出不惡寒此表解裏未和也十棗湯短氣煩躁心中懊憹者梔子豆豉湯風濕相搏一身盡痛汗出小便難惡風不欲去衣被短氣者甘草附子湯食少飲多水停心下滿悶短氣者茯苓甘草湯小便難五苓散主之

多眠

多眠者衛氣晝則行陽夜則行陰行陽則寤行陰則

寐陽氣虛陰氣盛則目瞑故多眠乃邪傳陰不在陽也昏昏閉目者陰司闔也默默不言者陰主靜也脾肝腎經謂之陰司太陽證十餘日脉浮細嗜臥者外已解神將復也設胷滿脅痛者屬少陽也小柴胡加桔梗若浮緊無汗者太陽未解也宜麻黃湯汗之若鼻乾不眠者風熱內攻不干乎表熱氣伏內則多眠小柴胡湯凡汗後身凉脉靜而好睡者病之愈也少陰脉微細但欲寐或踡臥惡寒或喜向壁臥或身體沉重欲寐脉沉逆冷者皆屬陰證也附子湯風溫脉陰陽俱浮者汗出身重鼻息鼾睡語言難出用葳蕤湯狐惑脣口生瘡咽乾聲啞面乍白乍黑但默默欲眠治在本條

晝夜偏劇

凡病晝靜夜劇者熱在血分宜四物湯加黃蘗知母芩連山梔丹皮軟柴胡主之若夜靜晝劇者此熱在氣分宜小柴胡湯加山梔黃連知母地骨皮主之若晝夜俱劇者此熱在氣血之分宜小柴胡合四物湯加連梔主之若有表證脉浮數不安宜汗之則愈若

裏實躁渴大便不通譫語晝夜不寧者宜下之則愈若下後復發熱晝則煩躁不得眠夜則安靜脉沉微無大熱者乾薑附子湯凡婦人熱入血室晝則明了至夜譫語者小柴胡加生地主之

不眠

不眠者陽盛陰虛則晝夜不眠蓋夜以陰爲主陰氣盛則目閉而臥安若爲陽所勝則終夜煩躁而不寧所謂陰虛則夜爭也

太陽脉浮身痛無汗煩躁不眠者宜汗此則邪在表也

陽明經頭額痛目疼鼻乾身熱不眠脉微洪則邪在表宜葛根湯以解肌若自汗脉洪數表裏俱熱煩渴舌燥飲水者人參白虎湯若蒸蒸發熱或潮熱自汗大便實燥渴譫語宜調胃承氣湯下之又若大熱錯語呻吟乾嘔不得眠者黃連解毒湯主之此則熱在裏也若表裏大熱舌燥飲水不眠者白虎合解毒湯主之大抵胃不和則睡不安故宜解熱胃和則已少陽發熱嘔而口苦脅痛心煩不眠脉弦數者小柴胡

湯加黃連山梔主之此則邪在半表半裏也虛人津液不足者加麥門冬

少陰證二三日心中煩不眠者黃連雞子湯又下利六七日欬而嘔心煩不眠者此停水也猪苓湯

太陽病發汗後不得眠脉浮數微熱煩渴小便不利者五苓散若大汗胃中乾燥煩渴欲飲水者宜少與之卽愈不與則喘渴而死脉數大用人參白虎湯加竹葉不可用五苓也若發汗吐下後虛煩不得眠者必反覆顚倒心中懊憹梔子豉湯若下後復發汗晝日煩躁不得眠夜安靜不嘔不渴無表裏證脉沉微無大熱乾薑附子湯汗下後虛煩不眠者溫膽湯加竹葉石膏山梔烏梅辰砂主之若小便不利大便乍難乍易微熱而喘不得眠者有燥屎也大承氣下之

傷寒瘥後飲酒煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯加烏梅乾薑乾葛主之

瘥後不眠者卽熱氣與諸陽相併陽氣未復梔子烏梅湯

陽挾陰狂言不眠亂夢心煩氣乏之者酸棗仁湯陰挾

陽則驚悸昏沉溫膽湯

若汗下太過而陽氣衰不得眠若無熱證又當四逆湯主之以退陰復陽也

少陰寒證陰極發躁不得眠脉沉細足冷面赤或下利身疼痛不得眠脉微者四逆湯加參术主之

中風汗出脉濡弱將厥而且寒煩躁不眠宜小建中湯

咽痛

咽喉不利或痛或嘔皆毒氣上攻有陰陽二毒有少陰有伏氣要在審察治之不可一例作爲風熱治也

陽毒咽喉腫痛乃熱極也陰毒咽喉不利乃寒極也治在本條

少陰病二三日咽喉痛用甘桔湯若下利咽痛胷滿心煩者用猪膚甘桔湯下利清穀裏寒外熱脉微欲絕面赤咽痛者用通脉四逆湯伏氣者亦屬少陰謂之腎傷寒因冬月伏寒在於腎經頭疼腰痛脉微弱發則咽痛後必下利用蜜煑附子四逆湯以溫腎經則愈不可用寒凉之藥也少陰病咽中生瘡不能言

語聲不出者用苦酒湯

怫鬱

怫鬱者陽氣蒸越形於頭面肌膚之間聚赤而不散也太陽病發汗不徹併於陽明續自微汗出面色赤者陽氣怫鬱於表面色緣緣正赤其人煩躁不知痛處用葛根湯解肌若太陽病發汗不徹脉浮緊而面赤者表未解也用麻黃湯汗之若面赤身痒者以其不得小汗出故也用桂枝麻黃各半湯病人大便乍難乍易小便利有微熱怫鬱不得臥此有燥屎作實用調胃承氣湯下之吐汗下之後虛極胃中虛冷外色怫鬱假色於面乃內寒也宜用理中湯手足冷者加附子吐下之後虛矣或復汗之其人怫鬱復與之水因而得噦此胃寒也用桂枝人參湯加茯苓吐汗下之後得噦怫鬱者內虛也用人參四逆湯傷寒被火刼汗出不解邪熱與火交攻而發怫鬱蒸於肌膚身目俱黃用茵陳湯陽明內實熱盛脉洪大面色赤煩渴舌燥飲水者用人參白虎湯潮熱自汗譫語面赤燥渴大便實者用大柴胡湯加芒硝少陰下利清

穀裏寒外熱或身痛脉微欲絕面赤或咽痛者用通脉四逆湯加葱白有下利脉沉遲面色少赤身有微熱下利清穀鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也大抵陰證怫鬱幷下虛人怫鬱者自是赤而不光盛也若陽病表不解幷內實熱甚者赤而光盛也要在審其虛實寒熱不可見其面赤槩作熱治之以致悞也

驚惕

驚惕者心中動悸惕然而驚也太陽病加溫鍼必驚惕也又傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身盡痛用柴胡龍骨牡蠣湯主之又少陰病耳無所聞目赤胷滿不可吐下若吐下則生驚惕也又傷寒脉結代心動悸者用炙甘草湯凡風濕被火則如驚癎也陽明被火發熱汗出不惡寒加溫針必驚惕而煩躁不眠也太陽脉浮宜以汗解妄以火迫必驚狂起臥不安宜桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事驚恐遂生驚惕者宜養心血安神之劑主之

奔豚

奔豚者如江豚之狀氣從小腹上冲心而痛也凡欲作奔豚者其氣在臍下築築然而動也宜理中湯去白术加肉桂主之痛甚加茱萸凡燒針令其汗出者針處被寒核起而赤者必發奔豚也宜灸其核上各一壯與桂枝加桂湯若痛甚手足厥冷者宜當歸四逆湯加肉桂吳茱萸主之蓋桂大能泄奔豚茯苓能伐腎邪故加之术能燥腎閉氣故去之藥中不可不愼也用甘爛水煎藥取其力薄不助腎邪也

狐惑

狐惑濕䘌皆是蟲證蓋傷寒失於汗下不解多日傳變因腹中有熱食入無多腸胃空虛三蟲求食而食人五臟且狐惑者如狐之下冰取猶豫不決進退之義若蟲食其肛則聲啞蟲食其臟則咽乾當看上脣有瘡蟲食其肛下脣有瘡蟲食其臟面色乍白乍赤乍黑變易無常四肢沉重惡聞食氣默默欲眠目閉舌白齒晦殺人甚速越人望而畏之

漱水不欲嚥

陽明證口燥但欲漱水不欲嚥者必作衄用犀角地黃湯若畜血下焦其人喜忘而如狂小便自利大便黑色口燥舌乾但漱水不欲嚥者此有瘀血結於下焦宜桃仁承氣下盡黑物則愈少陰證脉沉細手足冷或時煩躁渴欲漱水不欲嚥者宜四逆湯又下利厥逆無脉乾嘔煩渴欲漱水不欲嚥者宜白通湯加猪膽汁人尿服之有厥陰蚘厥煩躁吐蚘口燥舌乾但欲凉水浸舌井口唇時不可離但不欲嚥下宜理中湯加烏梅花椒主之

大抵陰證發躁煩渴不能飲水或欲勉强飲下良久仍復吐出或飲水而嘔逆者皆內寒也宜四逆湯溫之蓋無根失守之火遊於咽嗌之間假作燥渴故不能飲水也若能飲水而不吐者熱也

百合

百合者百脉一宗悉致其病無復經絡傳次也蓋欲臥不臥欲行不行寒又無寒熱又不熱坐又不坐欲食不食口苦小便赤藥入口即吐利狀若鬼神爲禍大抵汗吐下之後元氣虛弱多變此證若惡寒而嘔

者病在上焦二十三日愈若腹滿微喘大便堅三四日一行而微溏者病在中焦六十三日愈若小便淋瀝難者病在下焦三十三日愈若溺時頭覺痛六十日愈如頭不覺痛灑淅惡寒者四十日愈若溺時覺快然但有頭眩者三十日而愈也宜百合湯以治百合病也

瘛瘲

瘛者筋脉急而縮瘲者筋脉緩而伸一縮一伸手足牽引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相類謂之瘛瘲者此證多屬於風蓋風主搖動也又心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則瘛瘲也若夫不因汗下所生者當平肝木降心火佐以和血之劑用羌防芩連柴芍歸地川芎天麻之類若兼痰者必加南星半夏竹瀝薑汁如風邪急搐須兼全蠍殭蠶若曾經汗下之後多日傳變而得此證者爲病極也蓋因虛極生風用小續命湯加減凡傷寒汗出露風則汗不流通遂變筋脉攣急手足搐搦用牛蒡根散主之風溫被火劫發微黃色劇如驚癇時發瘛瘲

者宜用葳蕤湯主之若夫瘛瘲戴眼反折反而上視白絕汗乃出如貫珠不流此太陽絕也又有四肢漐漐動而不止似瘛瘲而無力抽搐者此肝絕也蓋汗下後虛變生此證者多死若用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩要在通變而已矣

肉瞤筋惕

陽氣者精則養神柔則養筋發汗過多津液枯少陽氣偏虛筋肉失所養故惕惕而跳瞤瞤然而動也非溫經助陽何以治之惕者筋脈跳動也瞤者肌肉蠕動也太陽病發汗出不解仍發汗頭身瞤動振振欲擗地用眞武湯合人參養榮湯倍用歸芪亦效若不因汗之過多其人惕惕然筋脈跳動者此人素禀血少邪熱傳於六脈之中使之動惕也用加味人參養榮湯最妙如傷寒發汗過多或虛人取汗或傷風取汗妄用麻黃青龍等湯大發其汗便有厥逆筋惕肉瞤之證並用眞武湯瘦人去芍藥恐其入榮故也有熱去附子恐其大熱以瘦人火多故也若傷寒發汗腹中有動氣者汗之則肉瞤筋惕或頭眩汗不止其證

最逆急用防風白朮牡蠣湯次用小建中湯乃可十愈一二若汗吐下後心中滿氣上冲胷起則頭眩脉沉緊身振搖者用茯苓桂枝白朮甘草湯久則成痿心下滿去甘草加枳桔子曾治一人傷寒不經發汗七八日筋脉動惕潮熱甚其肉不瞤大便祕小便赤以手按腹中鞕痛此有燥屎大柴胡湯下之則愈一人傷寒十餘日曾三次發汗過多遂變肉瞤身振搖筋脉不惕此氣虛也用人參養榮湯而愈一人汗後虛煩不得眠筋惕肉瞤內有熱以加味溫膽湯治之乃愈也

凡傷寒口唇下頷顫動者有虛有實此熱在手足陽明二經之分也脈虛者以人參三白湯加麥冬五味先生其脈次用竹葉石膏湯主之

若舌燥煩渴能飲水者人參白虎湯主之大抵此證不解昏迷逆冷者多不能救也

肉苛

人之肉苛雖近衣絮猶尚苛也傷寒發汗過多亡其血者乃變此證蓋榮虛而衛實則血氣不得通和肌

肉失所養故頑痺不仁痛癢不知也用羌活冲和湯加桂枝當歸木香主之

鬱冒

鬱冒人氣昏沉迷逆如物之蒙冒其首蓋諸陽乘寒而爲厥鬱冒不仁者謂不柔和痛癢不知針火不知即不仁也此寒氣乘虛所中用四逆湯加人參歸桂芎芪天麻主之太陽病下早不愈仍復發汗以致表裏俱虛其人致冒冒家汗自出而愈乃表和也若不得汗而不解者用人參三白湯加芎歸天麻下虛脈微足冷加熟附溫經固本經云蔭苗者必固其根伐下者必枯其上少陰下利止而頭眩時時自冒者死此腎絕也凡頭目眩運非鬱冒也蓋眩運爲輕鬱冒爲重新產婦人病多鬱冒者此血虛也用加味四逆湯主之又惡露未盡上衝鬱冒此血暈昏迷亦宜四物湯加紅花桃仁乾薑肉桂推陳致新治之

過經不解

傷寒十三日不解謂之過經若脈尺寸陷者大危也陷者卽脈伏也若過經不解或已經二三十日之後

其柴胡證未罷先與小柴胡和之若嘔不止心下鬱鬱微煩者大柴胡下之凡胷脅滿而嘔日晡潮熱者此爲實也先以小柴胡解外次以大柴胡下之加芒硝若過經不解人弱脉虛者不可下以參胡三白湯加減治之若虛煩少氣者人參竹葉湯主之若虛煩不得眠者參胡溫膽湯主之爲當也

目直視

直視者目睛圓正直視而不轉動也凡直視搖頭者心絕狂言目反直視者腎絕直視喘滿下利者皆死直視讝語不止者死目斜視者死若其目正圓直視口噤或角弓背反張者痓病也多難治若戴眼反折者此爲上視絕汗乃出大如貫珠不流此膀胱絕也凡目中不明非直視也此目中乃視物但見一半不見一半有所讝妄而胡言也若大便實者宜下之目自明也內虛者難治

欽定古今圖書集成

博物彚編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百六十九卷目錄

醫部彙考三百四十九

傷寒門十五

陶華全生集 瘖瘂不言 遺尿 循衣摸牀 舌卷囊縮 手足攣搐 瘥後發腫 瘥後喜唾 瘥後遺毒 瘥後發豌豆瘡 勞復 食復 女勞復 陰陽易 瘥後虛弱 瘥後昏沉 瘥後飲酒復劇 臟結 痓病 大頭傷風 溫病 熱病 時氣 冬溫 溫毒 傷濕 中濕 風濕 濕溫 風溫 溫瘧 溫疫 中暑 中暍 寒疫 霍亂 婦人傷寒 熱入血室 妊娠傷寒 產後傷寒 痰證類傷寒 食積類傷寒 虛煩類傷寒 脚

氣類傷寒　瘀血發熱類傷寒
樓英醫學綱目
節候用藥　陰毒

藝術典第三百六十九卷

醫部彙考三百四十九

傷寒門十五

明陶華全生集

瘖瘂不言

瘖瘂不言者若少陰病咽中生瘡不能言語者以鷄子苦黃酒湯若狐惑上脣有瘡聲啞者治在本條痓病口噤不能言治在本條熱病瘖啞不言三四日不得汗出者死若熱甚火傷肺金不能言者宜清肺降

火則愈若風熱擁盛欬嗽聲瘖瘂者以清風熱降痰火則愈又有失於發散風邪伏於肺中者當以發散爲主也

遺尿

遺尿者小便自出而不知也三陽合病身重譫語遺尿者用人參白虎湯大抵熱盛神昏遺尿者可治若陰症下寒逆冷遺尿脈沉者多難治宜四逆湯加益智仁主之厥陰囊縮逆冷脈沉遺尿者宜四逆加茱萸湯陽不回者死傷寒汗下之後熱不解陰虛火動而遺尿者用人參三白湯加黃蘗知母麥冬五味歸地主之若狂言直視遺尿者是腎絕也膀胱不利爲癃不約爲遺溺又水泉不止者膀胱不藏也腎與膀胱表裏俱虛則膀胱之氣不約故遺尿也溲便遺尿肺金虛當補肺也大抵肺虛腎虛熱盛遺尿者皆可治惟腎絕遺尿者不可治

循衣摸牀

傷寒循衣摸牀者死兩手撮空者死向壁踡臥逆冷鄭聲循衣摸牀者死凡循衣摸牀直視譫語脈弦者

生脈濇者死小便利者可治不利者不可治謂津液枯竭也大抵陰陽二氣俱絕則妄言撮空也若大便祕結撮空讝語燥渴者此爲實熱宜承氣湯下之若因汗下虛而大便自利讝語撮空逆冷脈小者難治以升陽湯刧之

舌卷囊縮

凡舌卷囊縮者難治也若陰陽易病卵入腹則舌吐者死且夫囊縮有陽證有陰證其陽證囊縮者因熱極而縮蓋熱則熾燃其陰證囊縮者因寒極而縮蓋寒則收引皆是宗筋也婦人亦有囊縮可辨但其乳頭縮者即是也凡陽證囊縮舌卷者急用大承氣下之若陰證囊縮舌卷者急用四逆加茱萸湯溫之先灸關元氣海丹田及蒸臍熨法甚效

手足攣搐

傷寒大汗已出因而露風則汗不流通風邪乘虛襲於經絡故手足攣搐不能屈伸而筋脈拘急也用牛蒡散治之

瘥後發腫

傷寒瘥後浮腫者此水氣也以牡蠣澤瀉散主之

瘥後喜唾

病新瘥後口中和喜唾不止者此胃中有寒宜理中湯溫之瘥後口乾喜唾或咽痛人參竹瀝湯加烏梅黃連知母天花粉主之咽痛者用山豆根磨水噙之復用甘桔湯加芩連山梔連翹薄荷主之

瘥後遺毒

傷寒汗下不徹邪結在耳後一寸二三分或兩耳下俱硬腫者名曰發頤此皆餘熱之毒不除也宜速消散緩則成膿矣以連翹敗毒散主之

瘥後發豌豆瘡

豌豆瘡者亦因汗下後餘毒未盡瘥後故發豌豆瘡也只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荊芥連翹羌活白芷煎服外用芒硝赤小豆青黛爲末以鷄子清和猪膽汁調和敷瘡上最效勿令動之待其脫落無痕

傷寒瘥後小便澀而有血者名曰內外瘡皆黑靨不出膿者死亦是餘熱毒也用黃連解毒湯加生地當

歸連麴木通滑石牛膝萹蓄琥珀甘草梢加燈心水煎服

勞復

病新瘥後血氣未平復餘熱未盡如水浸牆壁水退土尚未堅不可動也非但負重涉遠雖梳頭洗面亦傷神也若勞動再發爲勞復血氣尚虛但當安臥守靜以養血氣設或早晚勞役使血氣沸騰而邪熱遂還於經絡而發熱謂之遺熱脉浮者以汗解之脉沉者以下之若不應汗下者以參胡三白湯加調理藥但濈然汗出而解或寒戰汗出而解若虛煩不眠用參胡溫膽湯加棗仁遠志氣虛煩嘔竹葉石膏湯燥渴去半夏加知母倍多天花粉若虛熱不止者千金麥冬湯若身熱食少無力者參胡溫膽湯無熱下虛有寒人參養榮湯加熟附若陰虛火動者宜補中益氣湯加黃蘗知母以滋腎水也

食復

新瘥後多食而復發者爲食復緣新瘥不能勝穀氣遂發虛熱也大抵傷寒病後只宜先進稀米飲次進

薄粥又宜少少與之常令不足不可盡意諸般肉食不可食之若瘥後病已解但日暮微煩者此食穀早或多食故也胃虛弱而不能消穀食宜損穀則愈食後復發熱大便難燥渴讝語關脈實者用枳實梔子湯加大黃下之熱不解大便如常者參胡三白湯加減治之心下痞滿加枳實黃連桔梗有痰嘔加橘紅半夏米食不化加神麯麥芽肉食不化加草果山樝治之

女勞復

傷寒男子病新瘥早犯女色而爲病復發者名曰女勞復也其候頭重不舉目中生花腰背痛小腹裏急絞痛或憎寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胷煩悶者以竹皮燒裩散猳鼠糞若有熱加柴胡調赤衣散人虛弱者用參胡三白湯調赤衣散若小腹急痛脈沉足冷用當歸四逆湯加熟附茱萸送下赤衣散若見卵縮入腹脈離經者死也

陰陽易

陰陽易者如換易之易以其邪毒之氣交相易換也

男子病新瘥婦人與之交而爲病者名曰陽易婦人病新瘥男子與之交而爲病者名曰陰易其候身重氣乏百節解散頭重不舉目中生花熱上衝胷憎寒壯熱陰火上衝頭面大熱在男子則陰腫小腹絞痛在婦人則裏急連腰胯內痛病甚者手足冷攣拳男子卵陷入腹婦人痛引陰中皆難治也若見舌吐出者死于會治一人見舌出數寸者卽死矣宜用竹皮燒裩散加人參當歸知母若卵腫痛倍加竹青黃連滑石生地鼠糞韭根甘草青皮木通有粘汗出而陰頭腫爲效有熱加柴胡陰火上衝加黃蘗知母若傷腎經虛損眞陽衰脫有寒無熱脈虛足冷者以人參四逆湯調下燒裩散若傷肝經以當歸四逆湯加茱萸熟附送下燒裩散用分寒熱而治

大抵傷寒大病之後房幃之事切宜謹戒若未瘥後因交接淫慾而無病人反得病此爲陰陽易也若瘥後因交接淫慾病人自病而復發謂之女勞復此乃仲景不傳之妙論醫當玩之

瘥後虛弱

傷寒瘥後虛弱無力者先因汗下過多病久元氣虛弱調養失宜須漸漸進食守靜不可太急治傷寒雖無補法若果病久元氣虛憊或勞力所傷不得不補此合宜則用也宜補中益氣湯

瘥後昏沉

傷寒瘥後昏沉者或半月以來或十餘日漸見昏沉終日不醒又有寒熱錯語失神如見鬼狀或呻吟者或寒熱似瘧或朝夕潮熱頰赤者蓋先發汗不盡餘熱在心包絡間故也醫作風魅治之非矣當以知母麻黃湯取微汗則愈若胃脘有虛煩而嘔竹葉石膏湯加薑汁少許無熱脈沉細喜睡不已者脾土有寒也少與理中湯瘥後目昏微煩者因强食穀食早而不消化也宜損穀則愈且夫前用知母麻黃取汗者但慮病後血氣兩虛豈可再發汗若人元氣壯盛脈來有力者乃可汗之若脈虛人弱者只用十味溫膽湯若有寒熱潮熱日晡發熱者以參胡溫膽湯加芩連主之要在脈證詳辨不可執一也

瘥後飲酒復劇

酒能發散溫經其味苦辛乃大熱有毒也且寒月惟酒不氷可見矣緣傷寒熱病本熱未解若飲酒則病增劇轉加熱盛而助火邪也若脉弦數者用小柴胡合解毒湯加烏梅乾葛砂仁若脉洪大者用人參白虎湯合黃連解毒湯加乾葛烏梅砂仁主治可也

臟結

臟結者臟氣閉結而不復流布也一息不運則機緘窮一毫不續則霄壤判臟結之理如此其外證如結胷狀但飲食如故時時下利爲異耳其脉寸浮關尺沉細而緊陰筋引臍腹俱痛是也病人脅下有痞氣連在臍旁痛引小腹陰筋者此冷臟結者死臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑不可攻也宜灸關元仍與茱萸四逆湯溫之寒甚加附子

痓病

痓證身熱足冷頭項强急惡寒頭熱面赤目脉赤獨頭搖卒口噤背反張手足攣搐角弓者是也起於太陽先傷於風重感於寒無汗爲剛痓起於太陽先傷於風重感於濕有汗爲柔痓仰面而臥開目爲陽合

面而臥閉目爲陰脉浮緊者屬陽脉沉細者屬陰口中燥渴者屬陽口中和者屬陰脉緊急而强直下行者成痓又發汗太過亦成此病大發濕家汗幷發瘡家汗皆成痓也新產婦人血虛汗出當風亦成痓也陽證易治陰證難醫太陽無汗小便少氣上冲口噤欲作剛痓麻黃加葛根湯若人參羌活散加麻黃乾葛亦佳太陽病几几身體强痛脉反沉細此爲痓宜苦蔞桂枝湯若有汗宜桂枝湯加羌活防風胃弱加參术凡剛痓若胷滿口噤咬牙脚攣急宜大承氣湯下之要在脉實有力可下脉沉細無力者不可下也陰證脉沉細用附子散加桂枝白术若血虛發痓八寶湯加羌活防風黃芪桂枝脉小加熟附或用續命湯治剛柔二痓有汗去麻黃無熱有寒去黃芩防己有熱無寒去附子用者詳之

大頭傷風

大頭者一曰時毒一曰疫毒蓋天行疫毒之氣人感之而爲大頭傷風也若先發於鼻額紅腫以至面目盛腫不開幷額上面部焮赤而腫者此屬陽明也或

壯熱氣喘口乾舌燥或咽喉腫痛不利脈來數大者普濟消毒飲主之內熱甚者通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫者此屬少陽也或肌熱日晡潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脅滿宜小柴胡加天花粉羌活荊芥連翹芩連主之若發於頂上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荊防敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒飲外用清凉救苦散敷之大抵治法不宜太峻峻攻則邪氣不伏而反內攻必傷人也且頭面空虛之分既著空處則無所不至也治法當先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃氣弱食少者兼助胃氣候其大便熱結以大黃下之拔其毒根此先緩之法也蓋此毒先腫鼻次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必成膿也

溫病

蓋冬感寒不卽病伏藏於肌膚至春時天道溫煖其伏寒各隨時氣改變爲溫者因溫氣將發又受暴寒故春變爲溫病既變之後不得復言爲寒矣所以仲

景有云春時人感壯熱不惡寒而渴者其理可見溫病也不惡寒則病非外來渴則明其熱自內達言無表證明矣溫病大熱不宜發汗不在表也已經汗下亦不在表也其溫熱二病所起所因所感所發治例一同若誤下之未必不爲害誤汗之變不可言溫病之脉散在諸經而動各隨其經取之脉如尺寸俱浮緊者發於太陽宜羌活湯加葱白蘇葉柴胡葛根自汗者去葛根蘇葉柴胡蒼朮加桂枝芍藥脉若尺寸俱長者發於陽明宜解肌湯合芎蘇散脉若尺寸俱弦者發於少陽宜小柴胡合芎蘇散兼有太陽者羌活散加蘇葉兼有陽明者用羌活散加乾葛芍藥溫病發表不與傷寒同者蓋因春時溫氣而發非寒初傷於表也此怫鬱之熱自內而發於外故宜辛涼之劑而解之若時令溫煖雖用麻黃必加凉劑天道尚寒亦宜少佐要在明病審察不可執一說也凡溫病發於三陽者多發於三陰者少若發於陰者必有所因也或因飲食內傷而得之或因慾事先傷腎經而得之治例皆與傷寒傳變各條同治惟發表不與傷

寒同也三月得此病者爲晚發治法同溫病壯熱脉浮大有力可治細小者難治所以溫病大熱滾滾脉小足冷者多死也

熱病

夫熱病乃冬時感寒不即病伏藏於肌膚至夏時其伏寒各隨時令改變爲熱者因炎暑將發又受暴寒故夏變爲熱病既變之後不得復言爲寒矣所以仲景有云夏時人感壯熱不惡寒而渴者其理可見熱病也不惡寒則病非外來渴則明其熱自內達其無表證明矣治熱病與溫病同夏至以後時令炎暑人感壯熱煩渴不惡寒乃爲熱病熱病之脉亦隨其經而取之也發於太陽脉浮緊發於陽明脉浮長發於少陽脉弦數發於三陽者多發於三陰者少亦有所因也治依溫病條下若表邪傳進三陰者治法與傷寒條內下證同若脉沉小足冷者亦發於陰則難治也大抵熱病比溫病尤加熱也脉得洪大有力或滑數有力乃爲病脉相應謂之可治若細小無力謂之難醫人虛脉弱者主扶元氣兼解邪熱不可峻攻若

見表證在者治例與溫病同若夾暑加香薷扁豆雙解之若夾內傷生冷飲食停留或嘔吐或惡心中脘痞悶發熱憎寒拘急用藿香正氣散加香薷扁豆葛根黃連若熱渴大便自利小便不利者五苓散去桂加葛根黃連香薷滑石甘草主之表熱甚者加柴胡若時令熱病發黃名曰瘟黃用瀉濕熱茵陳五苓散

凡熱病一二日瀉利腹滿熱甚者死三四日目昏譫語熱甚脈小者死五六日舌本焦黑燥渴者死七八日衄血吐血下血燥熱脈大者死八九日發痓兼昏沉者死凡熱病脈促結伏沉小皆難治熱不得汗脈躁急者亦難治已得汗而熱反盛脈躁急者死也

時氣

時氣者乃天時暴厲之氣流行人間凡四時之令不正者則有此氣行也若春應溫而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫此時行不正之氣也邪傷眞氣若近穢氣而傷眞氣正如牆壁不固賊乃敢入若正氣既盛邪氣難侵矣其病勢與傷寒相類蓋傷寒因寒而得之時氣乃感疫癘之氣而得之

不可與傷寒同治惟發散之藥則同矣凡發散湯劑春感寒邪在肝升麻葛根湯夏感凉邪在心調中湯秋感熱邪在肺蒼朮白虎湯冬感溫邪在腎葳蕤湯瘟疫敗毒散若表不愈者用羌活沖和湯正氣散沖和羌活散芎蘇散選而用之其瘧痢等證亦時行也已開雜證條下

冬溫溫毒

冬月非常之煖名曰冬溫蓋此卽時氣也陽脈洪數陰脈實大者遇濕熱變爲溫毒溫毒爲病最重也此前熱未已又感溫熱者也若發斑者名曰瘟毒亦時行發斑也蓋因冬月感寒毒異氣至春而發表邪未解毒氣未散故發斑也其證心下煩悶嘔逆欬嗽後必下利寸脈洪數尺脈大用元參升麻湯人參化斑湯又傷寒壞病蓋因前熱多日不解更感溫熱之氣而爲重也若無汗以三黃石膏湯有汗人參白虎湯煩熱錯語不眠白虎合解毒湯表熱甚者加柴胡內實不大便者大柴胡加芒硝下之若斑出如錦者難治

傷濕中濕風濕

傷濕者濕傷太陽經起也中濕者濕中太陰脾經或腎經也風濕者或先濕而後傷風風濕相搏而後爲病也其證一身盡痛不能轉側額上微汗惡風寒不欲去衣大便難小便利熱極日晡而甚治宜微解肌但微微似欲汗出濈濈身潤者則風濕俱去不可大汗若大汗則風去濕在非惟無益而反害之宜羌活沖和湯濕多身痛小便不利甘草附子湯煩渴小便不利五苓散外不熱內不渴小便自利术附湯緩弱昏迷腹痛身重自汗下利不止白通湯加白术甘草身腫滿痛微喘惡風敗毒散加杏仁熱而煩渴苦蔞根湯若誤下之小便必不利五苓散中濕小便不利大便自利甘草附子湯合五苓散大小便俱利無黃者术附湯身痛鼻塞小建中湯加黃芩太陽病關節疼痛脈沉細者此名濕痺其人小便不利大便反快但當利小便也濕病但頭汗出者背強欲得被覆向火胷滿小便不利舌上如胎者此丹田有熱而胷中有寒也渴欲得水而不飲則口燥煩也若誤下之則

噦爲難治若下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死也濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭疼與鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕以瓜蒂散搐鼻中黃水出則效也濕家爲病身盡痛身如熏黃凡傷濕必身重而不便也

濕溫

濕溫寸濡而弱尺小而急素傷於濕因時中暑濕與熱搏卽爲濕溫其狀胷腹滿目疼壯熱多汗妄言雙脛疼倦怠惡寒朮附湯加人參香薷扁豆若發其汗使人不能言耳聾不知痛處其身赤面色變是醫殺之也且濕溫在太陰蒼朮白虎湯加桂濕氣勝一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快茵陳五苓散臟虛自利朮附湯脈大有力煩渴自汗者人參白虎湯加香薷扁豆黃連治之也

風溫

風溫尺寸脈俱浮素傷於風因時傷熱風與熱搏卽爲風溫又發汗已後身灼熱者名曰風溫陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變爲風溫其證四肢不收身

熱自汗頭疼喘息欬發渴昏迷鼻鼾語澀體重不仁慎不可汗汗之則讝語煩躁擾亂目無睛光病在少陰厥陰葳蕤湯未醒柴胡桂枝湯汗後灼熱者知母葛根湯大渴者苦蔞根湯脉浮身重防己湯悞汗風溫防己黃芪湯治之

溫瘧

溫瘧傷寒壞病前熱未除其脉陰陽俱盛重感寒邪變爲溫瘧寒熱往來口苦胷滿者小柴胡加桂枝芍藥湯寒多倍桂熱多倍柴胡熱甚煩渴者人參白虎湯痰多熱盛者小柴胡合二陳湯食少胃弱加白朮心滿者加枳實黃連渴者去半夏加苦蔞根若寒邪結裏大便不通大柴胡下之若變瘧已正又當補而截之

溫疫

經曰陽脉濡弱陰脉弦緊更遇瘟氣變爲瘟疫也此先因傷寒前熱未除更感時行瘟氣而爲瘟疫治之當與瘟瘧同也

中暑中暍

凡中暍者即熱也蓋熱傷太陽經與傷寒相似故曰中暍也中暑熱傷心脾二經而不在太陽故曰中暑也動而得之爲中熱靜而得之爲中暑經曰太陽經中熱者即暍是也其人必汗出身熱煩渴宜人參白虎湯若身重而疼者人參敗毒散加黃連香薷主之中暑者其證面垢自汗煩躁而渴身熱脈虛或伏或遲洒然毛聳惡寒口開前板齒燥者人參白虎湯加連薷扁豆或背惡寒者蓋暑傷心心不受邪則包絡受之包絡相火此火助火則熱盛而昏不醒也大抵清利小水黃連香薷飲浸冷服之煩渴熱甚自汗者人參白虎湯加竹葉若煩渴小便不利者香薷飲合四苓加木通滑石若大便瀉而小便少者亦以此湯主之內熱心煩者加薑炒黃連山梔調辰砂末虛者倍用人參若嘔吐頭疼瀉利胷滿或腹痛者藿香正氣散加香薷扁豆名二香湯若小便不利而大便自利者以正氣散合五苓散轉筋者加木瓜大抵不可作傷寒妄治所謂夏月有四證傷寒傷風脈證互見中暑熱病疑似難明若脈緊惡寒謂之傷寒脈緩惡

風謂之傷風脉盛壯熱謂之熱病脉虛身熱謂之傷暑以此別之也

寒疫

寒疫者乃天之暴寒爲病也四時之中天令忽有暴寒之作若感冒卽病者名曰寒疫也其證與正傷寒同但暴寒爲輕耳若病初起頭疼發熱憎寒拘急或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發熱者十味芎蘇散汗之若身痛骨節疼發熱者羌活沖和湯加紫蘇主之若有汗不可再發汗宜加減沖和湯主之若邪熱不解傳入裏變證者宜從正傷寒條內治之

霍亂

傷寒霍亂嘔吐瀉利頭疼體痛惡寒發熱腹痛或吐利止而發熱揮霍撩亂其脉或伏或絕此名濕霍亂若不吐利而腹痛甚者此名乾霍亂爲內因所傷邪物不得出壅塞正氣陰陽隔絕升降不通死在須臾急用皂莢末麝香鹽湯調一椀服探吐用鵝翎吐出

所傷之物最爲良法莫與米湯服之卽死是穀氣反助邪氣也若吐瀉多而元氣虛脫者方可少與清粥湯以助元氣若熱多渴甚飲水者五苓散中暑霍亂加香薷扁豆葛根薑汁炒黃連若寒多或吐瀉腹痛不飲水者理中湯手足厥冷脈伏者加附子嘔吐者加藿香葉陳皮半夏厚朴名藿理湯瀉多小便少者理中合五苓散名理苓湯若臍上築築然動者藿苓湯加薑炒黃連乾葛若瀉不止倍用蒼术白术炒用升麻少許脈虛加參芪轉筋加木瓜寒痛甚者加茱萸若厥冷脈沉細或下利清穀裏寒外熱者用附子理中湯若吐瀉發熱汗出惡寒四肢厥冷拘急者四逆湯若吐利止小腹復痛大汗出或下利清穀內寒外熱脈微絕者四逆湯加猪膽汁若吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微者四逆湯加猪膽汁大抵霍亂邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中焦既吐且利如夏月霍亂脈虛不用薑附葢非眞陰寒則不可也

婦人傷寒

凡婦人傷寒治法皆與男子相同惟經水適斷適來熱入血室與胎產傷寒則不同治

熱入血室

婦人中風發寒熱經水適來而得之七八日熱退而脈遲身凉胷脇滿如結胷狀讝語者此爲熱入血室當刺期門隨其實而瀉之當以小柴胡加生地丹皮歸尾枳殼香附乾薑少用紅花去黃芩

婦人傷寒發熱惡寒經水適來晝則明了夜則讝語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上中二焦必自愈也犯胃氣則謂攻下犯上焦則謂發汗犯中焦則謂取吐也是以不可汗吐下必待自愈故設小柴胡加生地丹皮

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀當用小柴胡加生地丹皮以散血結也

婦人陽明經病下血讝語此爲熱入血室用小柴胡加生地黃丹皮男子陽明經病下血讝語者亦是熱入血室也輕用犀角地黃湯重用桃仁承氣湯下之

男女俱有此血氣亦俱有此衝脉何但婦人有之耶

姙娠傷寒

凡姙娠傷寒須要安胎爲主兼傷寒藥爲當不可獨用發表攻裏之劑恐傷胎氣若有表證宜汗者用羌活沖和湯加柴胡當歸芍藥蘇葉葱白卽四物沖和湯汗之有氣滿喘急加香附砂仁去生地外用護胎法最效若裏急實熱證大便不通燥渴者當用大黃轉藥不必疑矣須酒製用有病病當之無病胃傷之經云有故無殞亦無殞也上無殞令無害其母下無殞令無害其子姙婦設患眞寒證脉伏厥冷者當用薑桂附子不必慮也薑桂附雖熱炒製無害必加黃連甘草兼製沉香墜之

産後傷寒

産婦患傷寒不可輕易而發汗下也葢恐産時傷力發熱有去血過多發熱有惡露不盡發熱有三日蒸乳發熱或早起勞動發熱或飲食停滯發熱惡寒一概狀類傷寒要在仔細詳審不可便用發表攻裏之劑實因産後之氣血空虛若汗之必鬱冒筋惕肉瞤

昏迷不省或入風手足搐搦不定或大便祕結而難通若下之則利不止亦變肉瞤筋惕鬱冒昏沉厥逆等證此皆爲害非小凡有傷力發熱有早起勞動發熱或去血過多發熱脉必虛大無力內無痛者此熱非有餘之熱乃陰虛不足而生熱爾用四物去芍藥恐其酸寒伐生發之氣必加參朮茯苓淡滲其熱如大熱不止必加煨乾薑神效夫乾薑之辛熱能引血藥入血分以生新血引氣藥入氣分補氣有陽生陰長之義非元機之士豈能知此妙乎

凡產後惡露不盡亦有發熱惡寒必脅肋脹滿連大小腹有塊作痛凡產後腹痛者血也腹滿者非是食卽是瘀血而作也宜用四物湯加靈脂丹皮桃仁紅花延胡索香附青皮乾薑肉桂酒水各一鍾黑豆一撮後磨木香入童便薑汁溫服取下瘀血爲效後以四物湯加參朮乾薑茯苓陳皮少佐童便炒香附調理

若飲食停滯發熱必有噫氣作酸惡聞食臭胷膈飽悶右關脉緊盛一般發熱惡寒頭痛必用治中湯加

山梔神麯砂仁炒黃連川芎當歸佐之

若產後蒸乳發熱惡寒者必乳間脹硬疼痛令產婦揉乳汁通竅其熱自除不藥而愈矣

大抵胎產數證俱有發熱惡寒頭疼實非傷寒也若悞治之殺人甚速且夫產後雖有寒熱骨痛及口眼喎斜手足搐搦者蓋血虛所致不可作中風寒證治之乃若果因產後不謹虛中入風者當以四物湯加防風荆芥白芷人參香附烏梅殭蠶乾薑治之

又產後血虛昏沉不省者用四物湯加參术乾薑香附茯苓治之若有瘀血衝上昏運不省又當如前惡露不盡方內治之吞下益母丸最效

又有產後不謹感冒傷寒發熱惡寒頭疼骨痛脈浮緊表證宜汗者用四物湯加羌活蒼术白术乾薑蘇葉梔子少佐葱頭用水煎取微汗爲效若自汗去蒼术蘇葉加白术熱甚者可加軟柴胡乾薑少許加炒黃芩佐之若熱邪傳裏口燥渴大便不通脉沉實或熱甚譫語宜下之輕則蜜導法重則四物加柴胡炒黃芩枳殼熟大黃微下就用四物湯加乾薑少許大

用參朮以溫補其血氣若熱邪傳至半表半裏證寒熱嘔而口苦若脈弦數者以四物湯合小柴胡主之若產後妄用汗下吐法太過遂變鬱冒昏迷肉瞤筋惕者必用四物湯合四君子湯加減治之茯苓乾薑乃爲主藥不可少也經云胎前宜養血安胎產後須大補氣血雖有雜證以末治之此誠格言也予雖不專產科但恐各證與傷寒相似有誤故併開明以備緩急爾

痰證類傷寒

凡中脘停痰畱飲亦作寒熱狀類傷寒但頭不痛項不強爲異耳若痰在上焦則寸口脈沉滑或沉伏痰在中焦則右關脈滑大痰在下焦隨火而動則脈洪滑有氣鬱右脈必沉滑有飲內痛右脈必沉弦若關脈左右滑大者膈上有伏痰也目如炭烟者多痰也昔肥今瘦者亦痰也凡治痰以二陳爲主隨證加減若痰飲凝結憎寒壯熱隱隱頭疼胷膈滿悶上氣喘急咽喉不得息宜瓜蔕散吐之若痰飲心包寒熱胷膈滿氣急出語無倫曰痰結此挾痰如見祟皆痰之

使然用二陳湯加蘇子枳實芩連苦蔞貝母桔梗山梔前胡去甘草以薑汁調辰砂溫服若痰涎壅盛昏迷不省者用吐法後以加減二陳湯治之若有遍身四肢骨節走注疼痛牽引胷膈心背亦作寒熱喘欬煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢痲痹不仁或背心一點如冰冷脉來沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也用二陳倍加蒼朮羌活酒炒黃芩白芷南星白芥子竹瀝薑汁磨木香若骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊前方加乳香木香海石朴硝薑汁少許大便自利內無熱少用朴硝頭項痛加川芎威靈仙脚腫加牛膝黃蘗防己龍膽草木瓜若手臂膊痛加薄桂引南星等藥至痛處若作寒熱加柴胡桂少許獨熱減桂倍柴芩內熱加炒梔連若痰流在脅下痛結脹滿寒熱難轉側者二陳加柴芩川芎蒼朮青皮白芥子白芍竹瀝薑汁磨木香脅下硬塊不消作痛再加朴硝薑汁海石取鹹以軟堅喘欬加杏仁五味桑皮氣急加蘇子葶藶若身熱咯吐紅痰與上焦痰鬱火邪即血痰也二陳減半夏加炒芩連山梔杏

仁桔梗苦蔞貝母青黛麥冬五味加竹瀝薑汁少許磨金墨服之氣虛加參朮血虛加當歸生地若痰飲氣鬱結滯寒熱胷滿喘欬者二陳去甘草半夏加蘇子桑皮苦蔞貝母枳實黃連桔梗杏仁五味竹瀝薑汁磨木香熱甚去木香加黃芩無熱而氣不調者還用木香薑汁若胷滿喘欬痰涎如膠者二陳去甘草半夏倍加芩連貝母苦蔞桑皮杏仁五味桔梗金沸草前胡竹瀝薑汁少許外有熱加柴胡酒芩若有內熱以痰作欬二陳去半夏甘草加芩連貝母苦蔞五味乾葛桔梗山梔杏仁竹瀝薑汁少許若熱痰在胷膈間不化咯吐不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結二陳去半夏甘草加貝母苦蔞芩連桔梗枳殼杏仁山梔蘇子桑皮少佐朴硝薑汁磨木香如外熱加柴胡仍用薑柤揉熨法胷中有風痰頑老氣壅盛者二陳加南星枳實羌活荆芥防風蘇子蒼朮苦蔞竹瀝薑汁磨木香若胷中有寒痰留飲喘急無熱者二陳加桂枝枳殼桔梗蘇子砂仁蒼朮薑汁磨木香若喉中痰涎漉漉有聲如水車響者難治用皂莢末鵝

翎蘸桐油探吐痰大吐者爲愈已後隨證用藥如用吐法痰不出者必死矣若胷中有痰壅塞喘急滿悶兩脅脹痛脉沉者名曰痰氣二陳湯去甘草加香附乾薑官桂蘇子厚朴砂仁青皮桔梗薑汁磨沉木香外用炒薑柤揉熨法若痰核在咽喉中咯不出嚥不下或升或降窒礙不通者名曰梅核證亦痰氣也與前治法同去青皮加枳實若胷膈痰涎壅塞昏迷卒倒不省四肢厥冷脉沉細名曰痰厥二陳加乾薑桂枝熟附南星枳實蘇子木香桔梗薑汁若元氣本虛人下焦火痰升作喘欬至午夜間發寒熱者名曰痰火二陳去半夏加當歸生地芍藥黃蘗知母麥冬五味杏仁桑皮片芩橘紅竹瀝薑汁少許氣虛加參朮虛熱虛汗加黃芪其痰隔中焦小便不通二陳加木通滑石蘇子枳實砂仁黃連木香磨薑汁竹瀝若痰飲欬嗽氣急滿悶一寒一熱坐臥不寧有時而煩有時而躁名曰痰躁二陳合溫膽湯加砂仁竹瀝薑汁少許若肥人日常頭眩眼昏時卒運倒者名曰痰運二陳加川芎天麻蒼朮南星生烏藥桔梗枳殼酒芩

羌活去甘草竹瀝薑汁少許若痰在心下滿悶者二陳去甘草加苦蔞黃連枳實砂仁桔梗貝母香附蘇子竹瀝薑汁磨木香傳送外用炒薑柤揉熨法最效此乃痰家要藥不可缺也若寒痰不宜用竹瀝芩連凉劑醫家當愼之若痰發出者宜吐不宜畱此穢濁之物畱則反生別病矣要在明辨痰證不可混作傷寒治之悞也且痰家之藥枳實瀉痰能衝牆倒壁黃芩治熱痰假以降其火也海石朴硝治頑痰味鹹以軟堅痰在脅下非白芥子不能達蒼朮治痰飲成窠囊行痰極效取燥以去濕苦蔞桔梗能開膈上稠痰砂仁治痰行氣故也竹瀝降痰無薑汁不能行經絡貝母治膈上鬱痰最效天花粉大能降膈上熱痰靑黛治痰火上淸咽膈此治痰之妙用也人身之痰如魚之涎若地之泉隨氣升降無處不到設有阻其道路爲腫爲塊爲喘爲欬爲噫爲噦爲塞爲熱爲嘔爲吐爲泄瀉爲嘈雜爲噯氣爲怔忡爲驚悸爲關格爲煩躁爲痞滿爲麻木爲癃閉爲厥逆爲眩運爲胡言爲顚呆爲不語爲健忘爲不仁爲積滯爲牽引爲走

串皆痰之患也善治痰者兼治氣氣順則痰利也

食積類傷寒

凡飲食自倍腸胃乃傷停滯中焦不化作爲頭疼發熱惡寒但身不痛與傷寒爲異耳必左手脉平和右手脉緊盛是傷食必惡食理必然也或噯氣或作酸或惡聞食臭或欲吐不出或吐之不盡或惡心或短氣或痞滿或腹脹或胃口作痛或腹中痛或心下痞塞按之則痛以香砂平胃散依後法加減治之若停食傷感卽夾食傷寒左右脉俱緊盛外證頭疼身熱惡寒拘急惡心中脘痞滿或嘔或吐或痛或瀉以藿香正氣散合養胃湯加香附砂仁若肉食不化加神麴麥芽生冷肉食果子不化加草果砂仁乾薑枳實青皮飲食不化加萊菔子神麴山楂酒食不化加砂仁蘇葉乾葛黃連烏梅心下痞滿加枳實黃連胷脅脹滿加枳殼桔梗腹中窄滿加蒼朮厚朴倍多腹脹加萊菔子大腹皮若胷中脹滿疼痛氣虛不順加木香砂仁胃弱加神麴白朮內寒不熱加薑桂外熱加柴芩頭疼加川芎大便實熱腹中滿加大黃下之腹

中有食積塊悠悠作痛者加蓬朮嘔吐薑汁小便澀加木通猪苓大抵憎寒未甚熱者用此方加減若已發熱無汗必須先解其外以十味芎蘇散汗之身體痛發熱者羌活沖和湯加乾葛葱白汗之然後消其食也若食在上口未入於胃乃可吐之如不吐則消導待食下入於胃變化糟粕外證已解乃可下其食也外證無惡寒惡風乃可下熱多者大柴胡下之凡治夾食傷寒不可先攻其食待發散寒邪已解次可攻食劫吐法開霍亂條下

虛煩類傷寒

凡諸虛煩熱狀類傷寒但頭身不痛爲異耳蓋煩即熱也心中鬱鬱不安謂之虛煩若飲食不節內傷勞役而發熱者則手心熱而手背不熱也蓋外感有餘則口鼻之氣俱盛內傷不足則少氣懶言而煩作也凡諸虛作熱狀類傷寒不可不辨而治若誤作外感以汗吐下法治之豈不死哉原虛煩之脉雖大按之無力或尺脉多浮大左寸關脉或濡或弱或微或濇乃虛脉也且脉數主熱數而有力爲實熱又云平人

脉大者爲虛勞又云陰虛生內熱又云勞則喘而自汗出則氣耗矣若飲食失節喜怒不調房事勞役皆損其眞氣氣衰則木旺木旺則伐其脾土四肢困倦而熱少氣以動懶言沉臥動則氣促喘之或表虛自汗惡風當以甘溫之劑補其中氣溫其眞陰其熱自愈大抵勞者溫之損者益之蓋除大熱最忌苦寒之劑重瀉其脾土也且參芪甘溫乃除虛熱之聖藥專以補中益氣少加黃蘗以滋腎水其效如神又房勞陰虛相火發熱者幷大病後虛弱皆宜此湯輕劑爲妙又竹葉石膏湯十味溫膽湯皆治病後煩熱虛熱之聖藥要在選而用之虛煩有熱不可攻熱熱去則寒起誠格言也

脚氣類傷寒

脚氣之作必發寒熱嘔逆但起於脚膝酸軟爲異耳須要察其足脛焮赤腫者濕熱也黃白腫者寒濕也脉浮主風小續命湯加羌活木通木瓜龍膽草牛膝脉沉遲或緊主寒桂枝湯加羌防木瓜木通牛膝蒼术脉數有力主熱小柴胡加黃蘗知母牛膝羌活防

風木通脈沉濡主濕五苓散加蒼朮木通防風羌活牛膝木瓜然傷寒則無足痛之患以別之因有發熱惡寒故狀類傷寒也

瘀血發熱類傷寒

凡跌撲損傷或被人踢打或物相撞或取閃肭一時不覺過至半日或一二三日而發者有之十數日或半月一月而發者有之一般寒熱交作其心胷脅下小腹滿痛按之手不可近者此有瘀血也或一時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死之狀良久復甦輕則當歸導滯湯重則桃仁承氣湯加蘇木紅花牛膝桔梗薑汁量其元氣下其瘀血則愈若醫家不識見其寒熱脹滿罔察其痛處若有痛腫手難近按其脈芤濇或數以明之蓋肝爲血海凡有瘀血必畜積於心胷脅下或小腹之分乃肝部也心主血肝藏之脾爲統之但小便如常者畜血證也內傷瘀血證必自汗

樓英醫學綱目

節候用藥

治中風自汗用桂枝湯治傷寒無汗用麻黃湯此仲景表散之法百世不易者也若元氣暴虧者以參芪與桂枝麻黃等藥表散此丹溪補仲景之法亦百世不易者也至於韓祗和戒桂枝而以中風傷寒通作一法治之者此當時之權變非百世之常行也王海藏云仲景用桂枝當漢之末也韓祗和戒桂枝當宋之隆也時世之異不可不知今編祗和之法於篇末以廣後學之見云

傷寒病有可汗者論中但統言其可汗證及可汗脈或云脈浮而數或云脈浮緊或云脈浮無汗而喘或云脈浮爲在表今略舉數條後人但憑其脈之大槩並不分脈浮有陰陽虛盛之理又不知有可汗不可汗之證誤投發表藥則多變成陽毒之患矣今舉病人有汗惡風無汗惡寒分二等及據立春已後立秋已前氣候輕重各立方治之庶學者易爲開悟耳

病人二三月以前兩手脈浮數或緩或緊按之差軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可便投解表藥此是見裏證未見表脈也宜候寸脈力小

如關尺即可投解表藥大抵治傷寒病見證不見脈未可投藥見脈未見證雖少投藥亦無害也凡治雜病以證爲先脈爲後治傷寒病以脈爲先證爲後

病人兩手脈浮數而緊名曰傷寒若關前寸脈力小關後尺脈力大雖不惡風不自汗出此乃陰氣已盛先見於脈也若不投藥和之後必惡風及自汗出若立春已後至清明已前宜調脈湯主之清明已後至芒種已前宜葛根柴胡湯主之芒種已後至立秋已前宜人參桔梗湯主之

病人兩手脈浮數而緩名曰中風若寸脈力小尺脈力大雖不惡風不自汗此乃陰氣已盛先見於脈若不投藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明已前宜薄荷湯主之清明已後芒種已前宜防風湯主之芒種已後至立秋已前宜香芎湯主之

病人兩手脈浮數或緊緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰盛陽虛也若自汗出惡風是邪氣在表陰氣有餘也素問云陰氣有餘爲多汗身寒即可投消陰助陽表劑以治之若立春已後清明已前宜六物

麻黃湯主之清明已後芒種已前宜七物柴胡湯主之芒種已後立秋已前宜發表湯主之

病人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈大於關尺者此名陽盛陰虛也若發熱冒悶口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰陽氣有餘爲身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解表若立春已後至清明已前宜人參湯主之清明已後至芒種已前宜前胡湯主之芒種已後至立秋已前宜石膏湯主之

病人兩手脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用藥平之若立春已後至清明已前宜解肌湯主之清明已後至芒種已前宜芍藥湯主之芒種已後至立秋已前宜知母湯主之

仲景云傷寒爲病脈緩者名中風脈緊者名傷寒今分此二端何也始因冬寒毒之氣中人其內伏之陽沉潛於骨髓之內每至春夏發時或因外傷寒而引內邪出或因外傷風而引內邪出及乎內邪旣出而

爲病一也古人云立此二端恐後人疑其脉緊與緩脉治別也若中風與傷寒脉異何故仲景無別法治之此乃後人不究仲景之心也病人始得病一二日至五六日尚有表脉及表證亦可依脉證投藥凡投解表及發表藥每一日可飲三服病證甚可至五服外不可頓服藥也如證未解次日依前再投如證依前未解可作熱粥投之粥內加葱白亦可如有汗出勿厚衣蓋覆恐汗出太過作亡陽證也海藏云韓氏微旨可汗一篇有和解因時法言傷寒之脉頭小尾大傷風之脉頭大尾小李思訓保命新書亦分尺寸與仲景同之非若前人總言尺寸脉俱浮而緊尺寸脉俱浮而緩緊則爲傷寒無汗緩則爲傷風自汗又有傷寒有汗者傷風無汗者脉亦互差與證不同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大卽爲傷寒尾小頭大卽爲傷風人病間有脉證未顯於尺寸者故韓李述爲和解因時法也又恐後人疑其不與前聖合遂於本方內又立加減法數條亦不越前人之意何其當哉蓋二公者當宋全盛之時故又戒麻黃桂枝

不可輕用改用石膏升麻葛根柴胡之平劑當時則可非百代常行之道時世遷移之法也可汗一篇若隨湯液隨證應見自有定規雖明哲不可踰也

又寸口脉小飲冷與霧露所傷同作中焦治今韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷霧露同傷一體也飲冷霧露所傷寸口舉按全無是陰氣在胃不和陽氣不能升越也傷寒寸口小者只於關部下至膀胱本部見之寸口雖小只是舉之微小沉按之有也非若飲冷舉按全無也若果寸口舉按全無卽不可解表只宜溫中不可不知夫傷寒之說始自黃帝以開其端至於仲景方陳其條目自後膚淺之學莫知其數立言者只云病在表可發汗病在裏可下或云不可汗不可下未嘗有溫中之說仲景傷寒例云尺寸俱沉細太陰受病也尺寸俱沉少陰受病也尺寸俱微緩厥陰受病也又辨太陰證云太陰病脉浮可發汗宜桂枝湯又手足溫自利不渴者宜四逆湯又腹滿時痛桂枝加芍藥湯辨少陰證云少陰病始得之發熱脉沉者麻黃附子細辛湯又少陰病一二三日麻黃附

子甘草湯又少陰病手足寒身體痛骨節疼脈沉者附子湯又厥陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯又少陰病脈沉急溫之宜四逆湯今舉仲景論中數條最是三陰病之良法於今世用之尚有未盡證者愚嘗校之自至和初歲迄於今三十餘年不以歲之太過不及爲則每至夏至已前有病傷寒人十中七八兩手脈俱沉細數多是胷膈滿悶或嘔逆或氣塞或腸鳴或腹痛與仲景三陰病說理同而證不同因茲不敢妄投仲景三陰藥方纔見脈沉及胷膈滿便投下藥下之往往不救常斟酌仲景理中丸與服之其病勢輕者胷中便快其病勢重者半日許滿悶依然或有病人脈沉細遲投仲景四逆湯溫之以藥力大熱後必發煩躁因校量此形證今別立方以治之藥多對證不可不傳焉

病人但兩手脈沉細數或有力或無力或關脈短及力小胷膈塞滿氣短不能相接者便可隨脈證投溫中藥以治之

病人兩手脈沉遲或緊皆是胃中寒也若寸脈短及

力小於關尺者此陰盛陽虛也或胷膈滿悶腹中脹滿身體拘急手足逆冷急宜溫之

若立春已後至清明已前宜溫中湯主之清明已後芒種已前宜陳皮湯主之芒種已後至立秋已前宜七物理中丸主之

病人脉沉細無力雖三部脉力停等亦是陰氣盛也更不須候寸脉短治之或胷脅滿悶身體拘急疼痛手足逆冷速宜溫中藥和之

若立春已後至清明已前宜厚朴丸主之清明已後至芒種已前宜白朮湯主之芒種已後至立秋已前宜橘皮湯主之

病人胷膈滿悶時時嘔逆肢節痛兩脅下痛腹中鳴此是停飲宜二苓湯

病人服前藥胷膈不滿悶者此上焦有陽也或藥力太過上焦有熱腹滿虛鳴時時疼痛此是被陽藥消逐得上焦陰氣并入下焦也雖是下焦積寒冷奈上焦陽盛更難用溫下焦藥也當用灰包熨之其法用稻草灰或桑柴灰二三升許入好醋拌和乾濕得所

銚內炒令灰熱以帛包裹置臍下熨之須先炒灰包常更換令常熱以腹不滿痛爲度初熨時病人不受者勿聽但令亟熨之不住可也如灰包熨後得下利三兩行或小便二三升或微似有汗此是陰氣外出或下泄也勿疑之病輕者乃得愈後出餘氣而解病人三部脈沉寸脈小於關尺此爲陰盛當溫中藥以消陰氣宜厚朴丸

神术湯亦同治陰躁而渴不可悞用凉藥若熱藥冷服內有伏陽則可若脈已虛按之全無力或病人素無食養者只可溫服

陰毒

陰毒本因腎氣虛或因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰證也若服凉藥過多則

渴轉甚躁轉急有此證者急服還陽退陰之藥卽安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰證不宜發汗如氣盛脉大身熱未瘥用藥發汗無妨陰毒漸深候積陰感於下則微陽消於上故其候四肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脉沉細而一息七至以來有此證者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫煖爲效仍服金液丹來甦丹五勝散還陽散退陰散

陰毒沉困之候與前後漸染之候皆同而更加沉重六脉附骨取之方有按之卽無一息八至已上或不可數至此則藥餌難爲功矣但於臍下灼艾火如棗大三百壯以來手足不和煖者不可治也倘復和煖以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服金液破陰來復等丹其脉遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰證而見陽脉有可生之理仲

景所謂陰病見陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足漸溫陽回得汗而解或問滑沉之脈如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沉爲純陰翕爲正陽陰陽和合故名曰滑古人論滑脈雖曰往來前却流利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翕合也言張而復合也故曰翕爲正陽沉言忽降而下也故曰沉爲正陰方翕而合俄降而沉奄爲忽忽間仲景論滑脈可謂諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十卷目錄

醫部彙考三百五十

傷寒門十六

李梴醫學入門（太陽經證 陽明經證 少陽經證 太陰經證 少陰經證 厥陰經證 日數 標本 榮衛 經脈 少陽禁汗禁下 三陰有中有傳 論傷足不傷手 辨傳足不傳手 論表裏 辨陰陽 表裏俱無 表裏俱有 當汗 當下 不可汗 不可下 不可灸 不可吐 急下 急溫 過經不解 暫補 大法 論正傷寒名義 傷寒 傷風 兩感 傷風見寒傷寒見風 合病 併病 疫厲 溫熱病 晩發）

冬溫　暑暍　寒疫　風溫　風濕　寒濕
中濕　濕痺　痓痙　溫瘧　霧露　水證
黃疸　目風
趙獻可醫貫論傷寒　溫病論

藝術典第三百七十卷

醫部彙考三百五十

傷寒門十六

明李梴醫學入門

太陽經證

頭疼身熱脊強此太陽正病也以後凡言太陽證即頭疼身熱脊強也凡言表證者亦即太陽證也各經倣此陽從下起三陽之長曰太陽太陽脉尺寸俱浮浮緊傷寒浮緩傷風太陽受病當一二日發以其脉上連

風府故頭項痛腰脊强頭者諸陽之會氣病則麻血病則痛身熱者寒客皮毛鬱閉其陽而後發熱陽雖人身正氣鬱則爲邪爲熱熱雖甚不死蓋傷寒始於寒而終成於熱也惟不發熱而但惡寒者邪發於陰也或熱多寒少或不大便而泉清頻數或熱結膀胱溺濇或汗多溺難或汗後不解或汗漏不止或過經不解或畜血發黃或喘或嘔皆太陽所主

陽明經證

陽明夾於二陽之中陽氣盛極故曰陽明脈尺寸俱長長而微洪經病長而沉數腑病太陽脈靜則不傳如脈數急欲吐者此寒邪變熱傳於陽明當二三日發以其經中客邪故目痛鼻乾身熱者陽明主肌肉邪甚則身前皆熱不眠者煩盛津乾胃氣不和也太陽未罷者發熱惡寒太陽已罷者不惡寒而反惡熱煩渴作嘔津乾便鞕或即狂言謂之正陽明少陽陽明脅滿不大便而嘔或瘀血發黃或下血讝語或胃煩懊憹皆此經所主然亦有裏寒下利或寒氣結積而爲痼瘕者不可不知

少陽經證

少初也陽氣初嫩亞於陽明故曰少陽脉尺寸俱弦弦而滑數者陽極發厥弦而和者病欲散少陽受病當三四日發以其脉循脅絡於耳故風熱上壅不利則耳聾脅痛寒熱往來不食嘔而口苦咽乾目眩若不嘔吐而能食者爲三陰不受邪也若身無大熱躁悶者陽去入陰無疑矣似瘧婦人血結皆此經所主

太陰經證

陰從天降首曰太陰在陽爲表在陰爲裏邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉故尺寸俱沉沉實有力當下沉細無力當溫太陰受病當四五日發以其脉布胃中絡於咽嗌故腹滿或痛而嗌喉下乾燥或大便不通小便如常或自利手足溫而渴者爲傳經腑熱或自利不渴手足冷者爲直中陰證或因內傷飲食冷氣入脾必腹痛胷膈不快然太陰乃三陽之終三陰之始陽經表證未盡宜汗半表裏胷滿多痰宜吐傳經裏熱宜下直中陰經宜溫調脾勝邪正在此關

少陰經證

次於太陰故曰少陰脉尺寸俱沉沉實有力當下沉微無力當溫少陰受病當五六日發以其脉起於足心貫腎絡於肺繫故舌乾口燥而渴或自利淸水心痛腹脹或大便閉鞕不欲厚衣者皆熱入裏之深也若厥逆畏寒欲吐不吐腹痛自利小便白色或乾嘔亡陽咽痛脉微欲寐者乃陰毒入臟之深也或下利體痛欬嘔者水氣也或飲食入口則吐脉弦遲厥逆心下實者不可下也宜吐之或脉沉發熱者汗之蓋有初得病直攻少陰不先自太陽傳次而入也

厥陰經證

厥陰者陰盡則變而厥逆生蓋傳經至此已盡無復可傳再傳則逆於手經矣脉尺寸俱沉沉實有力當下沉遲無力當溫浮緩病自愈厥陰受病當六七日發以其脉循陰器絡於肝故脣靑舌捲而煩滿者胷中氣滿急也或囊拳者陰囊縮也在女子則陰戶急痛引小腹此傳經厥陰風熱毒深於內也肝木移熱尅脾脾受賊邪五臟六腑皆困榮衛不通耳聾囊縮而厥水漿不入不知人則死速下以救五死一生或

下利讝語者內有燥屎也仍宜下之或嘔而發熱者和之或發熱惡寒如瘧囊不縮脉微浮微緩胃之脉脾氣旣全不受賊邪榮衞將復水升火降寒熱作而大汗解矣或下利腹脹身疼者當先救表而後溫裏若下利清穀大汗出而厥四肢疼小腹拘急或乾嘔吐沫或氣衝心痛發熱消渴吐蛔皆厥陰寒證也宜溫之已上正文六言乃萬病之祖非得之內經不能六言包括無遺如此凡言六經所見之證卽此三陽三陰經證也雜病亦然

日數

經云一日足太陽膀胱之經二日足陽明胃之經三日足少陽膽之經四日足太陰脾之經五日足少陰腎之經六日足厥陰肝之經又云傷寒不加異氣不傳經者七日足太陽病衰手太陽受之頭痛少愈八日足陽明病衰手陽明受之身熱少歇九日足少陽病衰手少陽受之耳聾微聞十日足太陰病衰手太陰受之腹減如故則思飲食十一日足少陰病衰手少陰受之渴止舌乾已而嚏十二日足厥陰病衰手

厥陰受之囊縱少腹微下大氣乃止病再傳六經有自安者活人云一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日不解便實方可議下此皆論其常耳解惑論云病人有虛實邪氣有遲速豈可拘於日數日雖多尚有表證而脉浮數猶當發汗日雖少已有裏證而脉沉細即當下之但隨證虛實與脉而汗下之陶節菴云但見太陽證即用麻桂汗太陽見少陰證即用四逆溫少陰見陽明證即用承氣下陽明見眞寒證直入陰經即救眞寒此最活法有循次傳者天

運主氣者初氣厥陰風木二氣少陽相火三氣少陰君火四氣太陰濕土五氣陽明燥金六氣太陽寒水人生順受其氣病則逆其氣而傳變自下而上自外而內究其所以然者陽主動而位外陰主靜而位內人身膀胱氣血之會自頭背至足無所不主故風寒每先犯之其次胃氣流行無息自鼻腹至足皆其所主故太陽行督而交任必及於陽明也又其次少陽淸氣主行榮衞脅肋身側皆其所主故胃邪必移於膽部此三陽皆身之外而動者故爲表至於太陰人

身五臟脾爲死陰至靜不動其所消食者全賴胃氣升降故自少陽脅肋下肚腹宜乎先入太陰也其次腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已故自中腹移至臍腹必及於腎也又其次肝惟主散血藏血而極其凝靜者此天然之序不可亂者如此若夫太陽自傳於太陰者作渴溺澀因誤滲也太陽併傳陽明者當用麻黃而反用葛根以引之也太陽越經傳少陽者當用麻黃而反用柴胡以引之也太陽傳少陰者當用桂麻而反下以陷之也太陽傳太陰者當用桂枝而反下以入之也此醫之誤而亂其傳之序也又有太陽卽傳厥陰頭項痛甚二經脉絡相接同督脉而上行也有太陽傷風以致陰血自燥熱畜膀胱逆傳小腸與心謂之寃熱有風寒自背入者直中太陽少陽自面入者直中陽明有首尾只在太陽經而不傳諸經者有間傳一二經者有不傳而罷者有不罷再傳者有不自陽經直中陰經者此邪無定體不可拘於日數也活人云六氣之邪乘虛之經得之

標本

標者梢末本者根本以主言之各經絡爲標各臟腑爲本如太陽經爲標膀胱爲本餘倣此以客邪言之先受病爲本次受病爲標標本相傳治其急者請詳言之太陽膀胱爲本故頭疼脊强小腸爲標與心爲表裏故發熱冬月麻黃桂枝餘月九味羗活湯陽明大腸爲標與肺爲表裏故微惡寒發熱爲經病葛根解肌湯渴而有汗不解者白虎湯胃爲本目痛鼻乾潮汗閉澀滿渴狂譫爲腑病調胃承氣湯少陽三焦相火爲本遊行一身故微熱膽爲標耳聾脅痛寒熱嘔而口苦緣三焦無形膽無出入之路故從中治標本俱小柴胡湯太陰肺爲標咽乾身目黃脾爲本腹滿痛謂之腑熱咽乾腹滿手足溫者桂枝加大黃湯或大柴胡湯身目黃者茵陳湯胃滿者瓜蔕散如自利不渴或嘔吐者屬臟病理中湯丸少陰心爲本故舌乾口燥或遶臍硬痛或心下硬痛或下利純清水或譫語便閉小承氣湯腎爲標面寒如刀刮唇青不渴吐利胃腹絞痛四肢厥逆指甲黑踡臥身如被杖

古薑附湯厥陰心胞絡爲標故舌卷厥逆冷過肘膝吐沫嘔逆不渴小腹絞痛者爲寒三味參萸湯四順湯肝爲本主男子囊縮女子陰挺乳縮或手足乍冷乍溫大便實消渴煩滿者爲熱大承氣湯似瘧不嘔二便自調者必自愈不愈脉遲有汗者小建中湯脉濇無汗者桂麻各半湯其囊乳縮證寒證亦有之學者於此而一悟焉則病機到手矣自非仲景玉函內祕其孰與於斯乎此後汗吐下溫和解諸方不甚詳載止言宜汗宜吐宜下宜和悟之

榮衛

榮行脉中在血脉其病深衛行脉外在皮膚其病淺榮血陰也主閉藏故寒喜傷榮而無汗衛氣陽也主開泄故風喜傷衛而有汗然豈獨太陽爲榮衛之會而有風寒之別乎陽明善饑爲傷風不食爲傷寒少陽耳聾脅滿而煩爲傷風口苦咽乾目眩爲傷寒三陰傷風但四肢煩疼耳太陽爲之先者傷寒因腎水虧損至春木無生意故發爲溫病至夏絕生化之原發爲熱病所以太陽少陰二經受病最多最先

經腑

表多裏少爲在經宜清肌解表裏多表少爲在腑宜和肌通裏蓋陽明標雖主肌而其本則胃也然豈獨陽明爲十二經之長而有經腑之異乎仲景曰三陽受病未入於腑可汗而已三陰受病已入於腑可下而已則三陰有在經者仍宜微汗之蓋榮衛屬太陽主皮毛胃腑屬陽明主皮膚之下肌肉之上及腸胃也胷脅屬少陽主血榮百節流行三部臟屬三陰主筋骨并兩足故太陽爲陽之表胃爲陽之裏若但以臟腑而分表裏則腑爲表臟爲裏若合榮衛臟腑而分表裏則表者榮衛之所行裏者胃腑之所主而臟則又深於裏但病入胃則亦不更傳不可不知

少陽禁汗禁下

少陽居太陽陽明之中半表半裏禁汗恐犯太陽禁下恐犯陽明禁滲恐生發之氣陷入陰中只宜和之以小柴胡湯犯三禁則變不可勝窮他如太陽經禁下與滲犯之則動血熱入裏而難解陽明經禁汗與滲犯之則竭津液畜下而如狂益津液者連鬚葱白

湯是也又下證中治見合病

三陰有中有傳

三陰最不可執有宜下者有宜溫者自三陽氣分傳入三陰謂之傳經陰證傳非傳入脾腎肝也乃入三陰血分胃與大小陽之腑也故仲景謂巳入於腑可下者是也若不自陽經傳來直中三陰之經初起厥逆腹痛自利不渴太陰自受寒也上證加之嘔吐少陰自受寒也又加之小便淸利厥陰自受寒也熱藥溫之猶恐或遲陰陽一差生死立判雖然傳經直中先賢發之盡矣然豈無傳變者乎假如傳經之際輕生者或被生冷或犯房慾或粗工猛施汗下眞氣衰弱陽證變爲陰證如俗所謂陽證歸陰仍宜直中寒證法治故內經止言傳變而不言直中者蓋言變則包直中今局方言傳陰傳陽則不是當言傳陽變陰庶乎傳經爲裏熱直中與變爲裏寒臨證叅脉直中三陽傳經三陽病在於表脉浮長弦傳經三陰病在於裏脉沉數實直中三陰病在於經脉沉微緩此表裏虛實大分非專以陽爲熱陰爲寒也

論傷足不傷手

手之六經主於春夏足太陽少陽正司冬令觸冒之者則二經受病其次則少陽厥陰繼冬而司春令至春分後方行溫令故風寒亦能傷之足陽明與冬本無與然寄旺四季寒熱溫涼之氣皆能傷之况表邪傳裏必歸脾胃而爲燥糞用湯藥下之而胃和矣

辨傳足不傳手

人身之氣每日周行三百六十五骨節以應周天三百六十五度血亦隨氣運行腠理以爲一身動靜云爲之主所以一脉愆和百脉皆病况風寒中人先入榮衛晝夜循環無所不至豈間斷於手經哉七日不愈而再傳者乃足經移熱傳於手經如寃家之相摭也雖然手足亦推本言耳上古止分三陰三陽而不分手足其意甚深況手足三陽同手走頭至足手足三陰同足走胷腹與手豈有經絡同而受病又有不同者哉卽如喘欬發熱分明手太陰太陽病也狂言讝語分明手少陰病也胷滿乾嘔耳聾分明手厥陰少陽病也認眞五臟六腑俱有表裏二證蓋人之情

慾天之淫邪自然不齊故病多標本兼見假令脉弦面青目痛筋急善怒心下滿者兼肝有風也脉洪面赤口乾善笑身熱者兼心有熱也脉緩面黃身重肢疼嗜臥者兼脾有濕也脉濇面白帶憂喘嗽下衄者兼肺有燥也脉微面黑善恐耳閉氣逆而泄兼腎有寒也凡邪出於外則爲腑表入於內則爲臟爲裏不拘何臟何腑表證必同歸於太陽裏證必同歸於陽明噫法無定用病有定體知此則百病機關一悟可了又何疑於手經之不受病耶

論表裏

表證屬太陽凡見頭疼發熱惡寒清便自調腰項脊强脉浮緊者卽是表證不拘日數多少便宜解表不宜下滲有汗爲表虛宜解肌無汗爲表實宜發汗但發汗亦有輕重不同古謂春夏宜汗者借天時而喻陽邪在外也其實春月陽氣尚微秋月陽氣欲斂俱不可大汗夏月天氣熱元府開不必大汗冬月陽氣伏藏感冒輕者尤不宜汗惟傷寒重者時令嚴慄皮毛堅緻非大汗無由得散不得已而從權也至於陰

證但厥無汗者妄汗動經則死或有表邪辛熱微汗以散之可也

裏證始焉脉浮而大今則沉而數始焉惺而靜今則躁而動始焉頭疼發熱惡寒今則不惡寒反惡熱煩躁倍加胷連臍腹滿痛脅下掌心自汗濈濈以致胃乾糞燥大便不通小便赤澀口乾發狂讝語掀衣揭被揚手擲足六脉有力即是傳經熱證又謂陽盛誤汗即死或有初病即見此證者不拘日數多少便宜通利失下則血氣不通而發厥矣抑又有說焉純乎表而裏無一毫病者當解表時勿攻裏純乎裏而表無一毫病者當攻裏時勿解表如表裏俱見或表多裏少表急裏緩則先治其表而後攻其裏或裏多表少裏急表緩則先攻其裏而後救其表也又表虛裏實則藥宜辛凉裏虛表實則藥宜辛熱皆以裏爲主內氣正而後可以治表雖莫急於內表亦不可緩也表裏虛實而醫之大分明矣

凡病或渴或不渴或胷中煩不煩或嘔不嘔或腹脅痛不痛或欬或心下悸或小便不利或有爲之證少

陽所主也邪在表則多寒邪在裏則多熱邪在半表裏則寒熱往來邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿邪在半表半裏則胷脅滿邪在表則呻吟不安邪在裏則狂言亂語邪在半表裏則欲言不言邪在表則小便清而易邪在裏則小便濁而難邪在半表裏或利或不利邪在表則不煩不渴不嘔邪在裏則煩滿而渴故或煩或嘔者邪在表方傳裏也若見耳聾脅痛寒熱嘔而口苦胷脅緊滿脈見弦數者即是半表半裏脈大胷滿多痰者或挾宿食可吐百問云氣浮上部塡塞心胷頭痛多涎此吐證也內經云其高者因而越之脈雖大無甚痰者不可吐只當和解古謂春宜吐者順陽氣發生於上也秋冬宜下者順陽氣收斂於內也此亦道其常耳有病皆當從權

辨陰陽

概言之三陽經病即陽證手之三陽從頭走足故頭疼身熱云云三陰經病即陰證足之三陰從足走腹故腹痛自利云云然陰陽俱有表裏二證陽證表裏同歸於熱而已陰證表鬱似陽入裏則有傳經直中

之殊大抵陽證之表發熱惡寒清便自調面光聲亮鼻息往來如常手足溫陽證之裏脣焦舌燥爪甲紅活身輕易於轉側煩渴掀衣揚手擲足大便或閉或鞕小便或赤或澀脈浮洪數宜汗吐下和四法以治之陰證之表無熱惡寒面慘聲短鼻息往來氣冷手足厥逆陰證之裏脣紫舌卷爪甲青黑身重難於轉側不渴引衣臥多踡足大便泄利小便清白脈細沉微每與陽證相反蓋陽證自下而上故初起有頭疼陰證則無頭疼也陽證自外傳入故鬱而爲熱陰證則無身熱而反厥冷也陽證搖手擲足陰證則臥多踡足陽證內熱而渴陰證則不渴陽證二便閉陰證二便清且利也惟有腹痛與嘔陰陽二證俱有然陰脈沉微凡言陽證多得之風寒暑濕邪生於太陽也凡言陰證多得之飲食起居喜怒邪生於少陰也故云傷寒挾內傷者十居八九此陰陽正病也

陽邪不深不能至於厥逆陰邪不甚不能至於煩躁此水極似火火極似水謂之反化亢極則害之義也陽證潮汗祕赤滿渴狂讝甚則斑血喘急然熱極忽

然熱伏於內故身寒四肢厥逆狀若陰證但身雖冷而不欲近衣神雖昏而氣色光潤脉必沉滑而有力此陽極似陰也宜大柴胡湯下之或白虎湯竹葉石膏湯陰證厥冷吐利不渴靜踡甚則咽痛鄭聲然寒極忽然火浮於外發躁擾亂狀若陽證然身雖煩躁而引衣自蓋口雖燥渴而飲水不下脉必沉細無力此陰極似陽也宜通脉四逆湯從治者反攻也熱藥冷飲冷藥熱飲或熱藥爲君而佐以凉藥或冷藥爲君而佐以熱劑亦非判然如庸醫之差訛也借有熱病服熱藥而愈者必先服寒藥過多寒病服寒藥而愈者必先服熱藥過多故耳若夫以寒治熱以熱治寒此爲逆治逆治者正治也正治之法人孰不知之乎

表裏俱無

傷寒頭痛寒熱表也口失滋味腹中不和或閉或泄裏也若四五日後以至過經十三日既無表證又無裏證身微熱者虛熱耳小柴胡湯和之不可汗吐以犯上焦清氣不可大下以犯下焦腎氣身熱日中不

了了睛不和大便鞕者乃可大柴胡小承氣下之設或已下而脈數消穀善饑六七日不大便者瘀血證也

表裏俱有

表裏俱見必分多少治之脈浮而大爲表煩渴尿赤爲裏五苓散主之頭疼身熱便閉爲裏小便清利爲表桂枝湯主之心滿不食便閉爲裏惡寒頭汗爲表小柴胡湯主之太陽病因下早而協熱下利心痞鞕者謂之表裏不解桂枝人參湯太陽病因下早而腹痛有積者謂之太陽太陰又謂之裏傳表桂枝加芍藥湯甚者加大黃太陽病下早利不止脈促喘而汗出表未解也葛根芩連湯脈弦胷滿者梔豉湯吐之通治表多裏少者白虎湯或合小柴胡湯裏多表少者五苓散或合小柴胡湯表裏俱急者防風通聖散大柴胡湯

當汗

太陽證脈浮緊者宜汗汗之不解者再與汗之若失其汗則寒邪傳經當看傳過何經變出何病若因汗

而反下滲表邪乘虛內陷則熱畜於裏變爲瘀血懊憹痞氣結胷等證

當下

裏證具而脈沉實者宜下若下後熱不退脈未和者猶當量虛實再下若失下則邪無從出又或應下而反汗之則津液內竭變爲動悸等證

不可汗

可汗者脈證全在表也若太早太過則津液竭而變生焉有不可汗者諸虛損咽乾口燥咽痛瘡瘍淋瀝經水適至諸失血吐沫欬嗽壞證臍中上下左右動氣風溫風濕濕溫脈遲微濇者或厥而脈緊者俱宜和解不宜汗若強發之病微者難瘥劇者言亂目眩而死

不可下

可下者脈證全在裏也若太早太過則水穀脫而變生焉有不可下者諸虛咽腫嘔吐厥逆結胷不轉失氣臍中左右上下動氣脈浮細浮虛浮濇帶表惡寒等證下之則危隨宜以溫熱藥救之

不可灸

陰陽二毒及少陰證吐利及口和背惡寒脉微濇屬陽虛者宜灸陰虛挾火脉微數者不宜灸蓋外火能助內火灸則下體必重皮骨焦肉消或因此遺精潮熱欬唾見紅皆火氣之所使也活人云凡灸後燒鍼後證與火邪發狂者同小柴胡加龍骨牡蠣治之

不可吐

膈上寒飲乾嘔少陰病也四肢冷胃虧也脉微下虛也誤吐內煩損傷元氣遂致不救者有之若應吐而反溫之則毒氣鬱結於胃而爲發狂等證

急下

傷寒熱氣入臟流於少陰之經咽絡焦口燥渴腎水乾也熱病熱不已目睛不和亦腎水乾也皆急下以救腎水陽明發熱汗多或已汗不解腹滿痛或譫狂不大便者皆急下以存胃液傷寒脉弦而遲弦爲寒遲爲臟脉大而緊大爲陽緊爲寒俱謂之陽中伏陰急下以分陰陽又下利三部脉平心下鞕者內實也下利脉遲而滑或浮大按之反濇惡食者皆胃有宿

食也但宿食忌巴霜只宜用大黃蕩滌

急溫

脉沉厥冷膈上寒飲乾嘔或時頭痛皆寒氣上攻也急溫之三味參萸湯內寒已極厥逆吐利不渴靜踡陽和之氣欲絕六脉若有若無急溫之四逆湯凡言急者病勢已篤將有變革非若他病可以緩也他如太陽汗出不止汗後惡風汗後煩躁心悸身痛皆宜急用附子加於桂枝芍藥之類三陽脉遲腹痛建中湯當先施也但一服中病即止傷寒之藥皆然

過經不解

傷寒六日傳經已遍七日當解再傳至於十三日以上不愈謂之過經汗下失宜以致邪氣流連不已神昏讝語胷滿潮渴隨其表裏證見而調之或從輕再汗再下如脉亂發躁尺寸陷者危如脉緩安睡邪未淨者正未復耳參胡芍藥湯調之有大便下利而脉和者諸醫以丸藥下之停留餘熱凡過經氣虛或加異氣宜與壞證參看

暫補

凡尺寸遲弱血少也不問風寒初證雜證俱忌汗吐下宜先以小建中湯或黃芪建中湯救脉如素實者小柴胡湯亦好俟脉不遲方可施治

大法

陰陽病者爲虛不病者爲實表病裏和則邪出於外而爲陽虛陰盛故發表不遠熱而用辛甘之劑所以扶陽也裏病表和則邪入於內而爲陰虛陽盛故攻裏不遠寒而用酸苦之藥所以扶陰也若陰經自受寒邪則爲臟病設陰陽氣將脫急宜辛熱回陽抑陰故曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡實實虛虛損不足而益有餘醫殺之耳此汗下之樞機汗吐下溫解五法各有不同汗有大汗發表微汗解肌以別輕重下有急下少與微和滲利以分清濁溫有兼補者吐有宣湧探引或只寬利而不敢吐者和解則一而已或曰傷寒無補法熱氣得補復盛更復下之是重困也惟虛煩裏寒陰證不在此例得中者五法動中肯綮太過者粗工猛進不及者中工從緩從輕凡傷寒汗下藥一服中病即止不必盡劑與雜

病不同傷寒不過汗吐下三證若用之得當有何傳變全在醫者精明審處之耳

傷寒題目未定之時不知有無風濕勞役痰食等項相兼似是而非最宜詳辨故不知者寧可不治班固有言曰有病不治得中醫倘一藥之誤悔將噬臍噫古以醫藥救夭札今以醫藥治其生治生可也而誤人於死豈不與謀刼者同哉愼之愼之

論正傷寒名義

曰傷寒曰傷風曰傷風見寒曰傷寒見風曰合病曰併病曰兩感曰中霧露曰中暑暍曰熱病曰晩發曰痓痙五種濕病風濕濕溫寒濕中濕濕痹五種溫病春溫風溫溫疫溫瘧溫毒發斑其水證黃證乃傷寒之大關鍵也故幷提之共二十四種濕溫居半可見濕熱爲病最多

傷寒

霜降後春分前人有衝斥道途履霜踢冰冒犯寒氣卽發爲病名曰傷寒必先惡寒頭痛甚鼻無涕其聲前輕後重口中和雖不食亦不惡食手足不熱病深

重者必身痛發熱冬月麻黃湯輕淺者陶氏麻黃湯虛者人參順氣散三時羌活沖和湯小柴胡湯通用麻黃杏仁飲此專辨無汗爲傷寒蓋風暑濕皆有汗惟寒泣血則無汗至於初證傳變雜證詳後

傷風

傷風初證惟頭疼口和不惡食與傷寒同緣寒乃陰邪風乃陽邪所以傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒手足微厥傷風手足背皆熱傷寒鼻無涕傷風鼻流涕其聲如自瓮中出傷寒面慘身痛傷風面光身重傷寒無汗惡寒不惡風傷風有汗惡風不惡寒甚者自汗出不止灑灑惡風復嗇嗇惡寒冬月桂枝湯自汗小便數者芍藥甘草湯自汗小便利腳踡急者桂枝湯加參附輕者柴胡桂枝湯自汗渴而小便難者邪漸傳裏五苓散自汗不渴者邪在表茯苓桂甘湯三時防風沖和湯柴胡桂枝湯或敗毒散去茯苓鼻塞通關散通用柴胡半夏湯古立六經傷風湯但三陰藥皆辛熱似非傷寒家法仲景治傷寒傷風表證分有汗無汗裏證同於和解通利更無分別

今詳桂附八物恐亦風邪直傷陰分其人素虛或房室後傷風則可若槩作表藥誤人多矣蓋傷風發表辛熱不如辛溫辛溫不如辛凉也或疑六淫仲景獨詳於風寒而略於暑濕且不及燥火何也蓋暑火同氣燥濕同源風寒傳變六經暑濕性偏著人五臟壯者氣行則已怯者乃著爲病故耳前所謂嗇嗇不足也洒洒淅淅也皆惡風之貌

兩感

兩感者半入於陽半入於陰陰陽兩感臟腑俱病一日太陽與少陰俱病頭疼爲太陽邪甚於表口乾而渴爲少陰邪甚於裏二日陽明與太陰俱病身熱讝語爲陽明邪盛於表不飲食腹滿爲太陰邪盛於裏三日少陽與厥陰俱病耳聾爲少陽邪盛於表囊縮而厥爲厥陰邪盛於裏也五臟六腑俱病欲治表而裏急欲治裏而表急必死之證但禀厚而感邪淺者或挾異氣風溫風濕之類猶可救療所以仲景有治有先後發表攻裏之說法當審其表裏緩急虛實何如如表裏俱急者大羌活湯主之如陽證陽經先受

病身體痛而不下利者爲表急先以葛根麻黃發表後以調胃承氣攻裏如陰證陰經先受病身體痛而下利不止者爲裏急先用四逆救裏後以桂枝救表陰陽未分者陶氏沖和湯探之古法一日太陽少陰五苓散主之頭痛加羌活防風口渴加黃蘗知母二日陽明太陰大柴胡湯三日少陽厥陰危甚大承氣湯加川芎柴胡救之活人不分陰陽專用四逆桂枝先輩皆以爲謬大抵兩感脉從陽可治從陰難治

傷風見寒傷寒見風

先傷寒而後傷風者證傷寒也而見傷風之脉先傷風而後傷寒者證傷風也而見傷寒之脉此乃榮衛俱實故無汗而煩躁大青龍湯不煩躁者桂麻各半湯通用大羌活湯九味羌活湯加人參大棗或神朮散香蘇散

合病

或一陽先病一陽隨病或二陽同病三陽同病不傳者謂之合病

自利者下利溏泄三陽合病寒邪盛而裏氣不和也

氣行下則利氣逆上則嘔太陽合陽明自利惡寒升麻葛根湯惡熱者白虎湯太陽合少陽自利者黃芩湯嘔者並加半夏生薑陽明合少陽自利最重小柴胡合升麻葛根湯

有宜下者本太陽病因汗下滲亡津液胃腑燥實轉屬陽明謂之太陽陽明脾約丸潤之本少陽病因汗滲熱入胃腑大便燥者大柴胡微下之本陽明經病熱盛傳入胃腑謂之正陽陽明乃本經自病也宜調胃承氣湯從中治之蓋太陽少氣少陽少血惟陽明

居二陽之中氣血俱多所以從中治陽明而不敢犯太陽少陽也又三陽合病面垢腹脹痛身重難轉側譫語遺溺口燥不仁大便難者白虎加參湯主之不可汗下亦中治法也

有宜汗者表證頭疼惡寒未除爲太陽尚未過經尤宜發汗如太陽陽明喘而胷滿者麻黃湯太陽少陽麻黃湯合小柴胡湯通用九味羌活湯加石膏知母枳殼蓋在經則汗過經則下也

併病

併者催併逼迫之意始初二陽合病後一陽氣盛一陽氣衰併歸一經獨重初證亦不解罷陽明併太陽者太陽證未解陽明證又至麻黃湯合升麻葛根湯如太陽證重加太陽經藥陽明證重加陽明經藥後做此少陽併太陽者太陽證未解少陽證又至麻黃湯合小柴胡湯頭痛項強眩冒如結胷狀者亦宜通用九味羌活湯少陽併陽明者爲木尅土難治小柴胡湯合升麻葛根湯柴胡升麻湯救之是併病在表者皆可汗若太陽證罷乃入胃腑者謂之傳經非併也宜體量攻下舊云三陰無合併二病然三陰亦自有相合併者但非兩感必無陰經與陽經合併之理

疫厲

疫疾如有鬼厲相似故曰疫厲又曰時氣春應煖而反清夏應熱而反凉秋應凉而反大熱冬應寒而反大溫非其時而有其氣凡感之者即發頭疼身痛寒熱一方長幼病皆相似治與傷寒微異者春清責肝升麻葛根湯夏熱責心二香散調中湯秋濕責肺白虎加蒼朮湯茵陳五苓散冬寒責腎葳蕤湯甘桔湯

土旺四季隨經取之治與傷寒同者表證敗毒散半表證小柴胡湯裏證大柴胡湯挾內傷者宜補宜散宜降人中黃丸是也經曰疫氣不拘於診更當於運氣求之凡入疫家用麻油服之或紙撚蘸麻油幷雄黃朱砂末探入耳鼻內最能避穢毒之氣遍滿鄉村者用如意丹亦妙

溫熱病

經曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣淸涼冬氣冷冽以傷寒爲毒者其以最成殺厲之氣也其有傷於四氣當在何經而發何病大槩春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必瘧痢秋傷於濕冬必欬嗽冬傷於寒春必痎瘧痎者二日一發瘧者一日一發秋傷於濕病欬嗽者及冬風寒相搏痰涎生而爲欬嗽冬傷於寒病痎瘧者及春溫氣相搏變爲溫病是四時正氣亦能愆期而發皆因發動之時逆推致病之源非受傷之時頃擬今日之病故有久而消散不成病者豈可執一論哉但稍覺氣淫於內心腹不快者不換金正氣散加減以正胃氣

溫病者春分後有太陽病發熱欬嗽身痛口渴不惡寒其脈弦數不緊右手反盛於左手怫熱在內故也或散在諸經各取其經而取之熱病卽與溫病同但發在夏至後脈洪數熱渴更甚耳雖因冬時受寒伏於肌骨然人身隨天氣化春分則寒變爲溫夏至則寒變爲熱所以傷寒惡寒而不渴溫熱不惡寒而渴不惡寒則病非外來渴則自內達表熱鬱腠理不得外泄乃復還裏終是裏多表少間有惡寒者乃冒非時暴寒或溫暑將發又受暴寒非冬證之甚也法當治裏熱爲主而解肌次之亦有專治裏而表自解者誤下猶可誤汗則變爲嘔噦狂斑而死蓋溫熱在經而不在表安可例用傷寒汗法惟兼暴寒者乃可表裏雙解亦不敢用冬月辛溫之藥

春溫表證天溫升麻葛根湯天寒柴胡桂枝湯太陽合少陽升麻葛根湯合小柴胡湯半表裏小柴胡裏證大柴胡重者一時表裏俱發防風通聖散表裏俱熱大便自利者柴苓湯加山梔木通虛煩竹葉石膏湯變雜證者治同傷寒

夏熱表證太陽九味羌活湯汗後煩渴脈洪大背惡寒者白虎加人參湯益元散裏證大柴胡重者一時表裏盛發雙解散熱病脈細無力足冷已得汗而躁盛者此陰脈之極也必死詳溫暑門

晩發

先輩云清明至夏至前太陽病者謂之晩發比之溫病稍輕蓋以感之輕者發之早感之重者發之遲從立秋至霜降有患太陽證者亦名溫病治法同溫熱但加燥劑於解肌藥中裏證一同傷寒但既以三月至夏至爲晩發春分前又爲正傷寒不知春溫在於何月更考三月至夏至前名爲春溫則晩發當屬於秋矣立秋前後病因濕熱而發處暑後病者因燥熱而發庶乎四時六氣備而不混而治之各隨其時耳大槩表證九味羌活梔子升麻湯裏證大柴胡湯加生地或導滯通幽湯變雜證者隨宜施治

冬溫

冬有非時之煖名曰冬溫與春秋暴寒暴溫總謂之時行氣與傷寒相似但脈不浮耳治法大同春溫表

證葳蕤湯九味羌活湯入裏加大黃重者雙解散輕者加減調中湯

暑暍

暑暍皆自汗煩渴脈虛面垢昏倦靜而熱傷心脾爲中暑與夏熱病相似但熱病脈洪緊中暑脈細數而沉動而熱傷太陽爲中暍脈浮似夏傷風但汗出惡風身熱而不渴者傷風也汗出惡寒身熱而渴者中暍也加之身痛且重者必夏月傷冷或澡浴水行皮中所致

中暍心腹疼痛霍亂吐瀉轉筋甚則發厥昏悶香薷散痰逆惡心惡寒者橘皮竹薷湯汗多渴而不惡寒者竹葉石膏湯暑濕相搏身痛頭痛煩渴惡心尿赤者五苓散濕盛胷滿者瓜蔕散吐之若小便已洒洒然毛聳口開前版齒燥小有勞身卽熱者表裏俱病也白虎加人參湯有濕者白虎加蒼朮湯和之切忌汗下鍼灸汗則惡寒下則內虛變淋灸則助火發熱中暑發熱煩躁口渴者小柴胡湯加香薷瀉利口渴者香薷散合四苓散元氣素弱脈虛身倦者淸暑益

氣湯昏憒不甦者葱餅熨臍

寒疫

春分至秋分暴寒曰寒疫非冬月傷寒比也三月四月或有暴寒陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微傷之者其病與溫暑相似而治則殊者蓋溫暑伏寒自內而發寒疫自外而入宜調中湯爲主隨時氣候寒熱輕重而以辛凉辛溫之藥加減蓋折者折抑陽氣鬱而爲熱也感之輕而陽氣不爲所折未至發熱者當於感冒藥中求之

春三四月間暴熱傷之者亦名溫病傷寒汗下過經不解者亦名溫病但當隨各經見證治之皆不宜汗下暴溫梔子升麻湯九味羌活湯過經和解散參胡芍藥湯

風溫

太陽病發汗則身凉如發汗身猶灼熱者乃風溫也當春溫氣大行又感風邪所致惟風傷衞四肢緩縱不收若癱瘓然惟溫傷氣氣昏而鼻息不利語言謇

澀身熱自汗多眠治在心火肝木二經忌汗下針誤汗則身必灼熱甚則煩渴讝黃下則遺溺針則耳聾惟清解肌表爲佳宜葳蕤湯敗毒散或小柴胡加桂枝微汗之渴甚者苦蔞根湯痰喘者金沸草散加杏仁細辛五味子誤汗防己黃芪湯救之讝語獨語及直視遺尿者難治

夏月先傷濕而後傷暑名曰濕溫濕與熱搏兩脛逆冷甚則遍身亦冷胷滿頭痛壯熱自汗若再發汗令人嘔聾身變靑色不語名曰重暍必死治在心火肺土茯苓白朮湯濕勝溺澀便利者五苓散除濕湯臟滑者朮附湯暑勝壯熱二便澀者香薷散六合湯便閉渴讝白虎加蒼朮湯

風濕

先傷濕而後傷風風先上受濕先下受風濕相搏風在外而濕在內大汗則其氣暴而內邪不能出故風去而濕存濕流入裏則病重微汗則其氣緩而內外之邪俱去或濕證去而風證未去者不久自解寒熱身痛麻杏薏甘湯體痛發熱小便不利麻黃湯加蒼

朮肩背脊腰强痛者羌活勝濕湯腫痛微喘杏仁湯汗多漢防己湯虛者身重難以轉側桂枝湯加白朮身重昏迷自汗失音下利不禁者白通湯加白朮甘草身痛小便不利者甘草附子湯身重走痛者小續命湯去麻黃附子熱而重痛煩渴者敗毒散去柴胡人參加苦蔞小便自利及下利不止者死

寒濕

傷寒無汗寒濕相搏而有汗不能週身惟在頭耳身背強者表不利也證與風濕相似滲濕湯主之帶表五積交加散裏寒理中湯加附子寒多浮腫朮附湯妙

中濕

濕即水也東南窊下風雨襲虛山澤蒸氣人多中濕濕在經則日晡發熱鼻塞在關節則一身盡痛在臟腑則清濁混而大便濡泄小便反澀腹或脹滿濕熱相搏則遍身黃如熏色輕者面目微黃而已誤下則爲喘噦誤汗則發痓而死惟利小便爲佳五苓散除濕湯主之小便不利大便反快者甘草附子湯二便

利不發黃者术附湯身痛鼻塞者黃芪建中湯中氣堅滿癃閉者枳术湯加葶藶發黃見後

濕痺

痺者痛也太陽病脉沉而細關節煩疼皮膚麻木自汗者防己黃芪湯無汗者五積交加散主之然濕氣四時有之兼風兼熱兼寒者隨證加減

痓痙

太陽病純傷風純傷寒則不發痓惟先傷風而後又感寒或先傷風而後又感濕過汗俱能發痓重發太陽汗大發濕家汗皆能發痓外證寒熱類傷寒但脉沉遲弦細搖頭露眼口噤手足搐搦項強背反張如發癇終日不醒爲異風性勁爲剛痓因重感寒或冷故無汗宜葛根湯加羌獨活防風濕性緩爲柔痓因先傷風故有汗宜桂枝湯加天花粉葛根其或痰塞氣盛則南星半夏白茯以消痰枳實陳皮紫蘇以順氣痰消氣順然後分剛柔治之通用小續命湯有熱去附子自汗去麻黃剛痓二三日仰面壯熱胷滿如結胷狀便閉脚踡臥不著席者大承氣湯下之輕者

敗毒散小柴胡湯柔痓二三日不瘥汗多厥冷筋脈拘急者附子防風湯時發時止危者附朮散又有剛柔不分之痓身熱譫語似剛微厥便滑似柔宜小續命湯加生附子有汗下後乍靜乍躁偏左眼左手足牽搐者少陽痓也小柴胡加防風又血虛之人及產後傷風過汗破傷風證發痓俱不可純作風治四物湯加防風或八物湯去茯苓加黃芪羌活防風救之凡痓脈如雨濺散出指外者立死又戴眼反折瘈瘲汗出如珠或反張離席一掌許小兒離席二指許者皆死風熱痰火虛痓見雜病

溫瘧

傷寒汗吐下後餘熱未淨重感於寒而變瘧或過經舊熱未解新感六淫之氣而變瘧皆曰溫瘧者俱先熱後寒故也寒多熱少或單寒者太陽邪變也柴胡桂薑湯熱多寒少或單熱骨節煩疼者陽明邪變也白虎湯加桂寒熱相等或先熱者少陽邪變也小柴胡湯渴者去半夏加天花粉知母寒熱大作戰慄汗出不散者太陽陽明合病也桂枝石膏湯服此後瘧

愈甚者三陽合病也恐傳入陰經急用桂枝黃芩湯如傳入陰分從卯至午發而嘔吐大便閉者大柴胡湯下之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣湯下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑者桃仁承氣湯微利之不敢下者梔子升麻湯傷寒與雜病瘧不同在此間有挾痰與食積嘔吐不食者二陳湯對金飲子尿澀煩渴或因瘴氣不伏水土者五苓散俱加黃芩柴胡此等瘧與雜病無大異日久勢發稍緩則截之痰飲在上膈欲吐不吐者瓜蒂赤小豆雄黃等分爲末水調五分服之以吐爲度或袪邪丸亦好久不愈者勝金丹老瘧丸以消之

霧露

陰脉緊者霧露濁邪中於下焦少陰之分故曰渾因表虛裏微遂使邪中於陰爲慄令人足脛逆冷便溺妄出或腹痛下利宜理中湯四逆湯熱藥以散其邪陽脉緊或帶濇者霧露清邪中於上焦太陽之分故曰潔令人發熱頭痛項强頸攣腰痛脛痠宜九味羌活湯加藁本或惡寒欲吐者藿香正氣散五積散仍

量加藁本

陰陽脉俱緊者上下二焦俱中邪也必吐利後脉不緊手足溫則愈若吐利後脉遲不食者脾胃虛而內停水飲也若脉陰陽俱緊口中氣出脣口乾燥踡臥足冷鼻涕出舌上胎滑勿妄治也又有陽病上行極而下陰病下行極而上上下必干中焦於是三焦溷亂內外氣塞以致口糜嗢噎下爲小便黃大便血凝如猪肝熱氣勝而脾胃不運榮衛凝滯則生瘡癰虛寒甚者脾胃獨弱下焦不約淸便下重臍築湫痛而死蓋臍爲生氣之源築痛乃生氣已絕

水證

水陰也寒也或因飲食生冷或洗浴過度內熱者得之卽自消爍內寒者得之卽自停畜傷寒表熱與水氣相合者發熱怔忡乾嘔喘嗽小腹滿小便不利小靑龍湯半表裏證但頭汗出身無大熱心下滿揉之汩汩有聲者謂之水結胷小半夏湯甚者大陷胷丸下之或傷寒厥而心下悸乾嘔飢逆者茯苓桂甘湯赤茯苓湯裏寒與水氣相合者四肢疼痛腹痛嘔泄

小便不利眞武湯甚則成癖脅鞕者十棗湯表裏俱見渴欲飲水水入卽吐者名曰水逆五苓散滲之若病在陽宜汗而反以水噀面閉熱肉上粟起欲飲水而不渴者單用文蛤爲末沸湯調服方寸匕流入皮膚浮腫者牡蠣澤瀉湯五苓散防己黃芪湯朮附湯選用

黃疸

經曰濕熱相交民病癉癉卽黃單陽而無陰也傷寒發黃雖不一皆因內熱而誤用溫藥或被火攻太甚或失汗下與滲以致陽明經中血熱而見眞色於肌膚謂之瘀熱發黃頭汗作渴小便不利色黃而明茵陳湯茵陳三物湯陶氏茵陳湯有濕熱鬱而發黃者身痛發熱色黃而晦茵陳五苓散有寒濕發黃者太陽病寒濕在裏發汗過多則寒去而濕在麻黃連軺赤小豆湯身痛鼻塞者急用後瓜蒂搐鼻法內服茵陳五苓散頭痛甚者神朮散加茵陳有中濕發黃者一身盡痛誤汗則眼目俱黃茵陳五苓散梔子蘗皮湯防己黃芪湯身體煩疼者麻黃湯加蒼朮有傷風

發黃者易饑鼻乾腹痛潮熱欬嗽小柴胡加茵陳如噦加茯苓甚者用大柴胡兼之往來寒熱者小柴胡加山梔茵陳有內傷中寒發黃者脾胃素虛或傷冷物停滯不散或嘔逆腹滿或大便自利理中湯加茵陳枳實靑皮腹脹食不敢飽欲作穀疸者五苓散有陰證發黃者四肢逆冷脉沉或陰盛發躁四逆湯有結胷發黃者心胷滿鞕按之痛不可近大陷胷湯有痞氣發黃者心下滿鞕按之不痛半夏瀉心湯已上並加茵陳則痞結消而黃自愈大抵發黃與治濕相似輕則滲利和解重則大下水利黃自退矣但寸口無脉鼻氣冷爲不治形變煙熏黑色搖頭直視環口黧黑柔汗發黃脾臟氣絕也凡初發黃先以口含水用瓜蔕末一字搐入鼻中吐出黃水內服茵陳五苓散或酒蒸黃連丸外用生薑同茵陳搗爛遍身擦之諸發黃皆小便不利惟瘀血發黃小便自利且瘀血與瘀熱外證俱頭汗作渴脉浮數但熱結下焦則熱耗津液而小便不利血結下焦則熱但耗血而不耗津液故小便自利治詳血門

冒風

肺主皮毛通膀胱最易感冒新欬嗽惡風鼻塞聲重噴嚔是也柴胡半夏湯參蘇飲寒月麻黃杏仁飲重者頭疼身痛寒熱咽乾音啞柴胡桂枝湯防風沖和湯頭痛甚者川芎茶調散痰多者金沸草散挾熱人參敗毒散升麻葛根湯挾寒十神湯挾寒濕消風百解散挾濕神朮散挾暑香葛湯時行柴胡升麻湯

服食過厚素有痰火時常鼻塞流涕聲重欬嗽略被外感則甚者防風通聖散或大黃黃芩等分爲丸白水下素虛者只用防風羌活川芎隨宜加入補藥痰藥中傷食加白朮陳皮青皮山樝麥芽挾形寒飲冷加薑桂挾房勞加參朮歸地挾勞役傷氣者補中益氣湯加羌活防風風虛甚者羌活丸加味烏金丸風中傳裏一同傷寒治法

風能燥血散氣故古用桂附八物等湯久不愈者只宜三白湯加減斂之切忌疎泄雖初起非寒月無汗麻黃禁用

趙獻可醫貫

論傷寒

傷寒專祖仲景凡讀仲景書須將傷寒與中寒分爲兩門始易以通曉爲因年久殘缺補遺註釋者又多失次錯悞幸歷代考證者漸明逮陶節庵六書吳綬蘊要二書刊行而傷寒之理始著余於至理未暇詳辨先將傷寒中寒逐一辨明庶不使陰陽二證混亂夫傷寒治之得其綱領不難也若求之多岐則支離矣先以陽證言之夫既云傷寒則寒邪自外入內而傷之也其入則有淺深次第自表達裏先皮毛次肌肉又次筋骨腸胃此其漸入之勢然也若夫風寒之初入必先太陽寒水之經便有惡風惡寒頭痛脊痛之證寒鬱皮毛是爲表證若在他經則無此證矣脉若浮緊無汗爲傷寒以麻黃湯發之得汗爲解浮緩有汗爲傷風用桂枝湯散邪汗止爲解若無頭疼惡寒脉又不浮此爲表證罷而在中中者何表裏之間也乃陽明少陽之分脉不浮不沉在乎肌肉之間謂皮膚之下也然有二焉若微洪而長卽陽明脉也外證鼻乾不眠用葛根湯以解肌脉弦而數少陽脉也

其證脅痛耳聾寒熱往來而口苦以小柴胡湯和之蓋陽明少陽不從標本從乎中治也若有一毫惡寒尚在表雖入中還當兼散邪過此而邪入裏爲實熱脉不浮不沉沉則按之筋骨之間方是若脉沉實有力外證不惡風寒而反惡熱譫語大渴六七日不大便明其熱入裏而腸胃燥實也輕則大柴胡湯重則三承氣湯大便通而熱愈矣又以陰證言之若初起便怕寒手足厥冷或戰慄踡臥不渴兼之腹痛嘔吐泄瀉或口出涎沫面如刀刮不發熱而脉沉遲無力此爲陰證不從陽經傳入熱證治例更當看外證如何輕則理中湯重則薑附湯四逆湯以溫之由此觀之可見傷寒者由皮毛而後入臟腑初雖惡寒發熱而終爲熱證其人必素有火者中寒者直入臟腑始終惡寒而並無發熱等證其人必無火者一則發表攻裏一則溫中散寒兩門判然明白何致混雜於中而使後人疑悞耶

寒傷榮風傷衛衛陽也風亦陽也陽從陽之類故風能傷衛榮陰也寒亦陰也陰從陰之類故寒能傷榮

辛甘發散爲陽風宜辛散寒宜甘發桂枝辛而熱者故能發散衞中之風邪麻黄甘而熱者故能發散榮中之寒邪又桂枝麻黄氣味俱輕陽中之陽故能入太陽經散皮膚間之風寒也此二方者乃治冬月正傷寒之的方霜降後至春分前此時太陽寒水用事房勞辛苦之人其太陽寒水之氣乘虛而入客於太陽經同氣相求故易以傷也仲景特以殺氣最重故詳言之其餘時月則無傷寒則二方不可用也活人言頭痛如破者連鬚葱白湯不可便與升麻葛根湯恐太陽流入陽明是太陽邪氣引入陽明不能解也未至少陽者不可便與柴胡湯

太陽經表之表也行身之背陽明經表之裏也行身之前少陽經半表半裏也行乎兩脅之旁過此則太陰少陰厥陰俱入臟而爲裏

大凡傷寒之證邪熱傳裏結實須看熱氣淺深用藥今之醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一概用大黄芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷者

則痞滿燥實堅俱全宜大承氣湯厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥實堅三證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳實厚朴恐傷上焦元氣調胃之名由此立矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒硝不傷下焦眞陰謂不伐其根本之法也若夫大柴胡則有表證尚未除而裏證又急不得不下者只可以此湯通表裏而緩治之尤有老弱及血氣兩虛之人不宜用此故經云轉藥孰緊有芒硝者緊也大承氣最緊小承氣次之大柴胡又次之其大柴胡加芒硝方爲轉藥蓋爲病輕者設也仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯藥切不可用丸藥不可不知如欲用此三方須以手按病人自胷至小腹果有硬處手不可近方敢下手然至妙處尤須辨舌胎燥滑若何此金鏡錄三十六舌不可不細玩也

初病無熱便四肢厥冷或胷腹中滿或嘔吐腹滿痛下利脈細無力此自陰經受寒卽眞陰證非從陽經

傳來便宜溫之不宜少緩經云發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也治宜四逆湯腹滿腹痛皆陰證只有微甚不同治難一槩腹痛不大便桂枝芍藥湯腹痛甚桂枝大黃湯若自利腹痛小便清白宜溫中理中四逆看微甚用輕者五積散重者四逆湯無脈者通脈四逆湯使陰退而陽復也

陰毒病手足指甲皆青脈沉細而急者四逆湯無脈者通脈四逆湯陰毒甘草湯臍中葱熨氣海關元著艾可灸二三百壯乃用溫和補氣之藥通其內外以復陽氣若俱不效死證也此屬眞陰證人皆知之至於反常則不易曉有發熱面赤煩躁揭去衣被飲冷脈大誤認爲陽證投寒藥死者多矣必須憑脈下藥不問浮沉但指下無力按至筋骨全無力者必有伏陰不可與凉藥若曾已服過凉藥脈必鼓指而有力脈又難憑矣若一應茶湯及寒熱藥俱吐者此陰盛格陽急用白通湯加人尿猪膽汁以通拒格之寒所以仲景傷寒論中傳經與直中並論者正謂有陽證似陰陰證似陽所宜詳辨但年久散亂後人誤相補

集致使不明如太陽證頭痛發熱脈當浮而反沉又似少陰矣故用麻黃附子細辛湯如少陰證脈沉應無熱而反發熱者又似太陽矣須用乾薑附子甘草湯如陰證四肢厥逆而陽證亦有厥逆者此四逆湯與四逆散不同又如陰證下利而陽證又有漏底者此理中湯與黃龍湯不同若此之類疑似難明幸陶節庵六書已分明矣予又有說焉若讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人多矣讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而殺人多矣讀丹溪書而不讀薛氏書則眞陰眞陽不明而殺人亦多矣東垣曰邪之所湊其氣必虛世間內傷者多外感者間而有之此一間字當作五百年間出之間甚言其無外感也東垣脾胃論與夫內感外傷辨深明饑飽勞逸發熱等證俱是內傷悉類傷寒切戒汗下以爲內傷多外感少只須溫補不必發散外感多而內傷少溫補中少加發散以補中益氣湯一方加減出入如內傷兼傷寒者以本方加麻黃兼傷風者本方加桂枝兼傷暑者本方加黃連兼傷濕者本方加羌活實萬世

無窮之利東垣特發明陽虛發熱之一門也然世間眞陰虛而發熱者十之六七亦與傷寒無異反不及論何哉今之人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷寒之書法已窮奈何豈知丹溪發明之外尚有不盡之旨乎予常於陰虛發熱者見其大熱面赤口渴煩躁與六味地黃大劑一服卽愈如見下部惡寒足冷上部渴甚躁極或欲飲而反吐卽以六味湯中加肉桂五味甚則加附子冷飲下嚥卽愈予常以此活人多矣敢以私祕乎因製補天要論一卷以補前人之不逮所望於高明者再加裁奪幸甚幸甚且舉傷寒口渴一證言之邪熱入於胃腑消耗津液故渴恐胃汁乾急下之以存津液其次者但云欲飲水者不可不與不可多與並無治法縱有治者徒知以芩連梔蘗麥冬五味天花粉甚則石膏知母以止渴此皆有形之水以沃無形之火安能滋腎中之眞陰乎若以六味地黃大劑服之其渴立愈何至傳至少陰而成燥實堅之證乎既成燥實堅之證仲景不得已而以承氣湯下之此權宜之霸術然諄諄有

虛人老弱人之禁故以大柴胡代之陶氏以六一順氣湯代之豈以二湯爲平易乎代之而愈所喪亦多矣况不愈者十之八九哉當時若多用六味地黃飲子大劑服之取效雖緩其益無窮况陰虛發熱者小便必少大便必實其上證口渴煩躁與傷寒無異彼之承氣者不過因亢則害下之以承眞陰之氣也予今直探其眞陰之源而補之如亢旱而甘霖一施土木皆濡頃刻爲清凉世界矣何不可哉况腎水既虛矣復經一下之後萬無可生之理愼之愼之吾爲此懼故於補天要論中詳言陶節庵亦悟此理有云自氣而至血血而復之氣者大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血者生地黃黃連主之二者俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石膏湯相表裏是皆三焦包絡虛火之用也病既危急只得以此湯降血中之火陶公以血爲陰故有此論惜乎其不識眞陰眞陽之至理也

合而言之眞知其爲陽虛也則用補中益氣湯眞知其爲陽虛直中也則用附子理中湯眞知其爲陰虛

也則用六味腎氣湯眞知其爲陰虛無火也則用八味腎氣湯其間有似陰似陽之假證也則用寒因熱用之法從之不可少誤惟以補正爲主不可攻邪正氣得力自然推出寒邪汗出而愈攻之一字仁人之所惡也百戰百勝戰之善者也不戰而屈人之兵善之善者也故曰善戰者服上刑

溫病論

夫傷寒二字蓋冬時嚴寒而成殺厲之氣觸冒之而卽時病者乃名傷寒不卽發者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極重於溫也旣變爲溫則不得復言其爲寒不惡寒而渴者是也此仲景經文也其麻黃桂枝爲卽病之傷寒設與溫熱何與受病之源雖同所發之時則異仲景治之當別有方緣皆遺失而無徵是以各家議論紛紛至今未明也劉守眞謂欲用麻黃桂枝必加凉藥於其中以免發黃之病張子和六神通解散以石膏寒藥中加麻黃蒼朮皆非也蓋麻黃桂枝辛熱乃冬月表散寒邪所宜之藥不宜用於春夏之時陶氏欲以九味羌

活湯謂一方可代三方亦非也羌活湯易老所制之方乃治感四時不正之氣如春宜溫而反寒夏宜熱而反溫秋宜涼而反熱冬宜寒而反溫又有春夏秋三時爲暴寒所折雖有惡寒發熱之證不若冬時肅殺之氣爲甚故不必麻黃桂枝以散寒惟宜辛涼之藥通內外而解之況此方須按六經加減之法不可全用也不若逍遙散爲尤妙眞可一方代三方也然則欲治溫者將如何余有一法請申而明之經曰不惡寒而渴者是也不惡寒則知其表無寒邪矣曰渴則知腎水乾枯矣蓋緣其人素有火者冬時觸冒寒氣雖傷而亦不甚惟其有火在內寒亦不能深入所以不即發而寒氣伏藏於肌膚自冬至三四月歷時旣久火爲寒鬱於中亦久將腎水熬煎枯竭蓋甲木陽木也藉癸水而生腎水旣枯至此時強木旺無以爲發生滋潤之本故發熱而渴非有所感冒也海藏謂新邪喚出舊邪非也若復有所感表又當惡寒矣余以六味地黃滋其水以柴胡辛涼之藥舒其木隨手而應此方活人多矣予又因此而推廣之凡冬時

傷寒者亦是鬱火證若其人無火則爲直中矣惟其有火故由皮毛而肌肉肌肉而腑臟今人皆曰寒邪傳裏寒變爲熱既曰寒邪何故入內而反爲熱又何爲而能變熱耶不知即是本身中之火爲寒所鬱而不得泄一步反歸一步日久則純熱而無寒矣所以用三黃解毒解其火也升麻葛根即火鬱發之也三承氣即土鬱則奪之也小柴胡湯木鬱達之也此理甚簡而易只多了傳經六經諸語支離多岐凡雜證有發熱者皆有頭疼項強目痛鼻乾脅痛口苦等證何必拘爲傷寒局傷寒方以治之也余於冬月正傷寒獨麻黄桂枝二方作寒鬱治其餘不惡寒者俱作鬱火治此不佞之創論也聞之者孰不駭然吐舌及閱虞天民醫學正傳傷寒篇云有至人傳曰傳經傷寒是鬱病余見之不覺竊喜以爲先得我心之同然及考之內經帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰寒氣外凝內鬱之理腠理堅緻元府閉密則氣不宣通濕氣內結中外相薄寒盛熱生故人傷於寒轉而爲熱汗之則愈則外凝內鬱之理可知觀此而余以

傷寒爲鬱火者不爲無據矣故特著鬱論一篇

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十一卷目錄

醫部彙考三百五十一

傷寒門十七

李中梓醫宗必讀（總論 傷寒十四證 類傷寒五證 表證 裏證 陰證 陽證 六經證治 可汗 不可汗 可吐 不可吐 可下 不可下 用火法 用水法 發熱 惡寒 惡風 自汗 頭痛 大身痛 筋惕肉瞤 胷脅滿 結胷 痞腹滿 少腹滿 腹痛 咽痛 脅痛 呃逆 嘔吐 噦 欬嗽 喘 煩躁 懊憹 戰慄脣 渴 口燥咽乾 漱水不欲嚥 發狂 讝語 自利 鬱冒 瘈瘲 動氣 剛痓）

柔痙　手足厥逆　頭眩　衄血　吐血　畜
血　下血　小便不利　小便自利　小便數
發黃　發斑　狐惑　多眠　不得眠　短
氣　蚘厥　百合病　陰陽易　勞復　食復
過經不解　汗後不解　下後不解　合病
併病　兩感　舌胎　瘥後昏沉　傷風
傷寒死候　脈候

藝術典第三百七十一卷

醫部彙考三百五十一

傷寒門十七

明李中梓醫宗必讀

總論

愚按冬之氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞爾形毋搖爾神形神竝守偕行於閉蟄封藏之本者也一有不謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月即發名正傷寒伏而不發至春變溫至夏

變熱變態不測殊可憂虞治之或差生殺反掌自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶節庵曰得其要領易於拾芥脈證與理而已求之多岐則支離繁碎如涉海問津矣脈證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其常通其變也多岐者蔓衍之方書也余有感於斯言約六法以盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散寒勝之時陰勝之臟陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛凉一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可凉但宜平用期於解表而已吐者治在上也吐中有發散之意可去胷中之實經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍緩但見痞實者攻之更緩或行畜血或逐停水輕重緩急隨證靈通也溫者溫其中也臟有寒邪不溫則死夫氣爲陽氣虛則寒故溫卽是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本

非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳今人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可憾已如屢散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不退陰不足也人知寒凉可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除溫中則寒自散此必見衰微之陰脈者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知繹其義夫正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈證之陽者假實也脈之陰者眞虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用藥至爲穩當不論浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰然則沉小者人知爲陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實而病者攻之卽愈雖不服藥經盡則安何足慮也所可慮者惟挾虛耳奈何庸淺之輩不察虛

實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇東垣丹溪節庵亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也而謂傷寒無補法可乎夫實者不藥可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者卽握傷寒之要矣又何必求之多岐也哉

傷寒十四證

傷寒者寒傷營血脉浮而緊頭痛發熱無汗惡寒

傷風者風傷衛氣脉浮而緩頭痛發熱有汗惡風

傷寒見風者旣傷於寒復感風邪惡寒不躁其脉浮緩

傷風見寒者旣傷於風復感寒邪惡風煩躁其脉浮緊以上四證皆冬月卽病者

溫病者冬受寒邪來春乃發發熱頭疼不惡寒而渴脉浮數

溫瘧者冬受寒邪復感春寒

風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱自汗身重嘿

嘿欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮

溫疫者冬受寒邪復感春溫時行之氣

溫毒者冬受寒邪春令早熱復感其邪以上五證皆冬傷於寒而病發於春皆有溫之名也

熱病者冬傷於寒至夏乃發頭疼身熱惡寒其脈洪盛

傷暑者暑熱爲邪自汗煩渴身熱脈虛

傷濕者感受濕邪身重而痛自汗身不甚熱兩脛逆冷四肢沉重胷腹滿悶

風濕者旣受濕氣復感風邪肢體重痛額汗脈浮

痓者身熱足寒頭項強急面赤目赤口噤頭搖角弓反張若先受風邪復感於寒無汗惡寒爲剛痓先受風邪復感於濕惡風有汗爲柔痓

類傷寒五證

一曰痰中脘停痰憎寒發熱自汗胷滿但頭不痛項不強與傷寒異耳一曰食積胃中停食發熱頭痛但身不痛氣口緊盛與傷寒異耳一曰虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒

異耳一日脚氣足受寒濕頭痛身熱肢節痛便閉嘔逆但脚痛或腫滿或枯細與傷寒異耳一日內癰脈浮數當發熱而惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也胷中痛而欬脈數咽乾不渴濁唾腥臭肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮甲錯腹皮腫急脈滑而數腸癰也胃脘痛手不可近胃脈細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而悞認傷寒者禁其飲食必死

表證

發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胷脅痛耳聾寒熱嘔脈浮而大或緊或緩有汗脈浮緩無力表虛也無汗脈浮緊表實也

裏證

不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞕滿大便不通腹痛腹鳴自利小便如常讝語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿囊縮而厥脣青舌卷脈沉細或沉實若腹鳴自利不渴脣青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脈沉微裏虛也腹中鞕大便閉讝語潮熱腹痛不惡寒反惡

熱掌心腋下有汗咽燥裏實也表裏俱見屬半表半裏表裏俱無不可汗下小柴胡湯隨證加減

陰證

身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入二便不禁面如刀割色青黑或喜向壁臥閉目不欲見人鼻氣自冷脣口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡黃大便不實手重按無大熱若陰重者冷透手也

陰毒者腎本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六脈沉微或尺衰寸盛五日可治六七日不可治

陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脈浮微手足冷大便泄小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛於內眞陽失守也

陽證

身動氣高而喘目睛了了呼吸能往來口鼻氣熱

面赤脣紅口乾舌燥讝語能飲凉水身輕如常小便赤大便閉手足溫指甲紅

陽毒者邪熱深重失汗失下或誤服熱藥熱毒散漫舌卷焦黑鼻中如烟煤咽喉痛甚身面錦斑狂言直視踰垣上屋登高而歌棄衣而走脉洪大滑促五日可治六七日不可治或昏噤咬牙見鬼神吐膿血藥入卽吐

陽證似陰者手足冷大便閉小便赤煩悶昏迷不眠身寒却不欲衣口渴指甲紅脉沉滑或四肢厥冷此陽極於內眞陰失守也陰厥脉沉弱指甲青而冷陽厥脉沉滑指甲紅而溫

六經證治

足太陽膀胱此經從頭項貫腰脊故頭痛惡寒發熱脊強然風與寒常相因寒則傷營惡寒頭痛脉浮緊而無汗用麻黃湯開發腠理以散寒得汗而愈風則傷衛惡風頭痛脉浮緩而有汗用桂枝湯充塞腠理以散風止汗而愈若夫風寒兼受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠密非辛溫不能發散故

宜用也若春溫夏熱之證皆用羌活沖和湯辛凉解之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯升麻湯治之然此經有在經在腑之別如目痛鼻乾微惡寒身熱脉浮洪病在經也潮熱自汗讝語發渴大便閉揭去衣被手揚足擲發斑發黃狂亂惡熱脉沉數病在腑也傳至少陽則寒熱而嘔胷痛脅痛口苦耳聾此爲半表半裏之經表證多者小柴胡湯裏證急者大柴胡湯過此不已則傳陽明之腑表證悉罷名爲入裏惡熱讝語口燥咽乾不大便脉沉實如痞滿燥實四證皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見痞燥實三證邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳朴恐傷上焦之氣也但見痞實二證邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂喜忘畜血證也宜桃仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腹痛吐瀉口吐冷涎畏寒戰慄面如刀割引衣踡臥脉見遲軟急宜溫之輕者理中湯重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名爲直中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證即與汗之一見裏證即

與下之一見虛寒卽與溫補但當以脈證爲據不可以日數爲拘也

可汗

頭痛項强肢節腰背俱強身疼拘急惡寒發熱無汗脈浮數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脈浮須再汗之

不可汗

無表證者不可汗脈沉不可汗尺脈遲不可汗脈微弱者雖惡寒不可汗咽中閉塞者不可汗諸動氣者不可汗淋家不可汗亡血虛家不可汗厥者不可汗汗家不可重汗太陽與少陽併病頭項强痛或眩冒心下痞不可汗脈弦細頭痛而熱屬少陽不可汗

可吐

病在膈上者可吐汗下後虛煩懊憹者可吐

不可吐

脈虛者不可吐厥逆者不可吐膈上寒乾嘔者宜溫不宜吐

可下

汗後不解邪傳胃腑可下潮熱腹痛脈實者可下陽明多汗讝語有燥糞可下潮熱手足腋下汗出讝語者可下吐後腹滿者可下凡臍腹硬或痛不可按者可下下後不解臍腹硬痛者可再下結胷脈不浮可下少陰病下利清水色青者心下必痛口乾者可下太陽證熱結膀胱小便不利小腹急結其人如狂者畜血也可下陽明證其人喜忘大便黑必有瘀血可下陽明無汗小便不利心中懊憹必發黃可下

不可下

表未解者不可下腹脹可按而減者不可下諸虛者不可下陽微者不可下咽中閉塞者不可下諸動氣者不可下脈弱者不可下脈浮大者不可下小便清白者不可下陽明病面赤心下雖鞕滿不可下

用火法

以火燒地布桃葉柏葉亦可設席置病人於上卽汗出或酢炒香附熱熨胷背卽汗或置火於牀下或艾灸

用水法

傷寒思飲水爲欲愈若不與則不愈若恣飲則水停宜以新汲水少與之待再思再與熱甚者以青布浸新汲水中置病人胷前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口若表未解及陰證似陽者忌之

發熱

翕翕而熱者表也羌活沖和湯蒸蒸而熱者裏也輕者大柴胡湯重者承氣湯半表半裏者表裏俱熱而輕於純在裏也小柴胡湯至於三陰發熱則有腹痛肢冷脉沉下利爲異四逆湯潮熱屬陽明一日一發日晡而作陽明内實也大便鞕者承氣湯表未罷者小柴胡湯煩熱兼渴者竹葉石膏湯心煩不眠酸棗仁湯煩而心悸小建中湯煩而悶者梔子豉湯熱者白虎湯寒者附子湯

惡寒

不見風亦惡寒身雖熱不欲去衣被也發熱惡寒者陽也羌活沖和湯無熱惡寒者陰也理中湯下證悉具微惡寒者表未解也先解表而後攻裏下後不解發熱而渴惡寒白虎湯惡寒而嘔心下痞者五苓散

汗後惡寒虛也芍藥附子甘草湯背惡寒表未解也葛根湯背惡寒而潮熱柴胡加桂湯口渴心煩背微惡寒白虎加人參湯背惡寒潮熱腹痛小承氣湯少陰病口中和背惡寒附子湯汗後不解反背惡寒者虛也芍藥甘草附子湯

惡風

見風則惡密室中則無所惡也太陽惡風無汗而喘麻黃湯有汗桂枝湯吐下後不解表裏俱熱時時惡風燥渴而煩白虎加人參湯汗多亡陽惡風者桂附湯

自汗

惡風寒者桂枝湯惡寒自汗表虛也小建中湯或黃芪建中湯自汗不惡風寒表證罷裏證實也承氣湯汗多小便利必津液竭大便雖鞕不可攻宜蜜導用蜜於銅器中微火煎稍凝攪之勿令焦內皂角末少許和之乘熱捻作棗子樣冷納穀道中欲大便急去之自汗而渴小便難五苓散汗多不止曰亡陽桂枝附子湯外用白朮藁本川芎白芷各一兩牡蠣粉米

粉各二兩細末紗囊周身撲之盜汗在半表半裏膽有熱也小柴胡湯頭汗者熱不得越陽氣上騰讝語承氣湯心下滿頭汗出水結胷也小半夏茯苓湯頭汗出齊頸而還發黃也茵陳五苓散頭汗出小便難者死手足汗大便燥讝語大承氣湯寒不能食小便不利水穀不分手足汗者理中湯

頭痛

太陰少陰有身熱而無頭痛厥陰有頭痛而無身熱若身熱又頭痛屬陽經也頭痛發熱無汗惡寒麻黃湯大便六七日不通頭痛有熱小便淸者不在裏仍在表也羌活沖和湯頭痛甚者必衄葛根葱白湯川芎石膏湯少陽頭痛小柴胡湯頭痛寒熱寸脉大痰厥也瓜蔕散厥陰頭痛嘔而吐沫吳茱萸湯厥陰頭痛脉微遲爲欲愈如不愈小建中湯陽明頭痛不惡寒微惡熱不大便調胃承氣湯

身痛

太陽脉浮身痛無汗麻黃湯陽明下證已見但身痛者表未解也麻黃湯發熱有汗身痛桂枝湯陽明脉

浮身痛葛根湯汗後脉沉遲身痛血虛也黃芪建中湯陰毒嘔逆下利身痛如被杖脣青面黑甘草四逆湯一身盡痛發熱惡寒面寒桂枝湯一身盡痛發熱面黃二便反利甘草附子湯一身盡痛發熱發黃頭汗出背強小便不利濕也茵陳五苓散一身盡痛發熱面黃熱結瘀血也抵當湯

筋惕肉瞤

汗多亡陽筋肉失養故惕惕瞤動瞤動兼肢冷者眞武湯輕者茯苓桂枝甘草白朮湯汗吐下後見此者先服防風白朮牡蠣湯次服小建中湯

胷脅滿

胷滿多表證葛根湯喘而胷滿麻黃杏仁石膏湯脅下痞鞕沖和湯去棗加牡蠣胷脅俱滿或鞕痛或嘔或不大便舌上白胎俱小柴胡湯邪在胷汗下之而煩熱梔子豉湯胷中痞鞕氣上衝喉塞也瓜蔕散陽明少陽合病下利身熱脅痛大柴胡湯汗後頭痛心痞脅滿十棗湯

結胷

病發於陽而反下之熱入裏因作結胷脉浮者先以小柴胡解表然後下之按之則痛小結胷也小陷胷湯不按亦痛大結胷也大陷胷湯懊憹躁渴實熱結胷也三黃瀉心湯血結胷者小腹滿小便不利抵當湯飲水不散水結胷也小半夏茯苓湯用陷胷等藥不效者枳實理中丸煩亂欲死宜水漬法凝雪湯漬布薄胷中熱除爲度

痞

滿而不痛病名曰痞病發於陰而反下之因作痞也輕者通用枳桔湯胷滿脉濡半夏瀉心湯手足溫按之濡關上浮者黃連瀉心湯乾嘔有水氣生薑瀉心湯下利腹鳴甘草瀉心湯胃寒欬逆理中湯關脉沉緊大柴胡湯

大腹滿

六七日不大便腹滿常痛者承氣湯腹滿時痛者桂枝芍藥湯腹滿吐食枳桔理中丸汗後脹滿厚朴半夏甘草人參湯腹滿漉漉有聲水與氣也半夏茯苓湯加桂枝

少腹滿

臍下滿也胷腹滿爲邪氣小腹滿爲有物小腹滿小便利畜血也重者桃仁承氣湯輕者犀角地黃湯小腹鞕滿小便自利發狂者抵當湯小腹滿手足厥冷眞武湯不結胷小腹滿按之痛冷結也灸關元穴

腹痛

陽邪痛者其痛不常陰寒痛者痛無休歇按而痛甚爲實按而痛減爲虛右關脈實腹痛便閉承氣湯下之早因而腹痛小建中湯陽脈濇陰脈弦腹痛瀉利建中湯或桂枝芍藥湯少陰厥逆或利而欬四逆加五味子乾薑湯厥陰小腹痛當歸四逆湯

咽痛

少陰證也不可汗不可下甘桔湯爲陰陽通用之藥脈陰陽俱緊主無汗有汗曰亡陽屬少陰當咽痛猪膚湯陽毒咽痛口瘡赤爛升麻六物湯或蜜浸黃連汁噙非時暴寒附於少陰之經脈弱咽痛必下利先用半夏桂甘湯次服四逆湯下利咽痛手足徹冷無熱證者理中湯

脅痛

往來寒熱脅痛胷痛小柴胡湯加茯苓身凉表證罷乾嘔脅痛有水也十棗湯

呃逆

仲景作欬逆即此證也切勿誤作咳脉微細呃逆胃寒也橘皮乾薑半夏生薑湯丁香柿蔕湯脉洪大而呃心火上奔肺不得納甘草瀉心湯服藥無效用齅法硫黃乳香等分爲末酒煎齅之失下呃逆大便實者小承氣湯

嘔吐噦

嘔者聲物俱出吐者無聲出物噦者有聲無物太陽陽明合病當自利若不利但嘔葛根加半夏湯少陽有嘔證小柴胡湯嘔而渴者猪苓湯五苓散先渴後嘔水停心下赤茯苓湯先嘔後渴此爲欲解當與水飲瘥後餘熱在胃而嘔者竹葉加薑汁湯太陽少陽合病自利而嘔黃芩半夏生薑湯寒厥嘔而不渴薑附湯嘔而發熱心下急微煩大柴胡湯胷中有熱胃中有邪陰陽不交腹痛欲吐黃連湯黃連加半夏生

薑湯三陽發熱而吐俱用小柴胡湯發熱六七日不解煩渴欲飲水入即吐五苓散虛熱少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯寒多而吐理中湯不飲而吐理中湯去朮加生薑汗下後胃虛冷吐乾薑黃連黃芩人參湯少陰吐者眞武湯去附子加生薑吐逆二便祕厥逆無脈大承氣湯心下有水氣乾嘔身熱微喘或自利小青龍湯不發熱不惡寒脅痛乾嘔十棗湯自汗頭痛乾嘔桂枝湯乾嘔自利黃芩半夏生薑湯裏寒外熱脈微欲絕乾嘔通脈四逆湯

欬嗽

有聲無痰曰欬有痰有聲曰嗽太陽證罷表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬小青龍湯太陽發熱欬嗽方同上太陽發熱嘔噦而欬小柴胡湯少陽寒熱往來欬嗽胷脅滿或泄利小柴胡去參棗加五味子乾薑少陰欬嗽眞武湯少陰腹痛小便不利四肢沉重欬嗽者水氣也眞武湯加五味子細辛乾薑

喘

太陽無汗而喘太陽陽明合病胷滿而喘俱麻黃湯

邪氣壅盛而喘雖汗而喘不已宜再發之麻黃杏子石膏湯誤下太陽利不止喘而有汗脉促葛根黃連黃芩湯太陽汗後飲多水停而喘小青龍去麻黃加杏仁小腹滿加茯苓太陽下之微喘表未解也桂枝湯加厚朴去杏仁水停心下腎氣乘心爲悸爲喘五苓散陰喘脉伏而逆理中湯四逆湯喘而氣促腹滿大柴胡湯

煩躁

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛無汗煩躁大青龍湯煩躁消渴辰砂五苓散下利欬嘔煩躁猪苓湯下利咽痛胷滿而煩猪膚湯自汗煩躁小便多芍藥甘草湯少陰心煩不臥黃連梔子湯少陰吐利手足厥冷煩躁欲死吳茱萸湯下後復發汗晝則煩躁夜則安靜不渴無熱乾薑附子甘草湯六七日無大熱陰盛格陽身冷脉細煩躁不飲水霹靂散陰躁欲坐井中薑附湯

懊憹

懊者煩惱憹者鬱悶比之煩躁殆有甚焉汗吐下後

虛煩不眠甚則懊憹梔子豉湯陽明脈浮咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱懊憹梔子豉湯陽明病下後懊憹有燥屎承氣湯短氣煩躁懊憹大陷胷湯陽明無汗小便不利懊憹發黃茵陳蒿湯

戰慄

戰者身動慄者鼓頷邪欲解也慄而不戰陰盛陽虛薑附四逆湯

悸

心中築築然動怔忡不安脈結代心悸炙甘草湯傷寒三四日心悸而煩小建中湯發汗過多心悸喜按桂枝甘草湯心神不寧怔忡不臥安神丸少陰病厥逆心下悸四逆散加桂飲水多而悸雖有他邪亦先治水茯苓甘草湯寒熱心悸小便不利心煩喜嘔小柴胡湯少陽發汗譫語悸動小柴胡湯

渴

或因熱耗津液或因汗下過多太陽脈弦而渴小柴胡加天花粉太陽表不解有水氣而渴小青龍去半夏加苦蔞湯脅下痛手足溫而渴小柴胡去半夏加

人參花粉厥陰病消渴氣上衝心茯苓白朮甘草桂枝四物湯汗下後寒熱胷脅滿小便不利頭汗心煩渴而不嘔柴胡桂枝乾薑湯太陽脉浮而渴桂枝湯脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯少陰下利欬而嘔渴煩不得眠猪苓湯汗多不可服汗吐下後六七日不解表裏俱熱惡風大渴白虎加人參湯汗後脉大而渴白虎加人參湯夏至左右虛煩而渴發熱不惡寒竹葉石膏湯小便不利而渴必發黃茵陳五苓散少陰自利而渴小便淸利下焦虛寒甘草乾薑湯心煩但欲寐或自利而渴少陰也理中湯陽明脉長而實有汗而渴承氣湯脉沉滑熱實煩躁而渴大陷胷湯

口燥咽乾

引飲曰渴不引飲曰燥乾少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脉弦小柴胡湯口乾脉浮緊微數白虎加人參湯陽明無大熱背惡寒口燥咽乾方同上少陰病二三日口燥咽乾急下之大承氣湯

漱水不欲嚥

此證屬陽明熱在經不在腑也陽明身熱頭痛脈微漱水不欲嚥必發衄犀角地黃湯不止茅花湯外證無寒熱漱水不欲嚥必發狂而衄血也桃仁承氣湯甚者抵當湯

發狂

熱毒在胃併於心神志不定而狂少臥不饑妄言笑登高而歌棄衣而走踰垣上屋六七日未得汗脈洪數面赤目脹大熱煩躁狂言欲走葶藶苦酒湯陽毒發狂斑斕譫語升麻湯火劫汗多亡陽煩躁驚狂金匱風引湯柴胡湯加龍骨牡蠣三陽熱極脈大身熱渴而狂黃連解毒湯甚者承氣湯汗吐下後虛者人參白虎湯加辰砂陽毒發狂眼赤脈洪口渴三黃石膏湯血上逆則喜忘血下畜則如狂輕者犀角地黃湯重者抵當湯脈弦長而狂調胃承氣湯陽勝陰絕發狂譫妄面赤咽痛發斑脈洪實或滑促宜酸苦之藥收陰抑陽大汗而解葶藶苦酒生艾湯

譫語

胃熱乘心神識昏冒妄言不休實則譫語虛則鄭聲

譫語者數數更端聲高脉實鄭聲者只將一事一語鄭重諄復聲低脉微極當明辨已發汗聲和譫語柴胡桂枝湯婦人經水適來熱入血室譫語小柴胡湯譫語不惡寒反惡熱白虎湯煩躁不眠白虎加梔子湯三陽合病腹滿身重口中不和面垢譫語遺尿脉滑實不可下白虎湯腹滿微喘口乾咽爛或不大便譫語是因火刧白虎湯身熱汗出胃實譫語或下利譫語調胃承氣湯下利譫語必有燥屎承氣湯譫語小便利大便實小腹滿手不可近爲瘀血抵當湯鄭聲脉微自利厥逆白通湯氣虛獨言脉細弱者理中湯

自利

太陽與陽明合病自利葛根湯嘔者加半夏太陽與少陽合病自利黃芩湯自利而渴屬少陰白虎湯自利下血蘗皮湯少陰腎虛客熱下利咽痛胷滿心煩猪膚湯協熱自利臍下必熱白頭翁湯溫毒下利膿血桃花湯下後脉數不解自利不止必協熱當便膿血犀角地黃湯自利不渴屬太陰理中湯自利清穀

脉微白通湯四逆湯自利腹寒痛手足冷理中湯或吳茱萸湯自利不止裏寒下脫桃花湯赤石脂禹餘糧湯

鬱冒

鬱結而氣不舒昏冒而神不清太陽誤下利不止復發汗表裏俱虛鬱冒漬形爲汗吐下後復發汗又與水噦而冒理中湯熱而鬱冒不得臥有燥屎調胃承氣湯

瘈瘲

熱極生風風主動故瘈瘲瘈則筋急而縮瘲則筋緩而伸或縮或伸動而不定汗出時蓋覆不周腰背手足搐搦牛蒡根湯脉浮數有風熱防風通聖散血不養筋大秦艽湯

動氣

臟氣不調肌膚間築築跳動隨臟所主而見於臍之左右上下獨不言當臍者脾爲中州以行四臟之津液左右上下皆不宜下何況中州其敢輕動乎此證須手探之切勿忽也四旁有動氣保命四氣散

剛痓柔痓

太陽中風重感寒濕而致也大發濕家汗則成痓新產血虛汗出傷風亦成痓傷寒頭痛汗出而嘔若汗之必發痓經曰身熱足寒頸項强急惡寒頭熱面赤背反張口噤脈沉細如發癇狀是也若先受風復感寒無汗惡寒爲剛痓先受風復感濕惡風有汗爲柔痓仰面開目爲陽合面閉目爲陰燥渴爲陽口中和爲陰脈浮緊數爲陽沉細濇爲陰陽痓易治陰痓難治通用小續命湯剛痓去附子柔痓去麻黃陰痓厥逆筋脈拘急汗多桂心白术散閉目合眼附子防風散胷滿口噤臥不著席咬牙攣急大承氣湯頭項强小腹滿小便不利五苓散風盛血燥防風當歸散

手足厥逆

四肢冷謂之四逆卽名爲厥也厥逆脈沉細踡臥惡寒引衣自覆不飲水下利清穀四逆湯脈不至者通脈四逆湯脈遲弱理中湯手足指微冷謂之清理中湯寒熱而厥面色不澤用綿衣包手足溫大汗而解急服五味子湯少陰病吐利厥逆煩躁欲死吳茱萸

湯厥而有熱黃芪人參建中湯厥而渴者白虎湯厥而悸先治其水茯苓甘草湯厥而惡熱不眠譫語白虎湯諸陽受氣於胷邪客則陽氣不施手足厥逆脉乍緊心滿而煩病在胷中當吐之瓜蔕散先發熱而後厥者手揚足擲煩躁飲水畏熱大便祕小便赤怫鬱大抵熱深厥亦深脉沉滑頭面有汗指甲溫皆伏熱也大小承氣湯

頭眩

上虛則眩也屬半表半裏表中陽虛目眩葛根湯風家多頭眩葛根湯口苦咽乾頭眩小柴胡湯陽明頭眩不惡寒能食而欬茯苓白朮甘草乾薑湯太陽病發汗汗不止眩冒身瞤動振振欲擗地眞武湯

衄血

鼻血出也太陽病衄血及服桂枝後衄者爲欲解犀角地黃湯脉浮大發熱下利鼻衄乾嘔黃芩芍藥湯衄煩渴欲飲水水入卽吐先服五苓散次服竹葉石膏湯自利而衄麻黃升麻湯少陰病但厥無汗而强發之必衄名下厥上竭爲難治當歸四逆湯黑錫丹

汗後熱退鼻血不止新汲井水草紙數層貼項上及項脊溫則易必止

吐血

當汗不汗熱毒深入故吐血內有瘀積桃仁承氣湯抵當湯服桂枝後吐血犀角地黃湯或柏枝湯血紫黑成塊脈遲細口不渴小便清理中湯加丹皮

畜血

太陽病不解熱結膀胱發狂血自下桂枝湯熱在下焦少腹急滿小便自利其人如狂桃仁承氣湯抵當湯

下血

太陽病不解其人如狂熱結膀胱血自下者愈若不愈桂枝湯小腹急滿抵當湯少陰下血桃花湯腹滿身熱下膿血黃連阿膠湯地榆散

小便不利

已汗復下小便不利心煩小柴胡湯太陽汗後脈浮小便不利微熱而渴五苓散身黃小便不利腹微滿者茵陳蒿湯小便不利大便乍難乍易微熱有燥屎

也承氣湯潮熱大便泄小便不利柴苓湯風濕自汗身重小便不利甘草附子湯熱鬱不通田螺搗朴硝少加麝如泥貼臍上寒鬱不通炒鹽熨臍下

小便自利

太陽病小便自利以飲水多心下悸桂枝茯苓甘草湯身黃小便當不利今反自利其人如狂下焦畜血抵當湯熱而小腹滿應小便不利今反自利畜血也抵當丸二便俱利脈沉遲四逆湯

小便數

頻來而短少也太陽汗吐後小便數譫語調胃承氣湯太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒小便數甘草乾薑湯芍藥甘草湯

發黃

發熱一身盡痛面目俱黃太陽中濕連翹赤小豆湯熱不去瘀血在裏而黃小便微利麻黃連翹赤小豆湯往來寒熱一身盡痛發黃小柴胡加梔子湯發熱頭汗渴欲飲水小便利大便快發黃五苓散加茵陳湯小便不利四肢沉重似瘧不欲飲茵陳五苓散傷

冷脈虛小便如常變爲陰黃理中加茵陳湯下之太過脾虛津竭飲水自傷此陰濕變黃茵陳茯苓湯茵陳四逆湯

發斑

熱甚傷血裏實表虛發爲斑也斑見紫黑者十死一生或陽證誤溫或當汗失汗當下失下或汗下未解或下早熱邪入胃或下遲熱留胃中皆發斑陽毒結熱舌卷焦黑鼻如烟煤狂言見鬼面赤錦斑陽毒升麻湯赤斑咽痛元參升麻湯表證多者防風通聖散去硝黃（已上皆消散）斑出咽痛猪膽雞子湯紫雪細細嚥之赤斑大青四物湯四物湯通用升麻湯犀角地黃湯黃連四物湯冬煖受邪至春發斑溫毒也黑膏化毒丹（已上皆解毒）溫毒煩渴便實腹痛赤斑承氣湯汗下虛極發斑白虎湯加人參白术

狐惑

失汗所致食少胃空蟲嚙五臟故唇口生瘡蟲食其臟則下唇生瘡爲惑蟲食其肛則上唇生瘡爲狐其候齒燥聲啞惡食面目乍赤乍白乍黑舌上白胎唇

黑四肢沉重喜眠清熱黃連犀角湯聲啞桃仁湯殺蟲雄黃銳散爲膏納穀道中

多眠

太陽病脈細多眠外已解也小柴胡湯尺寸沉細但欲寐者少陰證也四逆湯陽脈浮滑陰脈濡弱多汗或發汗後身猶灼熱喘息多眠風溫也葳蕤湯

不得眠

眠者安臥也吐下後不眠酸棗仁湯吐下後懊憹不眠梔子豉湯大熱嘔錯語不眠黃連解毒湯少陰病二三日已上心煩不眠黃連雞子湯太陽大汗胃乾不眠欲飲水者少少與之下後渴而不眠猪苓湯脈浮小便不利不眠五苓散下後復發汗不眠無表證脈沉乾薑附子湯

短氣

呼吸短促不能接續似喘而不搖肩似呻吟而無痛楚汗出不徹故短氣葛根加人參湯腹滿短氣邪在表爲虛甘草附子湯風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣甘草附子湯水停心下短氣五苓散

乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和十棗湯太陽下之早心下硬結胷短氣大陷胷湯

蚘厥

臟寒故食卽吐蚘也胃中虛冷理中丸或四逆湯仲景止用烏梅丸吐蚘而渴理中湯加大黃入蜜利之

百合病

似寒無寒似熱不熱欲食不食欲臥不臥欲行不行嘿嘿不知所苦如見鬼狀小便赤病後失調攻下非法故成百合病通用小柴胡湯加百合知母粳米生薑血熱百合地黃湯一月不解而渴百合一斤水二十碗漬一宿煑熱浴身

陰陽易

男病新瘥女與之交曰陽易女病新瘥男與之交曰陰易細考之卽女勞復也有謂男病愈後因交而女病女病愈後因交而男病於理未然古今未嘗見此證也證狀體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上冲胷頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急通用燒褌散取女人褌襠近陰處剪燒灰水調方寸匕日三服女

病用男裩新瘥後大虛因交復作垂死獨參湯調燒裩散多有用參至一二斤而愈者古用豭鼠糞湯寒者當歸白术湯

勞復

非但強力持重若梳沐微勞及七情皆復也脉虛者補中益氣湯麥門冬湯挾外證者則謂之復非爲勞也小柴胡湯

食復

新瘥胃虛食稍多則復羊肉及酒尤忌腹滿脉實煩熱便閉大柴胡湯輕者二陳湯加山楂麥芽砂仁神麴消導後熱不退補中益氣湯

過經不解

十二日當愈不愈則再傳是爲過經潮熱者實也先與小柴胡外已解加芒硝嘔微煩大柴胡湯過經譫語脉實當下調胃承氣湯

汗後不解

或表邪未盡或邪傳裏或邪氣乘虛內客汗後脉大如瘧狀再汗之麻黃湯汗後心下痞鞕嘔吐不和大

柴胡湯大汗大渴煩而脉大白虎加人參湯汗後惡熱脉實調胃承氣湯汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯太陽大汗出胃乾不眠欲飲水者少少與之若脉浮小便不利微熱消渴五苓散汗後脉洪數煩渴五苓散汗後脹滿厚朴生薑人參湯汗過多心悸發顫桂枝甘草湯汗後惡寒表虛也脉細神倦芍藥甘草附子湯太陽汗出不解發熱心悸肉瞤真武湯汗後身痛脉沉桂枝加芍藥人參湯汗後熱不去內拘急四肢疼下利惡寒四逆湯

汗後臍下悸欲作奔豚桂枝甘草大棗湯

下後不解

下後熱不去心中結痛梔子豉湯下後心煩腹滿臥起不安梔子厚朴湯太陽桂枝證誤下之利不止脉促喘而汗出表未解葛根湯黃連黃芩湯陽明下之心下懊憹梔子豉湯有燥屎大承氣湯太陽下後脉促胷滿桂枝芍藥湯大下後脉沉遲厥逆下利咽喉不利吐膿血難治麻黃升麻湯

合病

兩經三經齊病不傳者爲合病三陽合病腹滿身重口中不和譫語遺尿不可汗下白虎湯太陽陽明合病脉浮長大便鞕小便利脾約丸惡寒者升麻葛根湯不惡寒反惡熱大便通者白虎湯大便祕譫語者調胃承氣湯喘而胷滿不可下麻黄湯不下利但嘔者葛根加半夏湯太陽少陽合病脉浮弦脅下鞕往來寒熱小柴胡湯自下利者黄芩湯嘔者黄芩加半夏生薑湯少陽陽明合病脉弦長因發汗因利小便胃中燥實調胃承氣湯脉長自利者爲順滑而數者爲負有宿食大承氣湯負者尅賊也

併病

二經先病未盡又過一經之傳者爲併病始則二陽合病後則一陽病衰一陽邪盛歸併於一經二者皆併病也太陽陽明併病太陽病發汗不徹轉屬陽明續自微汗出不惡寒若面色怫鬱痛無常處是陽明復併歸太陽當再汗之麻黄湯太陽證未罷桂枝麻黄各半湯太陽證罷但見陽明證者下之大承氣湯太陽少陽併病頭痛太陽眩冒心下痞當刺肺俞肝

俞大椎愼勿下太陽不勝陽明不負不相尅爲順少陽脉勝陽明脉負鬼賊相尅爲逆

兩感

日傳二經陰陽俱病也表裏不可並攻陰陽難同一法故曰必死東垣以氣實而感之淺者猶或可治大羌活湯

舌胎

邪在表者舌上無胎半表半裏白胎而滑傳裏則乾燥熱深則黃熱極則黑也陽明病脅下鞕滿而喘發熱汗出不大便而嘔舌上白胎者小柴胡湯脉陰陽俱緊舌上胎滑小柴胡去半夏加人參苦蔞湯腹痛理中湯熱聚於胃則舌黃承氣湯舌純黑有二種皆死證也有火極似水者爲熱極大承氣湯有水來尅火者爲寒極脉證必寒附子理中湯七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風舌燥欲飲水數升白虎湯加人參

瘥後昏沉

因發汗不透餘毒在心胞絡也發汗出時蓋覆不周

則汗出不均腰背手足搐搦或冷或熱牛蒡根散瘥後腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散

傷風

按風爲陽邪善行數變其傷人也必從俞入俞皆在背故背常固密風弗能干已受風者常曝其背使之透熱則潛消嘿散經文所謂乘虛來犯固矣若其人素有痰熱壅遏於太陰陽明之經內有窠囊則風邪易於外束若爲之招引者然所謂風乘火勢火借風威互相鼓煽也治實之法秋冬與之辛溫春夏與之辛凉解其肌表從汗而散治虛之法固其衞氣兼解風邪若專與發散或汗多亡陽或屢痓屢發皆治之過也治風火之法辛凉外發甘苦內和勿與苦寒恐正不得伸邪不得解耳

傷寒死候

陽證見陰脈者死　陰陽毒過六七日者死　脈浮而滑身汗如油水漿不入喘息不休身體不仁者死

欬逆上氣脈散者死　陽反獨留體如煙熏直視搖頭心絕　汗出髮潤而喘肺絕　脣吻反青四肢

漐習肝絕　環口黧黑柔汗發黃脾絕　溲便遺失狂言目反直視者腎絕　脈緊盛汗出不解者死　尺寸俱虛熱不止者死　身熱喘急脈陽而躁者死　大發濕家汗則痓熱而痓者死　發少陽汗則譫語發少陰汗則動血謂之下厥上竭者死　發動氣汗者死　發風溫汗者死　發濕溫汗曰重暍死　汗後不爲汗衰謂之陰陽交者死　不得汗者死　發熱脈躁疾狂言不能食謂之三死　欬逆不止者死　臟結者死乃結胷證舌上白胎也　舌卷囊縮者死　脈代者死　少陰吐利煩躁四逆者死　結胷證悉具煩躁者死　發厥至七八日膚冷而躁無時暫安曰臟厥死　少陽與陽明合病脈長大而弦曰負者死　陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足攣痛離經脈見者死　厥而下利當不能食反能食者除中死　少陰病厥逆無脈與白通猪膽湯脈暴出者死　脈陰陽俱虛熱不止者死　七八日以上大發熱者死

脈候

浮濇而緊爲傷寒　浮而緊者表實可汗　浮而緩弱表虛宜救　沉數或疾滑或沉實裏實可下　沉細微遲軟裏虛可溫　中候數爲胃實　中候遲爲胃虛　寸口沉細無力爲陽中伏陰　尺部沉數有力爲陰中伏陽　寸部數大有力爲重陽　尺部遲細無力爲重陰　寸脈微細爲脫陽　尺部無力爲脫陰　寸脈弱者忌吐　尺脈弱者忌下　純弦之脈名曰負死脈也　陰病見陽脈者生浮數動滑大也　陽病見陰脈者死沉濇弱弦微結促濡緩緊遲芤散革代也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典
第三百七十二卷目錄
醫部彙考三百五十二
傷寒門十八

張介賓景岳全書　總名　初診法　論脈　風寒辨　傷寒三證　論六經證　傳經合病併病辨　陽證陰證辨　三陽陽明證　兩感　表裏辨　寒熱辨　論汗　論吐　論下　看目　舌色辨　飲水　三陽陰證辨　再論陰證陽證及李子建傷寒十勸之害　論傷寒古治法　論古法通變　麻黃桂枝辨　論今時皆合病併病

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六八五二

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十二卷目錄

醫部彙考三百五十二

傷寒門十八

張介賓景岳全書

總名　初診法　論脈　風寒辨　傷寒三證　六經證　傳經　合病併病辨　陽證陰證辨　三陽陽明證　兩感　表裏辨　寒熱辨　論汗　論吐　論下　看目　舌色辨　飲水　三陽陰證辨　再論陰證陽證及李子建傷寒十勸之害　論傷寒古治法　論古法通變　麻黃桂枝辨　論今時皆合病併病

藝術典第三百七十二卷

醫部彙考三百五十二

傷寒門十八

景岳全書（臣張介賓著）

總名

黃帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也又曰凡病傷寒而成溫者先夏至日爲病溫後夏至日爲病暑此皆內經之明言也故凡病溫病熱而因於外感者皆本於寒即今醫家皆謂之爲傷寒理宜然也近或有以

溫病熱病謂非眞傷寒者在未達其義耳

初診法

凡初診傷寒者以其寒從外入傷於表也寒邪自外而入必由淺漸深故先自皮毛次入經絡又次入筋骨而後及於臟腑則病日甚矣故凡病傷寒者初必發熱憎寒無汗以邪閉皮毛病在衞也漸至筋脉拘急頭背骨節疼痛以邪入經絡病在營也夫人之衞行脉外營行脉中今以寒邪居之則血氣混淆經絡壅滯故外證若此此所謂傷寒證也自此而漸至嘔吐不食脹滿等證則由外入內由經入腑皆可因證而察其表裏矣若或肌表無熱亦不憎寒身無疼痛脉不緊數者此其邪不在表病必屬裏凡察傷寒此其法也

論脉

傷寒之邪實無定體或入陽經氣分則太陽爲首或入陰經精分則少陰爲先其脉以浮緊而有力無力可知表之虛實沉緊而有力無力可知裏之虛實中而有力無力可知陰陽之凶吉診之之法當問證以

知其外察脉以知其內先病爲本後病爲標能參合脉證而知緩急先後者乃爲上工

診法曰浮脉爲在表故凡脉見浮緊而數者卽表邪也再加以頭項痛腰脊强等證此卽太陽經病當求本經輕重而解散之

脉見洪長有力而外兼陽明證者卽陽明在經之邪也宜求本經之寒熱以散之

脉見弦數而兼少陽之證者卽少陽經半表半裏之病宜和解而散之

沉脉爲在裏病屬三陰詳具後六經辨證中但沉數有力是卽熱邪傳裏也若表證深入而內見大滿大實陽邪熱結等證治當從下也

沉緊無力而外無大熱內無煩渴等病此陰證也若或畏寒厥冷及嘔吐腹痛瀉痢者此卽陰寒直中治宜溫中也

脉大者爲病進大因邪氣勝病日甚也脉漸緩者爲邪退緩則胃氣至病將愈也此以大爲病進固其然也然亦有宜大不宜大者又當詳辨如脉體本大而

再加洪數此則病進之脈不可當也如脈體本小因服藥後而漸見滑大有力者此自陰轉陽必將汗解乃爲吉兆蓋脈至不鼓者由氣虛而然無陽豈能作汗也

按浮爲在表沉爲在裏此古今相傳之法也然沉脈亦有表證此陰實陽虛寒勝者然也浮脈亦有裏證此陽實陰虛水虧者然也故凡欲察表邪者不宜單據浮沉只當以緊數與否爲辨方爲的確蓋寒邪在表脈皆緊數緊數甚者邪亦甚緊數微者邪亦微緊數浮洪有力者邪在陽分卽陽證也緊數浮沉無力者邪在陰分卽陰證也以緊數之脈而兼見表證者其爲外感無疑卽當治從解散然內傷之脈亦有緊數者但內傷之緊其來有漸外感之緊發於陡然以此辨之最爲切當其有似緊非緊但較之平昔稍見滑疾而不甚者亦有外感之證此其邪之輕者或以初感而未甚者亦多見此脈是又不可不兼證而察之也若其和緩而全無緊疾之意則脈雖浮大自非外邪之證

按陶節庵曰夫脉浮當汗脉沉當下固其宜也然其脉雖浮亦有可下者謂邪熱入腑大便難也設使大便不難豈敢下乎其脉雖沉亦有可汗者謂少陰病身有熱也設使身不發熱豈敢汗乎若此之說可見沉有表而浮亦有裏也

風寒辨

凡病傷寒者本由寒氣所傷而風卽寒之帥也但以風寒分氣令則風主春而東寒主冬而北以風寒分微甚則風屬陽而淺寒屬陰而深然風送寒來寒隨風入透骨侵肌本爲同氣故凡寒之淺者卽爲傷風風之深者卽爲傷寒而不淺不深半正半邪之間者卽爲瘧疾其有留於經絡而肢體疼痛者則爲風痹然則傷風也傷寒也瘧疾風痹也皆風寒之所爲也觀靈樞九宮八風篇及歲露論所載俱甚言虛邪賊風之爲害口問篇言風成爲寒熱此皆指風爲寒邪也卽如冬傷於寒者宜乎其爲傷寒也若春夏秋三時之感冒則孰非因寒亦孰非因風而入之故仲景曰凡傷寒之病多從風寒得之始因表中風寒入裏

則不消矣未有溫覆而尚不消散者豈非風寒本爲同氣乎內經曰謹候虛風而避之故聖人日避邪虛之道如避矢石然邪勿能害此之謂也此杜漸防微之道也

傷寒三證

夫傷寒爲病葢由冬令嚴寒以水冰地坼之時最多殺厲之氣人觸犯之而卽時病者是爲正傷寒此卽陰寒直中之證也然惟流離窮困之世多有之若時當治平民安飽煖則直中之病少見此傷寒之一也

其有冬時感寒不卽病者寒毒藏於營衛之間至春夏時又遇風寒則邪氣應時而動故在春則爲溫病在夏則爲暑病是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所傷故隨氣傳變本非卽病正傷寒之屬所當因其寒熱而隨證調治之此傷寒之二也

又有時行之氣者如春時應煖而反寒夏時應熱而反凉秋時應凉而反熱冬時應寒而反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者是卽時行之病感冒虛風不正之氣隨感隨發凡稟弱而

不愼起居多勞倦者多犯之此傷寒之三也凡此三者皆傷寒之屬但其病有不同治有深淺苟不能辨則必致悞人

六經證

成無己曰熱邪自太陽傳至太陰則腹滿而嗌乾未成渴也傳至少陰則口燥舌乾而渴未成消也傳至厥陰而成消渴者熱甚能消水故也凡飲水多而小便少者謂之消渴肝居下部而邪居之則木火相犯所以邪上撞心木邪乘土則脾氣受傷所以饑不欲食食即吐蚘脾土既傷而復下之則脾氣愈虛所以利不止

正陽明腑病者由表而傳裏由經而入腑也邪氣既深故爲潮熱自汗讝語發渴不惡寒反惡熱揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂五六日不大便脉滑而實此實熱已傳於內乃可下之若其脉弱無神或內無痞滿實堅等證又不可妄行攻下

太陽證似少陰者以其發熱惡寒而脉反沉也

少陰證似太陽者以其惡寒脉沉而反發熱也

仲景曰太陽病發熱頭痛脈反沉身體疼痛若不瘥者當救其裏宜四逆湯少陰病始得之反發熱脈沉者宜麻黃附子細辛湯按此二證謂在太陽其脈當浮而反沉者因正氣衰弱裏虛而然故當用四逆湯此裏虛不得不救也病在少陰證當無熱而反熱者因寒邪在表猶未傳裏故當用麻黃附子細辛湯此表邪不得不散也此二證者均屬脈沉發熱但其有頭疼故爲太陽病無頭疼故爲少陰病但在少陰而反發熱者以表邪浮淺可以汗解其反猶輕在太陽而反脈沉者以正氣衰微難施汗下其反爲重由此觀之可見陽經有當溫裏者故以生附配乾薑補中自有散意陰經有當發表者故以熟附配麻黃發中亦有補焉此仲景求本之治其他從可知矣

傳經合病併病辨

傷寒傳變不可以日數爲拘亦不可以次序爲拘如內經言一日太陽二日陽明三日少陽之類蓋言傳經之大槩非謂凡患傷寒者必皆如此也蓋寒邪中人本無定體觀陶節庵曰風寒之初中人也無常或

入於陰或入於陽非但始太陽終厥陰也或自太陽始日傳一經六日至厥陰邪氣衰不傳而愈者亦有不罷再傳者或有間經而傳者或有傳至二三經而止者或有始終只在一經者或有越經而傳者或有自少陽陽明而入者或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成眞陰證者所以凡治傷寒不可拘泥但見太陽證便治太陽但見少陰證便治少陰但見少陽陽明便治少陽陽明此活法也又有合病併病之證曰合病者兩經或三經齊病不傳者爲合病併病者一經先病未盡又過一經者爲併病所以有太陽陽明合病有太陽少陽合病有陽明少陽合病有三陽合病三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無合併例也卽仲景亦曰日數雖多但見表證而脉浮緊者猶宜汗之日數雖少但見裏證而脉沉實者猶宜下之誠爲不易之論故不可執定日數謂一二日宜發表三四日宜和解五六日宜下若或不知通變因致悞人者多矣故必眞知其表邪未解則當汗之眞知其胃邪已實方可下之眞知其陰寒邪勝自宜

溫之眞知其邪實正虛客主不敵必須補之但能因機察變原始要終而纖悉無遺者方是活人高手

陽證陰證辨

凡治傷寒須先辨陽證陰證若病自三陽不能解散而傳入三陰則寒鬱爲熱因成陽證蓋其初病必發熱頭痛脉浮緊無汗以漸而深乃入陰經此邪自陽分傳來愈深則愈熱雖在陰經亦陽證也其脉必沉實有力其證必煩熱熾盛此當攻裏或淸或下隨宜而用若內不有熱安得謂之陽證乎若初起本無發熱頭痛等證原不由陽經所傳而徑入陰分者其證或厥冷或嘔吐或腹痛瀉利或畏寒不渴或脉來沉弱無力此皆元陽元氣之不足乃爲眞正陰證經曰發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰此以傳經不傳經而論陰陽也陰陽之治又當辨其虛實如左

治傷寒凡陽證宜凉宜瀉陰證宜補宜溫此大法也但以經臟言陰陽則陰中本有陽證此傳經之熱邪也以脉證言陰陽則陽中最多陰證此似陽之虛邪

也惟陰中之陽者易辨而陽中之陰者爲難知耳如發熱狂躁口渴心煩喜冷飲水無度大便鞕小便赤喉痛口瘡聲粗氣急脈來滑實有力者此眞陽證也其有身雖熱而脈來微弱無力者此雖外證似陽實非陽證觀陶節庵曰凡發熱面赤煩躁揭去衣被脣口赤裂言語善惡不避親疎虛狂假斑脈大者人皆不識認作陽證殊不知陰證不分熱與不熱須憑脈下藥至爲切當不問脈之浮沉大小但指下無力重按全無便是陰脈不可與凉藥服之必死急與五積散逼解表裏之寒甚者必須加薑附以溫之又曰病自陽分傳入三陰者俱是脈沉妙在指下有力無力中分有力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒此節庵出人之見也然以余觀之大都似陽非陽之證不必謂其外熱煩躁微渴戴陽之類卽皆爲陰證也但見其元陽不足而氣虛於中雖有外熱卽假熱耳設用清凉消耗則中氣愈敗中氣既敗則邪氣愈强其能生乎故凡遇此等證候必當先其所急人知所急在病而不知所急在命元氣忽去疾如絕絃呼

吸變生挽無及矣

傷寒綱領惟陰陽爲最此而有悞必致殺人然有純陽證有純陰證是當定見分治也又有陰陽相半證如寒之卽陰勝熱之卽陽勝或今日見陰而明日見陽者有之今日見陽而明日變陰者亦有之其在常人最多此證盤珠膠柱惟明哲者之能辨也然以陰變陽者多吉以陽變陰者多凶是又不可不察

凡病人開目喜明欲見人多譚者屬陽閉目喜暗不欲見人懶言者屬陰

論曰陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死又曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡此陰陽乃以寒熱爲言也陽盛陰虛言內熱有餘而外寒不甚也夫邪必入腑然後作熱熱實於內卽陽盛也故再用溫熱以汗之則死矣陽虛陰盛言寒邪有餘而畜熱未深也夫邪中於表必因風寒寒束於外卽陰盛也故妄用沉寒以下之則死矣所以陽盛者用桂枝則斃陰盛者用承氣則亡

三陽陽明證

仲景曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實也少陽陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明內實大便難此名陽明也問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也按此三陽陽明之證皆自經傳腑胃家之實證也曰太陽陽明者邪自太陽傳入於胃其名脾約以其小便數大便鞕也正陽陽明者邪自陽明本經傳入於腑而邪實於胃也少陽陽明者邪自少陽傳入於胃也胃爲腑者猶府庫之府府之爲言聚也以胃本屬土爲萬物所歸邪入於胃則無所復傳鬱而爲熱此由耗亡津液胃中乾燥或三陽熱邪不解自經而腑熱結所成故邪入陽明胃腑者謂之實邪土氣爲邪王於未申所以日晡潮熱者屬陽明也論曰潮熱者實也是爲可下之證又曰潮熱者此外欲解也可攻其裏焉又曰其熱不潮不可與承氣此潮熱屬胃可知也然潮熱雖爲可攻若脉

浮而緊或小便難大便溏身熱無汗此熱邪未全入腑猶屬表證仍當和解若邪熱在表而妄攻之則禍不旋踵矣

兩感

病兩感於寒者一日則太陽與少陰表裏俱病凡頭痛發熱惡寒者邪在表口乾而渴者邪在裏二日則陽明與太陰表裏俱病身熱目痛鼻乾不眠者邪在表腹滿不欲食者邪在裏三日則少陽與厥陰表裏俱病耳聾脅痛寒熱而嘔者邪在表煩滿囊縮而厥水漿不入者邪在裏凡兩感者或三日或六日營衛不行臟腑不通昏不知人胃氣乃盡故當死也若此兩感雖爲危證然不忍坐視其於拯溺救焚之計所不可免但當細察其證亦自有緩急可辨若三陽之頭痛身熱耳聾脅痛惡寒而嘔此在表者不得不解於外其三陰之腹滿口渴囊縮讝語此在裏者不得不和其中若其邪自外入而外甚於裏者必當以外爲主治而兼調其內若其邪因虛襲而元氣不支者速宜單顧根本不可攻邪但使元陽不敗則强敵亦

將自解其庶幾乎有可望也此證變態非常故不可鑿言方治

門人錢禎曰兩感者本表裏之同病似若皆以外感爲言也而實有未必盡然者正以外內俱傷便是兩感今見有少陰先潰於內而太陽繼之於外者卽縱情肆慾之兩感也太陰受傷於裏而陽明重感於表者卽勞倦竭力飲食不調之兩感也厥陰氣逆於臟少陽復病於腑者卽七情不慎疲筋敗血之兩感也人知兩感爲傷寒而不知傷寒之兩感內外俱困病斯劇矣但傷有重輕醫有知不知則死生係之或謂兩感證之不多見者蓋亦見之不廣而義有未達耳其於治法亦在乎知其由而救其本也此言最切此病誠發人之未發深足指迷不可不錄

表裏辨

陽邪在表則表熱陰邪在表則表寒陽邪在裏則裏熱陰邪在裏則裏寒邪在半表半裏之間而無定處則往來寒熱

邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹痛

邪在表則呻吟不安邪在裏則躁煩悶亂

邪在表則能食邪在裏則不食不欲食者邪在於表裏之間未至於不能食也

邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔凡初見心煩喜嘔及胷膈漸生痞悶者邪在表方傳裏也不可攻下

凡病本在表外證悉具而脈反沉微者以元陽不足不能外達也但當救裏以助陽散陰爲上策

寒熱辨

邪氣在表發熱者表熱裏不熱也宜溫散之邪氣在裏發熱者裏熱甚而達於外也宜清之

陽不足則陰氣上入陽中而爲惡寒陰勝則寒也宜溫之陰不足則陽氣陷入陰中而爲發熱陽勝則熱也宜清之

寒熱往來者陰陽相爭陰勝則寒陽勝則熱也蓋熱爲陽寒爲陰表爲陽裏爲陰邪之客於表者爲寒邪與陽相爭則爲寒慄邪之傳於裏者爲熱邪與陰相爭則爲熱躁其邪在半表半裏之間者外與陽爭則

爲寒內與陰爭則爲熱或表或裏或出或入是以寒熱往來此半表半裏之證也故凡寒勝者必多寒熱勝者必多熱但審其寒熱之勢則可知邪氣之淺深也

論汗

按仲景表汗之條所用汗劑不曰麻黃則曰桂枝此寒邪初感溫散之妙法也今後人以麻黃桂枝爲異物而不敢用而復有强爲之釋者謂此在仲景乃爲隆冬直中陰寒者設耳不知四時陰勝之邪皆最宜者也嗚呼仲景之下再無仲景可見醫中之品矣

各經表證凡有汗出不徹者皆未足言汗葢邪未盡去其人必身熱不退而仍覺躁煩或四體痠疼坐臥有不安者以汗出不徹故也何從知之但診其脉緊不退及熱時乾燥無汗者即其證也仍宜汗之如果汗透而熱仍不退或汗後身熱愈甚者是即所謂陰陽交魂魄離大凶之兆也

凡汗之不徹者其故有三如邪在經絡筋骨而汗出皮毛者此邪深汗淺衞解而營不解一不徹也或以

十分之邪而出五分之汗此邪重汗輕二不徹也或寒邪方去猶未清楚遽起露風而因虛復感此新舊相踵三不徹也凡遇此者當辨其詳而因微甚以再汗之

凡既愈復熱者其故有四或以邪氣方散胃氣未清因而過食者是爲食復此其一也或以表邪方解原不甚虛有過愼者輙加溫補是誤補而復此其二也若此二者所謂食入於陰長氣於陽以致衛氣復閉陽邪復聚而然表邪既復仍宜汗也又或有以新病方瘳不能調攝或勞傷脾陰因而復熱者是名勞復此其三也或不愼房室因而再感者是名女勞復此其四也若此二者所謂陰虛者陽必湊之而然此則或從補或從汗當因變制宜權其緩急而治分虛實也

取汗之法當取於自然不宜急暴但服以湯劑蓋令溫煖使得津津微汗稍令久之則手足俱周遍身通達邪無不散矣若一時逼之致使如淋如洗則急遽間衞氣已達而營氣未周反有不到之處且恐大傷

元氣非善法也余嘗見有子病者其父母愛惜之甚欲其速愈且當溫煖之令覆以重被猶恐不足而以身壓其上子因熱極呼呌其父母曰猶未也須再出些方好及許久放起竟致亡陽而斃是但知汗出何妨而不知汗之殺人此强發之鑑也

又有邪本不甚或挾虛年衰感邪等證醫不能察但知表證宜解而發散太過或誤散無效而屢散不已而即被其害者有之或邪氣雖去遂致胃氣大傷不能飲食而羸憊不振者有之此過汗之戒也

凡發汗太過一時將致亡陽或身寒而慄或氣脫昏沉等候速宜煎獨參湯一兩許飲之或甚者以四味回陽飲速爲挽回庶可保全否則恐致不救

脉有忌汗者如傷寒論曰太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛不可發汗發汗則寒慄不能自還傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏不可汗汗亡津液必大便難而讝語少陰病脉微不可發汗以亡陽故也傷寒脉微而惡寒者此陰陽俱

虛不可更發汗更吐下也尺脈弱而無力者切不可汗下尺中遲者不可發汗以榮氣不足血少故也按以上忌汗諸脈可見仲景大意故凡治傷寒但見脈息微弱及沉細無力者皆不可任意發汗然欲去外邪非汗不可而仲景云脈微弱者不可發汗夫脈弱非陽既不可用寒涼而寒邪在表又不可用攻下然則舍汗之外又將何法以治此表邪乎不知溫中即可以散寒而強主即可以逐寇此仲景之意豈不盡露於言表而明悟者當心會之矣且凡病外感而脈見微弱者其汗最不易出其邪最不易解何也正以元氣不能托送即發亦無汗邪不能解則愈發愈虛而危亡立至矣夫汗本乎血由乎營也營本乎氣由乎中也未有中氣虛而營能盛者未有營氣虛而汗能達者脈即營之外候脈既微弱元氣可知元氣愈虛邪愈不解所以陽證最嫌陰脈正爲此也故治此者但遇脈息微弱正不勝邪等證必須速固根本以杜深入專助中氣以托外邪必使眞元漸充則脈必漸盛自微細而至滑大自無力而至有神務令陰脈

轉爲陽脉陰證轉爲陽證斯時也元氣漸充方是正復邪退將汗將解之佳兆故凡治表邪之法有宜發散者有宜和解者有宜調補營衞者如果邪實而無汗則發散爲宜有汗而熱不除則和解爲宜元氣虛而邪不能退則專救根本以待其自解自汗爲宜此逐邪三昧萬全之法也今有庸流但見其外不見其內每不論證之陰陽脉之虛實但知寒涼可以退熱但知發散可以解表不知元陽一敗則土崩瓦解立見潰矣

論吐

太陽證有不當吐而吐者必邪熱乘虛入胃故致內煩也

宿食在上脘者當吐之

凡用藥中病卽止不必盡劑也

寸脉弱而無力者切忌用吐

論下

大凡傷寒最宜愼下若脉息無力及表證未罷者不可亂投湯劑下之爲逆

陰虛水虧虛煩虛躁者不可下重亡其陰無生理矣

看目

凡治傷寒須看兩目或赤或黃赤者爲陽證若兼六脈洪大有力或躁而渴者其熱必甚輕則三黃石膏湯重則大承氣湯之類主之

凡目色青白而無昏冒閃爍之意者多非火證不可輕用寒凉

眼眵多結者必因有火蓋凡有火之候目必多液液乾而凝所以爲眵卽如肺熱甚則鼻涕出是亦目液之類也

目睛上視者謂之戴眼此屬足太陽經之證蓋太陽爲目之上綱而與少陰爲表裏少陰之腎氣大虧則太陽之陰虛血少故其筋脈燥急牽引而上若直視不轉者尤爲凶候欲治此者速當以培陰養血爲主今人不知皆云爲風若用風藥則陰愈虛血愈燥矣其有不顯覆者未之有也

舌色辨

舌爲心之官本紅而澤凡傷寒三四日已後舌上有

胎必自潤而燥自滑而濇由白而黃由黃而黑甚至焦乾或生芒刺是皆邪熱內傳由淺入深之證也故凡邪氣在表舌則無胎及其傳裏則津液乾燥而舌胎生矣若邪猶未深其在半表半裏之間或邪氣客於胷中者其胎不黑不澀止宜小柴胡之屬以和之若陽邪傳裏胃中有熱則舌胎不滑而澀宜梔子豉湯之屬以清之若煩躁欲飲水數升者白虎加人參湯之類主之大都舌上黃胎而焦澀者胃腑有邪熱也或清之或微下之金匱要略曰舌黃未下者下之黃自去然必大便燥實脉沉有力而大渴者方可下之若微渴而脉不實便不堅胎不乾燥芒刺者不可下也其有舌上黑胎而生芒刺者則熱更深矣宜涼膈散承氣湯大柴胡之屬酌宜下之若胎色雖黑滑而不澀者便非實邪亦非火證非惟不可下且不可清也此辨舌之槩雖云若此然猶有不可槩論者

按傷寒諸書皆云心爲君主之官開竅於舌心主火腎主水黑爲水色而見於心部是爲鬼賊相刑故知必死此雖據理之談然實有未必然者夫五行相制

難兇無尅此其所以爲病豈因兇尅爲病便爲必死但當察其根本何如也如黑色連地而灰黯無神此其本原已敗死無疑矣若舌心焦黑而質地紅活未必皆爲死證陽實者清其胃火火退自愈何慮之有其有元氣大損而陰邪獨見者其色亦黃黑眞水涸竭者其舌亦乾焦此腎中水火俱虧原非實熱之證欲辨此者但察其形氣脉色自有虛實可辨而從補從清反如冰炭矣故凡以焦黑乾澀者尚有非實非火之證再若靑黑少神而潤滑不燥者則無非水乘火位虛寒證也若認此爲火而苦寒一投則餘燼隨滅矣故凡見此者但當詳求脉證以虛實爲主不可因其焦黑而執言清火也傷寒固爾諸證亦然

飲水

凡傷寒欲飲水因內水消竭欲得外水自救若大渴欲飲一升止可與一椀常令不足不可太過若恣飲過量使水停心下則爲水結胷畱於胃則爲噎爲噦溢於皮膚則爲腫畜於下焦則爲癃滲於腸間則爲利下皆飲水太多之過也又不可不與又不可强與

故曰若還不與非其治強飲須教別病生也

凡陽明病口燥但欲漱水而不欲嚥者以熱在經而裏無熱也必將爲衄不可與凉藥蓋飲水一證本以內熱極而陽毒甚者最爲相宜若似乎止宜於實邪不宜於虛邪也而不知虛證亦有不同如陽虛無火者其不宜水無待言也其有陰虛火盛者元氣既弱精血又枯多見舌裂脣焦大渴喜冷三焦如焚二便閉結等證使非藉天一之精何以濟燃眉之急故先宜以冰水解其標而繼以甘溫培其本水藥兼進無不可也其有內眞寒外假熱陰盛格陽等證察其元氣則非用甘溫必不足以挽回察其喉舌則些微辛熱又不可以近口有如是者則但將甘溫大補之劑或單用人參煎成湯液用水浸極冷而飲之此以假冷之味解上焦之假熱而眞溫之性復下焦之眞陽是非用水而實亦用水之意余用此活人多矣誠妙之甚者也惟是假熱之證則證雖熱而脉則微口雖渴而便則不閉者此而欲水必不可與若誤犯之則其敗泄元陽爲害不小有不可不愼也

三陽陰證辨

足太陽膀胱經病凡發熱頭痛腰脊強肩背痛脉浮緊者是皆太陽證也若肩背畏寒惡心欲嘔或眼目無神不欲見人喜暗畏明眼眶酸澀或喜向壁臥或戴眼上視或頭傾身痛甚或顏色清白隱見青黑或丹田無力息短聲微氣促而喘或咽中閉塞或角弓發痙或小水清白或失小便或小便短赤而內不喜冷凡脉見浮空無力或沉緊細弱者皆太陽合少陰之陰證也

足陽明胃經之病凡發熱頭目痛不得眠脉長而數者本皆陽明證也若面鼻惡寒面色青白或鼻尖冷口氣不熱或脣口青白微黑或氣短聲微鼻息不長懶於言語或戴陽面赤昏沉困倦多眠或煩躁面赤身熱虛狂假斑脉反微細無力或身雖發熱反欲得衣或口渴不欲飲水并水漿不入或惡寒寒慄惡心嘔逆或肉瞤心悸或動氣見於胷腹或四肢無力身重懶於舉動或手足自冷或肌肉之間以手按之殊無大熱或大便不實自利腹痛凡脉見浮長無力或

短細結促者皆陽明合太陰之陰證也

足少陽膽經之病凡發熱頭耳牽痛脅肋痛往來寒熱脉見弦數者本皆少陽證也若身雖微熱而時作時止時多畏寒或耳聾或頭運或眼目羞澀或多驚怯恐畏或嘔苦吐酸或惡心喜煖或爪靑筋急囊縮或厥逆下利腸鳴小腹痛凡脉見弦數無力而沉細微弱者少陽合厥陰之陰證也

以上乃三陽經之陰證陰證者卽陽虛之證也皆大忌寒凉尅伐之藥妄用卽死余恐將來復有如李子建之流者故特揭而出之用爲提醒後人之鑑云

再論陰證陽證及李子建傷寒十勸之害

天地間死生消長之道惟陰陽二氣盡之而人力挽回之權亦惟陰陽二字盡之至於傷寒一證則尤切於此不可忽也但傷寒之陰證陽證其義有二所謂二者曰經有陰陽證有陰陽也經有陰陽則三陽爲陽證三陰爲陰證證有陰陽則實熱爲陽證虛寒爲陰證凡經之陰陽則有寒有熱故陽經亦有陰證陰經亦有陽證證之陰陽則有假有眞故發熱亦有陰

證厥逆亦有陽證此經自經而證自證乃傷寒中最要之綱領不可混也而今之醫流多不明此故每致混指陰陽肆行尅伐殺人於反掌之間而終身不悟深爲可慨原其由然非無所本蓋本於李子建之傷寒十勸十勸之中惟八勸曰病已在裏不可發汗九勸曰飲水不可過多十勸曰病後當忌飲食房勞凡此三者皆爲得理然亦人皆知之無待其爲勸矣此外七勸則悉忌溫補如一勸云傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥若此一說以陽經之表病認爲內熱之陽證治以寒凉必殺人矣觀仲景治太陽經傷寒頭痛發熱無汗者用麻黃湯頭痛發熱汗出惡風者用桂枝湯太陽病發熱頭痛脉反沉身體疼痛者當救其裏用四逆湯陽明病脉浮無汗而喘者出汗則愈宜麻黃湯凡此之類豈非皆用熱藥以治陽經之頭疼發熱乎且凡寒邪之感人必先入三陽之表所以爲頭疼發熱等證使於此時能用溫散則淺而且易故岐伯曰發表不遠熱是誠神聖心傳之旨惟仲景知之故能用溫散如此是豈果陽經之病便

是陽證耶經證不明而戕用溫熱最妄之談此其一也又二勸曰傷寒必須直攻毒氣不可補益若據此說則凡是傷寒盡皆實證而必無虛矣何岐伯曰邪之所湊其氣必虛又曰寒則眞氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間又觀仲景論傷寒之虛證虛脉及不可汗吐下者凡百餘條此外如東垣丹溪陶節庵輩所用補中益氣回陽返本溫經易元等湯則其宜否溫補槩可知矣矧今之人凡以勞倦七情色慾過度及天稟薄弱之流十居七八使以此輩一旦因虛感邪若但知直攻毒氣而不顧元陽則寇未逐而主先傷鼠未投而器先破顧可直攻無忌乎凡受斯害死者多矣妄談之甚此其二也又三勸曰傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥據此一說則凡見傷寒不食者皆是實熱證而何以仲景有曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也又曰病人脉數數爲熱當消穀引飲而反吐者以其發汗令陽氣微膈氣虛脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故也又曰食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之若此

之類豈非皆寒證之宜溫者耶但傷寒之熱證固不能食而寒證之不食者尤多以中寒而不溫脾則元陽必脫而死矣此妄談之三也又四勸曰傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥據所云亦有熱證則寒證居多矣寒痛既多則何不曰不可輕服寒凉藥而特以溫煖爲禁者何也獨不見仲景之治腹痛有用眞武湯者有用通脉四逆湯者有用四逆散加附子者有曰手足厥冷小腹滿按之痛者此冷結膀胱關元也使以此證而亦忌溫煖則寒在陰分能無斃乎此妄談之四也再如五勸之傷寒自利不可例服補藥煖藥止瀉藥六勸之禁用艾火七勸之手足厥冷不可例作陰證等說總屬禁熱之談余亦不屑與之多辨但摭取聖賢成法明哲格言再悉於此用救將來是誠今日之急務也因詳考仲景傷寒論見其所列三百九十七法而脉證之虛寒者一百有餘一百一十三方而用人參者二十用桂附者五十有餘又東垣曰實火宜瀉虛火宜補又薛立齋曰大凡元氣虛弱而發熱者皆內眞寒而外假熱也凡若此者豈

皆余之杜撰耶豈子建諸人一無所見耶若無所見胡可妄言若有所見胡敢妄言今觀彼十勸之中凡禁用溫補者居其八九而絕無一言戒及寒冷果何意哉以致末學認爲聖經遂悉以陰證作陽證悉以虛證作實證但知凉瀉之一長盡忘虛寒之大害夫生民元氣足者其幾能堪此潛消暗剝之大盜乎嗟嗟何物匪才敢言十勸既不能蒐羅訓典明析陰陽又不能揣摩實虛原始要終總弗求陽德之亨全不識冰霜之至後學者多被所愚致造終身之孽無辜者陰受其戮詎思冤魂可憐余言及此能不轉慈悲爲憤怒借筆削爲箴規獨思深詆先輩豈出本心亦以目擊多艱難勝嗚咽實亦有爲而云然蓋以久感之餘復有所觸適一契姻向以中年過勞因患勞倦發熱余爲速救其本已將復元忽遭子建之徒堅執十勸以相抗昧者見其發熱反爲左袒不數劑而遂死因并往日見聞倍加傷慘誠可痛可恨也子建子建吾知多冤之積於爾者久矣故悉此論以解爾此後之冤孽爾若有知尚知感否

論傷寒古治法

凡傷寒治法必當先知經絡次序如一日在太陽則爲發熱頭痛等證二日在陽明則爲目痛鼻乾不眠等證三日在少陽則爲耳聾脅痛寒熱口苦等證四日在太陰則爲腹滿自利等證五日在少陰則爲舌乾口燥等證六日在厥陰則爲煩滿囊縮等證此傷寒傳經之大槩也然病有不同證有多變故不可以一定之法鑿鑿爲拘今人有不知通變者每按日按經執方求治則證多不合益見其難矣即如發熱無汗頭痛者宜於發汗本太陽經之證治也然仲景曰陽明病外證云何曰身熱汗自出不惡寒反惡熱此陽明之發熱也曰陽明病反無汗而小便利嘔而欬手足厥者必苦頭痛此陽明之無汗頭痛也曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽此少陽之頭痛發熱也凡三陽皆爲表證而惟少陽則曰半表半裏不可發汗然法曰尺寸俱浮者太陽受病也尺寸俱長者陽明受病也尺寸俱弦者少陽受病也此三經皆受病未入於腑者可汗而已豈非少陽亦所當汗乎此三

陽之治宜乎若此至於三陰則亦有若此者如曰太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯曰少陰病始得之反發熱脉沉者宜麻黃附子細辛湯曰厥陰證下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯凡此皆三陰之發熱三陰之當汗者也至於下證則惟獨少陽爲半表半裏之經若下之恐邪氣乘虛內陷故不可攻其他五經皆有下證由此觀之則三陽何嘗無裏證三陰何嘗無表證故善治者但見表邪未解卽當解表若表證未解不可攻裏也但見裏證已具卽當攻裏若裏證未實尚宜和解也或汗或和或下但當隨證緩急而用得其宜卽古今畫一之法也

論古法通變

凡用藥處方最宜通變不可執滯觀仲景以麻黃湯治太陽經發熱頭痛脉浮無汗之傷寒而陽明病脉浮無汗而喘者亦用之太陽與陽明合病喘而胷滿者亦用之此麻黃湯之通變也又如桂枝湯本治太陽經發熱汗出之中風而陽明病如瘧狀日晡發熱

脉浮虛宜發汗者亦用之太陽病外證未解脉浮弱當以汗解者亦用之太陰病脉浮可發汗者亦用之厥陰證下利腹脹滿身疼痛宜攻表者亦用之此桂枝湯之通變也又如小柴胡湯本治少陽經脅痛乾嘔往來寒熱之傷寒而陽明病潮熱胷脅滿者亦用之陽明中風脉弦浮大腹滿脅痛不得汗身面悉黃潮熱等證亦用之婦人中風續得寒熱經水適斷熱入血室如瘧狀者亦用之此小柴胡湯之通變也由此觀之可見仲景之意初未嘗逐經執方而立方之意多有言不能悉者正神不可以言傳也所以有此法未必有此證有此證未必有此方卽仲景再生而欲盡踵其成法吾知其未必皆相合卽仲景復言而欲盡吐其新方吾知其未必無短長於戲方烏足以盡變變胡可以定方但使學者能會仲景之意則亦今之仲景也又何必以仲景之方爲拘泥哉余故曰用藥處方最宜通變不當執滯也雖然此變通二字蓋爲不能通變者設而不知斯道之理又自有一定不易之要焉苟不知要而強借通變爲譚柄則胡猜

亂道妄識經權反大失通變之旨矣

麻黃桂枝辨

按傷寒論曰太陽病頭痛發熱惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊無汗而喘者名爲傷寒麻黃湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風脉緩者名爲中風桂枝湯主之此以無汗脉緊者爲傷寒故用麻黃湯有汗脉緩者爲中風故用桂枝湯是其辨也又曰桂枝本爲解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也然何以又曰太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯陽明病日晡所發潮熱脉虛浮者宜發汗發汗宜桂枝湯是豈桂枝爲止汗者耶但麻黃湯無芍藥而用麻黃桂枝湯無麻黃而用芍藥蓋桂枝性散芍藥性斂以芍藥從桂枝則桂枝不峻以桂枝從芍藥則芍藥不寒然以芍藥之懦終不勝桂枝之勇且芍藥能滋調營氣適足爲桂枝取汗之助故桂枝湯亦是散劑但麻黃湯峻而桂枝湯緩耳故凡寒邪深固者恐服桂枝不能解表則反以助熱所以脉緊無汗者宜麻黃不宜桂枝若脉浮緩有汗

或浮弱者以其風邪尙淺宜桂枝不宜麻黃也此麻黃湯爲發表之第一而桂枝湯則解表之次者也今時醫不能察此但聞汗不出者不可與桂枝便謂桂枝能止汗誤亦甚矣而不知止汗在芍藥不在桂枝也但桂枝性溫能强衛氣如內經曰陰氣有餘爲多汗身寒仲景曰極寒反汗出者此亡陽而汗也助陽乃可以止汗則正宜用桂枝矣

又傷寒論以太陽病無汗脉緊者爲傷寒汗出脉緩者爲中風此風寒之辨也然大青龍湯證治曰太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之是豈非太陽中風亦有脉緊無汗者耶可見風之與寒本不相遠但風邪淺而寒邪深耳淺屬陽而深屬陰耳且近見外感寒邪者率皆傷寒發熱脉緊無汗等證至於中風一證謂其脉緩有汗而復發熱者其病本不多見卽有之亦必外因者少而內因者多也倘學者以風寒二字及麻黃桂枝二湯必欲分其陰陽同異而執以爲辭則失之遠矣

論今時皆合病併病

余究心傷寒已久初見合病併病之説殊有不明而今始悉之夫所謂合病者乃二陽三陽同病病之相合者也併病者如太陽先病不解又併入陽明少陽之類也觀仲景曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明若太陽病證不罷者不可下按此云轉屬陽明則自太陽而來可知也云太陽病證不罷則二經皆病可知也凡併病者由淺而深由此而彼勢使之必然也此合病併病之義而不知者皆以此爲罕見之證又豈知今時之病則皆合病併病耳何以見之蓋自余臨證以來凡診傷寒初未見有單經挨次相傳者亦未見有表證悉罷止存裏證者若欲依經如式求證則未見有如式之病而方治可相符者所以令人致疑愈難下手是不知合病併病之義耳今列其大略如左

合病者乃兩經三經同病也如初起發熱惡寒頭痛者此太陽之證而更兼不眠卽太陽陽明合病也若兼嘔惡卽太陽少陽合病也若發熱不眠嘔惡者卽陽明少陽合病也若三者俱全便是三陽合病三陽

合病者其病必甚

三陽與三陰本無合病蓋三陽爲表三陰爲裏若表裏同病卽兩感也故凡有陰陽俱病者必以漸相傳而至皆併病耳此亦勢所必至非合病兩感之謂

併病與合病不同合病者彼此齊病也併病者一經先病然後漸及他經而皆病也如太陽先病發熱頭痛而後見目痛鼻乾不眠等證者此太陽併於陽明也或後見耳聾脅痛嘔而口苦等證者此太陽併於少陽也或後見腹滿嗌乾等證者此太陽併於太陰也或後見舌乾口燥等證者此太陽併於少陰也或後見煩滿囊縮等證者此太陽併於厥陰也若陽明併於三陰者必鼻乾不眠而兼三陰之證少陽併於三陰者必耳聾嘔苦而兼三陰之證陰證雖見於裏而陽證仍留於表故謂之併凡患傷寒而始終熱有不退者皆表邪之未解耳但得正汗一透則表裏皆愈豈非陰陽相併之病乎今之傷寒率多併病若明此理則自有頭緒矣治此之法凡併病在三陽者自當解三陽之表如邪在太陽者當知爲陽中之表治

宜輕清邪在陽明者當知爲陽中之裏治宜厚重邪在少陽者當知爲陽中之樞治宜和解此雖解表之大法然余仍有心法詳載新方八略中故或宜溫散或宜凉散或宜平散或宜補中而散是又於陰陽交錯之理有不可不參合而酌用者皆治表之法也至於病入三陰本爲在裏如太陰爲陰中之陽治宜微溫少陰爲陰中之樞治宜半溫厥陰爲陰中之陰治宜大溫此陰證之治略也然病雖在陰而有兼三陽之併病者或其邪熱已甚則自宜清火或其表尙未解則仍當散邪蓋邪自外入則外爲病本拔去其本則裏病自無不愈者此所以解表即能和中也若表邪不甚而裏證爲急又當先救其裏蓋表裏之氣本自相關惟表不解所以裏病日增惟裏不和所以表邪不散此所以治裏亦能解表也但宜表宜裏或此或彼之間則自有緩急先後一定不易之道而非可以疑似出入者要在乎知病之藪而獨見其必勝之機耳此又陰陽併病之治略也惟是病既在陰必關於臟臟氣爲人之根本而死生係之故凡診陰證者

必當細察其虛實而補瀉寒熱弗至倒施則今時之治要莫切乎此矣

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十三卷目錄

醫部彙考三百五十三

傷寒門十九

張介賓景岳全書（治法　論虛邪治法　補中亦能散表　寒中亦能散表　傷寒三表法　傷寒無補法辨　病宜速治　溫病暑病　發斑　發黃　發狂　結胸　厥　讝語鄭聲　衄血　畜血　熱入血室　勞力感寒　動氣　戰汗　頭汗　吐蚘　腹痛　下利　小便　死證　傷寒逆證賦）

陳士鐸石室祕錄（治法　相舌祕法）

藝術典第三百七十三卷

醫部彙考三百五十三

傷寒門十九

景岳全書　臣張介賓著

治法

凡治傷寒不必拘於日數但見表證卽當治表但見裏證卽當治裏因證辨經隨經施治乃爲良法若表邪未解卽日數雖多但有表證而脈見緊數者仍當解散不可攻裏也若表邪已輕卽日數雖少但有裏

證而脈見沉實者卽當攻裏不可發表也然此二者一曰發表一曰攻裏皆以邪實者爲言也其有脈氣不足形氣不足者則不可言發言攻而當從乎補矣但補有輕重或宜兼補或宜全補則在乎明慧者之用之如法耳

傷寒但見發熱惡寒脈緊數無汗頭項痛腰脊強或肢體痠軟者便是表證不拘日數多寡卽當解散但於陰陽虛實不可不預辨也而於汗散方中擇宜用之

傷寒但見往來寒熱脅痛口苦而嘔或漸覺耳聾脈見弦數者卽少陽經半表半裏之證治宜和解以新方諸柴胡飲及小柴胡湯之類酌宜用之然少陽之治有三禁曰不可汗吐下也

傷寒如頭痛發熱惡寒表證之類悉除反見怕熱躁渴讝語揭去衣被揚手擲足斑黃發狂或潮熱自汗大便不通小便短赤或胷腹脹滿疼痛或上氣喘促脈實有力者卽是傳裏之熱證不拘日數多少卽當清裏如果實邪內結不得宣通此必大爲滌蕩庶使

裏通而表亦通也然必其胷腹脹滿腸胃燥結而大滿大實堅者乃可攻之故法曰痞滿燥實堅五者具而後可下又曰下不嫌遲蓋恐內不實而誤攻之則必至不救矣

凡治傷寒如時寒火衰內無熱邪而表不解者宜以辛溫熱劑散之時熱火盛而表不解者宜以辛甘涼劑散之時氣皆平而表不解者宜以辛甘平劑散之此解散之要法也蓋人在氣交之中隨氣而化天地之氣寒則宜辛熱天地之氣熱則宜辛涼經文既以冬爲傷寒春爲溫病夏爲暑病名旣因時而易則方亦不容不隨時而更也但以凉散之法當知所辨必其表裏俱有熱證方可兼用清凉若身表雖熱而內無熱證者此以表邪未解因寒而爲熱也不可妄用凉藥蓋恐表寒未除而內寒復至以寒遇寒則凝結不解必將愈甚經曰發表不遠熱正此之謂也且舍時從證尤爲治傷寒緊要之法此又不可不知常變

凡暑熱盛行瘟疫大起焦渴斑黃臟腑如火此則或用寒肅以清其裏或用寒散以救其表但當察表裏

而酌緩急之宜也

論虛邪治法

凡傷寒治法在表者宜散在裏者宜攻此大則也然傷寒死生之機則全在虛實二字夫邪之所湊其氣必虛故傷寒爲患多係乘虛而入者時醫不察虛實但見傷寒則動曰傷寒無補法任意攻邪殊不知可攻而愈者原非虛證正既不虛邪自不能害之及其經盡氣復自然病退故治之亦愈不治亦愈此實邪無足慮也惟是挾虛傷寒則最爲可畏使不知固本禦侮之策而肆意攻邪但施孤注則凡攻散之劑未有不先入於胃而元氣更虛邪將更入虛而再攻不死何待是以凡傷寒而死者必由元氣之先敗此則舉世之通弊也故凡臨證者但見脈弱無神耳聾手顫神倦氣怯畏寒喜暗言語輕微顏色青白諸形證不足等候便當思顧元氣若形氣本虛而過散其表必至亡陽臟氣本虛而誤攻其內必至亡陰犯者必死卽如元氣半虛而邪方盛者亦當權其輕重而兼補以散庶得其宜若元氣大虛則邪氣雖盛亦不可

攻必當詳察其陰陽峻補中氣如平居偶感陰寒邪未深入但見發熱身痛脈數不洪內無火證表裏不足者卽當用理陰煎加柴胡或加麻黃連進一二服其效如神此常用第一方也此外諸證如虛在陽分則當以四柴胡飲補中益氣湯或八珍湯理中湯溫胃飲之類此溫中自能發散之治也若虛在陰分而液涸水虧不能作汗則當用補陰益氣煎三柴胡飲或三陰煎左歸飲之類此壯水制陽精化爲氣之治也若陰盛格陽眞寒假熱者則當以大補元煎右歸飲崔氏八味丸料之類此引火歸原之治也其有陰盛陽衰之證身雖發熱而惡寒不已或嘔惡或泄瀉或背凉如冰或手足厥冷是皆陽虛之極必用大溫中飲或理陰煎不可疑也若果邪火熱甚而水枯乾涸者或用凉水漸解其熱表未解而固閉者或兼微解漸去其寒若邪實正虛原有主客不敵之勢使但能保定根本不令決裂則邪不戰而自解此中大有元妙余嘗藉此而存活者五十年來若干人矣謹書之以爲普濟者之則

補中亦能散表

夫補者所以補中何以亦能散表蓋陽虛者卽氣虛也氣虛於中安能達表非補其氣肌能解乎凡脈之微弱無力或兩寸短小而多寒者卽其證也此陽虛傷寒也陰虛者卽血虛也血虛於裏安能化液非補其精汗能生乎凡脈之浮芤不實或兩尺無根而多熱者卽其證也此陰虛傷寒也然補則補矣仍當酌其劑量譬之飲酒者能飲一勺而以一升宜乎其至於困也使能飲一斗而與以一合其眞蚍蜉之撼大樹耳

寒中亦能散表

夫寒中者所以清火何以亦能散表蓋陽亢陰衰者卽水虧火盛也水涸於經安能作汗譬之乾鍋赤裂潤自何來但加以水則鬱蒸沛然而氣化四達夫汗自水生亦猶是也如前論言補陽補陰者宜助精氣也此論言以水濟火者宜用寒涼也蓋補者補中之不足濟者制火之有餘凡此者均能解表其功若一而宜寒宜煖其用不侔是則不可不辨

傷寒三表法

傷寒者危病也治傷寒者難事也所以難者亦惟其理有不明而不得其要耳所謂要者亦惟正氣邪氣二者之辨而已使能知正氣之虛實邪氣之淺深則盡之矣夫寒邪外感無非由表而入裏由表而入者亦必由表而出之故凡傷寒者必須得汗而後解但正勝邪者邪入必淺此元氣之強者也邪勝正者其入必深此元氣之弱者也邪有淺深則表散有異正有虛實則攻補有異此三表之法所不容不道也何爲三表蓋邪淺者逐之於藩籬散在皮毛也漸深者逐之於戶牖散在筋骨也深入者逐之於堂室散在臟腑也故淺而實者宜直散直散者逐之無難也虛而深者宜托散托散者但強其主而邪無不散也今姑舉其略如麻黃湯桂枝湯參蘇飲羌活湯麻桂飲之類皆單逐外邪肌表之散劑也又如小柴胡湯補中益氣湯三柴胡飲四柴胡飲之類皆兼顧邪正經絡之散劑也再如理陰煎大溫中飲六味回陽飲十全大補湯之類皆建中逐邪臟腑之散劑也嗚呼以

散藥而散於肌表經絡者誰不知之惟散於臟腑則知者少矣以散爲散者誰不知之惟不散之散則元之又元矣

傷寒無補法辨

按傷寒一證惟元氣虛者爲最重虛而不補何以挽回奈何近代醫流咸謂傷寒無補法此一言者古無是說而今之庸輩動以爲言遂致老幼相傳確然深信其爲害也不可勝紀茲但以一歲之事言之如萬曆乙巳歲都下瘟疫盛行凡涉年衰及內傷不足者用大溫大補兼散之劑得以全活者甚多使此輩不幸而遭庸手則萬無一免者矣痛夫枉者之非命因偏求經傳則並無傷寒無補法之例必求其由則惟陶節菴有云傷寒汗吐下後不可便用參芪大補使邪氣得補而熱愈盛所謂治傷寒無補法也此一說者蓋亦本於孫眞人之言云服承氣湯得利瘥愼不中補也此其意謂因攻而愈者本爲實邪故不宜妄用補藥復助其邪耳初非謂虛證亦不宜補也此外則有最庸最拙爲萬世之害者莫如李子建之傷寒

十勸今後世謬傳實基於此故余於前論直叱其非并詳考仲景傷寒論及諸賢之成法以申明其義焉矧今人之患傷寒者惟勞倦內傷七情挾虛之類十居七八傳誦傷寒無補者十有八九以挾虛之七八當無補之八九果能堪乎而不知以直攻而死者皆挾虛之輩也此在衆人則以傳聞之訛無怪其生疑畏至若名列醫家而亦曰傷寒無補法何其庸妄無知毫不自反誤人非淺誠可醜可恨者也其有尤甚者則本來無術偏能惑人但逢時病則必曰寒邪未散何可用補若將邪氣補住譬之關門趕賊若此一言又不知出於何典亂道異端尤可恨也此外又有一輩曰若據此脈證誠然虛矣本當從補但其邪氣未淨猶宜緩之姑俟清楚方可用也是豈知正不能復則邪必日深焉能清楚元陽不支則變生呼吸安可再遲此不知死活之流也又有一輩曰此本虛證如何不補速當用人參七八分但以青陳之類監制用之自然無害是豈知有補之名無補之實些須兒戲何濟安危而尚可以一消一補自掣其肘乎此不

知輕重之徒也卽或有出奇言補者亦必見勢在垂危然後曰快補快補夫馬到臨崖收韁已晚補而無濟必又曰傷寒用參者無不死是傷寒無補之說益堅而衆人之惑益不可破雖有儀秦不能辨也余目覩其受害於此者蓋不可勝紀矣心切悲之不得不辯夫傷寒之邪本皆自外而入而病有淺深輕重之不同者亦總由主氣之有強弱耳故凡主強者雖感亦輕以邪氣不能深入也主弱者雖輕必重以中虛不能自固也此其一表一裏邪正相爲勝負正勝則生邪勝則死倘以邪實正虛而不知固本將何以望其不敗乎矧治虛治實本自不同補以治虛非以治實何爲補住寒邪補以補中非以補外何謂關門赶賊卽曰強寇登堂矣凡主弱者避之且不暇尚敢關門乎旣能關門主尚強也賊聞主強必然退遁不遁卽成禽矣謂之捉賊又何不可夫病情人事理則相同未有正勝而邪不却者故主進一分則賊退一步謂之內拒謂之逐邪又何不可而顧謂之關門耶矧如仲景之用小柴胡湯以人參柴胡並用東垣之用

補中益氣湯以參朮升麻並用蓋一以散邪一以固本此自逐中有固固中有逐又豈皆補住關門之謂乎甚矣一言之害殺命無窮庸醫之庸莫此爲甚余不能以口徧傳故特爲此辨

徐東皐曰漢張仲景著傷寒論專以外傷爲法其中顧盼脾胃元氣之祕世醫鮮有知之者觀其少陽證小柴胡湯用人參則防邪氣之入三陰或恐脾胃稍虛邪乘而入必用人參甘草固脾胃以充中氣是外傷未嘗不內因也即如理中湯附子湯黃連湯炙甘草湯吳茱萸湯茯苓四逆湯桂枝人參湯人參敗毒散人參白虎湯陽毒升麻湯大建中等湯未嘗不用參朮以治外感可見仲景公之立方神化莫測或者謂外傷是其所長而內傷非所知也此誠不知公者也何今世之醫不識元氣之旨惟見王綸雜著戒用人參之謬說執泥不移樂用苦寒攻病之標致誤蒼生死於非命抑何限耶間有病家疑信相半兩弗之從但不速其死耳直以因循俟其元氣自盡終莫之救而斃者可謂知乎況斯世斯時人物劇繁稟氣益

薄兼之勞役名利之場甚至踏水火而不知恤躭酒色以竭其眞不謂內傷元氣吾弗信也觀其雜病稍用攻擊而脾胃遂傷甚則絕穀而死者可以類推矣

病宜速治

凡人有感冒外邪者當不時卽治速爲調理若猶豫隱忍數日乃說致使邪氣入深則難爲力矣惟小兒女子則爲尤甚凡傷寒之病皆自風寒得之邪氣在表未有溫覆而不消散者若待入裏必致延久一人不愈而親屬之切近者日就其氣氣從鼻入必將傳染此其病之微甚亦在乎治之遲早耳故凡作湯液不可避晨夜覺病須臾卽宜速治則易愈矣仲景曰凡發汗溫服湯藥其方雖言日三服若病劇不解當促之可半日中盡三服卽速治之意也其或藥病稍見不投但有所覺便可改易若其勢重當一日一夜晬時觀之一劑未退卽當復進一劑最難者不過三劑必當汗解其有汗不得出者卽凶候也

溫病暑病

溫病暑病之作本由冬時寒毒內藏故至春發爲溫

病至夏發爲暑病此以寒毒所化故總謂之傷寒仲景曰發熱不惡寒而渴者溫病也暑病則尤甚矣蓋暑病者即熱病也是雖與寒證不同然亦因時而名非謂其病必皆熱也此外如夏月中暑者亦謂之暑病則又非寒毒畜留之證在仲景即名之爲中暍義詳暑證門所當參閱

溫病暑病之治宜從涼散固其然也然必表裏俱有熱證方可治用清涼若值四時寒邪客勝感冒不正之氣表邪未解雖外熱如火而內無熱證可據者不得以溫暑之名執以爲熱而概用涼藥

冬有非時之煖或君相客熱之令而病熱者名曰冬溫此與冬月正傷寒大異法宜涼解此舍時從證也若夏月有寒者宜溫亦然

素問刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑傷寒論曰脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑此二論之言傷寒傷暑者非即溫病暑病之謂蓋單指夏月感觸時氣者所當辨其爲寒爲暑而寒則宜溫暑則宜清也身寒者言受寒憎寒身熱者言

受熱發熱非曰身冷者方是傷寒身熱者乃是傷暑也但此二論一曰氣盛氣虛一曰脈盛脈虛詞若異而理則一也故凡察氣者當在形色察脈者當在本元合而觀之則見理精矣

發斑

發斑證輕則如疹子重則如錦紋其致此之由雖分數種然總由寒毒不解而然如當汗不汗則表邪不解當下不下則裏邪不解當清不清則火勝不解當補不補則無力不解或下之太早則邪陷不解或以陽證誤用溫補則陽亢不解或以陰證誤用寒涼則陰凝不解凡邪毒不解則直入陰分鬱而成熱乃致液涸血枯斑見肌表此實毒邪固結營衛俱劇之證也但斑有微甚勢有重輕輕者細如蚊迹或先紅而後黃重者成粒成片或先紅而後赤輕者只在四肢重者乃見胸腹輕者色淡而隱重者色紫而顯若見黑斑或大便自利或短氣或二便不通則十死九矣凡病傷寒而汗下溫清俱不能解及足冷耳聾煩悶欬嘔者便是發斑之候

成無己曰大熱則傷血熱不散裏實表虛熱邪乘虛出於皮膚而爲斑也愼不可發汗若汗之重令開泄更增斑爛也自後諸家所述皆同此說余則以爲不然蓋凡傷寒之邪本自外而入深入不解則又自內而出此其表裏相乘勢所必至原非表虛證也但使內外通達則邪必由表而解矣卽如犀角地黃湯乃治斑之要藥人知此湯但能凉血清毒而不知此湯善於解表散邪若用之得宜則必通身大汗熱邪頓解何爲不可汗耶由此言之則凡脈數無汗表證具

在者必須仍從解散

凡治發斑須察表裏如瘟疫不解熱入血室舌焦煩熱發斑者犀角地黃湯內外俱熱陽明狂躁大渴發斑者白虎湯或加人參陽毒赤斑狂言見血者陽毒升麻湯疫癘發斑大熱而燥者三黃石膏湯火鬱於經寒邪不解脈仍滑數而發斑者一柴胡飲陽明外邪陽毒不解者升麻湯脾腎本虛外邪不解而發斑者五柴胡飲陽明表邪不解溫熱發斑者柴胡白虎煎溫熱毒盛咽痛發斑者元參升麻湯陰虛水虧血

熱發斑者玉女煎陰虛血燥大熱大渴發斑者歸葛飲內虛外實陰盛格陽發斑者大溫中飲太陽陽明惡熱大便祕結邪毒在臟發斑者調胃承氣湯

凡本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解余常用大溫中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪達多有見赤斑風餅隨汗而出隨出隨沒頃刻即愈活者多人凡寒毒爲斑即此可見使內托無力則此毒終無出期日深日甚難乎免矣此理甚微不可不察

發黃

凡發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹滿不痛或大便實而渴甚脈來沉實有力皆濕熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃自退矣然黃有陰證及諸治法俱詳黃疸門宜參用之

發狂

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂而實非狂此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡

實熱之狂本屬陽明蓋陽明爲多氣多血之經陽邪傳入胃腑熱結不解因而發狂內經陽明脈解篇曰胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其惡火者熱甚惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋者以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣而走者以熱盛於身也其妄言罵詈不避親疎而歌者以陽盛爲邪也又曰陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂又曰邪入於陽則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令神志昏亂若此此陽狂也然傷寒病至發狂是爲邪熱已極使非峻逐火邪則不能已故但察其大便鞕結或腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承氣或涼膈散六一順氣湯之類下之可也如無脹滿實堅等證而惟胃火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其病自愈

如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃

仁承氣湯又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人如狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下其血乃愈抵當湯主之按此二條以太陽熱邪不解隨經入腑但未至發狂故曰如狂此以熱搏血分畜聚下焦故宜下也

近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由失精而病其病在腎也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之氣內無胸腹之結滑實之脈雖或不時躁擾而禁之則止口多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則口無焦渴察其下則便無鞕結是皆精氣受傷神魂不守之證此與陽極爲狂者反如冰炭而時醫不能察但見錯亂便謂陽狂妄行攻瀉必致殺人凡治此者須辨陰陽其有虛而挾邪者邪在陽分則宜補中益氣湯之類邪在陰分則宜補陰益氣煎之類虛而

無邪者在陽分則宜四君八珍十全大補湯大補元煎之類在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之類陰虛挾火者宜加減一陰煎二陰煎之類陽虛挾寒者宜理中湯回陽飲八味湯右歸飲之類此方治之宜大略如此而變證之異則有言不能傳者能知意在言表則知所未言矣

凡身有微熱或面赤戴陽或煩躁不寧欲坐臥於泥水中然脈則微弱無力此陰證似陽也名爲陰躁蓋以陽虛於下則氣不歸原故浮散於上而發躁如狂速當溫補其下命門煖則火有所歸而病當自愈若醫不識此而誤用寒凉者必死

發狂下利讝語者不治狂言目反直視者爲腎絕死

汗出後輒復熱狂言不食者死

結胷

按結胷一證觀傷寒論所載如前數條凡太陽表邪未解而誤下者成結胷少陽證亦然太陽少陽併病者亦然此不當下而誤下之以致臟氣空虛外邪乘虛內陷結於胷膈之間是皆因下而結者也又曰傷

寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者此不因下而邪實漸深結聚於胸者也然則結胸一證有因誤下而成者有不因下而由於本病者觀近代傷寒諸書云未經下者非結胸也豈不謬哉

結胸證觀仲景所言惟太陽少陽二經誤下者有之而陽明一經獨無言及者何也蓋凡病入陽明胃腑已實故可下之而無害也然又曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利不止者死此豈非陽明在經表證邪未入腑者亦爲不可下乎不惟三陽爲然卽三陰之證其有發熱惡寒表邪未解者切不可下最當愼也

結胸證治之辨凡心腹脹滿鞕痛而手不可近者方是結胸若但滿不痛者此爲痞滿非結胸也凡痞滿之證乃表邪傳至胸中未入於腑此其將入未入猶兼乎表是卽半表半裏之證只宜以小柴胡之屬加枳殼之類治之或以治之本方對小陷胸湯亦妙今余新方製有柴陳煎及一柴胡飲之類皆可擇而用之也至於結胸之治則仲景俱用大陷胸湯主之然

以余之見則惟傷寒本病其有不因誤下而實邪傳裏心下鞕滿痛連小腹而不可近或燥渴譫妄大便鞕脈來沉實有力者此皆大陷胸湯所正宜也其於太陽少陽表邪未解因下早而致結胸者此其表邪猶在若再用大陷胸湯是既因誤下而復下之此則余所未敢不若以痞滿門諸法酌其輕重而從乎雙解以緩治之或外用罨法以解散胸中實邪此余之屢用獲效而最穩最捷者也

厥

厥有二證曰陽厥曰陰厥也陽厥者熱厥也必其先自三陽傳入陰分故其初起必因頭疼發熱自淺入深然後及於三陰變爲四肢逆冷或時乍溫其證必便結躁煩譫語發渴不惡寒反惡熱脈沉有力此以傳經熱證所化外雖手足厥冷內則因於熱邪陽證發厥故爲陽厥乃陽極似陰也其證由邪熱內結或伏陽失下之所致也凡厥微則熱亦微宜四逆散之類厥甚則熱亦甚宜承氣湯之類也

陰厥者寒厥也初無三陽傳經實熱等證而眞寒直

入三陰則畏寒厥冷腹痛吐瀉戰慄不渴脈沉無力者此陰寒厥逆獨陰無陽也故爲陰厥輕則理中湯重則四逆回陽等湯主之

按陽厥陰厥其辨如前此先哲之大法也然愚則猶有所辨如陰厥一證既無陽證陽脈而病寒若此明是陰證今人但曰中寒者卽其病也然犯此者無幾知此者無難治宜溫中無待辨也惟是陽厥一證則有不得不辨者夫厥由三陽所傳是爲陽厥此固然矣卽以傳經者言之又豈盡無陰證乎故凡病眞陽不足者卽陽中之陰厥也脈弱無神者卽陽中之陰厥也攻伐清凉太過者卽陽中之陰厥也四肢爲諸陽之本使非有熱結煩渴脹實等證而見厥逆者皆由陽氣不足也成無己曰大抵厥逆爲陰所主寒者多矣又曰厥爲陰之盛也故凡屬挾虛傷寒則雖自陽經傳入者是亦陽中之陰厥也陰中之陰者宜溫陽中之陰者果宜凉乎學者勿謂其先有頭疼發熱但自三陽傳至者便爲陽厥而寒因熱用之則爲害不小矣

臟厥證仲景曰傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲臟厥臟厥者死陽氣絕也

蚘厥證仲景曰蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩此爲臟寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之

成無己曰臟厥者死陽氣絕也蚘厥雖厥而煩吐蚘已則靜不若臟厥而躁無暫安時也病人臟寒胃虛故宜與烏梅丸溫臟安蟲

讝語鄭聲

實則讝語虛則鄭聲此虛實之有不同也夫讝語鄭聲總由神魂昏亂而語言不正又何以分其虛實但讝語者狂妄之語也鄭聲者不正之聲也讝語爲實實者邪實也如傷寒陽明實熱上乘於心心爲熱冒則神魂昏亂而讝妄不休者此實邪也實邪爲病其聲必高其氣必壯其脈必強其色必厲凡登高罵詈狂呼躁擾之類皆是也此之爲病有燥糞在胃而然者有瘀血在臟而然者有火盛熱極而然者有腹脹

便祕口瘡咽爛而然者察其果實卽當以三承氣或白虎湯涼膈散之類治之

鄭聲爲虛虛者神虛也如傷寒元神失守爲邪所乘神志昏沉而錯亂不正者此虛邪也虛邪爲病其聲必低其氣必短其脈必無力其色必萎悴凡其自言自語喃喃不全或見鬼怪或驚恐不休或問之不應答之不知之類皆是也此之爲病有因汗亡陽因下亡陰而然者有焦思抑鬱竭蹶心氣而然者有勞力內傷致損脾腎而然者有日用消耗暗殘中氣而然者凡其或雖起倒而過之卽止終不若實邪之難制者卽虛邪也察其果虛最忌妄行攻伐少有差謬無不卽死治此者速宜察其精氣辨其陰陽舍其外證救其根本稍遲猶恐不及而況於誤治乎甚至有自利身寒或尋衣撮空面壁啐啐者尤爲逆候蓋讝妄一證最於虛損者不宜有之故凡身有微熱脈見洪滑者生心多煩躁脈見微弱細急而逆冷者死所以證逢虛損而見有讝妄者卽大危之兆不可不加之意也

衄血

雜病衄血積熱在裏傷寒衄血積熱在表論曰傷寒小便清者知不在裏仍在表也當發其汗若頭痛者必衄宜桂枝湯曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之此以傷寒之衄爲其熱不在裏在表而然也然又論曰衄家不可發汗而何以復用桂枝麻黃等湯蓋衄由乎陰者以陰虛火動也故不宜再汗以亡陰衄由乎陽者以表邪未解也故當用桂枝麻黃以發散又論曰太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈此以表邪欲解不從汗而從血俗人謂之紅汗所以衄後當愈也由此觀之則有因衄而愈者以經通而邪散也有治衄仍當發散者以邪之將解未解而因散其餘邪也治衄之法於斯可見若寒氣不甚而用麻黃桂枝似屬太剛或易以柴葛之類自無不可用者其酌之

論曰陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄蓋陽明之脈絡於口鼻今其漱水不欲嚥者以熱在經而裏無熱故當鼻衄也

有動陰血者又非衄血之謂論曰少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出故或從口鼻或從目出者是名下厥上竭此陰血也乃爲危證

畜血

傷寒畜血者以熱結在裏搏於血分畱瘀下焦而不行也論曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也又曰太陽病身黃脈沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也大抵熱畜血分畱結下焦則生狂躁論曰熱結膀胱其人如狂者是也然又有陽明證其人喜忘屎雖鞕而大便反快其色黑者是亦畜血之證故診傷寒但其少腹鞕滿而痛便當問其小便若小便自利者知爲虛血之證蓋小便由於氣化病在血而不在氣故小便利而無恙也血瘀於下者血去則愈其在仲景之法則以抵當湯抵當丸主之愚謂但以承氣之類加桃仁紅花以逐之或其兼虛者以玉燭散之類下之則畜血自去而病無不除矣

熱入血室

血因熱結而畱畜不行也有熱入血室者以邪入血分而血亂不調也故血畜者去之則愈血亂者調之則安調之之法則熱者宜涼陷者宜舉虛者宜滋瘀者宜行邪未散者宜解也然此皆病在下焦故曰無犯胃氣及上二焦必自愈是又不可不察

勞力感寒

凡因辛苦勞倦而病者多有患頭痛發熱惡寒或骨腿痠疼或微渴或無汗或自汗脈雖浮大而無力亦多緊數此勞力感寒之證即東垣云內傷證也宜補中益氣湯或補陰益氣煎及五福飲等劑爲良所謂溫能除大熱即此類也若或邪盛無汗脈見洪數而當和解者即當用諸柴胡飲之類主之

凡勞力感寒一證人皆以服役辛苦之人爲言而不知凡爲名利所牽有不自揣以致竭盡心力而患傷寒者皆其類也故凡有形勞而神不勞者勞之輕者也若既勞其神又勞其形內外俱勞則形神俱困斯其甚矣今人之病傷寒者率多此類輕者和解治宜如前重者速宜救本當於培補諸方擇而用之庶乎

有濟倘不知其所致之由而槩施混治但知攻邪則未有不誤人者矣此卽勞倦內傷之類諸義具詳本門

動氣

按動氣一證卽築築然動於臍旁及左乳之下曰虛里者皆其聯絡者也考之難經則以臍之上下左右分心腎肝肺四臟而各列其證在傷寒論所載亦詳成無己曰動氣者臟氣不治正氣內虛也雖諸說如此然皆未盡其要所以今之醫家多不識此爲何證而且疑爲未見此證也余嘗留心察此所見極多葢動氣之在臍旁者皆本於下焦之陰分凡病關格勞損者多有此證而尤於瘦薄者易見之其動之微者則止於臍旁上下其動之甚者則連及虛里心脅眞若舂舂連續而渾身皆振動者此以天一無根故氣不蓄藏而鼓動於下誠眞陰不守大虛之候也何以驗之但察於呼吸饑飽之頃可得其徵凡病此者餒時則動甚飽時則稍緩呼出則動甚吸入則稍緩但虛甚者動必甚虛微者動亦微豈非虛實之明證乎

卽在病者雖常覺其振動而無疼無痒尚不知爲何故醫家多不以爲意弗能詳察故不知爲何病此動氣之不明也久矣此動氣之見於虛損者極多而見於傷寒者亦不少也精虛者既不可汗陰虛者又不可下仲景但言其禁而不言其治然則動氣之治豈無法乎獨於霍亂條中云臍上築者腎氣動也用理中丸去朮加桂四兩以治之此其意在脾腎槩可知也然余之治此則惟直救眞陰以培根本使其氣有所歸無不獲效欲察虛實者最不可忽此一證

戰汗

戰與慄異戰由乎外慄由乎內也凡傷寒欲解將汗之時若其正氣內實邪不能與之爭則但汗出自不作戰所謂不戰應知體不虛也若其人本虛邪與正爭微者爲振甚則爲戰正勝邪則戰而汗解矣故凡邪正之爭於外者則爲戰戰其愈者也邪正之爭於內者則爲慄慄其甚者也論曰陰中於邪必內慄也夫戰爲正氣將復慄則邪氣肆强故傷寒六七日有但慄不戰竟成寒逆者多不可救此以正氣中虛陰

邪內盛正不勝邪而反爲邪氣所勝凡遇此證使非用大補溫熱之劑及艾灼回陽等法其他焉得而禦之

頭汗

頭汗之證有二一爲邪熱上壅一爲陽氣內脫也蓋頭乃諸陽之會凡傷寒徧身得汗者謂之熱越若身無汗則熱不得越而上蒸陽分故但頭汗出也治熱蒸者可清可散甚者可下在去其熱而病自愈至若氣脫一證則多以妄下傷陰或尅伐太過或泄瀉不止以致陰竭於下則陽脫於上小水不通而上見頭汗則大危矣

頭汗脈緊數有表邪當散者宜小柴胡湯或柴胡桂枝乾薑湯及新方諸柴胡飲俱可酌用

若有火邪脈洪滑內多煩熱頭汗當清者宜人參白虎湯益元散之類主之

若水結胷心下滿頭汗出者或大陷胷湯或小半夏茯苓湯

若便結腹脹疼痛頭汗者宜承氣湯

若諸虛泄瀉陽脫頭汗者宜速用獨參湯或大補元煎六味回陽等飲作急救之庶可保全

吐蚘

凡治傷寒若見吐蚘者雖有大熱忌用涼藥犯之必死蓋胃中有寒陽氣弱極則蚘逆而上此大凶之兆也急用炮薑理中湯一服加烏梅二箇花椒一二十粒服後待蚘定然後以柴胡或補中益氣等劑漸治其餘蓋蚘聞酸則靜見苦則安也

腹痛

若小腹鞕痛小水自利大便黑身目黃者屬畜血痛亦用寒劑加行血藥下盡黑物自愈

凡傷寒腹中痛甚但將涼水一盞與病者飲而試之若飲水後痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之

以上皆實熱痛也必脈來沉實有力方是此證若微弱者仍當詳審從緩治之

若飲水愈加作痛此爲寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷嘔吐瀉利者急用熱藥救之但須詳脈之有力無力方爲良法

下利

凡雜證下利多積於寒傷寒下利有寒有熱蓋熱邪傳裏則亦有下利之證但寒利最多熱利則僅見耳治者當辨寒熱若誤用之則爲害最大

凡傷寒下利由熱邪者必有煩躁大熱酷欲冷水等證亦必有洪滑強盛數實等脈如果表裏俱熱方可作火證論治若其脈雖數而無力外雖身熱而不惡熱內雖渴而不喜冷此其內本不熱而病爲下利者悉屬虛寒治宜四逆湯理中湯溫胃飲胃關煎五苓散之類酌用可也或表裏寒邪俱甚則當以麻桂飲相兼用之爲最妥若以寒利作熱利妄用寒凉再損胃氣則無有不死

表裏俱病而下利者雖有表證所急在裏蓋裏有不實則表邪愈陷卽欲表之而中氣無力亦不能散故凡見下利中虛者速當先溫其裏裏實氣強則表邪自解溫中可以散寒也

脈數又欲飲水是誠熱矣然寒邪在表脈無不數但數而有力者爲陽證數而無力者卽陰證矣瀉利亡

津無有不渴但渴欲飲水愈多愈快者爲陽證若口雖欲水而腹不欲嚥者卽非陽證矣此外如渴欲茶湯者乃瀉渴之當然也不得悉認爲熱證

凡傷寒表邪未解脈實滑數喜冷氣壯內外俱熱而下利者宜柴芩煎主之

凡傷寒下利者本非陽明實邪不當譫語今既譫語故知有燥屎當去也又若少陰下利心下有痛有鞕者必有所積故亦當下

凡利家身涼脈小者爲順身熱脈大者爲逆此以外無表證而病之在臟者言也

下利日十餘行脈反實者死發熱下利至甚厥不止者死直視譫語下利者死下利無脈手足厥冷灸之不溫脈不還者死少陰病自利煩躁不得臥寐者死

大抵下利一證爲脫氣至急五奪之中惟此爲甚金匱要略曰六腑氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利下不禁臟氣旣脫不能治也

按仲景言表證未除而誤下之因致外熱未退內復作利故云協熱下利此一熱字乃言表熱也非言內

熱也夫協者協同之協非挾藏之挾即表裏俱病之謂故治此者止有桂枝人參湯一方其義顯然可見即如成無己明理論曰表邪傳裏裏虛協熱則利是亦以表邪爲言也奈何後學不明此義止因協熱二字每每以表作裏以寒作熱但見作利者無論表裏虛實即認爲內熱便云協熱下利且近有不必誤下而妄用芩連治表熱者表證得寒熱愈不退乃致下利或脾胃素弱逢寒即泄者皆是此證既見下利益云協熱其謬孰甚獨不觀仲景桂枝人參湯豈治內熱之劑乎寒熱倒施殺人多矣余因特表於此

小便

凡傷寒小便淸者病不在裏仍在表也當解表發汗小便利者病不在氣分而在血分以小水由於氣化也

陽盛則欲衄陰虛則小便難

凡病傷寒而小水利者多吉以內邪不甚也

凡傷寒表證未除病在陽分者不可即利小便葢走其津液取汗愈難且恐大便乾結也

死證

少陰病惡寒身踡而利手足逆冷者不治少陰病吐利躁煩四逆者死少陰病四逆身踡脈不至不煩而躁者死少陰病六七日息高者死少陰病至五六日自利煩躁不得臥寐者死少陰病下利厥逆無脈服藥後脈微續者生脈暴出者死少陰病但厥無汗而强發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死脈純弦者死脈陰陽俱虛熱不止者死脈陰陽俱盛大汗出熱不解者死手足逆冷脈沉細讝言妄語者死脈證俱虛而見讝妄者死傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死寸脈上不至關爲陽絕尺脈下不至關爲陰絕此皆不治決死也傷寒下利日十餘行脈反實者死

傷寒病脅下素有痞氣連於臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結死發熱下利厥逆躁不得臥者死發熱下利至甚厥不止者死直視讝語喘滿者死下利者

亦死下利發熱者亦死發熱而厥七日下利者難治傷寒六七日發熱而利汗出不止者死有陰無陽故也陽氣前絕陰氣後絕者陰證也其人死後身色必靑陰氣前絕陽氣後絕者陽證也其人死後身色必赤腋下溫心下熱也金匱要略曰六腑氣絕於外者手足寒五臟氣絕於內者利下不禁葢傷寒發熱爲邪氣獨甚若下利至甚厥不止此以邪未解而臟腑之氣先絕故死

傷寒逆證賦

傷寒難療逆證須知陽病怕逢陰脈讝語陰證非宜乍疎乍數脈之忌也張目陷鼻如煤乾嘔出氣骨節痛而呃逆弗已發斑發黃大便利而先赤後灰霍亂躁煩心下悶而喘脹腹膨呃逆下泄利而難溲四肢厥逆眼定腹疼如石內外關格頭汗陽脫溲遲頭運胷痛四肢冷聲啞脣瘡狐惑悲七日已過復大熱喘逆上氣脈散危陰陽易脈離經而外腎腫手足攣拳加腹痛陰陽交大汗後而熱愈甚躁疾狂言食更稀厥利無脈灸而不至者腎殆脣靑舌卷耳聾囊縮者

肝離赤斑黑斑救五而收一尋衣撮空兩感者何疑凡諸汗證仍當備言只在頭面不遍身衄不止口噤肉戰多嘔促如油汗圓當汗無汗麻黃數劑不能通尤嫌脈躁汗後嘔吐水藥不入證反劇言亂目眩濕家大汗必成痓風濕與疸皆譫言犯濕溫則身青面變耳聾不語名重暍發少陰必九竅出血下厥上竭奚能痊動氣脈遲弱皆忌風濕和中濕不堪其諸下利尤宜細叅熱厥利而汗難止冷厥利而躁不眠少陽陽明合病脈弦者負少陰吐瀉無脈拳厥躁煩譫語直視而喘滿下利頻數而脈堅臟結者臍痛引陰白胎下利除中則厥逆而利反能食焉誤下濕家之頭汗溲難便利喘加添體如熏而搖頭直視心神已絕脣吻青而四肢多汗肝氣不全腎絕者直視狂言而遺尿反目肺絕者喘無休歇而汗潤髮巔虛汗發黃環口黑非脾經之吉兆孤陽偏勝脈暴出知陰絕之在先此傷寒之逆候勿僥倖以圖全

石室祕錄

臣陳士鐸著

治法

凡人病初起之時用藥原易奏功無如人看不清用藥錯亂往往變證蜂起苟認得清用得當又何變證之生耶如傷寒之證必然頭痛身疼欬嗽痰多切其脈必浮此傷風也卽以防風荆芥柴胡甘草黃芩半夏各一錢水煎服一劑卽止不再劑也

傷寒之初起也鼻塞目痛項强頭亦痛然切其脈必浮緊此傷寒也若以傷寒治之卽愈方用桂枝甘草陳皮乾葛各一錢水煎服一劑卽愈

人有正氣虛而中風寒不可先攻其邪蓋邪之所湊其氣必虛邪之敢入於正氣之中者是人之正氣先虛也不急補其正氣則邪何所畏而肯速去哉譬如賊人入室主懦而僕從又怯賊必將安坐門庭逍遥酒食矣苟能用一二果敢之士出死力爭敵則盜寇且急走而不遑也故必先補其正而後可以散邪方用人參黃芪白朮當歸各三錢柴胡二錢半夏甘草陳皮各一錢神麯黃芩各五分山楂五粒水煎服此方妙在用參歸芪朮以扶正氣加柴胡半夏以祛邪加陳皮山楂以消食加甘草以和中不治邪而邪自

退也

一方用人參甘草半夏各一錢柴胡白朮茯苓各三錢水煎服此方專治正氣虛而邪入之者如頭疼發熱凡脈右寸口大於左寸口者急用此方無不全愈蓋雖有外邪不可純作邪治當以補正爲先治邪爲後

邪入皮毛腠理將入營衞急宜發散方用白朮三錢荆芥柴胡蘇葉半夏甘草蒼朮丹皮各一錢水煎服此方平和之中有妙理蓋木氣之鬱最宜乎散今所用之藥俱是直入肝經之聖藥自然肝木疏通枝葉條達也

人病發熱必先散其邪氣俟邪氣速去而後再扶其正氣則正氣不爲邪氣所傷方用柴胡荆芥半夏黃芩甘草各一錢水煎服則邪散而身凉蓋四時不正之氣來犯人身必然由皮毛而入營衞今用柴胡荆芥先散其皮毛之邪邪旣先散安得入裏方中又有半夏以祛痰使邪不得挾痰以作祟又有黃芩使不得挾火以作殃況又有甘草調和藥味以和中邪旣

先散而正氣又不相虧但世人不肯先服藥因以邪由皮毛而入營衛由營衛而入臟腑也倘先用此方又何至傳經深入哉一方用柴胡當歸梔子甘草陳皮各一錢天花粉白芍各二錢水煎服此方凡肝脈鬱者用一劑卽快不必專是外感也治內傷初起者神效又一方用當歸二錢柴胡白芍茯苓甘草麻黃桂枝各一錢陳皮五分水煎服此方專治傷寒初起者神效乘其尚未傳經可從補正之中兼用祛邪之品而熱散之也蓋初起之邪尚不敢與正氣相敵故一補正氣而邪氣自消及一傳經則正氣遁入於臟腑不敢與邪相爭愈補而愈不敢出也故一傳經則萬萬不可用補藥今乘其初起之時亟用補劑而加以祛邪之品用桂枝以散熱用麻黃以祛寒寒熱相攻邪難內入而又有正氣之健以助之所以一劑而盡愈也

傷寒變爲結胷若仍以平常藥餌相治吾見其坐斃而已矣蓋傷寒火邪正熾原不可急與飲食若不知禁忌與之胃中得食不啻如寶故茹而不出而他臟

見胃中有食羣起而爭其勢猖狂非杯水可解必當以變法治之急須以苦蔞一枚搥碎入甘草一錢同煎服之夫苦蔞乃陷胷之勝物平常人服之必至心如遺落今病人一旦服之不異其虛乎誰知無病常人斷斷不可服此而傷寒結胷之證却有相宜蓋食結在胷非大黃芒硝枳殼檳榔厚朴之類可能祛逐必得苦蔞始能陷之入於脾中尤恐其過於下也少加甘草留之且得甘草之和不至十分推蕩此變證而用變法眞勝於用正也

傷寒兩感隔經相傳每每殺人如第一日宜在太陽第二日陽明第三日少陽第四日太陰第五日少陰第六日厥陰此順經傳也今第一日太陽卽傳陽明第二日陽明卽傳少陽第三日少陽卽傳太陰第四日太陰卽傳少陰第五日少陰卽傳厥陰此過經傳也更有第一日太陽卽傳少陽第二日陽明卽傳太陰第三日少陽卽傳少陰第四日太陰卽傳厥陰此隔經傳也第一日太陽卽傳少陰第二日陽明卽傳太陰第三日少陽卽傳厥陰此兩感傳也順傳者原

有生機至七日而病自愈過傳者有生有死隔傳者死多於生兩感而傳者三日水漿不入不知人即死今傳二方一救過經傳之傷寒一救隔經傳之傷寒過經傳方名救過起死湯用麻黃柴胡厚朴知母半夏黃芩各一錢石膏青蒿茯苓各五錢炒梔子五分當歸三錢水煎服一劑即生蓋過經之傳必然變證紛紜斷非初起之一二日也所以方中不用桂枝以散太陽之邪止用麻黃以散其表傷寒至三四日內熱必甚故以石膏知母爲君以洩陽明之邪火陽明火一退而厥陰之木不舒則木以生火邪退者復聚故又用青蒿柴胡梔子以涼散之木不自焚而各經之邪不攻自散況又重用茯苓以健脾行濕引火下行盡從膀胱而出之乎且黃芩以清肺厚朴以逐穢半夏以清痰又用之咸宜五臟無非生氣矣隔經傳方名救陰起死湯青蒿一兩人參石膏各五錢白芍炒梔子各三錢柴胡二錢知母半夏甘草各一錢水煎服隔經之傳必至三日而證乃明雖已過陽明而餘火未散故少陰之火助其焰而少陽之火失其權

若不仍用石膏知母則陽明之火勢不退而少陰之火勢不息也故必須用此二味爲主然徒用二味而太陰脾土不急爲救援則火氣凌亢何以存其生氣故又用人參以助生氣但生氣既存而厥陰受邪則木氣乾燥勢必尅太陰之脾土僅存之生氣又安能保乎故又用柴芍梔蒿以涼散其木中之邪木之邪散則木氣得養自然不去尅土而太陰之氣生太陰土有生氣則陽明之火必消歸無有矣又何至焚燒自滅其少陰之臟哉況方中半夏清痰甘草和中又用之無不宜乎起死回生實非虛語故一見有隔經之傳卽以此方投之必能轉敗爲功也或疑青蒿用之太多不知青蒿不獨泄肝木之火尤能瀉陽明之焰且性靜而不動更能補陰火旺之時補陰重藥又不敢用惟青蒿借其攻中能補同人參兼用實能生陰陽之氣於無何有之鄉若但用人參止生陽氣而不能生陰氣矣陰生則陽火無權也第三日少陽與厥陰兩感水漿不入不知人者方名救臟湯麥冬三兩元參白芍各二兩人參當歸各一兩天花粉三錢

荊芥二錢水煎服多用當歸者助肝膽以生血也多加麥冬者救肺氣之絕以制肝膽之木使火不旺而血易生斯胃氣有養臟腑可救其壞也

傷寒發狂至登高而歌棄衣而走見水而入罵詈呼號不避親疎者去生遠矣仲景以竹葉石膏湯救之妙矣蓋陽明之火其勢最大一發而不可救非用大劑白虎湯何能止其燎原之勢而世人畏手畏尾往往用之而特小其劑是猶杯水救車薪之焰也故用石膏必須至三四兩或半斤一劑煎服火勢始能少退狂亦可少止也然石膏性猛雖善退火未免損傷胃氣必須與人參兼用爲妙我更有一方用白虎湯之半而另加藥味方名祛熱生胃湯石膏元參麥冬各三兩茯苓一兩人參車前子各五錢知母三錢水煎服此方石膏知母以瀉胃火人參以生胃氣元參去浮游之火焰麥冬生肺中之陰茯苓車前引火下行於膀胱從小便而出且火盛者口必渴口渴必多飲水吾用此二味以分濕則水流而火自隨水而散矣方中瀉火又不傷氣似勝於白虎湯一劑而狂定

二劑而口渴減半三劑而口渴止火亦息正不必用四劑也凡有火熱而發狂或汗如雨下口渴舌燥或如芒刺者以此方投之立效斷不至於死也

傷寒發斑死證也然而斑亦不同有遍身發斑者有止心窩內發斑者遍身發斑證似重而反輕心窩發斑證似輕而轉重蓋遍身發斑內熱已盡發於外心窩發斑熱存於心中而不得出必須用化斑之藥以解其熱毒之在中也一方最神名起斑湯元參三兩當歸一兩荊芥花粉各五錢升麻黃連茯神各三錢甘草一錢水煎服火毒結於內必須盡情發出然內無血以養心則心中更熱火毒益熾而不能外越也故用當歸元參以滋心中之血用黃連以凉心中之火天花粉以消心中之痰然不開關以散之則火藏於內而不得洩故又用升麻荊芥以發之甘草茯神以和之自然引火外出而不內畜矣火既外越斑亦漸消又何致於喪命哉

傷寒太陽病結胷證具煩躁者死言不可下即下而亦死也夫結胷而加煩躁此胃氣之將絕也胃氣欲

絕津液何生津液既無心何所養故結胷而又煩躁所以證成不可治也雖然津液之竭非五臟之自絕亦因結胷之故耳是必攻其中堅使結胷證愈而津液自生死證可望重甦也一奇方名化結湯天花粉五錢麥芽天門冬桑白皮神麴各三錢枳殼一錢陳皮五分水煎服一劑即結胷開而津液自生也此方用天花粉以代苦蔞不至陷胷之過猛然而天花粉即苦蔞之根也最善開陷胷而無性猛之憂枳殼消食寬中麥芽與桑白皮同用而化導更速神麴陳皮調胃實有神功天門冬善生津液佐天花粉有水乳之合人未知也天花粉得天門冬化痰化食殊有不可測識之效所以既結者能開必死者可活若以大陷胷湯蕩滌之於已汗已下之後鮮不速其死矣

傷寒陽明證中有直視讝語喘滿者死而下利者亦死之文此必證犯直視讝語而又喘滿下利一齊同見也苟有一證未兼尚不宜死倘三證皆見明是死證矣雖然直視讝語之生多是胃火之盛自焚其心而腎水不能來濟於是火愈盛而無制喘滿者火炎

而氣欲上脫下利者火降而氣欲下脫也此猶屬欲脫未脫之危證苟治之得法猶可望生有一奇方名曰援脫散人參麥冬白芍各一兩石膏五錢竹茹三錢水煎服此方用人參以救脫用石膏以平火用麥冬以平喘白芍以止利用竹茹以清心自然氣不絕而可救也

傷寒少陰證吐利兼作又加煩悶手足四逆者死證也上吐下瀉且兼煩躁則陰陽擾亂拂抑而無生氣可知況加手足之逆冷是脾胃之氣又將絕也自是死證無疑然而治之於早未嘗不可救如一見此等證急以人參白朮各二兩肉桂丁香各二錢灌之尚可救耳方名止逆奠安湯人參救元陽之絕原有奇功白朮救脾胃之崩實有至效丁香止嘔肉桂溫中又能止瀉救中土之危亡奠上下之變亂轉生機於頃刻杜死禍於須臾舍此方又何有別方哉

傷寒少陰證下利雖止而頭眩運亦是死證蓋陽雖回而陰已絕下多亡陰竟致陰絕原無救法雖然陰陽之道未嘗不兩相根而兩相生也今因陰絕而諸

陽之上聚於頭者紛然亂動所以眩冒此陽欲脫而未脫補其陽而陽氣生陽生則陰之絕者可以重續陰生於陽也方用參桂湯人參二兩肉桂二錢煎服可救人參返陽氣於無何有之鄉是止能返陽氣也如何陰絕者亦能回之不知人參雖屬陽而中存陰氣陽居其八陰居其二陽既回矣陰氣亦從之而漸返肉桂雖是純陽之品而性走肝腎仍是補陰之聖藥故用之而成功也

傷寒少陰證四逆惡寒身踡脈不至不煩而躁本是死證而吾以爲可救者何全在脈不至不煩而躁也夫病至四肢之逆其陰陽之將絕可知脈之不至未必非寒極而伏也不然陽絕則心宜煩矣而何以不煩但嫌其不煩而躁則陽未絕而將絕爲可畏耳陽既欲絕則陰亦隨之而絕矣故一補其陽陽回而陰亦回也陰陽之道有一線未絕俱爲可救譬如得餘火之星星引之可以焚林况眞陰眞陽非有形之水火乃先天之氣耳一得接續便有生機故一見此等之證急以生生湯救之可以重生方用人參三兩炒

棗仁五錢附子三錢水煎服此方得人參以回其陰陽得附子以祛其寒逆加棗仁以安心則心定而躁可去躁定而脈自出矣死中求生其在斯方乎

傷寒少陰證六七日息高者死息高見於六七日之間明是少陰之證而非太陽之證也息高與氣喘大殊太陽之證乃氣喘氣喘本於邪盛少陰之證乃息高息高本於氣虛而息高與氣喘終何以辨之氣喘者鼻息粗大息高者鼻息微小耳此乃下元之眞氣欲絕而未絕牽連氣海之間故上行而作氣急之狀能上而不能下也最危最急之候方用止息湯熟地人參各三兩麥冬二兩牛膝破故紙各三錢核桃仁一箇乾薑五分水煎服此方大補關元氣海引火下行絕不祛寒逐邪庶幾氣可回而息高可平也倘疑是太陽喘證而妄用桂枝湯殺人於頃刻矣故必用止息湯救之十中亦可望生五六然必須多服久服始得苟或服一劑而輒止亦未能收功也

傷寒少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲嘔吐至五六日自利復煩躁不能臥寐者死證也傷寒而

脈微沉細明是陰證況欲臥而不欲動乎汗已出矣內無陽證可知心中不煩時欲嘔吐此陽邪已散而陰邪作祟急宜祛寒爲是乃失此不溫至五六日而下利是上下俱亂也此時尚不煩躁則腎中之眞陽未散今又加煩躁不得臥寐明是奔越而不可囘之兆矣非死證而何然而其先原因失治以至於不可救非本不可救而成此擾亂之證也有一奇方名轉陽援絕湯用人參白朮炒棗仁各一兩茯神五錢肉桂二錢水煎服一劑即可安臥而囘春矣此方用人參以救絕用白朮茯神以分消水濕而止下利又用肉桂以溫中而去寒加棗仁以安心而解躁用之得宜自然奏功如響也

傷寒脈遲自然是寒悞與黃芩湯以解熱則益加寒矣寒甚宜不能食今反能食病名除中仲景謂是死證者何也夫能食者是胃氣有餘如何反曰死證不知胃寒而加之寒藥反致能食者此胃氣欲絕轉現假食之象以欺人不過一時能食病名除中者正言其胃中之氣除去而不可留也此病雖是死證猶有

生機終以其能食胃氣將除而未除可用藥以留其胃氣也方用加減參苓湯人參一兩茯苓五錢肉桂甘草各一錢陳皮三分水煎服此方參苓健脾開胃肉桂祛寒陳皮化食甘草留中相制得宜自然轉敗爲功而死者可重生矣

傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死夫傷寒陰證發厥灸其厥陰之經亦不得已之法原不及湯藥之神也灸厥陰不還聽其死者亦僅對貧寒之子而說以其不能備參藥也倘以參附湯救之未有不生者一方名還厥湯用白朮四兩附子乾薑各三錢水煎服一劑而甦凡見有厥逆等證即以此方投之神效如響蓋白朮最利腰臍陰寒之初入原從臍始吾利其腰臍則腎宮已有生氣況佐之附子乾薑則無微不達而邪又安留乎况白朮健脾開胃中州安奠四肢邊旁有不陽回頃刻者乎

傷寒發熱而能發厥便有可生之機以發厥則邪能外出也然厥可一二而不可頻頻況身熱而下利至甚如何可久厥而不止乎其爲死證何疑蓋下寒上

熱鬱結於中而陰陽之氣不能彼此相接也必須和其陰陽而通達其上下則死可變生方用人參三兩白术五錢附子二錢甘草蘇子各一錢水煎服此方通達上下以和其陰陽之氣自然厥止而利亦止厥利既止而死可變生倘服後而厥仍不止則亦無藥之可救正不必再與之也蓋陰陽已絕而上下之氣不能接續矣

傷寒發熱六七日不下利忽然變爲下利者已是危證況又汗出不止乎是亡陽也有陰無陽死證明甚何以救之哉夫陽之外越因於陰之內祛也欲陰之安於中而不外祛必先使陽之壯於內而不外出急以人參三兩北五味一錢煎湯救之可生然而貧寒之子安可得參另定一方用白术黃芪各三兩當歸一兩白芍五錢北五味一錢水煎服此方補氣補血以救陽氣之外越陽回則汗自止汗止而下利未必遽止方中特用當歸白芍者正所以止利也水瀉則當歸是所禁用下利非水瀉也正取當歸之滑白芍之酸兩相和合以成止利之功況又有五味之收斂

不特收汗并且澀利

傷寒下利手足厥冷以致無脈急灸其關元之脈者以寒極而脈伏非灸則脈不能出也今灸之而脈仍不出反作微喘此氣逆而不下乃奔於上而欲絕也本是死證而吾以爲可生者正以其無脈也夫人死而後無脈今人未死而先無脈非無也乃伏也灸之不還豈眞無脈之可還乎無脈應死矣而仍未死止作微喘是脈欲還而不能遽還也方用人參一兩熟地五錢牛膝三錢甘草附子各一錢名爲還脈湯一劑而脈驟出者死苟得漸漸脈出可望生矣

傷寒下利後脈絕手足厥冷猝時脈還而手足盡溫者生此亦用灸法而脈還者也然亦必手足溫者可生正見陽氣之尚留耳倘脈不還則手足之逆冷終無溫熱之時是陽不可返而死不可生矣今將何以救之哉不知脈之不返者因灸法而不能返也灸之力微終不及藥之力厚吾以人參三兩灌之則脈自然驟出矣夫少陰下利厥逆無脈者服白通湯惡脈之驟出茲厥陰下利厥逆脈絕者用灸法欲脈之猝

還一死一生者何也一用灸而一用藥也可見用藥之能速出脈不於此而益信乎吾所以用獨參湯救之而可生也

傷寒下利日十餘行脈反實者死何也蓋下多亡陰宜脈之虛弱矣今不虛而反實現假實之象也明是正氣耗絕爲邪氣所障邪盛則正氣消亡欲不死不可得矣然則何以救之哉仍補其虛而不必論脈之實與不實也方名還眞湯人參白芍各一兩茯苓二兩水煎服此方人參以固元陽茯苓以止脫瀉白芍以生眞陰陰生而陽長利止而脫固則正氣既強虛者不虛而後邪氣自敗實者不實也假象變爲眞虛則死證變爲眞生矣

直中陰經之證乃陰寒之氣斬關直入於腎宮命門之火逃亡而將越出於軀殼之外非用大劑補火之藥何以追散失之元陽而返其宅哉方用人參一兩白朮三兩附子三錢肉桂一錢乾薑二錢水三椀煎服一劑而愈此方用人參白朮實有妙用驅寒之品而用此二味且必須多加而元陽始足可畱於將絕

之頃也

傷寒火退邪散則胃氣初轉最忌急與之食一得食而胃氣轉閉不可復開此時卽以藥下之則胃氣大傷而火邪復聚反成不可解之證不若禁之不與之食則中州之地自然轉輸漸漸關開搬運不至有阻隔之虞方用陳皮梔子茯苓各一錢白芍三錢神麴枳殼厚朴甘草各五分麥芽二錢水煎服此方藥味平平似無甚奇妙然而此證本不可以大劑出奇得此平調轉能化有事爲無事然必待其饑餓之時始可與服若正飽之時服之徒滋滿悶而已矣

傷寒愈後邪已盡退正氣自虛理宜補正但胃強脾弱多食補劑恐能食而不能受法當用補胃之藥少而補脾之藥多尤不宜補脾之藥多而補腎之藥少蓋腎能生土而土自能生金金旺則木有所畏不至來尅脾土然則補腎正所以補脾也方用熟地一兩麥冬白芍白朮薏仁各三錢五味子五分肉桂三分白芥子一錢水煎服此方專補腎脾二經不去通補各臟而各臟無不治之也

相舌祕法

傷寒病凡見舌係白胎者邪火未甚也用小柴胡湯解之舌係黃色者心熱也可用黃連梔子以凉之凡見黃而帶灰色者係胃熱也可用石膏知母以凉之凡見黃而帶紅者乃小腸膀胱熱也可用梔子以清之若舌紅而白者乃肺熱也用黃芩蘇葉以解之見舌黑而帶紅者乃腎虛而挾邪也用生地元參又入柴胡以和解之見舌紅而有黑星者乃胃熱極也宜用石膏以治之元參乾葛亦可終不若石膏之妙見舌紅而有白點者乃心中有邪也宜用柴胡黃連以解之心肝同治也見舌紅而有大紅點者乃胃熱而帶濕也須茵陳五苓散以利之蓋水濕必歸膀胱以散邪非肉桂不能引入膀胱但只可用一二分不可多入見舌白胎而帶黑點亦胃熱也宜用石膏以凉之見舌黃而有黑者乃肝經實熱也用柴胡梔子以解之見舌白而黃者邪將入裏也急用柴胡梔子以解之不使入裏柴胡乃半表半裏不可不用之藥也見舌中白而外黃者乃邪入大腸也必須五苓散以

分水水分則泄止矣見舌中黃而外白者乃邪在內而非外邪在上而非下止可加柴胡枳殼以和解不可驟用大黃以輕下也天水加五苓亦可終不若柴胡枳殼直中病原少加天水則更妥或不加用天水加五苓散亦可也見根黃而光白者亦胃熱而帶濕也亦須用石膏爲君而少加去水之品如猪苓澤瀉之類見舌黃而隔一瓣一瓣者乃邪熱已入大腸急用大黃茵陳下之不必用抵當十棗湯也若下之遲則不得而用之然須辨水與血之分下水用十棗下血用抵當也見舌有紅中如蟲蝕者乃水未升而火來乘也亦須用黃連柴胡以和解之見舌紅而開裂如人字者乃邪初入心宜用石膏黃連以解之見舌有根黑而尖帶紅者乃腎中有邪未散宜用柴胡梔子以解之見舌根黑而尖白者乃胃火乘腎宜用石膏知母元參以解之不必論其渴與不渴不必問其下利也舌根黑而舌尖黃者亦邪將入腎須急用大黃下之然須辨其腹痛與不痛按之腹痛而手不可近者急下之否則只用柴胡梔子以和解之見舌純

紅而獨尖黑者乃腎虛而邪火來乘也不可用石膏湯腎旣虛而又用石膏是速之死也當用元參一兩或二兩以救之多有能生者見舌有中心紅暈而四圍邊旁純黑者乃君相二火炎騰急用大黃加生地兩許下而救之十人中亦可救五六人見舌有中央灰黑而四邊微紅者乃邪結於大腸也下之則愈不應則死以腎水枯槁不能潤而推送此時又不可竟用熟地補腎之藥蓋邪未散不可補補則愈加脹急適所以害之也必邪下而後以生地滋之則可然亦不可多用也見舌有純灰色中間獨兩暈黑者亦邪將入腎也急用元參兩許少加柴胡治之見舌有外紅而內黑者此火極似水也急用柴胡梔子大黃枳實以和利之若舌又見刺則火亢熱之極矣尤須多加前藥總之內黑而外白內黑而外黃皆前證也與上同治十中亦可得半生惟舌中淡黑而外或淡紅外或淡白內或淡黃者較前少輕俱可以前法治之十人中可生其八見舌有純紅而露黑紋數條者此水來乘火乃陰證也其舌胎必滑必惡寒惡水下喉

必吐倘見純黑之舌乃死證也不須治之水極似火火極似水一帶純黑俱不可治傷寒知驗舌之法便有把握庶不致臨證差悞耳

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十四卷目錄

醫部彙考三百五十四

傷寒門二十

方一

桂枝湯 桂枝加葛根湯 桂枝加厚朴杏仁湯 桂枝加桂湯 桂枝加附子湯 术附湯 桂枝加芍藥生薑人參新加湯 桂枝加芍藥湯 桂枝加大黃湯 桂枝去芍藥湯 桂枝去芍藥加附子湯 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝甘草湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 茯苓桂枝白术甘草湯 茯苓甘草湯 炙甘草湯 小建中湯 麻黃湯 大青龍湯 小青龍湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二麻黃

一湯　桂枝二越婢一湯　桂枝去桂加茯苓
白朮湯　麻黃杏仁甘草石膏湯　葛根湯
葛根加半夏湯　葛根黃連黃芩湯　麻黃升
麻湯　麻黃連軺赤小豆湯　麻黃附子細莘
湯　麻黃附子甘草湯　桂枝附子湯　去桂
枝加白朮湯　甘草附子湯　桂枝人參湯
小柴胡湯　柴胡桂枝湯　柴胡桂枝乾薑湯
　柴胡加芒硝湯　柴胡加龍骨牡蠣湯　大
柴胡湯　四逆散　五苓散　文蛤散　猪苓
湯　牡蠣澤瀉散　大承氣湯　小承氣湯
調胃承氣湯　麻仁丸　蜜煎導　猪膽汁導
　二白散　茵陳蒿湯　十棗湯　大陷胷湯
　大陷胷丸　小陷胷湯　桃核承氣湯　抵
當湯　抵當丸　瓜蒂散　梔子豉湯　梔子
甘草豉湯　梔子生薑豉湯　梔子厚朴湯
梔子乾薑湯　枳實梔子豉湯　梔子蘗皮湯
　半夏瀉心湯　大黃黃連瀉心湯　附子瀉
心湯　生薑瀉心湯　甘草瀉心湯　黃芩湯

　黃芩加半夏生薑湯　黃連湯　乾薑黃連
黃芩人參湯　黃連阿膠湯　白頭翁湯　竹
葉石膏湯　白虎湯　白虎加人參湯　四逆
湯　茯苓四逆湯　四逆加人參湯　通脈四
逆湯　四逆加猪膽汁湯　白通湯　白通加
猪膽汁湯　附子湯　芍藥甘草附子湯　乾
薑附子湯　眞武湯　理中湯　理中丸　甘
草乾薑湯　烏梅丸　吳茱萸湯　當歸四逆
湯　四逆加吳茱萸生薑湯　桃花湯　赤石
脂禹餘糧湯　旋覆代赭石湯　厚朴生薑甘
草半夏人參湯　芍藥甘草湯　甘草湯　桔
梗湯　猪膚湯　苦酒湯　半夏散　半夏湯
　燒裩散　百合知母湯　百合滑石代赭湯
　百合雞子湯　百合地黃湯　百合滑石散
　百合洗方　大橘皮湯　狐惑熏方　赤小
豆當歸散　升麻鼈甲湯　紫石寒食散

藝術典第三百七十四卷

醫部彙考三百五十四

傷寒門二十

方一

桂枝湯（仲景下同）

桂枝去皮　生薑　芍藥各三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煑取三升去滓適寒

溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力

溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物

桂枝加葛根湯

葛根四兩　芍藥　甘草各二兩　桂枝去皮生薑各三兩切　大棗十二枚擘

右六味以水一斗先煑葛根減二升去上沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法

桂枝加厚朴杏仁湯

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十箇去皮尖餘依前法

桂枝加桂湯

於桂枝湯方內更加桂二兩共五兩餘依前法

桂枝加附子湯

於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

朮附湯

於桂枝加附子湯方內去桂枝加白朮四兩餘依前法

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

於桂枝湯方內更加芍藥生薑各一兩人參三兩餘依桂枝湯法服

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯方內更加芍藥三兩通前共六兩餘依桂枝湯法

桂枝加大黃湯

桂枝去皮　生薑切各三兩　甘草炙二兩
大黃一兩　芍藥六兩　大棗十二枚擘

右六味以水七升煑取三升去滓溫服一升日三服

桂枝去芍藥湯

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法

桂枝去芍藥加附子湯

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝去皮　生薑切各三兩　蜀漆三兩洗去腥

甘草炙二兩　牡蠣熬五兩　龍骨四兩

大棗十二枚擘

右爲末以水一斗二升先煑蜀漆減二升內諸藥煑取三升去滓溫服一升

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝一兩　甘草　牡蠣熬　龍骨各二兩

右爲末以水五升煑取二升去滓溫服八合日三服

桂枝甘草湯

桂枝去皮四兩　甘草炙二兩

右二味以水三升煑取一升去滓頓服

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓半斤　桂枝去皮四兩　甘草炙二兩

大棗十五枚擘

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

茯苓桂枝白术甘草湯

茯苓四兩　桂枝三兩　白术一兩　炙甘草二兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫三服

茯苓甘草湯

茯苓　桂枝各二兩　生薑切三兩　甘草炙一兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

炙甘草湯

麥門冬去心　麻子仁各半斤　生地黃一斤

阿膠　人參各二兩　甘草四兩　生薑切

桂枝去皮各三兩　大棗擘三十枚

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烊消盡溫服一升日三服一名復脈湯

小建中湯

桂枝去皮　甘草炙　生薑各三兩　芍藥六兩

膠飴一升　大棗擘十二枚

右六味以水七升煑取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

麻黃湯

麻黃去節　桂枝去皮各三兩　甘草炙一兩

杏仁去皮尖七十箇

右四味以水九升先煑麻黃減二升去上沫內諸藥煑取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯

麻黃去節六兩　桂枝去皮　甘草炙各二兩

杏仁去皮尖四十箇　石膏如雞子大一塊碎

生薑切三兩　大棗擘十二枚

右七味以水九升先煑麻黃減二升去上沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者

溫粉撲之一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

小青龍湯

麻黃去節　芍藥　乾薑　甘草炙　桂枝去皮

細辛各三兩　半夏湯洗　五味子各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

若微利者去麻黃加蕘花如雞子熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利蕘花下十二水水去利則止

若渴者去半夏加苦蔞根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥津液非渴者所宜故去之苦蔞味苦而生津液故加之

若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人卽餲加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘去麻黃惡發汗

若小便不利少腹痛去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行爲小便不利少腹滿麻黃發津液於外非

所宜也茯苓泄畜水於下加所當也

若喘者去麻黃加杏仁半斤去皮尖金匱要略曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

桂枝麻黃各半湯

桂枝去皮一兩十六銖　生薑切　甘草炙

白芍藥　麻黃去節各一兩　大棗擘四枚

杏仁湯浸去皮尖及兩仁者二十四箇

右七味以水五升先煑麻黃一二沸去上沫內諸藥煑取一升八合去滓溫服六合

桂枝二麻黃一湯

桂枝去皮一兩十七銖　麻黃去節十六銖

芍藥　生薑切各一兩六銖　甘草炙一兩二銖

杏仁去皮尖十六箇　大棗擘五枚

右七味以水五升先煑麻黃一二沸去上沫內諸藥煑取二升去滓溫服一升日再

桂枝二越婢一湯

桂枝去皮　芍藥　甘草各十八銖　大棗四枚

生薑切一兩二錢　石膏二十四銖綿裹碎

麻黃去節十八銖

右七味㕮咀以水五升煑麻黃一二沸去上沫內諸藥煑取二升去滓溫服一升本方當裁爲越婢湯桂枝湯合飲一升今合爲一方桂枝二越婢一

桂枝去桂加茯苓白朮湯

於桂枝湯方內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依前法煎服小便利則愈

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃去節四兩　杏仁去皮尖及雙仁五十箇

甘草炙二兩　石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升先煑麻黃減二升去上沫內諸藥煑取二升去滓溫服一升

葛根湯

葛根四兩　麻黃去節　生薑切各三兩　桂心

芍藥切　甘草炙各二兩　大棗十二枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煑麻黃葛根減二升去沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升覆取微似汗

不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

葛根加半夏湯

葛根四兩　麻黃去節湯泡去黃汁焙乾秤

生薑切　甘草炙　芍藥　桂枝去皮各二兩

大棗十二枚擘　半夏洗半升

右八味以水一斗先煑葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升覆取微似汗

葛根黃連黃芩湯

葛根半斤　甘草炙　黃芩各二兩　黃連三兩

右四味以水八升先煑葛根減二升內諸藥煑取二升去滓分溫再服

麻黃升麻湯

麻黃去節二兩半　升麻　當歸各一兩一分

知母　黃芩　葳蕤各十八銖　石膏碎綿裹

白朮　乾薑　芍藥　天門冬去心　桂枝

茯苓　甘草炙各六銖

右十四味以水一斗先煑麻黃一兩沸去上沫內諸藥煑取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米

須令盡汗出愈

麻黃連軺赤小豆湯

麻黃去節　生薑　連軺各二兩（連軺連翹根也）　赤小豆

生梓白皮各一升　杏仁去皮尖并雙仁四十箇

大棗十二枚擘　甘草一兩炙

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

麻黃附子細辛湯

麻黃去節　細辛各二兩　附子一枚炮去皮

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃附子甘草湯

麻黃去節　甘草炙各二兩　附子一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝附子湯

桂枝去皮四兩　附子三枚炮去皮破八片

生薑切三兩　甘草炙二兩　大棗擘十二枚

右五味以水六升煑取三升去滓分溫三服

去桂枝加白术湯

於前方內去桂枝加白术四兩餘依前法

甘草附子湯

附子二枚炮去皮　甘草炙　白术各二兩

桂枝去皮四兩

右四味以水六升煑取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗止復煩者服五合恐一升多者宜服六七合爲始

桂枝人參湯

桂枝去皮　甘草炙各四兩　白术　人參

乾薑各三兩

右五味以水九升先煑四味取五升內桂更煑取三升溫服一升日再服夜一服

小柴胡湯

柴胡半斤　半夏湯洗半升　黃芩　人參

甘草　生薑切各三兩　大棗擘十二枚

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

柴胡桂枝湯

柴胡四兩　桂枝去皮　黃芩　人參　芍藥
生薑各一兩半　甘草一兩炙　半夏二合半
大棗六枚擘

右九味以水七升煑取三升去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡半斤　苦蔞根四兩　桂枝去皮　黃芩
牡蠣熬　乾薑各三兩　甘草炙二兩

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

柴胡加芒硝湯

於小柴胡湯內加芒硝六兩餘依前法服不解更服

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏二合洗　大棗六枚　柴胡四兩　生薑
牡蠣熬　人參　龍骨　鉛丹　桂枝去皮
茯苓各一兩半　大黃二兩

右十一味以水八升煑取四升內大黃切如碁子

更煑一二沸去滓溫服一升

大柴胡湯

柴胡半斤　黃芩三兩　大黃　芍藥各二兩

半夏洗半升　生薑切五兩　枳實炙四枚

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎溫服一升日三服一方用大黃二兩若不加大黃恐不爲大柴胡湯也

四逆散

甘草炙　枳實水漬炙乾　柴胡　芍藥

右四味各十分擣篩白飲和服方寸匕日三服

欬者加五味子乾薑各五分幷主下利肺寒氣逆則欬五味子之酸收逆氣乾薑之辛散肺寒幷主下利者肺與大腸爲表裏上欬下利治則頗同

悸者加桂枝五分悸者氣虛而不能通行心下築築然悸動也桂猶圭也引導陽氣苦熱以使

小便不利者加茯苓五分茯苓味甘而淡用以滲泄

腹中痛者加附子一枚炮令坼裹虛遇邪則痛加附子以補虛

泄利下重者先以水五升煑薤白三升煑取三升去滓以散三方寸匕內湯中煑取一升半分溫再服泄利下重者氣滯也加薤白以泄氣滯

五苓散

瀉澤一兩六銖半　桂去皮半兩　猪苓去皮

白朮　茯苓各十八銖

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

文蛤散

文蛤五兩

右一味爲散以沸湯和一方寸匕服湯用五合

猪苓湯

猪苓去皮　茯苓　阿膠　滑石碎　澤瀉各一兩

右五味以水四升先煑四味取二升去滓內下阿膠烊消溫服七合日三服

牡蠣澤瀉散

牡蠣熬　苦蔞根　蜀漆洗去腥　葶藶熬
澤瀉　商陸根熬　海藻洗去鹹各等分
右七味異擣下篩爲散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三

大承氣湯

大黃酒洗四兩　厚朴炙去皮半斤　芒硝三錢
枳實炙五枚
右四味以水一斗先煑二物取五升去滓內大黃煑取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯

大黃四兩　厚朴炙去皮二兩　枳實三枚炙
右三味以水四升煑取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯

大黃去皮清酒浸四兩　甘草炙二兩　芒硝半升
右三味㕮咀以水三升煑取一升去滓內芒硝更上火微煑令沸少少溫服

麻仁丸

麻子仁二升　杏仁一升去皮尖熬作脂　芍藥

枳實炙各半斤　大黃去皮　厚朴炙去皮各一斤

右六味爲末煉蜜爲丸桐子大飲服十丸日三服

漸加以知爲度

蜜煎導

蜜七合

一味內銅器中微火煎之稍凝似餳狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞕以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁導

大猪膽一枚瀉汁

和酢少許以灌穀道中如一食頃當大便出

二白散

貝母　桔梗各三分　巴豆去皮心熬黑研脂一分

右件三味爲末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服强人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必

利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以噀之洗之益令熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩　梔子十四枚擘　大黃去皮二兩

右三味以水一斗先煑茵陳減六升內二味煑取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

十棗湯

芫花熬　甘遂　大戟　大棗十枚擘

右上三味等分各別擣爲散以水一升半先煑大棗肥者十枚取八合去滓內藥末强人服一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

大陷胷湯

大黃去皮六兩　芒硝一升　甘遂一錢

右三味以水六升先煑大黃取二升去滓內芒硝

煑一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

大陷胷丸

大黃半斤　葶藶熬　杏仁去皮熬　芒硝各半升

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別擣甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煑取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下爲效禁如藥法

小陷胷湯

黃連一兩　半夏洗半升　苦蔞實大者一箇

右三味以水六升先煑苦蔞取三升去滓內諸藥煑取二升去滓分溫三服

桃核承氣湯

桃仁去皮尖五十箇　大黃四兩　桂枝去皮

芒硝　甘草炙各二兩

右五味以水七升煑取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

抵當湯

水蛭熬　蝱蟲熬去翅足各三十箇　大黃酒浸三

兩　桃仁去皮尖二十箇

右四味爲末以水五升煑取三升去滓溫服一升不下再服

抵當丸

䖟蟲二十五箇　桃仁去皮尖　水蛭各二十箇　大黃三兩

右四味杵分爲四丸以水一升煑一丸取七合服之晬時當下血若不下者更服

瓜蔕散

瓜蔕熬黃　赤小豆各一分

右二味各別擣篩爲散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煑作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止

梔子豉湯

梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味以水四升先煑梔子得二升半內豉煑取一升半去滓分爲二服溫進一服得吐者止後服

梔子甘草豉湯

於梔子豉湯方內加入甘草二兩餘依前法得吐止後服

梔子生薑豉湯

於梔子豉湯方內加生薑五兩餘依前法得吐止後服

梔子厚朴湯

梔子十四枚擘　厚朴薑炙四兩　枳實炒四枚

已上三味以水三升半煑取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

梔子乾薑湯

梔子十四枚擘　乾薑二兩

右二味以水三升半煑取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

枳實梔子豉湯

枳實炙三枚　梔子擘十四枚　豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煑取四升內枳實梔子煑取二升下豉更煑五六沸去滓溫分再服覆令微似汗

梔子蘗皮湯

梔子擘十五箇　甘草炙一兩　黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

半夏瀉心湯

半夏洗半升　黃連一兩　黃芩　乾薑　人參　甘草炙各三兩　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

大黃黃連瀉心湯

大黃二兩　黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

附子瀉心湯

大黃二兩　黃連　黃芩各一兩　附子一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯

生薑切四兩　甘草炙　人參　黃芩各三兩

半夏半升洗　乾薑　黃連各一兩　大棗十二枚

右八味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

甘草瀉心湯

甘草四兩　黃芩　乾薑各三兩　半夏洗半升

大棗十二枚擘　黃連一兩

右六味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

黃芩湯

黃芩三兩　甘草炙　芍藥各二兩　大棗十二枚

右四味以水一斗煑取三升去滓溫服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘依黃芩湯服法

黃連湯

黃連　甘草炙　乾薑　桂枝去皮各三兩

人參二兩　半夏洗半升　大棗十二枚擘

右七味以水一斗煑取六升去滓溫服一升日三服夜二服

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑　黃連　黃芩　人參各三兩

右四味以水六升煑取二升去滓分溫再服

黃連阿膠湯

黃連四兩　阿膠三兩　黃芩一兩　芍藥二兩

雞子黃二枚

右五味以水五升先煑三物取二升去滓內膠烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

白頭翁湯

白頭翁二兩　黃連　黃蘗　秦皮各三兩

右四味以水七升煑取二升去滓溫服一升不愈更服一升

竹葉石膏湯

竹葉二把　石膏一升　麥門冬去心一升

人參三兩　甘草炙二兩　半夏洗　粳米各半升

右七味以水一斗煑取六升去滓內粳米煑米熟湯成去米溫服一升日三服

白虎湯

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩　粳米六合

右四味以水一斗煑米熟湯成去滓溫服一升日三服

白虎加人參湯

於白虎湯內加人參餘依白虎湯方法

四逆湯

甘草炙二兩　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味㕮咀以水三升煑取一升二合去滓分溫再服强人可大附子一枚乾薑三兩

茯苓四逆湯

茯苓六兩　附子一枚生用去皮臍破八片

甘草炙二兩　乾薑一兩半　人參一兩

右五味以水五升煑取三升去滓溫服七合日三服

四逆加人參湯

於四逆湯內加人參一兩餘依四逆湯方法

通脈四逆湯

甘草炙二兩　附子大者一枚生用去皮破八片

乾薑三兩強人可四兩

右三味以水三升煑取一升二合去滓分溫再服

面色赤者加葱九莖葱味辛以通陽氣

腹中痛者去葱加芍藥二兩芍藥之酸通寒利氣腹中痛爲氣不通也

嘔者加生薑二兩辛以散之嘔爲氣不散也

咽痛者去芍藥加桔梗一兩咽中如結加桔梗則能散之

利止脈不出者去桔梗加人參二兩利止脈不出者亡血也加人參以補之經曰脈微而利亡血也四逆加人參湯主之脈病皆與方相應者乃可服之

四逆加猪膽汁湯

於四逆湯方內加入猪膽汁半合餘依前法服如無

猪膽以羊膽代之

白通湯

乾薑一兩　附子一枚生用去皮臍破八片

葱白四莖

右三味以水三升煑取一升去滓分溫再服

白通加猪膽汁湯

乾薑一兩　附子一枚生用去皮臍破八片

葱白四莖　人尿五合　猪膽汁一合

已上三味以水三升煑取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽亦可用

附子湯

附子二枚炮去皮破八片　白术四兩　茯苓

芍藥各三兩　人參二兩

右五味以水八升煑取三升去滓溫服一升日三服

芍藥甘草附子湯

芍藥　甘草炙各三兩　附子一枚炮去皮破八片

已上三味以水五升煑取一升五合去滓分溫服

乾薑附子湯

乾薑一兩　附子大者一枚生用去皮破八片

右二味以水三升煑取一升去滓頓服

眞武湯

茯苓　芍藥　生薑切各三兩　白朮二兩

附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煑取三升去滓溫服七合日三服

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩氣逆欬者五味子之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒

若小便利者去茯苓小便利則無伏水故去茯苓

若下利者去芍藥加乾薑二兩芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒

若嘔者去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子補氣生薑散氣千金曰嘔家多服生薑此爲嘔家聖藥

理中湯

人參　甘草炙　白朮　乾薑各三兩

右四味用水八升煑取三升去滓溫服一升日三服

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩脾虛腎氣動者臍上築動內經曰甘者令人中滿朮甘壅補桂泄奔豚是相易也

吐多者去朮加生薑三兩嘔家不喜甘故去朮嘔家多服生薑以辛散之

下多者還用朮悸者加茯苓二兩下多者用朮以去濕悸者加茯苓以導氣

渴欲得水者加朮足前成四兩半津液不足則渴朮甘以緩之

腹中痛者加人參足前成四兩半裏虛則痛加人參以補之

寒者加乾薑足前成四兩半寒淫所勝平以辛熱

腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被胃虛則氣壅腹滿甘令人中滿故去朮也附子之辛以補陽散壅

理中丸

即理中湯方

四味擣篩爲末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯

甘草乾薑湯

甘草炙四兩　乾薑炮二兩

右㕮咀以水三升煑取一升五合去滓分溫再服

烏梅丸

烏梅三百箇　乾薑十兩　黃連一斤　當歸

蜀椒去子井汗各四兩　細辛　附子炮　桂枝

人參　黃蘗各六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷滑物臭食等

吳茱萸湯

吳茱萸洗一升　人參三兩　生薑切六兩

大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

當歸四逆湯

當歸　桂枝　芍藥各三兩　細辛　甘草炙　通草各二兩　大棗二十五箇

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

四逆加吳茱萸生薑湯

於當歸四逆湯方內加吳茱萸二升生薑切半斤

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫分五服一方水酒各四升

桃花湯

赤石脂一斤一半全用一半篩末　乾薑一兩

粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂碎　禹餘糧碎各一斤

已上二味以水六升煑取二升去滓分溫三服

旋覆代赭石湯

旋覆花　甘草炙各三兩　大棗十二枚擘

生薑切五兩　代赭石一兩　半夏洗半升

人參二兩

右七味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

厚朴生薑甘草半夏人參湯

厚朴去皮炙　生薑切各半斤　半夏洗半升

人參一兩　甘草炙二兩

右五味以水一斗煑取三升去滓溫服一升日三服

芍藥甘草湯

白芍藥　甘草炙各四兩

右二味㕮咀以水三升煑取一升半去滓分溫再服之

甘草湯

甘草二兩

右一味以水三升煑取一升半去滓溫服七合日二服

桔梗湯

桔梗一兩　甘草二兩

右二味以水三升煑取一升去滓分溫再服

猪膚湯

猪膚一斤

右一味以水一斗煑取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

苦酒湯

半夏洗破如棗核大十四枚　雞子一枚去黃內上苦酒著雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐶中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服之

半夏散

半夏洗　桂枝去皮　甘草炙各等分

已上三味各別擣篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少與之

半夏湯

卽前半夏散方

以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少與之

燒裩散

婦人中裩近隱處剪燒灰

以水和服方寸匕日三服小便卽利陰頭微腫則愈婦人病取男子裩襠燒灰

百合知母湯

治汗後百合證

百合七枚擘　知母三兩切

右先將百合水浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎至一升去滓又將泉水二升另煎知母取一升去滓後合和煎取一升半分溫再服

百合滑石代赭湯

治下後百合證

百合七枚擘　代赭石如彈丸大一枚綿裹碎

滑石三兩綿裹碎

右煎如上法服

百合雞子湯

治吐後百合病

百合七枚擘　雞子黃一枚

右先水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓納雞子黃攪勻溫服

百合地黃湯

治不經汗吐下百合證

百合七枚擘　生地黃汁一升

右以水洗百合如上法更以泉水二升煎取一升去滓納地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便常如漆

百合滑石散

治百合病變寒熱者

百合一兩炙　滑石三兩

右爲末散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

百合洗方

治百合病一月不解變成渴者

百合一升

水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也千金曰如渴仍不瘥可用苦蔞根幷牡蠣等分爲散飲服方寸匕日三

大橘皮湯

治動氣誤發汗心煩骨痛目運吐食

陳皮三錢　靑竹茹二錢　人參　甘草各一錢

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

狐惑熏方

治狐惑病蟲蝕其肛者

雄黃

右一味爲末筒瓦二枚合之燒向肛熏之

赤小豆當歸散

治前證膿已成者

赤小豆三升浸令芽出曝乾　當歸

右二味杵爲散漿水服方寸匕日三服

升麻鼈甲湯

治陽毒

升麻　甘草各二兩　雄黃研半兩　當歸

蜀椒炒去汗各一兩　鼈甲手指大一片炙

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

紫石寒食散

治傷寒令愈不復

紫石英　白石英　赤石脂　太乙餘糧　花粉

防風　桔梗　文蛤　鬼臼　鍾乳鍊各十分燒

乾薑　附子炮去皮　桂枝去皮各四分

右十三味杵爲散酒服方寸匕

古今圖書集成二八二十之三十七

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十五卷目錄

醫部彙考三百五十五

傷寒門二十一

方二

浴腸湯　五勝散　欬逆方　青膏　黃膏　白膏　度瘴發汗青散　崔文行解散　六物青散　青散　詔書發汗白薇散　華佗赤散　赤散　水解散　六物解肌湯　解肌湯　解肌升麻湯　葛根龍膽湯　又方　七物黃連湯　三匕湯　五香麻黃湯　又方　雪煎　神丹丸　麥奴丸　水導散　生地黃湯　大柴胡葳蕤知母湯　又方　駃豉丸　四物甘草湯　大青湯　苦參湯　凝雪湯　苦蔞湯　蘆根飲子　又方　又方　猪

膽湯　鼻衄方　咽痛方　又方　煎方　又
方　又方　又方　止汗方　又方　麥門冬
湯　神效沃雪湯　桔梗枳殼湯　茵陳蒿大
黃湯　茅根湯　茵陳五苓散　雄黃丸　訶
黎勒丸　黃連丸　訶黎勒飲　燥腸丸　杜
仲酒　二瀝湯　人參湯　牡蠣散　羚羊角
丸　葳蕤湯　茯神散　龍齒丸　柴胡湯
鼈甲散　又方　補肺散　韭根散　六君子
湯　養脾湯　補脾湯　健脾散　熱病方
羚羊角散　鐵粉丸　生地黃煎　刺薊飲子
　龍膽煎　青葙子丸　解毒犀角丸　白蘚
皮散　藍葉散　茵陳散　承氣丸　木通散
　石葦散　人參養胃湯　藿香正氣散　不
換金正氣散　正陽散　麻黃杏仁飲　香蘇
飲　芎芷香蘇飲　十神湯　人參敗毒散
香葛湯　葱白散　參蘇飲　神术散　消風
百解散　雙解散　三一承氣湯　六一順氣
湯　陶氏黃龍湯　正陽散　破陰丹　復陽
丹　還陽散　退陰散　三黃石膏湯　三黃
巨勝湯　霹靂散　回陽返本湯　陽毒升麻
湯　陽毒梔子湯　葛根湯　芍藥甘草湯
陶氏益元湯　陶氏升陽散火湯　甘李根湯
　三白飲　活龍散

藝術典第三百七十五卷

醫部彙考三百五十五

傷寒門二十一

方二

浴腸湯（千金方下同）

治陽厥發狂將成疸

大黃四兩濕紙裹煨　大青　甘草炙各一兩

梔子二兩

右水五升煎去二升內朴硝五合熬去一升分四

服量虛實與之

五勝散

治四時傷寒目風身熱頭疼昏倦寒痰欬嗽及中滿傷寒三日以前服無不效

甘草　石膏　白朮　五味各一兩　乾薑炮三分

右五味同爲細末每服二大錢水二盞入生薑二片棗子一箇同煎至七分去滓溫服中滿以鹽煎傷風頭痛加荆芥煎不計時候服

欬逆方

治傷寒欬逆噎食尋常亦可服

丁香　柿蔕各一錢　甘草　良薑各半錢

右爲末用熱湯猛點乘熱一服效

青膏

治傷寒頭痛項強四肢煩疼

當歸　芎藭　蜀椒　白芷　吳茱萸　附子

烏頭　甘草各三兩

右八味㕮咀以醇苦酒漬之再宿以猪脂四斤煎令藥色黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服

取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳

黃膏

治傷寒赤色頭痛項強賊風走風

巴豆五十枚　大黃　附子　細辛　乾薑

蜀椒　桂心各半兩

右七味㕮咀以醇苦酒漬一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服梧子大一枚又以火摩身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊風所在摩之神效

白膏

治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫覆取汗摩身當千過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗瘡以布拭之傅膏癰腫火炙摩千過日再自消

天雄　烏頭　莽草　羊躑躅各三兩

右四味㕮咀以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十二聚濕土各一升許大取成煎猪脂三斤著

銅器中加竈上炊以葦薪令釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡徧藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近目

度瘴發汗青散

治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項强體疼

桔梗　細辛　吳茱萸　防風　白朮各一兩

川烏頭　乾薑　蜀椒　桂心各一兩六銖

麻黃三兩半

右十味治下篩溫酒服方寸匕溫覆取汗汗出止若不得汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭疼發熱此爲內實當服駃豉圓若藋氏圓如得便頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病

崔文行解散

治時氣不和傷寒發熱者

桔梗　細辛各四兩　白朮八兩　烏頭一斤

右四味治下篩若中傷寒服錢五匕覆取汗解若

不覺復小增之以知爲度若時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病者服一服皆酒服

六物青散

治傷寒赤色惡寒

附子　白朮各一兩六銖　防風　細辛各一兩十八銖　桔梗　烏頭各三兩十八銖

右六味治下篩以溫酒服五匕不知稍增之服後食頃不汗出者進溫粥一盃以發之溫覆汗漐漐可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸

青散

治春傷寒頭痛發熱

麻黃五兩　苦參　厚朴　石膏各三十銖

大黃　細辛各二兩　烏頭五枚

右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出多溫粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利

者有大黃故也

詔書發汗白薇散

治傷寒三日不解者

白薇十二銖　杏仁　貝母各十八銖　麻黃一兩八銖

右四味治下篩酒服方寸匕自覆汗出即愈

華佗赤散

治傷寒頭痛身熱腰背强引頸及風口噤瘧不絕婦人產後中風寒氣腹大

丹砂十二銖　雄黃二十四銖　蜀椒　蜀漆　乾薑　細辛　黃芩　防己　桂心　茯苓　人參　沙參　桔梗　女萎　烏頭各一十八銖　吳茱萸三十銖　麻黃　黛赭各二兩半

右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者二匕覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二匕半以意消息之細辛薑桂丹砂雄黃不熬餘皆熬之

[illegible]赤散

治傷寒頭痛項强身熱腰脊痛往來有時

乾薑　防風　沙參　細辛　白术　人參
蜀椒　茯苓　麻黃　黃芩　黛赭　桔梗
吳茱萸各一兩　附子二兩
右十四味治下篩先食酒服一錢匕日三

水解散

治時行頭痛壯熱一二日
桂心　甘草　大黃各二兩　麻黃四兩
右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖水服方寸匕日三覆取汗或利便瘥力强人服二方寸匕

延年祕錄黃連芍藥各二兩古今錄驗無甘草有芍藥治天行熱病生疱瘡疼痛及解肌出汗

六物解肌湯

治傷寒發熱身體疼痛
葛根四兩　茯苓三兩　甘草一兩　麻黃
牡蠣　生薑各二兩
右六味㕮咀以水八升煑取三升分三服再服後得汗汗通即止古今錄驗無生薑甘草

解肌湯

治傷寒溫病

葛根四兩　麻黃三兩　大棗十二枚　黃芩

芍藥　甘草各二兩

右六味㕮咀以水一斗煑取三升飲一升日三服三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沉實者宜以駃豉丸下之延年祕錄有桂心一兩

解肌升麻湯

治時氣三四日不解

升麻　芍藥　石膏　麻黃　甘草各一兩

杏仁三十枚　具齒三枚一作貝母十八銖

右七味㕮咀以水三升煑取一升盡服溫覆發汗便愈

葛根龍膽湯

治傷寒三四日不差身體煩毒而熱

葛根八兩　龍膽　大青各半兩　升麻　石膏

萎蕤各一兩　甘草　桂心　芍藥　黃芩

麻黃　生薑各三兩

右十二味㕮咀以水一斗煑葛根取八升內餘藥

煑取三升分四服日三夜一

又方

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

梔子仁　黃連　黃蘗　大黃各半兩　豉一升

葱白七莖

右六味㕮咀以水八升煑上四物六七沸內後葱白豉煑得三升頓服一升日三服湯訖溫覆令汗出粉之得汗便止後服勿復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老小神良

七物黃連湯

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

黃連　茯苓　黃芩各十八銖　甘草一兩六銖

芍藥　葛根各一兩　小麥三合

右各㕮咀以水七升煑取三升冷分三服不能一升者可稍稍服之湯勢安乃臥藥主毒氣服湯之後胷中熱及咽喉痛皆差其明日復煑一劑如法服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者取

三分之一以水四升煮得一升稍稍服

三匕湯

治傷寒中風得之三日至七八日不解胷脅痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消重下血一日數十行

茯苓如雞子大　黃芩　人參各三兩　芒硝

乾地黃各一升　大黃　麻黃　寒水石各半斤

苦蔞根四兩

右九味擣篩令相得以散三方寸匕水一升煮令三沸絞去滓服之日三溫覆汗出即愈病劇與六七匕

五香麻黃湯

治傷寒忽發腫或著四肢或在胷背虛腫浮如吹狀亦著頭面脣口頸項劇者偏著腳脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉主之

麝香半兩　薰陸香　雞舌香各一兩　沉香

青木香　麻黃　獨活　防風　秦艽　葳蕤

甘草各三兩　白薇　枳實各二兩

右十三味㕮咀以水九升煑取三升分三服覆取汗後外摩防己膏

又方

治傷寒三日外與前藥不差脉勢仍數者陽氣猶在經絡未入臟腑

石膏八兩　桂枝　黃芩　甘草各二兩　升麻　葛根　生薑各三兩　芍藥六兩　梔子二七枚

右九味㕮咀以水九升煑取二升七合分三服相去十里久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗更進一服得汗即止不得汗者明日去梔子加麻黃二兩足水二升再依方服

雪煎

治傷寒

大黃一斤十二兩金色者　杏仁三斗四升　麻黃十斤

右三味㕮咀以雪水五斛三斗漬麻黃於東向竈釜中三宿內大黃攪令調炊以桑薪煑得二斛汁去滓復內釜中搗杏仁內汁中復炊之可餘六七

斗汁絞去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸密盛藥勿令泄氣

神丹丸

治傷寒赤濇惡寒發熱體疼者

人參　茯苓　半夏各五兩　硃砂一兩　附子　烏頭各四兩

右六味末之蜜圓以眞丹爲色先食服如大豆二

圓生薑湯下日三須臾進熱粥二升許重覆汗出止若不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應解而不解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫飲解之治瘧先發服二圓要略用細辛不用人參別有射干棗大一枚名赤圓主寒氣厥逆

麥奴丸

治傷寒五六日以上不解熱在胷中口噤不能言惟欲飲水爲壞傷寒醫所不能治爲成死人精魂已竭心下纔溫以杖發其口開灌藥咽中藥得下

則愈麥奴圓一曰黑奴丸二曰冰解丸

麻黃二兩　麥奴　釜底墨　竈突墨　梁上塵

黃芩　大黃　芒硝各一兩

右八味末之蜜丸如彈子大以新汲水五合研一圓破漬置水中當藥消盡服之病者渴欲飲水極意不問升數欲止復强飲能多飲爲善不欲飲水當强飲之服藥須臾當寒寒竟汗出便解若服藥日移五尺許不汗復服如前法不過再三服佳小麥黑勃名麥奴

水導散

治時氣病煩熱如火狂言妄語欲走

甘遂十兩　白芷二兩　大黃四兩　厚朴八兩

枳實五枚　芒硝

右六味㕮咀以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煎取二升去滓下芒硝更煎一兩沸分再服得快利止

生地黃湯

治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便

不利

生地黃三斤　大黃四兩　大棗十二枚擘

甘草兩寸　芒硝二合

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

大柴胡葳蕤知母湯

治傷寒七八日不解默默心煩腹中有乾屎譫語

柴胡半斤　葳蕤　知母　大黃　甘草各二兩

人參　黃芩　芍藥各三兩　生薑切五兩

半夏半兩

右十味㕮咀以水一斗煑取三升去滓服一升日三卽下爲效集驗用枳實四枚不用芍藥

又方

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛

柴胡　梔子仁　芍藥　知母各四兩　升麻

黃芩　大青　杏仁去皮尖各三兩　石膏八兩

香豉一升

右十味㕮咀以水九升煑取二升七合分溫三服

若熱盛加大黃四兩

駃豉丸

消傷寒畱飲宿食不消

豆豉一升　巴豆去油三百枚（今用二百枚）　黃芩

黃連　大黃　麻黃各四兩　杏仁六十枚

芒硝　甘遂各三兩

右九味爲末以蜜和丸如大豆服二丸不得下者

增之

四物甘草湯

治傷寒發汗出而喘無大熱

甘草二兩　麻黃四兩　石膏半斤　杏仁五十枚

右四味㕮咀以水七升先煑麻黃令減二升內諸

藥煎取三升分三服

大青湯

治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱

不除及下利不止斑出者治之

大青四兩　甘草　阿膠各二兩　豆豉一升

右四味㕮咀以水八升煑取三升去滓煑三沸去

豉內阿膠令烊頓服一升日三服欲盡復作常使餘渴者當飲但除熱止吐下無毒

苦參湯

治熱病五六日已上

苦參三兩　黃芩二兩　生地黃八兩

右三味㕮咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日再

凝雪湯

治時行毒病七八日熱積聚胷中煩亂欲死

芫花一升

以水三升煑取一升半漬故布薄胷上不過三薄熱卽除當溫暖四肢護厥逆也

苦蔞湯

治傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔

苦蔞　黃芩　甘草各三兩　大棗十二枚

柴胡半斤　生薑四兩

右六味㕮咀以水一斗二升煑取五升絞去滓適寒溫服一升日三

蘆根飲子

治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食

生蘆根　青竹茹各一升　粳米三合　生薑三兩

右四味以水七升先煑千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

又方

治傷寒後嘔噦

通草三兩　生蘆根一升　橘皮一兩　粳米三合

右四味㕮咀以水五升煑取一升隨便稍飲不瘥更作取瘥止

又方

治傷寒後虛羸少氣嘔吐

石膏　麥門冬　半夏各一升　竹葉一把

人參一兩

右五味㕮咀以水一斗煑取六升去滓內粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方加生薑五兩

猪膽湯

治傷寒五六日斑出

猪膽　苦酒各三合　雞子一枚

右三味合煎三沸强者盡服之羸者須煎六七沸分爲二服汗出卽愈

鼻衄方

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此

牡蠣二兩半　石膏一兩六銖

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻衄者

咽痛方

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通

生烏扇一斤切　猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻　芍藥　羚羊角各三兩　通草四兩

射干二兩　生蘆根切一斤

右六味㕮咀以水七升煑取二升半分作三服

煎方

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴

石膏半升　蜜一升

右二味以水三升先煑石膏取二升次內蜜復煎取如錫含如棗核盡復含之大良

又方

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛

大棗二十枚　烏梅十枚

右二味和搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗

又方

治傷寒後下利膿血

阿膠一兩　黃蘗二兩　黃連四兩　梔子十四枚

右四味㕮咀以水六升煑取二升去滓內阿膠更煎令消分爲三服甲乙方無黃蘗有黃芩

又方

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有䘌蟲在下部

麝香　礬石　巴豆　附子　眞珠　雄黃各等分

右六味治合取桑條如箭簳長三寸以緜纏頭二寸唾濡緜展取藥著緜上內穀道中半日復易之日再神效

止汗方

杜仲　牡蠣各等分

右二味治下篩臨夜臥以水服五錢匕

又方

牡蠣　雷丸　麻黃根各三兩　米粉二升

乾薑　甘草各一兩

右六味治下篩隨汗處粉之

麥門冬湯

治勞復氣欲絕起死人

麥門冬一兩　甘草二兩　京棗三十枚擘

竹葉切一升

右四味㕮咀以水七升煑粳米一升令熟去米內諸藥煎取三升分三服不能服者緜滴湯內口中用之有效

神效沃雪湯

治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮堅者泡刮去皮　乾薑炮　甘草炙各六兩

厚朴去皮薑汁製　防風嫩者　白芍藥去皮

葛根各四兩

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時服少頃取生薑葱作羹或粥投之避風坐臥身體微潤即愈如疫氣正相傳染淸晨進一服爲佳常服每用二錢水一盞煎至八分服

桔梗枳殼湯

治結胷心下痛欲死者

桔梗炒　枳殼麩炒　甘草炙各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓服或不用生薑亦可疾多加半夏生薑有熱加黃芩

茵陳蒿大黃湯

治傷寒發黃面目悉黃小便赤宜服

茵陳蒿　山梔仁　柴胡　黃蘗蜜炙各半兩

龍膽草五錢　黃芩去黑心　升麻各一兩

大黃炒一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓早晚食後溫服

茅根湯

治傷寒發黃遍身如金色者

茅根洗剉　山梔子仁　茵陳蒿　地骨皮

甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢用水一盞半生薑三片豆豉三七粒同煎至一盞去滓早晚食遠溫服

茵陳五苓散

治傷寒溫濕熱病感冒後發爲黃疸小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥不對證因感濕熱病以致遍身發黃余嘗用茵陳五苓散治之甚效

生料五苓散一兩　茵陳半兩　車前子一錢

木通　柴胡各一錢半

酒後得證加乾葛二錢作㕮咀幷前藥和勻分作

二服每服水一椀燈草五十莖同煎八分去滓食前服滓再煎連進數服小便淸利爲愈

雄黃丸

治傷寒狐惑微煩默默欲臥毒氣上攻咽乾聲嗄下蝕濕䘌或便膿血

雄黃研　當歸炒各七錢半　檳榔半兩　蘆薈
麝香各研二錢半

右搗研爲末煑麪糊爲丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前溫粥飲下日三服

訶黎勒丸

治傷寒後膿血痢下部疼痛

訶黎勒炮去核　人參各一兩　白茯苓去皮
當歸焙　木香　白芷各七錢半　牡丹皮半兩

右擣羅爲末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下日再服

黃連丸

治傷寒熱病後熱毒下痢膿血

黃連炒七錢半　烏梅肉炒二兩

右爲細末煉蜜入少蠟和擣五六百杵丸如梧桐子大每服二十九加至三十九空心米飲下

訶黎勒飲

治傷寒後氣不和自利無度

訶黎勒去核　草豆蔻去皮各四枚並二生二煨

右㕮咀每服二錢匕漿水一盞煎至六分去柤空心溫服

燥腸丸

治傷寒汗下後大小便自利腹中痛者

附子一枚炮　乾薑一兩　龍骨　吳茱萸

訶黎勒去核　米殼各半兩

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服三十九溫水下痢止勿服

杜仲酒

治傷寒後體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲去粗皮炙二兩　獨活半兩　仙靈脾七錢半

牛膝　附子炮裂去皮臍各一兩

右細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日

後開每日取三二合溫服日三服未差再浸服

二瀝湯

治傷寒失音不語

竹瀝　荆瀝　梨汁各二合

右攪令勻以緜濾過分溫四服空心日晚各一服

人參湯

治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參半兩　白茯苓去皮半兩　麥門冬去心焙

黃芪各一兩　半夏湯洗七次炒　陳皮去白

白朮各半兩　甘草炙二錢半

右㕮咀每服五錢匕水一盞半入生薑三片棗三

枚擘破同煎至八分去滓食前溫服

牡蠣散

治傷寒後虛損心多怔悸夜夢洩精

牡蠣燒爲粉　桂心　白芍藥　鹿茸酥炙

龍骨各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎

至五分去柤食前溫服

羚羊角丸

治傷寒夜夢洩精不禁身體枯燥瘦瘠骨立者

羚羊角屑　犀角屑　石龍芮　韭子炒　龍骨

硃砂細研水飛　鹿茸酒浸炙　澤瀉各一兩半

桂心　木香各一兩

右爲細末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

葳蕤湯

風溫之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘其形

狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者必譫語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利如此病者宜服

葳蕤　白薇　麻黃　獨活　杏仁　川芎

甘草　青木香各一兩　石膏三兩

右㕮咀以水八升煮取三升去柤分三服取汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品方云葳蕤湯治冬溫春月中風傷寒則發頭腦疼痛咽喉乾舌強肉疼心胷

痞滿腰背強

茯神散

治傷寒後虛羸心氣乏力弱驚悸多忘

茯神　黃芪　菖蒲各一兩　遠志去心七錢半

人參　白芍藥各半兩

右㕮咀每服五錢水一中盞入棗三枚煎至六分

去滓不拘時溫服

龍齒丸

治傷寒後伏熱在心心虛驚悸

龍齒　人參　茯神　生地黃各一兩　遠志

鐵粉細研各半兩　黃連去鬚　馬牙硝細研

防風各七錢半　麝香研五分　麥門冬一兩半焙

右爲細末都研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服

二十丸竹葉金銀湯下不拘時服

柴胡湯

治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手足無力不

能飲食

柴胡　赤茯苓　黃芪　鼈甲去裙襴酢浸炙各一

兩　秦艽　地骨皮　黃芩　枳殼去穰麩炒

葛根各半兩　甘草炙　人參各七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分不拘時溫服

鼈甲散

治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向晚憎寒

鼈甲醋炙去裙襴　附子炮裂去皮臍　甘草炙

肉蓯蓉酒浸去皮炙乾　人參　黃芪　熟地黃

桃仁去皮尖幷雙仁麩炒　枳殼去穰麩炒

杜仲炙　五味子各七錢半　牡蠣煆一兩　柴胡

牛膝各七錢半　蒼朮炒一兩

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分不拘時溫服

又方

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心煩口乾咽喉不利

黃雌雞一隻去腸肚淨治如常法　麻黃根

牡蠣燒各二兩　肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮

右先將雞麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去雞麻黃根後下肉蓯蓉牡蠣煎取一盞半去滓分爲三服空心午前夜後臨臥時服

補肺散

治傷寒汗下後喘欬不止恐傳肺痿

人參一兩　五味　款冬花各半兩　蛤蚧一對

桑白皮二兩

右爲細末每服五錢沸湯一盞調服

韭根散

治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翕翕氣劣著牀不能起動甚者手足拳卵腫疼痛

韭根　苦蔞根各二兩　青竹茹　乾薑炮各半兩

右細剉和勻分作八服每服用水一大盞煎至五分去滓入鼠糞末一字攪令勻不拘時服聖濟方擣篩五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓食前溫服一名豐本湯

六君子湯

治傷寒汗下之後將見平復宜服此調理助脾進

食辟邪氣大妙

人參　白朮　黃芪　茯苓　山藥　甘草各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至七分去滓溫服

養脾湯

治傷寒後脾胃虛弱不思飲食

茯苓　乾薑炮各一兩　白朮二兩　丁香

人參　甘草各半兩

右如法事治一處搗羅爲末每服三錢水一盞煎至六分溫服日進三服不拘時候

補脾湯

治傷寒汗後傷冷物胷膈不快尋常血氣不和

人參　乾薑　白朮　陳皮去白　青橘皮去白

甘草各等分

右爲細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

健脾散

治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食縱食不能消化

訶黎勒皮　白术　麥蘖炒微黃　人參各一兩

神麴炒　甘草炙　枳殼麸炒　大腹皮各半兩

乾薑七錢半炮

右㕮咀每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時稍熱服

熱病方

治熱病五六日壯熱狂語欲走

雞子二枚取清　芒硝細研　寒水石細研各半兩

右先以新汲水一小盞調芒硝等末次下雞子清攪令勻不拘時候分爲二服

羚羊角散

治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發熱癲狂

羚羊角屑　犀角屑　茯神　黃芩　甘草炙

防風各半兩　龍齒　人參　鐵粉各一兩

地骨皮三分

右㕮咀每服五錢水一大盞煎五分去滓不拘時溫服

鐵粉丸

治熱病心神恍惚悲喜不常發狂欲走

鐵粉　牛黃並細研　遠志去心　丹參　茯神

升麻各半兩　金箔三七片細研　麝香細研

白殭蠶炒　白附子炮各二分　馬牙硝細研三分

右爲細末同研令勻煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服二三十丸不拘時薄荷湯下

生地黃煎

治熱病心胷煩熱口乾皮肉黃宜服

生地黃汁　生苦蔞汁　生麥門冬根汁各五合

蜜二合　酥一兩　生藕汁三合

右一處相和於鍋中熬令稍稠每服不拘時抄半匙服

刺薊飲子

治熱病頭痛壯熱鼻衄及吐血心中緊硬遍身疼痛四肢煩悶宜服

刺薊　生地黃　生麥門冬去心各一兩　雞蘇

生薑　赤茯苓各半兩　青竹茹一分

右㕮咀水三大盞煎一盞半去滓不拘時分溫三

服

龍膽煎

治熱病口瘡發渴疼痛不可忍宜塗

龍膽草　黃連　升麻　槐白皮　大青各一兩

薔薇根　竹葉各二兩

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢火煎成膏塗於瘡上有涎吐之

青葙子丸

治熱病毒攻於眼內生瞖膜宜服

青葙子　防風　枳殼麩炒各一兩　枸杞子

生地黃　石決明　澤瀉各一兩半　茺蔚子

細辛　黃連各三分　麥門冬二兩半去心焙

車前子一兩

右爲細末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服三十丸以粥清飲下不拘時服

解毒犀角丸

治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服

犀角屑　黃芩　麥門冬去心焙　馬牙硝

大青各一兩　梔子仁　牛黃細研　赤茯苓
天竺黃細研　甘草生用　川黃連各半兩
麝香細研一錢

右爲細末每服二錢不拘時竹葉煎湯調下

白蘚皮散

治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡

白蘚皮　升麻　犀角屑　梔子仁　赤芍藥
黃芩　大黃炒　甘草炙　杏仁湯浸去皮尖炒
元參各半兩　麥門冬一兩去心焙

右㕮咀每服四錢水一中盞煎六分去柤不拘時溫服

藍葉散

治熱病熱毒盛疱瘡出頭黑者爲難治

藍葉　元參　大香　瞿麥各一兩　犀角屑
升麻各一兩半　甘草炙半兩

右㕮咀每服五錢以水一大盞煎五分去柤不拘時溫服

茵陳散

治熱病黃疸目黃如金小便如血心煩躁悶口苦頭痛宜服

茵陳　梔子各三分　木通　苦蔞根　柴胡
秦艽各一兩　甘草炙半兩　麥門冬一兩半

右㕮咀每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不拘時候溫服

承氣丸

治熱病若十餘日不大便者宜服

大黃炒　芒硝各二兩　枳實麩炒　火麻仁研
郁李仁湯浸去皮研各一兩

右爲細末和勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十丸不拘時以溫水下未利再服

木通散

治熱病小便不通或淋瀝疼痛

木通　琥珀別研各一兩　赤芍藥　枳實麩炒
茅根　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四大錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

石葦散

治熱病小便不通

石葦去毛　瞿麥各一兩　木通　甘草炙
子芩各半兩　葵子三合

右㕮咀每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

人參養胃湯（入門）

治傷寒陰證及外傷風寒內傷生冷憎寒壯熱頭痛身疼

陳皮　厚朴　半夏製各一錢二分半　茯苓
藿香各一錢　人參　草果　甘草炙各五分
蒼朮一錢半

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一箇水煎服令微汗濈濈然自然解散若有餘熱以參蘇飲款款調之

藿香正氣散（醫鑑）

治傷寒陰證頭痛身疼如不分表裏證以此導引經絡不致變動

藿香一錢半　紫蘇葉一錢　白芷　大腹皮

白茯苓　厚朴　白术　陳皮　半夏製　桔梗

甘草炙各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

不換金正氣散（入門）

治傷寒陰證頭痛身疼或寒熱往來

蒼术二錢　厚朴　陳皮　藿香葉　半夏泡

甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

正陽散（本草）

治陰證傷寒

麻黃一錢半　陳皮　大黃生　乾薑　肉桂

芍藥　附子炮　半夏製　甘草炙各七分

吳茱萸五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服取汗

麻黃杏仁飲（入門下同）

治傷寒太陽經發熱惡寒頭痛無汗脉浮緊

防風七分　麻黃　桔梗　前胡　黃芩　陳皮

半夏製各一錢　杏仁　細辛各八分　甘草四分

右剉作一貼入生薑三片水煎服

香蘇飲

治四時傷寒頭痛身疼發熱惡寒及傷風傷濕傷寒時氣瘟疫

香附　蘇葉各二錢　蒼朮一錢半　陳皮一錢

甘草炙五分

右剉作一貼入薑三片葱白一莖水煎服

芎芷香蘇飲（得效）

治傷寒傷風表證頭項强百節痛陰陽未分皆宜

香附子　紫蘇葉各二錢　蒼朮一錢　陳皮

川芎　白芷各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

十神湯（入門）

治兩感風寒頭痛寒熱無汗

香附　紫蘇葉　升麻　赤芍藥　麻黃　陳皮

川芎　乾薑　白芷　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

人參敗毒散（醫鑑）

治傷寒時氣發熱頭痛項強肢體煩疼及傷風欬嗽鼻塞聲重

羌活　獨活　柴胡　前胡　枳殼　桔梗

川芎　赤茯苓　人參　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片薄荷少許水煎服本方加天麻地骨皮等分名人參羌活散加荊芥穗防風等分名荊防敗毒散

香葛湯（得效）

治傷寒不問陰陽兩感頭痛寒熱

蒼朮　紫蘇葉　白芍藥　香附　升麻　乾葛

陳皮各一錢　川芎　白芷　甘草各五分

右剉作一貼入薑三片葱白二莖豉七粒水煎服

葱白散（局方）

治四時傷寒傷風頭痛體熱煩渴

麻黃二錢　蒼朮　白朮　川芎各一錢半

石膏　乾葛　甘草各七分半

右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

參蘇飲（易簡）

治外感風寒頭痛發熱欬嗽及內因七情痰盛胷滿潮熱

人參　紫蘇葉　前胡　半夏製　乾葛　赤茯苓各一錢　陳皮　桔梗　枳殼　甘草各七分半

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

神术散

治傷寒傷風頭痛體疼惡寒無汗

蒼术二錢　荊芥　藁本　乾葛　甘草炙　麻黃各一錢

右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服驗

消風百解散（入門）

治感傷風寒頭痛身疼鼻塞聲重

荊芥　蒼术　白芷　陳皮　麻黃各一錢甘草五分

右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

雙解散（河間）

治傷寒表裏不解

滑石三錢　石膏　黃芩　桔梗各七分　防風

川芎　當歸　赤芍藥　大黃　麻黃　薄荷

連翹　芒硝　荊芥　白朮　梔子各五分

甘草一錢

右剉作一貼入薑三片葱白三莖豉半合同煎服

此方乃益元散與防風通聖散合劑也益元散通裏通聖散發表兩得其宜也

三一承氣湯（得效）

治傷寒雜病入裏之深大小便不通者

甘草三錢　大黃　厚朴　枳實　芒硝各一錢半

右剉作一貼入薑三片煎至半去查入芒硝再一沸溫服

六一順氣湯（入門）

治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾讝語發狂潮熱自汗胷腹滿痛等證以代大小調胃三一承氣大柴胡大陷胷等湯之神方也

大黃二錢　枳實　厚朴　芒硝　柴胡　黃芩

芍藥　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片水煎至半去滓入鐵銹水二匙調服

陶氏黃龍湯（節菴）

治熱邪傳裏胃中燥糞結實心下硬痛純下清水

大黃二錢　芒硝一錢半　枳實　厚朴各一錢

人參　當歸　甘草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎溫服

正陽散（得效）

治傷寒陰毒證

附子炮一兩　乾薑炮　甘草炙各二錢半

皂角一挺　麝香一錢

右爲末每二錢水一盃煎至五分和查熱服一方用白湯調下

破陰丹（入門下同）

治陰毒脈伏及陽脫無脈厥冷不省

硫黃五兩　硝石　太乙元精石各二兩　乾薑

附子　桂心各五錢

爲末用鐵銚先鋪元精次鋪硝石各一半中間鋪

硫黃末又鋪硝石元精餘末蓋上以小盞合著地上候冷取出入餘藥同爲末糊丸梧子大艾湯下三十丸汗出爲度

復陽丹

治陰毒面青肢冷脉沉

華澄茄　木香　吳茱萸　全蠍　附子炮

硫黃各五錢　乾薑一錢

右爲末酒糊和丸梧子大薑湯下三十丸復以熱酒投之取汗

還陽散（本事下同）

治陰毒面青肢冷心躁腹痛

硫黃

爲末每二錢新汲水調下良久或寒一起熱一起再服汗出而差

退陰散

治傷寒陰毒

川烏　乾薑等分

右爲粗末炒令轉色放冷再爲細末每一錢鹽一

捻水少許同煎溫服

三黃石膏湯（醫鑑）

治陽毒發斑身黃眼赤狂叫欲走讝語六脈洪大

麻黃一錢　石膏三錢　黃芩　黃連　黃蘗

山梔仁各一錢半　香豉半合

右剉作一貼入薑三片細茶一撮水煎服

三黃巨勝湯（入門下同）

治陽毒發狂極甚姑以劫之

卽前三黃石膏湯去麻黃豆豉加芒硝大黃

入薑一片棗二枚水煎臨熟加泥漿清水二匙服

霹靂散

治陰盛格陽證

附子一枚炮過以冷灰培半時許取出切半箇

細剉入蠟茶一錢水一盞煎至六分去查入熟蜜

半匙放冷服之須臾躁止得臥汗出差

回陽返本湯

治陰盛格陽證

附子炮　乾薑炮　人參　陳皮　麥門冬

五味子　甘草炙　蠟茶各一錢

右剉作一貼以清泥漿二盞同煎去滓入蜜五匙調和放冷服之取汗爲效面赤者入葱白七莖黃連少許同煎服

陽毒升麻湯（活人下同）

治傷寒陽毒面赤狂言或見鬼脉浮大數

黃芩二錢　甘草十分　升麻　射干　人參

犀角各一錢半

右剉作一貼水煎服出汗則解

陽毒梔子湯

治陽毒

石膏二錢　升麻　黃芩　杏仁　柴胡各一錢

梔子　赤芍藥　知母　大青各七分　甘草五分

右剉作一貼入薑五片豉百粒同煎服

葛根湯（海藏）

治陽毒

葛根二錢　黃芩　大黃酢炒　梔子　朴硝

甘草各一錢半

右剉作一貼水煎服

芍藥甘草湯（丹溪）

治汗後惡寒

桂枝二錢　甘草炙一錢半　芍藥　白朮

附子炮各一錢

右剉作二貼水煎服

陶氏益元湯（入門）

治傷寒戴陽證

甘草炙二錢　附子炮　乾薑炮　人參各一錢

五味子二十粒　麥門冬　黃連　知母各七分

熟艾三分

右剉作一貼入生薑五片棗二枚葱白三莖水煎

臨熟入童尿三匙去滓放冷服之

陶氏升陽散火湯

治撮空證此因肝熱乘肺元氣虛弱不能主持以

致讝語神昏叉手冒心或撮空摸牀

人參　當歸　芍藥　柴胡　黃芩　白朮

麥門冬　陳皮　茯神　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚入熟金同煎服

甘李根湯（入門）

治動氣誤發汗氣上衝正在心端

李根皮五錢　桂枝一錢半　當歸　芍藥

茯苓　黃芩各一錢　半夏　甘草各五分

右剉作一貼入薑三片水煎服

三白飲（醫鑑）

治傷寒熱病熱極狂走

雞子清一箇　白蜜一大匙　芒硝三錢

右合作一處凉水調下

活龍散（入門）

治陽毒發狂

活地龍大者四五條淨洗研取汁

入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和徐徐灌

盡漸次凉快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十六卷目錄

醫部彙考三百五十六
傷寒門二十二
方三 大羌活湯 陶氏沖和湯 葛根解肌湯
九味羌活湯 四順理中湯 四順理
中丸 治中湯 三黃熟艾湯 薤白湯 附
子散 白朮散 回陽救急湯 陽旦湯 陰
旦湯 五積散 莘黃三白湯 黃連解毒湯
柴苓湯 柴胡連翹湯 知母麻黃湯 參
胡芍藥湯 奪命湯 鼈甲散 陶氏柴胡百
合湯 麥門冬湯 鼠屎豉湯 梔豉枳黃湯
七味葱白散 益氣養神湯 猳鼠糞湯
青竹茹湯 竹皮湯 乾薑湯 竹皮逍遙散

人參逍遙散　桂枝紅花湯　五味子湯
陶氏導赤各半湯　黃連犀角湯　桃仁湯
雄黃銳散　酸棗仁湯　烏梅湯　辰砂五苓
散　辰砂益元散　溫經益元湯　陶氏再造
散　附子理中湯　朮附湯　回陽湯　防風
沖和湯　沖和散　沃雪湯　升麻葛根湯
加味益氣湯　陶氏補中益氣湯　十味和解
散　加減白虎湯　靈砂　金液丹　至聖來
復丹　加味理中湯　代灸塗臍膏　衝寒散
　大補元煎　左歸飲　右歸飲　五福飲
一陰煎　加減一陰煎　二陰煎　三陰煎
大營煎　小營煎　補陰益氣煎　金水六君
煎　大和中飲　小和中飲　小分清飲　百
順丸　一柴胡飲　二柴胡飲　三柴胡飲
四柴胡飲　五柴胡飲　正柴胡飲　麻桂飲
　大溫中飲　柴陳煎　柴芩煎　柴胡白虎
煎　歸葛飲　抽薪飲　徙薪飲　大分清飲
　玉女煎　玉泉散　四味回陽飲　六味回
陽飲　理陰煎　養中煎　溫胃飲　五君子
煎　胃關煎　煖肝煎　罨結胷法

藝術典第三百七十六卷

醫部彙考三百五十六

傷寒門二十二

方三

大羌活湯（東垣）

解利兩感傷寒或傷寒見風風脉傷風見寒脉發熱惡寒無汗頭痛項强等證

羌活　防風　獨活　防己　黃芩　黃連

蒼朮　白朮各七分　細辛　甘草各五分

生地黃　知母　川芎各二錢

右剉作一貼水煎服未解再服三四貼此方治陰陽已分陽證多者宜服

陶氏沖和湯（入門）

治兩感傷寒陰陽未分者以此探之

羌活　蒼朮　防風　川芎　生地黃　黃芩

柴胡　乾葛　白芷　石膏各一錢　細辛

甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚黑豆三七粒同煎服一名沖和靈寶飲

葛根解肌湯（回春）

治陽明經病目疼鼻乾不得臥宜解肌

葛根　柴胡　黃芩　芍藥　羌活　石膏

升麻　白芷　桔梗各一錢　甘草五分

右剉一貼入薑三片棗二枚水煎服一名柴葛解肌湯

九味羌活湯（節菴）

不問四時但有頭痛骨節痛發熱惡寒無汗脉浮

緊宜用此以代麻黃爲穩當有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若誤服則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌乃解表神方

羌活　防風各一錢半　蒼朮　川芎　白芷

黃芩　生地黃各一錢二分　細辛　甘草各五分

右剉作一貼入生薑三片大棗二枚葱白二莖水煎服一名羌活沖和湯

四順理中湯（類聚）

治腹痛自利

卽理中湯倍甘草一倍是也一名四順湯

四順理中丸

卽理中湯倍甘草一倍爲末蜜和作丸彈子大也一名四順丸

治中湯（三因）

治太陰腹痛

卽理中湯加陳皮青皮等分也

三黃熟艾湯（活人下同）

治傷寒大熱利不止

黃芩　黃連　黃蘗　熟艾各一錢半

右剉作一貼水煎服

薤白湯

治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛

豆豉半合綿裹　薤白一握　梔子七枚

右剉水二升半先煎梔子十沸下薤白煎至二升入豉煎至一升二合分二服

附子散（得效）

治傷寒陰毒

附子炮二錢半　桂心　當歸　白朮各二錢

半夏製　乾薑炮各一錢

右剉作一貼入薑三片水煎服

白朮散（丹溪）

治傷寒陰毒四肢逆冷心胷煩躁

川烏炮　桔梗　白朮　附子炮　細辛各五錢

乾薑炮二錢半

右爲末每二錢水煎服

回陽救急湯（醫鑑）

治傷寒陰證及陰毒四肢厥冷脉沉細脣青面黑

人參　白朮　白茯苓　陳皮　半夏　乾薑炮

肉桂　附子炮　五味子　甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑七片水煎服

陽旦湯（入門下同）

治傷寒陽證身大寒反不欲近衣此爲內熱外寒

桂枝　芍藥各三錢　黃芩二錢　甘草一錢

右剉作一貼入薑一片棗二枚水煎服

陰旦湯

治傷寒陰證身大熱反欲近衣此爲內寒外熱

桂枝二錢　黃芩　乾薑各一錢半　芍藥

甘草各一錢

右剉作一貼入棗二枚水煎服

五積散

治感傷風寒頭痛身疼四肢逆冷胷腹作痛嘔吐

泄瀉或內傷生冷外感風寒並皆主之

蒼朮二錢　麻黃　陳皮各一錢　厚朴　桔梗

枳殼　當歸　乾薑　白芍藥　白茯苓各八分

白芷　川芎　半夏　桂心各七分　甘草六分

右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服海藏除白芷肉桂餘藥慢火炒令色變攤冷入桂芷名曰熟料五積散不炒者名曰生料五積散

莘黃三白湯

治陰證傷寒在表經者

人參　白朮炒　白芍藥各二錢　白茯苓

當歸各一錢　細莘　麻黃各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

黃連解毒湯（活人）

治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒

黃連　黃芩　黃蘗　梔子各一錢二分半

右剉作一貼水煎服

柴芩湯（丹溪）

治傷寒熱病發熱泄瀉

柴胡一錢六分　澤瀉一錢三分　白朮　猪苓

赤茯苓各七分半　半夏七分　黃芩　人參

甘草各六分　桂心三分

右剉作一貼入薑三片水煎溫服

柴胡連翹湯（醫鑑）

治傷寒發熱讝語呻吟睡臥不得

柴胡　黃芩　枳殼　赤芍藥　桔梗　苦蔞仁

梔子仁　連翹　黃連　黃蘗　甘草各八分

右剉作一貼入薑三片水煎服

知母麻黃湯（入門下同）

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由汗下不盡毒留心胞間所致也

知母三錢　麻黃　赤芍藥　黃芩　桂心

甘草炙各一錢

右剉一貼水煎服微汗卽愈一本以桂枝代桂心

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安臥不思飲食大便不快小便黃赤此爲外證

生地黃一錢半　人參　柴胡　芍藥　黃芩

知母　麥門冬各一錢　枳殼八分　甘草三分

右剉作一貼入薑三片水煎服

奪命湯（丹溪）

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽二證不明過經不解及或因誤服藥困重垂死一切危急之證

人參一兩

右剉作一服水二升於銀石器內煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻梁上出涓涓如水是藥之效也一名獨參湯

鼈甲散（入門下同）

治壞證諸藥不效

鼈甲二錢　犀角　前胡　黃芩　生地各一錢

枳殼八分　烏梅二箇

右剉作一貼水煎服

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證

鼈甲酢炙二錢　柴胡　百合　知母　生地黃

陳皮　人參　黃芩　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

麥門冬湯（海藏）

治勞復氣欲絕能起死回生

麥門冬二錢　甘草炙三錢　粳米一合

右水二盞先煎粳米令熟去米入二藥及棗二枚

青竹葉十五片煎至一盞溫服加人參尤妙

鼠屎豉湯（活人）

治同上

梔子七箇　雄鼠屎七枚　枳殼一枚炒

右以水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至

一盞分二服勿令病人知

梔豉枳黃湯（入門）

治食復發熱

梔子仁　枳殼　柴胡各一錢　香豉五錢

大黃三錢

右剉水煎服

脹腹加厚朴

傷肉加山楂

傷麪飯加神麯

七味葱白散（活人）

治勞復食復

葱白連根三莖　乾葛　麥門冬　熟地各三錢

香豉半合　生薑切一合

右剉以甘爛水四升煎至三分之一去滓分二服

益氣養神湯（回春）

治勞復宜養氣血

人參　當歸　白芍藥酒炒　麥門冬　知母

梔子仁炒各一錢　白茯神　前胡各七分

陳皮五分　升麻生　甘草各二分

右剉作一貼入棗二枚水煎服

豭鼠糞湯（海藏）

治男子陰易病

韭白根一把　豭鼠糞十四箇

右以水二升煮取半升去滓溫服取微汗未汗再

服豭鼠雄鼠也糞兩頭尖者是

青竹茹湯（入門）

治勞復及陰陽易病

苦蔞根五錢　青竹茹二錢

右剉作一貼水煎服一名苦竹湯治法服法同

竹皮湯（綱目）

治陰陽易及勞復病

青竹刮取皮一升

水三升煑取一升分二服一名竹茹湯

乾薑湯（得效）

治陰陽易病速當汗之滿四日不可療

乾薑三錢

右剉水煎服得汗出手足伸卽愈

竹皮逍遙散（入門下同）

治勞復及易病

青竹皮（卵縮腹痛倍之）　生地黃　人參　知母　黃連

滑石　韭白　柴胡　犀角　甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚煎臨服入燒裩襠

末一錢半調服微汗之未汗再服

人參逍遙散

治女勞復虛弱者

人參　當歸各二錢　柴胡一錢半　白朮

白芍藥　白茯苓各一錢

右剉作一貼水煎服

桂枝紅花湯

治熱入血室及血結胷

桂枝　芍藥　甘草各一錢半　紅花一錢

右剉作一貼入薑四片棗二枚水煎服汗出而解

五味子湯（活人）

治傷寒喘促脈伏而厥

五味三錢　人參　麥門冬　杏仁　陳皮各二錢

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服一名加味

生脈散

陶氏導赤各半湯（入門）

治差後昏沉

黃芩　黃連　梔子　知母　麥門冬　茯神

犀角　人參　滑石各一錢　甘草五分

右剉作一貼入薑一片棗二枚燈心一握煎入生

芋汁三匙服一名瀉心導赤散

黃連犀角湯（回春）

治狐惑

黃連　犀角　烏梅　木香　桃仁各一錢

右剉作一貼水煎服空心

桃仁湯（得效下同）

治同上

桃仁　槐子碎　艾葉各二錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎空心服

雄黃銳散

治下部䘌瘡

雄黃　靑葙子　苦參　黃連各二錢　桃仁一錢

右爲末以生艾汁和如棗核大緜裹納下部

酸棗仁湯（活人下同）

治傷寒後虛煩不得眠

棗仁炒二錢　麥門冬　知母各一錢半　茯苓

川芎各一錢　乾薑　甘草炙各一分半

右剉作一貼水煎服

烏梅湯

治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

柴胡二錢　梔子炒　黃芩　甘草炙各一錢

烏梅肉二箇

右剉作一貼入薑三片豉五十粒同煎服

辰砂五苓散（丹溪）

治傷寒發熱狂言讝語及差後熱不退虛煩等證

澤瀉　赤茯苓　猪苓　白朮各二錢半　肉桂

辰砂各五分

右細末每二錢沸湯煎服

辰砂益元散（入門下同）

治傷寒熱不退狂言讝語

滑石六兩　甘草　辰砂各一兩

右細末每二錢井水調下日二三

溫經益元湯

治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身慄筋惕肉瞤

熟地黃　人參　白朮　黃芪蜜炒　白芍藥

當歸　生地黃　白茯苓　陳皮　甘草各一錢

桂皮　附子炮各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚糯米一撮水煎服

陶氏再造散

治陽虛不得汗名曰亡陽證

人參　黃芪　桂皮　附子炮　細辛　羌活

防風　川芎　甘草炙各一錢

右剉作一貼入煨薑一片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎一二沸溫服

附子理中湯（三因）

治中寒口噤身强直

附子炮　人參　白朮　乾薑炮　甘草炙各一錢

右剉作一貼水煎服一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮厚朴各等分煎服亦名附子理中湯

朮附湯（得效下同）

治傷寒

白朮三錢　甘草炙一錢半　附子炮一錢

右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合丸三九服之

回陽湯

治中寒

益智　青皮各二錢　川烏生　附子生各一錢

乾薑炮五分

右剉作一貼入薑七片棗二枚水煎服

防風沖和湯

治春夏秋感冒風寒頭痛身熱自汗惡寒脉浮緩

羌活　防風各一錢半　白朮　川芎　生地黃

白芷　黃芩各一錢　細辛　甘草各五分

右剉作一劑入薑三片葱三莖水煎服一名加減沖和湯

沖和散

治四時感冒風寒

蒼朮四錢　荆芥　甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

沃雪湯（類聚）

解利四時傷寒溫和表裏通順陰陽

蒼朮三錢　厚朴一錢半　川芎　當歸　防風

白芍藥　陳皮　葛根　甘草各七分

右剉作一貼水煎服

升麻葛根湯（局方）

治溫病及時令感冒

葛根二錢　白芍藥　升麻　甘草各一錢

右剉作一貼薑三片葱二莖煎服

加味益氣湯（回春）

治勞力感寒證

人參　黃芪　防風　柴胡各一錢　白朮

陳皮　當歸各七分　羌活一錢半　甘草五分

升麻　黃蘗酒炒各二分

右剉作一貼入薑三片水煎服熱甚加酒炒黃芩三分

陶氏補中益氣湯（入門）

治內傷氣血外感風寒頭痛身熱惡寒自汗沉困無力

人參　生地黃　黃芪　當歸　川芎　柴胡

陳皮　羌活　白朮　防風各七分　細辛

甘草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚葱白二莖水煎服

如元氣不足加升麻三分

十味和解散（丹溪）

治外感內傷頭痛身熱

白朮四錢　桔梗二錢　當歸　陳皮　枳殼

防風　白芍藥　厚朴　人參　甘草各五分

右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服

加減白虎湯（寶鑑）

治沉寒痼冷臍腹冷痛大便自利足脛寒而逆

附子炮二錢　乾薑炮　肉桂　草豆蔻煨

半夏　人參　白朮　甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑五片葱白五莖水煎服仍灸氣

海三里穴

靈砂（局方下同）

治諸虛痼冷厥逆如神

水銀四兩　硫黃一兩

右同入鐵銚內炒成砂子有烟焰起以酢灑之研

細入水火鼎赤石脂封口鹽泥固濟炭三十斤煆

經宿取出細研糯米糊和丸麻子大每五七丸以至十五丸空心以人參大棗湯下忌食猪羊血菜豆粉冷滑之物

金液丹

治久寒痼冷及吐利日久身冷脉微

硫黃十兩

右研細飛過盛磁盒內以赤石脂抿縫外以鹽泥固濟先掘地坑埋小罐子盛水令滿安盒子在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火一斤煆取出放冷研爲細末每藥末一兩用蒸餅一兩湯浸去水搗和丸梧子大每三十丸多至百丸溫米飲下空心服

至聖來復丹（活人）

治痼冷心腹冷痛臟腑虛滑及霍亂吐瀉脉微欲絕又治榮衛不交泰心腎不升降上實下虛氣塞痰厥一切危急之證但有胃氣無不獲安此藥配合二氣均調陰陽可冷可熱可緩可急功效殊勝

硫黃　硝石各一兩

右爲細末入銚內以微火慢炒用柳木篦不住手攪令陰陽氣相入再研極細名曰二氣砂乃入水飛五靈脂陳皮青皮末各二兩次入太陰元精石末一兩和勻酢糊和丸豌豆大空心米飲下三十丸或五十丸此鐵瓮城八角杜先生方也一名正一丹

加味理中湯（同春）

治痼冷積寒

附子炮　人參　白朮　乾薑炒　肉桂　陳皮

白茯苓　甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑二片棗二枚水煎服

代灸塗臍膏（海藏）

治痼冷臍腹痛

附子　馬藺子　蛇牀子　吳茱萸　肉桂　木香

右爲細末用白麪一匙薑汁調成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其力可代灸百壯

衝寒散（入門）

治痼冷腹痛泄瀉飲食減少

香附子　陳皮　草果各一錢半　縮砂　白薑

肉豆蔻各七分　藿香　白茯苓　吳茱萸

木通各三分

右爲末每二錢溫酒或薑湯調下或剉作一貼水煎服

大補元煎（景岳全書下同）

凡元氣太虛者雖有寒邪亦不可攻必單培根本正復邪將自散或眞寒假熱等證皆宜用此

人參少則一二錢多則一二兩　炙甘草一二錢

熟地少則二三錢多則二三兩　當歸（若泄瀉便滑者去之）

枸杞各二三錢　山茱萸一錢（畏酸吞酸者去之）　杜仲

山藥炒各二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

左歸飲

凡命門眞陰虧損雖有寒邪不可攻者宜此

熟地二三錢或加至一二兩　炙甘草一錢

山藥　枸杞各二錢　山茱萸一二錢（畏酸者少用）

茯苓一錢半

水二鍾煎七分食遠服

右歸飲

凡命門陽衰或陰盛格陽感邪不可攻者宜此

熟地用如前　山藥　枸杞　杜仲薑製各二錢

山茱萸一錢　肉桂去皮　甘草炙各一二錢

製附子一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服

五福飲

凡五臟氣血俱虛者宜此爲主

人參　熟地俱隨宜　當歸三錢　炙甘草一錢

白朮炒一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服或加生薑三五片

一陰煎

凡腎水眞陰不足而虛火爲邪者宜此

熟地三五錢　甘草一錢　生地　芍藥　麥冬

丹參各二錢　牛膝一錢半

水二鍾煎七分食遠溫服

加減一陰煎

凡水虧火盛煩熱動血者宜此

生地　芍藥　麥冬各二錢　熟地三五錢

炙甘草五七分　知母　地骨皮各一錢

二陰煎

凡心經有熱狂笑煩熱失血者宜此

生地　麥冬各二三錢　棗仁二錢　元參

茯苓　木通各一錢半　黃連或用一二錢

生甘草一錢

水二鍾燈草二十根竹葉亦可煎七分食遠服

三陰煎

凡三陰不足及風瘧多汗而正氣不復寒熱不止者宜此

當歸二三錢　熟地三五錢　炙甘草一錢

芍藥酒炒　棗仁各二錢　人參隨宜

水二鍾煎七分食遠服

大營煎

此大補元煎之次也酌宜用之

當歸二三錢或五錢　熟地三五七錢　炙甘草

桂各一二錢　牛膝一錢半　枸杞　杜仲各二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

小營煎

凡血少陰虛而無火者宜此

熟地二三錢　當歸　芍藥酒炒　山藥炒

枸杞各二錢　炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服

補陰益氣煎

凡邪陷陰中陰虛不能作汗身熱不退或往來寒熱者宜此

人參一二三錢　當歸　山藥酒炒各二三錢

熟地三五錢或一二兩　陳皮　炙甘草各一錢

升麻三五分（火浮於上者不必用）　柴胡一二錢（無外邪者不必用）

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

金水六君煎

凡陰虛受寒欬嘔喘促吞酸痞滿等證宜此

當歸　半夏　茯苓各二錢　陳皮一錢五分

熟地三五錢　炙甘草一錢

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服

大和中飲

凡邪結胃脘氣逆食滯者宜此

陳皮一二錢　枳實一錢　砂仁五分　山楂

麥芽各二錢　厚朴　澤瀉各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

凡胷膈脹滿嘔惡氣滯者宜此

陳皮　茯苓　厚朴各一錢五分　甘草五分

山楂　扁豆炒各二錢

水一鍾半加生薑三五片煎服

小分清飲

凡小水不利濕滯腫脹泄瀉者宜此

茯苓　澤瀉　猪苓各二三錢　薏仁二錢

枳殼　厚朴各一錢

水一鍾半煎七八分食前服

百順丸

凡三焦熱祕邪不解者宜此

川大黃錦紋者一斤　牙皂角炒微黃一兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅搗丸菉豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜爲丸亦可

一柴胡飲

凡六經初感內外俱有熱者宜此

柴胡二三錢　芍藥二錢　甘草八分　黃芩

生地　陳皮各一錢半

水一鍾半煎七八分溫服

二柴胡飲

凡邪感三陽及三陽併病寒勝者宜此主之三陰初感者亦可用

陳皮　厚朴各一錢半　半夏二錢　甘草八分

細辛一錢　柴胡一錢半或二三錢

水一鍾半生薑三五七片煎七八分溫服

三柴胡飲

凡肝脾陰虛血少而偶感風寒者宜此

柴胡二三錢　芍藥一錢半　當歸二錢（溏泄易以熟地）

炙甘草　陳皮各一錢

水一鍾半生薑三五片煎七八分溫服

四柴胡飲

凡脾肺氣血或勞倦感寒發熱者宐此

人參酌用　炙甘草一錢　當歸二三錢（泄瀉者勿用）

柴胡隨宐

水二鍾生薑三五七片煎七八分溫服

五柴胡飲

凡脾腎血氣不足而感外邪發熱者宐此

柴胡一二三錢　熟地三五錢　芍藥錢半炒

當歸　白朮各二三錢　炙甘草一錢　陳皮酌用

水一鍾半煎七分食遠熱服

正柴胡飲

凡血氣本無虧損而感冒寒邪者宜此

柴胡一二三錢　芍藥二錢　陳皮一錢半

防風　甘草各一錢　生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

麻桂飲

凡傷寒初感邪盛氣實者勿論諸經四季先宜此

官桂一二錢　當歸三四錢　炙甘草一錢

麻黃二三錢　陳皮隨宜

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫

不拘時服

大溫中飲

凡中氣虛寒感邪發熱無汗表不能解者速用此

熟地三五七錢　冬白朮三五錢　炙甘草一錢

當歸三五錢（泄瀉者代以山藥）　人參二三錢甚則一兩

乾薑炒熟一二錢或用煨生薑三五七片亦可

肉桂一二錢　柴胡二三四錢　麻黃一二三錢

水二鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗

柴陳煎

凡感冒風寒發熱而兼欬嗽嘔惡者宜此

柴胡二三錢　陳皮一錢半　甘草一錢　半夏

茯苓各二錢

水一鍾半生薑三五七片煎七分食遠溫服

柴芩煎

凡表邪未解內外俱熱泄瀉不止者宜此

柴胡二三錢　枳殼一錢五分　黃芩　梔子

澤瀉　木通各二錢

水二鍾煎八分溫服

柴胡白虎煎

凡溫病熱極表裏不解者宜此

柴胡　黃芩　麥冬各二錢　細甘草七分

石膏三錢

水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸葛飲

凡陽明溫暑大熱大渴津枯不能作汗者宜此

當歸三五錢　乾葛二三錢

水二鍾煎一鍾以冷水浸涼徐徐服之得汗卽解

抽薪飲

凡邪熱畜之甚者宜此

黃芩　石斛　木通　梔子炒　黃蘗各一二錢

枳殼　澤瀉各一錢半　細甘草三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳

徙薪飲

凡熱邪內畜將甚未甚者宜此

陳皮八分　黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃蘗

茯苓　牡丹皮各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服

大分清飲

凡積熱閉結小水不通熱瀉等證宜此

茯苓　澤瀉　木通各二錢　猪苓（或倍之）　枳殼

梔子（或倍之）　車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

玉女煎

凡陰虛水虧陽明火盛煩渴內熱者宜此

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　知母

牛膝各一錢半　麥冬二錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服

玉泉散

一名一六甘露散治陽明實熱煩躁斑黃等證

石膏六兩生用　粉甘草一兩

右爲極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下

四味回陽飲

凡陽脫氣虛者宜此

人參一二兩　製附子　炮乾薑各二三錢

炙甘草一二錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

凡陰陽大虛元氣將脫者非此不可

人參一二兩或數錢　當歸三錢（如泄瀉者代以冬朮）

熟地五錢或一兩　炙甘草一錢　製附子

炮乾薑各二三錢

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

凡眞陰不足或因勞倦感寒陰虛假熱寒邪不解者速宜用此

熟地三五七錢或一二兩　炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢　乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢水二鍾煎七八分熱服

養中煎

凡中氣虛寒爲嘔爲瀉者宜此

人參一二三錢　白扁豆炒二三錢　山藥

茯苓各二錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

溫胃飲

凡中寒嘔吐吞酸者宜此

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩

扁豆二錢炒　陳皮（或不用）　炙甘草各一錢

乾薑炒焦一二三錢　當歸一二錢（滑泄者勿用）

水二鍾煎七分食遠溫服

五君子煎

凡脾胃氣分虛弱而微寒當溫者宜此

人參一二三錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一二錢

白芷　茯苓各二錢

水一鍾半煎服

胃關煎

凡脾腎虛寒瀉利不止者宜此

熟地三五錢或一兩　山藥炒　扁豆炒各二錢

焦乾薑　白朮炒各二三錢　吳茱萸製五七分

炙甘草一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

煖肝煎

凡肝腎陰寒小腹疼痛者宜此

當歸二三錢　枸杞三錢　沉香一錢（木香亦可）

肉桂一二錢　茯苓　小茴香　烏藥各二錢

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服

罨結胷法

凡病傷寒結胷其有中氣虛弱不堪攻擊內消者須以此法外罨之則滯行邪散其效如神

葱白頭　生薑　生蘿蔔（此味倍之如無以子代之）

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熱用手巾或白布包作大餅罨胷前脹痛處此藥須分二包冷則輪換罨之無不即時開通汗出而愈但不宜太熱恐炮烙難受也

古今圖書集成 二十二之三十三

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

一六五五

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十七卷目錄

醫部彙考三百五十七

傷寒門二十三

單方

鍼灸

導引

藝術典第三百七十七卷

醫部彙考三百五十七

傷寒門二十三

單方

傷寒有數種庸人卒不能分別者今取一藥兼療之凡初覺頭痛身熱脈洪一二日便以葱白一虎口豉一升綿裹水三升煑一升頓服取汗更作加葛根三兩再不汗加麻黃三兩（肘後方下同）

又法用葱湯煑米粥入鹽豉食之取汗

又法用豉一升小男溺三升煎一升分服取汗

傷寒不止不解已三四日胷中悶惡者用豉一升鹽一合水四升煑一升半分服取吐此祕法也（梅師方）

傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫用豉五合微炒以酒一升半同煎五七沸任性飲之（簡要濟衆）

傷寒暴痢豉一升薤白一握水三升煑薤熟納豉更煑色黑去豉分爲二服（藥性論）

傷寒勞復鼠屎二十枚豉五合水二升煑一升頓服（外臺）

傷寒黃病髮髲燒研水服一寸匕日三（類要下同）

天行勞復合頭垢棗核大一枚良

傷寒初愈預防勞復頭垢燒研水丸梧子大飲服一丸（外臺）

陰陽易病卵腫或縮入腹絞痛欲死取婦人陰毛燒灰飲服仍以洗陰水飲之（總錄）

傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛以乾艾葉三升水一斗煑一升頓服取汗（肘後方）

姙娠傷寒壯熱赤斑變爲黑斑溺血用艾葉如雞子

大酒三升煑二升半分爲二服（類要）

傷寒發狂驚怖恍惚用番紅花二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳（集要）

勞復食復欲死並以蘆根煑濃汁飲（肘後方）

傷寒時氣溫病初得頭痛壯熱脉盛者用生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升

傷寒黃疸表熱者名麻黃醇酒湯麻黃一把去節綿裹美酒五升煑取半升頓服取小汗春月用水煎

偶感風寒芝麻炒焦乘熱擂酒飲之煖臥取微汗出良

傷寒發黃生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和攪服盡（外臺）

男子陰易黍米二兩煑薄粥和酒飲發汗卽愈（總錄）

又法用丹黍米三兩煑薄粥和飲令發汗卽愈（類要）

傷寒初起取熱湯飲之候吐則止（本草）

初感風寒頭痛憎寒者用水七椀燒鍋令赤投水於內取起再燒再投如此七次名沸湯乘熱飲一椀衣被覆頭取汗神效（蘊要）

傷寒頭痛壯熱胷中煩痛四五日不解烏梅十四枚鹽五合水一升煎半升溫服取吐吐後避風良（梅師方）

傷寒䘌瘡生下部者烏梅肉三兩炒爲末煉蜜丸梧子大以石榴根皮煎湯食前下三十丸（聖惠）

傷寒熱病後口乾咽痛喜唾大棗二十枚烏梅十枚搗入蜜丸含一杏仁大嚥汁甚效（千金）

傷寒溫疫已發未發用棃木皮大甘草各一兩黃秫穀一合爲末鍋底煤一錢每服三錢白湯下日二服取愈（簡易方）

陰毒腹痛油松木七塊炒焦冲酒二鍾熱服（集簡方）

傷寒舌出過寸者梅花片腦半分爲末摻之隨手卽愈（夷堅方）

傷寒讝語蚯蚓屎涼水調服（簡便方）

勞復食復欲死者水調胡粉少許服（肘後方）

傷寒陽毒狂言妄語亂走毒氣在臟也鐵粉二兩龍膽草一兩爲末磨刀水調服一錢小兒五分（心鑑）

頭痛鼻塞鐵粉二兩龍腦半分研勻每新汲水服一錢（聖惠）

傷寒發汗時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者取眞丹一兩水一斗煑一升頓服覆被取汗忌生血物肘後用眞丹末酒調遍身塗向火坐得汗愈（外臺）

傷寒欬逆服藥無效雄黃二錢酒一盞煎七分乘熱嗅其氣卽止（活人）

傷寒孤惑蟲蝕下部痛癢不止雄黃半兩燒於瓶中熏其下部（聖惠）

傷寒發狂踰垣上屋寒水石二錢黃連一錢爲末煎甘草湯冷服名鵲石散（本事方）

風熱心躁口乾狂言渾身壯熱寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土壅起經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米糕丸彈子大蜜水磨下（集驗方）

男女陰毒寒水石不拘多少爲末用兩餾飯搗丸栗子大日乾每用一丸炭火煅紅燒研以滚酒調服飲葱酢湯投之得汗愈（必用方）

傷寒衄血滑石末飯丸梧子大每服十丸微嚼破新水咽下立止湯晦叔云鼻衄乃當汗不汗所致其血

紫黑時不以多少不可止之且服溫和藥調其營衞待血鮮時急服此藥止之也（本事方）

傷寒無汗代赭石乾薑等分爲末熱酢調塗兩手心合掌握定夾於大腿內側溫覆汗出乃愈（蘊要）

百合病發已汗下復發者百合七箇擘破泉水浸一宿代赭一兩滑石三兩泉水二鍾煎一鍾入百合汁再煎一鍾溫服（蘊要）

傷寒尿濇小腹脹滿石燕爲末葱白湯調半錢脹通爲度（聖惠）

傷寒發狂元明粉二錢硃砂一錢末之冷水服（蘊要）

陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脈危甚者舶上硫黃爲末艾湯服三錢就得睡汗出而愈（本事方）

陰陽二毒黑龍丹用舶上硫黃一兩柳木槌研二三日巴豆一兩和殼記箇數用三升鐺子一口將硫黃鋪底安豆於上以釅米酢半斤澆之盞子緊合定酢紙固縫頻以酢潤之文武火熬候作聲定可一半爲度急將鐺子離火卽便入臼中擣細再以酢兩茶匙洗鐺中藥入臼旋下蒸餅擣丸雞頭子大若是陰毒

用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熟呑下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一盞煎同前呑下不得嚼破經五六日方可服之若未傳入或未及日數不可服有孕婦人吐瀉亦不可服（博濟方）

傷寒心悸脈結代者甘草二兩水三升煑一半服七合日一服（類要）

陰毒雞血衝熱酒飲（風俗通）

傷寒時疫不問陰陽老幼姙婦誤服藥餌困重垂死脈沉伏不省人事七日以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復脈湯人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脈復立瘥（百一）

傷寒厥逆身有微熱煩躁六脈沉細微弱此陰極發躁也無憂散用人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星末二錢熱服立甦（三因方）

夾陰傷寒先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脈沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各一兩生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服汗出身溫卽愈（蘊要）

傷寒腹脹陰陽不和也桔梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服名桔梗半夏湯（活人）

傷寒勞復身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩拌和炒令微焦爲末用豬膽汁和丸梧子大每服十九用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之臥時再服甚效（本草）

傷寒天行病四五日結胷滿痛壯熱苦參一兩以酢三升煑取一升三合飲之取吐即愈天行毒病非苦參酢藥不解及溫覆取汗良（祕要）

傷寒發狂草龍膽爲末入雞子清白蜜化涼水服二錢（蘊要）

風寒頭痛發熱初覺者馬蹄香爲末每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一椀催之出汗即愈名香汗散（摘要）

時行一切傷寒不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服之名聖僧散用白芷一兩生甘草半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二椀煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服之此藥可卜人之

好惡也如煎得黑色或誤打翻即難愈如煎得黃色無不愈者煎時要至誠忌婦人雞犬見（家寶方）

風寒流涕香白芷一兩荊芥穗一錢爲末臘茶點服二錢（百一）

陽毒下血熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇牛黃皂莢子大一粒爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服（祕寶方）

傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煑四升日三服（范汪方）

傷寒狐惑脫肛者蕙草黃連各四兩㕮咀以白酸漿一斗漬一宿煑取二升分三服（小品方）

四時傷寒不正之氣用水香薷爲末熱酒調服一二錢取汗（易簡方）

感寒上氣蘇葉三兩橘皮四兩酒四升煑一升半分再服（肘後方下同）

傷寒氣喘不止用赤蘇一把水三升煑一升稍稍飲之

勞復食復欲死者蘇葉煑汁二升飲之亦可入生薑

豆豉同煑飲

傷寒勞復葵子二升粱米一升煑粥食取汗立安（聖惠方下同）

傷寒初愈交合陰陽易病拘急手足踡小腹急熱頭不能舉名陰陽易當汗之滿四日難治藍一把雄鼠屎三七枚水煎服取汗

傷寒赤斑青黛二錢水研服（活人書）

勞復因交後卵腫或縮入腹痛蓼子一把水挼汁飲一升（肘後方）

傷寒咽痛毒攻作腫以蕳茹爪甲大納口嚼汁嚥之當微覺爲佳（備急方）

陰毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切曬紙裹收之遇有患者取爲末一錢入鹽八分水一盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似再進一服名玉女散（本事方）

陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子二枚炮裂去皮臍爲末每服三錢薑汁半盞調服良久臍下如火暖爲度名回陽散（濟生方）

陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩附子一箇生破作四片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服暖臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎滓服屢用多效（續傳信方）

風寒客於頭中清涕項筋急硬胷中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藭生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩（十便良方）

陰毒傷寒生草烏頭為末以葱頭蘸納穀道中名提盆散（海藏）

急傷寒病半夏四錢生薑七片酒一盞煎服（百病方）

傷寒乾嘔半夏熟洗研末生薑湯服一錢匕（梅師方）

傷寒咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每噙棗許取瘥（傷寒論）

結胷心腹硬痛用牽牛頭末一錢白糖化湯調下（鄭氏家傳）

傷寒煩渴欲飲苦蔞根三兩水五升煑一升分二服先以淡竹瀝一斗水二升煑好銀二兩半冷飲汁然

後服此（外臺）

百合病渴苦蔞根牡蠣熬等分爲散飲服方寸匕（永類鈐方）

傷寒頭痛二三日發熱者葛根五兩香豉一升以童子小便八升煎取二升分三服食葱粥取汗（梅師方）

傷寒喘急防己人參等分爲末桑白皮湯服二錢不拘老小

傷寒變䘌四肢煩疼不食多睡羊桃十斤擣熟浸熱湯三斗日正午時入坐一炊久不過三次愈（千金方）

傷寒毒攻手足腫痛羊桃煮汁入少鹽漬之（肘後方）

夾驚傷寒紫背浮萍一錢犀角屑半錢鉤藤鉤三七箇爲末每服半錢蜜水調下連進三服出汗爲度（總錄）

傷寒頭痛如破者連鬚葱白半斤生薑二兩水煮溫服（活人書）

傷寒勞復因交接者腹痛卵腫用葱白擣爛苦酒一盞和服之（千金）

妊娠傷寒赤斑變爲黑斑尿血者以葱白一把水三升煮熟服汁食葱令盡取汗（類要）

感寒無汗水調芥子末塡臍內以熱物隔衣熨之取汗出妙方（簡便）

陰證傷寒腹痛厥逆芥菜子研末少調貼臍上（生生編）

傷寒後婦人得病雖瘥未滿百日不可與男合爲病拘急手足拳腹痛欲死丈夫名陰易婦人名陽易速宜汗之卽愈滿四日不可治也用乾薑四兩爲末每用半兩白湯調服覆衣被出汗後手足伸卽愈方（類要）

傷寒脫陽小便不通用茴香末以生薑自然汁調傅腹上外用茴香末入益元散服之方（摘元）

百合腹滿作痛者用百合炒爲末每飲服方寸匕日二

陰毒傷寒百合煮濃汁服一升良方（食忌）

傷寒痞滿陰病下早成痞按之虛軟而不痛檳榔枳實等分爲末每服二錢黃連煎湯下方（宣明）

房勞陰毒胡椒七粒葱心二寸半麝香一分擣爛以黃蠟鎔和做成條子揷入陰內少頃汗出卽愈方（集效）

發散寒邪胡椒丁香各七粒碾碎以葱白搗膏和塗兩手心合掌握定夾於大腿內側溫覆取汗則愈（蘊要）

傷寒欬逆日夜不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打碎麝香半錢酒一鍾煎半鍾熱服（聖惠）

冬月感寒吳茱萸五錢煎湯服之取汗（千金）

陰毒傷寒四肢逆冷用吳茱萸一升酒拌濕絹袋二箇包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累有效（聖惠）

傷寒欬逆呃噫日夜不定者用蓽澄茄高良薑各等分爲末每服二錢水六分煎十沸入酢少許服之（圖經）

傷寒口乾生藕汁生地黃汁童子小便各半盞煎溫服之（傷寒論）

孕婦傷寒大熱煩渴恐傷胎氣用嫩卷荷葉焙半兩蚌粉二錢半爲末每服二錢

又方新汲水入蜜調服幷塗腹上名罩胎散（鄭氏方）

傷寒遺毒手足腫痛欲斷黃蘗五斤水三升煑漬之（肘後方下同）

傷寒六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑劈斷四寸一束以酒五合水一升煑半升去滓頓服當吐下青黃汁數升即瘥

傷寒初得不問陰陽以皂角一挺肥者燒赤爲末以水五合和頓服之陰病極效方（千金）

陰毒傷寒心結按之極痛大小便閉但出氣稍煖者急取巴豆十粒研入麪一錢捻作餅安臍內以小艾炷灸五壯氣達卽通此太師陳北山方也（直指方）

傷寒舌出巴豆一粒去油取霜以紙撚卷內入鼻中舌卽收上（普濟方）

傷寒後卒胷膈閉痛枳實麩炒爲末米飲服二錢日二（濟生方）

傷寒呃噫枳殼半兩木香一錢爲末每白湯服一錢未知再服（本事方）

陰毒腹痛雞糞烏豆地膚子各一把亂髮一團同炒烟起傾入好酒一椀浸之去滓熱服卽止（生生編）

傷寒發狂煩躁熱極吞生雞子一枚效（食鑑）

傷寒煩渴心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大琖煎六分分作二服（聖惠）

傷寒之後餘熱入經絡體瘦肌熱推陳致新解利傷寒時氣伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四兩甘草一

兩每用三錢水一琖煎服（本事方）

熱毒攻手足赤腫焮熱疼痛欲脫煑馬屎與羊屎汁漬之日三度（千金下同）

又方濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煑苦參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草（一名蒼耳）絞取汁以漬之

傷寒後汗不止地黃三斤切以水一斗煑取三升分作三服

又方白朮葉作飲飲之

又方白朮方寸匕以飲服之

傷寒卒得汗不止以溫酒服牛羊脂愈或服牛羊屎亦止

傷寒盜汗及汗無時以韭根四十九枚水二升煑一升頓服之以止爲度

又方豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過

三劑即止

又方死人蓆緣燒灰煑汁洗身瘥

大病後不足虛勞取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四升煎取一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服不絕爲佳

病後或因洗手足或梳頭或食勞等復取洗手足汁飲一合取頭中垢如棗核大吞一枚

病新瘥遇美飲食食過多食復者取所食餘燒灰爲末飲調服二錢匕日三服

重病新瘥早起勞復及飲食多致發欲死燒鼈甲末飲服方寸匕

傷寒後食勞復杏仁五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

欲令病人不復燒頭垢如梧桐子大吞服之

交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛欲死取所交婦人衣服以覆男子立愈

令病人不復取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若米飲汁服之

百合病變腹中滿痛取百合根隨多少熬令黃色搗篩爲散飲服方寸匕日三滿消痛止

傷寒欬逆急救方香附子橘核各半兩細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋呷服（活人下同）

又方單用香附子末

又方大蒜頭二箇煨動爆研入白薑末丸得爲度研和如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下二十丸病退再服一十五丸

男女陰毒傷寒外接法名廻生神膏牡蠣煆粉乾薑炮各一錢爲細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈卵與乳男女之根蔕坎離之分也陰證大小便不通及諸雜證陰候大小便不通者並宜此外治法數日不通爲急非急者勿用

水漬法治陽毒大熱發狂不能制伏用青布五六尺疊摺新水浸之搭病人胷上須臾蒸熱又浸水中又搭日數十易爲佳（得效）

又法菉豆煮湯一鍋稍溫用青布數重蘸湯搭於胷膈冷則再蘸湯搭之日數十易被蓋覆得汗而愈蓋菉豆青布性凉能退熱故也（丹溪）

傷寒發汗吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難原蠶蛾半斤糯米半升同炒令米色焦然後擂羅爲末每用半兩以米酢調如稀糊入銚子內煎攪令稠乘熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷卽易之（良方）

熨臍法陰毒危急體冷無脉氣息欲絶或不省人事大葱白一把切去葉搗餅二三寸許連作四五餅先將麝香硫黃各一字塡臍內放葱餅於臍上以熨斗火熨之如餅爛再換新餅又熨之以葱氣入腹爲效手足溫有汗卽差便服四逆湯以溫其內如熨後手足指尚冷甲下肉黑者死（活人）

傷寒陽證結胷死無可藥者蚯蚓十五條活者擂爛蜜半盞冷水半椀灌服若無蜜砂糖亦妙（良方）

又法釅酢拌麩皮炒熨納布袋中蒸熱熨之尤速效（海藏）

中寒身冷脉微面靑黑葱白連根切小麥麩各三升

鹽二升以水和勻分二包炮令極熱絹包之互熨臍上冷則用水拌濕更炒熨之（醫鑑）

陰陽易以人手足指爪甲二十片燒灰爲末米飲調下效（入門下同）

赤衣散治陰陽易最效取室女月經布近陰處燒存性爲末米飲調下

火刦法治發狂炭火一盆置病人之前將酢一椀急沃火內使煙氣衝入鼻內須臾自定又將凉水噀面亦可

大病差後多虛汗龍骨牡蠣麻黃根等分爲末以粉身（良方）

麻黃療傷寒解肌發汗爲第一去節取五錢水煎服之（本草下同）

傷寒熱病汗後脈洪大頭痛口燥大渴取石膏碎一兩水煎服之

傷寒陰毒煮百合濃汁服一升良

柴胡療傷寒第一解肌除煩熱劇作一兩水煎服之

傷寒勞復竹瀝水煎數數飲之取汗

傷寒熱病勞復梔子十枚碎水煎服微汗

傷寒昏迷不省人事皂莢末以紙撚燒煙入鼻有嚏可治無則不治肺氣上絕也可治者隨用皂莢半夏生白礬共一錢半爲末薑汁調服探吐痰去即甦（同春）

傷寒熱盛取生梨食之

傷寒熱病煩渴菉豆煮作粥常服之

傷寒頭痛取荊芥穗一兩濃煎服之（本草下同）

風寒用忍冬藤濃煎湯溫服取汗

傷寒陰陽毒取薄荷葉煮汁溫服取汗良

傷寒發熱發狂溫水漬乾人屎取汁飲之

鍼灸

素問曰肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脅滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗

氣逆則甲乙死刺足太陰陽明

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胷膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已

腎熱病者先腰痛䯒酸苦渴數飲身熱熱爭則項痛而强䯒寒且酸足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也

肝熱病者左頰先赤心熱病者顏先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未病

熱病從部所起者至期而已其刺之反者三周而已重逆則死諸當汗者至其所勝日汗大出也

諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也

熱病先胷脅痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者爲五十九刺

熱病始手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

熱病始於頭首者刺項太陽而汗出止

熱病始於足脛者刺足陽明而汗出止

熱病身先重骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚爲五十九刺

熱病先眩冒而熱胷脅滿刺足少陰少陽

太陽之脉色榮顴骨熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脉爭見者死期不過三日其熱內連腎少陽之脉色也少陽之脉色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脉爭見者死期不過三日

熱病氣穴三椎下間主胷中熱四椎下間主鬲中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骶也項上三椎陷者中也頰下逆顴爲大瘕下牙車爲腹滿顴後爲脅痛頰上者鬲上也

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒治在風府調其陰陽不足則補有餘則瀉

大風頸項痛刺風府風府在上椎

帝曰夫子言治熱病五十九俞余論其意未能領別其處願聞其處因聞其意岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胷中之熱也氣街三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也五臟俞旁五此十者以瀉五臟之熱也凡此五十九穴者皆熱之左右也帝曰人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒甚則爲熱也

靈樞經曰大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒卽泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

刺寒厥者二陰一陽所謂二陰者二刺陰也一陽者一刺陽也

肺氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠振寒洒洒鼓頷不得汗出腹脹煩悗取手太陰

風逆暴四肢腫身漯漯唏然時寒飢則煩飽則善變取手太陰表裏足少陰陽明之經肉清取榮骨清取

井經也

熱病三日而氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以瀉其熱而出其汗實其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿刺也其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有死徵也

熱病七日八日脈口動喘而短者急刺之汗且自出淺刺手大指間

熱病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而死脈代者一日死

熱病已得汗出而脈尚躁喘且復熱勿刺膚喘甚者死

熱病七日八日脈不躁躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死未曾汗者勿腠刺之

熱病先膚痛窒鼻充面取之皮以第一鍼五十九苛軫鼻索皮於肺不得索之火火者心也

熱病先身濇倚而熱煩悗乾脣口嗌取之脈以第一鍼五十九膚脹口乾寒汗出索脈於心不得索之水水者腎也

熱病嗌乾多飲善驚臥不能起取之膚肉以第六針五十九目眥青索肉於脾不得索之木木者肝也

熱病面青腦痛手足躁取之筋間以第四鍼於四逆筋躄目浸索筋於肝不得索之金金者肺也

熱病數驚瘛瘲而狂取之脈以第四鍼急瀉有餘者癲疾毛髮去索血於心不得索之水水者腎也

熱病身重骨痛耳聾而好瞑取之骨以第四鍼五十九刺骨病不食齧齒耳青索骨於腎不得索之土土者脾也

熱病體重腸中熱取之以第四鍼於其腧及下諸指間索氣於胃絡得氣也

熱病挾臍急痛胷脅滿取之湧泉與陰陵泉取以第四鍼鍼嗌裏

熱病而汗且出及脈順可汗者取之魚際太淵大都太白瀉之則熱去補之則汗出汗出太甚取內踝上橫脈以止之

熱病不可刺者有九一曰汗不出大顴發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四

曰老人嬰兒熱而腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痓者死腰折瘛瘲齒噤齘也凡此九者不可刺也

風痓身反折先取足太陽及膕中及血絡出血中有寒取三里

邪氣之中人也灑淅動形正邪之中人也微先見於色不知於其身若有若無若亡若存有形無形莫知其情是故上工之取氣乃救其萌芽下工守其已成因敗其形

凡刺熱邪越而蒼出遊不歸乃無病爲開辟門戶使邪得出病乃已

凡刺寒邪日以除徐往徐來致其神門戶已閉氣不分虛實得調其氣存也

甲乙經曰頭腦中寒鼻衄目泣出神庭主之

頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出曲差主之

頭痛目眩頸項強急胷脅相引不得傾側本神主之

熱病汗不出上星主之先取譩譆後取天牖風池

熱病汗不出而苦嘔煩心承光主之

頭項惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目系急痛引頞頭重項痛玉枕主之

頭痛身熱引兩頷急腦空主之

熱病汗不出天柱及風池商陽關衝掖門主之

傷寒熱盛煩嘔大椎主之

身熱頭痛進退往來神道主之

頭痛如破身熱如火汗不出瘛瘲寒熱汗不出惡寒裏急腰腹相引痛命門主之

頭項痛不可以俯仰頭痛振寒瘛瘲氣實則脅滿俠脊有井氣熱汗不出腰背痛大杼主之

風眩頭痛鼻不利時嚏清涕自出風門主之

悽悽振寒數欠伸鬲腧主之

熱病汗不出上窌及孔最主之

背痛惡寒脊強俯仰難食不下嘔吐多涎鬲俞主之

熱病頭痛身重懸顱主之

熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛懸釐主之

熱病偏頭痛引目外眥懸釐主之

熱病胷中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘛瘲心痛氣滿不得息巨闕主之

身寒熱陰都主之

熱病象瘧振慄鼓頷腹脹睥睨喉中鳴少商主之

寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕癢腹痛不可以食飲肘攣肢滿喉中焦乾渴魚際主之

熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也鬲中虛食飲嘔身熱汗不出數唾血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也刺魚際補之

溫病身熱五日已上汗不出刺太淵留鍼一時取之若未滿五日禁不可刺也

熱病先手臂瘛瘲脣口聚鼻張目下汗出如轉珠兩乳下二寸堅脅滿悸列缺主之

兩脅下痛嘔泄上下出胷滿短氣不得汗補手太陰以出之

熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛中衝主之

熱病發熱煩滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴舌中爛掌中熱飲嘔勞宮主之

熱病煩心而汗不止肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胷中熱苦不樂太息喉痹嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胷痛太陵主之

熱病煩心善嘔胷中澹澹善動而熱間使主之

面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實則心暴痛虛則煩心心惕惕不能動失智內關主之

心澹澹然善驚身熱煩心口乾手淸逆氣嘔血時瘛善搖頭顏青汗出不過肩傷寒溫病曲澤主之

鼻鼽衄熱病汗不出䪼目目痛瞑頭痛齲齒痛泣出厥逆頭痛胷滿不得息陽谿主之

熱病腸澼臑肘臂痛虛則氣鬲滿肩不舉溫留主之

傷寒餘熱不盡曲池主之

頭痛振寒淸冷淵主之

頭痛項背急消濼主之

熱病汗不出胷痛不可息頷腫寒熱耳鳴聾無所聞陽谷主之

泄風汗出腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥生疣瘈瘲頭眩目痛陽谷主之

氣喘熱病衄不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得臥氣滿胷中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐不欲食飲隱白主之

熱病汗不出且厥手足清暴泄心痛腹脹心尤痛甚此胃心痛也大都主之并取隱白腹滿善嘔煩悶此皆主之

熱病先頭重額痛煩悶身熱熱爭則腰痛不可以俛仰胷滿兩頷痛甚善泄饑不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔泄有膿血若嘔無所出先取三里後取太白章門主之

熱病滿悶不得臥太白主之

熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之

熱病汗不出默默嗜臥溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內

腫漾心痛如錐鍼刺太谿主之手足寒至節喘息者死

熱病刺然谷足先寒寒上至膝乃出鍼

善齧頰齒脣熱病汗不出口中熱痛衝陽主之胃脘痛時寒熱皆主之

熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱讝語解谿主之

厥頭痛面浮煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痹不能言豐隆主之

陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔三里主之

脅痛欬逆不得息竅陰主之及爪甲與肉交者左取右右取左立已不已復取

手足清煩熱汗不出手肢轉筋頭痛如錐刺之狀熱不可以動動益煩心喉痹舌卷乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴竅陰皆主之

膝外廉痛熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛寒逆泣出耳鳴聾多汗目癢胸中痛不可反側痛無常處俠谿主之

厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不可得行足外皮痛臨泣主之

身懈寒少氣熱甚惡人心惕惕然取飛揚及絕骨跗下臨泣立已淫濼脛酸熱病汗不出皆主之

下部寒熱病汗不出體重逆氣頭眩飛揚主之

熱病俠脊痛委中主之

身熱狂走讝語見鬼瘛瘲身柱主之

狂妄言怒惡火善罵詈巨闕主之

熱病汗不出鼽衄眩時仆面浮腫足脛寒不得臥振寒惡人與木音喉痹齲齒惡風鼻不利多善驚厲兌主之

四厥手足悶者使人久持之厥熱脛痛腹脹皮痛善伸數欠惡人與木音振寒嗌中引外痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄齘口噤僻不嗜食內庭主之

狂歌妄言怒惡人與火罵詈三里主之

千金方曰灸傷寒法初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背強直面目如飲酒狀此傷寒初得

一二日但烈火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上脘第三處去心下三寸名胃脘各灸五十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃脘又中屈半繩更分爲二分從胃脘向上度一分卽是上脘又上度取一分卽是巨闕大人可灸五十狀小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意酌量也若病者三四日以上宜先灸胷上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸兩風池又灸肝腧百壯餘處各二十壯又灸太衝三十壯神驗

魚際陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變

經渠陽池合谷支溝前谷內庭後谿腕骨陽谷厲兌衝陽解谿主熱病汗不出

孔最主臂厥熱病汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

列缺曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱瘛瘲脣口聚鼻張目下汗出如珠

中衝勞宮大陵間使關衝少衝陽谿天窌主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛

勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕

三間主氣熱身熱喘

曲澤主傷寒溫病身熱煩心口乾

曲池主傷寒餘熱不盡

掖門中渚通里主熱病先不樂頭痛面熱無汗

溫留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

上脘曲差上星陶道天柱上窌懸釐風池命門膀胱腧主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出體重

懸顱主熱病頭痛身熱

少澤主振寒小指不用頭痛

玉枕大杼肝腧心腧膈腧陶道主汗不出悽厥惡寒

大椎主傷寒熱盛煩嘔

懸釐鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥

膈腧中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得臥支滿

神道關元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

魚際主頭痛不甚汗出

臂臑主頭身熱赤振慄腰中四肢淫濼欲嘔

尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗煩心身痛

委中主熱病俠脊痛

大都主熱病汗出且厥足清

大白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛不可以俯仰又熱病滿悶不得臥身重骨痛不相知

支正少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而强振寒寒熱

後谿主身熱惡寒

光明主腹足清寒熱汗不出

復畱主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井滎熱

中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗面清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痹洒淅振寒季脅支滿痛

活人書曰仲景云太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯愈謂服桂枝湯後其證尚自汗發熱惡寒脈尚寸浮尺弱而反煩爲邪痹在陽維經故可先鍼風池風府此二穴陽維之會非太陽經也太陽經穴在俠項後髮際大筋外廉陷中名曰天柱不鍼此者桂枝已主太陽病故也

期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當鍼期門不用行子午法恐纏臟膜引氣上但下鍼令病人吸五吸停鍼良久徐徐出鍼此是平瀉法也凡鍼期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深

臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元關元穴是小腸募足少陰任脈之會鍼入八分留三呼瀉五吸灸亦良然不及鍼氣海穴或作臍下一寸

本事方曰傷寒陰毒危極藥餌無功速灸臍中三百

壯又灸氣海關元各二三百壯以手足溫煖爲效

活法機要曰傷寒大熱不止取曲池瀉絕骨補陷谷出血八關大刺血指間出

雲岐子曰傷寒頭痛太陽證刺完骨京骨陽明證刺合谷衝陽少陽證刺陽池丘墟風府風池

傷寒熱退後再發熱取風門合谷行間絕骨

得效方曰傷寒初得一二日頭痛寒熱宜灸巨闕上脘中脘各五十壯

醫學綱目曰傷寒頭痛刺合谷攢竹

傷寒汗不出刺合谷鍼五分遍身汗出卽出鍼此穴發汗大妙復溜瀉又商丘腕骨陽谷俠谿厲兌勞宮風池魚際經渠內庭又十二經榮穴皆可刺

傷寒汗多不止取內庭合谷復溜俱瀉

傷寒結胷先使人心蔽骨下正痛處左畔揉之以毫鍼刺左畔支溝穴次刺左間使穴名曰雙關次刺左行間穴左邊結胷立效右亦依上法刺之慢慢呼吸停鍼立愈

傷寒胷痛取期門大陵

傷寒脅痛取支溝陽陵泉

傷寒手足厥冷取大都鍼一分

遍身發熱如火狂言妄語氣虛者補手三里氣實者瀉足三里

傷寒胷熱不已大杼五分瀉之又風門五分留七呼中府乳上三肋間動脉應手刺入三分缺盆三分

傷寒胃熱不已中脘瀉之又上廉三分下廉八分三里氣衝

傷寒四肢熱不已雲門三分灸五壯肩髃委中腰腧在二十一椎節下間宛宛中以挺伏地紓身兩手相重支額縱四體然後取其穴針入五分留七呼灸七十壯

傷寒大熱不退曲池瀉絕骨補

傷寒熱退後再發熱風門合谷行間絕骨

如脉浮而頭痛過在手足太陽刺完骨京骨如脉浮而長過在手足陽明刺合谷衝陽如脉浮而弦過在手足少陽刺陽池丘墟風府風池此刺頭痛之法也

傷寒發熱不識尊卑曲池絕骨百勞湧泉

傷寒邪在三陰內不得交通故爲腹痛手足之經皆會於腹如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脉沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脉沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

傷寒六脉俱無復溜補之大回六脉合谷中極支溝一寸半此穴和脉絕復溜順骨而下巨闕三寸三分氣衝灸七壯

傷寒在表發熱惡寒頭項痛腰脊強無汗尺寸脉俱浮合谷五分候遍身汗出卽出針此穴發汗大妙復溜瀉

大煩熱不止晝夜無度用八關大刺熱無度不可止宜陷谷出血

萬病回春曰傷寒陰證已極玉莖縮入速令人捉定急將艾丸菉豆大放在陰莖口上灸三壯其莖卽出

陰證腹痛灸足小指外側上紋尖灸三壯男左女右

導引

保生祕要曰傷風導引法平身坐定雙手擦掌撫脊囊兩肘靠膝以身勢向前先躬而後仰如此用力起五九之數約汗透身輕爽而自愈慎風邪

運功定艮背起念運上風門穴多著工夫蓋風由此入也漸運入內又散出外上泥丸降心頭推開或吐而愈不吐亦愈

傷風發汗導引法心頭推開至臍大效

運功握固兩手指如拳腳指亦要拳握固閉目調息

而臥自然汗出週身風邪從汗散矣

冒風鼻塞導引法先清肺經以兩手指擦鼻兩旁令其內外俱熱如虛火升兩眼看兩脚底驗

傷寒傷風先飲熱茶或熱湯項要直舌捲托之上齶兩手作拳狀兩足指亦縮緊自然汗發而愈

附艮背法初學之士靜坐片時將萬念掃除凝神定志於水火之中背之腔子裏平心元虛處初從口念太乙救苦而漸歸於心歸於背存無守有念茲在茲有復冥於無神自虛而靈矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十八卷目錄

醫部彙考三百五十八

傷寒門二十四

醫案

藝術典第三百七十八卷

醫部彙考三百五十八

傷寒門二十四

醫案

儒門事親曰戴人之僕嘗與鄰人同病傷寒俱至六七日下之不通鄰人已死僕發熱極投於井中撈出以新汲水貯盆使坐其中適戴人遊他方家人偶記戴人治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服瓜蔕散良久吐膠涎三椀許與宿食相雜在地狀

如一帝頓快乃知世醫殺人多矣戴人之女僮亦嘗吐一吏傷寒吐訖使服太白散甘露散以調之戴人之棠谿也雪中冒寒入浴重感風寒遂病不起但使煎通聖散單服之一二日不食惟渴飲水亦不多飲時時使人搥其股按其腹凡三四日不食日飲水一二十度至六日有譫語妄見以調胃承氣湯下之汗出而愈戴人常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最爲妙藥但不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七日見有下證方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人飲水至有渴死者病人若不渴強與水飲亦不肯飲耳戴人初病時鼻塞聲重頭痛小便如灰淋汁及服調胃承氣一兩半覺欲嘔狀探而吐之汗出漐漐然須臾下五六行大汗一日乃瘳當日飲冰水時水下則痰出約一二椀痰卽是病也痰去則病去也戴人時年六十一

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使啜焦因熱服之訖偶感戴人語曰凡苦味皆能涌令頭痛是病在上試以筯探之吐畢其痛立解

常仲明常於炎暑時風快處披露肌膚以求爽爲風所賊三日鼻窒雖坐於煖處少通終不大解戴人使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通矣

陽夏賀義夫病傷寒當三日以裏醫者下之而成結胷求戴人治之戴人曰本風溫證也不可下又下之太早故發黃結胷此已有瘀血在胷中欲再下之恐已虛惟一涌可愈但出血勿驚以茶調瓜蔕散吐之吐血數升而衄且噎逆乃以巾捲小鍼而使枕其刃不數日平復

本事方曰一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者用巴豆下之頃得溏利宛然如舊余曰此陽明結熱在裏非大柴胡承氣不可巴豆止去積不能蕩滌邪熱蘊毒亟進大柴胡等三服得汗而解常謂仲景一百一十三方爲丸者有五理中陷胷抵當烏梅麻仁是以理中陷胷抵當皆大如彈子煑化而服與湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治濕䘌皆用小丸以達下部其他逐邪毒破堅癖導瘀血潤燥糞之類皆

憑湯劑未聞用巴豆小丸藥以下邪氣也既下而病不除不免重以大黃芒硝下之安能無損也哉

一丘生者病傷寒發熱頭疼煩渴脈雖浮數無力尺以下遲而弱余曰此雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗余於建中湯加當歸黃芪令飲翼日脈尚爾其家煎迫日夜督發汗藥幾不遜矣余忍之只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜二服發狂須臾稍定略睡已出汗矣信知此事誠難仲景雖云不避晨夜卽宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安損虧五臟以促壽限何足貴哉

范雲傷寒恐不得預武帝九錫之慶召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便瘥甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可況二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於其上頃刻汗解撲以溫粉翼日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限況不顧表裏不待時日便欲速效乎每見病家不奈病未三四晝夜促汗醫

者隨情順意鮮不敗事余故書此爲戒

一親戚病傷寒身熱頭痛無汗大便不通已四五日余訊問之醫者治大黃朴硝等欲下之余曰子姑少待余爲視之脈浮緩居密室中自稱甚惡風余曰表證如此大便不通數日腹且不脹別無所苦何遽便下之仲景法須表證罷方可下不爾則邪乘虛而入不爲結胷必爲熱利也余作桂枝麻黃各半湯繼以小柴胡漐漐汗出大便亦通而解

一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澀神昏而睡診其脈長大而實余用承氣下之而愈一則陽明自汗大便不通小便利津液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞得溏利而解其家曰皆陽明不通何以治之異余曰二證雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五臟爲無津液也然則傷寒大證相似兩證稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知不可不謹

有人患傷寒目痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱

大已數日一夕汗出余謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥余謂曰子雖知蜜煎爲穩當還用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之余力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也余謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速下之則爲精捷免致用蜜煎也若胷中識得了了自無可疑若未能了悞用之反不若蜜煎之爲穩也

有一人得太陽證因發汗汗不止惡風小便濇足攣而不伸余診其脈浮而大浮爲風大爲虛余曰在仲景方中有兩證大同小異一則小便難一則小便數用藥稍差卽有千里之失仲景第七證云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸

者桂枝加附子湯第十六證云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反以桂枝湯攻表者誤也得之便數咽中乾煩躁吐逆一則漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同也余用第七證桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍藥湯足便得伸

有人病傷寒下利身熱神昏多困讝語不得眠或者見下利便以讝語爲陰虛證余曰此亦小承氣證衆駭曰下利而服小承氣仲景之法乎余曰此仲景之法也仲景云下利而讝語者有燥糞也屬小承氣湯而得解余常讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結伏須除以寒下之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉

有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中九死仲景雖有證而無法但云脈弦者生濇

者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便得通而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生此何意也余曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱讝語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻物者肝熱也此證在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫於胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受尅此所謂有生之理讀仲景論而能博遍諸醫書以發明其隱奧者吾未之見也

有人初病嘔吐俄爲醫者下之已七八日而內外發熱余診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣白虎可用乎余曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在胃脘而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐下後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此以表有熱裏有

寒白虎加人參湯主之

有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不除余曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃蕩滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名柴胡湯須酒洗生用有力

一人病身體痛面黃喘滿頭痛自能飲食大小便如常余診之脈大而虛鼻塞而煩余曰非濕熱宿穀相搏此乃頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥方此方見外臺刪繁證云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕沉於骨髓之間或爲黃疸宜瓜蔕散卽此方也

一舟梢病傷寒發黃鼻痠痛身與目如金色小便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓予曰非其治也小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻頞痛是

病在清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹爲逆亦用瓜蔕散先含水次搐之鼻中黃水盡乃愈

有人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷心下痞悶大便祕結或者見四肢冷又汗出滿悶以爲陰證予診其脈沉而緊予曰此證誠可疑然大便結非虛結也安得爲陰脈雖沉而緊爲少陰證多是自利未有祕結者此證半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有人難曰脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰證余曰此一段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便鞕頭汗出不得爲少陰蓋頭者三陽同聚若三陰劑頭而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出爲陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也名少陰則無頭汗者可治有汗者死心爲手少陰腎爲足少陰相與上下惟以意逆志

者斯可得之

有人病傷寒脈浮而長喘而胷滿身熱頭痛腰脊強鼻乾不得臥余曰太陽陽明合病仲景云中有三證下利葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胷滿者麻黃湯也治以麻黃湯得解

有武臣爲寇執置舟中艎板下數日得脫乘饑恣食良久解衣捫虱次日遂傷寒自汗而膈不利一醫作傷寒而下之一醫作解衣中邪而汗之雜治數日漸覺昏困上喘息高余診之曰太陽下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁湯此仲景之法也指令醫者急治藥一啜喘定再啜漐漐汗出至晚身凉脈已和矣醫曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如此

有病傷寒八九日身熱無汗譫語時因下後大便不通三日矣非躁非煩非寒非痛終夜不得臥但心中無曉會處或時發一聲如歎息之狀醫者未知是何證余診之曰此懊憹怫鬱二證俱作也胃中有燥屎者服承氣湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下之心中懊憹微煩胃中有燥屎者可攻又云小

便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不臥者有燥屎也承氣湯主之素問云胃不和則臥不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便堅者必讝語此所以有時發讝語也非煩非躁非寒非痛所以心中懊憹也聲如歎息而發一聲所謂外氣怫鬱也燥屎得除大便通利胃中安和故其病悉去也

有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧眞勞復也余診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也余曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

東垣十書曰馮內翰姪櫟年十六病傷寒目赤而煩渴脈七八至醫欲以承氣湯下之已煑熟矣偶東垣從外來馮告之故東垣切脈大駭曰幾殺此兒彼以脈數爲熱今脈七至是極熱也殊不知至眞要大論云病有脈從而病反者何岐伯對曰脈至而從按之不鼓諸陽脈皆然此陰盛格陽於外非熱也取薑附來吾以熱因寒用之法治之治藥未就而病者爪甲已青頓服八兩汗漸出而愈

西臺掾葛君瑞二月中病傷寒發熱以白虎湯主之面黑如墨本證遂不復見脈沉細小便不禁東垣初不知也及診之曰此立夏以前誤服白虎白虎大寒非行經之藥止能寒臟腑不善用之則傷氣本病曲隱於經絡之間或投以大熱之藥求以去陰邪他證必起非所以救白虎也可用溫藥升陽行經有難者曰白虎大寒非大熱何以救東垣曰病隱經絡間陽道不行而本證見矣又何難哉果如其言而愈

丹溪心法曰一男子素嗜酒因暴風寒衣薄遂覺倦怠不思飲食半日至晡後大發遍身疼痛如被杖微

惡寒天明診之六脈浮大按之豁然左手爲甚余作極虛受風寒治之人參爲君黃芪白术歸身爲臣蒼术甘草木通乾葛爲佐使大劑與之至五貼後通身汗如雨凡三易被得睡覺來諸證悉除

盧兄年四十九歲自來大便下血脈來沉遲濇面黃神倦者二年矣九月間因勞倦發熱自服參蘇飲二貼熱退早起小勞遇寒兩手背與面紫黑昏仆少時却醒身大熱妄語口乾身痛至不可眠脈之三部不調微帶數重取虛豁左手大於右手以人參二錢半帶節麻黃黃芪各一錢白术二錢當歸五分與三五貼得睡醒來大汗如雨卽安兩日後再發脅痛欬嗽若睡時嗽不作而妄語且微惡寒診其脈似前而左略帶緊余曰此體虛再感寒也再以前藥加半夏茯苓至十餘貼再得大汗而安後身倦不可久坐不思飲食用補中益氣去涼藥加神麴半夏砂仁五七十貼而安

杭州葉君章臘月因齋素中饑而冒寒作勞遂患發熱頭痛醫與小柴胡湯遂自汗神昏耳聾目不見物

余診其脈大如指似有力熱不退與人參黃芪白朮熟附炙甘草作大劑與之一日而汗少二日而熱減半耳微有聞目能視物初用藥至四貼前藥中加蒼朮與兩服再得汗而熱除本日遂去蒼朮附子又與前藥作小劑服三日而安

呂仲修年六十六歲正月間因忍饑冒寒作勞頭痛惡寒發熱骨節皆疼無汗至次日妄語熱愈甚而妄語時作時止熱亦不爲十分自服參蘇飲兩貼汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至第四日余診其脈兩手皆洪數而右爲甚此因饑而胃寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊當急以大劑補之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂以參芪白朮歸身陳皮炙甘草每貼加熟附子一片一晝夜服五貼至第三日口稍乾言語有次諸證雖解而熱未退遂去附子加白芍又兩日思食却作肉羹間與之又三日精神全二日許自汗出而熱退診其脈不數洪脈却尚有些洪脈作大脈論年高而誤汗此後必有虛證見又與前藥至次日言我欲大便自病

來不曾更衣今穀道逼痛坐努責狀如不堪醫者必欲投大黃巴豆等劑余謂大便非實祕爲是氣因誤汗而虛不得充腹無力可努仍與前補藥以肉粥及蓯蓉與之一日半煎濃葱椒湯浸下體方下大便軟塊者五六枚診其脈仍舊大未斂此因氣血未得回復又與前藥兩貼經兩日小便不通少腹下妨悶顚倒所苦但仰臥則點滴而出余曰補藥服之未盡於前藥內倍加參芪大劑服兩日小便方利而安

陶明節年十九歲不憚勞勤不息農作忽一日因勞倦大發熱而渴恣飲冷泉水數椀次日熱退目不識人言語謬誤自言肚痛不能轉側飲食不進身戰掉不自持又二日求余診之兩手脈濡而大而右爲甚遂於氣海灸三十壯用白朮黃芪各二錢熟附一片陳皮五分與十貼不效又增發熱微渴餘證仍在却可進二匙稀粥余曰此氣欲利而血未應也於前藥內去附子加當歸以和血因有熱加人參一錢半服三十貼而安

一人五月內患譫語大發熱肢體不能舉喜冷飲診

其脈洪大而數用黃芪茯苓濃煎如膏却用冷水調與之三四服後病者昏睡如死狀但顏色不改氣息如常至次早方醒諸證悉退而安

盧兄汗後再發熱妄言呂仲修汗後熱不退亦妄言陶明節熱退後不識人言語謬妄皆用參芪歸朮等補劑而愈信哉讝語屬虛者十居八九

衛生寶鑑曰省掾曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請余治之脈沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱腋下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫畱白虎加人參湯可服否余曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此證不可服白虎湯者有三傷寒證立夏以前立秋以後不可妄用一也太陽證無汗而渴者不可用二也況病人陰證悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連鬚葱白九莖水五大盞煎至三盞去滓分三服一日服之至夜則手足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈

眞定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞役飲食

失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢匕熱酒調下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後卽加口乾舌燥眼白時紅項强硬肢體不柔和小便淋赤大便祕澀循衣摸牀如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生全余診其脉七八至知其熱證明矣遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三行折其盛勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐服之以去其熱三日後病十分中減五六更與白虎加人參湯約半斤服之瀉熱補氣前證皆退戒以慎起居節飲食月餘漸得平復

友人劉巨源年六十五歲至正夏月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以爲四時證治之不愈逮十日請余治之曰右手三部脉沉細而微太陰證也左手三部脉微浮而弦陽虛在表也大抵陰多而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自

覆氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下利清穀急當救裏宜四逆湯溫之內經有用熱遠熱之戒口乾但嗽水不欲嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也內虛則外證隨時而變詳內外之證乃飲食勞倦寒傷於脾胃非四時之證明矣治病必察其本今適當大暑之時而得內寒之病以標本論之時爲標也病爲本也用寒藥則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從乎中治中治者溫之是也遂以錢氏白朮散加升麻就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而利小便人參藿香木香和脾胃進飲食㕮咀一兩煎服再服斑退而利止身溫而神清次服異功散治中湯辛溫之劑一二服五日得平止藥

靜江府提刑李君長子年十九歲四月病傷寒九日醫作陰證治之與附子理中丸數服其證增劇別易一醫又作陽證議論參差不敢服藥李君邀余往視坐間有數人余不欲直言其證但細爲分解令自忖

度之凡陽證者身大熱而手足不厥臥則坦然起則有力不惡寒反惡熱不嘔不瀉渴而飲水煩躁不得眠能食而多語其脈浮大而數者陽證也凡陰證者身不熱而手足厥冷惡寒踡臥惡聞人聲或自引衣蓋覆不煩渴不飲食小便自利大便反快其脈沉細而微遲者陰證也今診其脈數得六七至其母云夜來叫呼不絕全不睡又喜飲冰水余聞其言知陽證悉具且三日不見大便宜急下之余遂以酒煨大黃六錢甘草炙二錢芒硝五錢煎服至夕下數行燥糞二十餘塊是夜汗大出明日又往視之身凉脈靜矣

醫學綱目曰一僧傷寒發汗不徹有畜熱身面皆黃多熱朞年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與茵陳湯服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用茵陳梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以知爲度

竇大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢竇氏

親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明之醫乎名孫至曰卽日不可下明日正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆曰此證緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰證乎少陰證固不可下豈不知少陰一證自利淸水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服

太乙宮道士周德眞患傷寒發汗出多驚悸目眩身戰掉欲倒地衆醫有欲發汗者有作風治者有用冷藥解者病皆不除名孫至曰太陽經病得汗早欲解不解者因太陽經欲解復作汗腎氣不足汗不來所以心悸目眩身轉遂作眞武湯服之三服微汗自出遂解蓋眞武湯附子白朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽者惟能乾涸血液爾仲景云尺脈不足乃榮氣不足不可汗以此知腎氣怯則難得汗也明矣許學士云鄉里有一姓高者子年三十初得病身微汗脈弱惡風醫以麻黃藥與之汗遂不止發熱心多驚悸夜不得眠讝語不識人筋惕肉瞤振

振動搖醫又進鎮心藥予曰強汗之過也仲景云脉微汗出惡風不可服青龍湯服之則筋惕肉瞤此爲逆也惟眞武湯可救進此三服佐以清心竹葉湯數日遂愈

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沉弦欲絕厥陰脉也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脉生因渴私飲水一杯脉復退又見頭不舉目不開問之則犯陽易若只與燒裩散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一大服調燒裩散連進二服出大汗兩晝夜而愈

李良佐子病太陽證尺寸脉俱浮數按之無力余見其內陰虛與神朮加乾薑湯愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脉反沉小始見陰侯又與已寒加芍藥茴香等九五六服三日內約服丸六七百丸脉復生又用大建中接之大汗作而解

醫宗必讀曰社友韓茂遠傷寒九日以來口不能言

目不能視體不能動四肢俱冷衆皆曰陰證比余診之六脉皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚按其趺陽大而有力乃知腹有燥屎也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟施笠澤耳延至診之與余言若合符節遂下之得燥屎六七枚口能言體能動矣彼按手不及足者何以救此垂絕之證耶

休寧吳文哉傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷水其弟日休乞余決死期手揚足擲難以候脉五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲余曰浮大沉小陰證似陽也與附子理中湯當有生理日休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用熱劑烏乎敢余曰溫劑猶生凉劑立斃矣日休卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子二錢煎成入井冰冷與飲甫及一時狂躁定矣再劑而神爽服參至五斤而安文哉遺以書曰弟爲俗子所誤既登鬼籙矣而兄翁拯全之大奇亦大幸也方弟躁熱之時醫以三黃湯入牛黃服之轉加悶絕舉室哀號惟是治終具候

目瞑而已不意兄翁毅然以爲可活參附一投陰霾見睍荆妻稚子含淚歡呼一日即甦經年乃復嗚呼父母生之兄翁再生之昊天罔極莫可云喻敢誌巔末乞附案帙俾天下萬世知藥不可以浪投命不可以輕弃何莫非大仁人回春之澤哉

同社王月懷傷寒至五日下利不止懊憹目脹諸藥不效有以山藥茯苓與之慮其濡脫也余診之六脉沉數按其臍則痛此協熱自利中有結糞小承氣倍大黃服之果得結糞數枚利遂止懊憹遂安

婁水張爾和傷寒第二日頭痛發熱正在太陽余曰方今正月天令猶寒必服麻黃兩日愈矣若服冲和湯不惟不得汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滚水入浴桶置牀下熏之得汗如雨密覆半日易被神已爽矣至晚索粥家人不與余曰邪已解矣必不傳裏食粥何妨至明日果愈不以麻黃汗之傳變深重非半月不安也

光祿卿吳元水太楊歸頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言譫妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下

之余曰此三陽合病也誤下之決不可救乃以白虎湯連進兩服諸證漸減更加天花粉麥門冬二劑而安

縣學師楊龍友如夫人發熱頭疼六日後忽見紅疹衆皆以爲發斑用升麻犀角等湯凡五日不效余視之曰此疹也非斑也斑爲陽明火毒疹爲太陰風熱一表一裏如天與淵乃用防風二錢黃芩一錢甘草五分薄荷桔梗蟬殼各一錢四劑霍然矣

儒者吳君明傷寒六日譫語狂笑頭痛有汗大便不通小便自利衆議承氣湯下之余診其脉浮而大因思仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱小便清知不在裏仍在表也方今仲冬宜與桂枝湯衆皆咋舌掩口謗之甚力以譫狂爲陽盛桂枝入口必斃矣余曰汗多神昏故發譫妄雖不大便腹無所苦和其營衛必自愈耳遂違衆用之及夜而笑語皆止明日大便自通故夫病變多端不可謬執向使狐疑而用下藥其可活乎

內戚顧淡之勞神之後煩躁大熱頭痛時作時止醫

者禁其飲食與之解表見四日熱不退欲與攻裏余診之曰脉不浮緊安得表耶又不沉實安得裏耶惟心部大而濇此勞心而虛煩乃類傷寒非眞傷寒也若禁飲食即餓絕矣便以粥與之兼服歸脾湯五日而安

寓意草曰黃長人犯房勞病傷寒守不服藥之戒身熱已退十餘日外忽然昏沉渾身戰慄手足如冰舉家忙亂亟請余至一醫已合就薑附之藥矣余適見而駭之姑俟診畢再三闢其差謬主家自疑陰證言之不入又不可以理服只得與醫者約曰此一病藥入口中出生入死關係重大吾與丈各立擔承倘至用藥差悞責有所歸醫者云吾治傷寒三十餘年不知甚麽擔承余笑曰有吾明眼在此不忍見人活活就斃吾亦不得已也如不擔承待吾用藥主家方纔心安亟請用藥余以調胃承氣湯約重五錢煎成熱服半盞少頃又熱服半盞其醫見厥漸退人漸甦知藥不悞辭去仍與前藥服至劑終人事大清忽然渾身壯熱再與大柴胡一劑熱退身安門人問曰病者

云係陰證見厥先生確認爲陽證而用下藥果應其理安在答曰其理頗微吾從悟入可得言也凡傷寒病初起發熱煎熬津液鼻乾口渴便祕漸至發厥者不問知其爲熱也若陽證忽變陰厥者萬中無一從古至今無一也蓋陰厥得之陰證一起便直中陰經脣青面白遍體冷汗便利不渴身踡多睡醒則人事了了與傷寒傳經之熱邪轉入轉深人事昏惑者萬萬不同諸書類載陰陽二厥爲一門即明者猶爲所混況昧者乎如此病先犯房室後成傷寒世醫無不爲陰證之名所惑往往投以四逆等湯促其暴亡而諉之陰極莫救致寃鬼夜號尚不知悟總緣傳派不清耳蓋犯房勞而病感者其勢不過比常較重如發熱則熱之極惡寒則寒之極頭痛則痛之極所以然者以陰虛陽往乘之非陰盛無陽之比況病者始能勿藥陰邪必輕旬日漸發尤非暴證安得以陰厥之例爲治耶且仲景明言始發熱六日厥反九日後復發熱三日與厥相應則病旦暮愈又云厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈明明以熱之日數

定厥之瘥期也又云厥多熱少則病進熱多厥少則病退厥愈而熱過久者必便膿血發癰厥應下而反汗之必口傷爛赤先厥後熱利必自止見厥復利利止反汗出咽痛者其喉爲痹厥而能食恐爲除中厥止思食邪退欲愈凡此之類無非熱深發厥之旨原未論及於陰厥也至於陽分之病而妄汗妄吐妄下以致勢極如汗多亡陽吐利煩躁四肢逆冷者皆因用藥差悞所致非以四逆眞武等湯挽之則陽不能囘亦原不爲陰證立方也蓋傷寒纔一發熱發渴定然陰分先虧以其悞治陽分比陰分更虧不得已從權用辛熱先救其陽與純陰無陽陰盛隔陽之證相去天淵後人不窺製方之意見有成法轉相效尤不知治陰證以救陽爲主治傷寒以救陰爲主傷寒縱有陽虛當治必看其人血肉充盛陰分可受陽藥者方可囘陽若面黧舌黑身如枯柴一團邪火內燔者則陰已先盡何陽可囘耶故見厥除熱存津液元氣於什一已失之晚況敢助陽刦陰乎證治方云若證未辨陰陽且與四順丸試之直指方云未辨疑似且

與理中丸試之亦可見從前未透此關縱有深心無可奈何耳因與子輩詳辨并以告後之業醫者

金鑑春月病溫悞治二旬釀成極重死證壯熱不退譫語無論皮膚枯澀胸膛板結舌卷脣焦身踡足冷二便略通半渴不渴面上一團黑滯從前諸醫所用之藥大率不過汗下和溫之法絕無一效求救於余余曰此證與兩感傷寒無異但兩感證日傳二經三日傳經已盡即死不死者又三日再傳一週定死矣此春溫證不傳經故雖邪氣留連不退亦必多延幾日待元氣竭絕乃死觀其陰證陽證兩下混在一區治陽則礙陰治陰則礙陽於兩感證之病情符合仲景原謂死證不立治法然曰發表攻裏本自不同又謂活法在人神而明之未嘗教人執定勿藥也吾有一法即以仲景表裏二方爲治雖未經試驗吾天機勃勃自動若有生變化行鬼神之意必可效也於是以麻黃附子細辛湯兩解其在表陰陽之邪果然皮間透汗而熱全清再以附子瀉心湯兩解其在裏陰陽之邪果然胸前柔活人事明了諸證俱退次日即

思粥以後竟不需藥只此一劑而起一生於九死快哉

徐國禎傷寒六七日身熱目赤索水到前復置不飲異常大躁將門牖洞啓身臥地上展轉不快更求入井一醫洶洶急以承氣與服余診其脈洪大無倫重按無力謂曰此用人參附子乾薑之證奈何認爲下證耶醫曰身熱目赤有餘之邪躁急若此再以人參附子乾薑服之踰垣上屋矣余曰陽欲暴脫外顯假熱內有眞寒以薑附投之尚恐不勝回陽之任況敢以純陰之藥重劫其陽乎觀其得水不欲嚥情已大露豈水尚不欲嚥而反可嚥大黃芒硝乎天氣燠蒸必有大雨此證頃刻一身大汗不可救矣且既認大熱爲陽證則下之必成結胷更可慮也惟用薑附所謂補中有發井可以散邪退熱一舉兩得至穩至當之法也吾在此久坐如有差悞吾任其咎於是以附子乾薑各五錢人參三錢甘草二錢煎成冷服服後寒戰戛齒有聲以重綿和頭覆之縮手不肯與診陽微之狀始著再與前藥一劑微汗熱退而安

錢仲昭患時氣外感三五日發熱頭疼服表汗藥疼止熱不清口乾脣裂因而下之遍身紅斑神昏譫語食飲不入大便復祕小便熱赤脈見緊小而急謂曰此證全因誤治陽明胃經表裏不清邪熱在內如火燎原津液盡乾以故神昏譫妄若斑轉紫黑卽刻死矣目今本是難救但其面色不枯聲音尚朗乃平日保養腎水有餘如旱苗之側有下泉未竭故神雖昏亂而小水仍通乃陰氣未絕之徵尚可治之不用表裏單單只一和法取七方中小方而氣味甘寒者用之惟如神白虎湯一方足以療此蓋中州元氣已離大劑急劑複劑俱不敢用而虛熱內熾必甘寒氣味方可和之耳但方雖宜小而服藥則宜頻如饑人本欲得食不得不漸漸與之必一晝夜頻進五七劑爲浸灌之法庶幾邪熱以漸而解元氣以漸而生也若小其劑復曠其日縱用藥得當亦無及矣如法治之更一晝夜而熱退神清脈和食進其斑自化

張令施乃弟傷寒壞證兩腰僂廢臥牀徹夜痛叫百治不效求診於余其脈亦平順無患其痛則比前大

減余曰病非死證但恐成廢人矣此證之可以轉移處全在痛如刀刺尚有邪正互爭之象若全然不痛則邪正混爲一家相安於無事矣今痛大減實有可慮宜速治之病者曰此身既廢命安從活不如速死余蹙額欲爲救全而無治法諦思良久謂熱邪深入兩腰血脈久閉不能復出止有攻散一法而邪入既久正氣全虛攻之必不應乃以桃仁承氣湯多加肉桂附子二大劑與服服後即能強起再倣前意爲丸服至旬餘全安此非昔人之已試乃一時之權宜也然有自來矣仲景於結胷證有附子瀉心湯一法原是附子與大黃同用但在上之證氣多故以此法瀉心然則在下之證血多獨不可倣其意而合桃仁肉桂以散腰間之血結乎後江古生乃弟傷寒兩腰僂廢痛楚不勞思索徑用此法二劑而愈

黃曙修與乃翁起潛春月同時病溫乃翁年老而勢輕曙修年富而勢重勢重者以冬不藏精體虛不任病耳余見其頭重著枕身重著席不能轉側氣止一絲不能言語畏聞聲響於表汗藥中用人參七分伊

表姪施濟卿恐其家婦女得知不與進藥暗贈人參入藥服後汗出勢減次日再於和解藥中贈人參一錢與服服後即大便一次曙修頗覺輕爽然疑藥下之早也遣人致問余告以此證表已解矣裏已和矣今後緩調即日向安不必再慮往診見老翁病尚未愈頭面甚紅謂曰望八老翁下元虛憊陽浮於上與在表之邪相合所謂戴陽之證也陽已戴於頭面不知者更行表散則孤陽飛越而危殆立至矣此證從古至今只有陶節庵立法甚妙以人參附子等藥收拾陽氣歸於下元而加葱白透表以散外邪如法用之即愈萬不宜遲渠家父子俱病無人敢主且駭爲偏僻之說旋即更醫投以表藥頃刻陽氣升騰肌膚粟起又頃刻寒顫咬牙渾身凍裂而逝翁雖海濱一氓留心管晏富國之術而賫志以沒也良足悼矣其醫於曙修調理仍行尅伐致元氣日削謝絕醫藥靜養六十餘日方起于牀愈後凡遇戚友家見余用藥率多詆訾設知當日解表和中俱用人參肯捨命從我乎是其所以得全者藉于濟卿之權巧矣

陸平叔文學平素體虛氣怯面色痿黃藥宜溫補不宜寒涼固其常也秋月偶患三瘧孟冬復受外寒雖逗寒熱一班而未至大寒大熱醫者以爲瘧後虛邪不知其爲新受實邪也投以參朮補劑轉致奄奄一息遷延兩旬間有從外感起見者用人參白虎湯略無寸效昏昏嘿嘿漫無主持昆弟子姪倉皇治木名昌診視以決行期之早暮非求治療也昌見其脈未大壞腹未大滿小水尚利但筋脈牽掣不停因謂此病九分可治祇恐手足痿廢仲景有云經脈動惕者久而成痿今病已廿三日之久血枯筋燥從可識矣吾今用法治則兼治當於仲景法外另施手眼以仲景雖有大柴胡湯以解表裏之法而無治痿之法變用防風通聖散成方減白朮以方中防風荊芥薄荷麻黃桔梗爲表藥大黃芒硝黃芩連翹梔子石膏滑石爲裏藥原與大柴胡之制相倣但內有當歸川芎芍藥正可領諸藥深入血分而通經脈減白朮者以前既貽誤不可再誤耳當晚連服二劑第一劑殊覺相安第二劑大便始通少頃睡去體間津津有汗次

早再診筋脉不爲牽掣但陽明胃脉洪大反加隨用大劑白虎湯石膏知母每各兩許次加柴胡花粉芩蘗連翹梔子一派苦寒連進十餘劑神識始得漸清粥飲始得漸加經半月始起坐於牀經一月始散步於地人見其康復之難咸憂其虛抑且略一過啖即爾腹痛便泄儼似虛證昌全不反顧但於行滯藥中加用柴胡桂枝升散餘邪不使下溜而變痢以取儻然後改用葳蕤二冬略和胃氣間用人參不過五分前後用法一一不違矩矱乃克起九死於一生也

景岳全書曰余在燕都嘗治一王生患陰虛傷寒年出三旬而舌黑之甚其芒刺乾裂焦黑如炭身熱便結大渴喜冷而脉則無力神則昏沉羣醫謂陽證陰脉必死無疑余察其形氣未脫遂以甘溫壯水等藥大劑進之以救其本仍間用涼水以滋其標蓋水爲天一之精涼能解熱甘可助陰非若苦寒傷氣者之比故於津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之證亦所不忌由是水藥並進前後凡用人參熟地輩各一二斤附子肉桂各數兩冷水亦一二斗然後諸證漸退

飲食漸進神氣俱復矣但察其舌黑則分毫不減余甚疑之莫得其解再後數日忽舌上脫一黑殼而內則新肉燦然始知其膚腠焦枯死而復活使非大爲滋補安望再生若此一證特舉其甚者紀之此外凡舌黑用補而得以保全者蓋不可枚舉矣所以凡診傷寒者當以舌色辨表裏以舌色辨寒熱皆不可不知也若以舌色辨虛實則不能無誤蓋實固能黑以火盛而焦也虛亦能黑以水虧而枯也若以舌黃舌黑悉認爲實熱則陰虛之證萬無一生矣

弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得此舌手足厥冷呃逆不止衆醫猶作火治幾致危殆院判吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之爲道有是病必用是藥附子療寒其效可數奈何世皆以爲必不可用之藥寧視人之死而不救不亦哀哉凡用藥得宜效應不異不可便謂爲百無一治而棄之也

余嘗治一衰翁年踰七旬陡患傷寒初起卽用溫補調理至十日之外正氣將復忽爾作戰自旦至辰不能得汗寒慄危甚告急於余余用六味回陽飲入人

參一兩薑附各三錢使之煎服下咽少頃卽大汗如浴時將及午而浸汗不收身冷如脫鼻息幾無復以告余余令以前藥復煎與之告者曰先服此藥已大汗不堪今又服此尚堪再汗乎余笑謂曰此中有神非爾所知也急令再進遂汗收神復不旬日而起矣嗚呼發汗用此而收汗復用此無怪乎人之疑之也而不知汗出與汗之收者皆元氣爲之樞機耳故余紀此欲人知闔闢之權不在乎能放能收而在乎所以主之者

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百七十九卷目錄

醫部彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

黃帝素問 生氣通天論　陰陽別論　異法方宜論　脈要精微論　通評虛實論　氣穴論　氣交變大論　五常政大論

靈樞經 癰疽篇　刺節眞邪篇　脈度篇　寒熱病篇　玉版篇

張機金匱要略 病脈證治

華佗中藏經 總論　論五疔狀候

孫思邈千金方 總論脈證治法　疔腫

竇漢卿瘡瘍全書 圍法貼紙訣　開刀手法　疔瘡總論　拔法　各種飛遊毒　紅絲瘡

劉完素六書 總論

李杲十書 總論　用藥加減法

朱震亨心法 總論證治　痛證　疔瘡

藝術典第三百七十九卷

醫部彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

（按外科證生於各部分者已詳前雜病例中如發腦百會等病之見於頭門發面發頤等病之見於面門瘰癧天柱等病之見於頸門發背對心等病之見於背門內癰井疽見於胷門臁瘡鶴膝見於四肢婦精疝癩見於前陰之類此皆不復贅）

黃帝素問

生氣通天論

高粱之變足生大疔受如持虛

註高粱厚味也味厚傷形氣傷於味形氣傷則肌腠虛矣高粱所變之熱毒逆於肉理而多生大疔蓋膚腠虛而熱毒乘之有如持虛器而受之也

榮氣不從逆於肉理乃生癰腫

註邪逆於肉理氣分而陰陽不和則生癰腫經曰陽氣有餘榮氣不行乃發爲癰陰陽不逼兩熱相搏乃化爲膿

陰陽別論

三陽爲病發寒熱下爲癰腫

註三陽者太陽也太陽之氣主表邪之中人始於皮毛邪正相搏發爲寒熱之病矣太陽主開病則開闔不得邪氣從之逆於肉理乃生癰腫

異法方宜論

東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆爲癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來

註魚性屬火鹹又勝血靈樞經曰飲食不節陰氣不足陽氣有餘榮氣不行乃發爲癰

脉要精微論

帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也

註 以勝治之者以五行氣味之勝治之而愈也如寒淫於內治以甘熱如東方生風風生木木生酸辛勝酸之類

通評虛實論

所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得頃時回

註 癰疽之患榮衞血氣並實皮肉筋骨皆傷非若四時之有淺深冬時之少鍼石也癰者擁也疽者阻也謂熱毒外擁內阻宜即刺之不得遲延時頃而使邪毒之回轉也

氣穴論

邪溢氣壅脈熱肉敗榮衞不行必將爲膿內銷骨髓外破大膕畱於節湊必將爲敗

註 夫氣爲陽邪畱於肌腠之氣分邪正相搏則爲病熱故有壅膿消破之敗證矣邪氣淫溢則正氣自壅谿谷之氣與脈相通是以脈熱於內而肉敗

於外也榮衞不行則血氣留滯而爲癰膿膕足之股肉也節湊筋骨相連之處邪留其間則筋骨必將爲敗矣

氣交變大論

歲木不及復則炎暑流火病寒熱瘡瘍疿疹癰痤

註　皆暑熱之病也

歲水不及民病寒瘍流水

註　此寒毒而無熱化故發爲寒瘍流水而無膿也

五常政大論

委和之紀其病支廢癰腫瘡瘍

註　皆金盛而邪傷肝也

卑監之紀其動瘍涌分潰癰腫

註　土運不及則化氣不能施其令逆於肉理也

赫曦之紀其病笑瘧瘡瘍血流

註　皆火熱之爲病也

堅成之紀其動暴折瘍疰

註　暴折金受其傷瘍疰皮膚之疾也

少陰司天熱氣下臨甚則瘡瘍

註　暑熱淫盛也

靈樞經

癰疽篇

黃帝曰余聞腸胃受穀上焦出氣以溫分肉而養骨節通腠理中焦出氣如露上注谿谷而滲孫脉津液和調變化而赤爲血血和則孫脉先滿溢乃注於絡脉皆盈乃注於經脉陰陽已張因息乃行行有經紀周有道理與天合同不得休止切而調之從虛去實瀉則不足疾則氣減留則先後從實去虛補則有餘血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之可得聞乎岐伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草蓂不成五穀不殖經路不通民不往來巷聚邑居則別離異處血氣猶然請言其故夫血脉榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化爲熱熱勝則腐肉肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋

筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相營經脈敗漏熏於五臟臟傷故死矣

註 人之血氣流行與天地相參與日月相應晝夜環轉之無端也一息不運則留滯而爲癰多不治之死證矣

黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷骨髓不爲焦枯五臟不爲傷故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰熱氣淳盛下陷肌肉筋髓枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也

註 人之血氣流行環轉出入而淫邪泮衍變易無常且氣秉有厚薄邪客有微甚是以死生成敗各不同焉

刺節眞邪篇

虛邪之中人也灑淅動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨則爲骨痹搏於筋則爲筋攣搏於脉中則爲血閉不通則爲癰

註　灑淅動形故搏於皮脉肉筋骨而爲痹爲攣爲癰爲痒陰勝則爲寒寒則眞氣去有傷衞氣則爲不仁此皆邪氣之所生也

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久畱而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕有所疾前筋筋屈不能伸邪氣居其間而不反發爲筋溜有所結氣歸之衞氣畱之不得反津液久畱合而爲腸溜久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液畱之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣幷日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣歸之邪畱而不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也

註　寒與熱搏者形中之陰陽二氣也蓋形舍氣氣歸形形氣之相合也是以傷形則病氣傷氣則病

形結氣歸之者寒熱相搏之氣歸於邪留之形所也凡此數氣者其發無定處而有肉枯骨蝕筋溜昔瘤之定名也

脈度篇

六腑不和則留爲癰

註　在內者六腑爲陽在外者皮膚爲陽本經曰陽氣有餘榮氣不行乃發爲癰是以六腑不和則血氣留滯於皮腠而爲癰此病從內而外也

寒熱病篇

五臟身有五部伏兔一腓二腓者腨也背三五臟之腧四項五此五部有癰疽者死

註　伏兔腎之街也腨者脾之部也背者肺之俞也五臟俞者謂五椎之心俞也項者肝之俞也本經曰癰疽之發不從天下不從地出積微之所生也故五部之有癰疽者乃五臟漸積之鬱毒外應於血氣之不和而爲癰疽故五部有此者死

玉版篇

黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足

陽氣有餘榮氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲膿小鍼能取之乎岐伯曰聖人不能使化者爲其邪不可留也故兩軍相當旗幟相望白刃陳於中野者此非一日之謀也能使其民令行禁止士卒無白刃之難者非一日之教也須臾之得也夫至使身被癰疽之病膿血之聚者不亦離道遠乎夫癰疽之生膿血之成也不從天下不從地出積微之所生也故聖人自治於未有形也愚者遭其已成也黃帝曰其已形不予遭膿已成不予見爲之奈何岐伯曰膿已成十死一生故聖人弗使已成而明爲良方著之竹帛使能者踵而傳之後世無有終時者爲其不予遭也

註皮膚分肉之氣血從內而出於外少有留滯則漸積而成癰膿如發於外而小者易愈大者多害若留積在內成癰膿而不見者十死一生也

黃帝曰其已有膿血而後遭乎不道之以小鍼治乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其惟砭石鈹鋒之所取也

註　癰小而以小鍼治之者其功小而易成癰大而以大鍼治之者多有逆死之害故其已成膿血者其惟砭石鈹鋒之所取也

漢張機金匱要略

病脉證治

諸浮數脉應當發熱而反灑淅惡寒若有痛處當發其癰師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手掩腫上熱者爲膿不熱者爲無膿

問曰寸口脉浮微而濇法當亡血若汗出設不汗者云何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

病金瘡王不畱行散主之

華佗中藏經

總論

夫癰疽瘡腫之作者皆五臟六腑畜毒不流則皆有矣非獨因榮衞壅塞而發者也其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者陰之毒發於上者陽之毒發於外者六腑之毒發於

內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑則易治感於五臟則難瘳也又近骨者多冷近虛者多熱近骨者久不愈則化成血蠱近虛者久不愈則傳氣成漏或蠱則多癢少痛或先癢後痛生漏則多痛少癢或不痛不癢內虛外實者多痛少癢血不止則多死膿疾潰則多生或吐逆無度飲食不時皆癰疽之使然種候萬端要在憑詳

論五疔狀候

五疔者皆由喜怒憂思衝寒冒熱恣飲醇酒多嗜甘肥毒魚酢醬色慾過度之所爲也畜其毒邪浸漬臟腑久而不散始變而成其名有五一曰白疔二曰赤疔三曰黃疔四曰黑疔五曰青疔白疔起於右鼻下初如粟米根赤頭白麻木或痛癢使人憎寒頭重狀若傷寒不欲食胷膈悶喘促昏冒者死未者可治此疾不過五日禍必至矣宜速治之赤疔在舌下根頭俱赤發痛舌本硬不能多言驚煩悶恍惚多渴引水不休小便不通狂者死也未者可治此不七日禍必

至矣大人小兒皆能患也黃疔起於脣齒齦邊其色黃中有黃水發則令人多食而還出手足麻木涎出不止腹脹而煩多睡不寤者死也未者可治黑疔者起於耳前狀如瘢痕其色黑長或不定使人牙關急腰脊膝不仁不然則病亦不出三歲死皆由腎氣漸絕也宜慎慾事青疔起於目下始如瘢瘤其身青硬如石使人目昏昏然無所見多恐悸睡不安寧久不愈令人盲或脫睛有此則不出一年禍必至矣白疔其根肺赤疔其根心黃疔其根脾黑疔其根腎青疔其根肝五疔之候最爲巨疾不可不察也

唐孫思邈千金方

總論脈證治法

脈數身無熱即內有癰

諸浮數脈當發熱而反灑灑惡寒若有痛處當結爲癰

脈微而遲必發熱脈弱而數此爲振寒當發癰腫

脈浮而數身體無熱其形默默胃中微燥不知痛處其人當發癰腫

脉滑而數滑則爲實數則爲熱滑則爲榮數則爲衞榮衞相逐即結爲癰熱之所過即爲癰膿身體有痛處時時苦有瘡

趺陽脉滑而數法當下重少陰脉滑而數婦人陰中生瘡

夫癰疽初發至微人皆不以爲意此實奇患惟宜速治稍遲緩乃即病成以此致禍者不一但發背外皮薄爲癰外皮厚爲疽宜急治之

凡癰疽初發或似小癤或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿於此皆微候善察之見有小異即須大驚忙急須攻治及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸當頭百壯其大重者灸四面及中央二三百壯數灸不妨多也復薄以冷藥種種救療必速瘥也

凡用藥貼法皆當瘡頭處其藥開孔令洩熱氣亦當頭以火針針入四分即瘥

凡癰疽瘤石癰結筋瘰癧皆不可就針角針角者少有不及禍也

凡癰無問大小已覺卽取膠如手掌大暖水浸令軟納納然稱大小當頭上開一孔如錢孔大貼腫上令相當須臾乾急若未有膿者卽定不長已作膿者當自出若以鋒針當孔上刺出膿大好至瘥乃洗去膠

凡腫根廣一寸已下名癤一寸已上名小癰如豆粒大者名皰子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取瘥乃止

凡癰高而光大者不大熱其肉正平無尖而紫者不須攻之但以竹葉黃芪湯申其氣耳肉正平爲無膿也癰卒痛以八味黃芪散傅之大癰七日小癰五日其自有堅强者寧生破發乳若熱手不可得近者先內服王不留行散外摩發背膏若背生破無苦在乳宜令極熟候手按之隨手卽起者瘡熟也須針之針法要得著膿以意消息胷背不過一寸斟量不得膿卽與食肉膏散著銳頭內癰口中如體氣熱歇卽服木占斯散五日後癰欲著痂者卽服排膿內塞散

凡癰破之後便綿惙欲死內寒外熱（闕文）腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是風毒耳勿針之

宜服升麻湯外摩膏破癰口當令上留三分近下一分針之務令極熟熟便不痛破後敗壞不瘥者作猪蹄湯洗之日二度夏用二日冬用六七日用湯半劑亦可夫癰壞後有惡肉者宜猪蹄湯洗去穢次傅蝕肉膏散惡肉盡後傅生肉膏散及摩四邊令好肉速生當斷絕房室忌風冷勿自勞煩待筋脈平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則裏潰潰則重發發即難救慎之慎之白痂最忌

凡諸暴腫一一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血小豆末傅之其間數數以針刺去血若失療已潰爛者猶服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之外以升麻湯洗熨之摩升麻膏若生息肉者以白蔄茹散傅之青黑肉去盡停止好肉生傅升麻膏如肌不生傅一物黃芪散若傅白蔄茹青黑惡肉不盡者可以㯃頭蔄茹散半錢和白蔄茹散三錢稍稍傅之其散各取當色單擣下篩直爾成散用之或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬時

受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煎楊柳皮及暖熨之有赤氣點點者卽刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑未瘥便住藥以爲無效禍卽至矣中間用白薇散佳又有氣腫痛其狀如癰腫無頭虛腫色不變但皮急痛不得近手亦須服此五香次日白針瀉之次與蒺藜散傅之

胷中痛短氣者當入闇室中以手指捺左眼視若見光者胷中有結癰若不見光者是瘭疽內發出也

經云氣宿於經絡中氣血俱澀不行壅結爲癰疽也不言熱之所作其後爲癰又陽氣湊集寒化爲熱熱甚則肉腐爲膿也又人體有熱被寒冷搏之而脈凝結不行熱氣壅結成癰疽方有灸法亦有溫治法以其中冷未成熱之時宜用冷藥貼傅之治熱已成以消熱令不成膿也赤色腫有尖頭者藜蘆膏傅之一云酢和蚌蛤灰塗乾則易之

余平生凡治癰疽得效者皆卽記之考其病源多是藥氣所作或有上世服石遂令子孫多有此疾食中

尤不宜食麪及酒蒜及慎溫牀厚被能慎之者可得終身無疾此皆躬自驗之故特論之也

疔腫

夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此二氣更相擊怒當是時也必有暴氣夫暴氣者每月之中必有卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脉遂使腠理壅隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣泄變成癰疽疔毒惡瘡諸腫至於疔腫若不預識令人死不逮時若著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡痍皆無所逃

凡療疔腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥氣得入針孔中佳若不達瘡內療不得力

又其腫好著口中頰邊舌上見赤黑如珠子磣痛應心是也是秋冬寒毒久結皮中變作此疾不即療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經五六日不瘥眼中見

火神惛口乾心煩卽死也

一曰麻子疔其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子及衣麻布幷入麻田中行

二曰石疔其狀皮肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺之肉內陰陰微疼忌瓦礫磚石之屬

三曰雄疔其狀頂頭黑黶四畔仰瘡皰漿起有水出色黃大如錢孔形高忌房事

四曰雌疔其狀瘡頭稍黃向裏黶亦如灸瘡四畔皰漿起心凹色赤大如錢孔忌房事

五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑黶四邊有皰漿起如赤粟米忌火炙爍

六曰爛疔其狀色稍黑有白瘢瘡潰則有膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛臭物

七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三十六者可治俗名黑皰忌嗔怒畜積愁恨

八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似

蛇眼大體硬忌惡眼看幷嫉妬人見之及毒藥

九曰鹽膚疔其狀大如匙面四面皆赤有黑粟粒起忌食鹹物

十曰水洗疔其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑黶汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鎌疔其狀瘡闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒爍忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治

十二曰浮漚疔其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛

十三曰牛拘疔其狀肉皰起掐不破

右十三種瘡初起必先癢後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆難治其麻子疔一種始末惟癢所最忌者不得犯觸犯觸者即難療其浮漚疔狗疔兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸之狀但脊強瘡痛極甚不可忍者是也

宋竇漢卿瘡瘍全書

圍法貼紙訣

凡用圍藥多加功夫攪千餘下其藥自稠輕手圍之留孔必須如鵝子形狀須用薄紙貼之務要扯碎貼上免致綳裂疼痛之苦待圍藥略乾再用調藥餘汁潤之以助藥力況藥乾不能入肌肉借濕以通竅耳

開刀手法

凡瘡瘍之起疼痛固屬於心火久而陽氣昇上蒸肉化爲膿若不原其膿之有無遽爾開刀則鮮血突出膿何從來致患者煎寒發熱日夜疼痛無法可止可先將指頭按患上隨手而起四畔悉輭觀其頭聚擇尻神不犯吉日將刀頭向上開之方不致傷新肉取出刀再撚綿紙條潤油度之使膿水齊會半日扯出則膿水易乾外貼呼膿膏四圍再用搜膿散敷之

疔瘡總論

大抵疔瘡有十三種而有青黃赤白黑所以應五臟也復有暑疔火疔氣疔冷疔者皆以其時候緩急浮實之異但初發起或先後痛先寒後熱四肢拘急沉重強痛者得證便發寒熱瘡邊麻漸至半身大痛應

心嘔逆自利足冷至膝四畔紫黑色皆爲重證惟麻木始末皆痒其證候寒熱與諸疔瘡同但覺背强其痛甚者乃觸犯所致即取枸杞根擣汁服之彌佳再狗屎白色者得雨露之功臭氣已去加枸杞根和勻絞取清汁服之尤良但有卒患喉痛心寒熱或腹痛惡寒發熱者當預防生此疔證也凡疔瘡多生口邊頰內或舌上赤黑點點如珠磣痛應心者是也不即治之日夜根長流入諸脉如箭入身不得動搖經久五六日後甚者毒氣入腹眼中見火神昏煩悶嘔吐恍惚如醉如痴不可療矣疔瘡有頭黑硬而凹者瘡頭白而腫實者瘡頭如豆垽色者瘡頭鮮紅色者瘡頭內有黑脉者瘡頭紅赤而浮虛者瘡頭如梔而黃者瘡頭如金箔者瘡頭如茱萸者瘡頭如石榴子者有初如風疹粉刺搔破入風則黃水出其裏有赤黑脉而微腫者肉中突起如魚眼赤黑慘痛徹骨者結久皆爲爛瘡瘡下深孔如大針穿物初生時突起如釘故名疔瘡令人惡寒發熱四肢强直而牽痛一二日瘡變黑色焦黑腫大光起根硬不可近犯之則痛

甚甚則發於頭面手足骨節間者此氣血聚會之所宜急治之有似灸瘡四邊泡漿者但其瘡熟時膿水出瘡孔如蜂窠病易瘥也此瘡惡證眼黃面青舌黑冷汗發渴脚冷至膝下不食自利瘡冷不痛嘔逆瘡不起發四畔不紅瘡邊麻木乾黑生刺瘡邊紫黑色磣痛應心眼中見火神昏煩悶神思恍惚猶如醉如痴者皆難治也試以針刺患人手足中指不痛者難治凡初生時紅輭溫和忽然頂陷黑謂之走黃此證危矣急服飛龍奪命丹追疔奪命湯其有發於太陽眼邊者名曰釘腦疔十死一生內經以白疔發於右鼻赤疔發於舌根黃疔發於口脣黑疔發於耳前青疔發於目下蓋取五色以應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在頭面手足骨節間者甚急

拔法

凡疔瘡之起多發於嘴脣上邊初如米大或如粉刺擠破入湯火風氣亦要變成疵瘡疵瘡者卽疔之別名也先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛熱酒半

碗過下以衣覆患上略出汗爲妙上午服藥下午卽將絕利磁鋒劃破瘡口十字卽摻飛龍奪命末在內而外用蟾舌研爛蟾肚底皮貼之內服追疔湯劑若發於鬚髮者卽剃去鬚髮如前法治之此法百發百中活人多矣凡發於頭面上者切不可用冷藥敷之若敷冷藥遏熱毒惡戾之氣入於喉間斷不能生矣

各種

芝麻疔用黑雲膏或用紫花草敷瘡上走注者遍身疼不能轉動服錮毒流氣飲蟾酥丸

氣疔用勝金錠服蟾酥丸外用紫花草敷之

火疔用勝金錠服蟾酥丸紫花草敷瘡上

冷疔者高粱之變風濕餘毒天陰久冷攻於膝下傳於足太陰經初生如米漸成潰爛其色如煤敗血來侵骨肉損壞遂成大患經年骨節疼痛累歲不能生肌先用艾葉蛇牀子紫蘇豨薟草煎湯洗之內服黃芪白术蒼术當歸白芍連翹生地之藥外用隔紙膏貼之節勞內省亦可瘳矣

魚臍疔春用黑雲膏夏用蟾舌膏秋用桐淚膏冬用

勝金錠

飛遊毒

此毒因榮衛受其肌熱故生此疽赤腫走注不定用溫水洗患處用三稜針刺毒上二三十針或磁鋒砭之亦妙隨用拔毒散傅之

紅絲瘡

夫紅絲者心腸積毒氣血相凝灌於經絡之間發於肌膚之上紅絲貫穿如一紅線或疼或痒皆由風熱相乘而生如箭之速若行至心間卽死急當頭以磁鋒刺破擠出毒血其紅絲之中再刺之方絕其根急用當歸連翹解毒之劑治之須戒酒數日

金劉完素六書

總論

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本內經曰膏粱之變足生大疔其原在裏發於表也受持如虛言內結而發諸外未知從何道而出皆是從虛而出也假令太陽經虛從背而出少陽經虛從鬢而出陽明經虛從髭而出督脉經虛從腦而出經曰地之濕氣感則

害人皮膚筋脉其在外盛則內行若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐氣傷於內也有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從逆於內裏乃生癰疽此因失托裏及失疎通又失行榮衞也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衞三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衞者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪氣深於內也故先疎通以絕其原外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衞也用此三法之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻減而易痊愈故經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰知其要者一言而終不知其要流散無窮

素問云痛痒瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核怫鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結爲癰近於火氣微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也爲風濕之所乘則

生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開爲風濕所乘脾氣濕而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經絡使血澀而不通壅結成腫風邪不作即無頭無根寒血相搏作者即有頭有根壅盛則爲膿赤根腫則風氣流潰也瘡以痛痒則爲實痒則爲虛非虛爲寒也正謂熱之微甚也痒則美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火漬之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故也瘡瘍皆爲火熱而反腐出膿水者猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則爲癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘤氣赤瘤丹熛熱勝氣火之色也

人近火氣微熱則癢熱甚則痛附近則灼而爲瘡皆火之用也或癢痛如鍼輕刺者猶飛迸火星灼之然也癢者美疾也炙之以火漬之以湯而癢轉甚者微

熱之所使也因而癢去者熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄而熱散也或夏熱皮膚痒以冷水沃之不去者寒能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故也痒得爬而解者爬爲火化微則亦能令痒甚則痒去者爬令皮膚辛辣而屬金化辛能散故金化見則火力分而解矣或云痛爲實痒爲虛者非謂虛爲寒也正謂熱之微甚也或疑瘡瘍皆屬火熱而反腐爛出膿水者何也猶穀肉果菜至於極熱則腐爛而潰爲汚水也潰而腐爛者水之化也所謂五行之理過極則勝己者反來制之故火熱過極則反兼於水化又如鹽能固物令不腐爛者鹹寒水化制其火熱使不過極故得久固也萬物皆然

元李杲十書

總論

膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆於肉理乃生癰腫榮氣者胃氣也飲食入於胃中先輸於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜

以厚味積久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走於空竅而先行陽道今反行陰道則濕氣大盛子令母實火乃大旺實熱既盛必來尅腎若不慎房事損其眞水則水泛而濕熱之化上行其癰必出背上及腦此爲大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛者如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標本言之先受病爲本非苦寒之劑爲主爲君不能除其苦楚疼痛也諸瘡瘍有痛往往多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必無少減之理此其悞也若使經絡流通臟腑中去其壅滯必無痛矣痛則以苦寒之劑除之無不愈者瘡瘍食肉與自殺無異法當瀉氣而反補之故也

用藥加減法

發背疔腫膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加五味子恍惚不寧加人參茯神虛而發熱者加地黃苦蔞根潮熱者加柴胡地骨皮渴不止者加知母赤小

豆虛煩者加枸杞天門冬自利者加厚朴膿多者加當歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白蘞官桂有風邪者加獨活防風心驚悸者加丹砂口目瞤動者加羌活細辛嘔逆者加丁香藿葉痰多者加半夏陳皮

朱震亨心法

總論證治

癰疽只是熱勝血

六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟在陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死證遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

陽滯於陰脈浮洪弦數陰滯於陽脈沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之

人中年以後不可生癰纔有痛腫參之脈證但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓

氣之藥慮虛之禍如指諸掌

內托之法河間治腫焮於外根盤不深形證在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵於內急須內托以救其裏宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便祕及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於些小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難爲倚仗

瘡先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者此爲虛宜補亦有穢氣所觸宜和解風寒逼者宜溫散

加味十全湯治癰疽後補氣血進飲食實爲切要蓋膿血出多陰陽兩虛非此藥何以回生起死惜其不分經絡不載時令又在識者觸類而長之今之外科於瘡瘍腫平痛寬遂以爲安漫不加省往往於結痂

後兩三月或半年虛證乃見醫者不察病者不悟無補益調養之功因而轉成他病者惜哉予治一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言問不答肌上起白屑如麩片時在冬月予作極虛處治詢其弟乃知半年前曾於臂背腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣予爲作參芪白术當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥一斤白屑沒者大半病者自喜呼吸有力補藥應效以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸子作料煎飲子頓服之予諫之不聽因而不救書以警云

痛證

諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用及引經藥則可又云諸瘡以當歸黃連爲君連翹甘草黃芩爲佐

諸痛痒瘡瘍屬火若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之

若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃連

黃芩大力子甘草在下焦者加黃蘗若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羌活荆芥白芷蒼朮連翹取其風能勝濕

諸瘡藥膿窠治熱燥濕爲主用無名異乾疥開鬱爲主用茱萸

蟲瘡如癬狀退熱殺蟲爲主蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺蟲樟腦松香頭上多加黃連方解石蛇牀定痒殺蟲松皮炭主膿腫多者加白芷開鬱痛多加白芷方解石蟲多加藜蘆盤蝥痒多加枯礬陰囊瘡加茱萸濕多香油調乾痒出血多加大黃黃連猪脂調紅色加黃丹青色加青黛蟲多加錫灰蕪荑檳榔

疔瘡

疔用針刀鏃破頭上以蟾酥敷之後用菉豆野菊莎末酒調飲醉睡覺卽定痛熱除不必去疔自愈也

治一切疔瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十卷目錄

醫部彙考三百六十

外科癰疽疔毒門二

齊德之外科精義 診候入式法 榮衞色脈參應之法 論持手訣消息法 三部所主腑臟病論 脈證名狀二十六種所主病證 三部脈所主證候 三部脈所主雜病法訣 將護忌慎法 論虛實法 辨淺深法 辨膿法 辨證法 辨善惡法 砭鎌法 貼熁法 溻漬法 針烙法 灸療法 內消法 追蝕法 托裏法 止痛法 用藥增損法 權變通類法 論五發疽 總論疔瘡

戴思恭證治要訣（癰疽癤毒證治）

薛己醫按（用藥總論　治法三要　灸法　攻補法　分三因　陰滯於陽則生癰　陽滯於陰則生疽　明本末　膿潰論　生肌止痛　惡肉論　腫瘍　潰瘍　作痛　發熱　作渴　作嘔　便祕　疔瘡）

藝術典第三百八十卷

醫部彙考三百六十

外科癰疽疔毒門二

元齊德之外科精義

診候入式法

夫醫者人之司命也脉者醫之大業也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣夫大方脉婦人小兒風科必先診視後對證處藥獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別名方脉診察

於瘡科之輩甘當淺陋之名噫其小哉如是原夫瘡腫之生皆由陰陽不和氣血凝滯若不診候何以知陰陽勇怯血氣聚散耶由是觀之則須信療瘡腫於診候之道不可闕也歷觀古今治療瘡腫方書甚多其間診候之法略而未詳比夫諸科甚有滅裂愚雖不才輒取黃帝素問難經靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華佗千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中診候瘡腫之說簡編類次貫成篇帙首載診候入式之法次論血氣色脈參應之源後明脈之名狀所主證候及瘡腫逆從之方庶使爲瘡腫科者覽此則判然可曉了無疑滯於胷次一朝臨疾診候至此則察逆從決成敗若黑白之易分耳

榮衛色脈參應之法

夫天地之道曰陰與陽陰陽在人曰血與氣蓋血者榮也氣者衛也榮者榮於中衛者衛於外所以榮行脈中衛行脈外脈者血氣之先也血非脈則焉能榮於中氣非脈則焉能衛於外二者相資而行內則通於五臟六腑十二經絡外則濡於九竅四肢百節萬

毛晝夜循行如環無端以成其度會於寸口變見於脉故曰氣血者人之神也脉者氣血之神也所以治病之始五決爲紀蓋五決者五臟之色脉也脉應於內色應於外其色之與脉當相參應故曰能合色脉可以萬全也凡爲醫先須調明色脉若於此不精雖聰慧辯博亦不足委也

論持手訣消息法

夫診候脉法常以平旦爲紀陰氣未散陽氣未動飲食未進血氣未亂經脉未隆絡脉調勻故乃可診有過之脉若遇倉卒患病不拘此論內經所謂持脉有道以虛靜爲保但可澄神靜慮調息凝心視精明察五色聽音聲問所苦方始按寸尺別浮沉以此參照可決生死之分矣復觀患人身形長短肥瘦老少男女性情緩急例各不同故曰形氣相得者生三五不調者病謂如室女尼冠脉當濡而弱嬰兒孺子之脉細而疾三四歲者呼吸之間脉當七八至爲平比夫常人特不同耳大抵男子先診左手女子先診右手男子左脉大則順女子右脉大則順大凡診脉先以

中指揣按掌後高骨骨下爲關得其關位然後齊下左右兩指若臂長人踈排其指若臂短人密排其指三指停穩先診上指曰寸口浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息之一類此若診得三部之中浮沉滑澀遲疾不調何病所主外觀形色內察脉候參詳處治以忠告之不可輕言談笑亂說是非左右瞻望舉止忽略此庸醫也

三部所主腑臟病論

夫診候之道醫者之難精也若非燈下辛苦勤於記誦參師訪友晝夜不遑造次顚沛寤寐俯仰存心於此安能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其探賾索隱之玅也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之功也蓋三指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之功世人固以爲難命曰神豈容易可至哉嘗考於經脉有三部寸關尺也從魚際至高骨却行一寸曰寸從寸上一分曰魚際從寸至尺曰尺澤寸後尺前爲關關前爲陽即寸口也

關後爲陰卽尺脉也陽出陰入以關爲界寸主上焦頭手皮毛關主中焦腹及腰尺主下焦小腹及足此三部所主之大略也左右兩手三部謂之六脉也又有人迎氣口神門所主又各不同蓋左手關前曰人迎右手關前曰氣口兩關之後一分卽曰神門故脉法讚曰肝心出左肺脾出右腎與命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口所謂左手關前心之部也其經手少陰與手太陽爲表裏小腸合爲腑左手關上肝之部也其經足厥陰與足少陽爲表裏膽合爲腑左手關後腎之部也其經足少陰與足太陽爲表裏膀胱合爲腑右手關前肺之部也其經手太陰與手陽明爲表裏大腸合爲腑右手關上脾之部也其經足太陰與足陽明爲表裏胃合爲腑右手關後命門之部也其經手厥陰與手少陽爲表裏三焦合爲腑此謂六部所主臟腑十二經之義也又脉要精微論曰尺內兩旁則季脅也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候膈右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候膻

中前以候前後以候後上竟上者胷喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也粗大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥巔疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脈俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲眴仆諸浮而數者皆在陽爲熱其有躁者在手脈諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脈也洩及便膿血諸過者切之濇者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而盡其妙也又平人氣象論曰一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈行五動閏以太息不大不小不長不短不滑不澀不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平

人之常氣也所以人常稟氣於胃故脈以胃氣爲本也正理論曰穀入於胃脈道乃行合靈樞經云胃爲水穀之海也又曰脈應四時曰平信夫四時之脈皆以胃氣爲本謂春弦夏洪秋毛冬石春之脈微弦曰平餘皆倣此逆四時則病矣若診婦人之脈妊身則愼勿亂投湯散其婦人之脈診得少陰脈動甚則有子也又曰陰搏陽別有子也又曰身汗而無脈者卽有妊也治重身者問其月事觀其體貌然後主治不可忽也又經曰察色按脈先別陰陽蓋陰陽者天地之道也是以治病者必求其本本於陰陽寒暑四時五臟之根也以脈言之則浮沉也以部言之則尺寸也經故云脈者陰陽之法以應五臟是謂呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味其脈在中也以浮沉論之則曰浮者陽也沉者陰也應在臟腑則浮而大散者心也浮而短濇者肺也所以心肺俱浮也牢而長者肝也按之而大舉指來實者腎也所以肝腎俱沉也遲緩而長者脾也脾爲中州所以脈在中也仲景曰大浮數動滑皆陽也沉濇弱弦微皆陰也

陽者熱也陰者寒也所以寒則脉來沉而遲熱則脉來浮而數故曰諸數爲熱諸遲爲寒無如此驗也脉經曰諸浮爲風諸緊爲痛諸伏爲聚諸弦爲飲芤者失血長則氣治短則氣病濇則煩心大則病進浮爲在表沉爲在裏遲爲在臟數爲在腑又形壯脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胷中氣多者斃形氣相得者生三五不調者病三部九候皆相失者死此先聖診脉之大法也故曰凡治病則察其形氣色澤治之無後其時也所以形氣相得者生色澤以浮者病易已脉從四時者可治脉弱以滑者是有胃氣此皆易治也若形氣相失或色夭不澤及脉逆四時或脉實益堅皆不可治經所謂必察四難而明告之又若病熱脉靜泄而脉大脫血脉實汗後脉躁此皆難治也若瘡疽之人膿血大泄脉滑數者難治也凡出膿多或如清泔脉滑大散寒熱發渴者治之無功也若患肺瘡者欬嗽膿血脉見洪滑治之難痊矣大凡診脉見浮數應當發熱而反惡寒雖頭項拘急四肢煩痛或復戰慄渴甚者但有痛處欲發瘡腫也

脈證名狀二十六種所主病證

夫脈之大體二十六種此診脈之紀綱也細而論之毫釐少差舉治必遠總而言之逆從虛實陰陽而已兩者議之以要其中謹於諸家脈法中撮其機要翦去繁蕪載其精義

浮脈之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太過瞥瞥然見於皮毛間其主表證或爲風或爲虛浮而大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脈應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脈之診似浮而大舉按皆泛泛然滿三部其狀如水之洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脈洪大者瘡疽之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脈見洪大則難治若自利者不可救治也滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其主或爲熱或爲虛此陽脈也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也所謂始爲熱而終爲虛也

數脉之診按之則呼吸之間動及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數爲熱仲景曰脉數不時見則生惡瘡也又曰肺脉洪數則生瘡也診諸脉洪數者裏欲有膿結也

散脉之診似浮而散按之則散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊退者診其脉洪滑粗散難治也以其正氣虛而邪氣實也又曰肢體沉重肺脉大則斃謂浮散者也

芤脉之診似浮而軟按之中央空兩邊實其主血虛或爲失血瘡腫之病診得芤脉膿潰後易治以其脉病相應也

長脉之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脉也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脉之診按之則實大而弦且沉且浮而有牢堅之意若瘰癧結腫診得牢脉者不可內消也

實脉之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實

久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

弦脉之診按之則緊而弦其似緊者爲弦如按弦而不移緊如內繩而轉動以此爲異春脉浮弦而平不時見則爲飲爲痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

緊脉之診似弦而緊按之如繩而轉動其主切痛積癖也瘡腫得之氣血沉濇也亦主痛也

濇脉之診按之則散而復來舉之則細而不足脉濇則氣濇也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

短脉之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脉短皆難治也瘡腫脉短眞氣短也

細脉之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絶舉之如無而似有細而微其主亡陽衰也瘡腫之病脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也

微脉之診按之則軟小而極微其主虛也眞氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而勻乃爲瘥也

遲脉之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩

而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊

緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰陽同等謂之緩脉見長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣也

沉脉之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在臟也水氣得之則逆比陰脉也瘡腫得之邪氣深也

伏脉之診比沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪氣益深矣

虛脉之診按之不足遲大而軟輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也

軟脉之診按之則如帛在水中極軟而沉細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

弱脉之診似軟而極微來遲而似有仲景曰微弱之脉綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏

促脉之診按之則去來數時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脉促亦急下之

結脉之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰陰盛則結經曰促結則生代則死

代脉之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脉也代者氣衰也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脉促結者難治而况見代脉乎

動脉之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖者是也脉經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣虛而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也

三部脉所主證侯

夫寸關尺者脉之位也浮沉滑濇脉之體也奠位分體指文語證者診脉之要道也脉經曰大凡診候兩手三部脉滑而遲不浮不沉不長不短去來齊等者無病也

寸口脉浮者傷風也緊者傷寒也弦者傷食也浮而

緩者中風也浮而數者頭痛也浮而緊者膈上寒脅下冷飲也沉而緊者心下寒而積痛沉而弱者虛損也緩而遲者虛寒也微弱者血氣俱虛也弦者頭痛心下有水也雙弦者兩脅下痛也偏絕者不遂也俱絕者不治也瀓瀓如羹上肥者陽氣微也連連如蜘蛛絲者陽氣衰也

關主中焦胷腹中事去來徐而緩者無病也浮者腹滿而不欲食胃虛脹也滑者客熱在胃也數者熱結中焦也沉伏者中焦水氣或嘔逆而吞酸也弱者胃氣虛也雖有虛熱不可大攻須防熱去則生寒也牢而實者腹滿響響噎塞而不通或復大痛澀者氣逆也芤則瀉血濇堅大實按之不減而有力者中焦實有結伏在胃也微浮者積食不消蚘動心悸也

尺主下焦腰腎膝脛足中事也尺脈浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者腳弱下腫而痿痹也弱者下冷而腎氣衰也軟者腳不收而風痹小便難也伏者小腹痛

而疝瘕穀不化也細者溏泄而下冷也芤者小便澀而血下虛也牢而小者足膝寒痹脚下隱隱疼痛也細而急者筋攣不能行也來而斷絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

三部脉所主雜病法訣

夫三部之中俱見一脉所主雜病略而言之脉經曰陽邪來見浮洪陰邪來見微細水穀之邪來見實堅寒癖之邪來見弦小又曰浮而滑者宿食也短而滑者酒病也遲而滑者脹滿也洪而大者傷寒也浮而數者傷風也浮而急者飲食不消脾不磨也沉而弦者寒氣結而陰痛也浮而緩者皮膚不仁也滑而散者癱瘓也遲而緩者寒癥也浮而濇者霍亂也弱而濇者反胃也緊而滑者吐逆也短而數者心痛也弦而數者爲瘧也緊而急者尸遁也實小而堅者病在內而冷也浮滑而緊者病在外而熱也短而急者病在上也長而緩者病在下也長而弦者病在肝也滑而洪者病在心也微而軟者病在脾也浮而濇者病在肺也沉而緊者病在腎也又訣曰諸浮爲風或爲

虛也諸緊爲痛或爲積也諸濇爲痹諸弦爲飲諸數爲熱諸遲爲寒芤則爲失血軟則爲虛若脈沉沉澤澤四肢不仁者亡祟也或大而搦搦者社祟也若脈來乍大乍小乍短乍長者鬼祟也

將護忌慎法

大凡有瘡疽生皆只如黍粟粒許大其狀至微人多不以爲急此蘊大患宜速辨之不可自忽若能防之於未形理之於未成或朝覺而夕治求治於良醫則必無危困矣若因循慢忽詢於庸醫致令膿血結聚委之於命束手待斃不亦去道遠乎以致筋骨敗壞穿通臟腑死者十有八九矣可不慎歟蓋患瘡疽之人托命庸醫任意措置危殆立至若用良醫則可保痊愈用醫之際不可不擇辨之何難若能飽讀經書久諳證候湯藥熟嫺洞明色脈性情仁善孝義忠信臨事不惑處治有決方爲良醫委用勿疑然後要在病人自克不可恚怒悲憂叫呼忿恨驕恣情性信任口腹馳騁勞役惟宜清靜恬澹耐煩爲宜於患人左右止息煩雜切忌打觸器物諸惡音聲爭辨是非呪

罵鬬毆及產婦婬男體氣不潔帶酒腥羶雞犬乳兒孳畜禽獸並須遠離設或親友重意問疾者可以預囑徐行低聲款曲伺候禮畢躬退勿令嗟呀驚怪話舊引其遊賞宴樂遠別親戚牽惹情懷但恐病人心緒悽愴尤不可亂舉方藥徒論虛實惑亂患人疑滯不決祇合方便省問不可久坐多言勞倦病人深不方便夫侍患者宜須壽近中年情性沉厚勤謹耐煩仁慈智慧全在調以粥藥無失時節勿令於患人左右彈指嗟咨掩淚竊言感激病人甚不利便飲食之間忌慎非細不可不載畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛羖羊等并雜魚龜鼈蝦蟹及淹浥臭陳自死病倒之類慎勿嘗啖飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷹雀鶴鴛鴦鷺鷥鳩鴿鴉鷄鴇及能學人言者慎勿食之野獸之中忌食獐鹿狐兎虎豹熊豺及爪牙害人有毒蟲獸并父母自本命生屬忌慎勿嘗啖菜蔬之中忌食黃瓜茄子蘭香蕓薹胡荽生菜蓼芥菌瓠韭蒜葱薤勿食之果木之中忌食桃杏棗栗李柰梨梅輭棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸蟲蚛未熟之果慎勿食之若

其瘡疽膿潰腫消氣血虛弱則可食羊肉鵪鶉蔓菁薑醬瓜薺蘿蔔及黃白糧米細米稀粥輭飯若至肌肉漸生思想滋味則宜食白熟酥餅虀粥羹湯熟輭溫和稀稠得中製造如法勿令太飽此時猶忌饅頭蒸餅餺飥餛飩肉角煎餅及炙煿煠煏煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉若至肌膚欲平惡肉去盡瘡口收斂之際尚忌起立行步揖待賓客房酒宴會嗔怒沐浴登陟臺榭運動肢體寒暑勞倦正宜調節飲食保攝以待瘡瘢平復精神如故氣力完全萬無所忌百日內愼勿觸犯之

論虛實法

夫瘡疽膿潰腫毒浸展證候危惡者須辨虛實況夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實證多端不可不辨有瘡之虛實有臟腑氣血上下眞邪各有虛實故不同也分而言之則腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下輭漫膿稀者瘡疽之虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲

音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腹滿膨脹胷膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水淸稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目運重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不滯大便自利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者眞氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便祕澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰眞氣奪則虛邪氣勝則實又曰諸痛爲實癢爲虛也又曰診其脉洪大而數者實也微細而輭者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之

辨淺深法

夫瘡候多端欲辨淺深直須得法若不素知方論而

妄生穿鑿者如大匠捨其繩墨以意度量安能中於規矩哉嘗聞古人有言曰多則惑少則得簡而論之則瘡疽概舉有三腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不相辨者發於骨髓又曰凡療瘡疽以手按搖瘡腫根牢而大者深也根小而浮者淺也又驗其人初生瘡之時便覺壯熱惡寒拘急頭痛精神不寧煩躁飲冷者其患瘡疽必深也若人雖患瘡疽起居平和飲食如故其疾浮淺也惡瘡初生其頭如米粟微似有痛癢誤觸破之卽焮展覺有深

意速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等取通利疎暢兼用浴毒湯溻漬之類若浮淺者紝貼膏求差以此推之淺深之辨始終之要也

辨膿法

夫瘡腫之疾毒氣已結者不可論內消之法卽當辨膿生熟淺深不可妄開視其可否不至於危殆矣凡瘡疽腫大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也若按之卽復者有膿也不復者無膿也非也必是水也若發腫都軟而不痛

者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰必多成瘻宜早服內塞散以排之諸癭瘤疣贅等至年衰皆自內潰若治之於年壯可無後憂也又凡療癰疽以手掩其上大熱者膿成自輭也若其上薄皮剝起者膿淺也其腫不甚熱者膿未成也若患瘰癧結核寒熱發渴經久不消者其人面色痿黃被熱上蒸已成膿也至於臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目既不見手不能近所爲至難可以診其脉而辨之亦可知矣有患胃脘癰者當候胃脉人迎者胃脉也其脉沉細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃脘而爲癰也若其脉洪數者膿已成也設脉遲緊雖膿未就已有瘀血也宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也又肺癰論曰始萌則可救膿成卽死不可不愼也久久欬膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也又腸癰論曰或遶臍生瘡膿從瘡出者有出臍中者惟大便下膿血者自愈也

辨證法

夫瘡疽癤腫其名甚多載之紛紜方書百緒及至臨疾治之無據不知所以內經曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮愚雖不才姑揣其要而言之熱發於皮膚之間是以浮腫根小至大不過二三分者癤也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚腫皮光輭侵展廣大者癰也五臟風積熱攻焮於肌骨風毒猛暴初生一頭如痦癗白焦枯觸之應心者疽也夫癰疽發於六腑若燎原之火外潰膚肉疽生五臟沉澀難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療易得痊復夫癤與瘡初生並宜灸之謂其氣本浮達以導其熱令速暢也疽則烙不宜灸謂其氣本深沉須達其原也凡瘡疽生於外皆由熱毒蘊於內明乎三者癰毒丹瘮可以類推矣蓋皮膚微高起而肌厚或痛或癢移走無常者謂之腫有因風而得之者有因風熱相搏而得之者腫硬色白因熱而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者久久不消熱勝於風若不即治血不流通與氣乘

之以成膿也又曰風多則癢熱多則痛此爲驗也又有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹毒世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂之瘡瘤凡丹毒之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以其氣血嫩弱臟腑柔脆難任鎌針所以忌也又頸腋之間而生結核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚久久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者得之於風熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風熱邪氣蘊結所成證候不同治之者亦各異矣

辨善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辨從來醫瘡概舉五善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之證也發背腦疽別有善惡之證載之於後蓋七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便如淋者一惡也膿血既泄腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看三惡也喘粗短氣恍惚嗜臥四惡也肩背不便四肢沉重五

惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗脣鼻靑赤面目四肢浮腫者七惡也動息自寧飮食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消水鮮不臭三善也神彩精明語聲淸亮四善也體氣和平五善也病有證合七惡皮急緊而如善者病有證合五善而皮緩虛如惡者夫如是者豈淺識之所知哉只知五善併至則善無以加矣七惡併至見惡之極矣愚意裁之凡患瘡疽之時五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二惡證宜深懼之大抵證候瘡疽之發虛中見惡證者不可救也實證無惡候者自愈大凡膿潰之後而煩疼尚未痊者診其脉洪滑粗散者難療微濇遲緩者易痊此善惡之證於診候之中亦可知也發背腦疽及諸惡瘡別有五逆之證者白睛靑黑而眼小服藥而嘔傷痛渴甚膊項中不便音嘶色敗者是爲五逆其餘熱渴痢嘔蓋毒氣入裏臟腑之傷也當隨證以治之

砭鎌法

夫上古制砭石大小者隨病所宜也內經謂針石砭

石鑱針其實一也今時用鎌者從聖濟總錄丹毒論曰法用鎌割出血明不可緩也又扁鵲云病在血脉者治之以砭石此舉素問血實宜決之又氣血形志論曰形樂志樂病生於內治之以砭石蓋砭石者亦從東方來爲東方之民其病多瘡瘍其法宜砭石砭石之用自有證候非止丹瘤也但見腫起色赤遊走不定宜急鎌之先以生油塗赤上鎌之要在決洩其毒然而此法不可輕用忌其太深內經所謂刺皮無傷肉以其九針之用而各有所宜也砭鎌之法雖治瘡疽不可輕用也

貼熁法

夫瘡腫之生於外者由熱毒之氣蘊結於內也蓋腫於外有生頭者有漫腫者有皮厚者有皮薄者有毒氣深者有毒氣淺者有宜用溫藥貼熁者有宜用涼藥貼熁者有可以乾換其藥者有可以濕換其藥者深淺不同用藥亦異是以不可不辨也若瘡腫初生似有頭者卽當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也於四畔赤焮處搗生寒藥貼熁之折伏其熱勢驅

逐其邪惡撲火之義也夫生寒藥勢氣力精全性味雄健或有療者不本物理皆通用藥草膏之類其有勢力微者是使羸瘦之人敵其勇夫不亦難乎又有粗工不審逆從便用寒藥敷貼趁逐邪毒復入於內歸於肝心十死八九矣大抵敷貼之法欲消散癰毒血脈疎通寒熱逆從斷其去就焉苟使執方無權安能散其鬱結欲不成膿得乎其腫皮厚者以故軟布或以紙花子塗藥敷貼之待其藥乾換腫皮薄者卽用疎紗或薄紙塗藥敷貼之其藥末乾卽當換之若至膿潰之後卽貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒凉之藥水調貼之夫血脈喜溫而惡寒若著冷氣過之卽血滯難瘥矣

溻漬法

夫溻漬瘡腫之法宣通行表發散邪氣使瘡內消也蓋湯水有蕩滌之功古人有論瘡腫初生經一二日不退卽須用湯水淋射之其在四肢者溻漬之其在腰腹背者淋射之其在下部委曲者浴漬之此謂疎

導腠理通調血脉使無凝滯也且如藥二兩用水二升爲則煎取一升半以淨帛或新綿蘸藥水稍熱漬其患處漸漸淋浴之稍凉則急令再換愼勿冷用夫血氣得寒則凝澀得熱則淖澤日用五七次病甚者日夜不住或十數次腫消痛止爲驗此治瘡腫神良之法也

針烙法

夫瘡疽之疾證候不一針烙之法實非小端蓋有淺有深有遲有速宜與不宜不可不辨蓋疽腫皮厚口小腫多膿水出不快者宜用針烙癤皮薄惟用針以決其膿血不可烙也如未成膿已前不可以諸藥貼熁溻漬救療以待自消久久不消內潰成膿即當棄藥從其針烙當用大針如似火筯磨令頭尖如棗核樣圓滿用燈焰燒須臾作炬數搵油燒令赤於瘡頭近下烙之一烙不透即須再烙令透要在膿水易出不假按抑近代良醫倉卒之際但以金銀鐵鋌其樣似針者可通用之實在洩其毒也或只以木炭然火猛燒通赤蘸油烙之尤妙烙後實者撚髮爲紝虛者

以紙爲絍於絍上蘸藥絍之上以帛攤溫熱軟粘膏藥貼之常令滋潤勿令燥也夫瘡疽既作毒熱聚攻蝕其膏膜肌肉腐爛若不針烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻其內內既消敗欲望其生豈可得乎嗟乎此疾針烙取差實爲當理然忌太早亦忌稍遲嘗見粗工不審其證淺深妄施針烙之法或瘡深針烙淺毒氣不得泄以致內潰或瘡淺針烙深誤傷良肉筋骨腐爛或抑擦掀動益加煩痛或針之不當別處作頭或卽時無膿經久方潰遂使痛中加痛眞氣轉傷詳其所由不遇良醫也以此推之凡用醫者不可不擇縱常醫療之得痊者幸矣

灸療法

夫疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜溻漬之腫皮光輭則針開之以泄其毒治瘡之手法殆不過此而各有所宜故聖惠方論曰認是疽瘡便宜灸之一二百壯如菉豆許大灸後覺似瘷痛經一宿乃是火氣下徹腫內熱氣被火導之隨火而出所以然也若其瘡癀宜隔豉餠子灸之其餠須以椒薑

徑一寸厚二分貼著瘡上以艾作炷灸之一炷一易餅子其瘡粟米大時可灸七七炷其瘡如錢許大日夜不住灸以瘥爲度已上數法並依本方一一親驗所以載之愚謂瘡醫自幼至老凡所經驗必須寫之嘗記疳瘻惡瘡諸醫不驗者取螃蟹剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者又法用乞火婆蟲灸之同前法累驗之神效人皆祕之往往父子不傳又法赤皮蒜搗爛焊作餅子一如豆豉餅子灸法灸之彌佳

鹽葱相和爛搗捏作餅子厚薄如折三二錢以來當瘡頭豉餅子上灸之若覺太熱即擡起又安其上餅子若乾更換新者尤佳若其瘡痛即須急灸壯數多爲妙若其膿已成者愼不可灸即便針開之即得瘥也若諸瘡經久不瘥變成瘻者宜用硫黃灸法灸之其法硫黃一塊可瘡口大小安之別取少許硫黃於火上燒用釵尖挑起點硫黃令著三五遍取膿水乾差爲度若其發背初生即宜上餅灸法灸之初覺背上有瘡疼癢頗異認是發背可取淨土水和捻作餅子

內消法

夫瘡疽丹腫之生皆由陰陽不調榮衛凝澀氣血不流之所生也古人有言曰陽滯於陰則生瘡陰滯於陽則生疽瘡疽之生有內有外內生於臟腑胷腹之中外則生於膚肉筋骨之表發無定處夫鬱滯之本則因血氣不流蒸氣不能外達留滯而成內熱瘡疽所以生焉若初覺氣血鬱滯皮肉結聚腫而未潰特可疎滌風熱通利臟腑一二行徐次諸湯潟漬即得內消矣不然則治之稍慢毒熱不散反攻其內致令膿血之聚也內經謂治病必求於本蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也其風邪寒氣所聚也治之宜溫熱之劑和血令內消也辨之有法須認風寒則腫硬色白熱毒則焮腫色赤以爲異也如有氣已結聚不可論內消之法宜用排膿托裏之藥此皆先後之次也

追蝕法

夫瘡瘍生於外皆由積熱蘊於內內經謂血熱肉敗榮衛不行必將爲膿留於節腠必將爲敗蓋瘡疽膿潰爛之時頭小未破瘡口未開或毒氣不出疼痛難

任者所以立追蝕膿之方法使毒外泄而不內攻惡肉易去好肉易生也若其瘡紝其血出不止者則未可紝於瘡上糝追蝕之藥待其熟可紝方紝若其瘡紝之痛應心根者亦不可以強紝之悞觸其瘡其焮痛必倍變證不無不可不慎也若瘡癤膿成未破於上薄皮剝起者卽當用破頭代針之劑安其上以膏貼之膿出之後用搜膿化毒之藥取效如神矣若膿血未盡便用生肌斂瘡之劑欲其早愈殊不知惡不盡其瘡早合後必再發不可不慎也

托裏法

夫瘡疽丹瘤結核瘰癧初覺有之卽用內消之法經久不除氣血漸衰肌寒肉冷膿汁清稀毒不出瘡口不合成聚腫不赤結核無膿外證不明者並宜托裏膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裏補之陰陽不和托裏調之大抵托裏之法使瘡無變壞之證凡爲瘡醫不可一日無托裏之藥然而寒熱溫凉煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

止痛法

夫瘡疽之證候不同寒熱虛實皆能爲痛止痛之法殊非一端世人皆謂乳沒珍貴之藥可住疼痛不知臨病制宜自有方法蓋熱病之痛者以寒之劑折其熱則痛自止也寒邪之痛以溫熱之藥熨其寒則痛自除矣因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之因膿鬱而閉者開之惡肉侵潰者引之陰陽不和者調之經絡祕澀者利之臨機應變方爲上醫不可執方而無權也

用藥增損法

古人用藥因病制宜治不執方隨病增損療積聚補益可用丸藥以從舊方不加增損蓋瘡疽危要之際證候多種安有執方之論固可臨時加減以從其法只如發背腦疽惡疔瘡膿潰前後虛而頭痛者於托裏藥內加五味子恍惚不寧加人參茯苓虛而發熱者加地黃苦蔞根往來寒熱并潮熱者加柴胡地骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃芒硝小便不通者加木通燈草虛煩者加枸杞子天門

冬自利者加厚朴四肢厥逆者加附子生薑嘔逆者加丁香藿香多痰者加半夏陳皮膿多者加當歸川芎痛甚者加沒藥乳香肌肉遲生者加白蘞官桂有風邪者加獨活防風心驚怯者加丹砂口目瞤動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常依此法加減用藥取效如神後之學者宜細詳焉

權變通類法

夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋溻及敷掃貼熁針鎌灸烙用之不同蓋知其道者舉治必效昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其源矣愚雖不才略陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之性其可因其類而取之也假如心實生熱者當益其腎腎水滋足熱將自除腎虛水寒當補心火心火既

降寒將自除此所謂寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞微者逆之甚者從之何謂也蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間有正有權者何也蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者從治理之權也然爲瘡科於補瀉汗下標本逆從正權之理烏可闕而不知也大凡治療瘡疽之要法曰初覺熱毒發熱鬱結而作瘡疽一二日宜先服五利湯蕩滌邪氣疎通臟腑令內消也古今湯法謂切剉㕮咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也次有丸散宜導血脈漸次消磨令緩散也助以淋溻調和榮衞行經絡也更當膏潤溫養兼磨傅四畔貼熁之藥順其陰陽也追蝕托裏汗下調補臨時制宜淺深緩急自有等差男女貴賤亦當別論晉尚書褚澄曰寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦此深達其情者也又仲景云物性剛柔餐居亦異治亦不同也所以黃帝與四方之問岐伯舉四治之能況病之新舊形志樂苦豈可執

方無權以求其愈疾哉亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脉沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不寧外證深沉者亦宜即當用托裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

論五發疽

夫五發者謂癰疽發於腦背眉髭鬢是也大概論之分爲三等一者疽也二者癰也三者癤也夫疽初生如黍米大癢痛有異悞觸破之即焮展四畔赤腫沉悶牽引脅肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展爊漿汁出積日不潰抑之則流血發於背者謂之發背疽也其發於腦者爲腦疽也其發於鬢眉髭者以類呼也又有初生其狀無頭腫闊三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也又有初生一頭邑浮赤而無根腫見於皮膚之間大小一二寸者癤也三者之候惟疽最重此疾初生皆由滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脉不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於

血血聚則肉潰成瘡淺則爲癤實則爲癰深則爲疽矣亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實之人急服五香連翹湯漏蘆湯若年未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼溫熱膏劑更溻腫湯潰毒湯淋溻之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱觸著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃朴硝苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者卽用追蝕之藥或鋌子絍之上用鹿角散以酢熬爲糊貼之惡肉退去好肉漸生卽用搜膿散翠霞散之類絍之若瘡中毒氣未盡慎勿早斂若早上生肌之藥縱得平復必再發其間調理次第臨時制宜兼將護忌慎之法耳

總論

夫瘡腫之患莫大乎癰疽然而癰疽何以別之經所謂榮衛稽留於經脉之中則澀不行血脉不行則陽氣鬱遏而不通故生寒熱積毒之氣騰出於外畜結爲癰久而不散熱氣乘之腐化爲膿然而骨髓不焦枯腑臟不傷敗可治而愈也何爲疽五臟風毒積熱毒熱熾甚下陷肌膚骨髓皆枯血氣涸竭其腫色夭堅如牛領之皮故命曰疽癰者其腫皮薄以澤此其候也癰疽之生有內有外內生胷腹臟腑之中外生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫鬱滯之本始於喜怒憂樂不時飲食居處不節或金石草藥之發動寒暑燥濕之不調內使陰陽之不平而蘊結外使榮衛凝澀而腐潰輕者起於六腑浮達而爲癰氣行經絡而浮也重者發於五臟沉澀而爲疽氣行經絡而沉也明乎二者腫毒丹疹可以類推矣

疔瘡

夫疔瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者是也古方論之凡有十種華元化載之五色疔千金方說疔瘡有十三種以至外臺祕要神巧萬全其論頗同然皆不離

於氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或憎寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也其候本因甘肥過度不慎房酒以致邪毒蓄結遂生疔瘡內經曰膏粱之變足生大疔此之謂也其治之法急以艾炷灸之若不覺痛者針疔四邊皆令血出以廻瘡錠子從針孔紝之上用膏藥貼之仍服五香連翹湯漏蘆湯等疎下之爲效若或針之不痛無血者以猛火燒針通赤於瘡上烙之令如焦炭取痛爲效亦紝前錠子用膏藥貼之經一二日膿潰根出服托裏湯散依常療之以取平復如針不痛其人眼黑或見火光者不治此邪毒之氣入臟腑故也養生方云人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎也

明戴思恭證治要訣

癰疽瘤毒證治

發散諸般毒多碾白芙蓉葉入草烏葉少許蜜調傅重者加入南星末凡諸毒用膏藥欲散搓入麝香欲潰搓入雄黃

一應毒證已作渴或膿過多防其爲渴宜於千金內補散之外兼進八味丸用五味者佳

發熱惡寒狀如傷寒而痛者其痛處欲爲癰疽癰屬腑故生淺皮薄而腫高疽屬臟故生深皮厚而腫堅又有輕於癰疽者名曰癤毒癰壅也疽沮也癤節也言氣血壅滯沮節也並威靈仙飲微利之或五香連翹散佐以復元通氣散若膿血結成不可發散已潰未潰宜小托裏散或千金內補散加木香羌活白芍藥烏藥等分渴加苦蔞根此數藥皆治陽證若陰證宜於千金內補散減防風桔梗之半倍加白朮未效更加熟附與諸藥煎服尤佳

外有服金石以助欲至精氣既衰藥毒偏勝金石與肺同類肺附於腎所以多成發背之疾又有用鼈爲臛亦治發背蓋鼈之陽氣皆聚於上甲所以上甲可入藥也治法同前若毒發於陰而又未可用附桂諸藥劑外疼內寒宜五香湯

毒之初發並宜酒調復元通氣散或病在下者酒糊丸通氣散却欲木香湯吞下

治諸毒方結成者以皂角樹上所生之甚磨烏酢調塗此甚須預藏在煙閣頭緩急取用

患背瘡人及諸毒已潰後血去過多津液少者宜換肌散毒初發頭疼體痛乍寒乍熱恐挾外邪宜香蘇飲加川芎白芷防風當歸陳皮之類

病消渴之人多生毒此乃津液已耗虛陽外發內外俱虛此爲極病凡消渴愈後生毒毒愈後消渴皆非可治之病也

癰疽癤此毒總名亦舉其大槩耳其他證狀不一名稱亦異未潰之際憎寒壯熱狂言妄語如見鬼神膿去已多而大熱不休者似爲難治蓋毒之得膿猶傷寒病證之得汗汗已而反大熱則爲壞傷寒矣若淋洗貼傅自屬外科癰疽發背已潰出膿過多而羸瘦者芎歸湯凡所服藥並不可用白朮能生膿故也未潰與初發陰證用之却可

若其人嘔不喜食不可用千金內補散滯其脾恐挾外邪未潰者二陳湯加芎或不換金正氣散已潰者穀神嘉禾飲

又一方治毒並不喜食於不換金正氣散加白茯苓半夏等分人參木香減半亦名正氣散

患癰毒人膿血已潰所去過多津液枯竭多病於渴縱有發熱躁擾等證不可以治者用益榮生津之劑若大熱不止者難治

瘡毒久不乾成漏者忍冬草浸酒常服

瘡毒而大便堅者升麻和氣飲和消毒飲加以身上發熱甚者消毒飲和敗毒散

有火邪逼身及因灸後徧身發爲赤核腫痛旋盤用荊防湯浸取洗

露痶名爲羊核生取石菖蒲爛研盦之仍以石首膠一兩許火煆存性研爲末酒調服

有不傅藥時大痛傅即不痛有不傅藥時不痛傅之則痛蓋寒熱風濕幷憂怒等氣積而內攻則痛不禁藥拔出之故不痛也血死陰毒在中愈服愈深愈不覺痛藥發之於外故反痛也

薛己醫按

用藥總論

人病不同藥性亦異有是病而宜是藥不可以誤施也且如瘡疽痛息自寧飲食知味脉證俱緩緩則治本故可以王道和平之藥徐而治之亦無不愈若脉沉焮腫寒熱煩躁此脉證俱實宜瀉之非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰潰而膿水清稀或瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時或手足並冷此脉證俱虛非大補之藥不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也當推內經虛者補之實者瀉之熱者清之寒者溫之之本旨隨證用藥臨機應變庶不誤耳大抵瘡瘍之證皆由臟腑不和氣血凝滯喜怒不常飲食不節或腠理不密邪氣客於經絡或服丹石之藥及膏粱厚味不慎房室精虛氣竭所致故治其證者當辨其表裏虛實隨宜治之若不推陰陽逆順氣味攻守率爾投藥以致實實虛虛或槩以王道爲萬全猶執一而無權適以害之矣

靈樞經云癰疽不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿於經絡與血俱澀而不行壅結而成此因喜怒憂思也身有熱被風冷搏之血脉凝滯不行熱氣壅

結而成此外因也有陰虛陽氣湊襲寒化爲熱熱盛則肉腐爲膿此寒熱風熱所傷也有因服丹石炙煿麪濕牀被厚者有因盡力房室精虛氣節者爾雅云癤者節也癰者壅也疽者沮也是言陰陽不和有所壅節皆成癰疽也又云陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽此二毒發無定處當以脈辨之浮洪滑數則爲陽微沉緩濇則爲陰陰則熱治陽則冷治治法有四節八事初覺則宜消熱拔毒已潰則宜撥膿止痛膿毒則消惡肉惡肉盡則長傳痂次第既明又須別其因以施治觀病浅深凶吉寒則溫之熱則凉之虛則補之實則瀉之導以鍼灼以艾破毒潰堅以平爲期也

客問瘡瘍脈洪數身作熱爲陽證亦有死者何也曰經云陰滯於陽則生癰脈見沉細弱澀陽滯於陰則生疽脈見浮洪弦數此氣血爲證瘡疽屬陰屬陽之論也彼瘡疽雖因積熱所成若初起未成膿脈洪數乃陰虛陽亢之證若膿潰於內不得發泄於外身必發熱故脈洪數瘡疽之病進也膿既去則當脈靜身

涼腫消痛息如傷寒表證之得汗也若反發熱作渴脈洪數者此眞氣虛而邪氣實也死無疑矣

治法三要

病機機要云瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若其脈沉實當先疏其內以絕其源也其脈浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫此因失托裏及失疏通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疏通和榮衛之三法內之外者其脈沉實發熱煩躁外無焮赤痛深於內其邪氣深矣疏通臟腑以絕其源外之內者其脈浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏也內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此三法之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻減而易愈

灸法

元戎云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及

其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也然此亦約法因以東垣等法附於左宜參用之凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立候視之其紙先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六七活五六日三四活過七日則不可灸矣若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一粒如黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚薄正安於瘡上著艾灸十四壯多至四十九壯

註　按謂癰疽所發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉尤宜用附子浸透切作大厚三二分於瘡上著艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長

滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麪硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互相用之紝入瘡內歹肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理卽瘥矣蓋不止宜灸於瘡之始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設有反逆不唯不愈恐致轉生他病

攻補法

元戎云陷脉爲瘻留連肉腠營氣不從逆於肉理乃生癰腫榮逆血鬱則熱聚爲膿正理論曰熱之所過則爲癰腫營氣不從亦有不熱者乎答曰膏梁之變芳草之美金石之過氣血不盛榮衛之氣充滿而抑遏不能行故閉塞血氣腐而爲癰也當泄之以奪盛熱之氣若其人飲食疎精神衰氣血弱肌肉消薄營衛之氣短促而濇滯故寒薄腠理閉鬱而爲癰腫也當補之以接虛怯之氣亦當以脉浮沉別之旣得盛

裒泄之則連翹大黃補之則內托之類是也

註　按辨瘡瘍因熱因寒及氣血鬱而成當攻補之法不同宜與前後諸篇兼看殆無餘藴矣但世俗昧此理而云是瘡不是瘡且服五香連翹湯然或中或否致悞者多蓋不審形氣虛實瘡毒深淺發表攻裏所因不同故也今以丹溪先生外科精要發揮諸法之義附於後例之下庶學者知所鑑焉

分三因

陳無擇云發背癰疽者該三因而有之論曰癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經亦云氣宿於經絡與血俱澀而不行壅結爲癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃內因喜怒憂思有所鬱而成也身有熱被風冷搏之血脈凝泣不行熱氣壅結而成亦有陰虛陽氣湊襲寒化爲熱熱盛則肉腐爲膿者此亦外因寒熱風濕所傷而成也又服丹石及炙煿酒麪溫牀厚被所致又盡力房室精虛氣節所致者此乃不因內外所傷而成也故知三因備也

註　按所分三因雖備但未具瘡瘍之邪在經在表

在裏之異故其治亦不能詳備也

陰滯於陽則生癰陽滯於陰則生疽

丹溪曰精要云陽滯於陰脈浮洪弦數陰滯於陽脈沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之切詳其意陽滯陰滯當作熱治寒治求之寒熱固可作陰陽論於陰於陽分明是於氣於血他無可言也熱滯於氣固無寒滯耶寒滯於血固無熱滯耶何寒不能傷氣熱不能傷血耶以予觀之氣爲陽行脈外血爲陰行脈內相並分派周流循環一身無停止謂之脈一呼

脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息共得六寸一身通行八十一丈得熱則行速而太過得寒則行遲而不及五味之厚七情之偏運氣爲滯津液稠厚積而久也爲飲爲痰滲入脈內血爲所亂因而凝濁運行沍泣或爲沸騰此陰滯於陽也正血滯於氣也氣病今人或以藥助邪病上生病血之病日增溢出脈外隧道隘塞升降有妨運化失令此陽滯於陰也正氣滯於血也病分寒熱者當是稟受之素偏虛邪之雜合豈可以陽爲熱陰爲寒耶浮洪弦數氣病之脈也

豈可遽以此作熱論沉細弱濇血病之脈豈可遽以此作寒論此萬病之根本豈止疥癬瘡瘍癰疽而已幸相評其是否

明本末

東垣曰生氣通天論云營氣不從逆於肉理乃生癰腫又云膏粱之變足生大疔受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則害人皮肉筋脈是言濕氣外傷則營氣不行榮衛者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也營氣爲本本逆不行爲濕氣所壞而爲瘡瘍也膏粱之變亦是言厚滋味過度而使營氣逆行凝於經絡爲瘡瘍也此邪不在表亦不在裏唯在其經中道病也已上內經所說俱言因營氣逆而作也遍看諸瘡瘍論中多言二熱相搏熱化爲膿者有只言熱化爲膿者又言濕氣生瘡寒化爲熱而爲膿者此皆瘡疽之源也宜於所見部分用引經藥幷兼見證中分陰陽證先瀉營氣是其本本逆助火濕熱相合敗壞肌肉而爲膿血者此治之次也宜遠取諸物以比之一歲之中大熱無過夏當時諸物皆不壞爛

者而壞於交秋濕令大行之際也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以爲上工矣

營氣不從逆於肉理乃生瘡癰且營氣者胃氣也飲食入於胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脉次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節以飲食肥醲之類雜以厚味日久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅先行陽道反行陰道逆於肉理則濕氣大勝則子能令母實火乃大旺濕熱既盛必來尅腎若雜以不順又損其眞水腎既受邪積久水乏水乏則從濕熱之化而上行其瘡多出背出腦此爲大疔之最重者也若毒氣行於肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛如持虛器以受物無不受焉治大疔之法必當瀉其營氣以標本言之先受病爲本非苦寒之劑爲主爲君不能除其苦楚疼痛也諸瘡瘍有痛往往多以乳香沒藥雜以芳香之藥止之必

無少減之理若使經絡通流臟腑中去其壅滯必無痛矣苦寒之劑除其疼痛藥下於咽則痛立已此神品藥也

瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍者乃營氣而作也今反補之與自棄何異雖用藥施治而不能愈地之濕氣自外而入內者瘡癤當先服藥而用針如瘡癤小不欲飲藥或嬰兒之瘡先當溫衣覆蓋令其凝泣壅滯血脉溫和則出血立已者不如此血脉凝滯便針則邪毒不瀉反傷良肉又益其瘡勢也瘡瘍及諸病面赤雖伏大熱禁不得攻裏爲陽氣佛鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥之藥以潤之如見風脉風證只可用發表風藥便可以利通得大便行也若只乾燥祕澀尤宜潤之慎不可下也瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之則愈驗瘡名色治之當從素問針經聖濟總錄易老瘡論及諸家治瘡用藥法度此爲緊要臨病之際宜詳審焉

註　按聖濟總錄能悉諸瘡之名色但其用藥則多

主寒凉而無通變之法唯已上易老東垣等言深擷針經之大法陳脈病治例之要學者能熟此等議論則臨證處方便自胷中了然明白

膿潰論

夫癰疽瘡癤皆由氣血壅滯而生也當推其虛實表裏而早治之可以內消此卽托裏之意也若毒氣已結者勿泥此內消之法當辨膿之有無淺深若按之卽復起者有膿也不復起者無膿也大按方痛者膿深也小按便痛者膿淺也急酌量刺之緩則穿通臟腑爛筋骨可不慎哉但病者多喜內消而醫者卽用十宣散及敗毒散流氣飲之類殊不知十宣散雖有參芪然防風白芷厚朴桔梗皆足以耗氣況不分經絡時令氣血多少而槩用之乎敗毒散乃表散之藥也雖有表證不過一二服況非表證而用之乎流氣飲乃行氣散血之劑若服之過度則氣虛血耗何以爲膿此三藥者不可輕用明矣若夫瘡既成膿皮膚不得疎泄昧者待其自穿殊不知少壯而充實者或能自解若老弱之人氣血枯槁兼或攻發太過不行

針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤事如沈氏室乳癰膿成予爲針刺及時不月而愈黃上舍腿癰膿熟惡針幾至危殆予爲刺之大補三月而愈練千兵腿癰脉證俱弱亦危甚矣予治以托裏得膿急使針刺彼固不從致膿水開泄淋漓不能收斂而歿王安人發背待其自破毒氣內攻王貴腹癰潰透腹脅穢氣從瘡口而出予謂其決不起果然大抵瘡瘍之證感有輕重發有淺深淺者腫高而軟發於血脉深者腫下而堅發於筋骨然又有發於骨髓者則皮肉不變膿成之時氣血壯實者或自出怯弱者不行針刺鮮有不誤東垣云毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎茲舉一二與同道裁之使患者知所慎云

生肌止痛

夫肌肉脾之所主也潰後收斂遲速者乃氣血盛衰使然世之治者但知生肌用龍竭之屬止痛用乳沒之屬恪守不移予謂不然蓋生肌之法當先理脾胃助氣血爲主則肌肉自生豈假龍竭之屬設若膿毒

未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛而不斂亦危矣蓋止痛之法熱者清之寒者溫之實者損之虛者補之膿鬱者開之惡肉侵蝕者去之如是則痛自止豈假乳沒之屬如黃汝耘背發毒氣未盡早用生肌竟致潰爛予以解毒藥治之得愈許序班患此毒氣始發驟用生肌其毒內攻而死王汝道患腿癰因寒作痛與乳香定痛丸周朝儀母患時毒因熱作痛與防風通聖散丁蘭患臂癰膿潰因虛作痛與益氣養榮湯劉貴患腹癰因實作痛與黃連內疎湯王州守患腿癰膿成作痛予爲刺之楊千兵母發背腐肉侵蝕作痛予爲取之痛卽自止嗟夫以寒治熱以熱治寒損實補虛此用藥者之繩墨若專用龍竭生肌乳沒止痛予恐其功不奏也

惡肉論

夫惡肉者腐肉也大凡癰疽瘡潰後腐肉凝滯必取之乃推陳致新之意若壯者筋骨強盛氣血充溢眞能勝邪或自去或自平不能爲害若年高怯弱之人

血液少肌肉澀必先迎而奪之順而取之是謂定禍亂以致太平設或留而不去則有爛筋腐肉之患如劉大尹汪太夫人取之及時而新肉卽生得以全愈金工部陸舍人取之稍遲幾至不救鄭揮使取之失期大潰而斃于常見腐肉既去雖少壯者不補其氣血尚不能收斂若怯弱者不取惡肉不補氣血未見其生也

腫瘍

腫高焮痛脈浮者邪在表也宜托之腫硬痛深脈沉者邪在內也宜下之外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也當調榮衛焮痛煩躁或咽乾作渴者宜降火焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒煩躁飲冷焮痛脈數者邪在上也宜清之惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之焮痛發熱汗多大渴便祕讝語者結陽證也宜下之不作膿或熟而不潰者虛也宜補之

潰瘍

膿熱不潰者陽氣虛也宜補之瘀肉不腐者宜大補陽氣更以桑木灸之膿清或不斂者氣血俱虛宜大補之膿後食少無睡或發熱者虛也宜補之倦怠懶言食少不睡者虛也宜補之寒氣襲於瘡口不斂或陷下不斂者溫補之脈大無力或濇微者氣血俱虛也峻補之出血或膿多煩躁不眠者乃亡陽也急補之

作痛

膿出而反痛者虛也宜補之脈數虛而痛者屬虛火宜滋陰脈數實而痛者邪氣實也宜泄之脈實便祕而痛者邪在內也宜下之脈濇而痛者氣血虛寒也溫補之

發熱

脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣脈濇而熱者血虛也宜補血午前熱者補氣爲主午後熱者補血爲主脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散之脈沉數發熱而痛者邪在內也宜下之

作渴

尺脈大或無力而渴者宜滋陰降火上部脈沉實而渴者宜瀉火上部脈洪數而渴者宜降火胃脈數而渴者宜清胃火氣虛不能生津液而渴者宜補中氣脈大無力或微弱而渴者宜補氣血膿血大泄或瘡口出血而渴者大補氣血如不應急用獨參湯

作嘔

喜寒惡熱而嘔者宜降火喜熱惡寒而嘔者宜養胃氣脈實便祕而嘔者宜瀉火脈細腸鳴腹痛瀉而嘔者托裏溫中

便祕

脈沉實而祕者火在內也宜泄之脈濇而祕者屬血少宜養血脈浮而祕者屬氣虛宜補氣脈浮濇而祕者氣血俱虛也宜補氣血

疔瘡

脈浮數者散之脈沉實者下之表裏俱實者解表攻裏痲癢或大痛及不痛者幷灸之更兼攻毒

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十一卷目錄

醫部彙考三百六十一

外科癰疽疔毒門三

薛己醫按（灸法用藥第一　備論第二　灸法論第三　騎竹馬灸法第四　隔蒜灸法第五　尋頭灸法第六　蒜餅分輕重第七　灸法要論第八　灼艾痛癢論第九　腦疽灸法第十　護臟腑論第十一　癰疽論第十二　敘論第十三　素問要論第十四　千金要論第十五　別脈辨證論第十六　脈證第十七　用藥大綱第十八　嘔逆第十九　論源第二十　華佗論第二十一　論原有五第二十二　分表裏第二十三　別內外第二

十四 陰陽深淺緩急治法第二十五 善惡
第二十六 生死第二十七 先明形證逆順
第二十八 審內證用藥附 治貴在早第二
十九 津潤 墨圍第三十 看色灼艾防蔓第
三十一 瘡口冷濇難合第三十二 用藥溫
涼防祕泄第三十三 生瘀切護第三十四
體察愛護第三十五 香藥調治第三十六
飲食居處戒忌第三十七 更易良方第三十
八 麥飯石膏第三十九 敷神異膏第四十
口緊小硬第四十一 喉舌生瘡如菌第四
十二 替針丸第四十三 割傷第四十四
寒熱多汗用藥第四十五 食毒發熱第四十
六 作渴調補精氣第四十七 將安發熱作
渴第四十八 口乾作渴不同第四十九 腎
虛發熱第五十 將安當補第五十一 服藥
捷徑第五十二 調節飲食當平胃氣第五十
三 成漏脈例第五十四 蜞針法第五十五
槩括關鍵處治 論多骨疽

藝術典第三百八十一卷

醫部彙考三百六十一

外科癰疽疔毒門三

明薛己醫按

灸法用藥第一

精要曰經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火前輩又謂癰疽多生於丹石房勞之人凡人生四十以上生發背等瘡宜安心早治此證如虎入室禦而不善必至傷人宜先用內托散次用連翹五香湯更以騎竹馬法或

隔蒜灸并明灸足三里以發泄其毒蓋邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實故癰疽未潰臟腑畜毒一毫熱藥斷不可用癰疽已潰臟腑旣虧一毫冷藥亦不可用猶宜忌用敷貼之藥閉其毫孔若熱渴便祕脈沉實洪數宜用大黃等藥以泄其毒後用國老膏萬金散蠟礬丸遠志酒之類選而用之

（註）按前證若熱毒蘊於內大便祕結元氣無虧者宜用大黃等藥泄其熱毒若陰虧陽湊精虛氣節脾胃虛弱者宜用甘溫之劑培其本源若瘡不焮腫不作膿者雖未潰仍須溫補若瘡已潰而腫不退痛不止者仍宜淸涼之劑治之若病急而元氣實者先治其標病緩而元氣虛者先治其本或病急而元氣更虛者必先治本而兼以治標大抵腫高焮痛膿水稠粘者元氣未損也治之則易漫腫微痛膿水淸稀者元氣虛弱也治之則難不腫不痛或漫腫色黯不潰者發於陰也元氣虛甚理所不治若腫高焮痛者先用仙方活命飲後用托裏消毒散漫腫微痛者宜托裏散如不應加薑桂若

膿出而反痛氣血虛也八珍散不作膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪肉桂不生肌不收斂脾氣虛也十全大補加薑桂晡熱內熱陰血虛也四物加參朮欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑自汗盜汗五臟虛也六味丸加五味子食少體倦脾氣虛也補中益氣加茯苓半夏喘促欬嗽脾肺虛也前湯加麥門五味欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯腹痛泄瀉脾胃虛寒也附子理中湯小腹痞足脛腫脾腎虛弱也十全大補加山茱山藥肉桂泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附熱渴淋閉腎虛陰火也加減八味丸喘嗽淋閉肺腎虛火也補中益氣湯加減八味丸凡此變證皆因元氣虧損失於預補所致故丹溪先生云但見腫痛參之脈證虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉旨哉斯言蓋古今虛實不同因時施治不無少異是集治論義悉類此

備論第二

初虞世云凡癰疽始作須以大黃等藥急轉利之勿

以困苦爲念若與其潰爛而死不若利之而死况有生道哉古人立法率用五香連翹漏蘆等藥貧乏者單煎大黃湯以利之至於膿潰乃服黃芪等藥以排膿千金外臺備矣世以瘡發於外不行轉利而死者多矣悲夫

註 按前證若腫高焮痛臟腑閉結屬內外俱實當用前藥瀉之若漫腫微痛臟腑不實屬內外俱虛當用內托補之若漫腫無頭肉色不變當助胃壯氣令其內消若疼痛不止焮腫不消當用人參黃芪散以托裏排膿若飲食少思肌肉不生當用參芪托裏散以補養脾胃丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固次以行經活血藥佐之叅以經絡時令使毒氣外泄治之早者可以內消此內托之旨也又云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如用大黃寧無孟浪之非潰瘍內外皆虛宜以補接爲主如用香散未免虛虛之失此蓋古今氣禀不同治宜審之

灸法論第三

陳無擇云癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾唯癰腫成則宜鍼疽膿成則宜烙當審察其證疎利其毒補托其裏然癰疽冠於襍病之首治失次序多致夭枉故集得效灸法以貽學者庶不致妄投也

註 按前證若發熱煩渴大便祕結者由邪畜於內宜內疎黃連湯以泄內毒若頭痛拘急發熱惡寒者由邪客於外宜人參敗毒散以散表邪若腫痛焮赤發熱作渴此毒氣凝於肉裏宜仙方活命飲解散其毒若食少體倦發熱惡寒此中氣虛弱宜六君子湯以補脾胃

騎竹馬灸法第四

治一切瘡瘍即用此法無有不愈其法令病人以肘凭几豎臂腕要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷爲則不量指甲却用竹杠一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人杠起令病者脚不著地又令二人扶之勿令傴僂却將前所量臂篾從竹杠坐處尾骶骨盡處直貼

男以左手女以右手先屈中指用薄篾量取中間一節兩橫紋盡處爲同身一寸爲則子（此是第一次法）先從男左女右臂腕中曲橫紋起用薄篾一條量至中指齊肉盡處不量指爪爲則剪斷（此是第二次法）先令病人脫去衣服以大竹杠一條跨定令二人徐徐杠起足要離地五寸許兩旁更以兩人扶定毋令動搖不穩却以第一圖則子貼定竹杠從尾閭起貼脊量至則子盡以墨點定記之非灸穴也此是取中穴止處却以第二圖取同身寸則取兩寸平摺自中

脊背量至篾盡處爲則用墨筆點定此只是取中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫紋爲則男左女右截爲一則就前所點記處兩邊各量一則盡處卽是灸穴兩穴各灸五七壯疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴心脈所過之處凡癰疽皆心火畱滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死囘生之功屢試屢驗

註　按前證若毒既解而肌肉不生當求其屬而補之

穴量之以中分取兩旁各一寸方是灸穴也（此是第三灸法）

隔蒜灸法第五

李氏云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使毒氣外泄譬諸盜入人家當開戶逐之不然則入室爲害矣凡瘡初發一二日須用大顆獨蒜切片三分厚貼疽頂以艾隔蒜灸之每三壯易蒜痛者灸令不痛不痛者灸之令痛瘡潰貼神異膏如此則瘡不開大肉不敗壞瘡口易斂一舉三得此法之妙人所罕知若頭項見疽則不可用此法

註 按瘡瘍之證有諸中必形諸外在外者引而拔之在內者疏而下之苟或毒氣鬱結瘀血凝滯輕者藥可解散重者藥無全功是以灼艾之功爲大凡灸法未潰則拔引鬱毒已潰則補接陽氣每治四肢患瘡氣血無虧者祇以前法灸之皆愈若中氣虛弱不灸而服敗毒之藥復傷中氣未有不敗者也其頭項患者亦宜灸之但艾炷宜小而少其壯數爲善

尋頭灸法第六

李氏云凡患背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫處但一點先乾處乃是瘡頭可用大蒜十顆淡豉半合乳香錢許研爛置瘡上鋪艾灸之痛否皆以前法爲度

註　按前證或附骨疽及臂腿諸毒初起未明者尋頭用灸多自內消其毒熾盛更服活命飲其功尤捷若氣血虛弱必以補托爲主若背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角取嚔法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取嚔鼓動內膜反致穿透愼之愼之

蒜餅分輕重第七

伍氏曰凡用蒜餅灸者葢蒜味辛溫有毒主散癰疽假火勢以行藥力有只用艾炷灸者此可施於頑瘡痼發之類凡赤腫紫黑毒甚者須以蒜艾同灸爲妙

註　按前法誠有回生之功若頑瘡痼疾脾胃虛弱營氣不能滋養患處以致寒邪內襲而不愈宜用小艾炷頻灸瘡口以祛寒邪補接營氣其內補之法說見首論及三十二論

灸法要論第八

伍氏方論曰夫癰疽發背皆有所因前篇言之詳矣凡初覺赤腫先從背脊骨第二陷中兩旁相去同身寸各一寸五分名熱腑穴二處各灸七壯此能疎泄諸陽熱氣永無癰疽之苦或隔蒜灸不論壯數則邪無所容而眞氣不損但頭項見瘡宜用騎竹馬法及足三里灸之

註 按前論誠爲良策其調理之法當求首論

灼艾痛癢論第九

伍氏曰凡治癰疽發背疔瘡不痛者必灸使痛痛者必灸使不痛若初灸即痛者由毒氣輕淺灸而不痛者乃毒氣深重悉宜內服追毒排膿外傅拔毒之藥大抵癰疽不可不痛又不可大痛悶亂不知痛者難治

註 按前論唯疔瘡一證其狀不一其色不同或如小瘡或如水泡或作痛或麻木或有紅絲或寒熱頭疼或嘔吐惡心或肢體拘急其候多端非前灸法并解毒之劑卒難濟事若不省人事或牙關緊急者即以奪命丹爲末灌之若生兩足多有紅絲

至臍生於兩手多有紅絲至心生於唇面多有紅絲入喉俱難治若針其紅絲出血多有生者若患於肢末之處毒愈凝滯藥難導達艾灸之功爲大如妄服踈利之劑耗損眞氣不唯無以去毒而害反隨之矣

腦疽灸法第十

李氏云腦疽及頭項有疽不可用隔蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴三七壯仍服涼血化毒之藥或以騎竹馬穴法灸之凡頭項咽喉生疽古法皆爲不治若用此法多有生者如五香連翹漏蘆等湯國老膏萬金散皆可選用

註按前證屬膀胱經或濕熱上壅或陰火上炎若因濕熱則病氣有餘元氣不足當用黃連消毒散以除濕毒用補中益氣湯以滋化源若因陰火則元氣病氣俱不足當用補中益氣湯及六味地黃丸以滋腎水若腎水乾涸中傳末證急用加減八味丸及補中益氣湯以固根本引火歸源若色黯不潰或潰而不斂名曰腦爍不治大凡腫焮痛甚

宜活命飲隔蒜灸之解散瘀血拔引鬱毒但艾炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏爲主

護臟腑論第十一

李氏云背疽之方雖多得效者殊少今擇用驗者錄之庶不致誤人如護心散凡有疽疾早進數服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黑爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

（註）按護心散乃解金石發疽之藥若發熱焮腫作渴飲冷而嘔者宜用若發熱焮腫作渴飲湯而嘔者不宜用若脾虛停痰或寒邪內侵或痛傷脾胃宜用六君子湯若喉舌生瘡口乾作渴或小便頻數宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便祕是熱毒也黃連消毒散解之飲冷便和是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虛也補中益氣湯以補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虛寒也六君加炮薑以溫之常見脾胃虛弱者用前散反心間陰冷無不致嘔其喉舌生瘡乃腎水枯涸虛火炎上

其證甚惡急用加減八味丸亦有得生者

癰疽論第十二

馬益卿曰夫人有四肢五臟一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而爲榮衞暢而爲氣色發而爲聲音陽用其形陰用其精此又常數之所同也至其失也蒸則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽凝而爲瘡癬憤則結癭怒則結疽又五臟不和則九竅不通六氣不和則流結爲癰皆經絡澀滯氣血不流暢風毒乘之而致然也

（註）按此論可謂善言人身之造化瘡瘍之情狀者矣治法當參詳前論

敘論第十三

癰疽之證若七情虧損氣血經絡壅結而成者屬內因若六淫外侵氣血受傷寒化而爲癰者屬外因若服丹石補藥膏粱酒麪房勞所致者屬內外因也又曰陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽脈浮洪滑數爲陽沉緩遲濇爲陰陰則熱治陽則冷治初覺宜清熱拔毒已潰宜排膿止痛故用遠志大黃甘草此三

因之法也治當寒者溫之熱者淸之虛者補之實者瀉之導之以針石灼之以艾炷破毒潰堅各遵成法以平爲期

註　按前證脈沉實大便祕結者屬內因也宜疎利之脈浮大便調和者屬外因也宜托裏之脈不浮不沉者屬不內外因也宜調和榮衛此亦治三因法也若焮腫大痛煩熱飲冷大便祕結脈洪數實者爲純陽宜苦寒之劑淸熱拔毒若不腫不痛瀉利不食嘔吐足冷是爲純陰宜辛熱之劑大補陽氣不拘嚴寒盛暑當捨時從證若微腫微痛似潰不潰時出淸膿者爲半陰半陽宜辛熱之劑溫補胃氣此亦治陰陽證法也治驗詳見首論

素問要論第十四

素問云陽氣湊襲寒化爲熱熱甚則肉腐爲膿凡發背多因服金石而發者有因上代曾服而發者其候多發於髀起如粟或痛或癢多致不救外面如拳古人云外面如麻裏面如瓜有數十孔以手按之諸孔出膿尋時失痞凡有此證可用淨土水調量大小作

餅厚分許以艾炷灸之內服五香連翹湯及鐵漿酢調蚌殼灰塗之更以騎竹馬法灸之甚良

註 按前證仍參首論主治恐其表裏熱毒之不同元氣虛實之不一也

千金要論第十五

千金云癰疽始作或大痛或小痛或發如米粒即便出膿宜急斷口味利去其毒用騎竹馬灸法或就患處灼艾重者四面中央總灸一二百壯更貼寒藥其效甚速

註 按前證若因元氣虧損或因氣血相滯而患者更當調補其內

別脈辨證論第十六

伍氏云癰疽之疾有二十餘證熛發痼發石發岩發蜂窠發蓮子發椒眼發連珠發竟體發有腸癰內發腦背發眉發頤頷發肺癰瓜瓠發大率隨病淺深內外施治不可遲緩初發如傷寒脈浮而緊是其候也

註 按前證其名雖殊處治之法詳具各論其肺癰胃脘癰別載

脈證第十七

陳無擇云癰疽脈數身無熱反洒淅惡寒若有痛處乃發爲癰以手掩上若熱者爲有膿不熱者爲無膿若脈不數不熱而疼者發於陰也尤爲惡證凡熱甚脈數用漏蘆散并單煑大黃等湯不甚熱脈緩弱投五香連翹湯仍依四節八事次序三因以藥之無有不濟者也

註　按前證洒淅惡寒有屬瘡之表邪者有屬脾肺之氣虛者若潰後焮腫作痛惡寒發熱煩渴脈數乃眞氣虛而邪氣實也仍參詳首論主之

用藥大綱第十八

李氏云余之所著方論靡不周備但欲使治者一玩味次第用之無有不效今略書用藥要領節次於後

一初患癰疽便服內托散以免後來口舌生瘡仍用騎竹馬或隔蒜灸

一服五香連翹湯如大便快卽止仍量人虛實

一癰疽潰後宜服排膿內補散若嘔逆用木香湯下

一癰疽初作便宜灼艾及麥飯石膏塗四圍中留口

出毒如瘡小通傳之既潰用神異膏貼之

一癰疽已潰日用猪蹄湯淋洗將愈之際三日一次

一癰疽將斂宜用神異膏如毒未盡不可遽用生肌之劑

一癰疽將安宜用加味十全大補湯補其氣血庶肌肉易生

一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救多矣若服加減八味丸非特杜絕渴疾抑且大滋氣血生長肌肉

註　按前證及諸治法各附四十七等論當審用之

一癰疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在心一因脾氣不正若因伏熱在心者心煩身熱焮腫作痛宜用內托散三兩服若因脾氣不正者則不煩熱或聞穢氣作嘔宜用嘉禾散如有寒熱用不換金正氣散五更初兼服山藥丸以補腎

註　按前證治法當與第十一論參看

嘔逆第十九

李氏云癰疽嘔逆是毒氣衝心非脾胃之冷當服內

托散楊氏云鼻衄初愈不曾表汗毒在經絡則背發大疽自肩下連腰脅腫硬如石其色紫黑以凉藥投之終夜大嘔連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患癧者痛過徹嘔服此即止今有病疽不服此藥者故引楊氏之言以解世人之惑

註　按用藥之法有是病必用是藥但今之脾胃虛寒氣逆痰滯而嘔吐者十居八九熱毒內攻而嘔吐者十纔一二當參首論及第十一論主之

論源第二十

夫癰疽之源因於氣或因於熱以僕之管見亦有因於膏粱房勞金石等藥者故治法用菉豆犀角礬石國老膏追毒丸其屬毒明矣華佗中藏所言是毒服宣熱敗毒之藥不必疑矣

註　按前證若因金石所致元氣充實者誠宜此法若膏粱積熱房勞過度脾腎虛損者當滋其化源不可拘執

華佗論第二十一

夫癰疽瘡腫之作皆五臟六腑畜毒不流非獨因榮

衛壅塞而發也其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六腑之毒發於內者五臟之毒故內曰壞外曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑則易治感於五臟則難瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蟲近膚者久不愈則傳氣成漏成蟲則多癢少痛或先癢後痛成漏則多痛少癢或不疼不癢內虛外實者多痛少癢血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無度飲食無時皆癰疽使然證候多端要當詳治

註　按瘡瘍生蟲乃肝經風熱其成漏乃元氣虛弱其出血乃脾虛有火其潰膿乃元氣充實至於嘔逆等證屬脾胃虧損所致當調補元氣庶保無虞

論原有五第二十二

一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙煿服丹藥

註　按前證所因雖殊其治法亦當別經絡陰陽虛

實表裏腫潰以助胃壯氣爲主使根本堅固庶保無虞

分表裏第二十三

伍氏曰癰疽皆因喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和腠理不密寒氣客於經絡或榮血受寒則濇而不行衞氣從之與寒相搏壅遏不通或陽氣蘊積則生寒熱寒熱不散皆致前證又曰五臟六腑俞穴皆在背凡患瘡證易傷臟膜多致不救腑氣浮行於表故癰腫浮高爲易治臟血沉寒主裏故疽腫內陷爲難治又曰癤者節也癰者壅也疽者沮也一寸至二寸爲癤三寸至五寸爲癰五寸至一尺爲疽一尺至二尺爲竟體疽若脈洪數者難治脈微濇者易治初覺宜清熱拔毒已潰則排膿止痛膿盡則長肌敷痂當酌量輕重形證順逆而審治之

（註）按前證若飲食少思用六君子湯以補脾胃如不應加薑桂以溫補之使邪氣自退其不起者由邪氣盛正氣虛不能發也於旬日之外見之若已發出用托裏消毒散以壯元氣助令潰腐不應須

溫補脾胃其不起者由眞氣虛不能潰也於二旬之外見之若已腐潰用托裏散以補氣血生肌肉不應當專補脾胃又不應須溫補脾胃其不起者乃脾氣虛不能收斂也於一月之外而見之凡此治法竊常用驗詳具首論

別內外第二十四

李氏云疽初發一粒如麻豆發熱腫高熱痛色赤此爲外發勢雖熾盛治得其法可保其生若初時不發熱體倦怠患處如故數日不腫痛內臟已壞雖有盧扁之藥亦末如之何矣

註 按前證有因元氣虛而不能發出者有因敷貼寒藥而不能發出者有因攻伐過傷氣血而不能發出者凡有因熱毒內蘊而失疎托者審而治之多有生者

陰陽淺深緩急治法第二十五

會氏云凡癰疽其脈浮數洪緊腫焮作痛身熱煩渴飲食如常此六腑不和毒發於外而爲癰其勢雖急投以涼劑多保生全其脈沉細伏緊初發甚微或無

瘡頭身不熱而內躁體重煩疼情緒不樂胷膈痞悶飲食無味此五臟不和毒畜於內而爲疽急投五香連翹湯甚者轉毒散神仙截法黃礬丸國老膏防托毒氣免致變證內攻尤宜當頭隔蒜灸若塗毒藥迷其腠理投諸凉藥虛其眞氣故其善惡之證在乎醫之工拙耳或噫氣痞塞欬逆身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言顚倒皆惡證也五善見三則瘥七惡見四則危五善併至則善無以加七惡併臻則惡之劇矣

註　按前證善者乃五臟未傷病微邪淺使能愼起居節飲食勿藥自愈惡者乃五臟虧損之證前哲雖云不治若能補其脾胃固其根本多有可生者豈可以其惡而遂棄之耶

善惡第二十六

問曰五善七惡可得聞乎曰飲食如常一善也實熱而大小便濇二善也內外病相應三善也肌肉好惡分明四善也用藥如所料五善也渴發而喘眼角向鼻大小便反滑一惡也氣緜緜而脈濡與病相反二

惡也目不了了睛明內陷三惡也未潰肉黑而陷四惡也已潰青黑筋腐骨黑五惡也發痰六惡也嘔吐七惡也

註　按善惡形證治法見附錄

生死第二十七

問曰病有甚而至生有微而至死病證難辨生死何從決乎答曰發背潰透內膜者死（此言肝兪已上）未潰內陷面青脣黑便汚者死（此言臟壞便瘀血）潰喉者不治陰患入腹者不治入囊者不治鬢深數寸者不治在頤後一寸三分名銳毒亦不治無此者生流注雖多療之必愈

註　按前證有因元氣虛弱而毒氣內陷者有因初作失於內疎托裏和榮衛者有因毒盛失於消解者有因虛弱失於補托者有因膿成失於針刺者有因腐潰失於補養者若發背腦疽屬濕熱上壅者黃連消毒散補中益氣湯以除濕毒補脾肺滋腎水若鬢疽銳毒屬風熱者柴胡山梔散以清肝火養肝血若陰虛用六味地黃丸以生腎水滋化

源若患於小腹補足三陰之血養脾胃之氣庶可保其生也其流注之證或因飲食勞倦房室陰虛或七情內動六淫外侵以致血虛互相凝滯或產後血瘀隨虛流注或結塊或漫腫宜用益氣養榮湯以固元氣佐以葱熨解散凝滯更以豆豉餅祛散寒邪潰久內有瘀肉用針頭散腐之多有生者設若不守禁調攝多致不起慎之

先明形證逆順第二十八

癰疽潰後形有逆有順白睛黑小一惡也不能下食納藥而嘔食不知味二惡也傷痛渴甚三惡也體項不便四肢沉重四惡也聲嘶色脫脣鼻青黑面目浮腫五惡也煩躁時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋六惡也膿血大泄腫痛尤甚膿色敗臭七惡也喘粗氣短恍惚嗜臥八惡也未潰黑陷面青脣黑便汚九惡也氣噎痞塞欬嗽身冷自汗無時目瞪耳聾恍惚驚悸語言顛倒十惡也又腦爲諸陽所會頸項近咽喉腎俞皆致命之所俱不可灼艾

（註）按前證未潰黑陷面青脣黯便汚者臟腑內潰

之惡證也氣噫痞塞欬嗽身冷自汗者脾肺虛敗之惡證也不食便瀉腸鳴耳聾目瞪者脾腎虛敗傳變之惡證也治法詳見附錄

審內證用藥附

自瀉嘔吐不進飲食腎脈最虛如是之疾古人皆以爲不治然亦有救療之理焉耳

註 按前論發內經之微旨開萬世之聾瞶其惠博矣此證實命門火衰不能生脾土而虛寒以致自瀉嘔吐或胷膈不利或食而不化或大便不實宜用八味丸及六君子加薑附若因房勞過度眞陽衰敗或原禀不足不能生脾土而飲食不進者用補中益氣加附子薑桂幷東垣補眞丸多有得生者若用參芪之類直補脾胃鮮有不誤若或以爲毒氣內攻而治者俱致不起

治貴在早第二十九

伍氏曰夫癰發背者皮薄腫高多有椒眼數十粒疽發背者皮膚頑硬狀如牛頸之皮二證皆宜灼艾癰成膿則宜針其針當以馬銜鐵爲之形如薤葉樣兩

面皆利可以橫直裂開五六寸許取去毒血其病頓輕須先灸而後裂可服神仙追毒丸利去毒根次服排膿托裏等藥調治疽成膿則宜烙用銀箆大寸許長六寸燒赤頻烙患處以膿出爲效大抵癰疽難於諸科非心傳契妙其可以易治耶

註 按前證若氣血充實其膿既成宜速針之勿藥可愈若氣血虧損膿不能出或膿出反痛須托裏養胃庶保終吉詳見第四十

津潤墨圍第三十

伍氏曰但覺背兩胛間赤痒腫痛或有白粒且以津唾時潤令濕切勿抓破大抵在背微有赤腫點或因抓破入浴犯水或因飲食膾炙而作初未辨證且以津潤時用墨圍之若腫赤急就圍中灼艾最善人皆疑火熱太過以致延蔓誤者衆矣

註 按疽發背胛若有瘀肉腐爛膿水淋漓腫痛仍作者此處有筋一層間隔內膿不出故也宜用針引之老弱者若待其自潰多致不救治者審之

看色灼艾防蔓第三十一

伍氏曰瘡腫赤色按之色不變者此膿已成矣按之隨手赤色者其亦有膿也按之白良久方赤者此遊毒已息可就赤白盡處灸斷赤腫自消凡癰疽以手按之若牢硬未有膿也若半軟半硬已有膿也又按腫上不熱者爲無膿熱甚者爲有膿宜急破之

註　按瘡瘍毒氣已結而不發者法當補其血氣使膿速成而針之其膿既潰宜培養脾胃以生肌斂口大凡瘡瘍膿血既潰當大補血氣爲先雖有他證當以末治

瘡口冷澁難合第三十二

治癰久不合其肉白而膿少者此氣血俱虛不能潮運而瘡口冷澁也每日用艾葉一把煎湯避風熱洗及燒松香烟熏之更以神異膏貼之必須守禁調理否則不效

註　按前證果因寒邪凝滯氣血不能榮衞宜用斯法祛散寒邪補接陽氣其功甚大若因氣血虛弱不能潮會瘡口必用補脾胃生氣血爲善丹溪先生云諸經唯少陽厥陰之生癰疽宜預防之以其

多氣少血也血少則肌肉難長瘡久未合必成敗證苟反用驅利毒藥以伐其陰分之血禍不旋踵矣

用藥溫凉防祕泄第三十三

伍氏曰凡瘡家皆宜宣去其毒蕩滌陳莝宜用神仙追毒丸六味車螯散五香連翹湯千金漏蘆湯更當詳辨禀賦强弱臨時加減大抵治瘡要法須臟腑堅而不祕通而不泄則眞氣不耗邪無所留如祕結神效麻仁丸凡瘡潰後尚覺虛熱可與五香湯加大黃朴硝且如治瘡溫藥先用桂以通血脈宣導百藥冷藥必用地黃補不足益氣塡髓近用乳香散乳香消毒菉豆清熱眞良藥也

註 按大腸祕結果因血燥胃氣不虛最宜前藥若因精血枯涸用八珍桃仁麻仁其潰後發熱若因氣虛用四君黃芪當歸血虛用四物白朮茯苓氣血俱虛用八珍黃芪若大便祕小便赤用四物麥門五味如不應急用加減八味丸或六味丸若下後元氣傷而發熱用六君當歸胃氣虛而發熱用

補中益氣湯大凡二便肝腎主之經云腎主五液開竅於二陰若津液滋潤大便通利若津液不足必因脾氣虧損當培養化源

生肌切護第三十四

伍氏曰癰潰之後敗肉漸去新肉漸生日見堆阜方成白膜新肉當滋養平復保無虞大凡瘡口未可速合日用猪蹄湯洗去惡濁外敷生肌膏神異膏毒膿出盡可用聖效散以合瘡口更愼起居節飲食戒七情否則虛證蜂起多致不救愼之

註　按前證敗肉去而新肉生者須先微赤四沿漸生白膜者此胃中生氣也用六君子湯以培補之若赤甚者血虛而有火也用四物加參芪白朮以調補之若赤而不生膜者氣虛也用四君加當歸黃芪若色白而無神者氣血俱虛也用十全大補加薑桂如不應急加附子大凡瘡疽潰後歹肉漸去新肉漸生此乃脾胃之氣充實也若惡濁已去宜用當歸膏

體察愛護第三十五

伍氏曰癰疽一證病人當自體察凡初作先以墨圍患處却視浮沉聚散膿出視其多少肉生視其闊狹飲食視其美惡臟腑防其祕泄瘡口防其奢裂宜戒怒節勞調補元氣保愛體察慎不可忽

註 按前論卽丹溪先生所云癰疽當先助胃壯氣使根本堅固東垣先生教人以飲食有節起居有時素問反覆言之可不慎哉大凡泄瀉易損元氣腫瘍犯之不能成膿潰瘍犯之不能生肌患者審之

香藥調治第三十六

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於肉裏鬱聚爲膿得香之味則氣血流行故當多服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒入胃則欬逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其眞元可保無虞矣

註 按前證說見第十八十九

飲食居處戒忌第三十七

李氏云病疽之人當戒酒麵炙煿醃臟法酒生冷油膩雞鵝魚鮮之類起居七情尤當深戒臥室潔淨馨香使氣血流暢仍忌僧道孝子產婦經婦雞犬猫畜若背疽難於隱几宜用菉豆十斗作一袋隱伏其上解毒凉心也

註　按前論慎起居薄滋味恐病者好動四體甘嗜性熱性寒之物使火益熾而胃氣益衰則所患淹滯不愈又誰咎哉不若預爲之防當以古人之言爲戒如菉豆性寒主丹毒煩熱風疹或金石所發實熱煩渴飲食如常證屬純陽者宜用否則不可用也

更易良方第三十八

李氏云常見世間醫者每有妙方祕而不傳或更改以惑人誠可惡也余思西華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子責之矣昔趙公宣教字季修來宰龍泉兼程而進患鼻衄日出數升時家兄教以服藕汁地黃膏趙叩諸醫云此爲戒服之劑乃數易醫無效家兄陰餽前汁服三日而疾愈兄曰此卽前所獻之

方趙驚歎曰向非醫者譎計以惑我早信此方豈久受此困也今以屢試屢驗不可易者如因熱毒衝心而嘔用內托散（一名萬金散）因脾胃虛弱而嘔嘉禾散熱毒腫痛麥飯石膏陰虛作渴加減八味丸此四方屢爲醫人眩惑使人勿用深憫患者之受苦故舉趙公之事以例之

註竊以爲方者倣也倣病因以立方非謂內經無方也若執古方以治今疾猶折舊宇以對新宇其長短大小豈有合匠氏之手而能合者乎設或有合以爲亘古不易之方此又先王普濟之神術奚必祕而私之耶余嘗觀太無先生治滇南一僧遠遊江浙思親成疾先生惠之以飲食藥餌復贈金一鎰以資其歸此固我醫道之當然也今之醫者或泥古或吝祕或嗜利以惑人其得罪於名教多矣

麥飯石膏第三十九

李氏云麥飯石膏治發背癰疽神妙惜世罕知有患者因膿不潰以毒藥罨之其勢益甚毒延咽喉脚膝

皆爲不治余用此膏一夕頓潰凡疽得膿其毒始解或有不潰者須用此膏故錄之俾精擇修合以收十全之功也

註　按前證屬腑屬陽而氣血未損者用前膏敷之固無不愈然亦有屬臟屬陰而氣血有虧者當審其因而調治其內可也大凡瘡瘍之作由胃氣不從瘡瘍之潰由胃氣腐化瘡瘍之斂由胃氣營養余常治初結成膿者托而散之已成欲作膿者托而腐之膿成未潰者托而開之膿已潰者托而斂之東垣先生云胃氣乃生發之源爲人身之本丹溪先生亦謂治瘡當助胃壯氣使根本堅固厥有旨哉

敷神異膏第四十

凡疽證先以麥飯石膏塗之俟瘡根漸收却敷神異膏斂之夫癰疽之發有淺深故收斂之功有遲速斷不可早用收口之藥恐毒氣未盡後必復發爲患匪輕但麥飯石膏難於修合用神異膏亦效

註　按前證若毒已解而不生肌收斂者元氣虛也

用六君子湯壯其脾胃則肌肉自生設有餘毒亦能自解

口緊小硬第四十一

李氏云大抵疽口緊小而硬者葢因風毒所勝合用蚣蠍散摻瘡口以神異膏貼之

註按前證乃風寒滯於瘡口而未傳於內也凡傷損之證尤多此患經云風者善行數變入臟甚速死生在乎反掌當急分表裏虛實而治之其邪在表者善伸數欠筋脈拘急惡寒惕搦脈浮而弦宜羌活防風湯和解之傳於裏者舌强口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胷腹滿悶或便閉溺赤時或汗出脈洪數而弦宜大芎黃湯疏導之其汗初出者由風熱鬱於裏亦宜大芎黃湯之類下之若熱既退臟腑已和而汗仍出者表虛也宜白朮防風湯以實其表然解散和解疏導三法此治暴患之證氣血未損者若膿瘀內焮而見前證者宜針之急投十全大補或口噤遺尿乃氣血虛極亦用十全大補加炮附子大抵此證若因膿血去多宜

以補中益氣加羌活主之或人素多痰因傷損而見風證宜二陳白朮芎歸梔子芩連氣虛加四君血虛加四物血氣俱虛內熱甚而生風者宜四物參朮柴芩梔子若因怒傷而見前證宜小柴胡湯倍加川芎山梔天麻釣藤鉤若患破傷風至三五年忽然復發或跌撲而患者皆氣虛有痰所致也用二陳參朮芎歸主之

喉舌生瘡如菌第四十二

李氏云癰疽不服內托散或失宣內毒致咽喉口舌生瘡甚則生紅黑菌害人甚速當用琥珀犀角膏治之向有患此證者諸法不效余用此藥一日而安

（註）按前證多因酒色過度虧損腎水虛火上炎或五痏元氣消爍虛火上攻而致治當滋其化源最忌黃蘗知母之類恐復傷胃氣也

替針丸第四十三

曾氏曰癰疽膿熟塗以替針丸瘡口自開古人云癰疽能殺人若針藥得其宜則生失其宜則死可不慎哉

註　按瘡瘍之證若毒氣已結腫赤熾盛中央肉死黯黑者內用托裏健脾之劑外用烏金膏塗之則黯處漸低赤處漸起至六七日間赤黯之界自有裂紋如刀劃狀其黯漸潰若用鈹鍼利剪除去尤好須使不知疼痛不見鮮血爲善若膿未流利宜用針於紋中引之若膿水已出腫痛仍作乃內筋間隔亦用針引之若元氣虛弱誤服尅伐之劑患處不痛或肉死不潰者急溫補脾胃亦有復生者後須純補脾胃庶能收斂若妄用針刀去肉出血使陽隨陰散是速其危也若膿潰而煩痛未痊脈洪滑大散者眞氣虛而邪氣實也爲難治脈微濇遲緩者邪氣虛而眞氣將復也爲易治

割傷第四十四

李氏云癰疽有悞搽毒藥或針刀開割瘡口不合不可用澀斂之藥宜用猪蹄湯北艾湯間洗傅貼神異膏及服內補十宣散內托黃芪丸

註　按經云脾主肌肉脾健則肉自生然其勢熾甚宜用前藥以消其毒毒將盡宜用四君湯以養脾

寒熱多汗用藥第四十五

李氏云有數人病背疽或先寒後熱先熱後寒或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用柴胡恆山不應余謂此因脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三日卽愈

註　按前證若外邪既去而仍作宜用六君子湯以補脾胃大凡胃氣虛而作嘔者必喜溫熱毒內攻而作嘔者必喜寒治當辨之

食毒發熱第四十六

李氏論云凡癰不可食牛羊雞鵝蝦魚酒麪煿炙之物犯之必發熱宜服梔子黃芪湯大凡臟腑已利瘡毒已潰氣血既虛最當調護若發熱而服凉藥無不致禍

註　按前證若飲食傷脾胃而發熱用六君神麴山楂若陰血不足而發熱用四物參朮黃芪若膿血出多而發熱用十全大補湯東垣先生云胃爲五臟之根本胃氣一傷諸臟皆虛七惡蜂起可不愼哉

作渴調補精氣第四十七

伍氏云癰疽發熱大渴毒氣熾盛急用神仙追毒丸驅下惡毒次以清膻湯萬金散五香連翹湯六味車螯散千金漏蘆湯選用之渴不止用祕傳金粉散人參黃芪散內補散之類以補津液生血氣其渴自止

註 按前證若脈沉實大便祕結宜用前藥驅逐積毒若發熱作渴飲食如故大便如常屬胃經實熱用竹葉石膏湯以清胃熱生津液若發熱作渴飲食少思大便不實屬胃經虛熱用竹葉黃芪湯以補胃氣生津液若發熱惡寒若內熱晡熱口乾作渴屬氣血不足用八珍麥門五味以補肝脾生精血

將安發熱作渴第四十八

李氏云凡疽愈後忽發渴而不救者十有八九或先渴而患疽者尤爲難治急用加減八味丸可免前患如能久服末不作渴亦無疽證且氣血皆壯眞神劑也

註 按前證屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲水

無度或脣乾作裂小便頻數或痰氣上壅煩躁不寧或二三年先作渴飲水或口舌生瘡兩足發熱痰氣上壅或瘡愈三四年而口乾作渴小便頻數急用前藥多有復生者能逆知其因預服前丸可免此患若兼手足厥冷眞陽虛也宜服八味丸大凡瘡後審其腎水不足用加減八味丸中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補湯陽氣虛寒加薑桂如不應用八味丸

口乾作渴不同第四十九

李氏云癰疽已安之後或未安之際口舌燥黃如雞內金者乃腎水枯竭心火上炎此證最惡古人云玉華池竭七朝亡若誤投以丹藥禍在反掌急用加減八味丸桑枝煎五味子湯以滋補之

註 按前證若不愼房事虧損眞陰而虛火上炎亦多患此若發熱作渴或口舌生瘡或小便頻數或莖中作痛亦宜用前藥其桑枝補血氣生津液輕身明目補肺腎之良劑也五味子湯乃六一散生脈散之複方滋化源之良劑若腎水既涸虛火上

炎而口燥作渴者須佐以加減八味丸詳見附錄

用藥關鍵

腎虛發熱第五十

李氏曰一癰疽之熱未有不自腎虛而得之者必須五更服加減八味丸

註　按癰疽皆由腎經濕熱虛火上炎中傳惡證若非加減八味丸滋腎水以制心火補中益氣以生化源欲望其生難矣啓元子曰大寒而甚熱之不熱是無火也當助其心大熱而甚寒之不寒是無水也當益其腎夫寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責水之少竊謂無火者當用八味丸以益其心無水者當用六味丸以滋其腎

將安當補第五十一

李氏云疽疾將安每日當服十全大補湯以補氣血宜與排膿內補十宣散相間服

註　按前云潰瘍屬氣血俱虛固在所當補若患腫瘍而氣血虛弱者尤宜預補否則雖潰而不斂矣

凡大病之後氣血未復多致再發若不調補必變爲他證而危或誤以爲瘡毒復發反行攻伐速其不起深可爲戒也詳見附錄用藥關鍵

服藥捷徑第五十二

李氏云凡患瘡疽而腎脈虛者急服補藥尚恐有誤如鹿茸附子之藥是猶抱薪救火反益其勢而平補之藥亦難奏功有一貴人苦疽諸藥無效愚謂服山藥丸於五更初物欲未接之際腎門未開之時如法服三日脈證平復若腎經沉寒痼冷鹿茸附子之藥斯可用矣

註　按前方誠有囘生之功治法見前論

調節飲食當平胃氣第五十三

論曰素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味大凡瘡疽當調脾胃蓋脾爲倉廩之官胃爲水穀之海主養四旁須進飲食以生氣血宜用茯苓開胃散人參內補散內補十宣散

註　按人參順氣散因脾肺腎氣盛壅遏宜用此以疎泄之若氣虛壅滯必用益氣養榮湯以調補之

今之患者多因氣血受傷當隨證而施治若胃氣鬱滯宜用茯苓開胃湯若胃氣虛弱用四君子湯若胃氣下陷用補中益氣湯若脾氣虛弱用六君子湯若脾氣鬱結用歸脾湯

李氏曰胃氣弱不進飲食合服嘉禾散每五兩加人參丁香沉香白豆蔻各二錢有一貴人苦疽用藥失序脾虛不食余欲用嘉禾散或云內有丁沉香乃別服藥不應仍用前散飲食頓進

成漏脈例第五十四

經云陷脈爲漏留連肉腠蓋脈得寒則下陷凝滯肌肉故曰留連肉腠是爲冷漏須用陷脈散桂附丸溫補之

註 按瘡瘍爲漏皆因元氣不足營氣不從逆於肉裏或寒氣相搏稽留血脈腐潰既久陽氣虛寒外邪乘虛下陷卽成是患若治其初患當內用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝蔥熨接引陽氣使自消散若久而不能成膿亦用前二法補助以速之若膿既成而不潰用艾於當頭灸數炷以出之却服

十全大補湯患者又當愼起居節飲食庶幾收斂若用冷針開刺久而內出青膿外色黑黯或誤用生肌散速其收斂反助其邪必成敗證

基針法第五十五

洪丞相治癰疽初作先以筆管一箇入螞基一條以管口對瘡頭使基吮瘡膿血其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴基必死矣累試累效若血不止以藕節上泥塗之若瘡頭未明以井邊泥塗上先乾處即是

註 按癰疽既成毒血凝聚於外可用此法吮去固善但能治其末耳又當審其邪在表裏併元氣虛實而藥之斯內外合一而爲萬全之治也

槩括關鍵處治

一瘡瘍用藥當審其經絡受證標本虛實以治之不可泥於熱毒內攻專用寒涼尅伐之劑虧損脾胃氣血多致有誤若腫高焮痛者邪氣實也先用神仙活命飲後用托裏消毒散漫腫微痛者眞氣虛也用托裏散如不應加薑桂若不作膿不腐潰陽氣虛也用

四君子加黃芪肉桂若膿既出而反痛氣血虛也用八珍散不生肌不收斂脾氣虛也四君子加芍藥木香又當舍時從證如腫痛煩躁發熱飲冷便祕脈洪數實是爲五實雖在嚴寒必用大苦寒之劑瀉其陽以救其陰若脈細皮寒瀉利腸鳴不食嘔吐手足逆冷是爲五虛雖在盛暑必用大辛熱之劑散其陰以回其陽若執其常法則誤矣

一瘡瘍作嘔如熱盛焮痛邪氣實也用仙方活命飲解之若因作膿焮痛胃氣虛也用托裏消毒散主之膿熟脹痛氣血虛也用托裏散或針以泄之焮痛便祕熱蘊於內也用內疎黃連湯導之寒藥傷胃者托裏建中湯食少胃寒者托裏益中湯中虛寒淫者托裏溫中湯肝木乘脾土者托裏益清湯胃脘停痰者托裏清中湯脾虛自病者托裏益黃散鬱結傷脾者托裏越鞠湯

一瘡瘍用圍藥如腫痛熱渴證屬純陽宜內服濟陰丹外敷抑陽散若似腫非腫似痛不痛似潰不潰屬半陰半陽宜內服沖和湯外敷陰陽散若微腫微痛

或色黯不痛或堅硬不潰證屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散

一瘡瘍作痛若大便祕結者用內疎黃連湯熱毒熾盛者仙方活命飲瘀血凝滯者乳香定痛散作膿而痛者托裏消毒散膿脹而痛者針之膿潰而痛者補之氣虛而痛者四君歸芪血虛而痛者四物參芪腎虛而痛者六味地黃丸口乾作渴或小便頻數加減八味丸

一瘡瘍氣脫陷或誤服尅伐或膿血大泄或吐瀉勞役或誤行房事若發熱煩熱頭痛頭運便血目赤煩喘自汗盜汗氣短唾痰體倦熱渴意欲飲水投水身熱惡寒憎寒惡衣揚手擲足汗出如水腰背反張呻吟不絕脈浮洪大此無根虛火假熱之證若畏寒頭痛欬逆嘔吐耳聵目矇小便自遺或時淋瀝瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖短縮冷汗時出齒浮痛肢體麻痺或厥冷身痛咬舌嚙脣舌本強硬餩逆喘促脈微沉細此危殆之證但見一二急用大劑參附湯補之多得復生

一瘡瘍潰後發熱煩躁若發熱無寐血虛也聖愈湯自汗不止氣虛也四君子加黃芪五味子發熱煩躁肉瞤筋惕氣血虛也八珍湯大渴面赤脈洪大而浮陰虛發熱也當歸補血湯肢體微熱煩躁面赤脈沉微陰盛發躁也四君薑附

一瘡瘍大便祕結若作渴飲冷其脈洪數而有力者屬實火宜用內疎黃連湯若口乾飲湯其脈浮大而無力者屬氣虛宜用加味八珍湯若飲食雖多肚腹不脹此內火銷鑠切不可通若腹痞脹而不通者乃因直腸乾涸以猪膽汁導之若誤行疏導復傷元氣則不能斂潰

一瘡瘍大便泄瀉若因寒凉傷脾六君加砂仁脾氣虛弱六君煎送二神丸脾虛下陷補中益氣送二神丸命門火衰用八味丸料煎送四神丸腎虛不固薑附湯加茱萸五味脾腎虛寒參附湯送四神丸脈沉而細飲食不下用薑附湯多有復生者

一瘡瘍小便頻數或莖中澀痛者乃腎經陽氣虧損陰無以化之惡證也用加減八味丸以補陰足脛逆

冷者用八味丸以補陽小便頻而黃者四物加參朮麥門五味以滋肺腎小便短而黃者補中益氣加山藥麥門五味以補腎若熱結膀胱而不利者五淋散以清熱脾肺氣燥而不化者黃芩清肺飲以滋陰若膀胱陰虛陽無以生者宜滋腎丸膀胱陽虛陰無以化者宜腎氣丸若老人陰痿精內敗者用加減八味丸加車前牛膝如不應加附子若大小便牽痛愈痛則愈便愈便則愈痛以前藥加附子多有生者苟用黃蘗知母淡滲之劑既瀉眞陽復損眞陰速其危矣

一瘡瘍作渴焮痛發熱便利調和者上焦熱也用竹葉石膏湯腫痛發熱大便祕澀者內臟熱也用四順清涼飲焮腫痛盛者熱毒蘊結也用仙方活命飲漫腫微痛者氣血虛壅也用補中益氣湯若因胃火消爍而津液短少者用竹葉黃芪湯若因胃氣虛而不能生津液者用補中益氣湯若因胃氣傷而內亡津液者用七味白朮散若因腎水乾涸作渴或口舌乾燥者用加減八味丸或先口乾作渴小便頻數而後患疽或疽愈後作渴飲水或舌黃乾硬小便數而疽

生者尤其惡也苟能逆知其因預服加減八味丸補中益氣湯以滋化源可免是患

一瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而錯經妄行也若因肝熱而血妄行者四物加炒梔丹皮芩朮肝虛不能藏血者六味地黃丸心虛不能主血者四物加炒連丹皮芩朮若脾虛熱不能統血者四君加炒梔丹皮若脾經鬱結者用歸脾湯加五味子若脾肺氣虛者用補中益氣加五味子若氣血俱虛者用十全大補若陰火動者用六味丸加五味子

一瘡瘍用針當辨生熟淺深若小按卽痛者膿淺也大按方痛者膿深也按之而不復起者膿未成也按之而卽起者膿已成也若膿生而卽針則徒泄其氣血而膿反難成若膿熟而不針則腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺則內膿不出外血反泄若瘡淺而針深則內膿雖出良肉反傷其元氣虛弱必先補而後針不論尻神若膿出而反痛或煩躁嘔逆皆由血氣虧損宜急補之不論尻神者蓋因患處已潰故也

一瘡瘍肌肉不生若赤色而不生者血熱也四物湯

加牡丹皮晡熱內熱血虛也四君子加歸地丹皮若膿水清稀氣血俱虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴起居如常胃火也竹葉黃芪湯煩熱作渴日晡熱甚腎虛也用加減八味丸

論多骨疽

多骨疽者由瘡瘍久潰氣血不能營於患處邪氣陷襲久則爛筋腐骨而脫出屬足三陰虧損之證也用補中益氣湯以固根本若陰火發熱者佐以六味丸壯水之主以鎮陽光陽氣虛寒者以八味丸益火之源以消陰翳外以附子餅葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂也夫腎主骨若腎氣虧損其骨漸腫荏苒歲月潰而出骨亦用前法若投以尅伐之劑復傷真氣鮮有不誤者

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十二卷目錄

醫部彙考三百六十二
外科癰疽疔毒門四
李梴醫學入門（癰疽證治　疔瘡證治　紅絲瘡證治　多骨疽證治）
樓英醫學綱目（行年血忌　虛實寒熱宜忌　不可患癰疽者七處　疔瘡）
王肯堂證治準繩（癰疽之源　癰疽之別　脈法　分經絡　諸經向導藥）
（善惡　虛實　內消　內托　敷貼　淋洗）

藝術典第三百八十二卷

醫部彙考三百六十二

外科癰疽疔毒門四

明李梴醫學入門

癰疽證治

癰者壅也爲陽屬六腑毒騰於外其發暴而所患浮淺不傷筋骨疽者沮也爲陰屬五臟毒攻於內其發緩而所患深沉傷筋蝕骨凡年壯氣血勝毒則順年老毒盛氣血則險有內因飲食積毒者經曰膏粱之

變足生大疔榮氣不從逆於肉理榮氣卽胃氣胃和則榮衛順而滋養皮膚膏粱金石厚衣烘被以致蘊熱臟腑濕熱聚下燒爍腎水陰火熾盛八脈沸騰經隧凝滯故水穀精微不能上行陽道反逆聚肉之腠理而成癰有外感風寒濕氣蘊毒者經曰地之濕氣感則害人皮肉又曰諸癰腫筋攣骨痛者此寒氣之腫八風之變也蓋風濕外侵鬱久爲熱自膀胱左遷移熱小腸小腸移熱於膽風性上衝瘡形高邑赤作痛小則爲癤大則爲癰而已非若疽之自裏也有因心氣鬱結饑飽勞役房室過度水竭火炎痰氣凝滯而成所謂相火能爲瘡瘍諸痛痒瘡瘍皆屬心火是也因火有君相瘡分微甚或鬱痛而不甚腫或虛腫而不甚痛雖然病該三因總皆濕熱丹溪云人身血行脈中氣行脈外氣血周流不息惟寒濕搏之則凝滯而行遲火熱搏之則沸騰而行速氣爲邪鬱津液爲痰爲飲積久滲入脈中血爲之濁此陰滯於陽而爲癰血爲邪鬱隧道或溢或結積久溢出脈外氣爲之亂此陽滯於陰而爲疽蓋陽氣無形陰血有質必

濕熱泣血而後發爲癰疽故局方曰癰疽皆熱盛血也又曰二熱相搏熱化爲膿蓋熱非濕則不能腐壞肌肉爲膿譬如夏熱諸物皆不壞爛壞爛者必在交秋濕熱大行之際此理甚明

癰疽有大而愈者有微如豆而死者陽發初起皮薄作熱色赤焮腫疼痛潰後肉色紅活此爲外發更加身健能食發熱便祕脈數有力爲純陽易治陰發初起皮厚不熱色黯微腫硬如牛領之皮不痛陷軟不作膿不潰微開闊破後肉色紫黑此爲內發未潰臟腑已經壞爛更加身倦少食不熱便利脈軟無力爲純陰不治又有半陰半陽似腫非腫似痛非痛似赤非赤似潰非潰脈數無力如陽多陰少用藥托裏變陽者生陰多陽少用藥托亦不起投陰必死就中尤以有熱無熱爲死生妙訣蓋陽證有熱則氣血行而生肌陰證無熱則氣血滯而不斂遇有熱者切不可退熱但宜溫藥清滲些小癤毒無熱亦不妨

癰疽雖止發於一經或兼二經多有挾風挾濕挾痰挾氣挾血挾陰虛等證大槩風氣食三種俱以不換

金正氣散加川芎木香爲主兼風多痒加祛風藥兼氣多痛加調氣藥兼食多發寒熱加消積藥兼濕多腫加滲濕藥又云熱瘡焮痛虛瘡淡白風寒瘡口帶白古方外因四氣單用大黃半生半熟甘草節等分爲末每空心酒下一匙以利爲度內因七情單用遠志爲末酒調二錢澄清服以查敷患處不內外因金石炙煿房勞國老膏一切熱毒槐花酒金石藥毒則堅硬如石不痛宜甘草黑豆煎湯解之虛勞瘦弱榮衛否澀患處重著如負石然因其有骨蒸潮熱也治宜滋補故不可用賫命丹等香燥疎泄之藥亦不可過用降火滯脾之藥惟腎氣丸托裏散甚得其宜且古方謂毒藥衝蒸癰疽極重

近骨者多冷久則化血爲蟲多痒少痛近虛者多熱久則傳氣成漏多痛少痒

腦發屬腎脈足太陽經鬢發手足少陽經眉發手足太陽少陽經頤發髭發足陽明經腮發手陽明經背發中屬督脈餘皆足太陽經腋發手太陽經乳發內陽明外少陽經乳頭足厥陰經腎癰足太陽經外腎

癰足厥陰經腿發外足三陽內足三陰經喉癰臍癰任脈足陽明經穿襠發督衝任三脈跨馬癰囊癰足厥陰經內疽肺癰手太陰經腸癰手太陽陽明經胃脘癰足陽明經若少陽少陰太陰多氣少血厥陰太陽多血少氣肉皆難平惟手足陽明氣血俱多分經用藥則不犯經禁病禁以致妄下妄汗且瘡屬腎經者最重脾肺二經者次之他經者又次之腦乃諸陽所在咽喉飲食所通腎俞命根所係皆至險之地又不可多著艾灸俗拘於人形瘡樣而忽經絡謬哉

毒因外感發者內無便溺阻隔外有六經形證腫痛雖甚飲食如常脈浮數邪在表也宜托裏微汗以表散之如發腦項背分黃連消毒散尻臀分內托羌活湯臂上白芷升麻湯乳脅內托升麻湯兩脅十味中和湯腿外側內托酒煎湯腿內近膝股內托芪柴湯通用敗毒散九味羌活湯辛熱手足太陰經分自汗浮腫流注四肢附子六物湯辛溫發熱十六味流氣飲賽命丹暑月內托復煎散寒月內托十宣散或不換金正氣散丹溪治形實脈浮數冬月背生紅腫及

脾骨不痛者用桂麻各半湯加生附酒蘗苦蔞仁甘草節羌活青皮人參黃芩半夏薑煎服六貼而愈此正內托法也有謂瘡家身痛不可汗汗之則發痓者邪不在表而誤汗也

內傷飲食積毒者腫痛異常外無六經形證內有便溺阻隔口渴煩躁脈沉實爲邪在裏急與寒凉攻裏內踈黃連湯瀉心湯活命飲四順清凉飲輕者清熱消毒飲加紫草或清心散滲之

內積熱毒外又感邪宜發表攻裏五香連翹湯防風通聖散毒盛者解毒湯下神芎丸濕盛者除濕丹

毒因內傷虛損房勞鬱怒而發者形雖腫痛外無六經之形證內無便溺之阻隔知邪在經也不可妄施汗下只宜補形氣調經脈和榮衛或專補脾胃可也鬱怒者十六味流氣飲虛勞者托裏消毒散內托復煎散補中益氣湯古人治癰以寒藥者正治法也治疽以熱藥者從治法也蓋藥性熱則宣行寒則踈泄疽乃有形之物非熱藥從治豈能行之乎此內托內踈正治從治之義也

潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏之法一日不可缺也古方托裏散托裏清中湯托裏定中湯托裏和中湯托裏建中湯托裏抑青湯托裏益黃湯托裏益氣湯選用蓋托裏則氣血壯而脾胃盛膿穢自排毒氣自解死肉自潰新肉自生瘡口自斂若不務補托而誤用寒凉反助邪火膿多臭穢甚則脈洪大渴眞氣虛而死矣丹溪云但見腫痛參之脈證虛弱更與滋補乃可萬全又不必泥氣質素實及參芪滿中滯痰也但初潰時間有熱毒盛者量加消毒清劑如發背搭

肩膜破穿心必死尤宜托裏免致毒陷托裏即護心也若毒氣上攻心神昏悶欲嘔者間服護心散以救之如帶表邪面赤等證勢未甚起者內托復煎散或內托十宣散暫服若無熱毒表邪但見穢氣觸犯虛熱少食不睡者便進人參黃芪湯但見膿多心煩少睡者便進聖愈湯但見脾虧氣弱不能生肌收斂者便進補中益氣湯但見腎虛不能消潰收斂或晡熱作渴者便進八味丸或腎氣丸緊急不及作丸大料煎服預防救危始終妙劑若不務根本而專用敷圍

生肌之藥則斂口太速毒反內攻或旁邊再發一癰者有之或愈後而惡證頓起大命隨去者有之惟務內治而不貴外治者爲高

形傷則痛氣傷則腫或先痛後腫傷乎血先腫後痛傷乎氣腫痛並攻氣血俱傷皆因臟腑不和而非外治能調古法隔蒜灸法豆豉餅惟外傷成瘡者不宜自內發者痛則灸至不痛不痛則灸至痛時方住早覺早灸爲佳一日二日十灸十活三日四日十灸七活五日六日十灸四活過七日則不可灸矣其餘點割敷透間有毒盛者量用之則可

癰疽毒氣已成宜托裏以速其膿膿成者當驗其生熟淺深而針之若腫高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋脈肉色不變者附於骨也按之熱者有膿不熱者無膿按之便痛者膿淺大按方痛者膿深按之陷而不起者膿未成按之而復起者膿已成按之都軟者無膿不痛者血瘤痛者氣瘤按之一邊軟者有膿若膿生而用針氣血旣泄膿反難成若膿熟而不針腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿不出

外血反泄瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷元氣虛者必先補而後針其膿諸證自退若瘡毒熾盛中有肉黯者宜內壯脾胃外塗單巴豆膏令其黯處漸低赤處漸高六七日間赤黯之處自有裂紋如刀劃狀黯肉漸潰當用鈹針利剪徐徐引去若膿出肉腐腫痛仍作必內有筋間隔宜再引之急補脾胃不痛者純用補藥庶可收斂若妄施針刀傷肉出血斷之不止者立危其鈹針用馬銜鐵爲之

人身氣血遇溫則散遇寒則凝槩敷寒涼閉塞腠理氣凝血瘀舊肉不潰新肉不生則毒反內攻難以潰斂甚則不起必內分陰陽用藥外分陰陽敷圍內外夾攻藥氣相通爲妙純陽證內服內疎黃連湯清熱消毒飲之類外敷抑陽散半陰半陽證內服托裏消毒散外敷陰陽散純陰證內服補中益氣湯加薑附入酒煎外敷抑陰散

點瘀爐灰膏以去惡肉藥線三品錠子以透膿管皆欲敗腐盡除不至侵蝕筋骨非得已而用之也

癰疽不可不痛不可大痛未潰前痛者爲熱毒便祕

宜內踈黃連湯解毒湯作膿痛者排之膿脹痛者針之已潰膿出反痛者虛也氣虛四君子湯加歸芪血虛四物湯加參芪氣血俱虛托裏益氣湯脾虛者托裏和中湯腎虛者腎氣丸因登厠犯穢氣觸者藥中加乳香芷芎之類和之風寒逼者加防風桂枝之類溫散之燥者潤之濕者導之果係瘀血惡肉凝滯者方可乳香止痛散和之

瘡口不斂由於肌肉不生肌肉不生由於腐肉不去腐肉不去由於脾胃不壯氣血不旺必以補托爲主而佐以行經活血之藥則肌肉受毒者自生死者自潰又何待於點割也大要氣虛體倦食少者補中益氣湯血虛晡熱內熱者四君子湯加歸地牡丹皮膿水清稀者氣血俱虛十全大補湯或不痛或大痛或不赤或內膿不潰或外肉不腐者氣血虛敗桑枝灸法十全大補湯加薑桂壯其陽氣則四畔即消瘡頭即腐若脾胃虛弱漫腫不赤者六君子湯倍白朮若初起腫痛或因尅伐及入房以致色黯而不痛者乃陽脫變陰急用古參附湯以救之間有血分虛熱者

瘡口肉色必赤四物湯加山梔連翹氣分虛熱煩渴者竹葉黃芪湯要知瘡口難斂或漸大漸開出血者危俗皆以腫痕所至爲暈非眞暈也暈生於瘡口之畔狀如紅筋二暈三暈尚可四暈五暈者死

洗藥疎通氣血膿血焮聚之時所賴朝夕煖酢蘸洗敗肉或洗毒散肉汁湯風冷瘡口白者乾艾煎湯亦好

膏藥多熱輕小瘡癤貼之卽消發表不遠熱之意也若大毒初起用之迷塞凝滯爲禍不小惟潰後只用白蠟膏太乙膏或水粉膏外護不致破傷風寒

婦人調血開鬱爲主值經閉及潰後月水又發所患堅硬不破不腫不疼者凶小兒主生胎毒或有飲食積熱者藥稍宜清凉如素稟受體薄及稍長而久病者仍以補托氣血脾胃爲主治之

脈證俱熱者未潰先內消解毒已潰後托裏消毒脈證俱虛者未潰前托裏消毒已潰後托裏補中治其瘡而諸證自退瘡爲本病爲標若病急而元氣實暫治其標病緩而元氣虛只治其本心通諸竅臟腑所

包者一膜耳若憂驚入心膜破必死藥中常加茯神遠志爲妙

五善動息自寧飲食知味一也便利調匀二也膿潰腫消水鮮不臭三也神彩精明語音清朗四也體氣和平五也此屬腑證病微邪淺若能慎節勿藥自愈七惡乃五臟虧損之證外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡而遂棄不治大抵元氣虛弱或膿水出多氣血虧損或汗下失宜榮衛消爍或寒凉尅伐氣血不足或峻厲猛劑胃氣受傷以致眞氣虛而邪氣實矣

大渴發熱或泄瀉淋閉者邪火內淫一惡也

凡瘡腫發熱潮熱煩躁或失血過多或潰膿大泄或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所附浮於肌表而非火也若發熱不寢虛熱也聖愈湯兼汗不止氣虛也單人參湯發熱煩躁肉瞤筋惕氣血俱虛也八物湯大渴面赤脈洪大而虛陽虛發熱也古歸芪湯微熱煩躁面赤脈沉而微陰盛發躁也四君子湯加薑附

凡渴不可專泥於火若焮痛發熱便利調和者竹葉石膏湯腫痛發熱大便祕澀者四順清凉飲焮痛熾盛者活命飲膿水多者聖愈湯胃傷內亡津液者錢氏白朮散腎水乾涸者八味丸有先作渴小便頻數而後患疽者或愈後作渴或舌黃乾硬小便頻數而後患疽者尤其惡也宜預服八味丸補中益氣湯以滋化源可免是患葢癰疽未有不因腎虛而作切忌知母黃蘗損陽則陰氣無由而生

泄瀉因寒凉傷脾者六君子湯加砂仁或托裏建中湯托裏溫中湯脾虛下陷者補中益氣湯吞二神丸命門火衰者八味丸料煎吞四神丸腎虛不固者古薑附湯加吳茱五味子大孔痛者附子理中湯四逆湯凡癰疽嘔瀉腎脈虛者死

便祕因熱毒入臟嘔啘心逆發熱腫硬祕結固宜通之又有伏熱陽氣怫鬱面赤便祕者爲邪火在經宜汗以發之潰後氣虛血涸便祕者十全大補湯或因入房傷腎便祕者加薑附以回陽氣則大便自潤凡便祕能食而肚腹不脹者切不可下若腹痞脹而祕

者猪膽法用猪膽一枚剪去頭入鹽酢少許以鵝管插入膽中灌穀道內須臾自通

小便淋澀頻數短少或莖中澀痛皆腎虛惡證

膿血既泄腫痛尤甚膿色臭敗者胃虛火盛二惡也人參黃芪湯或十全大補湯加麥門冬五味子

目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳人上視者肝腎陰虛而目系急三惡也腎氣丸料或八物湯俱加炒山梔麥門冬五味子

喘粗短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四惡也六君子湯

加薑棗或補中益氣湯加麥門冬五味子心火尅肺金人參平肺散陰火傷肺腎氣丸料加五味子煎服

肩背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯十全大補湯俱加山藥山茱萸五味子

不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁甚則加附子挾痰者托裏清中湯挾火者托裏益黃湯

瘰癧時作嘔熱毒攻心潰時作嘔陰證潰後作嘔脾虛如熱盛焮痛活命飲護心散作膿焮痛托裏消毒

散膿熟脹痛托裏散或針以泄之焮痛便祕者內踈黃連湯寒凉傷胃者六君子湯加乾薑木香木乘土位加芍藥柴胡胃脘停痰加桔梗脾虛自病或水侮土加益智仁砂仁鬱結傷脾加川芎山梔蒼朮香附濕氣侵胃倍白朮白朮生肌歛口妙劑又有登厠觸穢作嘔者仍宜補胃

脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加薑棗或六君子湯加炮薑甚則加附子或十全大補湯加炮薑

陽虛皆因誤服寒凉或潰後勞役或吐瀉之後或誤入房夢遺或外邪所乘初則虛火假證仍發熱頭疼良久寒戰咬牙腹痛雷鳴泄瀉飢逆自汗盜汗陽虛寒氣所乘之證八惡也急用托裏溫中湯後用六君子湯加附子或加薑桂甚者用大劑參芪歸朮倍加薑附以手足溫爲度

潰後發熱惡寒作渴怔忡睡臥不寧陽衰陰盛發躁脈洪大按之微細或無此陽虛極驀然牙關緊急腰背反張變爲痓痙陰病或無汗惡寒或有汗不惡寒九惡也俱宜八味丸料加參芪歸朮大劑煎服

原稟瘦怯或房慾竭精或瘡出膿多或誤汗下以致日晡潮熱口乾作渴夜寐不著瘡出紫血四物湯托裏益氣湯腎氣丸主之

便汚黑者不治便血瘀滯者犀角地黃湯救之

瘡瘍時或愈後口鼻吐衄牙宣齦露皆因瘡瘍出血虛火動而錯經妄行當求其經審其因而治之肝熱則血妄行四物湯加山梔牡丹皮黃芩白朮肝虛則不能藏血腎氣丸心火不能生血四物湯加炒黃連牡丹皮芩朮脾虛熱不能統血四君子湯加炒山梔牡丹皮脾經鬱結者歸脾湯加五味子脾肺氣虛者補中益氣湯加五味子氣血俱虛者十全大補湯陰火動者腎氣丸加五味子大凡失血過多而見煩熱發渴等證勿論其脈急用單人參湯補之經云血生於氣苟非甘溫參芪歸朮之類以生心肝之血決不能愈發熱脈大者死

正傳以善爲順以惡爲逆瘡瘍仍忌倒陷又增爲九逆殊爲有理

非癰非疽非瘡非癬狀如惡瘡或瘥或劇名曰無名

腫毒隨其見證在表在裏在經用藥外以槐枝煎洗淨後以赤小豆吳萸白膠香黃連黃蘗貝母硫黃糯米黃丹輕粉爲末麻油調搽一切惡瘡人所不識者皆同

疔瘡證治

經曰膏粱之變足生大疔恣食辛辣厚味炙煿腥葷及誤食自死禽獸蘊毒於中而即發者有之或卒遇大風大霧大暑大寒天地暴沴之氣襲注經絡觸動其毒而發者或因感死畜蛇蟲毒氣而發者其死尤速初發或因衣物觸著而疼痛忽生或因發疹抓破而成疱僅一小瘡殺人一二日間比之癰疽尤毒疔發無定處在肩背腰猶緩在頭面耳鼻口目舌根唇上及手足骨節間者最急如生兩足多有紅絲至臍生兩手多有紅絲至心生唇面口內多有紅絲入喉者俱難治須急看以針挑撥其絲出血以泄其毒氣方可保生

瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起寸餘隨變焦黑未幾腫大而光轉爲濕爛深孔透肌如大針穿

之狀其形初起大小不一或如水泡如吳萸如豆如石榴子其色有五內經分應五臟各有所屬部位局方分別一十三種疔外又有魚臍疔瘡頭黑深形如魚臍破之黃水滲出四畔浮漿其毒尤甚用絲瓜葉連鬚葱韭葉擣爛以酒和服其查貼腋下如病在左手貼左腋下在左足貼左跨下右手足同在中貼心臍並用布縛住候肉下紅絲處皆白則安有潮熱者亦宜却令人抱住恐其顫倒則難治或用蛇退燒灰雞子清調敷又一種水疔用黃荊葉十四片獨頭蒜三箇百草霜二錢擂酒服取汗大效諸證惟嘔吐最危

治分虛實實者初服賽命丹三丸以葱酒發汗表證多者追疔湯或敗毒散加蟬蛻殭蠶金銀花裏證多者活命飲五聖湯便利滿澀者黃連消毒散此散初起服之內消欲作膿者托裏消毒散虛者初服保生錠子以解毒或蟾肝丸有表邪不敢汗者補中益氣湯加防風白芷裏證不敢下者蜂蛇散腫痛欲作膿者托裏散內托十宣散不能潰者大料參芪歸术補

之或補中益氣湯合生脈散以防毒陷

豁心氣者疔毒入心則神昏口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危證也實者用萬病解毒丹以黃連當歸煎湯化下虛者用古芎歸湯加茯苓茯神遠志蓮肉清之毒上攻心嘔者護心散有因服賽命丹吐者亦宜此解之恍惚悶亂坐臥不寧煩渴身痛便祕者漏蘆飲子煩躁作渴者竹葉黃芪湯

外治輕者單蟾酥爲末以白麪和黃丹搜作丸如麥米大用針挑破頂頭以一粒納入效重者賽金丹危篤者提釘錠子

凡暴死者多是疔毒急用燈照遍身若有小瘡宜急灸之并服賽命丹亦有復醒者如偏僻之處藥難尋覓唯灸有回生之功若專疎利表散者危

紅絲瘡證治

因喜怒不常血氣逆行而生於手足間有黃疱其中忽紫黑色即有一條紅絲迤邐直上而生若至心腹則使人昏亂不收或有生兩三條紅絲者急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血以膏藥貼或嚼萍

草根敷之立愈

多骨疽證治

此證由瘡久潰氣血不能榮於患處久則腐爛有骨脫出宜補脾胃壯元氣十全大補湯腎氣丸主之外以附子餅灸或葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂若腎氣虧損其骨漸腫荏苒歲月潰膿出骨亦當用葱熨法若投以剋伐則正氣益虛邪氣益甚鮮有不誤

有上齶腫硬年餘方潰半載未愈內熱體倦作渴用補中益氣湯腎氣丸元氣漸復出骨一塊仍服前藥而愈有足背腫落一骨者有手背腫落一骨者

樓英醫學綱目

行年血忌

十歲二十二歲三十三歲七十三歲已上四人百神在上部不可患癰疽發背見血者死申子辰年血忌餘年不妨男女同

二十五歲三十一歲六十八歲七十四歲以上四人百神在額不可患瘡腫見血者死

十八歲二十四歲三十五歲四十五歲五十六歲六十七歲七十二歲八十九歲以上八人百神在兩肩隅不宜患癰疽瘡腫見血者死

十二歲二十七歲三十六歲五十九歲六十六歲九十七歲以上六人百神在中部不可患癰疽發背見血者死巳酉丑年血忌餘年不妨男女同

三十二歲四十二歲五十五歲六十一歲以上四人百神在肩背不可患癰疽見血者死

十九歲二十六歲四十九歲五十六歲五十七歲六十二歲八十歲九十一歲以上八人百神在肝肺俞不宜患癰腫見血者死

十一歲二十三歲二十四歲五十八歲九十六歲以上五人百神在脅肋不可患癰疽見血者死

十四歲二十九歲三十九歲四十六歲五十二歲六十歲六十九歲七十六歲八十一歲八十八歲九十五歲以上十一人百神在下部不可患瘡漏疾見血者死下部尤忌見勞瘵人不宜下部出膿難瘥

十一歲二十五歲二十七歲六十三歲七十五歲以上

五人百神在尻尾間不可患癰疽見血者死十三歲二十八歲五十二歲七十二歲九十三歲以上五人百神在足下不可患癰疽見血者死二十一歲三十八歲四十一歲五十歲以上四人百神在遍身不可患瘡腫見血者不治

虛實寒熱宜忌

凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺以上者其赤腫焮熱者卽用緊急收赤腫藥圍定不令引開中心卽用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後愼不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便卽是順疾也最宜節愼飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑卽止矣

不可患癰疽者七處

眼後虛處頤接骨處陰器根上毛間胯與尻骨接處

耳門前後車骨接處諸因小腹風水所成癰疽及頷骨下近耳後虛處鼻骨中並能害人但以諸法療之或有得瘥惟眼後虛處最險

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃疱中或紫黑必先痒後痛先寒後熱也

疔瘡者必發於手足之間生黃疱其中或紫黑色有一條如紅線直上倉卒之際急宜以針於紅線所至處刺出毒血然後以蟬酥乳香膏等藥於正瘡上塗之針時以病者知痛出血爲好否則紅線入腹攻心必致危困矣一法於所屬經絡各瀉之

王肯堂證治準繩

癰疽之源

方書敘癰疽之源有五一天行時氣二七情內鬱三體虛外感四身熱搏於風冷五食炙煿飲法酒服丹石等熱毒總之不出於三因也外因者運氣癰疽有四一火熱助心爲瘡經云少陰所至爲瘡疹又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從甚則瘡瘍又云少陰司

天之政初之氣寒乃始陽氣欝炎暑將起中外瘡瘍又云少陽所至爲瘡瘍又云少陽司天之政風熱參布太陰橫流寒乃時至民病熱中外發瘡瘍初之氣候乃太溫其病膚腠中瘡二之氣火反欝其病熱欝於上瘡發於中三之氣炎暑至民病膿瘡又云太陽司天之政初之氣候乃大溫肌肉瘡瘍此皆常化病之淺也又云少陰司天熱淫所勝甚則瘡瘍又云少陰司天客勝則瘡瘍又云少陰之復病疿疹瘡瘍癰疽痤痔又云火太過曰赫曦飄驟瘡疽血流又云火鬱之發民病瘡瘍癰腫此癰疽爲病之甚也二曰寒邪傷心爲瘡瘍經云太陽司天之政三之氣寒氣行民病寒反熱中癰疽注下又云太陽司天寒淫所勝血變於中發爲癰瘍病本於心又云陽明司天之政四之氣寒雨降民病癰腫瘡瘍是也三曰燥邪傷肝爲瘡瘍經云木不及曰委和上商與正商同其病支發癰腫瘡瘍邪傷肝也又云陽明司天燥淫所勝民病瘡瘍痤癰病本於肝是也四曰濕邪瘡瘍經云太陰司天濕氣變物甚則身後癰又云太陰之勝火氣

內鬱瘡瘍於中流散於外是也此四條所謂天行時氣者也素問脈要精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此皆安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也靈樞經癰疽篇云血脈榮衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化爲熱熱勝則腐肉肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏熏於五臟臟傷故死矣又生氣通天論云勞汗當風寒薄爲皶鬱乃痤又云陽氣者開闔不得寒氣從之乃生大僂榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是亦寒邪從勞汗之隙及陽氣開闔不得其理之隙久客之爲癰腫也所謂體虛外感及身熱搏於風冷者也治法則精要十宣散五香湯潔古蒼术復煎散等發表之劑是也內因者陳無擇云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿於經絡與血俱濇而不行壅結爲癰疽不言熱之所作而後成癰

者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也治之以遠志酒獨勝散兼以五志相勝之理如怒勝思之類是也不內外因者經所謂膏粱之變足生大疔受如持虛又東方之域委鹽之地其民食委嗜鹹安其處美其食委熱中鹹勝血故其民黑色踈理其病爲癰疽又有服丹石法酒而致者亦膏粱之類是也李東垣曰膏粱之變亦是滋味過度榮氣不從逆於肉理榮氣者胃氣也飲食入胃先輸於脾而朝於肺肺朝百脈次及皮毛先行陽道下歸五臟六腑而氣口成寸矣今富貴之人不知其節法酒肥羊雜以厚味積久太過其氣味俱厚之物乃陽中之陽不能走空竅而先行陽道乃反行陰道則濕氣大勝子令母實火乃大旺濕熱既盛必來尅腎若不愼房事損其眞水水乏則從濕氣之化而上行其瘡多出背上及腦此爲大疔之最重者若毒氣出肺或脾胃之部分毒之次也若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故經言膏粱之變足生大疔受如持虛器以受物則無不受矣治大疔之法必當瀉其榮氣以標

本言之先受病爲本非苦寒之劑爲主爲君不能除其苦楚疼痛也如東垣治元好問丹溪治老婦腦疽皆用好酒故以三黃大黃酒製治之又如排膿散當歸散之類是也又有盡力房室精虛氣積之所致者亦屬不內外因當以補虛內托爲主亦忌用五香之藥耗眞陰而助邪熱治之之藥如內固黃芪湯神效托裏散之類經云五臟菀熱癰發六腑又云六腑不和留結爲癰又云諸痛痒瘡皆屬於心肺乘肝則爲癰腎移寒於肝癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣此皆臟腑之變亦屬內因者也東垣曰生氣通天論云榮氣不從逆於肉理乃生癰腫又云膏粱之變足生大疔受如持虛陰陽應象論云地之濕氣感則害人皮肉筋脈是言濕氣外傷則榮氣不行營衛者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也榮氣爲本本逆不行爲濕氣所壞而爲瘡瘍也膏粱之變亦是言厚滋味過度而使榮氣逆行凝於經絡爲瘡瘍也此邪不在表亦不在裏唯在其經中道病也已上內經所說俱言因營氣逆而作也徧看諸瘡瘍論中多言

二熱相搏熱化爲膿者有只言熱化爲膿者有言濕氣生瘡寒化爲熱而爲膿者此皆瘡疽之源也宜於所見部分用引經藥幷兼見證中分陰證陽證先瀉營氣是其本本逆助火濕熱相合敗壞肌肉而爲膿血者此治次也宜遠取諸物以比之一歲之中大熱無過夏當是時諸物皆不壞爛壞爛者交秋濕令大行之際也近取諸身熱病在身止顯熱而不敗壞肌肉此理明矣標本不得邪氣不服言一而知百者可以爲上工矣

癰疽之別

靈樞經云榮衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷骨髓不爲焦枯五臟不爲傷故命曰癰熱氣淳盛下陷肌肉筋髓枯內連五臟血氣竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其候也鬼遺方云癰之痛只在皮膚之上其發如火焚茅初如黍米大三兩日如掌面大

五七日如椀面大卽易治如腫冷發渴發逆治之難愈疽發或如小癤觸則徹心痛四邊微起如橘皮其色紅赤不全變膿水不甚出至七八日疼悶喘急不止若始發腫高五七日忽平陷者此內攻之候也又云癰疽有三等毒氣浮淺屬腑毒氣沉深屬臟毒氣猛烈而行經絡或淺或深而定五臟六腑皆受其毒難爲調理唯宜急切於癰發諸處不問虛實高腫起盛光澤疼痛只在皮膚之上熱極脹滿或有癢疼別無惡候初用溫藥平氣次用排膿發穴

治癰所謂平氣者乃犀角飲之類其方用犀角連翹漏蘆甘草當歸肉桂皆發表之藥也所謂發穴者乃棘針之類用皂角刺爲君甘草川芎乳香爲佐使亦托裏之藥也然不若潔古東垣諸方發表托裏爲穩當

疽發諸處不拘大小惟起在背廣一尺二尺三尺皮厚而紫黑高腫不常內疼如錐刺攻擊滿悶應四肢重疼前心亦痛餘處發猶可唯虛處及近筋骨處若膿毒未潰卽傷爛筋骨肉損爲疽者屬五臟毒氣深

沉多氣伏硬堅實而不宜緩慢治之須內實五臟外透皮膚令軟勻和卽膿透宜用內托實臟氣之藥排膿勻氣乃可不比癰之毒氣浮淺也毋作一類治之凡一切腫瘡始覺患起高腫五七日忽平陷者此是內攻之候也急以內托散及內補湯藥補塡臟腑令實最怕透膜膜穿十無一生矣婁全善云癰之邪淺其稽留壅遏獨在經脈之中而專攻於外故初發時自表便發熱患處便如椀如盆高腫而痛甚者縱欲下陷緣正氣內固不肯受故或便祕或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不傷也疽之邪深其稽留壅遏內連五臟而不專攻於外故身體或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶氣脫眼黑眼小十指腫黑如墨多死也治之之法癰之初發當以潔古法爲主表者散之裏者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必消膿已成者速潰也疽之初發當以鬼遺方爲主補塡臟腑令實勿令下陷之邪蔓延外以火灸引邪透出使有穴歸著而不亂則可轉死回生變凶爲吉今世外科不分癰疽一例宜熱拔毒外以五香耗

其氣內以大黃竭其血終不能自悟其藥之非惜哉

集驗云癰疽之名雖有二十餘證而其要有二陰陽而已發於陽者爲癰爲熱爲實發於陰者爲疽爲冷爲虛故陽發則皮薄色赤腫高多有椒眼數十而痛陰發則皮厚色淡腫硬狀如牛頸之皮而不痛又有陽中之陰似熱而非熱雖腫而實虛若赤而不燥欲痛而無膿既浮而復消外盛而內腐陰中之陽似冷而非冷不腫而實赤微而燥有膿而痛外雖不盛而內實煩悶陽中之陰其人多肥肉緊而內虛陰中之陽其人多瘦肉緩而內實而又有陽變而爲陰者草醫涼劑之過也陰變而爲陽者大方熱藥之驟也然陽變陰者其證多猶可返於陽故多生陰變爲陽者其證少不能復爲陰矣故多死然間有生者此醫偶合於法百中得一耳觀此則癰疽但有陰陽深淺內外虛實之分而無大小之別精要乃謂二寸至五寸爲癰五寸至一尺爲疽者謬也

脈法

沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪深在裏宜先疎通

以絕其源

浮大數焮腫在外當先托裏恐邪入內

脈不沉不浮內外證無知其在經當和榮衛

脈數身無熱內有癰膿

脈數應當發熱而反惡寒若有痛處當發癰若數脈不時見當生惡瘡

浮　腫瘍爲虛爲風潰瘍爲虛宜補

洪　腫瘍爲虛爲熱盛宜宣熱拔毒年壯形實宜下潰瘍爲邪氣盛服藥久不退者難治

滑　腫瘍爲熱潰瘍爲熱爲虛爲邪氣未退

數　腫瘍爲病進爲熱數而洪者欲膿潰瘍爲難愈數甚者難治

散　腫瘍爲氣不收斂潰瘍爲痛未退洪滑大散難治

芤　腫瘍爲血虛潰瘍爲虛爲脈病相應

長　腫瘍宜消退之法潰瘍爲易愈謂長則氣治也

牢　腫瘍爲邪盛爲欲膿潰瘍爲邪氣不退

實　腫瘍爲邪氣太盛潰瘍爲邪不退爲實緩豁大

者爲虛

弦　腫瘍爲痛爲欲膿弦洪相摶外緊內熱爲疽發也潰瘍爲血虛爲痛

緊　腫瘍浮而緊發熱惡寒或有痛處是爲癰疽潰瘍主氣血沉濇爲痛爲有外寒

濇　腫瘍爲氣實爲氣滯潰瘍爲血虛爲病脈相應

短　腫瘍爲元氣不足潰瘍爲大虛宜補

微　腫瘍爲虛服藥漸充者佳潰瘍若微而勻者爲虛爲病脈相應

遲　腫瘍爲寒爲虛尺遲爲血少潰瘍爲虛爲氣血不能滋榮於瘡爲有外寒

緩　腫瘍爲可治大而緩爲虛潰瘍緩而澀者愈以其病脈相應及胃氣充也

沉　腫瘍爲邪氣深潰瘍爲遺毒在內寸沉爲胷有痰

伏　腫瘍爲陰中伏陽邪潰瘍爲陽伏陰中爲內蝕爲流注浸淫難治

虛　腫瘍便宜補而內托潰瘍膿既泄宜大補氣血

弱　腫瘍爲元氣不足宜內補托裏潰瘍爲病脈相應宜補

結　腫瘍爲邪氣結潰瘍漸勻則愈不調則危

促　腫瘍爲熱爲病進潰瘍爲熱不減漸進則死漸退卽生

代　腫瘍氣血敗壞元氣損傷潰瘍爲元氣竭絕

分經絡

人身之有經絡猶地理之有界分治病不知經絡猶捕賊不知界分其能無誅伐無過之咎乎況手足十二經絡有血氣多少之分如手少陽三焦少陰腎太陰脾多氣少血手厥陰心包絡太陽小腸足太陽膀胱多血少氣手陽明大腸足陽明胃多氣多血此其大較也多血少氣者易愈多氣少血者難療氣多之經可行其氣血多之經可破其血不可執一也

頭部　巔頂足太陽厥陰督脈　頭角直耳上中是少陽　中行前直鼻上巔後直鬚中上巔督脈　第二行足太陽一寸五分各開兩旁爲頭第三行　第三行足少陽

面部　頞足少陽陽明　鼻手陽明太陽足陽明督脈　人中督脈手足陽明　脣足陽明　脣內足厥陰　承漿足陽明任脈　上齒足陽明　下齒手陽明　舌足太陰少陰　目內眥手足陽明手足太陽　目銳眥手太陽手足少陽　眉至額直鼻而上督脈直目內眥而上足太陽直目瞳子而上足少陽直銳眥而上手足少陽　頰直目內眥而下足陽明直目瞳子而下足陽明　頰車足少陽陽明　耳手足少陽手太陽　目系手少陰足太陽

頸項部　項中間督脈　拔項大筋中足太陽　當完骨下手少陽項大筋之前耳之後也　當耳下足少陽　當曲頰下手太陽　曲頰前一寸手陽明　挾喉兩旁動脈足太陽陽明　缺盆中任脈　咽手太陰少陰足太陰　喉嚨足少陰陽明　喉嚨後足厥陰

肩部　前廉手陽明　後廉手太陽　上廉手足少陽

背部　中行督脈　第二行足太陽　第三行足太

陽

膺胷部　中行任脉　第二行足少陰　第三行足陽明　第四行足太陰

腹部　中行任脉　第二行足少陰　第三行足陽明　第四行足太陰

腋下中間手厥陰　前手太陽　後手太陰

脇部　腋直下髀樞足少陽

臑部　前廉手陽明　後廉手太陽　外廉手太陽　內廉手少陰　內前廉手太陰　內後廉手少陰

臂部　上廉手陽明　下廉手太陰　外廉手少陽　內廉手厥陰　內上廉手太陰　內下廉手少陰

股脛部　前廉足陽明　後廉足太陽　外廉足少陽　內廉足厥陰　內前廉足太陰

諸經向導藥

太陽經上羌活下黃蘗

陽明經上白芷升麻下石膏

少陽經上柴胡下青皮

太陰經上桔梗下白芍藥

少陰經上獨活下知母
厥陰經上柴胡下青皮
手太陰肺南星款冬花升麻桔梗山藥檀香五味子
粳米阿膠葱白麥門冬杏仁白茯苓麻黃益智丁香
桑白皮知母天門冬梔子黃芩石膏白豆蔻砂仁（檀香
豆蔻爲使）
足太陰脾茱萸草豆蔻砂仁（人參益智爲使）防風代赭石益
智甘草半夏赤茯苓當歸蒼朮白朮麻子仁黃芪膠
飴

通入手足太陰肺脾白芍藥酒浸升麻芍藥木瓜延
胡索藿香砂仁
手陽明大腸升麻麻子仁秦艽薤白石膏白芷肉豆
蔻白石脂砂仁（白石脂爲使）
足陽明胃丁香草豆蔻砂仁防風石膏知母白朮神
麴葛根烏藥半夏升麻葱白蒼朮白芷
通入手足陽明酒麻黃連翹升麻白朮酒大黃葛根
石膏白芷檀香（佐以他藥）
手少陽三焦川芎酒大黃柴胡青皮白朮黃芪熟地

黃石膏細辛附子地骨皮

足少陽膽半夏草龍膽柴胡

通入手足少陽青皮柴胡川芎連翹

手厥陰心包絡牡丹皮白朮沙參柴胡熟地敗醬

足厥陰肝草龍膽山茱萸阿膠瞿麥桃仁蔓荊子代赭石當歸甘草青皮羌活吳茱萸白朮紫石英

通入手足厥陰青皮熟地柴胡川芎皂角苦茶桃仁

手太陽小腸白朮生地黃赤石脂羌活赤茯苓砂仁（赤石脂爲使）

足太陽膀胱滑石蔓荊子猪苓澤瀉桂枝茵陳白茯苓黃蘗羌活麻黃

通入手足太陽蔓荊子防風羌活藁本酒大黃黃蘗白朮澤瀉防己茴香

手少陰心麻黃代赭石桂心當歸生地黃連紫石英梔子獨活赤茯苓

足少陰腎知母地骨皮黃蘗阿膠猪膚元參牡丹皮敗醬牡蠣烏藥山茱萸猪苓白茯苓檀香甘草益智天門冬澤瀉五味子丁香獨活（或用梢）吳茱萸砂仁（黃蘗）

（茯苓為使）桔梗（或用梢）

通入手足少陰五味子細辛熟地澤瀉地榆附子知母白朮

命門附子沉香益智黃芪

善惡

瘡瘍售分五善七惡動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿清腫消不臭三善也神采精明語聲清爽四善也體氣和平五善也煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄腫焮尤甚膿色臭敗痛不可近二惡也喘粗短氣恍惚嗜臥三惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看四惡也肩背不便四肢沉重五惡也飲食不下服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗鼻青赤面目四肢浮腫七惡也五善見三則瘥七惡見四則危

虛實

夫瘡疽膿潰腫毒浸淫證候危惡者須辯虛實況夫虛者難補實者易瀉補瀉之法不可輕用若或少差利害甚大然而虛實多端有瘡之虛實有臟腑虛實

有血氣虛實又有上實下虛眞虛邪實者不可不辯也

夫腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便硬小便澀飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩躁多渴身熱脈大精神昏塞者悉臟腑之實也如膿水淸稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭疼鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不斂大便自利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者眞氣之虛也腫焮尤甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便祕澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰眞氣奪則虛邪氣盛則實又曰諸痛爲實癢爲虛也又曰診其脈洪

大而數者實也微細而軟者虛也虛則補之和其氣托裏也實則瀉之疎利而自導其氣也內經謂血實則決之氣虛則掣引之元戎云若人氣血壅盛榮衛充滿抑遏不行腐化而爲癰者當泄之以奪盛熱之氣若人飲食少思精神衰弱榮衛短濇寒搏而爲癰者當補之以接虛怯之氣此治虛實之大法也

瘡疽痛息自寧飲食知味脈證俱緩緩則治本故可以王道平和之藥徐而治之亦無不愈若脈實焮腫煩躁寒熱脈證俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰或膿水清稀或泄利腸鳴飲食不入嘔吐無時或手足逆冷此脈證俱虛非大補不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證者當辨表裏虛實隨宜治之庶得萬全

內消

癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所形脈虛實如發於腦背腰項臀腨者皆太陽經也宜黃連羌活背連脅處爲近少陽宜柴胡並

宜敗毒散仙方活命飲形實脈實者宜漏蘆湯內疎黃連湯追毒丸等疎利之氣虛者參芪爲主血虛者芎歸爲主佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分野上有癰疽其五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟少陽一經雖曰氣多血少而氣血皆不足也治與氣虛血虛同法凡苦蔞射干穿山甲金銀花夏枯草蟾酥連翹地丁黍粘子木鼈子之類爲內消之藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車螯散返魂丹消毒飲爲內消之方衆皆知之殊不知補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則可內消也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣血和平而腫熱消退也

內托

癰疽已成血氣虛者邪氣深者邪氣散漫者不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或雖得膿而根脚紅腫開大或毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿者皆氣血虛氣血既虛兼以六淫之邪而變生諸證必用內托令其毒熱出於肌表則

可愈也凡內托之藥以補藥爲主活血祛邪之藥佐之或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風寒大抵托裏消毒散托裏散小托裏散十宣散皆爲要藥但用隨時加減耳如冬月并氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素不宜寒藥者小五香湯形脈實膿色稠不可用補藥者忍冬丸之類大膿出敗肉去紅腫消當用黃芪人參當歸白朮大劑補之令氣血滋茂新肉易長也

敷貼

瘡腫初生似有頭而未起卽當貼溫熱藥引出其熱毒火就燥之義也若瘡腫初生卽高起四畔焮赤宜搗生寒藥貼熁折伏其熱勢驅逐其邪惡撲火之義也大抵敷貼之法欲消息腫毒疏通血脈寒熱錯綜皆期於不成膿也凡腫皮厚者以軟帛或綿紙塗藥貼熁之待其藥乾方換腫皮薄者用疎紗或薄紙塗藥貼熁之其藥未乾卽當換之至膿潰之後卽貼溫肌生肉膏藥要在逐臭腐排惡汁取死肌生良肉全藉溫熱膏劑之力也切勿用寒凉藥水調貼令血滯

而難瘥蓋血脈喜溫而惡寒故也

集驗云癰疽無頭起者用神豕膏靈龜膏拔毒膏正鐵箍散貼即令消退膿潰者用靈龜膏貼之或用追毒膏去膿或用筒子收膿有頭疽瘡每於洗後視赤暈闊狹用凉水調大鐵箍散成膏隆冬用溫水調如人肉溫貼之腫赤盛用生地黃自然汁調貼圍貼之法從四畔紅暈處圍貼用皮紙掩上瘡有旋生白粒散漫如米如豆者用銀篦尾撥去瘡眼用老皮散傳之再換新藥傳上凡熱多則赤焮腫散熱甚則紫黑外寒欝之亦紫血虛兼寒則青白大鐵箍散正鐵箍散乃常用之藥或因風寒熱及穢氣厭觸等證四時寒熱不同又宜從權設法熱者宜三黃散熱甚宜三消散風者加羌活防風若氣滯者加木香寒欝加桂穢氣觸者宜加香藥熏之腫處脆嫩者去白芨去貼藥時看毛下竅中當有汗珠此則血脈疎通熱毒消散赤暈漸縮膿潰痛止變逆爲順皮毛潤活要作良肉但疽頂有些少腐開不用刀剪如藥下不生汗珠腐敗必闊必多也膿後圍貼則收散漫遺毒盡隨膿

出瘡口貼拔毒膏藥如膿出不順用追毒膏惡肉不去用金寶膏敗肉去後用貼則氣血活新肉易長瘡口用長肉膏敷貼之藥與淋洗藥並行同功

郭氏法如是有頭瘡疽就便用朱砂備急膏一丸如黃豆大安於瘡頭上却用軟粘膏藥蓋護之其瘡必破如瘡暈紫黑色外用宣毒散周圍敷住毒氣如瘡暈赤紅色用水澄膏敷之次日用堅峻碧雲錠子開了瘡口次用緊緩碧霞錠子去其歹肉稍淨却用緩慢碧玉錠子生肌總名青金錠子不拘日數直待歹肉去淨單用膏藥貼之候膿水盡肌肉平方許貼生肌斂口之藥若依此法免教人受刀剪針烙之苦如是無頭癰腫待膿成用針刺破方依法收功也

淋洗

古人論瘡腫初生經一二日不退卽須用湯水淋射之其在四肢者濡漬之其在腰腹及背者淋射之其在下部委曲者淹漬之無非疎導腠理通調血脈使無凝滯也集驗云淋洗之法每用藥二兩水三升煎取一升半去查以淨帛或新綿蘸之乘熱溻其患處

漸覺喜溻仍淋浴之稍冷則急令再換愼勿冷用腫瘍宜紫葛湯一日五七次洗之每洗後拭乾視瘡頂上有白粒如米大者以五灰膏點破之瘡眼傅老皮散次用水調大鐵箍散圍貼四邊紅腫處用正鐵箍散水調貼瘡口再洗則先去舊藥每一次洗換新藥如前潰瘍用猪蹄湯一日一二次洗之仍用大鐵箍散如前圍貼瘡口上用追毒拔毒等藥貼之敗肉去後間二三日一換之可換長肉膏貼之淋洗之功癰疽初發則宜拔邪氣可使消退已成洗之則疎導腠理調和血脈探引熱毒從內達外易深爲淺縮大爲小紅腫延蔓洗之則收殷紫黯黑洗之紅活逐惡氣袪風邪除舊生新如瘡口冷滯不收者濃煎北艾湯洗燒松香兎毛熏之淋洗之藥可與鐵箍散並行

大抵灸烙溻漬各有所宜凡疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜溻漬之腫皮光軟則宜針開之以洩其毒認是疽瘡速以艾炷如菉豆許大灸二百壯灸後覺似焮痛乃火氣下徹毒氣隨火而出若其瘡痒宜淡豆豉以椒薑鹽葱和搗捻作餅子如

三錢厚安瘡頭上灸之覺太熱卽取起又安其上餅乾再易新者若其瘡痛卽須更灸壯數以多爲妙已成膿者不可灸當針開之初覺背上有瘡疼痒略異認是發背卽取淨土水和捻作餅子徑一寸厚二分貼瘡上作艾炷灸之一炷一易其瘡粟米大時可灸七七壯如錢大者日夜不住灸以瘥爲度其疳瘻惡瘡諸法不驗者取蠐螬剪去兩頭安瘡口上以艾灸之七壯一易不過七枚無不效者又法以乞火婆蟲同前灸之累試累效人皆祕之往往父子不傳

二八五八

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十三卷目錄

醫部彙考三百六十三

外科癰疽疔毒門五

王肯堂證治準繩（腫瘍　潰瘍　辨膿　多骨疽　惡瘡　疔瘡）

陳實功外科正宗（原委論第一　治法總論第二　陽證歌第三　陰證歌第四　半陰半陽證歌第五　五善歌第六　七惡歌第七　治病則例歌第八　灸法并禁灸瘡穴第九　論病生死法第十　察形色順逆第十一　病有三因受病主治不同論第十二　調理須知第十三　雜忌須知第十四　看法　腫瘍治法　潰瘍治法　瘡名十則）

疔瘡論　看法　治法　多骨疽論

藝術典第三百八十三卷

醫部彙考三百六十三

外科癰疽疔毒門五

明王肯堂證治準繩

腫瘍

集驗論瘡瘍之法其名有三曰癤曰癰曰疽癤者初生突起浮赤而無根脚腫見於皮膚間止闊一二寸有少疼痛數日後則微軟薄皮剝起始出清水後自破膿出如不破用替鍼丸拔毒膏貼之膿出卽愈癰

者初生紅腫突起無頭便用火鍼鍼之卽散不散鍼侵根脚闊三四寸發熱惡寒煩渴或不發熱抽掣疼痛四五日後按之微軟此證毒氣浮淺春夏宜用防風敗毒散加葱頭薑棗煎服秋冬去薑棗葱頭加木香身半已上加苦蔞身半已下宜加射干治早者卽散或用追毒丸返魂丹復元通氣散微利之膿成用鈹針破開或用替針丸咬開又一等皮色不變但略微腫肌肉內痛夜間痛甚發熱惡寒煩渴此熱毒深亦名爲疽謂其能傷筋脉骨髓也日久按之心中微輭膿成後用火烙烙開以决大膿外用拔毒乳香膏貼之宜服內托之藥初發急用大針於腫硬處針之則散疽者初生白粒如粟米大便覺癢痛觸著其痛應心此疽始發之兆也急用火針於白粒上針開或誤觸破或入湯便覺微赤腫痛三四日後不散根脚赤暈展開須詳看之方見其暈闊狹如闊四五寸左右渾身發壯熱微渴瘡上亦熱此疽也用火針於初起白粒上刺入一寸餘徑寸之間四邊刺四處便用四味紫葛湯淋洗一日夜共五六次洗之洗了以輭

帛拭乾看疽上或有漸生白粒如黍米或多或少可用銀篦兒挑去勿令見血或有少血亦不妨不見血尤妙却用老皮散傅之用凉水調大鐵箍散圍貼却留瘡口瘡口處用水調正鐵箍散貼之未可用膏藥如再要洗須先去圍藥令淨然後洗之一次洗一次檢點疽上漸生白粒有則如前挑之六七日瘡頭無數如蜂房膿不肯出仍淋洗圍貼冬月用五香連翹湯大黃一味隨虛實加減夏秋用黃連羌活散春末夏初用防風敗毒散加葱白棗煎服秋去之加木香

若形氣實脈洪滑有力痛腫焮開壯熱便閉於五利大黃湯漏蘆湯返魂丹追毒丸復元通氣散藥一方以通利之若大便潤便止藥四十歲已前可用之虛弱年老之人雖有便閉之證須慎之勿令過也瘡熱暈赤焮開圍貼如赤暈收斂却再換鐵箍散不及用火針證七八日後中間初起白粒處此竅已潰逼內大膿可用皮紙撚小紙絍撚入竅中令透漸漸流出可不用針砭如要膿透必以大針刺開或周圍四五處其竅四邊如蜂房處膿不肯出用正鐵箍散香油

調貼一證初生白粒誤觸後便覺情懷不舒暢背上沉重如負五七升米樣身體煩疼胷膈痞悶而躁飲食無味怕聞食氣所謂外如麻裏如瓜者疽毒深惡內連腑臟也三五日內皆可用烙於中間左右上下令毒氣通暢後膿從諸竅而出五六日不散疽頂生白粒如椒者數日後漸生多間有大如蜂房蓮子者指捺有膿血而不流時有清水流出微腫不突根腳紅暈漸漸展開或癢痛或不痛或根腳暈紫赤焮開至七八寸疽不甚熱此證甚重用紫葛湯加米酢一盞淋洗可使紅活如法去白粒傅老皮散圍大箍散瘡口塗正鐵箍散每用前法如得根腳紅暈收疽突此藥力到變重爲輕如起第一顆頂上白粒雖有膿而紐引不透按之猶硬或漸不疼便宜用火烙開透若根腳仍舊紫黑瘡反陷下如牛領之皮漸變黑色肌骨腐潰恍惚沉重用拔毒乳香膏貼四邊仍用大鐵箍散圍腳用豬蹏湯洗此數項變證必多又宜隨證調理脈若虛弱便用大料人參當歸濃湯調解毒行經之藥凡癰疽必服萬全散夏月用桃紅散服以

護心若見膿之後當以潰瘍法調理

按集驗治法未可盡據爲準繩要當以後論爲主叅酌諸方用之

大法腫高焮痛脈浮者邪在表也宜托之如內托復煎散

腫硬痛深脈沉者邪在內也宜下之如黃連內疎湯仙方活命飲苦參丸外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衞如托裏榮衞湯白芷升麻輩

焮痛躁煩或咽乾作渴者宜降火如黃連解毒湯

焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之如荊防敗毒散人參敗毒散輩

大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒如仙方活命飲

煩躁飲冷焮痛脈數者邪在上也宜清之如清涼飲或金銀花散

惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之如十宣散

焮痛發熱汗多大渴便祕譫語者結陽證也宜下之

如黃連內疏湯破棺丹輩

不作膿或熟而不潰者虛也宜補之如補中益氣湯八物湯十全大補湯輩

焮痛或不痛及痲木者邪氣盛也隔蒜灸之

腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之如仙方活命飲

腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之如清心湯或防風通聖散加黃連

不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之如托裏

消毒散

潰瘍

集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脉之洪數漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿根脚赤暈反展開闊或不痛或大痛此毒氣不退金銀

白芷散十宣散去厚朴倍人參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角苦蔞根消毒之藥春末夏間及秋初宜加酒芩黃連黃蘗羌活腰已下可去桔梗見膿後須以補氣血藥爲主解毒藥助之或不宜於補藥者宜忍冬丸四圍腫焮處用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮服藥脉得和緩爲佳或破後不潰瘡口堅硬者風也用蜈蚣散傳之或𧖴肉不腐用雄黃輕粉敷之大忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃或兼他證又另議藥治腐肉不知痛癢正黑者可去之但不可傷四畔及裏面之良肉當去外之黑腐者下皆去黃白如絮之狀膿內有紅血絲絡又不可動此中大膿矣日必自脫落庶免傷其良肉若怕刀砭三四日必自脫落但用刀去者新肉易長毒氣漸消凡腐肉亦有長肉膏貼間日用猪蹄湯洗新肉長如梅李如石榴子紅活可愛日見堆阜或上有白膜皆是吉兆若腐敗去後下面良肉色白而平略無紋理亦不如粟不見漸生之意或膿水清淡或臭此積毒內連五臟血氣枯竭乃是危證肉不能長氣血不榮衛氣

不護瘡則風寒著之用北艾黃芪湯熏洗長肌肉藥傅之用乳香膏長肉等膏貼之或肉雖長起色紫者遺毒也用地榆湯活血散敷追毒膏貼之卽自紅活瘡口漸收仍用長肉膏貼或瘡口癢用細茶葱鹽煎湯熱洗或瘡口易收乃氣血中熱毒故不分消卽使長肉必防流注之患或更迷塞瘡口如錢大時恐轉他證危殆凡癰疽瘡口已收但皮嫩未可便去膏藥

鬼遺方云凡發背及癰疽皆在背上不問大小有疼無疼或熱或不熱或冷或不冷但從小至大腫起至一尺已上者其赤腫焮熱者卽用緊急收赤腫藥圍定不令引開中心卽用抽膿聚毒散貼之急令散毒外透內服排膿縮毒內托湯藥候膿成相次破穴看瘡大小深淺內發其膿汁膿水大泄急須托裏內補雖破穴膿汁不多再須排膿拔毒透後愼不令再腫須疼止腫消患人自覺輕便卽是順疾也最宜節愼飲食其熱毒方盛或發大渴多飲冷水及冷漿之類此是毒氣攻心令口乾煩渴但以心氣藥內補臟腑卽止矣

內補謂參芪之屬排膿謂皂角刺之屬

辨膿

集驗云脈緊而數爲膿未成緊去但數爲膿已成以手按上熱者爲有膿不熱者爲無膿按之牢硬未有膿也按之半軟已有膿也大軟方是膿成也大按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之即復者爲有膿也不復者無膿也小按便痛薄皮剝起者膿淺也按之四痛皮色不變不高阜者膿深也淺者冝藥點破高突者冝鈹針深者冝烙更詳虛實何如腫處軟而不痛者血瘤也發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也虛腫而黃者水也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所爲也畱積經久積陰生陽寒化爲熱以此潰必成瘻冝早服內塞藥以排之諸瘻瘤疣贅等至年衰皆自內潰不一於補養而妄行攻蝕必有性命之憂至於瘰癧結核寒熱發渴經久不消其人面色痿黃被熱上蒸已成膿也治見本條手足指稍及乳上冝膿熟大潰方可開之麻豆大肢節上癰稍覺有膿便須決破遲則成攣曲之疾

取膿凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者按之色不變膿已結成又按之隨手赤色此亦有膿按之白良久方赤遊毒已息可就赤白色盡處灸斷瘡肉平實久而方消

夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾惟癰膿成則宜針疽膿成則宜烙

切宜熟視詳審候其潰熟膿透於外其勢盈盈欲出只用替針丸自瘡頭咬開不半日許其膿自出切不可用針刀也

鬼遺云凡癰覺在虛處及眼不見處皆是惡證如發高腫紫赤皮薄光澤覺裏有膿毒諸藥貼熁不破者用熟銅針於油火上燎透先用黑筆點定却當頭以針淺刺入隨針出膿者順也有不隨針出膿當用白紙作紝紝入針孔引出膿毒當時腫退可及三分如腫不退是一逆也腫不退疼不除但膿出二逆也膿疼不退患人不覺瘡輕三逆也雖用針破出膿亦無所濟須急用引膿托裏湯藥以助其勢力可也更有癰生實處不問淺深如有膿即用針烙無害稍緩即

恐傷筋骨內疼凡近筋脉骨節處不得亂行針烙反致他病也

患疽初生赤硬或在虛處毒氣淺或在實處毒氣深切須仔細辨認仍問患人疼痛覺深覺淺其患處瘡頭不拘多少其間須有一箇最大者卽是大膿竅當用熟鐵大針頭如釵脚者於麻油燈上燒令熱透以大頭處按定插入一寸或至二寸膿當下恐未有膿毒出却用白紙作紝子紝入候次日取出其膿卽隨紝下矣膿色黃白卽好若赤黑色防後有鮮血出卽

患人寒戰不禁其有虛處不得妄行針烙

多骨疽

或問足脛生疽既潰甚久而不愈腐爛出骨者何如曰此名多骨疽亦名剩骨又名朽骨蓋因毒氣壅盛結成此骨非正骨也宜服勝金丹十全大補湯加牛膝防己紫金丹烏金散人參養榮湯加木瓜牛膝防己相間服此疽因未潰之前補劑太過故結毒而不散耳宜授仙紙黃龍膏貼之

惡瘡

諸痛癢瘡皆屬於心諸濕腫滿皆屬於脾心主血脾主肉血熱而肉濕濕熱相合潰敗肌膚浸淫不休不可以定名命之故謂之惡瘡也然有辨焉如疥癬癮疹之屬怫鬱氣血在皮膚腠理間者可以表而散內經有謂汗之則瘡已者是已若鬱氣血在肌肉之分外連皮膚作寒熱而生膿者或七情所招或膏粱之變皆宜解內熱不宜汗也張仲景所謂瘡家不可發汗汗之則痓者是已一瘡而有宜汗不宜汗之別熱有淺深表裏故也故瘡在皮膚則當因其輕而揚之汗之浴之外以殺蟲潤燥和解凝結涎沫之藥傅之瘡在肌肉則當因其重而減之瀉經絡之熱清涼氣血外以化膿生肌膏熁之瘡在頭巔則當射而取之用酒製寒涼劑更以風藥升而上之外以殺蟲解熱藥傅之能明此三者其於治瘡思過半矣

疔瘡

疔瘡者以其瘡形如丁蓋之狀而得名皆生頭面四肢發黃疱中或紫黑必先癢後痛先寒後熱凡人一二日間惡寒發熱四肢沉重心悸眼花頭疼體痛稍

異如常之證須宜徧身尋認如有小瘡與常患之瘡稍異即是疔也大抵起紫疱者多起堆核者少發於手上者多發於別處者少生兩足者多有紅絲至臍生兩手者多有紅絲至腋生唇面口內者多有紅絲入喉以針刺瘡不痛無血是其候也經云膏粱之變足生大疔大抵多由恣食厚味卒中飲食之毒或感四時不正之氣或感蛇蟲之毒或感疫死牛馬猪羊之毒或人汗入肉而食之皆生疔瘡各宜審而治之若嘔逆直視讝語如醉者不可治矣又有內疔一證與外疔之證大同但瘡形不現過數日間有一處腫起者即是內疔所發之處但腹痛甚者便須作內疔治之不可緩也緩則殺人

華元化云疔有五色屬五臟紅屬心發於舌根青屬肝發於目下黃屬脾發於口唇白屬肺發於右鼻黑屬腎發於耳前以種類言之千金方外臺祕要神巧萬全方皆稱一十三種殆不止也

麻子疔狀如麻子稍黑四邊微赤多癢少痛忌食麻子油衣麻衣井入麻田中行見穿麻布人　火疔發

於頂門或發於面身熱如火狀如湯火燒灼瘡頭有黑黶四邊烟焰又如赤粟米忌火灸燒針烙　脾疔生於脣四白　眉疔生於眉　髭疔生於髭中　龍泉疔生於脣上　虎鬚疔生於脣下　魚尾疔生於眼角外　顴骨疔生於顴骨上亦名赤面疔其狀色白頂陷如錢孔鼻有紫色者大凶　耳疔生於耳中亦名黑疔連腮赤腫　鼻疔生於鼻內痛引腦門不能運氣鼻如大瓶黑色者不治　頰疔生於面頰骨尖高處　氣疔形如氣泡感怒而生　腐疔色白有皰三日內頂陷狀如初灸瘡因夏月造豆腐時人汗滴於內食之而生忌食豆腐　鬼疔因中陰邪之毒而生　瓜藤疔延蔓無數忌瓜田中行　石疔皮肉相連堅鞕如石刺之不入肉微痛忌砂礫　鹽膚疔大如匙面四邊皆赤有黑點如粟粒起忌食鹹物　水洗疔狀如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑黶汁出而中鞕極癢透骨搔則快然忌水洗渡河及飲漿水　浮漚疔其狀圓曲少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛　三十六疔其狀頭

黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治未滿者可治俗名黑皰忌嗔怒畜積愁恨　猪疔形圓而小瘡口內有油　羊疔形長而白色　牛疔形圓而小瘡內無油皰起掐不破有寒熱　狗疔色赤而長或帶尖與牛疔同無忌不殺人　驢馬疔其狀三角頂上有黑點根脚有赤色或突起　水疔狀如泡因飲隔宿水而生忌飲水　臍疔生於臍　脅疔生於脅　刀鐮疔狀如薤葉長寸許肉黑如燒烙忌刀針　暗疔生兩腋下而無頭但腋下堅鞕四肢拘急寒熱大作陰囊腫痛睾丸附生突兀如疔寒熱併作亦名暗疔　寸疔生手指骨節間　虎口疔生合谷穴　魚臍疔狀如魚臍　茱萸疔中凹邊突　蛇眼疔頭黑皮浮形如小豆狀似蛇眼忌惡眼看幷嫉妒人見之及觸毒藥　紅絲疔一名血箭疔一名赤疔一名紅演疔生於舌根下或生頭面或生手足骨節間其證最急宜迎其經刺出惡血則愈稍遲毒氣攻心嘔噦迷悶者死若絲近心腹者就於絲盡處刺出惡血更

挑破初起瘡頭以泄其毒　芝麻疔走注不定徧身疼痛不能轉側　爛疔潰出膿水大如匙面色稍黑有白斑忌沸湯熱食爛物　雌疔瘡頭稍黃向裏黶亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤大如錢孔又有一枚在他處以水噀之則見大忌房事　雄疔其狀頭黑黶突起四畔仰皰漿起有水出色黃大如錢孔忌房事　黃疔有眼在皮發如齒齦之色手足痲木涎出不語者死　黑疔狀如黑皰　櫻桃疔狀如櫻桃　蛇頭疔生手指頭兩旁狀如蛇頭甚腥穢紫黑色痛引心有潰爛脫落者　足面疔狀如粟米癢極入骨急隔蒜灸之大抵如豆如臼如金箔如茱萸如石榴子或發疹搔破而青黃赤色汁出或衣物觸著而疼痛忽生或白而腫實或赤而浮虛其狀不一初覺頂不起者急隔蒜灸之灸而有皰者吉無者凶服汗劑得汗則生無汗則死刺出紫血者危出黑血者死

緩者一日瘡疔皰色微白二日皰色大白三日色微紫四日色眞紫皆緩之候也

急者五日色微青小緊六日色深青大緊七日色黑

其形如魚臍或如灸瘡之狀皆急之候也

凡生疔瘡身熱頭疼手足溫和飲食如常疔之四圍赤腫名曰護場可治凡生疔瘡眼白睛凝不轉渴欲飲水內熱瘡盛脣舌靑臥牀不能起五心腫頭運眼花氣粗食不進脈伏譫語惡心腹痛冷汗出手足冷滑泄無度疔之四圍無赤腫名曰不護場不可治

瘡證急者有應如生一疔之外別處肉上再生一小瘡卽是有應可用針挑破護場瘡四圍有赤腫生多瘡者謂之滿天星飮食如常頭痛身熱手足溫

瘡證凶者無應別處肉上無瘡不護場疔四圍無赤腫腹痛甚者有內疔若毒入心腹眼黑如見火光煩悶嘔逆恍惚癡眠瞳人不動赤脈貫睛胷脅赤腫瘡陷不起皆死候也

凡疔瘡必有紅絲路急用針於紅絲所至之處出血及刺疔頭四畔出血若針之不痛或無血者以針燒紅頻烙患處以痛爲度若下部所患多宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若灸而不痛者宜明灸之及針疔四畔出去惡血却以稜針深刺破疔頭

瘡口用海馬拔毒散敷之或雄礬丹敷之待疔四圍發黃皰浮腫知痛爲佳若疔未發用火針四畔亂刺如有紅絲脈盡處亦以火針三向刺斷刺了即敷藥若疔不痛不發者用艾火於疔瘡上灸之三壯候瘡邊起黃皰發後方可貼膏藥凡疔腫皆刺中心至痛又刺四畔令出惡血去血傳藥藥氣入針孔佳若不針透瘡內不得力也若起紫皰初然切不可針破服藥赶出自破出血水爲妙若服藥後又不破方以針挑破無妨若起紫皰腫痛者以萬病解毒丸外塗內服若成膿不乾者以米酢調鐵鏽塗之自然凸出出膿水即乾

多有患此不覺而暴死者用燈照看徧身有小瘡即是疔毒宜灸瘡處候甦更服敗毒藥并追疔奪命湯若內疔之證用化毒丸置舌上含化出涎或只用蟾酥一粒重者二粒置病人舌上含化化後良久用井水漱去毒涎爲妙若牙關緊急及喉內患者並宜含蟾酥丸或朱墨丸良久用井水漱去更宜服二丸少停又服二丸又服奪命丹或雄黃丸通利一行得利

爲度又用霹靂火汗之再用前藥調之或初生一箇次生二箇逐漸流注者急將初生者用鐵筒拔毒膏點破消蝕惡肉即不流注却以油髮蛇退土蜂房皂角刺各另燒存性等分白芨減半爲末掺之以平瘡口此即前所謂三十六疔者也其魚臍疔瘡頭深黑破之黃水滲出四畔浮漿其毒尤甚通用前法及服萬病解毒丸以清心行血

治法表實者宜解表以荆防敗毒散追疔奪命湯初發之時必發熱身疼此乃毒氣在表故發表則毒從毛腠而出

裏實者宜攻裏以救命追黃湯連翹攻裏散表證皆罷毒氣入裏口渴便祕毒在內也故攻裏則毒從臟腑而出

表裏俱實者宜解表和裏以化毒消腫和裏散加紫河車獨脚蓮紫金藤苦花子其證發熱身疼口渴便祕乃表裏俱見故攻發並用也

腫勢盛脉浮數者宜散之蟾酥丸返魂丹

毒勢盛脉沉實者宜下之奪命丹萬病解毒丸

無表裏證服散毒消毒藥後以復元通氣散加麝香少許

虛弱人以五香連翹湯合十宣散稍虛者只以人參敗毒散

按五香連翹湯乃溫熱走竄之藥既是虛人豈其所宜當用薛氏法爲良

疔毒拔出用金銀白芷散十宣散調理未潰者不須此藥

初發惡寒發熱或拘急或頭疼或寒熱交作或肢體重痛或大便祕結宜以敗毒散加防風荆芥連翹黃芩青木香金銀花天花粉大黃生地黃若無惡寒但發熱者可服刼瘴消毒散十神散萬全散若表證皆罷毒氣入裏者可用雄黃丸

怯弱之人不可用峻厲藥攻之宜隔蒜灸五十壯以人參敗毒散數劑若生道遠位僻之處非峻厲則藥力不到若以峻厲則胃氣先傷虛虛之禍有所不免不若灸之爲宜

疔瘡四畔紅赤漸散開闊走散不止此名疔瘡走黃

宜以通聖消毒散通利兩三行次去大黃朴硝調理而愈或解毒消瘴散亦可用之有效此宜作瘴氣治之無誤

疔瘡腫硬脉數煩躁喜冷口渴便祕宜以連翹攻裏散一服次用蟾酥丸若兼有表邪者以荊防敗毒散加金銀花天花粉大黃連翹脉實有熱更加黃連黃芩或只加苦花子退熱治瘴之妙藥也

若因剝割疫死牛馬猪羊瞀悶身冷遍體俱有紫泡此疔毒也急灸泡處良久遂甦即以人參敗毒散加防風荊芥投之

若忽然惡寒作嘔肩臂痲木手心瘙癢遂瞀悶不自知覺但有一泡此疔毒也急灸五十壯而甦又五十壯知痛投以荊防敗毒散而愈古人謂暴死多是疔毒急用燈照徧身若有小瘡紫泡異常者即是急灸其瘡但是胷腹溫者可救

若因開割瘴死牛馬猪羊之毒或食其肉致發疔毒或在手足或在頭面或在胷腹或在脅肋或在背脊或在陰胯或起紫泡或起堆核腫痛創人發熱煩悶

頭疼身痛骨節煩疼先用天馬奪命丹次用四神丸解毒消瘴散次以七神散又以萬病解毒丸刼瘴消毒散兼服朱墨丸井用祛瘴散多用毛屎梯根磨水服或仙人薯根磨水服如不熱磨酒服大熱不退者宜用退熱消毒飲又要以箍瘴散箍住不使走散又以洗瘴散淋洗次以刷瘴散塗刷若成瘡以掞瘴散掞之好膏藥貼之

若患疔瘡始初不覺不會用前法出汗過數日外證皆罷或在胷腹之間或在胷之下腫起此乃毒氣入裏所致用霹靂火治之若服當歸散外證不解者亦急用霹靂火發散

若疔瘡在兩脅間毒氣欲奔心乃危急之證也可急於瘡尖上用艾炷灸三五壯仍於灸穴前後左右針出少血灸瘡四圍有皰起吉無皰凶若疔在虛輭不便處不可用針只可用松針法針斷紅絲路若生兩胯間毒氣欲奔腎者用松針法於兩胯紅絲路盡處針斷出血若生頭面上者可於項間紅絲路盡處針斷出血若各處紅絲路亦有不現者亦可以消詳用

松針法針之凡用松針者蓋因紅絲路不現無可下針故用此法於項下脅下腋胯虛輭之處針斷紅絲路不使毒氣攻心攻腎而已

若手足厥冷六脉俱絕者此毒氣已深氣血爲毒氣所併不能通流故體冷而脉不見宜木香流氣飲連進數服氣血通流脉自回矣然後依法治之萬不失一

內疔之證與外疔並同亦發寒熱頭疼身痛但瘡形不現不過數日胷背腹脅頭面手足間或有一處腫起卽內疔所發之處急用霹靂火如前不護塲汗法於腫處出汗若身體寒熱雖未有腫起但腹痛甚者便須作內疔證用後法治之不可緩也

治內疔蟾酥須於取時用桑葉小錢大入蟾酥搗和得所丸如珍珠大陰乾用

陳實功外科正宗

原委論第一

癰疽發背爲何生好好身軀出此形

註　凡人處世而無疾病者水升火降精祕血盈也

養生篇曰毋搖爾精毋勞爾形皈心靜默可以長生此皆遠世俗忘名利無貪嗔却疾病惟修身保命之士所能今人豈能及哉蓋謂靜則生水動則生火又水能生萬物火能尅萬物故百病由火而生火既生七情六慾皆隨應而入之既入之後百病發焉發於內者爲風勞蠱膈痰喘內傷發於外者成癰疽發背對口疔瘡此皆言其大略也故成癰者壅也爲陽屬六腑毒騰於外其發暴而所患浮淺因病原稟於陽分中蓋陽氣輕清浮而高起故易腫易膿易腐易斂誠爲不傷筋骨易治之證也疽者沮也爲陰屬五臟毒攻於內其發緩而所患深沉因病原稟於陰分中蓋陰血重濁性質多沉故爲傷筋蝕骨難治之證也凡年壯氣血勝毒則順年老毒勝氣血則險治法載於第二論中宜詳觀之

內被七情干臟腑憂愁思慮總關心

註　七情六慾者皆盜人元氣之賊也人能疎於此者無不多安多壽人若親於此者無不有損有傷

但人能味之者鮮矣蓋情慾之動作無所不好無所不爲故喜傷心怒傷肝憂傷肺思傷脾悲傷魂魄恐傷腎驚傷膽此等七情皆耗人一身元氣之萌櫱也至於六慾者耳聽聲音眼觀物色鼻聞香氣舌貪滋味心帷天地意幄萬方此等六慾皆損人三世鍾靈之眞性也又所以爲苦爲疾爲實爲疼以及休廢衰敗諸病諸瘡盡皆出於此等之情慾也醫者患者亦宜愼察之

外又六淫傷氣血風寒暑濕火相臨

註　六淫者風寒暑濕燥火是也風爲四時不正浩蕩肅殺之氣發而最能中人寒乃節候不調疾風暴雨氷雪嚴寒所傷或口貪生冷之物暑因亢陽酷日爍火流金濕熱熏蒸而中濕從坐臥久陰卑濕之地或身驟臨風雨潮氣所侵燥爲陰虛內熱消爍津液不能滋潤臟腑以致皮膚枯槁便乾爲燥火生於心緒煩擾醇酒膏粱房慾不節所動此六淫者皆從外而入之體實之人遇而不中者有體弱之人感而隨發者多又有感之不發邪氣客

於臟腑經絡關節之內積襲日久或待內傷或因外感邪氣觸而發之既發之後當察寒熱溫涼邪正勝負而治之

膏粱厚味多無忌勞傷房慾致虧陰

註　膏粱者醇酒肥鮮炙煿之物也時人多以火炭烘熏或以油酥燖煮其味香燥甘甜其性鹹酸辛辣又至於醃藏厚料頓煮重湯以取其爽口快心不顧其消陰爍臟又得於寵妾滿前精神飛曠溫牀厚被爐火圍匝每至於未飢先食未冷先綿快意從心已力太過稍有不及便去興陽惟取快意於一時不覺陰消於平日況所生是疾者不起於藜藿盡屬於膏粱誰識膏粱味短不及藜藿味長凡知命者當遠之避之擇而用之可也

故將五臟多乖變自然六腑不調勻

註　五臟屬五行金木水火土是也常欲相順相生所謂木生火火生土土生金金生水水生木此五臟相合相生理稟太和之氣其疾何以生焉是為疾者五臟必相反相尅所謂木尅土土尅水水尅

火火剋金金剋木此五臟相刑相剋理返互變之機其疾再無不作者所謂相生者昌相剋者亡此誠爲萬物生剋一定之理豈止於疾病言哉又謂五臟不和則六腑不通六腑不通則九竅疲癃九竅疲癃則留結爲癰蓋癰疽必出於臟腑乖變開竅不得宣通而發也治當寒邪而痛者以溫熱散之濕腫強痛者滲而導之燥搐攣痛者滋而潤之泄而痛者溫之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之陰陽不和者調燮之經絡祕澀者沖和之膿脹而痛者開之惡肉侵蝕者去之勞而痛者逸之損而痛者續之此等皆爲活法惟在用者詳之

發於心上多危險五臟相干事可明

註　五臟者心肝脾肺四臟皆係於背惟腎經一臟獨居於下雖居於下其本臟精華津液元氣元神盡行灌溉榮注於上故四臟之火皆賴一臟之水以濟之所謂五臟根本皆係於背即此之意也凡發癰疽者未有不先傷五臟而後發之況背乃太

陽膀胱督脉所主太陽者六經之首領也督脉者十二經絡之總脉也所以瘡生於背毒犯於此況心又屬君主之位豈容毒相犯之凡發於此故多成危險難治之證醫者不可不愼而察之

心之已下多成順六腑之因亦許輕

註 凡瘡生於心之以下者除腎俞一穴外皆爲緩六腑者足陽明胃經手太陽小腸經足太陽膀胱經手厥陰心包絡經手少陽三焦經足少陽膽經此六經其名屬腑其形在下其氣主表其病爲癰故疾發於五臟者爲重生於六腑者爲輕此爲表裏臟腑輕重之別也

胛家積毒生肩脊

註 發生於肩下脊上者乃因飲食膏粱積毒所致發出高腫鮮明根脚不過兩肩者爲順先宜解毒護心爲主次宜內托清心爲要間用蠟礬丸護心散防毒攻心如腫平堅硬漸大漸開攻注兩肩胷項或腫而不定者危

心經火毒對心臨

註　對心發者乃心火妄動熱極而發之也況心爲一身之主宰周身蘊熱流會於此共結爲患又稱毒劇君位最易傷人刑截督經害非輕淺況此穴背脊多坑固難起發瘡形落陷腫不高尖治當大降心火急疏蘊熱頂用針通隨行拔法務使毒氣內外疎通各從門出庶不內攻方爲成效保至十五日後內無變證得膿爲解如是期變證漸生堅硬漸大不作膿者死在二十二朝前後但此證貴在乎早治十中可保其三四也

兩肩左右雙生發肺肝積受不虛名

註　左搭屬肝右搭屬肺生於左右肩骨移動之處爲可治古云左搭串右右搭串左俱爲難治予以爲不然每醫左右相串者未嘗見其死惟在治法得宜耳治之先用萬靈丹發汗疎通內外次以清肝解鬱湯柴胡清肝湯氣用四君子湯血用四物湯潰後八珍湯俱兼六鬱湯叅而調治誠爲妥當但此證原起於痰凝氣滯火鬱氣血不調所生正謂鬱者開之滯者行之如悞用瘡科解毒泄氣悞

補悞攻之藥必致多危

蓮子蜂窠防毒陷

註 蓮子蜂窠多生於背與心相近與脊中平輕者形長高腫或偏半背重者形斜平塌兩脅俱傷孔似蜂窠突如蓮子瘡形可畏常能多險多生老弱不堪反取常安常穩大規只怕不純陽治法何妨瘡勢惡護心護膜丸丹須要調停執藥執方活法在乎醫意機彖總論法決存亡

腰間腎俞發難生

註 腎俞發者生於兩腰內腎陷肉之間或正中亦發凡生於此者最爲險候蓋內腎乃爲性命根本藏精藏氣藏神又謂受命先天育女育男育壽凡此皆推腎臟一竅而言也其爲疾因房勞過度氣竭精傷慾火消陰外陽煽惑以致眞水眞陰從此而耗散既散之後其臟必虛所以諸火諸邪乘虛而入既入之後渾結爲瘡如本臟稍有眞陰制火瘡形自可紅活高腫爲膿治以人參養榮湯加山萸五味子黃蘗知母及加減八味丸以救其源若

瘡形色紫黑乾枯堅硬不作膿者爲眞陰內敗再無可生之理必死在十五日前後爲期也

督脈經處從項發俗名對口故相稱

註　對口者生於項後而對前口者是也但有偏正之不同發於正者屬督脈所主發於偏者乃太陽膀胱所司二者皆起於濕熱上攻凝結而成也督脈者發瘡雖正而反爲易治因督脈起於下而貫脊行於上故毒氣得之反能衝突高腫使邪毒不致下流低陷乃爲外發故多易治膀胱者發瘡雖偏而每爲難治蓋膀胱之脈起於巔頂貫項兩旁順下而行乃與瘡毒交會下流故瘡多平塌又太陽膀胱主司寒水其質多冷多沉故瘡於此多難起發形色多難紅活堅硬難潰又易流注兩肩胷項作腫十五日外無膿者必然變黑歸陰故多不治俗呼以正爲重以偏爲輕此皆庸說不得其消息故也治以黃連消毒飲主之餘皆降火化痰解毒清心托裏爲要也

何期耳後多生發夭疽銳毒果非輕

註　發生於耳後一寸三分致命之處誠爲險惡之候又左爲夭疽右爲銳毒夭者妖變之物也故屬肝木銳者鋒利之器也是屬肺金二者皆起於積想勞心謀慮不決致火旺而又鬱鬱而又旺以成此疾也故形多堅硬頭多隱伏未潰先黑未膿先腐臭穢易生元氣易敗毒氣多致不得外發後必內攻而死但此證初生起於隱微令人多不知覺及其知覺毒已入內矣如紅活高腫易膿易腐者無妨

又有脫疽生手足丹房補術孽根因

註　脫疽之發脫者落也疽者黑腐也此毒皆起於丹石補藥房術祕法興陽澀精幸圖不洩藥性暴烈或洗或嚼或噙於口或藏臍下霸阻精道久戰不弱取樂一時恣情戲謔毒積臟腑眞陰枯灼種禍在身終久必發此是根因發者難生多生手足發在骨筋初生如粟色似棗形漸開漸大筋骨伶仃烏烏黑黑痛割傷心殘殘敗敗汚氣熏人延至踝骨性命將傾此非天命自喪其身古人有法截

割可生今人誰肯割截爲名治法雖有詳在後文漫腫難治焮腫易總論中間法可憑諸瘡另自分門說豈許輕干紊此呈

註　漫腫者肉腫瘡不腫焮腫者瘡腫肉不腫是也此二者發瘡陰陽之大體辨證順逆之要節由此觀之一決而可定也初起理當升發潰後不可用內消宜用托藥如不應者乃毒勝氣血死在旬日或已發出而不腐潰根脚堅硬或輭而散大者急投托藥大補脾胃不應死在二旬若已潰而色不變紅活亦不生肌收斂瘡口暈大腫痛不減胃氣不回急須峻補不應者乃脾崩死在月餘

治法總論第二

癰疽發背怎生醫不論陰陽先灸之不痛灸至痛疼灸不疼時

註　凡看大瘡先要從容立定主意以見標日期爲始到今幾日看瘡形與日期可否相對相應則多吉不應則多險次看受病之源發於何臟腑出於何部位但身體有上下部位有險否形色辨順逆

精神論有無再看年紀老壯氣血盛衰發陰發陽毒深毒淺以陽爲易治者多生以陰爲難治者多死方診脈之虛實可知順險以決其終凡瘡未潰前脈要太過一二至已潰後又宜不及二三分此爲脈病相應首尾自不變生如其相反恐防不測但看法全在目力精巧與心相應一一叅明表裏透徹然後方定治法凡瘡七日以前形勢未成元氣未弱不論陰陽表裏寒熱虛實俱當先灸輕者使毒氣隨火而散重者拔引鬱毒通徹內外邪得火引毒氣混合爲陽方能發腫作痛然後可汗可攻或消或托兼求標本叅治必以脈合藥以藥合病如此治之自然無錯矣故藥難執方全在活法大抵首尾俱不可損傷元氣脾胃爲要

內服蟾酥丸一服外將神火照三枝

註 凡瘡初起七日之前或已灸之後未服他藥宜用蟾酥丸一服得汗解爲妙或萬靈丹發汗亦可所謂毒氣隨汗而散最爲捷徑如二藥服後或發汗不出此乃表裏閉密之故毒亦不輕當神妙拔

根方施治神燈照法甚妙亦不可用之太早如瘡四五日之間形未聚毒未出若用之早恐留鬱而內毒反致難出須用在八九日之後瘡勢已定毒氣已聚未成膿腐之時用此照之已成者自高未成者自消不潰者自潰不脫者自脫亦且能解毒活血消腫散瘀誠良法也

用膏貼頂上敷藥四邊圍

註　凡瘡最忌風寒所襲初起之時或已灸之後俱當用太乙膏蓋貼頂上功效在於拔毒提頂提膿防禦風寒不入如焮痛高腫陽瘡七日已後瘡頭自有黃色稠膿相粘膏上餘腫紅色光亮鮮明每日宜用葱湯洗淨換膏貼之其正膿定在十一日前後出也此爲易治易安之證如七日之後瘡不大腫高四邊又不焮痛瘡頭亦無膿意相粘此爲陰陽相等之證宜用化腐紫霞膏塗瘡頂上外以膏藥蓋之換至十日外瘡頂漸腐餘腫漸高似有膿意之象其正膿只在十五日之後可出也此爲以險成順之證至於二十日已後無膿者乃純陰

之證縱治亦無效矣又如瘡之四邊根脚餘腫其功又在敷藥收束根本庶不開大初起時宜用金黃散敷於四邊能拔毒消腫止痛既潰後當用鐵桶膏箍之庶瘡根漸收漸緊但諸瘡原因氣血凝滯而成切不可純用涼藥冰凝肌肉多致難腐難斂必當散滯行瘀拔毒活血藥用之方爲妥當也

氣盛兮頂自高而突起血盛兮根脚束而無疑

註　氣血者人之所原稟老者或有有餘少者亦有不足人之命脈全賴於此一或有乖百病生焉獨瘡科尤關係不淺但腫瘍時若無正氣衝托則瘡頂不能高腫亦不能焮痛潰膿若無眞陰相滋則瘡根不能收束色亦不紅活收斂凡視瘡之頂高根活不論老少定知氣血有餘故知老幼俱可無妨又宜交會明白交會者瘡根與好肉交界之處高低自然分別明白瘡形與好形各無混雜自然分明也以此觀之了然明白矣

高腫起者忌用攻利之藥以傷元氣平塌漫者宜投補托之劑以益其虛

註 凡瘡初發自然高起者此瘡原屬陽證而內臟原無深毒亦且毒發於表便宜托裏以速其膿忌用內消攻伐之藥以傷脾氣膿反難成多致不能潰斂又瘡初起不高不赤平塌漫者此乃元氣本虛急宜投托裏溫中健脾之藥催托毒氣在外庶無變證矣

內熱甚者量加消毒清劑便祕燥者必須通利相宜使臟腑得宣通則氣血自流利

註 腫瘍時內熱口乾脈實煩躁便祕喜冷者此為邪毒在裏急與寒涼攻利宜內疎黃連湯四順清涼飲內消沃雪湯俱可選用又兼有表證者防風通聖散去麻黃或雙解散加桔梗天花粉又或小便不利者兼入天水散五苓散俱可合用務使二便通利以杜其源又有元氣素虛者恐不勝前藥以托裏消毒散加蜜炒大黃或兼豬膽套法亦得通利為度首尾俱要閉而不結通而不泄得臟腑和平表裏透徹方可便用托裏排膿內補之藥又如潰瘍時雖有口乾便閉臟腑不和小水不利等

證此因潰後膿水出多內亡津液氣血虛耗不能榮潤臟腑所致其人必脉細而數口和而乾飲食減少好飲熱湯此乃虛陽之火爲病非前說有餘所比只宜養氣血滋津液和臟腑理脾胃如此治之則二便自和亦無變證常有悞行攻利多致不救者

十日之間瘡尚堅必用鈹鍼當頭點破

註凡瘡十日已後自當腐潰爲膿如期不作膿腐仍尚堅硬者此屬陰陽相半之證瘡根必多深固若不將針當頭點入寸許開竅發泄使毒氣無從而出必致內攻也倘內有膿又便易出此爲開戶逐賊之意也亦有十日外瘡雖不腐潰形尚紅活焮熱腫痛此雖膿遲後必自出不必針之蓋緣元氣不能充足或失用補托之藥又悞用寒凉或蓋覆未暖多致膿遲有此證者宜用補中健脾大托補藥以得膿爲效又以十五日至二十一日爲期過此外者縱有稀膿但元氣被毒相拒日久必致耗散誠難歸結也

半月之後膿亦少須將藥筒對頂拔提有膿血之交粘必腐肉之易脫

註　如瘡半月後仍不腐潰不作膿者毒必內陷急用鈹針品字樣當原頂寸許點開三孔隨瘡之深淺一寸二寸皆可入之入針不痛再深入不妨隨將藥筒預先煑熱對孔竅合之良久候溫取下如拔出之物血要紅而微紫膿要黃而帶鮮此爲血氣營運活瘡其人必多活又謂膿血交粘用藥可全色鮮紅活腐肉易脫如拔出瘀血紫黑色敗氣穢稀水無膿者此爲氣血內敗死瘡所謂氣敗血衰神仙歎哉此等之瘡難久候其人必在月終亡

且如斯時內有膿而不得外發者以針鉤向正面鉤起頑肉用刀剪當原頂剪開寸餘使膿管得流通庶瘡頭無閉塞

註　已用藥筒拔膿之後外既有孔內竅亦通瘡期又當大膿發泄之候如尚膿少此瘡頭必有瘀腐塗塞內肉亦有頑膜阻隔多致膿管不通難出也須用針鉤鉤起瘡頂頑肉以鈹針利剪隨便取去

寸餘頑硬之肉取之微痛或有血出俱不妨隨用兩手輕重得宜從瘡根焮處漸漸捺至中間剪出膿管處內有聚膿自然湧出以黃色稠厚爲吉其膿日漸多者爲輕反此爲慮務使塗塞者開之令膿毒外發也

頻將湯洗切忌風吹

註　凡瘡未潰前或已用照藥後俱要煎葱艾湯每日淋洗瘡上一次甚者早晚二次使血氣疎通易於潰散又已潰時及藥筒提拔之後尤宜避風先

去舊藥用方盤靠身瘡下放定隨用猪蹄湯以軟絹淋湯瘡上併入孔內輕手捺淨內膿庶敗腐宿膿隨湯而出以淨爲度再以軟帛疊成七八重勿令大乾帶湯覆於瘡上兩手輕盈旋按片時帛溫再換如此洗按四五次使血氣疎通患者自然爽快亦取瘀滯得通毒氣得解腐肉得脫疼痛得減此手功之要法大瘡不可缺也候腐脫已見紅肉時洗後隨用玉紅膏用抿脚挑膏於手心捺化搽塗新舊肉上外用太乙膏蓋之四邊脚根已消處

不必箍藥每日如此用之不數日間膿腐盡脫新肉頓生更加內補調理得宜輕瘡只在月餘大瘡不過七十日必完口而愈

關節在於斯時變生出於此候

註　陽瘡以十四日爲關陰瘡二十一日爲節此時務要出膿勢定膿出則腐脫腐脫則肌生肌生則收斂收斂則瘡平亦由次序來也如期不得膿者後必有變所謂一關順後必多順一關逆後必多逆也

治當大補得全收斂之功切忌寒凉致取變生之局

註　凡瘡潰後五臟虧損氣血大虛外形雖有餘而內臟實不足法當純補乃可無虞但見已潰時發熱惡寒膿多自汗作痛者便進十全大補湯但見虛熱少睡飲食不甘者便進黃芪人參湯但見皮寒骨熱欬嗽有痰者便進托裏清中湯但見四肢倦怠肌肉消瘦面黃短氣者便進人參養榮湯但見膿多心煩少食發躁不睡者便進聖愈湯但見脾虧氣弱身凉脉細大便溏泄者便進托裏溫中

湯但見飲食不甘惡心嘔吐者便進香砂六君子湯但見脾虛下陷食少虛熱間作者便進補中益氣湯但見腎虛作渴不能相制心火者便進加減八味丸倣此選用蓋托裏則氣血壯而脾胃盛膿自排毒自解死肉潰新肉生飲食進瘡口斂若不務補托而悞用寒涼謂之眞氣虛而益虛邪氣實而益實多致瘡毒內陷膿多臭穢甚則脉洪大渴面紅氣短此眞氣虛而死矣

蓋瘡全賴脾土調理必要端詳

註脾爲倉廩之官胃爲水穀之海胃主司納脾主消導一表一裏一納一消運行不息生化無窮至於周身氣血遍體脉絡四肢百骸五臟六腑皆藉此以生養蓋脾胃盛者則多食而易饑其人多肥血氣亦壯脾胃弱者則少食而難化其人多瘦氣血亦衰所以命賴以活病賴以安況外科尤關緊要善養生者節飲食調寒暑戒喜怒省勞役此則不損其脾胃也否則精神氣血由此日虧臟腑脉絡由此日損肌肉形體由此日削所謂調理一失

百病生焉故知脾胃不可不愛護矣

冬要溫牀暖室夏宜淨几明窻

註　凡人之氣血喜暖而惡寒蓋遇寒則結遇熱則散況瘡乃肌肉破綻之病若不防禦則風寒最爲易襲凡看瘡時冬要著柴炭之火烘烘暖氣逼盡餘寒夏宜淨几明窻庶外風不入然後方可揭膏洗貼瘡上常見患者夏月縱意當風取凉或睡臥陰濕之處冬又不從溫牀暖室多致寒侵輕則有妨生肌完口重則變爲崩塌不膿不斂陰證

飲食何須戒口冷硬膩物休餐

註　人賴飲食以生養要適其時如腫痛自然傷胃氣諸味不喜直待潰後膿毒一出胃氣便回方能思食但所喜者便可與之以接補脾胃如所思之物不與此爲逆其胃氣而反致不能食也但不可太過然生冷傷脾硬物難化肥膩滑腸故禁之

癰疽雖屬外證用藥卽同內傷

註　如癰疽腦項疔毒大瘡形勢雖出於外而受病之源實在內也治之豈可捨內而治外乎所以外

不起者內加托藥表熱甚者內必清解血虛宜用四物湯氣虛宜用四君子脉虛足冷溫中脉實身熱凉膈以此推之內外自無兩途

脉虛病虛首尾必行補法表實裏實臨時暫用攻方

註　丹溪云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用凡瘡既破臟腑已虧一毫凉藥亦不可用誠哉是言也茲說又有不然且如初病未破時脉得微沉緩濇細數浮空外形又兼身凉自汗便利嘔吐少食瘡形又不起發不焮不痛無潰無膿此等證

皆緣氣血虛弱之故若執前云未破毒攻臟腑之說必投凉藥攻之復損元氣其能生乎予謂治病不論首尾難拘日數但見脉證虛弱便與滋補乃可萬全如補不應虛弱甚者須用參术膏八仙糕陽虛自汗食少者單人參膏或六君子湯加砂仁木香甚則加附子泄瀉腸鳴胃虛嘔逆者參苓白术散加豆蔻山藥木香柿蔕脾虛下陷溏泄及肛門墜重者補中益氣湯加山藥山萸五味子選用又有表實者身體發熱無汗惡寒裏實者脉大身

熱便燥口乾假如表證急者先用荆防敗毒散以解其表裏證急者先用四順清凉飲以攻其裏表裏相兼者宜防風通聖散發表攻裏此隨其表裏先後治以活法古人謂受補者自無痰火內毒之相雜不受補者乃有陰火濕熱之兼攻又謂補而應藥者多生虛而不受補者不治

病要論久新要法在於寬治猛治

註病有新久勢有緩急如受病之初元氣未弱治當隨證迎刃而解若行霸道猛劑定不能決效於危急時也但要中病即已表證盛者用萬靈丹大加表散裏證急者以內疎黃連湯急與通行又如受病日久邪正相拒其元氣未有不衰弱者縱有餘證雜證壞證俱當先固其本而後調之和之散之使病氣漸退元氣漸醒飲食漸進根本漸實則餘患再無不愈之理常見治者不論病之新久本之盛衰又不悟因虛致病因病致虛其中又有虛熱虛寒之別一例妄行攻治如盲人騎瞎馬半夜臨深池豈不危哉

藥必求標本功莫別於先醫後醫若一槩以攻補恐兩途之悞用

註 以天地運氣標本言之五運爲本六氣爲標以身體標本言之五臟爲本六腑爲標以疾病標本言之初病爲本傳病爲標元氣爲本病氣爲標凡治病者必先治其本後治其標誠爲妥當若先治其標後治其本使邪氣滋甚其病益增又謂緩則治其本急則治其標假如先得瘡疾而後得泄瀉嘔吐食少等證此又宜捨本從標之法治之候瀉止嘔定食進方再治瘡餘倣此若一槩攻補必兩途悞用此屬疾病邪正之標本也

又說陽變爲陰內外被寒凉尅伐

註 發於陽者爲癰爲熱爲實爲疼此原屬陽證易治多因患者不覺以爲小恙不早求治又外受風寒內傷生冷或再被醫者失於補托又以凉藥敷圍圖其內消以合病家之意多致氣血冰凝脾胃傷敗使瘡毒不得外發必致內攻以成不救者多矣如變在十一日未出膿之前形勢與好肉相平

不疼不熱輭慢相兼瘡孔止流清稀肥水更兼身體不熱脈亦微細飲食厭餐精神昏短此乃瘡毒變入眞陰雖强投溫中健脾之劑而不應者百無一生如變在十五日之後已出膿時毒氣已將外發或調攝失宜悞餐冷物忽變爲陰者急投托裏溫中湯十二味異功散輕者十全大補湯倶倍加參芪桂附以救之須得瘡熱作痛膿出身溫脈起食進者爲吉若瘡原本於陽自多得生也

豈期陰變爲陽首尾得辛熱扶妝病分眞似理究陰陽

註　發於陰者爲疽爲冷爲硬爲虛此原屬陰證難治患者知覺欲其生而故將辛香酒煎大方熱藥以助之醫者又欲患處高腫焮熱作膿敷以熱藥圖其起發故瘡得藥性大熱而轉陰爲陽雖得微腫微熱微痛微膿但瘡形終不似眞陽紅活亦不能得其眞厚黃膿以瘡原本於陰故多死若治法得宜內外融和奇偶中節十中亦有一二可生者要如救焚拯溺可施者毋待少頃切似履冰臨淵

可禁者毋妄絲毫也

旣有針工之異說豈無線藥之品詳

註 腫高而軟者發於肌肉膿熟用針只四五分腫下而堅者發於筋脈膿熟用針只六七分腫平肉色不變者毒氣附於骨也膿熟用針必須入深寸許方得見膿又輕按熱甚便痛者有膿且淺且稠重按微熱方痛者有膿且深且稀按之陷而不起者膿未成按之輭而復起者膿已成按之都硬不痛者無膿非是膿卽瘀血也按之都輭不痛者有膿非是膿卽濕水也所謂有膿卽當針膿孔宜順下若膿生而用針氣血反泄膿反難成若膿熟而不針腐潰益深瘡口難斂若膿深而針淺內膿不出外血反泄膿淺而針深內膿雖出良肉受傷元氣虛者必先補而後針之諸證悉退又有氣癭腫而綿軟不痛者血癭腫而內壘成塊者頑毒結之日久皮腐肉紫根硬四邊紅絲纏遶者結核之證漸大漸腐漸痛者已上四證俱不可妄破妄破定然出血不止者立危但用針之法妙在膿隨針出

而寂然無所知覺也至於瘻癅瘰癧痔漏疔毒堅硬頑瘡諸證若非線藥之功亦不能刻期收效湯散丸丹要在發而必中神聖工巧誠爲學者機關千方百證難盡短長治在活法貴在審詳用之得當醫可稱良詞雖粗鄙後學提綱

註嘗言昔者承平今時擾攘所以動靜世務不同勞逸機關已異當原受病從外而來今之受病從內而發古者多實設方宜散宜宣今者多虛治法宜滋宜補若醫者不識古達今一槩施與必多夭枉也

陽證歌第三

癰疽不論上中下惟在陰陽二證推發背雖有正與偏要取高低兩樣看純陽初起必焮腫更兼身熱有微寒頂如尖字高突起腫似彎弓根有盤七日之間多焮痛二七之期膿漸漫動息自寧食知味二便調勻無瀉乾腫消膿潰精神爽脫腐生新氣血完五善自然稱並至七惡全無半點干痛便隨膿減腫退自肌寬新肉已生紅艷艷腐皮自斂白漫漫一身多爽

快五臟盡和歡此屬純陽俱易治百人百可保全安

陰證歌第四

純陰初起不知瘡粟米之形疙瘩僵不紅不腫不知痛少熱少焮少隄防七朝之後身體倦瘡根平大喜澆湯頂不高兮根不活色不光兮腐不穰陷軟無膿空結聚脉浮散大細飛揚飲食不餐身戰慄嘗湯止見意倉忙瘡上生衣如脫甲孔中結子似含芳膿多臭穢身難便舉動愴惶韻不長瘡形成黑紫面色變青黃精神昏憒多鼾睡言語無人自發揚口乾多舌强痰喘定身亡此屬純陰俱不治百人百可到泉鄉

半陰半陽證歌第五

陰陽之證兩相交生死同兼事可招微熱微寒微赤腫半昏半爽半平高脉來雖數多無力飲食雖餐不易消腫而不潰因脾弱潰而不斂爲膿饒大便多溏小便數上身有汗下身焦五善雖兼有七惡未全逃口渴喜茶腸腹痛面浮饜飲足心高心煩不穩睡神亂怕音焦投方應病方爲妙陰轉爲陽漸可調心眞造化爾命堅牢逢之任是神仙手半死餘生定莫逃

五善歌第六

心善精神爽言清舌潤鮮瘡疼兼不渴睡醒得安然
肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康
脾善脣滋潤衾幃蘭麝香凡餐俱有味膿厚更肥黃
肺善聲音嚮無痰韻更長肌膚多滑潤大便自尋常
腎善誠爲要水升火自降口和兼不渴小水得稀長

七惡歌第七

一惡神昏憒心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃
二惡腰身強雙睛邪視人瘡頭流血水驚悸是肝迍
三惡形消瘦膿清臭穢生瘡形多軟陷脾敗不知疼
四惡皮膚槁聲嘶韻不長痰多兼喘息鼻動肺將亡
五惡成消渴飲多口更乾形容多慘黑囊縮腎眞傷
六惡身浮腫腸鳴嘔呃頻大腸多滑泄臟腑並將傾
七惡瘡倒陷形如剝鱔同四肢多冷逆汚水自流通

治病則例歌第八

外科之瘡有治例說與君家須切記病端百出別根因方法甚多豈同類熱與寒通與祕其中消息知端的通多不足祕多餘熱實寒虛分證治陽似陰陰似

陽似中妙理要推詳不分表裏一例治輕變重而重變亡醫者貴乎多應變不可偏執用其方且如表證惡寒宜用荊防敗毒散裏證發熱可施內疎黃連湯瘡勢已成托裏消毒散誠爲正法內膿將潰十全大補湯最是相當人參養榮湯治潰後虛熱發作木香流氣飲散結腫寒濕爲殃飲食不甘定用香砂開胃精神怯少須將參朮回陽陰虛陽虛須八珍最爲要領盜汗自汗得獨參一味可強潰後多疼乳香定痛散功奇莫緩脾虛下陷補中益氣湯奏效尤良口燥讝言瀉實火須黃連解毒（湯）心煩衄血理虛陽必犀角地黃（湯）古法治癰疽稱述僊方活命飲今時醫發背還期神授衞生湯蟾酥丸在外科稱爲獨品護心散解內毒號曰無雙詎知蠟礬丸護膜護心可羨淡中有味還讚玉紅膏生肌生肉堪誇壞裏呈祥身凉自汗腹痛腸鳴嘔逆豈逃異功散睡臥不寧虛陽發躁膿多定用聖愈湯生脉散接虛羸脉來微細歸脾湯除驚悸睡得安康竹葉石膏（湯）治虛煩身熱者何須疑慮麥冬清肺（飲）除膈熱有痰者毋待商量金鯉

湯治肺癰吐膿氣急元龜丹攻結毒臭腐頑瘡風熱生瘡通聖散瘡瘍狂躁破棺丹小柴胡（湯）除客邪往來潮熱大防風（湯）攻腿膝寒濕爲殃咽腫咽疼定用清咽利膈散斑紅斑紫豈逃化斑解毒湯八味丸蠲口乾妙藥二神丸治脾泄奇方香連丸爲臟腑瀉痢通用甘露飲治口齒腐爛相當六和湯和脾止吐瀉雙解散解表理內傷逍遙散善治女人諸病保元湯常扶赤子多傷皮膚毛髮乾焦蘆薈丸效應甚捷咽喉口齒腫痛冰硼散功實非常滋腎丸治下元腎虛不固凉膈散解上焦膈熱多煩九龍丹消魚口吞之滅跡二蛟散行濕腫服下安康呂祖一枝梅止痢定驚稱爲僊藥眞君妙貼飲消疼止痛號曰神方痔漏瘻瘤疔毒古誇三品錠癰疽流注諸風今羨萬靈丹柴胡清肝湯治鬢疽肝膽有效黃連消毒飲醫對口督脉尤良小兒口內生疳必用人中白散大人咽喉腫痛須將金鎖匙湯下疳新久珍珠散小便淋澀木通湯玉眞散破傷風效復元湯跌撲稱强提肩散治肮髆强直作痛拈痛湯除痛腿風濕相傷小便生疳

龍膽瀉肝湯可羨大頭腫痛普濟消毒飲何妨便毒懸癰內消散呑何足慮臀癰腿病芪柴湯下自無殃又有女子陰瘡能腫能疼能至癢在人活法或消或補或蟲妨蓋男子之囊癰瀉肝經之濕熱小兒赤遊丹解毒兼砭血凡治楊梅瘡戒熏爲至切舌下發痰包利剪方能泄出如雞蛋清消痰是眞訣結毒與頑瘡紫金膏可貼風瘡徹骨癢雄黃散效絕疔瘡先刺血內毒宜汗泄禁灸不禁針怕綿不怕鐵又有失榮腫堅硬如巖凸强陰失道證形狀要分別婦人之乳巖此中一例決未破肉崚嶒已潰流臭血如此幾般證古今無治說瘡有數百種難以都陳白惟在一點心何須三寸舌學者若精靈萬事皆通徹此爲粗糙歌可議亦可閱

灸法併禁灸瘡穴第九

凡瘡初起惟除項之以上餘皆並用艾火隨瘡勢之大小灸艾壯之多少用蒜切成薄片安於瘡頂上著艾炷蒜上點火三壯一換蒜片初灸覺痛以不痛似癢爲止初灸不痛以知痛癢爲住如初灸全然不覺

痛癢宜去蒜當明灸之又陰瘡日數多者艾炷不及事以蒜搗爛鋪於瘡上以艾亦鋪蒜上點火灸之必知痛甚爲效此爲火氣方得入裏知痛深處方是好肉蓋艾火拔引鬱毒透通瘡竅使內毒有路而外發或爲瘡科首節第一法也貴在乎早灸爲佳又有禁灸數證亦以叅詳頭乃諸陽之首純陽無陰之處凡生瘡腫俱是亢陽熱極所致如再加艾火使毒氣熾甚隨後反加大腫最能引動內痰發之必死面生疔毒亦然又有腎俞一穴在於兩腰脊旁係內腎命根所係之處此穴發瘡多因房勞素虧腎水枯竭而成若再加艾灸火爍其源必致內外乾涸多成黑陷昏悶而死又有患者元氣素虛發瘡多不高腫其人體必倦怠精神必短而昏脉必浮散空虛數而不鼓此內無眞氣抵當火氣如灸之其人必致昏憒而死常謂艾火不虧人此言悮矣

論病生死法第十

初生如粟裏可容谷外面如麻裏面如瓜外面如錢裏可容拳起勢大終無害未老先白頭無膿軟陷休

瘡從疙瘩起有膿生方許腫潰氣昂昂不治自安康
根高頂又高八十壽還饒焮腫易腐爛任大終無恙
瘡高熱焮疼雖苦必然生瘡軟無神氣應補方爲益
肉腫瘡不腫必竟生疑恐膿穢不進食泄瀉黃泉客
瘡色豬肝紫無膿必定死綿潰不腐爛內怕葡萄嵌
仰臥不知疼陰證命難生腐盡有敗氣笑裏終生戾
根散瘡平塌神仙無治法久病目露神必竟命難存
面忽似塗脂十日後分離敗中有橫肉雖重生門路
新肉如板片不食終須變手足皮枯槁血敗生難保
脣白眼無神腹脹瀉將傾醃氣不滃氣雖重多生意
眼匡黑氣濃癰疽怕此逢房中香馥馥是病終爲福
瘡熱身微熱輕病何須說生死此中求片言一可決

察形色順逆第十一

凡看人病兼視其形色後與脈病相參誠識於始以決其終百無一失矣何以知之陰病見陽色腮顴紅獻陽病見陰色指甲呈青此二者俱死又身熱脈細脣吻反青目珠直視者死面如塗脂色若土黃油膩黑氣塗抹者死脣舌乾焦鼻生煙煤眼神透露者死

形容憔悴精神昏短身形縮小者死喘粗氣短鼻掀睛露語言讝妄者死循衣摸牀遺尿失禁撮空者死頭低項軟眼視無神吸吸短氣者死皮破無血肉綻爛斑痳木不知痛癢者死齒黃色如煮豆脣自反理無紋耳黑枯焦不聽人中縮而坦平口張氣出無回閉鼻煽相隨呼吸行汗出如珠不散痰若膠而堅凝白血紅如肺色指甲灣而帶青神昏神浮神離神亂緇衣生滿面黑氣慘天庭逢之都沒命法在此中評

病有三因受病主治不同論第十二

三因者內因外因不內外因此說從於先古其詞意尚有發而未盡者內因者皆起於七情蘊結於內又兼厚味膏粱熏蒸臟腑房慾勞傷虧損元氣乃五臟受之其病由此內發者但發之多在富貴人及肥胖者十有八九其見證瘡多堅硬根蔕深固二便不調飲食少進外軟內堅平陷無膿表實裏虛毒多難出得此者即病證之內傷也故曰內因外因者皆起於六淫體虛之人夏秋露臥當風取凉坐眠濕地以致風寒濕氣襲於經絡又有房事後得之其寒毒乘虛

深入骨髓與氣血相凝者尤重或外感風邪發散未盡遂成腫痛此肌肉血脉筋骨受之其病由此外來者發之多在不善調攝澡薄勞碌人十有八九見證多寒熱交作筋骨疼痛步履艱辛濕痰流毒以及諸風癱瘓口眼歪斜半身不遂風濕風溫天行時毒等證得此者卽疾病之外感也故曰外因又有不內外因內無七情干內外無六淫傷外何由來也其病得之於饑飽勞役喜怒不常飲食者冷熱不調動作者勤勞不惜以致臟腑不和榮衛不順脾胃受傷經絡凝滯故爲疾者外無六經形證內無便溺阻隔其病多生於膜外肉裏肌膚之間似瘰癧痰注氣痞癭瘤之屬治法不必發表攻裏只當養氣血調經脉健脾和中行痰開鬱治之法爲最善此三因之理盡矣

調理須知第十三

凡人無病時不善調理而致生百病況旣病之後若不加調攝而病豈能得愈乎其調治有法初起病時先看病者元氣虛實次看瘡之陰陽險否然後用藥調治當攻卽攻可補便補不可因循耽悞以致變態

不虞也且患者又當安定心神相忘諸念毋使倉皇乃保神氣不得變亂也再順天時假如夏熱坐臥不可當風忌置水於榻前牀下冬寒須避起居常要溫和非燃火不可開瘡看視恐有寒侵致生多變又未潰之先毒氣內作倘有口乾渴證者凉物須當少少與之以滋蘊熱至膿潰之後生冷硬物一槩禁之不然傷脾損胃膿必難成致瘡軟陷又難收斂飲食須當香燥甘甜粥飯隨其喜惡毋餐過飽宜少宜熱宜濃方無停滯又得易化故也如大瘡潰後氣血兩虛

脾胃並弱必製八仙糕早晚隨食數餅以接補眞元培助根本再熬參朮膏如患者脾胃俱虛飲食減少胷膈不寬飲食無味者用白朮膏三匙人參膏二匙清米湯空心化服喜飲酒者酒化亦可若精神短少昏沉多睡自汗勞倦嬾於動作者用人參膏三匙白朮膏二匙亦酒化服如肌膚粗澁面蒼不澤或大便血少虛祕以及皮乾髮槁者同地黃膏各二匙和服或飲陽春酒更妙其功强健精神頓生氣血開胃助脾潤肌榮骨此二藥功甚非小大瘡不可缺之實非

草藥之比病者當信用之乃無更變若泛視之則病多反復不常故有易愈難愈之分實在乎得此失此也

雜忌須知第十四

凡病雖在於用藥調理而又要關於雜禁之法先要灑掃患房潔淨冬必溫幃夏宜涼帳庶防蒼蠅蜈蚣之屬侵之一切尼僧孝服經事見行婦女及遠客生人開瘡時俱當忌見牛犬腥羶醃臘熏藏之物俱能作渴生乾瓜果梨柿菱棗生冷等類又能損胃傷脾雞鵝羊肉蚌蛤河豚蝦蟹海腥之屬並能動風發癢油膩煎炒烹炙鹹酸厚味等件最能助火生痰赤豆蕎麪動氣發病惱怒急暴多生痞滿飲食太過必致脾泄瘡愈之後勞役太早乃爲羸證入房太早後必損壽不避風寒復生流毒不減口味後必瘡癢無度大瘡須忌半年小瘡當禁百日此誠爲知命君子也

看法

初起頂高根活色赤發熱焮腫疼痛日漸高腫者順

已成焮痛皮薄光亮飲食如常二便調和身溫者順

已潰膿稠色鮮不臭腐肉自脫焮腫易消身輕者順

潰後膿厚稠黃新肉易生瘡口易斂飲食漸進者順

初起頂平根散色暗微腫不熱不疼身體倦怠者逆

已成腫堅色紫不作膿不腐潰惟口乾多煩躁者逆

已潰皮爛肉堅不腐腫仍不消痛仍不減心煩者逆

潰後膿水清稀腐肉雖脫新肉不生色敗臭穢者死

腫瘍治法

初起知痛或不痛起發或不發毋論陰陽表裏日數遠近但未見膿者俱宜灸之既灸不知痛癢明灸之焮腫發熱疼痛有時脈浮數無便祕者宜藥托之身體拘急脈緊惡寒飲熱就暖者邪在表也宜汗之腫硬痛深口乾便祕身熱脈實者邪在裏也宜下之焮痛勢甚煩躁飲冷舌乾口燥者火在上也宜清之腫痛堅硬背如負石惡心乾嘔邪毒在內解毒拔之腫痛日深內膿不出瘀肉塗塞瘡口者急宜開割之軟漫不作膿及不腐潰者陽氣虛也壯脾胃助陽氣身凉自汗手足並冷六脈虛細便泄陽脫也急溫之

潰瘍治法

膿熱不潰瘡不焮熱食少便溏者脾虛也補托溫中膿清或多瘡口散大不生肌者裏虛欲變證峻補之腐肉雖脫新肉生遲如凍色者肉冷肌寒大溫氣血潰後食少心煩不睡發熱作渴脾弱陰虛補中益氣身涼脉細倦怠嬾言食不知味者脾弱也醒脾助胃風寒襲於瘡口皮白綻而不收斂者外照而內溫補潰後面黃肌瘦膿水清稀瘡色淡白者當香燥助脾脉大無力細濇微沉自汗身涼者氣血俱虛峻補之出血或膿多五心煩熱躁甚不眠者亡陽也急補之瘡口已合經犯房勞或値急暴復崩潰者仍助氣血

瘡名十則

背之左右謂疽癰手膊肩臂亦一同肺疽居右癰居左蜂癰左右近喉嚨耳後右爲銳毒看夭疽左耳後相逢左右兩肩名搭手井疽正發在心中流注牽藤六七成發於心下正臍平脅疽生在脅肋下陰疽大體近期門穿踝疽穿孤拐下脚氣原來脚底生左左爲便毒右魚口鶴膝風前膝眼成肩下臑癰腋下疽喉嚨上下氣癰醫當脉旡疽君可

記三寸相離穿骨基紅絲疔從手上起蛾子喉風口內隨腎疽當腎生左右三里穴發附陰疽離臍四寸爲嚇癰再高三寸號幽癰腸癰還從臍突起胷疽乳上心肺中合谷一疔名虎口蛇頭魚肚指頭逢腦後一疽名玉枕莫作如常一樣同肩疽樂疽居右手石橊離肘上三分左元陰右襠疽發咬骨陰包穴上生淵疽腎上腿附骨佛頂疽生腦頂門人世毒瘡當切記管教患者即安生顴骨爲疔脣上疽鬢邊所發亦疽醫眉中鳳眉旁侵腦黑疔耳內不爲奇鼻內生疔當速療透腦原來髮際基眉尾瘭疽能大毒頰疔魚眼近腮齊馬刀瘰癧氣癭瘡一氣生來在頸間虎毒龍泉脣上下對口原來髮下藏牙根脣上癰莫異牙下生之疽一行頂牙縫突爲疔治休作人間容易瘡心肝脾肺腎癰疽當看胷中穴道醫更有黃頭井白泡發無定處速如飛左爲坐馬右下馬尾骨頭尖鶴口疑此物殺人能致命火急攻醫切莫遲婦人之乳有數種高腫爲癰堅硬疽還有乳巖眞惡

證腫如頑石破如壚鈕叩之風生頸項裙帶風瘡脚下需又有濕臁瘡等疾總生下腿上安居嬰兒走馬爛牙疳黑腐沿開臭不堪赤遊丹毒渾身到鵝口瘡苔滿口漫風瘡奶癬多搔癢血灌膿窠痛欠安還有心脾胎熱證口疳重舌一般看

疔瘡論

夫疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之淺深臟腑之乖逆節候之寒溫肅殺之瞬息畜類尸忤性情激變暴戾一時發生立判人之氣血虛者各隨臟腑而中之且如毒氣發於心經者生爲火焰疔其患多生唇口手掌指節間其發初生一點紅黃小泡抓動癢痛非常左右肢體麻木重則寒熱交作頭運眼花心煩發躁言語昏憒此等出於心經之病也毒氣發於肝經者生爲紫燕疔其患多生手足腰脅筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目昧指甲純青舌强神昏睡語驚惕此等出於肝經之病也毒氣發於

脾經者生爲黃鼓疔其發初生黃泡光亮明潤四邊紅色纏繞其患初生口角腮顴眼泡上下及太陽正面之處發之便作痲癢綳急硬强重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此等出於脾經之病也毒氣發於肺經者生爲白刃疔其發初生白泡頂硬根突破流脂水癢痛驟然易腐易陷重則腮損咽焦毛聳肌熱欬吐膿痰鼻掀氣急此等出於肺經之病也毒氣發於腎經者生爲黑靨疔其患多生耳竅胷腹腰腎偏僻軟肉之間其發初生黑斑紫泡毒患皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉困軟陷孔深目睛透露此等出於腎經之病也已上五疔相應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人多作寒熱甚則惡心嘔吐遲者紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血尋至初起瘡上挑破俱用蟾酥條插入膏蓋內服汗藥散之自愈凡治此證貴在乎早初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全一二初起項以上者三陽受毒必用鈹針刺入瘡心四

五分挑斷疔根令出惡血隨用回疔丹或蟾酥條插入孔內膏蓋之如項之以下者三陰受毒卽當艾灸灸之不痛亦須針刺插藥方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其大汗毒方得解庶不稽留毒氣致生變證今人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反致倒陷走黃之證作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如尸胖七惡頓起治雖有法百中難保一二外

又有疔名數種形狀紛紛故有舊說未及重錄也

看法

初起如疥形如粉刺或小泡或疙瘩結腫不散者順瘡腫不作寒熱亦不惡心飲食有味手足溫暖者順形勢已成瘡腫肉不腫四圍白色多痛少癢作膿者順已潰出膿瘡仍高腫肉色鮮明根內紅活漸平者順初起似疔非疔軟慢灰色四邊瘡根平塌漫腫者凶未發前先作寒熱如瘧惡心不食後出瘡如蚊跡蚤斑或青紫黑泡軟陷無根腐爛深孔氣粗足冷者

逆瘡形似魚臍項凹灰白輭慢相兼脈細身冷者多逆已成肉腫瘡不腫根脚走散瘡頂空腐血水氣穢者死凡疔生項之以上針刺不疼項之以下灸之不痛俱死已經走散頭項耳面俱腫煩躁脈細痰動喘急者死日久原瘡無跡走散之處仍復作膿脈數脣焦終死病雖險惡歲運順者可活瘡雖微險歲運逆者常危

治法

初生項之以上者必先針刺以去惡血庶毒不攻內

初發項之以下者必先艾灸以殺其勢庶不侵良肉

發熱惡寒身體拘急六脈緊數邪在表也宜汗散之

身體發熱口燥咽乾脈實有力二便祕澀者宜下之

針刺之後瘡不作腐邊腫不消仍加插藥內用補托

初起悞灸致毒走黃不住者急當隨走處砭去惡血

惡寒發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏宜解毒清心托裏護膜潰後氣血受傷神怯食少睡臥不寧宜助脾胃斂神氣將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急滋養腎水

多骨疽論

多骨疽者由瘡潰久不收口乃氣血不能運行至此骨無榮養所致細骨由毒氣結聚化成大骨由受胎時精血交錯而結日後必成此疽也但腎主骨宜服腎氣丸十全大補湯先補脾腎次用艾附餅灸之令溫煖腐毒朽骨自然脫盡生肌斂口而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十四卷目錄

醫部彙考三百六十四

外科癰疽疔毒門六

方一

內疎黃連湯　內托復煎散　當歸黃芪湯　托裏榮衛湯　加味當歸飲子　人參敗毒散　郭氏神效烏金散　奪命丹　蟾酥丸　寸金丹　烏金散　勝金丹　奪命丹　內托羌活湯　托裏溫經湯　當歸拈痛湯　復煎散　金鍼散　精要十宣散　十六味流氣飲　千金托裏散　托毒散　聖濟射干湯　托裏散　破棺丹　瀉心湯　清凉飲　精要漏蘆湯　內消升麻湯　孫眞人單煮大黃湯　宣毒散　內托散　車螯散　內消丸

神仙解毒萬病丸 郭氏瑞效丸 萬靈奪命丹 一粒金丹 威靈仙飲 五香連翹湯 千金漏蘆湯 防風通聖散 中和湯 內托散 國老膏 解毒散 清心內固金粉散 內追毒丹 獨勝散 遠志酒 五香散 忍冬酒 生地黃散 阿膠飲子 牛膠飲 黃礬丸 托裏消毒散 托裏散 散毒飲子 神效托裏散 黃芪散 黃芪四物湯 內固黃芪丸 回陽湯 清熱消毒散 黃連消毒散 黃連解毒湯 排膿湯 排膿散 連翹飲 柞木飲子 車螯散 內消散 化毒爲水內托散 仙方活命飲 保安方 祕方 托裏散 祕方拔毒散 歸芪湯 榮衛返魂湯 龍虎交加散 如神托裏散 前鋒正將 引兵先鋒 加味十奇散 豨薟散 圍藥 敷藥 將軍鐵箍膏 又方 正鐵箍散 大鐵箍散 水黃散 外用漬毒藥 圍腫方 神白膏 雄黃散 鐵井欄 烏龍膏 宣毒散 拔毒散 蠲毒散 退毒散 神功妙貼散 特異萬靈散 又方 隔皮取膿法 雄黃散 萬應針頭丸 萬槌青雲膏 四虎散 回陽玉龍膏 洪寶丹 金黃散 天花青露散 消腫散 神護膏 水澄膏 五金膏 清水膏 水調膏 水澄膏 二黃散 揭毒散 三消散 四面楚歌 水師晶明 硇砂膏 六灰膏 援生膏 替針丸 又方 替針丁香丸 托裏溫中湯 加味十全湯 補中益氣湯 人參養榮湯 四君子湯 六君子湯 異功散 四物湯 八珍湯 十全大補湯 歸脾湯 黃芪人參湯 托裏當歸湯 人參散 麥門冬湯 護壁都尉 六味丸 八味丸 加減八味丸 人參內托散 黃芪散 當歸補血湯 沉香散 加味逍遙散 梔子黃芩湯 六合回生丹 驪龍散 麥飯石膏 解毒百用膏 逼毒散 青散子

藝術典第三百八十四卷

醫部彙考三百六十四

外科癰疽疔毒門六

方一

內疎黃連湯

治嘔啘心逆發熱而煩脈沉而實腫鞕木悶而皮色不變根脚深大病因在內臟腑祕澀當急疎利之

黃連　芍藥　當歸　檳榔　木香　黃芩

梔子　薄荷　桔梗　甘草各一兩　連翹二兩

右除檳榔木香爲末外並剉每服一兩水一盞半煎一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再加二錢以利爲度如有熱證止服黃連湯大便祕澀加大黃如無熱證止用復煎散時時呷之如此內外皆通榮衛和調則經絡自不過絕矣

內托復煎散

治腫焮於外根盤不深形證在表其脉浮痛在皮內恐邪氣盛則必侵於內急須內托以救其裏

地骨皮　黃芪　防風各二兩　桂五錢　芍藥

黃芩　白朮　茯苓　人參　甘草　當歸

防己各一兩

右㕮咀先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去蒼朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓爲湯去滓再依前煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便祕及煩熱少服黃連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此

使榮衛俱行邪氣不能內侵也

當歸黃芪湯

治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸　黃芪　生乾地黃　川芎　地骨皮

芍藥各半錢

右㕮咀水煎服

如發熱加黃芩

如煩躁不能睡臥加梔子

如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

右三方乃易水師弟治瘡之三法今特列於篇首而以古今諸方臚列於後臨病之工詳審脉證而施用之庶乎可以無失矣

托裏榮衛湯

治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝七分　人參　黃芪　紅花　眞茅朮

柴胡　連翹　當歸身　羌活　黃芩　防風

甘草炙各一錢

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服

加味當歸飲子

治諸瘡瘍諸痛癢瘡皆屬心火火鬱則發之

當歸　生地黃　升麻各五錢　防風二錢五分

荆芥穗　何首烏各二錢　柴胡　白芍藥

川芎　羌活　黃芪各二錢　紅花　蘇木

甘草各一錢

右㕮咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分食遠服沐浴取微汗效速使血氣通和服之應效

人參敗毒散

人參　獨活　柴胡　桔梗炒　枳殼麩炒

羌活　茯苓　川芎　前胡　甘草各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎一鍾服後服內托復煎散

郭氏神效烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等證若瘡黑陷如石堅四肢冷脈細或時昏昧讝語循衣煩渴危篤者服此汗之瘡起

蒼耳頭端午午時收　草烏頭　火麻頭火日收

木賊去節　蝦蟆頭　樺皮節酥炙　麻黃去根節

右曬乾各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火內從早煅至申分如黑煤色爲度碾爲末每服二錢病重者三錢用熱酒調下未汗再一服如汗乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天晴好日於靜室中勿令雞犬猫畜及陰人見之又名首功元黑散

奪命丹

治諸般瘇毒疔疽惡瘡

蟾酥　輕粉各五分　朱砂三錢　白礬枯

寒水石　銅綠　乳香　沒藥　麝香各一錢

蝸牛二十一粒另研

右件爲細末將蝸牛另碾一處如丸不就用好酒糊爲丸如菉豆大每服一丸生葱三五莖嚼極爛吐於手心包藥在內熱酒和葱送下如重車行五七里汗出爲效重者再服一二丸

蟾酥丸

治疔黃一切惡瘡

川烏　蓮花蕊　大朱砂各一錢半　乳香
沒藥各二錢　輕粉　蟾酥各一錢　麝香五分

右爲細末糊爲丸豌豆大每服一丸病重者二丸依前法服取汗

右三方郭氏稱爲首藥皆主乎發散首出太陽例後二方出少陰例然皆刼劑也智者當較輕重陰陽之分取擇用之

寸金丹

二名返魂丹三名再生圓四名追命丹五名延壽圓六名來甦圓七名知命圓八名得道圓非人勿示此方若有人患瘡身未爛者與三圓服之嚥下便活如口噤但斡開牙關研化三圓灌下喉中立生此方治發背腦疽癰腫徧身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重體壯熱

麝香一分　南乳香　烏金石　輕粉　雄黃
狗寶　沒藥各一錢　粉霜　黃蠟各三錢
硇砂五錢　鯉魚膽　狗膽各一箇陰乾用
金頭蜈蚣七條全者酥炙　頭首男孩兒乳一合

蟾酥二錢

右件爲細末除黃蠟乳汁二味熬成膏子同和丸如菉豆大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加至三丸白丁香七箇研爛新汲水調送下用衣服蓋之睡勿令透風汗出爲度大段疼痛如無頭瘡腫不過三服立效服藥後喫白粥瓜虀就睡大妙

烏金散

治疔毒腫痛

牙皂四分　人言製　蟾酥　麝香各五分

血餘煅過　蛇蛻煅過　露蜂房煅各一錢

蟬蛻酒洗　血竭　乳香　殭蠶炒去絲各二錢

全蠍三錢湯泡七次　辰砂研水飛　雄黃

穿山甲炙黃各二錢半　天龍四錢酒炙去頭足

川烏尖　沒藥

右各爲細末秤準分兩和勻每服三分赤砂糖調葱頭酒送下取汗爲度

勝金丹

治證同前

麝香　白砒製各五分　蟾酥一錢　雄黃

辰砂　乳香　沒藥　血竭各錢半　全蠍泡炙

天龍去頭足炙　穿山甲炙各三錢　殭蠶炙五錢

右爲細末和勻服法同前

奪命丹

治證同前

輕粉　麝香　白砒製各五分　白礬煅研

血竭各一錢　蟾酥酒化　銅綠　寒水石煅

乳香　沒藥　雄黃各二錢　蝸牛二十一箇連殼

右爲末先將蝸牛研爛如泥勻和前藥爲丸如菉豆大辰砂一錢爲衣如丸不就加好酒打三五百下每服二三丸先用葱白三寸與病者嚼爛吐於男左女右手心將藥丸裹入葱白用無灰酒三四盞溫熱送下被蓋取汗爲度重者不過三服

內托羌活湯

羌活　黃蘗酒洗各三錢　防風　藁本　連翹

當歸各一錢　肉桂三分　甘草炙　蒼朮

陳皮各五分　黃芪一錢五分

右作一服酒二大盞水一大盞煎至一盞去滓熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈

托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍惡寒發熱或相引肢體疼痛

麻黃去根節　白芷　當歸各二錢　防風去蘆
葛根各三錢　升麻四錢　炙草　白芍各錢半
人參　蒼朮各一錢

右剉如麻豆大每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸熟去沫再下餘藥同煎至一盞去滓大溫服訖臥於暖處即以綿衣覆之得汗而散

當歸拈痛湯

治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外臁瘡膿水不絕或癢或痛脉沉緊實數動滑者並宜服之

羌活　人參　苦參酒製　葛根　眞茅朮
升麻各二錢　黃芩酒製　茵陳葉酒拌炒
甘草炙各半兩　防風　當歸身　知母酒製

澤瀉　猪苓各三錢　白朮一錢半

右㕮咀每服一兩水煎空心服臨睡再服之

復煎散

治癰疽發背

黃蘗　黃芩　黃連　知母　生地酒洗各一錢
防己　山梔　羌活　黃芪　麥門冬　甘草炙
獨活　人參各半錢　當歸尾二錢　陳皮
防風梢　甘草梢生　蘇木　當歸身　五味子
猪苓　藁本　連翹　桔梗各一錢半

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓隨證上下食前後服

金針散

治發背諸瘡腫

皂角針春取一半新採一半黑者

右一味不拘多少曬乾爲末食後酒調二三錢服

精要十宣散

人參　當歸　黃芪各二兩　川芎　防風
厚朴　桔梗　官桂　甘草　白芷各一兩

右爲細末每服二錢加至六錢止熱酒調下日數服以多爲妙不飲酒者用木香濃煎湯下然不若酒力之勝也許學士云此方得於都下異人濟苦者不可勝數

十六味流氣飲

治無名惡腫癰疽等證

川芎　當歸　芍藥　防風　人參　木香
黃芪　官桂　桔梗　白芷　檳榔　厚朴
烏藥　甘草　紫蘇　枳殼

右㕮咀水煎服

千金托裏散

治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪一兩半　厚朴　防風　桔梗各二兩
連翹二兩二錢　木香不見火　沒藥各三錢
乳香二錢　當歸半兩　川芎　白芷　芍藥
官桂　人參　甘草各一兩

右爲細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

托毒散（鬼遺）

治癰疽初起高腫發痛不定喘息氣粗

附子一枚炮去皮尖　當歸　麻黃　甘草

官桂　川芎　羌活　石葦　龍膽草

右九味等分爲末每服二錢水一大盞薑三片鹽少許同煎

聖濟射干湯

治癰疽發背諸瘡腫痛脉洪實數者

射干　犀角　升麻　元參　黃芩　麥門冬

大黃各一兩　山梔半兩

右㕮咀每服五錢加竹葉芒硝一錢以利爲度

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪實數腫甚欲作膿者三服消盡

川大黃　牡蠣　苦蔞根　皂角針　朴硝

連翹各三錢　當歸　金銀花各一兩　赤芍藥

黃芩各一錢

右爲粗末每半兩水酒各半煎服

破棺丹

治諸熱腫一切風熱瘡證發熱多汗大渴便祕譫語結陽之證

大黃二兩半半生半熟　芒硝　甘草各二兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸病重一丸至二丸食後童便入酒半盞化服或白湯合酒化服

瀉心湯

治瘡毒癰腫發躁煩渴脉實洪數者

大黃四兩　黃連　山梔　漏蘆　澤蘭　連翹

黃芩　蘇木各二兩　犀角一兩

右㕮咀每服三五錢水煎服

清涼飲

治瘡瘍煩躁飲冷焮痛脉實大便祕結小便赤澀

大黃炒　赤芍藥　當歸　甘草各二錢

右水煎服

精要漏蘆湯

黃芪生　連翹　沉香　大黃　漏蘆各一兩

粉草半兩

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

內消升麻湯

治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻　大黃各二兩　黃芩一兩半　枳實麸炒

當歸　芍藥　甘草炙各一兩

右㕮咀水煎食前服

孫眞人單煑大黃湯

脉實沉而數膏粱食肉之輩大腑祕者詳審用之

錦文大黃酒洗去皮

右一味剉如麻豆大水煑服

宣毒散

治一切瘡毒其功不可盡述

大黃煨　白芷各五錢

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

內托散

治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃　牡蠣各半兩　苦蔞二枚　甘草三錢

右剉每服三錢水一大椀煎七分去滓溫服

車螯散

治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒利下熱退爲度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯一雙鹽泥固濟火煆通紅置地上出去火毒用　輕粉　甘草各二錢　大黃五錢　黃芩　漏蘆去鬚　瓜根各半兩

右爲末每服二錢薄荷湯下速利酒亦可

內消丸（寶鑑）

治瘡腫初生及瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消

薄荷葉　皂角不蛀者水煑至軟二味煎濃膏

牽牛取頭末各半斤　青皮　陳皮各一兩

沉香半兩　廣朮炮　京三稜炮各三錢

右爲末入牽牛頭末用煎膏和丸如菉豆大每服三十丸煎連翹湯送下食後

神仙解毒萬病丸

一名追毒丸一名玉樞丹一名紫金錠治一切毒及菰子鼠莽菌蕈金石或喫疫死牛馬河豚等毒或時行瘟疫山嵐瘴瘧急喉閉纏喉風脾病黃腫

赤眼及衝冒寒暑熱毒上攻或自縊或溺水或打撲傷損癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或中邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥眞濟世衛身之寶

文蛤三兩用淡紅黃色者搥碎洗淨（一名五倍子）

山慈姑二兩　續隨子去殼研以紙包壓去油再研一兩　紅芽大戟洗淨一兩五錢　麝香三錢研

右各另爲細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及鷄犬之類見之合宜珍重否則無效

如癰疽發背未破用冷水磨塗痛處幷服良久覺痒立消

陰陽二毒傷寒心悶狂語胷膈壅滯邪毒未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下

急中顚邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下

自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下

蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般瘧疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯下

小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷一葉同磨下牙關緊急磨一錠外塗內服量大小用之牙痛酒磨塗及含少許吞下

湯火傷東流水磨塗傷處

打撲傷損炒松節酒下

年深日久頭痛太陽疼用酒入薄荷磨紙花貼太陽穴上并服之

諸般癎疾口眼歪斜眼目掣眨夜多唾涎言語謇澀卒中風口噤牙關緊急筋脈攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服

郭氏瑞效丸

治腸癰胃癰內積兼治男子婦人積聚證

當歸　京三稜　檳榔　木鼈　山甲炒各一兩

牡蠣爲末炒山甲都用　連翹　枳殼各一兩半

硇砂焙　琥珀各一兩　巴豆二十一粒去油

麝香少許

右爲末酒糊爲丸桐子大每服十九至二三十丸溫酒下臨臥再服如利動臟腑減丸數大小便有膿血出者却用別藥調治之

萬靈奪命丹（郭氏）

又名延壽濟世膏治一切瘡腫疔疽初起脈沉實及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此下之

朱砂　鹽花各二錢半　雄黃　明礬生用

楓香各二錢　赤石脂　黃丹飛過　琥珀

眞輕粉各一錢五分　巴豆去殼水煑十沸

蓖麻子另研各七七箇　麝香　片腦各一錢

右爲末用巴豆蓖麻子膏和藥爲丸如和不就加煉蜜就成膏收磁器內如用時旋丸芡實大每服一丸井華水下或湯亦得忌熱物半日大人小兒以意加減與服

一粒金丹

治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香　木香　乳香各五分　巴豆霜一錢半

各爲細末照秤分數和勻用黑肥棗一箇半去皮搗爛爲丸如芡實大每服一丸量人虛實先呷水一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之

威靈仙飲

生威靈仙不拘多少爲末

每服一錢空心溫酒調服逐日微利爲度

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆咽喉塞發寒熱

沉香　木香　麝香　丁香　連翹　射干
升麻　獨活　桑寄生　甘草炙各一兩　乳香
木通各二兩　大黃一兩半

右㕮咀每服五錢水一盞半煎七分溫服取利

千金漏蘆湯

治癰疽丹疹惡肉時行熱毒赤腫

漏蘆　連翹　黃芩　白蘞　枳殼　升麻
粉草　麻黃　朴硝各一兩　大黃一兩半

右除硝外每服二錢水一盞薑三片薄荷三葉同煎溫服取利爲度

防風通聖散

治時毒熱毒便祕熱燥若時毒饑饉之後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用

防風　當歸　川芎　芍藥　大黃　芒硝
連翹　薄荷　麻黃　桔梗　石膏　黃芩
滑石各一兩　白朮　山梔　荊芥各二錢五分
甘草二兩

右水煎服或爲末白湯調下仍量人虛實

中和湯

治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致

人參　陳皮各二錢　黃芪　白朮　當歸
白芷各一錢半　茯苓　川芎　皂角刺炒
乳香　沒藥　金銀花　甘草節各一錢

右水酒各半煎服

內托散

一名護心散一日至三日內宜連進十數服

眞菉豆粉一兩　明乳香半兩慢火於銀石器中炒手指攪使乾急傾出掮冷研極細

右研令匀每服二錢至三錢濃煎甘草湯調下時時細呷要藥常在胷膈間若毒衝心有嘔逆之證大宜服此如有寒而嘔逆不宜服此當用辛熱

國老膏

治一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述

甘草大者二斤

右搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也

解毒散

治癰疽始覺便宜服

犀角屑　升麻　朴硝　赤芍　木通各一兩剉

石膏二兩　元參　麥冬去心　甘草生剉各半兩

右每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服無時

清心內固金粉散

又名金花散

辰砂另研　白茯苓　人參　甘草各七錢半

菉豆粉四兩研　白豆蔻仁　朴硝另研各半兩

雄黃研　腦子研　麝香研各二錢半

右以參苓白豆蔻諸藥爲末入研藥令勻每服一錢半蜜湯調下無時候此藥專治惡瘡熱盛焮痛作渴煩躁此藥解毒

內追毒丹

清心解毒散潮

大朱砂　雄黃　生犀角　琥珀已上並別細研

黑角沉香各五錢　麝香一錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸燈心薄荷湯下

獨勝散

治癰疽皆緣血滯氣凝而致者

香附子去毛令淨以生薑汁淹一宿焙乾研極細右無時以白湯調二錢服之又云疽疾多因怒氣得之若有此疾必多怒但服香附進食寬氣自有效

遠志酒

治一切癰疽發背癤毒惡候浸有死血陰毒在中則不痛傅之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傅之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傅之必清凉或氣虛血弱潰而不斂若七情內鬱治之必愈

遠志不以多少泔浸搥去心乾爲末

酒一盞調末三錢澄清飲之以滓傅於患處

五香散

升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香　丁香　沉香　乳香　藿香各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

忍冬酒

初發便當服此或貧乏之中或居鄉僻田夫野老百發百中

忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入酒少許調和得所塗傅四圍中心留一口又取五兩用木槌搗碎不犯鐵器　甘草生剉一兩

右二味入砂瓶內用水二椀文武火煎至一椀入好酒一大椀煎十數沸去查分爲三服一日連夜進盡病勢重一日夜可二劑

生地黃散

治發癰癧熱毒疼痛心神煩悶

生地黃二兩　川大黃剉碎炒　川升麻　黃芩
地骨皮　當歸剉微炒　木通　赤芍藥　黃芪
元參　甘草生各一兩　赤茯苓一兩半

右爲散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

阿膠飲子（精要）

明阿膠炒如珠　粉草各一兩　橘紅半兩

右㕮咀分作三服以水一盞煎七分去滓溫服

牛膠飲

截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻於內

牛膠通明者四兩

用酒一椀入膠內重湯煑鎔透攪勻傾出更浸酒隨意飲能飲者以醉爲度此方活人甚多

黃礬丸

服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數

白礬一兩　黃蠟半兩

右和丸如桐子大每服十丸漸加至五十丸溫酒送下如未破即消已破即合一日服百粒則有效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳

托裏消毒散

治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯爲主屬血虛者

四物湯爲主氣血俱虛者十全大補湯爲主並忌寒凉治毒之劑

人參　黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌　芍藥炒

川芎　白朮炒　白茯苓各一錢　金銀花

白芷各七分　甘草炙　連翹各五分

右水煎服

托裏散

治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情及諸經錯雜之邪而爲患者當各審其因而參以主治之劑其屬胃氣虛弱者當以六君子湯爲主

人參氣虛者多用之　黃芪炒各二錢　白朮炒

陳皮　當歸　熟地黃自製　白芍藥酒炒

茯苓各一錢半

右水煎服

散毒飲子

治癰疽初覺腫結未成者可以消散

黃芪二兩　甘草炙　天羅生　山藥炒各一兩

鬼腰帶葉半兩生竹籬陰濕石岸絡石而生者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角

右爲粗末每服三錢水一盞煎至七分入酒三盞同煎一二沸去查溫服

神效托裏散（精要）

治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒焮赤疼痛憎寒發熱不問老幼虛弱並治之

黃芪去蘆　忍冬藤葉各五兩　當歸一兩八錢

粉草炙八錢

右爲細末每服五錢酒一盞半煎至一盞病在上食後服在下食前服少頃再進留滓外傅

黃芪散（本事方）

綿黃芪　皂角刺揀紅紫者剉炒黃色各一兩

甘草半兩

細末每服五錢酒一盞乳香一塊煎七分去滓服

黃芪四物湯

人參　黃芪　白朮　茯苓　芍藥　甘草

生薑　當歸　地黃　川芎

右多加金銀花水煎服

內固黃芪丸（本事）

緜黃芪　人參各半兩

右爲末入眞生龍腦一錢研細生藕汁和丸菉豆大每服三十丸溫熟水下加至四十九日三服

回陽湯

治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等證

乾薑炮　大附子炮各二錢　人參　白朮　黃芪各三錢　當歸　陳皮　甘草炙各二錢

柴胡　升麻各五分

右酒水煎服不應薑附倍之敷藥用回陽玉龍膏

清熱消毒散

治一切癰疽陽證腫痛發熱作渴

黃連炒　山梔炒　連翹　當歸各一錢　川芎

芍藥炒　生地黃各一錢半　金銀花二錢

甘草八分

右水煎服

黃連消毒散

治腦疽背疽腫焮疼痛或痲木

黃連製　羌活各一分　黃芩　黃蘗各半錢

生地黃　知母製　獨活　防風　當歸尾

連翹各四分　藁本　防己　桔梗各半錢

黃芪　蘇木　陳皮　澤瀉各二分　人參

甘草各三分

右水煎服

黃連解毒湯

治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脈洪數或發狂言

黃芩　黃蘗炒　黃連炒　山梔各一錢半

右水煎熱服

排膿湯（仲景）

甘草二兩　桔梗三兩　生薑一兩　大棗十枚

右四味以水三升煑取一升溫服五合日再服

排膿散

枳實十六枚　芍藥一兩半　桔梗五錢

右三味杵爲散取雞子黃一枚以藥散與雞子黃

相等揉和煎如薄粥溫服一升即瘥

連翹飲

治癰腫瘡癤排膿

連翹　防風去叉各三兩　薺苨　白芍藥

黃芩去黑心　元參各二兩　白茯苓去黑皮

人參　桔梗剉炒　前胡去蘆　甘草炙各一兩

黃芪生四兩　桑根白皮剉一兩半

搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服日二

柞木飲子（精要）

乾柞木葉四兩半　乾荷葉中心蔕　乾萱草根

甘草節　地榆各一兩

右細剉每服半兩水二椀煎一椀分作二服早晚各一服未成者自消潰者自乾其荷蔕去惡血萱根下水解毒利胷膈柞木有芒刺能驅逐地榆主下焦血病輕小證候或可倚仗

車螯散

車螯一兩煆通赤　生甘草二錢半　輕粉五分

爲細末每服四錢濃煎苦蔞酒調五更服轉下惡

物爲度未知再用效在五香之上

內消散

治癰疽結鞕疼痛

人參去蘆　瞿麥　白蘞　川升麻　當歸微炒

黃芩　防風　黃芪　沉香　甘草生各一兩

赤小豆煮熟一合

爲細末每服二錢不拘時溫酒調服

化毒爲水內托散

凡患癰疽發背對口惡疔瘡乳花百種無名無頭

歹瘡此藥能令內消去毒化爲黑水從小便出萬不失一此方不可祕藏不可輕視寶之寶之

乳香　穿山甲　白芨　知母　貝母　半夏

金銀花　皂角刺　天花粉各一錢

右㕮咀用無灰酒一椀煎半椀去柤作一服溫進不宜加減將柤擣爛加秋過芙蓉葉細末一兩以蜜水潤過一宿自消不必用第二服忌發物大效

仙方活命飲

又名眞人活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已

成膿者卽潰又止痛消毒之聖藥也

滴乳香研　防風　白芷　貝母　赤芍藥

當歸尾　明沒藥研　角皂刺炒　天花粉

甘草節　山甲炮各一錢　陳皮　金銀花各三錢

在背俞皂角刺爲君在腹募白芷爲君在胷次加苦蔞仁二錢在四肢金銀花爲君如疔瘡加紫河車草根三錢如無亦可右爲粗末大者四兩小者二兩作一劑無灰酒十茶鍾瘡小五茶鍾入有嘴瓶內以厚紙封口勿令泄氣煎至三大鍾去柤作三次服接連不斷隨瘡上下服能飲酒者服藥後再飲三五盃此藥並無酒氣不動臟腑不傷氣血忌酸薄酒鐵器服後側睡覺痛定囘生神功浩大不可臆度

保安方（潔古）

治瘡托裏或已成者速潰

苦蔞新者一枚去皮火焙　沒藥通明者一錢研

金銀花　甘草　生薑各半兩

右爲細末用好無灰酒三升於銀石器內煎至一

升分作三盞三次飲盡病微者只一服如服托裏藥不能發散又作瘡者用此

祕方托裏散

治一應瘡毒始終常服不致內陷

苦蔞大者一枚杵　當歸酒拌　黃芪鹽水拌炒
甘草　白芍藥各一兩半　皂角刺炒　金銀花
天花粉　熟地用生者酒拌入瓷器蒸半日各一兩

用無灰酒五茶鍾和藥五兩入瓷器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內煑用蓋覆之煑至藥香取出分服直至瘡愈

祕方拔毒散

治一切癰疽腫毒其功不可盡述

乳香　沒藥　穿山甲炮　當歸　木鼈子
連翹各一錢　苦蔞實八錢　甘草炙五分
牙皂角炒　貝母各七分　大黃生熟各一錢半
忍冬藤二錢

作一劑用酒水各一鍾煎至一鍾食前服

歸芪湯

治癰疽無頭但腫痛

黃芪　當歸　苦蔞仁　皂角刺　金銀花
甘草各一錢

右㕮咀水一鍾半煎八分去滓入乳香酒再煎服

榮衞返魂湯

又名通順散又名何首烏散

何首烏不犯鐵　當歸　木通去皮尖　赤芍炒
白芷不見火　茴香炒　土烏藥炒　甘草
陳枳殼麪炒若惡心加薑汁炒

右方止此九味各等分水酒湯使隨證用之水酒相半亦可惟流注加獨活每服四錢病在上食後服病在下食前服

龍虎交加散

治發背癰疽發腦發鬢發髭又治腦虛頭運風濕之證

南木香剉碎用紙墊鍋焙乾研爲細末　鸎粟殼去頂穰筋剉焙乾爲細末　甘草用濕紙裹煨焙乾爲細末　吳白芷麪裹煨去麪焙乾爲細末　川芎濕

紙裹煨焙乾爲細末

右件藥末各另包收看瘡加減用之

如神托裏散

治發背等瘡初起又治疔瘡并一切腫毒及發散傷寒

蒼耳草根　兎耳草根　金銀藤用花亦可　五味子根各等分

右㕮咀每服五錢用生白酒二盞煎至七分去柤服臥蓋取微汗杳再煎

前鋒正將

治一切癰疽不問發背發肩作臀疼痛其效如神

荆芥　薄荷　山蜈蚣　老公鬚　天花粉

菇片　菇萸　敗荷心　川白芷　赤芍藥

豬牙皂角切炒已上各等分　淮烏大者一箇煨

紅內消倍其數　甘草每十五文入一文喜𦧺加用

右爲末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調服效若服經日未見效恐是凉藥澀血可加當歸羌活如熱重雄黃酒調乳癰加萱草根研汁調其

餘候只用酒下或麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

引兵先鋒

凡用內消先用此藥退潮止渴解熱以升麻葛根湯表散後服此

木通　瞿麥　荊芥　薄荷　白芷　天花粉
甘草　赤芍藥　麥門冬去心　生乾地黃
山梔子　車前子　連翹各等分

右剉每服二錢燈心生地黃煎熱潮加淡竹葉煎溫服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活

加味十奇散

主內護治癰發已成未成服內消藥三五日不效或年四十已上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而止內能固濟去舊生新又名固壘元帥

當歸酒浸　桂心不見火　人參　土芎　桔梗
香白芷　防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炒

甘草五文　乳香　沒藥并別研

右件藥各等分研爲末每服二錢酒調日三服病愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

豨薟散

治癰疽發背及一切癤毒等證如神

豨薟草其葉長如牛舌其氣如豬臭者　小薊根

五爪龍即五藤　生大蒜

右四物各等分細研用酒和勻濾去柤服一椀得大汗通身而愈

圍藥

五倍子炒一兩　天南星　草烏頭　黃蘗

白芨各二兩

右爲細末調如糊隨血圍匝如牆壁可移險處於不險處如神

敷藥

白蘞　白芷　天南星　白芨　貝母各等分

右爲末水調傅外用圍藥束定內用傅藥提起制之有理

將軍鐵箍膏

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋蔓走疰毒氣

鹽霜白梅　南星　大黃　蒼耳根各一兩　白芨　白蘞　防風　川烏頭各半兩　草烏頭　雄黃各三錢

右爲末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如乾入酢調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以雞羽蘸水掃之日換二三次大妙

又方

治一切癰疽腫毒

草烏　貝母　天花粉　南星　芙蓉葉各等分

右爲細末酢調搽四圍留頭出毒如乾以酢潤之

正鐵箍散

貝母去心　白芷　蒼耳草灰酢拌曬乾各二兩　或加龍骨二錢尤妙

右爲細末水調或香油調貼瘡上

大鐵箍散

芙蓉　豬卷皮　木鼈子各四兩　白芷　黃蘗
寒水石　赤豆　白蘞　貝母各二兩　大黃
紫荊皮　白芨　眞地青　羌活去蘆各一兩
防風半兩

右爲末凉水調圍癰四畔如肉脆去白芨白蘞加生地黃地榆用芭蕉油調傅熱甚者用三消散

水黃散

圍腫毒

犀角屑　大黃　白芨　草烏皮尖　白蘞
麝香　朴硝各等分

右爲細末蜜酢調薄攤油紙上稍乾揭下再添潤濕貼之卽消

外用漬毒藥

治諸腫毒堅硬不消

升麻　葛根　鼠黏子　地骨皮　金銀花
黃花地丁　甘草生各等分

右爲粗末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四

畔熱用冷則再煖

圍腫方

草烏　白芨　白蘞　黃蘗　朴硝各等分

右爲末用蜜酢調圍腫外即便收起

神白膏

貼五發未破

南星　大黃　草烏　白蘞各半兩　蚌粉

大柏皮　赤小豆各一兩

右爲末取芭蕉頭研取油調角四畔加乳沒尤妙

雄黃散（郭氏）

治癰疽發背紫暈疼痛不止

粟米小粉三兩炒　草烏頭　南星　絡石

百合各一兩　白芨二兩　乳香　沒藥　雄黃

黃丹各半兩

右爲極細末溫水調敷之

鐵井欄

治無名腫毒或背疽腫圍

芙蓉葉重陽前收研末　蒼耳端午前收燒灰存性

右同研細以蜜水調敷之

烏龍膏

一名烏金散治一切腫毒癰疽收赤暈

木鼈子去殼切　半夏各二兩　小粉四兩

草烏頭半兩

右於鐵銚內慢火炒令轉焦爲細末出火毒再研以水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣或用酢調亦得

宣毒散

初發或灸後敷貼消腫收暈圍聚

露蜂房三兩炒焦　南星　赤小豆各半兩

小米一合　生草烏二錢半　生白礬半錢

右爲細末用淡酢調塗四畔乾即再上

拔毒散

癰疽癧結通用能散能潰

南星上等大白者一兩　草烏頭　白芷各半兩

木鼈子仁一箇研

右爲細末分兩次法酢入蜜調敷紗貼之

鐲毒散

治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

天南星一兩　貝母七錢半　白芷　赤小豆

直殭蠶炒各半兩　雄黃二錢

右爲細末初用酢調敷後用蜜水調敷

退毒散

癰腫通用

木鼈子去油　天南星　半夏生　赤小豆

白芷　草烏連皮尖各等分

右爲細末硬則法酢調敷熱焮則蜜水調敷

神功妙貼散

塗敷癰疽暈內使膿血化爲水出收暈斂毒

大南星圓白者　萆麻子仁各四錢　半夏生

白芷梢　五倍子　薑黃　貝母　白芨各三錢

沒藥　乳香各二錢　花藥石散二貼

右爲細末夾和井水入蜜調敷瘡色黯晦薑汁調敷從暈邊抹收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大全用紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片

如瘡勢先貼藥上然後貼瘡久年蓬仰上竹葉亦得竹葉出水藉藥以行之凡敷藥須是細末則不痛

特異萬靈散

治癰疽發背腫毒等患神妙

軟石膏燒通紅盌覆在泥地上一宿　大白南星　赤小豆　草烏連皮尖各半兩　乳香二錢別研

右爲細末蜜水調成膏從外抹收入留最高處如錢勿敷如瘡已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿不致潰爛屢效

又方

治冷癰青硬無頭陰毒幷瘡疥毒瘡皆效

生鐵銹　輕粉各二錢　白松香一兩五錢　麝香少許

先將鐵銹松香爲細末入銚內加麻油一兩慢火煎數沸離火待熱少退入輕粉麝香末攪勻卽爲膏矣收貯量瘡大小攤貼患處

隔皮取膿法

治諸般腫毒

驢蹄甲細切炒　蕎麥麪各一兩　白鹽半兩

草烏去皮四錢

右爲末水調作餅子慢火炙黃出火毒研米酢調成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼之成膿

雄黃　黃蘗　檳榔　川大黃　血竭各七錢半

麝香研一錢　黃連一兩　白芷　木香　芎藭

桂心各半兩　當歸炒三錢

右爲細末用臘豬脂調令勻塗於絹上貼腫處俟膿潰後卽用膏藥搜膿生肌

萬應針頭丸（濟生）

治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒卽愈

麝香二錢　血竭如蠟者用散者不用　輕粉

蟾酥舌試辢者　硇砂各三錢　片腦一錢

蜈蚣一對全用

右爲極細末煉蜜和丸爲劑如瘡有頭者用針頭

挑破微有血出將藥一黍米大放挑開瘡內上用紙花周圍唾津濕貼瘡上不過時刻卽愈如兩腋見無頭瘡卽是暗疔卽將兩手虎口內白土紋用針挑破如前法用藥封蓋忌雞鵝酒濕麪一切發熱之物

萬搥青雲膏

治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒追膿腹中痞塊貼塊上瘧疾貼大椎及身柱其效如神

白松香淨者一斤　輕粉二錢　蓖麻子去殼杏仁去皮各三百枚　乳香　沒藥各一兩五錢

銅青三兩

右共作一處用鐵槌木臼於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯中做不見火

四虎散

治發背初生筋脈緊急不舒

附子生去皮一兩　天南星　半夏　狼毒各半兩

一方無附子有草烏各等分右爲末熱酒調成膏

攤上腫處以熟絹縛定覺患處如火燒不妨

回陽玉龍膏

草烏頭三兩炒　軍薑二兩煨　白芷不見火

南星煨　赤芍藥各一兩炒　肉桂半兩不見火

此方治陰發背冷流注鼓椎風久損痛冷痹風濕諸腳氣冷腫無紅赤者冷腫不痛者足頑痲痹婦人冷血風諸陰證之第一藥也用熱酒調塗

洪寶丹

一名金丹又名寸金又名四黃散

天花粉三兩　薑黃　白芷各一兩　赤芍藥二兩

右爲末茶酒湯使隨證熱塗

金黃散

貼癰毒令內消

白芷　白芨　白蘞

右等分爲細末新汲水調敷

天花青露散

罨圍一切腫毒

白芨　白蘞　白薇　白芷　白蘚皮　朴硝

青黛　黃蘗　老龍骨各一兩　大黃四兩

天花粉　青露各三兩

右爲細末酢蜜調勻如疽毒未成則當頭罨退若已成四面圍之中留頭用替針膏貼之

消腫散

圍罨腫毒一切瘡癤並治

大黃　水仙子　山藥　苧根　青露　小赤豆

寒水石　水薑　香蛤粉　花蘂石

右將前藥搗和如乾加酢蜜調勻如疽毒未成則當頭罨退若已成四面圍之留一頭用替針膏貼之

神護膏

圍罨一切腫毒

小赤豆　黃皮　白蘞　天花粉　天南星

白芷各等分

右爲末陰用米酢與蜜水調陽用商陸根亦用芭蕉油此是邵邑婆黃金散加黃皮爲主

水澄膏

祕方圍敷腫毒

鬱金　白蘞　白芨　五倍子各一兩　乳香
雄黃各五錢

右爲細末水調敷如熱極者用臘水尤妙

五金膏

一名葵花散

黃葵花七朶　川連二錢去鬚　山梔三箇肥者
黃蘗五錢　川鬱金三錢

右爲末井華水調成膏傅此藥性急宜速打之

淸水膏

治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔焮腫抽熱毒散腫氣

羊桃根　大黃　黃芩　菉豆粉　黃蘗各一兩
赤小豆

右爲細末用蕓薹菜取自然汁入蜜少許相和調藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可厚一錢許貼之乾卽易

水調膏

治癰疽毒熱赤焮疼痛

川大黃生用研末　杏仁去皮尖研　鹽花各三分

右爲細末研令勻以新汲水調和稀稠得所旋卽塗腫上乾卽易之

水澄膏（郭氏）

治風熱腫毒赤紅色攻焮疼痛不止

白芨　白蘞各四錢　鬱金一對　大黃　黃蘗　黃藥子　楡皮各七錢五分　乳香　沒藥　雄黃各半兩

右爲細末用新汲水一碗藥末不以多少澄於水內藥定去水敷於腫處上用白紙封之用雞翎掠此水濕潤

二黃散

治一切腫毒

黃蘗　大黃各等分

右爲末用酢調搽如乾以水潤之

揭毒散

大黃一兩半　白芨一兩　朴硝二兩

右爲末用井水調搽如乾再搽

三消散

退極熱證赤腫焮開者

朴硝　焰硝　大黃　梔子炒黑色　寒水石

南星各等分

右爲細末生地黃汁調塗貼芙蓉葉搗汁調亦可

四面楚歌

敷諸般疽發腫赤痛不可忍未成則散已成則破

至瘡口合而止

荆芥和根剉碎　赤芍藥　大蘗根　土當歸

山大黃　土白芷　天南星圓白者　赤小豆

商陸根剉片子焙　白茇　赤蘞　白蘞　草烏

寒水石煨或炒各等分

右爲末生地黃汁調角四畔或苦蘿根汁腫用商

陸根研汁未潰則滿塗上或有尖起處則留出瘡

口

水師晶明

治諸發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去

故肉生新肉洗後淨乾再用角貼摻藥一日一次

大蘗皮　澤蘭　莽草　荊芥　赤芍　山大黃

土白芷　土當歸　獨活各等分

右剉粗散用水一斗入葱白大椒橘葉同煎熏洗如已爛入猪蹄下膝爪骨肉煎可免乾痛洗淨爲度

硇砂膏

治癰疽腫毒并治瘰癧點落疣痣等

硇砂生用一錢　石礦灰一兩炒黃色　白丁香三錢炒黃色　黃丹半斤生用　鹻一斤淋水五椀

右四味研爲極細末次將鹻水煎作一椀成膏待冷以前末入膏和勻藏磁器中一應毒物以此膏點之白丁香即麻雀兒屎用竪尖者不用輭頹者

六灰膏

治發背疔瘡癤子腫毒癧瘡痔瘡痣子疣子其功用與硇砂膏同也

灰莧　桑木　棗木　蕎麥科　茄科各燒爲灰

石礦灰研細

右件多少不妨和勻湯泡水淋淋下之水煎成膏如糊裝磁器中一應毒物以膏點之若點瘰癧瘡痔瘡待爛去少許再點之再爛去如是漸漸點去

援生膏

治諸般惡瘡及瘰癧鼠瘡纔起者點破卽愈

血竭一錢　蟾酥　輕粉各三錢　麝香五分

雄黃五錢　乳香　沒藥各一錢

右件俱爲極細末再用蕎麥稭灰或眞炭灰一斗三升淋灰湯八九盌用粟柴或桑柴文武火煎作三椀取一椀收留將二椀盛於好磁器內候溫將藥末入灰湯內用鐵瓢或桑柳枝右攪又用好細石灰一升入藥灰湯攪勻取出候冷過宿盛於小白磁罐內凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食破約五分血水出爲妙恐日久藥乾將前收留灰湯和用

替針丸

治癰疽已潰未破或破後膿出不快者

白丁香　硇砂　沒藥　乳香各一字

石灰藥汁內種糯米十四粒其法用石灰五升爐灰三升以水五升淋取清汁入大鍋內熬濃汁至三二升用瓦器盛貯臨用時以小青盞盛取半盞濃汁却用皮紙貼盞中濃汁面上安定然後取糯米十四粒種在皮紙面上一宿卽是右同爲細末糯米飯丸如麥粒大每用一粒未破用津貼瘡頭薄處卽破膿滯不快則用一粒納瘡口內使膿不滯好肉易生

又方

雄雀糞二十粒　硇砂　陳倉米　沒藥各一字

右研勻以米飯丸如粟大每用一粒貼瘡口眼中卽潰膿出

替針丁香丸

草烏尖　硇砂　白丁香堅者

右爲末酸酢調點將破者令速潰若急則無如刀快蜞針一法亦妙見後

托裏溫中湯

治瘡爲寒變而內陷者膿出清稀皮膚涼心下痞

滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促呃逆不絕不得安臥時有昏憒

丁香　陳皮　沉香　茴香　益智仁各一錢　木香一錢半　黑附子炮去皮臍四錢　羌活　乾薑炮各三錢　甘草炙二錢

加味十全湯

治癰疽潰後補氣血進飲食

黃芪蒸　地黃蒸　當歸　川芎　人參　茯苓　芍藥炒　白朮　陳皮各一兩　粉草炙　桂心　五味子各半兩　烏藥七錢

右㕮咀每服一兩用水一椀生薑五片棗二枚同煎分作二服留滓曬乾爲末服之丹溪云加味十全湯須看年之老壯資之強弱證之緩急時之寒熱加減用之

補中益氣湯

治瘡瘍之人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃芪炙一錢五分　甘草炙　人參　當歸酒拌

白朮炒各一錢　升麻　柴胡　陳皮各三分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾空心服

人參養榮湯

治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消瘦面色痿黃吸吸短氣飲食無味不能收斂或氣血原不足不能收斂若大瘡愈後多服之不變他病

白芍藥一錢半　人參　陳皮　黃芪蜜炙

桂心　當歸酒拌　白朮　甘草炙各一錢

熟地黃酒拌　五味子炒杵　茯苓各七分半

遠志去心炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

四君子湯

治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不能宜用此以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜於前湯但

加當歸脾胃旣旺飲食日進陰血自生若用四物沉陰之劑脾胃復傷諸證蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母

人參　茯苓　白朮各二錢　甘草炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯

治脾胃虛弱或寒凉尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸證自愈

卽四君子湯加陳皮半夏

異功散

治脾胃虛弱飲食少思

卽四君子湯加陳皮

四物湯

治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子湯加當歸酒炒白朮以補脾

熟地黃　當歸各三錢　芍藥二錢　川芎一錢半

右水煎服

八珍湯

調和榮衛順理陰陽滋養血氣進美飲食退虛熱此氣血虛之大藥也

當歸酒拌　川芎　芍藥炒　熟地黃酒拌

人參　白朮炒　茯苓各一錢　甘草炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

十全大補湯

治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及流注瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰潰而不斂或血氣不足之人結腫未成膿者宜加枳殼香附連翹服之自消

人參　肉桂　地黃酒洗蒸焙　川芎　茯苓

白芍藥炒　白朮土炒　黃芪用鹽水拌炒

當歸酒拌各一錢　甘草炙五分

作一劑用水二鍾薑棗煎服

歸脾湯

治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血

以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不準晡熱內熱或脣瘡流注等證不能消散潰斂

白朮　白茯苓　黃芪炒　當歸　龍眼肉
遠志肉　人參　酸棗仁炒各一錢　木香五分
甘草炙三分

右薑棗水煎服

黃芪人參湯

治諸瘡破後食少無睡及有虛熱穢氣所觸者

黃芪二錢　人參　白朮　麥門冬　蒼朮
陳皮　升麻　五味子　當歸身　甘草各一錢
黃蘗炒四分　炒麴五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

托裏當歸湯

治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂晡熱內熱寒熱往來婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證

當歸　黃芪炙　人參　熟地黃　川芎藭
芍藥各一錢　柴胡　甘草各五分

右水煎服

人參散

治癰疽內虛不足

人參　白朮　上白茯苓　枸杞子各一兩

熟地黃　黃芪剉各二兩　桂心　白芍藥

當歸微炒　甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不拘時溫服

麥門冬湯

治癰疽潰後膿水不絕

麥門冬去心　黃芪剉　五味子炒　人參去蘆

白茯苓去黑皮　官桂去粗皮　當歸切焙

遠志去心　芎藭各一兩　甘草炙七錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑半分擘碎大

棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服

護壁都尉

治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此

潰後服至愈而止

防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炒　苦梗　白芷

黃芪炙各半兩　人參二錢　川芎　甘草

柳桂　當歸各三錢

右爲末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更服爲佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙

六味丸

一名六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎爲主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋祕痰氣壅盛欬嗽吐血頭目眩運小便短少眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不足之證尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗諸血失血失音水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黃生者自製八兩　山萸肉　山藥各四兩

白茯苓　牡丹皮　澤瀉各三兩

右地黃杵膏餘爲末蜜和丸桐子大每服七八十丸滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴膝等證不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺

前方加肉桂附子各一兩

加減八味丸

治證同前

即六味丸加肉桂五味子各一兩

人參內托散

治瘡瘍潰膿而作痛者

人參　黃芪　當歸　川芎　厚朴　防風
桔梗　白芷　官桂　紫草　木香　甘草

右入糯米一撮水煎服

黃芪散

治癰潰後補虛去客熱

黃芪　石膏各二兩　知母　麥門冬去心
白芍藥　白茯苓　桂心　熟地黃　人參去蘆
川升麻各一兩　甘草炙微赤半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日三四服

當歸補血湯

治瘡瘍潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若誤服白虎湯必死宜此主之

黃芪炙一兩　當歸酒拌三錢

作一劑水一鍾半煎六分服

沉香散

治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沉香剉　柴胡去苗　黃芪　麥冬去心各一兩

白朮七錢半　熟地黃二兩　黃芩　苦蔞根

甘草生剉各半兩

右剉每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五十粒煎至六分去滓不拘時溫服

加味逍遙散

治肝脾血虛內熱發熱或遍身瘙癢寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜

汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胷乳腹脹

小便欠利

甘草炙　當歸　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒

柴胡各一錢　牡丹皮　山梔炒各七分

右水煎服

梔子黃芩湯

治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住用以退熱

漏蘆　連翹　山梔仁　黃芩去心　防風

石葦（如無以桑白皮代）　生甘草　生犀角屑　人參

苦參各去蘆　茯苓上白者去皮各二錢半

生黃芪去叉蘆一兩

右爲粗末每四大錢水一鍾煎至六分去滓溫服

六合回生丹

一名六合奪命散治發背癰疽潰爛有回生之妙

鉛粉一兩　輕粉　銀硃　雄黃　乳香箬上炙

沒藥炙各二分半

右六味各擇眞正好者研爲極細末收貯凡治其

病先煎好濃茶將瘡洗淨輭帛拭乾後剖開豬腰子一枚用藥一分摻於豬腰子上傳患處待豬腰子上發熱如蒸良久取去自此拔毒氣減痛苦定瘡口出膿穢不可手擠次日依前法仍傳之第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小只傳一次可愈豬腰子不發熱勿治又治對口瘡同前

驪龍散

治發背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠五分　牛糞十二月生用餘月燒存性　鐵鏽各重一兩

右研極細末以豬腦髓和好酢調傳瘡口三五次愈初起者自消凡發毒品味忌食之

麥飯石膏

在膿潰後鬪瘡口

麥飯石不拘多少炭火煆至紅以好酢淬之如此煆焠十數次研爲末重羅去粗者取細末入乳鉢數人更遞研五七日如麵極細爲妙　白蘞研爲細末

鹿角不用自脫者須用帶腦頂骨全者却是生取之

角截作一二三寸長炭火燒令烟盡研羅爲末再入乳鉢更遞研令極細

右用麥飯石細末二兩白蘞末二兩鹿角灰四兩最要研得極細方有效粗則反致甚痛細則大能止痛收口排膿精粗之異如此和合量藥末多寡用經年好米酢入銀石器內熬令魚眼沸却旋旋入藥末用竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠得所提出以磁器盛之候冷以紙蓋覆勿令著塵用時先以豬蹄湯洗去膿血以故帛挹乾鵝翎蘸膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大未潰能令內消已潰則排膿如湍水逐日瘡口收斂瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥貼瘡但內膜不穿亦能取安洗瘡勿可手觸嫩肉亦不可口氣吹著合藥亦忌腋氣之人及月經有孕婦人見之仍可熬好米酢一大椀收磁器內候逐日用藥於瘡上久則藥乾以鵝翎點酢拂拭藥上勿令綳也初則一日一洗一換藥十日後兩日一換

解毒百用膏

豬牙皂角煨　南星各一兩　大米一合炒黑

臭小粉乾者四兩炒焦去火毒

右爲末和勻蜜水調圍治顚撲酒酢調圍

逼毒散

劉氏貼發背癰疽膿盡四面皮粘恐有膿毒攻起

宜用此

黃藥子　白藥子各一兩　透明雄黃一錢

赤小豆二兩

右爲末水調傅

青散子

治發背癰疽膿盡生肉平滿宜用此緊瘡口生肌

槿花葉盛時收陰乾取四兩爲末　青赤小豆

白芨各二兩

右爲末臨時用槿花末三錢匕白芨小豆末各一錢匕相和新汲水調攤紙上貼四畔中心瘡口不用貼

古今圖書集成 疽疔毒門六之六十六

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

六五九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十五卷目錄

醫部彙考三百六十五

外科癰疽疔毒門七

方二

雄黃解毒散　猪蹄湯　集香散　熏洗
方　追毒丹　追毒烏金散　又方　神
異膏　止痛拔毒膏　青金錠子　翠霞錠子　追
信效錠子　紅玉錠子　時效針頭散　追
毒餅　翠青錠子　搜膿錠子　神效當歸膏
神異膏　熱瘡寒膏藥　神仙太乙膏　金
絲萬應膏　善應膏　元武膏　金絲膏　長
肌膏　精要生肌散　平肌散　生肌散　紅
玉散　完肌散　生肌散　又方　保命乳香
散　聖效散　桃紅散　又方　黃丹散　橘

半胃苓湯　托裏健中湯　托裏益中湯　托
裏抑青湯　托裏清中湯　托裏益黃湯　托
裏越鞠湯　人參理中湯　黃芪人參湯　加
味解毒湯　內補黃芪湯　當歸和血散　迴
瘡金銀花散　郭氏定痛托裏散　乳香止痛
散　乳香黃芪散　人參內托散　乳香丸
乳香定痛散　乳香膏　乳香膏　東垣聖愈
湯　和氣散　瞿麥散　參苓白朮散　調胃
白朮散　附子理中湯　薑附湯　參附湯
懷忠丹　葶藶大棗瀉肺湯　桔梗湯　葦莖
湯　如聖丸　仲景桔梗白散　牡丹散　如
金解毒散　桔梗湯　四順湯　瀉白湯　濟
生排膿湯　排膿散　寧肺湯　人參補肺湯
人參平肺散　參芪補脾湯　葶藶散　補
肺散　理肺膏　五香白朮散　薏苡附子散
牡丹湯　薏苡仁湯　牡丹散　梅仁湯
大黃湯　四聖散　排膿散　射干湯　復元
通氣散　芍藥湯　荊防敗毒散　二活散
奪命丹　返魂丹　返魂丹　飛龍奪命丹
走馬赴筵丹　羅氏破棺丹　破棺丹　內托
連翹散　不二散　奪命丹　雄黃丸　追毒
丸　五聖散　奪命返魂散　立馬囘疔奪命
散　御史散　加減通聖散　追疔奪命湯
加減追疔奪命湯　防風當歸湯　雄麝湯
解毒消瘴散　胡瘴消毒散　青黃消毒散
四神丹　萬全散　七聖紫金錠　硃墨丸
萬病解毒丸　剛瘴散　拔瘴散　洗瘴方
羅氏托裏散　連翹黃芪湯　羅氏保生錠子
滴滴金　疔瘡錠子　囘瘡錠子　神聖膏
藥　奪命散　郭氏寸金錠子　郭氏提疔錠
子　郭氏守效散　麝香蟾酥丸　追毒丹
海馬拔毒散　芫花根膏　四聖旋疔散　拔
毒散　保生餅子　濟生金砂散　鐵罐膏
又方　鐵粉散　又方　雄黃散　追毒丸
蟯蜋膏　又方　又方　五聖散　破棺丹
立馬囘疔丹　又方　蟾酥走黃丸　迴瘡蟾

酥錠子　化毒丸

藝術典第三百八十五卷

醫部彙考三百六十五

外科癰疽疔毒門七

方二

雄黃解毒散

治一切癰腫潰爛毒勢盛者先用此藥二三次以後用猪蹄湯

白礬四兩　雄黃　寒水石煆各一兩

用滾水二三椀乘熱入前藥一兩洗患處以太乙

膏或神異膏貼之

豬蹄湯

治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便用此湯洗

香白芷不見火　黃芩去心　赤芍藥　羌活
露蜂房取有蜂兒者　當歸去蘆　生甘草各等分

右爲粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將獖豬前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油花盡下面滓肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫溫徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并月經見行婦人猫犬並不許入病人房洗瘡切勿以手觸著洗疽之方所傳甚多惟此方極效其用露蜂房有理蓋以毒驅毒也

集香散

洗癰疽潰爛

白芷　藿香　茅香　香附子　防風各三錢

木香　甘草各一錢

作一劑用水三椀煎數沸去柤淋洗患處

熏洗方

凡諸發及癰疽瘰癧臁瘡湯盪火燒等疾或有別作一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或大皆當作急治之可用忍冬藤一握搗細用無灰酒濾汁服之以滓傅瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護其瘡之上俟其瘡出膿便以豶豬蹄湯等十分淨洗久洗爲妙至一二時辰不妨次用後藥熏之

好降眞香末　楓香末

右二味於銚中攪勻丸如彈子大却取香爐一枚依爐口造紙煙筒一箇如燒龍涎香樣慢火爇之緊以烟筒口熏瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更熏未出膿者卽出已出膿者卽乾直候生肌合口然後止向後有赤腫去處又再熏大槩欲屏去穢氣也

追毒丹

治瘡疽黑陷者用刀針開瘡內此丹使之潰然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之

巴豆七粒去皮心不去油研如泥　白丁香　輕粉各一錢　雄黃　黃丹各二錢

右件研和加白麪三錢滴水爲丸如麥大針破瘡內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之

追毒烏金散

治瘡口惡肉毒潰膿血

巴豆五錢　寒食麪一兩　好細墨一錠

右爲細末用水和麪作餅子將巴豆包定休敎透氣文武火燒成深黑色爲細末量瘡貼之用膽汁就和成錠子新水磨用掃五七次妙

又方（保命）

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香　輕粉　粉霜　雄黃　麝香各一錢

巴豆霜三箇

右爲細末新飯和作錠子用之

神異膏

治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃五錢　滑石倍用

右爲末洗後摻瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後破爛者用此貼之

止痛拔毒膏

治一切瘡發臭爛不可近未破則貼破已破則生肉杖瘡疔瘡皆用之

盤蝥四十九枚　柳枝四十九條　木鼈子七箇

乳香　沒藥　麝香少許　松脂三錢

右用眞清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去查入黃丹五兩滴入水中成珠爲度却入諸藥攪令勻入瓷器中收了後用

青金錠子（郭氏）

銅綠三錢　青礬　膽礬　輕粉　白丁香

砒霜　苦葶藶各一錢　腦子少許　麝香

右將葶藶研細次下諸藥同研極細打稠糊爲錠子或煉蜜加白芨末一錢爲錠如麻黃粗細約二三寸長看瘡口深淺紝入疼者可治不疼難治

第一般緊峻碧雲錠子砒霜生開瘡口用

第二般緊緩碧霞錠子砒霜煅去死肉用

第三般緩慢碧玉錠子去砒霜加枯礬生好肉用

翠霞錠子

治年深冷漏日久惡瘡有歹肉用之

銅綠 寒水石煅 滑石各三錢 明礬 膩粉

砒霜 雲母石研如粉各一錢二分半

右研極細末糊爲錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡口深淺紝之如修合候天色晴明則可

信效錠子

治一切惡瘡

紅娘子 黃丹 砒霜 鷹屎 土硝 白芨

銅綠各一錢半 腦子 麝香各少許

右研細末些兒乳汁和爲錠子用中病即止

紅玉錠子

去歹肉生肌

乾胭脂　白礬枯各三錢　輕粉　砒霜　黃丹

腦子　麝香各少許

右研極細末稠糊和爲錠子用之

時效針頭散

追蝕惡瘡歹肉兼治瘰癧

赤石脂半兩　乳香　白丁香各二錢　砒霜生

黃丹各一錢　輕粉　麝香各半錢　蜈蚣一條焙

右爲極細末摻於瘡口歹肉自去矣若動刀針其瘡雖可有瘢

追毒餅

治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大放入瘡中末不閉膿水自出瘡自乾好

極好信石半錢　雄黃　雌黃　大硃砂各一錢

輕粉少許

右研爲細末糯米糊丸如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之

翠青錠子

又名善效錠子治腦疽發背惡瘡幷潰爛追膿水長肌

銅青四錢　明礬枯　韶粉　乳香炙另研

青黛各一錢半　白蘞　輕粉眞者各一錢

麝香半錢　杏仁二七粒去皮尖另研

如有死肉加白丁香一錢右爲細末稠糊爲餅子或糯米飯和亦得看淺深絍之直至瘡平復猶可用之大有神效如前數方不宜多用謂犯生砒也

此藥無毒恐病家猜疑是毒藥請口內嘗之爲憑也

搜膿錠子

先用追蝕等錠子蝕去歹肉惡物止有膿水皆宜用之

自然銅酢淬　川芎　白芷各半兩　黃連

白蘞各二錢半　木香一錢半　麝香少許

右爲極細末糯米飯和爲錠子用之或作散末乾上亦佳此二方乃潰瘍必用之要藥余用之救人

無算凡瘡口深而窄者先以綿杖子展淨膿水却以軟飯和成錠子長短大小一以瘡爲準須令藥至底乃效外以膏藥護之若瘡口淺而闊大者藥湯洗過拭乾只以乾末摻之如瘡口乾燥以自死竹蘸豆油點著以盌承取滴下油瀝調前藥末鷄羽蘸塗膿汁自止瘡口又潤新肉自生神效

神效當歸膏

治癰疽瘡毒及湯火杖瘡潰爛最能止痛推陳致新

當歸二兩　麻油四兩　白蠟五錢（如用黃蠟一兩尤效）

先用當歸入油煎至焦黑色去柤入蠟鎔化即成膏矣此方用蠟爲君前人每云蠟爲外科之要藥生肌定痛續筋補血其功不可盡述常見善訟者杖後隨食蠟兩許飲酒一兩椀一睡之後血散痛止輕者卽消重者雖腐潰亦易愈可見蠟之功甚大用者不可忽之

神異膏（精要）

治諸般惡毒瘡癤發背癰疽其妙如神

露蜂房要蜂兒多者細剪淨　杏仁各一兩
全蛇蛻鹽水洗淨焙乾　元參去蘆各半兩
緜黃芪七錢半　黃丹五兩研細水飛後入
男子亂髮洗淨焙乾如鷄子大　眞麻油一斤
右件藥先將麻油入銀銚中同亂髮於風爐上慢慢文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候杏仁色變黑好緜濾去柤再將所熬清油入銀銚內然後入黃芪元參二味慢火熬一二時取出銚子安一冷風爐上候半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪移銚於火上不住手攪慢火熬至黃紫色用緜濾過後復入清油在銚內乘冷投黃丹急攪片時又移銚於火上文武火慢慢熬不住手用柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠子則是膏成就矣若珠子稀再熬少時必候得所然後用瓷器內封收待用或恐偶然熬火太過稍硬難用却少入蠟熬添麻油在內瓷器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪勻收而用之膏藥熬成了須用所盛瓷器置淨水盆中出火毒一晝夜歇

三日方可用熬此膏藥極難於火候須耐煩看火緊慢火猛即藥中火發千萬謹戒膏藥方甚多效無出於此右者

熱瘡寒膏藥（東垣）

當歸酒洗焙乾一兩　杏仁湯浸去皮尖一百箇
黃丹研細六兩　肥嫩柳枝三兩半切寸許洗乾
肥嫩桃枝一兩切寸許洗乾　麻油一斤

右件先熬麻油熱下桃柳枝熬令半焦以緜裹當歸杏仁同煎至柳枝焦黑爲度去藥柤濾油澄淸抹去銚中查滓令淨再上火令沸旋旋入黃丹熬成滴水中不散爲度

神仙太乙膏

治八發癰疽及一切惡瘡軟癤不問年月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣螫犬咬傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡淨軟帛拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫送下赤白帶下當歸酒下欬嗽及喉閉纏喉風並用新緜裹膏藥置口中含化

元參　白芷　當歸　赤芍藥　肉桂去粗皮
大黃　生地黃各一兩

右剉碎用麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色濾去粗入黃丹一斤靑柳枝不住手攪候滴水中成珠不粘手爲度傾入磁器中以磚蓋口掘窖子埋陰樹下以土覆三日出火毒欲服丸如雞頭子大

金絲萬應膏

治顛撲傷損手足肩背幷寒濕脚氣疼痛不可忍

小兒脾疳瀉痢欬嗽不肯服藥者

瀝靑二斤半　威靈仙　黃蠟各二兩　沒藥
乳香各一兩別研　木鼈子四七箇切片研
蓖麻子一百箇研　麻油夏二兩春秋三兩冬四兩

右先將瀝靑同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝攪候焦黑色重緜濾過以瀝靑入水盆候冷成塊取出秤二斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟蓖麻木鼈子泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不粘手扯拔如金絲狀方可如硬再旋加油少許如軟加

瀝青試得如法却下乳沒末起鍋在炭火上再用槐柳條攪數百次又以粗布濾膏在水盆內扯拔如金絲頻換水浸一日却用小銚盛頓如落馬墜車於被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉爲驗連換熱水數次浴之則熱血聚處自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上欬嗽貼背心上

善應膏（得效）

治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癧子牙腫打撲接骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼之卽愈又治婦人吹乳以藥丸如桐子大新汲水下二十丸肺癰腸癰亦可爲丸呑服溫酒米飲或北梗甘草煎湯皆可不可犯葷手及火焙

上等黃丹八兩研極細　白膠香　明沒藥
滴乳香並別研　大當歸　川白芷　大黃
杏仁去皮尖　草烏頭　川烏頭　赤芍藥
檳榔　生乾地黃　亂髮洗淨　滴青別研
土芎各一兩

右除乳香沒藥外將瓷石銚子盛香油一斤浸藥

一宿慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮煎少時用生絹帛濾去滓留下一兩藥油復將所濾油於慢火上熬却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有微烟起提起藥銚將柳條點藥滴在水面上凝結成珠不散方成膏如不成珠上火再熬直待成膏提起藥銚攪無煙出却入乳香沒藥白膠香末攪勻傾出瓷器中將元留下浸藥銚油一併收拾器內用新汲水將藥器坐於水內一日一換過三日出火毒方可用之如膏藥硬約量加黃蠟清油入膏內攪勻得所熬膏極難於火候須耐煩看火緊慢火猛則藥中火發不但失藥性又燎傷製藥人面目慎之

元武膏

治癰疽發背疔腫內外臁瘡陰疰下諸惡瘡及頭項癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止疼生肌累有神驗若疔腫先用銀篦或鹿角針於疔瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大插入孔中却用此膏貼之如瘡壞爛至甚難

以藥貼則將角皂二三片煎油調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大巴豆去殼膜　木鼈子去殼切片各二兩淨

黃丹四兩研細　槐柳嫩枝各七寸長七條剉碎

眞麻油十兩

右依前法煎熬成膏貼用

金絲膏

治傷筋動骨損痛閃朒風毒惡瘡風濕筋寒諸病

當歸尾　川白芷　杏仁去皮尖雙仁　元參

豬牙皂角去皮弦　黃蘗　草烏生剉各三錢

白膠香明者八兩　連鬚葉葱肥大者十根

滴青明者半斤　乳香　沒藥別研爲末各半兩

黃蠟明者一兩　男子亂髮洗淨挼如鷄子大

右用淸油半斤將八味依前法熬濾却入膠香滴青攪勻下黃蠟又攪無烟方下乳香沒藥

長肌膏

治年久諸般爛瘡貼之卽愈

白燭油四錢　黃蠟　香油各八錢　黃連三錢

大楓子去殼切細五錢　番木鼈肉切細二錢以上七味同煎濾去柤入後藥　枯礬　輕粉各三錢

密陀僧五分各研細

右將前七味煎濾入後三味拌勻俟凝看瘡口大小做薄餅簪穿小孔十數貼瘡上或日易之鹽茶湯洗瘡幷洗餅再貼以好爲度

精要生肌散

寒水石碎　滑石　烏鰂骨　龍骨各一兩

定粉　密陀僧　白礬灰　乾胭脂各半兩

右爲細末乾摻用之

平肌散

治諸瘡久不斂

密陀僧煆研　花蕊石煆研　白龍骨各一兩

乳香另研　輕粉各一錢

右爲細末和勻乾摻

生肌散

白礬枯　檳榔各一兩　黃丹　血竭各一錢

輕粉半錢　密陀僧一錢半

紅玉散

軟石膏煅半兩　黃丹炒一錢半

完肌散

定粉　枯礬　黃連　乳香　龍骨各二錢

黃丹　輕粉各一錢

右爲極細末貼瘡口生肌長肉看輕重選用之

生肌散

治瘡口不合

木香　輕粉各二錢　黃丹　枯礬各五錢

右件各另爲細末用猪膽汁拌勻曬乾再研細摻

患處

又方

治寒瘡斂口藥

歸身一錢洗曬乾　青皮去白二分　木香一分

黃連五分

右四味爲極細末蠟油調塗取效甚速

保命乳香散

治瘡口大者

寒水石煅　滑石各一兩　乳香　沒藥各半兩

腦子少許

右各研細和勻少許摻瘡口上

聖效散

收斂瘡口

黃蘗一兩去粗皮炒赤黑色　穿山甲一兩炒

檳榔　木香各半兩炒黃色　雞肶胵七枚生用

右爲細末每用少許候大膿出盡洗淨方可乾摻瘡上

桃紅散

斂瘡口定痛辟風邪

滑石四兩　乳香　輕粉各二錢　小豆粉一兩

寒水石三兩煅

右爲細末乾摻口上一方改小豆粉爲定粉

又方

治瘡口久不收

小椒去目炒黑　乳香　沒藥各一錢　定粉

風化硝各二錢　白礬二錢半

右爲細末摻之

黃丹散

斂瘡口

黃丹煅　枯礬　龍骨　寒水石　乳香　黃連
木香不見火　黃芩　檳榔　膩粉各三錢
腦子少許

右爲末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾却摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則又臖作

橘半胃苓湯

治癰疽嘔吐不下食不知味

橘紅　半夏薑製各一錢　蒼术米泔浸一宿炒
白术炒　厚朴薑製　甘草炙　茯苓　人參
澤瀉　茅根各二錢　薑汁數匙

水二鍾煎一鍾入薑汁煎一二沸作十餘次飲之

托裏健中湯

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等證

肉桂三分　人參　白术　茯苓各一錢　半夏

炮薑各一錢　炙甘草五分　黃芪一錢五分

右薑棗水煎服

托裏益中湯

治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或潰而不斂

人參　白术土炒　陳皮　半夏　白茯苓

炮薑各一錢　木香　炙甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏抑青湯

治脾土虛弱肝木所侮以致飲食少思或胸膈不利等證

人參　白术　茯苓　陳皮　半夏各一錢

芍藥　柴胡　甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏清中湯

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參　白术　陳皮　茯苓各一錢　半夏八分

桔梗七分　甘草五分

右薑棗水煎服

托裏益黃湯

治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思或嘔吐泄瀉等證

人參　白朮　陳皮　茯苓　半夏各一錢

炮薑　丁香　炙甘草各五分

右薑棗水煎服

托裏越鞠湯

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參　白朮各二錢　陳皮　半夏各一錢

山梔　川芎　香附　蒼朮各七分　炙甘草五分

右薑棗水煎服

人參理中湯

治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或胸膈虛痞飲食不入

白朮　人參　乾薑　甘草炙各等分

右薑棗水煎服

黃芪人參湯

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用

人參　蒼朮米泔浸炒　白朮炒　麥門冬去心

陳皮　當歸酒拌　神麴炒　甘草炙　五味子杵

各一錢　黃芪炙二錢　黃蘗炒　升麻各四分

右作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

加味解毒湯

癰疽大痛不止宜用

黃芪鹽水拌炒　黃連炒　黃芩炒　黃蘗炒

連翹　當歸酒拌各七分　甘草炙　白芍藥

梔子仁炒各一錢

右作一劑水二鍾煎八分服之藥下痛即止

內補黃芪湯

黃芪鹽水拌炒二錢　熟地黃酒拌　人參

茯苓　甘草炙各五分　芍藥炒　川芎　官桂

遠志去心　當歸酒拌各八分　麥門冬去心五分

作一劑水一鍾半薑三片棗二枚煎六分食遠服

當歸和血散

治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產後

腹痛

當歸二錢　乳香半錢　沒藥一錢半　芍藥三錢

右爲細末每服一錢水一中盞煎七分和滓溫服日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加赤芍藥

迴瘡金銀花散

治瘡瘍痛甚色變紫黑者

金銀花連枝葉俱用剉研二兩　黃芪四兩

甘草一兩

右㕮咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時辰取出去滓頓服之一方無黃芪

郭氏定痛托裏散

治一切瘡腫疼痛不可忍如少壯氣充實先用疎利後服此藥

粟殼去蒂炒二兩　當歸　芍藥　川芎各半兩

乳香　沒藥　桂各三錢

右㕮咀每服五錢水煎

乳香止痛散

治一切瘡腫疼痛不止

粟殼六兩　白芷三兩　炙草　陳皮各一兩半

乳香　沒藥各一兩　丁香半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎

乳香黃芪散

治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪去蘆　當歸酒洗　川芎　麻黃去根節

甘草生　芍藥　人參去蘆　粟殼蜜炒各一兩

乳香另研　沒藥另研各五錢　陳皮一兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去柤溫服如瘡在上食後在下食前服之

人參內托散

治瘡瘍潰膿而作痛者

人參　黃芪　當歸　川芎　厚朴　防風

桔梗　白芷　官桂　紫草　木香　甘草

右入糯米一撮水煎服

乳香丸

治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍

乳香　沒藥並另研極細　羌活　五靈脂

獨活各三錢　川芎藭　當歸　眞菉豆粉

交阯桂　川白芷　白膠香各半兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯送下手足損痛不能起者加草烏用木瓜鹽湯送下

乳香定痛散

治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各五錢　滑石　寒水石各一兩

冰片一錢

右爲細末擦患處痛卽止敷藥中加南星半夏能止痛更加蓖麻仁尤佳

乳香膏

治諸瘡痛久不瘥

乳香另研一兩　食鹽　杏仁去皮尖雙仁研

松脂各一兩半　生地黃取汁三合　黃蠟三兩

白羊腎脂半斤

右先熬脂令沸下杏仁地黃汁蠟煎候蠟鎔盡入乳香鹽松脂煎以柳篦攪令勻稀稠得所磁盒盛傅瘡上日二三度

乳香膏

木鼈子去殼細剉　當歸各一兩　柳枝一尺六寸剉同以清油四兩煎令黑色次用後　乳香　沒藥各半兩　白膠香明淨者四兩同研極細入油煎化用綿子濾之

右煉藥鐵銚令極淨再傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以兩柳枝攪極得所再上火煎不住手攪候油沸起住攪注在水中成珠不散爲度秋冬欲軟春夏欲堅傾在水中出火毒捜成劑收之

東垣聖愈湯

治諸惡瘡血出不止以寒水石細末摻之立止或瘡時間作黑色不可潰也藥力去盡却紅和如血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也此湯主之

熟地黃　生地黃各三錢　當歸身一錢半

川芎二錢　黃芪五分　人參三分

右㕮咀都作一服水一盞半煎至一盞去滓稍熱服無時

和氣散

治癰疽潰後氣虛滑泄四肢逆冷

蒼朮四兩米泔浸三日洗淨曬乾再以米醋炒令香

黃色　甘草炙　青皮去穰各一兩　良薑炒

肉桂　乾薑炮各半兩　陳粟半升

右七味爲末每服一錢用炒茴香末半錢相和溫酒調下不拘時

瞿麥散

治癰疽發背排膿止痛利小便

桂心　赤芍藥　當歸　黃芪　芎藭　瞿麥

白蘞　麥門冬去心各等分　赤小豆一合酒浸炒

右㕮咀每服四錢酒煎溫服如諸癰已潰未潰瘡中膿血不絕痛難忍者加細辛白芷白蘞薏苡仁

參苓白朮散

人參　茯苓　白朮炒　蓮肉去心　砂仁炒杵

薏苡仁炒　山藥各二兩　桔梗炒　甘草炙

白扁豆去皮薑汁浸炒各一兩

右爲細末每服二錢用石菖蒲煎湯調下

調胃白朮散

癰疽聲嘶色敗脣鼻青赤面目浮腫宜用

白朮炒　茯苓各二錢　陳皮　白芍藥炒

檳榔　澤瀉各一錢　木香五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服如腫不退

加白朮炒枳實麩炒各一錢

附子理中湯

治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子　人參　茯苓　白芍藥各三錢　白朮四錢

右水煎服

薑附湯

治瘡瘍眞陽虧損或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭運

人參　附子炮製去皮臍各一兩　乾薑炮

白术各五錢

右作二劑水煎服

參附湯

治失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下眞陽脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭運等證急服以救元氣緩則不治

人參一兩　附子炮去皮臍五錢

右薑五片水煎服不應倍之

懷忠丹

治內癰有敗膿敗血腥穢殊甚以致臍腹冷痛用此推膿下血

白芷　單葉紅蜀葵花根各一兩　白礬枯

白芍藥各五錢

右研爲末鎔黃蠟丸如梧子大空心米湯下三十丸推膿下血出盡後服十宣散補之忌發物

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰喘不得臥

葶藶炒黃研細如彈丸大　大棗十二枚

水三升入棗先煑取二升去棗入葶藶又煑一升頓服之又曰治肺癰胷滿脹一身并面目浮腫鼻塞清涕出不知香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞用前方三日一劑可至三四劑須先與小青龍湯一劑乃與之

桔梗湯

治欬而胷滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粥者肺癰也

桔梗　甘草炙各一兩

用水三升煑取一升去滓分溫再服則吐膿血也亦治喉痹三因甘草倍之每四錢名四聖散千金亦名桔梗湯用桔梗三兩甘草二兩服後必吐膿血

葦莖湯

治肺癰又云一本治欬有微熱煩滿心胷甲錯

葦莖三升切　桃仁五十枚去皮　薏苡仁

冬瓜仁各半升

用水一斗先煑葦莖得五升去滓入諸仁煮取二

升分溫五服當吐如粥

如聖丸（梅師）

治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺癰喘嗽唾膿血胷滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣臭腥穢久久咯膿狀如米粥

樟腦　牛黃各另研　桔梗　甘草生用各一錢

爲細末煉蜜丸每兩作二十九每用一丸噙化

仲景桔梗白散

治欬而胷滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰

桔梗　貝母各三分　巴豆去皮炒研如脂一分

右三味爲散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一椀則定

牡丹散（本事）

治肺癰吐膿血作臭胷乳間皆痛

牡丹皮　赤芍藥　地榆　苦梗　薏苡仁

川升麻　黃芩　生甘草各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服一方無黃芩加生薑煎名升麻湯

如金解毒散

治肺癰

桔梗一錢　甘草一錢半　黃連　黃芩　黃蘗　山梔並炒各七分

作一劑水二鍾煎八分作十餘次呷之勿急服

桔梗湯

治男婦欬而胷膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澀

桔梗　貝母　當歸酒浸　苦蔞仁　枳殼麩炒　薏苡仁微炒　桑白皮　防己　甘草節各一兩　百合蒸　黃芪各一兩半　北五味子　甛葶藶　地骨皮　知母　杏仁各半兩

右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘時溫服欬者加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許小便澀甚加木通車前子煎煩躁加

白茅根煎欬而疼甚加人參白芷煎

四順湯

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

貝母去心　紫苑去苗土　桔梗炒各一兩

甘草炙剉半兩

右擣篩每服三錢水一盞煎五七沸去滓不拘時稍冷服如欬嗽甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減

瀉白散

治肺癰

桑白皮炒二錢　地骨皮　甘草炙　貝母去心

紫菀　桔梗炒　當歸酒拌各一錢　苦蔞仁錢半

作一劑水一鍾薑三片煎八分食遠服

濟生排膿湯

治肺癰得吐膿後以此排膿補肺

生縣黃芪二兩細末每二錢水一椀煎五分服

肺癰收斂瘡口止有合懽樹皮白蘞煎湯飲之

排膿散

治肺癰吐膿後宜服此補肺

黃芪鹽水拌炒　白芷　五味炒杵　人參各等分

爲細末每服三錢食後蜜湯調下

寧肺湯

治欬嗽唾膿自汗上氣喘急用此補肺及治榮衛俱虛發熱自汗

人參　當歸酒拌　白朮　熟地黃　川芎

白芍藥　甘草炙　五味子搗　麥門冬去心

桑白皮炙　阿膠蛤粉炒　白茯苓各一錢

作一劑水二鍾薑二片煎八分食後服

人參補肺湯

治肺證欬喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴小便短澀

人參　黃芪蜜炙　白朮土炒　白茯苓　陳皮

當歸各一錢　山萸　山藥各二錢　麥冬七分

甘草炙　五味子各五分　熟地黃自製一錢半

牡丹皮八分

右薑棗水煎服

人參平肺散

治心火尅肺傳爲疽瘻欬嗽喘嘔痰涎壅盛胷膈痞滿咽嗌不利若因肝木太過而致當補肺若因腎水不足而患當補脾肺若因心火旺而自病當利小便

人參　陳皮　甘草炙　地骨皮　茯苓各一錢
知母炒七分　五味子杵炒四分　天門冬去心
青皮各五分　桑白皮炒一錢

右水煎服

參芪補脾湯

治肺疽脾氣虧損久欬吐膿涎或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參　白术各二錢　黃芪二錢五分　茯苓
陳皮　當歸各一錢　升麻三分　麥門冬七分
五味子四分　桔梗六分　甘草炙五分

右薑棗水煎服

葶藶散

治肺癰欬嗽氣急睡臥不安心胷脹滿

甛葶藶子二兩半隔紙炒至赤色　百合炒
白附子　北五味炒　甘草節　人參　款冬花
百藥煎　紫菀去木各一兩　大朱砂半兩另研
右爲末每服二錢燈心湯調下

補肺散

治肺癰已吐出膿血以此潤護
眞鍾乳粉一兩　白滑石二兩
右研細每服三錢米飲調下

理肺膏

治肺癰正作欬唾不利胷膈迫塞
訶子去核　百藥煎　五味子微炒　條參去蘆
款冬花蕊　杏仁　知母　貝母　甛葶藶子
紫菀　百合　甘草節各五錢
右爲末用白茅根淨洗秤三斤研取自然汁入磁
石器中熬成膏更添入好蜜二兩再熬勻候調和
前藥爲圓如梧子大溫水吞下

五香白术散

寛中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香　木香　明乳香　丁香　藿香葉各半兩
白朮　人參　白茯苓　薏苡仁　山藥　萹豆
桔梗　縮砂　白豆蔻　粉草　蓮肉各一兩

右爲末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥煎湯下

薏苡附子散

治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚身熱脈數者

附子炮二分　敗醬五分　薏苡仁一錢

右爲末每服方寸匕以水二合煎頓服小便當下

三因薏苡附子敗醬用一兩一分每四錢水琖半煎七分去柤空心服

牡丹湯

治腸癰小腹腫痞按之卽痛小便如淋時時發熱自汗惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已成不可下

牡丹皮　苦蔞仁各一錢　桃仁去皮尖雙仁
芒硝各二錢　大黃五錢

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓入硝再煎數沸

不拘時服

薏苡仁湯

治腸癰腹中㽲痛煩毒不安或脹滿不食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏苡仁　苦蔞仁各三錢　牡丹皮　桃仁各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

牡丹散

治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

牡丹皮　人參　天麻　白茯苓　黃芪　木香
當歸　川芎　官桂　桃仁去皮炒各七錢半
白芷　薏苡仁　甘草炙各五錢

爲細末每服三錢用水一鍾煎至七分食前溫服

梅仁湯

治腸癰裏急隱痛大便祕澀

梅核仁四十九粒去皮尖　大黃三兩　牡丹皮一兩七錢半　芒硝二兩半　冬瓜仁四兩　犀角鎊一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水二一琖煎至一琖去滓溫服以利下膿血三兩行爲度

大黃湯

治腸癰小腹堅鞕腫大如掌而熱按之則痛其上色或赤或白小便稠數汗出憎寒其脉遲緊者未成膿如脉數則膿已成

大黃剉炒　牡丹皮　硝石研　芥子　桃仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右剉碎每服五錢水二一盞煎至一盞去柤空心溫服以利下膿血爲度未利再服

四聖散

治腸癰癰疽生於腦髭背腋乳便毒服之神效

生黃苦蔞一枚去皮　粉草四錢研末　沒藥研末三錢　乳香研末一錢

右用好紅酒二大椀慢火煎至一椀分作兩服兩日服盡大便順導惡物妙若乾苦蔞則用兩枚一方若病在上食後服病在下食前服毒已結成卽膿化爲水毒未成卽於小便中出疾甚再合服以

退爲度

排膿散

治腸癰小腹脹痛脉滑數或裏急後重或時時下血

黃芪鹽水拌炒　當歸酒拌　金銀花　白芷

穿山甲用蛤粉炒　防風　連翹　苦蔞仁杵

甘草各一錢

作一劑水二鍾煎八分食前服若膿將盡去穿山甲連翹加當歸川芎或爲末每服三錢食後蜜湯調下亦可

射干湯

治胃脘癰人迎脉逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癰

射干去毛　梔仁　赤茯苓去皮　升麻各一兩

赤芍藥一兩半　白朮半兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去查入地黃汁一合蜜半合再煎溫服不計時候

復元通氣散（精要）

治諸氣澀耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮　陳皮各四兩　甘草三寸生熟各半

穿山甲炮　苦蔞根各二兩　金銀花淨者

連翹各一兩

右爲細末熱酒調下

芍藥湯

治胃脘積熱結聚爲癰

赤芍藥　石膏　犀角鎊　麥門冬　薺苨

木通各二兩　朴硝　升麻　元參　甘草各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓不拘時溫服

荆防敗毒散

治疔瘡

黃連　羌活　青皮　白殭蠶　獨活　防風

蟬蛻　細辛　赤芍藥　甘草節　獨脚茅各等分

右㕮咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑十錢重同擂爛熱酒和服然後用酒水各半盞薑三片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服略下一

二行蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔去根脚加鮮菊花搗汁入藥尤妙

二活散

羌活　獨活　當歸　烏藥　赤芍藥　金銀花
連翹　天花粉　甘草節　白芷各四錢半
紅花　蘇木　荆芥　蟬蛻　乾葛各三錢
檀香二錢

右爲細末每服三錢煎蒼耳湯調下

奪命丹

治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥乾者半錢酒化　硃砂水飛三錢　枯礬
寒水石水飛各一錢　輕粉五分　銅綠一字
麝香一字　海羊二十箇研卽蝸牛也不用亦效

右件爲細末將海羊另研爲泥和藥一處丸如菉豆大如丸不就加好酒成之病輕者一丸二丸重者三丸未效再服服時嚼葱白一大口極爛置手心放藥丸於葱內裹合熱酒送下暖處臥取汗出爲效忌氷水薛氏有銅綠麝香沒藥乳香各一錢

返魂丹（瑞竹）

治十三種疔

硃砂　膽礬各一兩半　血竭　銅綠　雄黃
蝸牛生用　枯白礬各一兩　輕粉　沒藥
蟾酥各半兩　麝香少許

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥爲細末同研和丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出卽瘥如不能嚼葱研爛裹下極效

返魂丹

經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香　沒藥　辰砂　雄黃各一錢半　輕粉
片腦　麝香各五分　蝸牛不拘多少　蟾酥
青黛　粉草　硼砂各一錢

右爲細末用海羊搗膏爲丸如難丸加酒麪糊些少丸如彈子大每服一丸兼生葱頭二三箇細嚼嚥下疔腫及癰腫毒氣入腑者得微汗卽解一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢

飛龍奪命丹

治疔瘡發背腦疽乳癰疽附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡證藥中至寶病危者服之立可矣萬無一失此乃家傳之祕方不敢輕洩神速之驗即愈立效

輕粉　腦子（無亦可）　麝香（各半錢）　寒水石
血竭　膽礬（各一錢）　蟾酥（乾者酒化）　乳香
沒藥　硃砂（爲衣）　銅綠（各二錢）　雄黃（三錢）
蝸牛（二十一箇無亦效）　蜈蚣（一條酒炙黃去頭足）

右爲細末先將海羊連殼研爲泥和前藥爲丸如菉豆大如丸不就入酒打麪糊爲丸每服二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將藥丸裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱酒數杯以助藥力發熱大汗出爲度初覺二丸即消如汗不出重者再服二丸汗出即效三五日病重者再進二丸即愈如疔瘡走黃過心者難治之汗出

冷者亦死矣如病人不能嚼葱擂碎裹藥丸在內熱酒送下瘡在上食後服瘡在下食前服服此藥後忌冷水黃瓜茄子油豬鷄魚肉濕麪一切發風發瘡毒類之物不可食之又忌婦人洗換狐臭百發百中此藥活人多矣

走馬赴筵丹

治疔瘡

片腦一分　沒藥　乳香　硼砂　硇砂　雄黃
輕粉各三錢　麝香少許

右爲細末蟾酥汁和爲丸如黃米大每服一丸溫酒送下

羅氏破棺丹

治瘡氣入腹危者

大黃二兩半生半熟　甘草　芒硝各一兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後溫酒化下或童溺半盞研化之忌冷水

破棺丹

山梔　牽牛末　大黃各一兩　甘草　京三稜炮

各七錢

右煉蜜丸如彈子大酒化服之一方有當歸赤芍連翹牡蠣金銀花紫花地丁宜選用之

內托連翹散

疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黃於黃上用針刺仍服內托散自然消散

連翹　白芷　乾生地黃　赤芍藥各一兩

大黃去皮　黃梔去頂蒂　薄荷葉各七錢

朴硝二兩　黃芩去心半兩　甘草一兩半

右爲粗末每服一兩水一椀燈心竹葉煎七分其人喘加人參少許大病只三四服愈如服了心煩嘔用不二散止之

不二散

甘草半兩　菉豆粉一兩

右爲末分作二服酸虀水下

奪命丹

治疔瘡大便祕實不通者或心腹痛者

巴豆去殼　大黃各一錢　輕粉二分　鬱金

雄黃　乳香各五分　硃砂　黃丹各三分

麝香少許　蟾酥不拘多少

右末麵糊爲丸如菉豆大隨虛實服之茶清送下五七丸至九丸止以利爲度如無此丸以雄黃丸代之

雄黃丸

治證如前

巴豆十四粒　麝香少許　全蠍　牙皂　雄黃

大黃　鬱金各一錢

右末米糊丸加菉豆大硃砂爲衣每服五七丸清茶送下以利爲度

追毒丸

海浮石燒赤酢淬七次半兩　川烏一兩　乳香

沒藥各一錢　巴豆四十九粒

右爲末酢糊丸如桐子大若患二三日服十九五六日服十四丸隨病上下服之先喫冷酒半盞或一盞又用冷酒吞下如嘔不妨出藥依上服之病

人大便不動再用三丸如疔看得端的爪破用頭垢塗患處後服藥

五聖散

治疔瘡

皂角鍼二兩　苦蔞一箇　大黃　金銀花

生薑　甘草各一兩

右㕮咀用好酒二升同煎至八分去柤不拘時溫服

奪命返魂散

治一切疔瘡憎寒發熱昏悶不語腫徧皮膚不思飲食

大黃　連翹　山梔子已上各二錢半研爲細末

巴豆　杏仁各二錢麩皮同炒黑色研爲細末

人言五錢用大蒜五箇去心塡入人言同燒過性研爲末　牽牛頭末　苦丁香各一錢

右爲細末研勻每服半錢病重者服一錢用新汲井華水調下一服見效如病重無脈者喫下藥約一頓飯時吐了藥便醫不得吐不了藥卽活

立馬回疔奪命散

治疔瘡及喉痹乳蛾腫痛大效

牡蠣　當歸　牛蒡子　殭蠶各半兩　大黃一兩

右㕮咀每服半兩用靑石磨刀水酒各一盞煎去滓連進二服疔瘡服後出汗者生無汗者死

御史散

治疔瘡

生鐵銹三錢

爲末木香磨酒調下分病上下食前食後服之得微汗而愈此方乃祕法也未嘗試用常治疔瘡有赤絲攻心腹者用鐵銹三錢牡蠣二錢靑鹽一錢爲末挑破瘡頭以燈盞內油調搽其絲自回名喚回丹但未用服考之本草云鐵銹生鐵上衣也治惡瘡疥癬蜘蛛等咬蒜磨敷之亦未云服家藏方用猫兒眼草一擔細切以水擔餘浸二日煮百餘沸去柤取汁煎至三四椀用生鐵銹細研末三兩徐徐入汁內以鐵杖不住手攪再煎至二椀許成膏子治一切癰疽瘡毒甚效瘰癧潰後塗瘡孔內

尤妙

加減通聖散

治疔瘡瘴氣紫游風等證

防風　荊芥　連翹　赤芍藥　當歸　川芎

桔梗　黃芩　梔子　青木香　甘草　元參

牛蒡子　大黃　芒硝　紫金皮　雞屎子

詐死子　谷藤根　芙蓉根　嫩柏根　青王叉

右薄荷生地黃煎服

追疔奪命湯

祕方速效能內消腫

羌活　獨活　青皮多用　防風多用　黃連

赤芍藥　細莘　甘草節　蟬蛻　白殭蠶

雞爪川黃連各等分　再加紫河車　蘭澤

金銀花

右㕮咀每服五錢先將一服加澤蘭少用葉金銀花各一兩生薑十片同藥擂爛好酒鏇之熱服不喫酒者水煎爲妙然後用酒水各一盞半生薑十片煎盞半熱服汗出爲度病退減後再加大黃二

錢煎如前熱服再以利一二次去餘毒爲妙此方以藥味觀之甚若不切然效速於神驗萬無一失累用累效如有別證再出宜隨證加減治之速效

若心煩嘔吐加甘草節一錢豆粉酸漿水下

嘔逆惡心加乳香豆粉甘草湯下

有膿加何首烏白芷

要利加青木香大黃牽牛梔子

在脚加木瓜以上各等分

加減追疔奪命湯

治疔瘡及癰疽發背惡瘡焮赤腫痛創人或紫游風赤游風並大效

防風　赤芍藥　連翹　羌活　獨活　細辛
青皮　白殭蠶　蟬蛻　青木香　甘草節
金銀花　紫河車　獨脚蓮

右生薑澤蘭生地黃煎服病勢退減加大黃取利下三五行去大黃

防風當歸湯

治疔瘡發熱大便實者

金銀花　山慈姑　青木香　當歸　赤芍藥
白芷　防風　荆芥　連翹　升麻　羌活
獨活　甘草　大黃

右薄荷生地黃煎服

雄麝湯

解疔毒如神凡解毒不可無雄黃硃砂

雄黃　硃砂　麝香　乳香並另研各一錢
白芷　茜根　眞菉豆粉　地丁各二錢　牡蠣
白殭蠶　牛蒡子炒　朴硝　大黃　山梔子

金銀花　青木香　荆芥穗　甘草各一錢
核桃二箇去膜殼

右以白芷以後十四味細切用無灰酒一椀浸少時擂細又加水一椀同煎至一椀去柤及濁脚入前雄黃等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味歸後下茜草卽過山龍地丁卽大薊也一云剪刀草開黃花者名黃花地丁開紫花者名紫花地丁

解毒消瘴散

治疔瘡瘴氣發熱者

柴胡　黃芩　黃蘗　梔子　木通　赤芍藥

當歸　防風　連翹　大黃　甘草　青木香

紫金皮　雞屎子　詐死子　青王叉　嫩柏根

苦花子

右薄荷生地黃煎服

刼瘴消毒散

治瘴氣腫痛發熱者及因剝割瘴死牛馬豬羊而中其毒者或因食瘴死之肉而中其毒者先服加減通聖散通利大便次服此藥

百丈光卽天瓠又名土人參　苦花子　大小青

金腦香卽社茶根梗葉俱可用　臭木待根

紫金藤　生藍葉　水圹根　烏苞根　嫩柏根

青王叉　山烏豆　雞屎子　晚禪西　狸咬柴

土木香

右薄荷煎服

腫勢甚加水金鳳水苦蕒

手足拘攣加釣鉤藤根梭婆子根

發熱加吉面消毛蕨根

小便不通加木通梔子

靑黃消毒散

治疔瘡瘴氣服凉藥過劑沉而不發不退者

雄黃研　大小靑各一兩　八角茴香五錢

右末陳酒調服又以酢和米泔塗患處一日服三次

四神丹

治因剝割瘴死牛馬豬羊不避其氣以中其毒或因食瘴死牛馬豬羊之肉者或手足各處發疔毒或起紫泡或起堆核初則創人次漸腫大疼痛不可忍昏悶發熱口渴心煩四肢强痛頭目昏花一切瘴毒並皆治之先服此藥次服刼瘴消毒散

苦花子又名毛連子又名小葉金雞舌梗葉俱用

土木香根名靑木香梗名天仙藤花名馬兜鈴

仙人薯用根新鮮生者爲妙乾者次之各二兩

晚蠶砂一兩

右鍘碎擂水和煮粽汁冷服熱極加芭蕉心小便不利加琉璃草又名耳環尻擂和前藥服之

萬全散

治瘴氣時毒疔瘡蛇犬咬等證

嫩柏根　水圹根　狸咬柴　烏苞根　青王叉
生藍葉　溪楓根　穿山蜈蚣

右薄荷煎服及調雄黃末服或合七神散更妙

七聖紫金錠

治疔瘡瘴氣時毒等證

土木香　苦花子連梗葉　仙人薯　晚蠶砂
柏花各一兩　硃砂　雄黃各三錢

右末秫米糊爲丸以毛尿梯根磨水化下

硃墨丸

治疔瘡瘴毒

硃砂　京墨各等分

右末以蟾酥汁爲丸如梧桐子大每服二丸以葱白煎湯吞下日服一二次

萬病解毒丸

治疔瘡癰疽發背腫瘍時毒狐狸毒鼠莽毒丹毒驚毒瘴毒風毒熱毒蠱毒河豚疫死牛馬豬羊毒蛇犬蜈蚣蜂蠍百蟲螫咬毒湯火所傷中惡邪氣無名腫毒菰毒砒毒藥毒瘡毒光粉輕粉毒一切邪熱毒悉皆治之

麝香二錢　硃砂五錢　山豆根　續隨子取仁

雄黃　紫河車　獨脚蓮各一兩　五倍子三兩

紅牙大戟一兩五錢　山慈姑二兩

右末秋米糊和勻杵擣一千餘下印作錠子隨意大小每服一錠井水磨化冬月用薄荷湯磨服日可進二三服

刷瘴散

治疔瘡瘴毒服藥後可用此藥刷塗

生藍葉　地薄荷　紫金藤

右擂米泔水暖刷患處次加蠶砂凌霄花雞肶花二花如無以葉代之

掞瘴散

治疔瘡瘴毒潰爛成瘡

柏樹皮去外面粗皮　側柏葉各等分

右細末以柏油先刷次掞末

洗瘴方

柏葉　朴葉　柳枝　連叉葉

右煎水淋洗之

羅氏托裏散

治一切發背疔瘡

黃芪兩半　厚朴　川芎　防風　桔梗各二兩

連翹二兩二錢　芍藥　官桂　白芷　甘草節

人參各一兩　木香　沒藥　乳香　當歸各半兩

右爲細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和查溫

服

連翹黃芪湯

治疔瘡因食瘴死牛羊足生大疔如釘入肉痛不

可忍者

金銀花　黃芪　當歸　蜈蚣一條去頭足酒炙

連翹　甘草

右生薑煎服

羅氏保生錠子

治疔瘡背疽瘰癧一切惡瘡

金脚信　輕粉各二錢　雄黃　硇砂各三錢

麝香一錢半　蟾酥一錢　巴豆生四十九粒另研

右爲細末用黃蠟五錢鎔開將藥和成錠子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹世傳疔瘡必有一條紅線可針紅線所至之處出毒血然後傅藥

滴滴金

治疔瘡

硇砂　輕粉　人言　雄黃　硃砂各一錢

麝香少許

右爲細末每用些少先以針刺開瘡頭貼藥黃水出效

疔瘡錠子

硇砂一錢　白芷　雄黃　蒼耳子　甘草各半錢

右爲細末用蟾酥汁和作錠子如前法用須五月

五日合

回瘡錠子

治疔瘡大效

草烏頭一兩　蟾酥七粒　巴豆七箇去皮

麝香一字

右爲細末麪糊和就捻如錠子如有惡瘡腫毒不痛無血者用針深刺至痛處有血出以此錠子紝之上用膏藥貼之疔瘡四畔紝之其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用此證大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砭射出血者亦有久而潰爛出膿者其間變異百端不可不愼也

神聖膏藥（羅氏）

治一切惡瘡

木鼈五十箇去皮　當歸　藁本各半兩　沒藥

乳香各二錢　白芨　琥珀各二錢半　黃丹

黃蠟各二兩　白膠香三兩　巴豆十五粒去油

粉霜　膽礬各一錢　槐柳枝各一百二十枝

清油

右件一處先將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥熬勿至焦濾出却將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立有神效

奪命散（保命集）

治疔瘡

烏頭尖　附子底　蠍梢　雌黃　雄黃各一錢

蜈蚣一兩　硇砂　粉霜　輕粉各五分　腦子

麝香各少許　砒二錢半

右爲細末先破瘡出惡血以草枝頭用紙帶藥末插入於內以深爲度

郭氏寸金錠子

治疔毒惡瘡

硃砂三錢　黃丹　明礬枯　砒霜　輕粉

花鹼　白芨各錢半　蟾酥　腦子　麝香各少許

右研極細末稠糊和爲錠子用之

郭氏提疔錠子

治疔瘡危篤發昏兼治瘰癧

雄黃　硃砂各二錢　靑鹽　砒霜生　白丁香

螌蝥去翅足　眞輕粉各一錢五分　蟾酥

麝香各一錢　黃蠟　蓖麻子三七粒

右爲細末於銀器內或磁器先將蠟鎔化和前藥丸如桐子大捻作餅子用針刺破疔瘡放一餅子於瘡頭上又刺四邊五七下惡血出爲妙却用輭膏藥貼之立驗內服首功元黑散或蟾酥丸

郭氏守效散

點疔瘡惡肉

砒霜生　白丁香　松香　眞輕粉　川烏

生礬各二錢　蜈蚣一條焙乾

右爲極細末鈹針刺破瘡口令血出唾津調藥貼之瘡上其根自潰

麝香蟾酥丸

治一切癰疽發背疔瘡內毒如未破用針刺破撚藥在內膏藥貼之其瘡卽潰

蟾酥　輕粉　乳香各五分　信　雄黃各一錢

巴豆十箇去皮油　麝香少許　寒水石三錢

右爲細末滴水爲丸作錠子如小麥粒大量瘡大

小用之寒食麪糊爲丸

追毒丹

取黃去疔頭追膿毒立效

蟾酥乾者用酒化　硇砂　白丁香（無此味加巴豆）

眞輕粉各一錢　雄黃　硃砂爲衣各二錢

蜈蚣酒浸炙乾黃　巴豆七粒去殼不去油

右總爲細末麪調水爲丸如丸不就用酒打麵糊爲丸如麥大兩頭尖入於針破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追出膿血毒物又如有黑陷漏瘡者四圍死敗肉不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死肌敗肉生新肉而愈小者用一粒大者加用之病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上安此藥水沉膏貼之其瘡卽時紅腫爲度去其敗肉爲妙

海馬拔毒散

治疔瘡大效兼治惡瘡發背

海馬二箇炙　穿山甲黃土炒去土　硃砂

水銀各一錢　麝香　片腦各少許　雄黃三分

右爲末針破瘡口點藥入內一日一點大有效

芫花根膏

治魚臍疔瘡久治不瘥者

芫花根一兩　黑豆三合　豬牙皁角五鋌

白礬三兩煅研細

右用酢一斗將前三味先浸三日於釜中以火煎至二升去查却入鐺中煎至一升入白礬末攪令勻去火成膏但是魚臍丹惡瘡攤於帛上貼日二易之

四聖旋疔散

治疔瘡生於四肢其勢微者先以好酢調藥塗上以紙封之次內服托裏之藥其疔自旋出根

巴豆仁五分　白殭蠶　輕粉　硇砂各二錢半

右爲細末酢調用之

拔毒散

治疔瘡

鹽白霜　粉霜　膽礬　硇砂各一錢另研

蜈蚣一條炙

右爲末和勻先用羊骨針挑破頭點藥在上酢糊紙貼上其根一時自出

保生餅子

治諸疔等瘡

金脚信二錢　雄黃　硇砂各三錢　輕粉　麝香各一錢　巴豆四十九粒泡熟去殼研

右爲末和勻用黃蠟一兩鎔和藥成錠水浸少時取出用時捻作餅如錢眼大以羊角骨針挑瘡頭按藥在上以酢糊紙貼之膏藥亦可黃水出爲效

濟生金砂散

取疔瘡

道人頭微炒存性一兩卽蒼耳子　硇砂三錢半　雄黃三錢　蟾酥以多爲妙

右將瘡四圍刺破油調藥末於瘡內緋帛封之數日疔自出如瘡入腹嘔逆者蒼耳搗汁飲之

鐵罐膏

治一切惡瘡內毒此藥止痛追死肉

桑柴灰　蕎麥稭灰　石灰各一椀　炭灰少許

右用瓦罐一箇底旁鑽一穴塞住將前項灰塡在內用水注滿厚紙封固一伏時用蘆筒插在罐孔內淋之盡其水不用灰將淋灰水於鍋內慢火熬用鐵片續續攪以滴水不散爲度鐵罐盛之封口

或有諸般瘡及腸風痔漏量瘡用之妙

又方

用鈹刀點破疔頭以蟾酥傅之後用

野菊花　莎草根　甜菜葉

擂細以無灰酒盡量調服之酒醒疔化爲水卽痛定如熱除不必去疔亦自愈也

鐵粉散

專治冷疔瘡經久不效

多年生鐵三錢炒過　松脂一錢　黃丹飛過

輕粉各五分　麝香少許

右爲細末用清油調搽瘡口立效

又方

治疔瘡

山慈姑　鐵銹　生薑　江茶　鹽少許

用銀針撥開疔瘡卽以前藥搭作餅子如大棋子放疔頭上甚者半月皮皺可醫不皺難治矣

雄黃散

治疔瘡

雄黃　硇砂　蒼耳草燒灰

右爲末酢調數次將菊花搗爛薑汁調清者服之濃者傳之

追毒丸

治疔瘡發背

蝦蟆糞二分　麻蟲　雄黃　黃丹各一分

右爲末水丸如米大將瘡撥開頭入藥在內以膏藥貼之

蜣蜋膏

治疔毒

蜣蜋三箇肚白者佳　黃麻蟲十箇

右二味搗勻撥破患處貼之如患在手足間有紅絲上臂絲盡處將針挑斷出血仍用前藥

又方

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁　蟬蛻　貫仲各一兩　乳香炙

丁香各二錢

右爲細末每服二錢空心溫酒下

又方

治疔瘡危篤者二服即愈輕者一服立效

土蜂房一小窠全　蛇蛻一條全

右作一處器皿中盛用黃泥封固火煅存性研爲細末每服一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已化黃水矣仍服五聖散

五聖散

大黃　甘草各一兩　生薑　皂角針　金銀花各二兩　苦蔞一箇

右㕮咀用好酒二升同煎至八分去查不拘時服

破棺丹

治疔黃走癊不止

當歸　赤芍藥　山梔子　牽牛各二兩半

連翹　牡蠣　金銀花　紫花地丁各一兩半

京三稜　甘草各二兩

便祕加大黃三兩右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用童便化開服忌飲酒及生冷硬物

立馬回疔丹

治疔瘡走癊不止

金脚信　蟾酥　血竭　硃砂　沒藥各半錢

輕粉　龍腦　麝香各一字

右爲細末用生草烏汁和如麥子大用時將瘡頂

刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫是效

又方

治疔走了黃打滾將死者

牡蠣　大黃　山梔子　金銀花　木通　連翹

牛蒡子　地骨皮　乳香　沒藥　苦蔞　皂角刺

右各等分剉碎每服半兩氣壯者加朴硝用水一椀酒半椀煎一服定愈

蟾酥走黃丸

治疔瘡走黃

硃砂研　黃丹飛　白麪各等分

右末取蟾酥搜作劑丸如麥粒大先刺瘡口次安一粒在瘡口內仍以水沉膏貼之又以五七丸葱湯吞下發汗即愈

迴瘡蟾酥錠子

治疔瘡毒氣攻心欲死以針刺其瘡向心行處但覺痛有血處下錠子若累刺至心側近皆不痛無血者急針百會穴痛有血者下錠子若無血以親人熱血代之猶十活三四初發無有不效大抵疔

瘡生於胷背頭項最急初生痛痒不常中陷如釘撼之有根壯熱惡心是也

南星　款冬花　巴豆仁　黃丹　白信各一錢

獨活五分　盤蝥去頭足十箇

右爲極細末用新蟾酥和藥如黍米大撚作錠子每遇疔瘡先以針刺其瘡必不知痛有血出者下錠子如覺痛不須再用若更不知痛再隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛即止其原瘡亦覺疼痛以膏藥貼之膿出自瘥用錠子法度以銀作細筒

子一箇約長三寸許隨針下至瘡痛處復以細銀絲子內藥於筒內推至痛處

化毒丸

治內疔

硃砂　雄黃各一錢　蟬蛻十枚　硼砂生

輕粉各五分　麝香一分　片腦半分

右末蟾酥爲丸菉豆大每用一丸舌上含化取涎化後以井水漱淨無此丸用單蟾酥代之亦可

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十六卷目錄

醫部彙考三百六十六
外科癰疽疔毒門八
單方

藝術典第三百八十六卷

醫部彙考三百六十六

外科癰疽疔毒門八

單方

遠志酒治一切癰疽發背癤毒惡候潰有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊血在內熱逼人手不可近傳之必清涼或氣虛血冷潰而不斂若七情內鬱治之必愈遠志不以多少泔浸搥去心曬乾爲末酒一

盞調末三錢澄淸飲之以滓傅於患處

忍冬藤酒治食膏粱炙煿過多及服金石補藥日久發疽預服免患忍冬藤鮮者五兩乾者一兩大甘草節一兩作一劑用水三鍾煎至二鍾入無灰好酒一鍾再煎十餘沸去柤分三次服能飲酒者一次服另取藤搗爛酒調塗患處中留頭出毒乾再搽一方無甘草節

槐花酒治發背一切瘡毒不問已成未成但焮痛者並治之槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去柤熱服未成者二三服已成者一二服

癰疽瘡腫名金鍼散皂角針春取一半新採一半黑者一味不拘多少曬乾爲末食後酒調二三錢服

癰疽腫痛無頭用貝母穿山甲天花粉共爲末每服三錢水二鍾煎半鍾一日四服其毒自在大小便下矣可與前方合爲一貼

一切癰疽能消腫逐毒使毒不內攻其效不可具述名國老膏用甘草大者二斤搥碎河水浸一宿揉令漿汁濃去盡筋滓再用絹濾過銀石器內慢火熬成

膏用器收之每服一二匙無灰酒或白湯亦可曾服燥藥丹劑者亦解之本事方每甘草一斤分作三服溫酒調下今云一二匙恐力少也

截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻於內名牛膠飲用牛膠通明者四兩用酒一椀入膠內重湯煑鎔透攪勻傾出更浸酒隨意飲能飲者以醉爲度此方活人甚多

黃礬丸服過一兩已上無不取效最止疼痛不傷臟腑活人不可勝數用白礬一兩黃蠟半兩右和丸如桐子大每服十丸漸加至五十丸溫酒送下如未破卽消已破卽合一日服百粒則有效能防毒氣內攻尤能護膜始終須服半斤瘡愈後服之尤佳一方用明礬飛過研細以雞子二箇取清調礬末稀稠如糊用無灰陳好酒化開服之膿未成者卽消已成膿者從大小便出神效其功大勝黃礬丸

一切瘡腫牛蒡根三莖洗淨煑令爛於盆中研令細去筋膜汁中卽下米煑粥鹹淡任性服一椀甚良無忌名牛蒡粥

豬牙皂角去皮如法酢炙焦黃爲末每服半錢加穿山甲全者看患人證在何處就取此處甲用以蛤粉炒爲末一錢與皂角末相和溫酒調下證在上食後服證在下食前服神效名破毒無比散

一切無名腫毒瘡癤貝母一味去心切細一半生曬一半微炒和勻爲末病在上食後服病在下食前服酒調一二錢名消毒散

神效葱熨法治流注結核骨癰鶴膝等證腫硬或先已隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行壅滯其功甚大又爲跌撲傷損止痛散血消腫之良法用葱白頭搗爛炒熱頻熨患處冷再換

凡癰腫初起以熱湯頻沃之卽散

凡腸癰取死人塚土作泥塗之良

一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可（外臺祕要下同）

瘭疽出汁著手足肩背累累如米用竈突墨竈屋塵釜下土研勻水一斗煮三沸取汁洗日三四度

石癰不膿梁上塵葵根莖灰等分用酢和傅之（千金方）

惡癧腫毒痛鉛白霜一分甘草半生半熟爲末綿裹含嚥（聖惠方）

骨疽出骨一名多骨瘡又時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名以密陀僧末桐油調勻攤貼之卽愈（壽域方）

雌雄疔瘡用鐵粉一兩蔓青根三兩搗如泥封之日二換（集元方）

疔腫拔根用鐵查一兩輕粉一錢麝香少許爲末針畫十字以點藥入內酢調麪糊傅之神效（普濟方）

疔腫初起多年土內銹釘火煆酢焠刮下銹末不論遍次煆取收之每用少許人乳和挑破傅之仍炒研二錢以蜜水煎滚待冷調服（普濟方下同）

癰疽楊梅諸惡瘡水銀一兩硃砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈琖蓋定鹽泥固濟文武火煉升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分洒太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜

魚臍疔瘡四面赤中央黑銀硃水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹

疔瘡惡毒刺四邊及中心以雄黃末傅之神驗

一方用雄黃蟾酥各五分爲末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙

手足甲疽熏黃蛇皮等分爲末以水洗淨割去甲入肉處傅之一頃痛定神效（近效方）

癰疽瘀肉石灰半斤蕎麥稭灰半斤淋汁煎成霜密封每以針畫破搽之自愈

疔瘡惡腫石灰半夏等分研末塗之（普濟方下同）

疔瘡發背白浮石半兩沒藥二錢半爲末酢糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下

疔腫熱毒慈石末酢和封之拔根立出（外臺祕要）

甲疽腫痛石膽一兩燒煙盡研末傅之不過四五度瘥（梅師方）

疔毒腫痛白薑石末和雞子淸傅之乾即易疔自出神驗（崔氏方）

潰癰作癢以鹽摩其四圍即止（外科精義）

疔瘡腫毒好硇砂雄黃等分研以銀篦挑破瘡口擠去惡血安藥一豆入內紙花貼住即效毒氣入腹嘔

吐者服護心散（瑞竹堂方）

癰疽不合石硫黃以筋蘸插入孔中以瘥爲度（外臺祕要）

疔瘡腫毒雪白礬末五錢葱白煨熟搗和丸梧子大每服二錢五分以酒送下未效再服久病孕婦不可服（衞生寶鑑）

魚睛疔瘡枯礬末寒食麵糊調貼消腫無膿（崔氏方）

疔腫惡瘡二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傅之不過三次決愈（衞生寶鑑）

諸般癰疽用甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片鎔成汁投酒中取出如此九度令病者飲酒至醉寢後即愈也

又方甘草一大兩火炙擣碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是瘡腫發背皆效

又方用甘草三大兩生搗篩末大麥麪一兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙束之仍令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍喫黃芪粥爲

妙神效

些小癰癤發熱時即用粉草節曬乾爲末熱酒服一二錢連進數服痛熱皆止（外科精要）

疔瘡腫毒生薺苨根搗汁服一合以滓傅之不過三度

癰疽便閉紫草苦蔞實等分新水煎服（直指方）

疔瘡腫毒白芨末半錢以水澄之去水攤於厚紙上貼之（袖珍方）

癰疽腫毒黃連檳榔等分爲末雞子清調搽之（簡易方）

癰疽瘡腫已潰未潰胡黃連穿山甲燒存性等分爲末以茶或雞子清調搽之（簡易方）

瘡口不合秦艽爲末摻之（直指方）

癰疽疔瘡惡瘡及黃疽慈姑連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫服或乾之爲末每酒服三錢（乾坤生意）

癰疽疔腫一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑者加酢

又鐵箍散用金絲草灰二兩酢拌曬乾貝母五兩去

心白芷二兩爲末以凉水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許

諸瘡腫痛撫芎煅研入輕粉麻油調塗（普濟方）

疔瘡初起白芷一錢生薑一兩擂酒一戔溫服取汗卽散（袖珍方）

癰疽赤腫白芷大黃等分爲末米飲服二錢（經驗方）

一切癰疽瘡癤惡瘡下痒臁瘡潰後外傷風寒惡汁臭敗不斂並主之木香黃連檳榔等分爲末油調頻塗之取效（和劑局方）

疔腫諸毒荆芥一握切以水五升煑取二升分二服冷飲（藥性論）

一切瘡疥荆芥末以地黃自然汁熬膏和丸梧子大每服三五十丸茶酒任下（普濟方）

熱毒瘡腫秋後收連錢草陰乾爲末水調傅之生搗亦可（寇氏衍義）

疔腫垂死菊花一握搗汁一升入口卽活此神驗方也冬月采根（肘後方）

癰疽疔腫一切無名腫毒用野菊花連莖搗爛酒煎

熱服取汗以查傅之卽效（集效方）

又方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以查敷之取汗卽愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可（易簡方）

疔瘡腫毒艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛乃點藥三遍其根自拔神驗（千金方）

癰疽不合瘡口冷滯以北艾煎湯洗後白膠香熏之（直指方）

一切癰瘡婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥癬陰蝕並用天麻草切五升以水一斗半煑一斗分數次洗之以殺痒（千金方）

急慢疔瘡用益母草搗爛傅之仍絞汁五合服卽消

又方用益母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃開疔根令血出次遶根開破捻出血拭乾以稻草心蘸藥撚入瘡口令到底良久當有紫血出捻令血淨再撚藥入見紅血乃止一日夜撚藥三五度重者二日根爛出輕者一日出看瘡根脛脹起卽是

根出以針挑之出後仍敷藥生肌易愈忌風寒房室酒肉一切毒物

丁瘡惡腫千針草四兩乳香一兩明礬五錢爲末酒服二錢出汗爲度

癰疽發背初起未成者苧根熟搗傅上日夜數易腫消卽瘥（圖經本草）

諸瘡腫毒牛蒡根五莖洗煑爛搗汁入米搗服食一椀甚良（普濟方）

積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月猪

脂日日封之（千金方）

一切丁腫危困者蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚驗

又方用蒼耳根苗燒灰和酢淀塗之乾再上不十次卽拔根出

又方蒼耳根三兩半烏梅肉五箇連鬚葱三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗（邵眞人方）

疔瘡腫毒地菘葉浮酒糟同搗傅之立效（集效方）

癰疽腫毒一切惡瘡端午采豨薟草一兩乳香一兩

白礬燒半兩爲末每服二錢熱酒調下毒重者連進三服得汗妙（乾坤秘韞）

發背疔瘡豨薟草五葉草即五爪龍野紅花即小薊大蒜等分擂爛入熱酒一椀絞汁服得汗立效（乾坤生意）

丁瘡腫毒端午采豨薟草暴乾爲末每服半兩熱酒調下汗出即愈極有效驗（集簡方）

癰疽惡肉白炭皮白荻灰等分煎膏塗之蝕盡惡肉以生肉膏貼之亦去黑子此藥只可畱十日久則不效（肘后方）

癰疽疔腫惡肉地黃三斤水一斗煮取三升搗敷之或去查煎稠塗紙上貼之日三易

癰瘡已潰用牛膝根略刮去皮插入瘡口中畱半寸在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗其上牛膝能去惡血二草溫凉止痛隨乾隨換有十全之功也（經驗方）

瘭疽惡毒肉中忽生一黶子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其黶有核核有深根應心能爛筋骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁可解其熱毒（集驗方）

癰腫無頭三日後取葵子一百粒水吞之當日即開

也一云只吞一粒即破如吞兩粒即有兩頭也一方葵子爲末水調敷之

腸胃生癰懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各五錢爲末黃蠟鎔化和丸梧子大每空心米飲下二十丸待膿血出盡服十宣散補之（皆效方）

諸瘡腫痛不可忍者葵花根去黑皮搗爛入井華水調稠貼之（普濟方）

癰疽腫毒黃蜀葵花用鹽摻收瓷器中密封經年不壞每用傅之自平自潰無花用根葉亦可（直指方）

便癰初起黃葵子七七粒皂角半挺爲末以石灰同酢調塗之（永類鈐方）

癰腫無頭龍葵莖葉搗傅（經驗方）

發背癰腫成瘡者龍葵一兩爲末麝香一分研勻塗之善

一切癰疽發背惡瘡用蝦蟆一箇同老鴉眼睛草莖葉搗爛敷之即散神效一方無蝦蟆

疔腫毒瘡黑色焮腫者乃服丹石毒也赤色者肉麪

毒也用龍葵根一握洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大小傅之覺痒卽換去痒不可忍切勿搔動候歘久瘡中似石榴子戢戢然乃去葉時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊血如無龍葵以蔓菁根代之（聖濟總錄）

魚臍疔瘡瞿麥燒灰以油和傅之甚佳（崔氏方）

疔腫初起王不留行子爲末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出卽愈

發背癰毒痛不可忍龍牙草卽馬鞭草搗汁飲之以查傅患處

疔瘡惡腫五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之三二日疔脫（聖濟總錄）

癰疽腫毒連翹草及根各一升水一斗六升煮汁三升服取汗（外臺祕要）

癰腫惡肉不消者蒴藋灰石灰各淋取汁合煎如膏傅之能蝕惡肉亦去痣疵此藥過十日卽不中用（千金方）

惡瘡痂痒作痛萹竹搗封痂落即瘥方（肘后）

一切疔腫蒺蔾子一升熬搗以酢和封頭上拔根（外臺祕要）

諸瘡腫毒蒺蔾蔓洗三寸截之以水五升煑取二升去查納銅器中又煑取一升納小器中煑如飴狀以塗患處方（千金）

一切癰疽及腸癰奶癰赤腫未破或已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分爲末每服二錢溫酒下（和劑局方）

癰疽惡瘡紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒一鍾攪汁服方（經驗）

癰疽發背無名諸腫紫花地丁草三伏時收以白麪和成鹽醋浸一夜貼之昔有一尼患發背夢得此方數日而痊方（集效）

一切惡瘡紫花地丁根日乾以罐盛燒烟封瘡熏之出黃水取盡愈方（易簡）

疔瘡腫毒紫花地丁搗汁服危極者亦效

又方用葱頭生蜜共搗貼之若癗瘡加新黑牛屎

腫毒初起大黃五倍子黃蘗等分爲末新汲水調塗日四五次（簡便方）

癰腫焮熱作痛大黃末酢調塗之燥卽易不過數易卽退甚驗神方也

一切毒腫商陸根和鹽少許搗傅日三易之（千金方）

石癰如石堅硬不作膿者生商陸根搗擦之燥卽易取軟爲度亦治濕漏諸瘺瘡傷

瘡傷水毒商陸根搗炙熱布裹熨之冷卽易之（千金方）

緩疽腫痛藺茹一兩爲散溫水服二錢（聖惠方）

石癰堅硬不作膿者莨菪子爲末酢和傅瘡頭根卽拔出（千金方下同）

癰疽腫毒以烏頭炒黃蘗炒各一兩爲末唾調塗之畱頭乾則以米泔潤之

癰疽肉突烏頭五枚濃酢三升淹五日洗之日夜三四度（古今錄驗）

疔瘡腫痛酢和附子末塗之乾再上（千金方）

疔毒初起草烏頭川烏頭各三箇杏仁九箇飛羅麪一兩爲末水調搽畱口以紙蓋之乾以水潤之（經驗方）

疔毒惡腫生烏頭切片酢熬成膏攤貼次日根出

又方兩頭尖一兩巴豆四箇搗貼疔自拔出（普濟方）

疔瘡發背草烏頭去皮爲末用葱白連鬚和搗丸豌豆大以雄黃爲衣每服一丸先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之卽以被厚蓋汗出爲度亦治頭風（乾坤祕韞）

惡毒諸瘡及發背疔瘡便毒等證二烏膏用草烏頭川烏頭於瓦上以井華水磨汁塗之如有口卽塗諸四邊乾再上亦可單用草烏磨酢塗之

癰腫初起芫花末和膠塗之（千金方）

癰瘺已潰芫花根皮搓作撚插入則口不合令膿易竭也

癰瘡未潰茵草一兩爲末雞子白調塗帛上貼之日二易取痛爲良

癰腫初起苦蔞根苦酒熬燥搗篩以苦酒和塗紙上貼之

諸般癰腫新掘天門冬三五兩洗淨沙盆擂細以好酒濾汁頓服未效再服必愈（醫學正傳）

癰疽毒瘡赤何首烏不限多少瓶中文武火熬煎臨熟入好無灰酒相等再煎數沸時時飲之其查焙研爲末酒煑麪糊丸梧子大空心溫酒下三十丸疾退宜常服之（外科精要）

疔瘡發背初起水調白蘞末塗之（肘后方）

一切癰腫白蘞二分藜蘆一分爲末酒和貼之日三上

諸瘡不斂白蘞赤蘞黃蘗各三錢炒研輕粉一錢用葱白漿水洗淨傳之

癰腫不散生白藥根搗貼乾則易之無生者研末水和貼（圖經本草）

一切癰疽初起不問發於何處用木蓮四十九箇揩去毛研細解開溫服功與忍冬草不相上下（外科錄要）

疔瘡黑凹用髮繩劄住將尖葉薜荔搗汁和蜜一琖服之外以葱蜜搗傳四圍（聖惠方）

一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用金銀花俗名甜藤采花連莖葉自然汁半盌煎八分服之以查傳上敗毒托裏散氣和血其功獨勝疔瘡便毒喉痺

乳蛾方皆同（積善堂方）

敷腫拔毒金銀藤大者燒存性葉焙乾爲末各三錢大黃焙爲末四錢凡腫毒初發以水酒調搽四圍留心洩氣（經驗方）

癰疽發背生菖蒲搗貼之瘡乾者爲末水調塗之

腫毒初起水中萍子草搗傅之（肘后方）

一切癰疽馬蹄草即蓴菜春夏用莖冬月用子就於根側尋取搗爛傅之未成即消已成即毒散用菜亦可（保生餘錄）

數種疔瘡馬蹄草又名缺盆草大青葉臭紫草各等分擂爛以酒一椀浸之去查溫服三服立愈（經驗良方）

熱毒腫丼丹毒但取渠中藻菜切搗傅之厚三分乾即易甚效無比

熱毒丹瘡千金方用愼火草搗汁拭之日夜拭一二十徧一方入苦酒搗泥塗之乾則易

一切腫毒野園荽一把穿山甲燒存性七分當歸尾三錢擂爛入酒一椀絞汁服以查傅之（集簡方）

瘡瘍刺骨草血竭搗罨之自出（本草權度）

一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消

治疔瘡如櫻桃者用佛掌花根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之

疔腫惡瘡胡麻燒灰針砂等分爲末酢和傅之日三（普濟方）

癰瘡不合烏麻炒黑搗傅之（千金方）

癰疽發背初作即以麻油一斤銀器煎二十沸和醇酢三椀分五次一日服盡（直指方）

腫毒初起麻油煎葱黑色趁熱通手旋塗自消（百一選方）

疽瘡有蟲生麻油查貼之綿裹當有蟲出（千金方）

一切疔腫麪和臈猪脂封之良（梅師方）

癰疽發背一切腫毒蕎麥麪硫黃各二兩爲末井華水和作餅曬收每用一餅磨水傅之痛則令不痛不痛令痛即愈（直指方下同）

瘡頭黑凹蕎麥麪煑食之即發起

赤根疔腫白粉熬黑和蜜傅之（千金方）

癰疽發背稷米粉熬黑以雞子白和塗練上剪孔貼

之乾則易神效（葛氏方）

疔瘡惡腫小豆花末傅之

瘡腫傷風中水痛劇者黍穰燒烟熏令汗出愈（千金方）

石癰諸癰赤小豆五合納苦酒中五宿炒研以苦酒和塗即消加苦蔞根等分（范汪方）

癰疽初作赤小豆末水和塗之毒即消散頻用有效（小品方）

服硫發癰酢和豉研膏傅之燥則易（千金方）

一切腫毒葱汁漬之日四五度

疔瘡惡腫刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔出以酢湯洗之神效（聖濟總錄）

瘡犯惡露甚者殺人薤白搗爛以帛裹煨熱去帛傅之冷即易換亦可擂作餅以艾灸之熱氣入瘡水出即瘥也（梅師方）

一切惡瘡熬豉研傅之不過三四次出（楊氏產乳）

魚臍疔瘡寒食餳塗之良乾者燒灰（千金方）

風熱腫毒蕓薹苗葉根蔓菁根各三兩爲末以雞子清和貼之即消無蔓菁即以商陸根代之甚效（近效方）

癰疽不潰苦酒和雀屎如小豆大傅瘡頭上卽穿也（肘后方）

癰疽初起乾薑一兩炒紫研末酢調傅四圍留頭自愈奇方也（諸證辨疑）

惡毒癰腫或連陰卵髀間疼痛攣急牽入小腹不可忍一宿卽殺人者用茴香苗葉搗汁一升服之日三四服其查以貼腫上冬月用根此是外國神方永嘉以來用之起死囘生神效

一切腫毒松香八兩銅青二錢蓖麻切五錢同搗作膏攤貼

疔瘡腫毒馬齒菜二分石灰三分爲末鷄子白和塗之

對口惡瘡野苦蕒搗汁一鍾入薑汁一匙和酒服以查傅一二次卽愈

魚臍瘡其頭白似粟腫痛不可忍先以針刺破頭及四畔以白苣滴孔中卽愈

疔瘡初起不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗卽愈

疔毒作痛魚腥草搗爛傅之痛一二時不可去草痛後一二日即愈

疔瘡惡腫野灰藋菜葉燒灰撥破瘡皮唾調少許點之血出爲度

腫毒初起帶泥山藥蓖麻子糯米等分水浸研傅之即散也（普濟方）

熱毒瘡腫生茄子一枚割去二分去瓤二分似罐子形合於瘡上即消也如已出膿再用取瘥（聖濟總錄）

癰疽不斂瘡口太深用絲瓜搗汁頻抹之（直指方）

諸瘡久潰絲瓜兒根熬水掃之大凉即愈（應驗方）

疔腫難拔黑牯牛抛糞在地待生菌子焙乾豨薟草等分爲末以竹筒去兩頭緊縛合住疔上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根拔出未出再作二三次（醫學正傳）

諸瘡腫痛杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效（鮑氏）

癰疽瘡腫已潰未潰皆可用鹽白梅燒存性爲末入輕粉少許香油調塗四圍（簡易方）

卒得惡瘡人不識者桃皮作屑納之（孫眞人方）

諸瘡久壞不愈者彘膏三升煎水噴洗取愈

疔腫惡毒以針刺四畔用櫑皮著瘡上以麪圍四畔灸之以痛爲度仍內櫑末傅上急裹經宿連根自出也（肘后方）

一切癰腫背癰附骨疽未成膿者核桃十箇煨熟去殼槐花一兩研末杵勻熱酒調服（古今錄驗）

疔瘡惡腫核桃一箇平破取仁嚼爛安殼內合在瘡上頻換甚效（普濟方）

石癰堅硬如石不作膿用橡子一枚以酢於青石上磨汁塗之乾則易不過十度卽平（千金方）

疔瘡惡腫用荔枝五箇或三箇不用雙數以狗糞中米淘淨爲末與糯米粥同研成膏攤紙上貼之留一孔出毒氣

又方用荔枝肉白梅各三箇擣作餅子貼於瘡上根卽出也

瘡腫作痛生椒末釜下土蕎麥粉等分研酢和傅之

腸癰已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿用

甜瓜子一合當歸炒一兩蛇退皮一條㕮咀每服四錢水一盞半煎一盞食前服利下惡物妙（聖惠）

一切腫毒野葡萄根曬研爲末水調塗之卽消也

諸般癰腫按毒止痛荷葉中心蔕如錢者不拘多少煎湯淋洗拭乾以飛過寒水石同臘猪脂塗之

毒腫入腹雞舌香青木香薰陸香麝香各一兩水四升煑二升分二服

癰疽惡肉丁香末傅之外以膏藥護之（怪證奇方）

癰疽惡毒番降末楓乳香等分爲末熏之去惡氣甚妙（集簡方）

一切惡瘡用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢半同鎔化入冷水中扯千遍攤貼之（儒門事親）

惡瘡疼痛楓香膩粉等分爲末漿水洗淨貼之

癰疽寒顫乳香半兩熟水研服顫發於脾以乳香能入脾故也（直指方）

收斂瘡口血竭末一字麝香少許大棗燒灰半錢同研津唾調塗之

癰疽腫毒黃蘗皮炒川烏頭炮等分爲末唾調塗之

醋頭頻以米泔水潤濕（集簡方）

斂瘡生肌黃蘗末麪糊調塗效（宣明方）

一切毒腫不問硬軟取楸葉十重傅腫上舊帛裹之日三易之當重重有毒氣爲水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫化膿血勝於衆藥（東陽方）

癰疽發背大如盤臭不可近桐葉醋蒸貼上退熱止痛漸漸生肉收口極驗祕方也（醫林正宗下同）

癰腫初起桐油點燈入竹筒內熏之得出黃水即消

疔瘡腫毒一切癰疽發背不問已成未成但焮痛者皆治槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服效

疔腫惡瘡皂角去皮酥炙焦爲末入麝香少許人糞少許和塗五日後根出（普濟方）

便癰初起皂角子七箇研末傅之一方照年歲吞之

（儒門事親）

腹內生瘡在腸臟不可藥治者取皂角刺不拘多少好酒一盌煎至七分溫服其膿血悉從小便中出極

效不飲酒者水煎亦可（經驗方）

瘡腫無頭皂角刺燒灰酒服三錢嚼葵子三五粒其處如針刺爲效

卒生惡瘡不可名識者柳葉或皮水煑汁入少鹽頻洗之（肘后方）

一切惡瘡巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效

癰疽惡肉一切瘡毒巴豆仁炒黑研膏點痛處則解毒塗瘀肉上則自化加乳香少許亦可若毒深不能收斂者宜作撚紝之不致成痛（外科精義）

石癰堅硬不作膿者蜀桑白皮陰乾爲末烊膠和酒調傅以軟爲度（千金）

癰口不斂經霜黃桑葉爲末傅之（直指方）

癰疽瘺毒狗頭骨灰蕓薹子等分爲末水和傅之（千金）

惡瘡不愈狗頭骨灰同黃丹末等分傅之（壽域方）

長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩當歸二錢半爲末麻油調敷（直指方）

癰瘡大痛壁虎焙乾研末油調傅之即止（醫方摘要）

癰疽不合破蒲席燒灰臘月猪脂和納孔中（千金下同）

內癰未成取伏雞屎水和服即瘥

凡諸般惡瘡取東牆上土及大黃等分爲末用無根井華水調搽乾則再上（瑞竹堂方下同）

一切惡瘡取燕窠內外泥糞研細油調搽一加黃蘗末

凡惡瘡腫毒用松木上白蟻泥同黃丹各炒黑研和香油塗之

無名惡瘡梁上倒掛塵二條韭地蚯蚓糞少許生蜜和捻作餅如錢大陰乾用蜜水調頻傅之（簡便方）

諸般毒瘡用門臼塵切蒜蘸擦至出汗即消

瘡傷水濕胡粉炭灰等分脂和塗孔上水即出也（千金方）

蛇皮惡瘡鐵漿頻塗之（談野翁方）

一切惡瘡雲母和傅之（千金方）

惡肉毒瘡一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙兩張揉熟蘸水銀擦之三日自落而愈

日久頑瘡不收者銀硃一錢千年地下石灰五分松香五錢香油一兩爲末化攤紙上貼之（應急良方）

廣東惡瘡雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末洗淨以雄猪膽汁調上二三日卽愈百發百中（積德堂方）

多年惡瘡多年石灰研末雞子淸和成塊煅過再研薑汁調傅（救急方）

諸般腫毒吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熬膏貼

一切癰疽發背無名腫毒年少氣壯者用黑白牽牛各一合布包搥碎以好酢一椀熬至八分露一夜次日五更溫服以大便出膿血爲妙名濟世散（張三丰仙方）

癰腫癤毒潰爛疼痛用薔薇皮更炙熨之（千金方）

年深惡瘡無心草根乾薑各二錢釣苓根五錢爲末摻之（外科精義）

瘡疽不出紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半水鍾半煎減半量大小加減服（傷寒論）

腫毒已破靑大麥去鬚炒暴乾爲末傅之成靨揭去

又傳數次即愈

癰腫熱毒家芥子末同柏葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙（千金翼下同）

一切癰腫猪膽汁和芥子末貼之日三上猪脂亦可

疔腫惡毒蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅即時毒散大有神效（時珍）

一切疔瘡及無名腫毒惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同搗如泥貼之立效（經驗方）

又方麻蟲即蒼耳草內蟲炒黃色白殭蠶江茶各等分爲末蜜調塗之（總錄）

又方用蒼耳節內蟲四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈

疔瘡毒腫不破則毒入腹用蟬蛻炒爲末蜜水調服一錢外以津和塗之（雜纂）

又方用蟬蛻殭蠶等分爲末酢調塗瘡口四圍候根出拔去再塗（太成）

一切惡瘡及沙蝨水弩惡疽五月五日取蜣螂蒸過

陰乾爲末油和傅之（聖惠）

疔腫惡瘡楊柳上大烏殼硬蟲或地上新糞內及泥堆中者生取以蜜湯浸死新瓦焙焦爲末先以針燒過針撥開好酢調傅之（普濟方）

無名惡瘡忽得不識者用死蜣蜋杵汁塗之（廣利）

疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥五分巴豆仁一枚粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入鎔化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也忌冷水如針破無血係是著骨疔即男左女右中指甲末刺出血糊藥又無血即刺足大拇糊藥如都無血必難醫也

疔腫有根用大針刺作孔削蔓菁根如鍼大染鐵生衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分擣塗於上有膿出即易須臾根出立瘥忌油膩生冷五辛粘滑陳臭（肘後方下同）

天行熱毒攻手足腫痛欲斷用母猪蹄一具去毛以

水一斗葱白一握煮汁入少鹽漬之

癰疽不歛不拘發背一切瘡用鼈甲燒存性研摻甚妙（怪證奇方）

腸癰內痛鼈甲燒存性研水服一錢日三（傳信方）

癰腫未成用此拔毒水調牡蠣粉末塗之乾更上（集驗方）

癰疽赤腫用米酢和蚌蛤灰塗之待其乾即易之（千金）

癰疽有毒蟲鹿角燒末苦酒和塗磨汁亦可

骨疽不合骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎二升同艾及荊葉擣碎入坑內燒令烟出以疽口就熏用衣擁之勿令洩氣半日當有蟲出甚效（千金方）

一切諸瘡五倍子黃蘗等分爲末傅之（普濟方）

一切腫毒五倍子炒紫黑色蜜調塗之

耳垢治癰腫未成膿封之即散疳蟲蝕鼻生瘡及毒蛇螫人並敷之（時珍）

瘡口不收五倍子焙研末以臘酢脚調塗四圍效

一切癰腫未潰用乾人屎末麝香各半錢研勻以豆

大津調貼頭外以酢麵作錢護之膿潰去藥（衍義）

疔腫初起刮破以熱屎尖傅之乾即易不過十五遍即根出立瘥（千金方）

收斂瘡口血竭末一字麝香少許大棗燒灰半錢同研津調塗之（究原方）

疔腫拔根取戸邊蜘蛛杵爛酢和先挑四畔血出根稍露傅之乾即易一日夜根拔出大有神效（千金方下同）

積年諸瘡蜘蛛膜貼之數易

一切腫毒已成未成用水膠一片水漬耎當頭開孔貼之未百日者自消已潰者令膿自出也（外臺祕要）

諸瘡腫毒全蠍七枚梔子七箇麻油煎黑去查入黃蠟化成膏傅之（濟寮方）

凡疔腫取糞坑下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以查敷瘡四圍疔自出也（聖濟總錄）

疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之又治馬鞍瘡神效（聖惠）

魚臍疔瘡似新火針瘡四邊赤中尖黑可刺之若不大痛即殺人也用臘月魚頭灰髮灰等分以鷄溏屎

和塗之（千金方）

疔瘡惡腫黑牛耳垢敷之（聖惠方）

疔腫未破白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麪圍腫處酢洗去之根出大驗（肘後方）

赤根疔瘡馬牙齒搗末臘猪脂和敷根卽出也燒灰傳之亦可愈（千金方）

疔腫傷風作腫以馬屎炒熨瘡上五十遍極效（聖惠方）

疔瘡中風腫痛用驢屎炒熨瘡上五十遍極效（普濟方）

腫毒初起敗龜板一枚燒研酒服四錢

疔瘡惡腫用田螺入冰片化水點瘡上（普濟方）

繞指毒瘡生手足指上以活田螺一枚生用搗碎傳之卽愈（多能鄙事）

疔瘡惡腫十二月猪膽風乾和生葱搗傳（普濟方）

拔取疔黃蟾酥以麪丸梧子大每用一丸安舌下卽黃出也（青囊雜要）

拔取疔毒蟾酥以白麪黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡上插入重者挑破納之仍以水澄膏貼之（危氏方）

疔瘡惡腫蟾酥一錢巴豆四箇搗爛飯丸錠子如菜豆大每服一丸薑湯下良久以萹蓄根黃荊子研酒半椀服取行四五次以粥補之（乾坤祕韞）

一切瘡毒蟾酥一錢白麪二錢朱砂少許井華水調成小錠子如麥大每用一錠井華水服如瘡勢緊急五七錠葱湯亦可汗出即愈

腸內生癰雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服（千金）

決癰代鍼白雞翅下兩邊第一毛燒灰水服即破（外臺）

癰疽惡瘡初腫起當歸黃蘗皮羌活爲細末生鷺鷥膝擣汁調傅瘡之四圍自然收毒聚作小頭即破切不可併瘡頭敷之恐毒氣四攻不可收也（養疴漫筆）

癰疽勢腫惡不潰堅硬以利刀將患處劃成十字路用麪水調稠厚週圍瘡口外高起五分許如塘池樣將梧桐淚塡半滿用好米醋滴淚上須臾自沸勿令滾出麪外次日用金銀花煎湯洗淨再如前用一次只用醋洗不痛爛肉自去

疔瘡腫毒用鍼刀鍼破疔頭以蟾酥傅之後用野菊花莎草根甜菜葉擣細以無灰酒盡量調服之酒醒

疔化水卽痛定如熱除不必去疔亦自愈也

疔瘡入腹嘔者煎道人頭濃汁飲之

疔瘡毒氣入腹昏悶不食紫花地丁蟬蛻貫仲各一兩丁香二錢爲末每服二錢空心溫酒下

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十七卷目錄

醫部彙考三百六十七

外科癰疽疔毒門九

鍼灸

導引

醫案

藝術典第三百八十七卷

醫部彙考三百六十七

外科癰疽疔毒門九

鍼灸

素問曰夫癰氣之瘜者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宐石而瀉之

東方之域其民食魚而食鹹其病皆爲癰瘍其治宐砭石

癰不知所按之不應手乍來乍已刺手太陰旁三痏

與纓脈各二

靈樞經曰凡刺之害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恇致氣則生爲癰疽也

凡刺癰邪勿迎隴易俗移性不得膿脆道更行去其鄉不安處所乃散亡諸陰陽過癰者取之其輸瀉之

鈹鍼者末如劍鋒以取大膿

病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘榮氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其惟砭石鈹鍼之所取也

甲乙經曰項腫不可俛仰頰腫引耳完骨主之

咽腫難言天柱主之

䪼腫脣癰顴窌主之

頰腫痛天牕主之

頭項癰腫不能言天容主之

身腫關門主之

胷下滿痛膺腫乳根主之

面腫目癰刺陷谷出血立已

犢鼻腫可刺其上堅勿攻攻之者死

疽竅陰主之

脉風成爲厲管疽發厲竅陰主之

管疽商丘主之

千金方曰癰疽始作大大痛或小痛或發如米粒即便出膿宜急斷口味利去其毒用騎竹馬灸法或就患處灼艾重者四面中央總灸一二百壯更用敷藥其效甚速

騎竹馬灸法治一切瘡瘍無有不愈令病人以肘凭几豎臂腕要直用篾一條自臂腕中曲處橫紋男左女右貼肉量起直至中指尖盡處截斷爲則不量指甲却用竹扛一條令病人脫衣正身騎定前後用兩人扛起令病者脚不著地又令二人扶之勿令傴僂却將前所量臂篾從竹扛坐處尾骶骨盡處直貼脊背量至篾盡處爲則用墨筆點定此只是取中非灸穴也却用薄篾作則子量病人中指節相去兩橫紋爲則男左女右截爲一則就前所點記處兩邊各量

一則盡處卽是灸穴兩穴各灸五七壯疽發於左則灸右疽發於右則灸左甚則左右皆灸蓋此二穴心脉所過之處凡癰疽皆心火留滯之毒灸此則心火流通而毒散矣起死囘生之功屢試屢驗

癰腫已潰未潰用香豉三升入少水搗成泥照腫處大小作餅厚三分瘡有孔勿覆孔上鋪豉餅以艾列於上灸之但使溫溫勿令破肉如熱痛卽急易之患當減覺輕快一日灸二次如先有孔以汁出爲妙

三因方曰癰疽初覺腫痛先以濕紙覆其上視之先乾處是頭也大蒜切片置頭上以大艾炷灸之三壯卽換一蒜痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃止大槩以百壯爲准最要早覺早灸爲上如有頭則不必紙覆也

若十數頭作一處生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於餅上灸之

直指方曰初發小點一二日急以蒜片貼其中心以小艾炷灸五壯而止

河間六書曰凡瘡瘍須分經絡部分氣血多少腧穴

遠近

從背出者當從太陽五穴選用至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉通谷在足小指外側本節前陷者中束骨在足小指外側本節後陷中崐崘在足外踝後跟骨上陷中委中在膕中央約紋中動脉

從鬢出者當從少陽五穴選用竅陰足小指次指端去爪甲如韭葉夾谿在足小指次指岐骨間本節前陷中臨泣在足小指次指本節後間陷中陽輔在外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分陽陵泉在膝下一寸外廉陷中

從髭出者當從陽明五穴選用厲兌在足大指次指去爪甲如韭葉內庭在足大指次指外間陷中陷谷在足大指次指間本節後陷中衝陽在足趺上五寸骨間動脉去陷骨三寸解谿在衝陽後一寸五分腕上陷中

從腦出者則惟絕骨一穴在外踝上三寸動脉中

癰疽已覺微漫腫硬皮不變也脉沉不痛者當外灸之引邪氣出而止經曰陷下者灸之如外微覺木硬

而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸如有膿水亦不可灸當鍼之

得效方曰癰疽初發漸大以濕紙一片搭瘡上其一點先乾處卽是正頂先以水洗去人皮鹹取大筆管一箇安於正頂上却用大水蛭一條安其中頻以冷水灌之蛭當吮其正穴膿血皮皺肉白是毒散無不差如毒大蛭小須用三四條方見效如血不止以藕節上泥塗之

資生方曰有善治癰疽者皆於瘡上灸至二三百壯無有不愈但艾炷小作之小則人不畏灸灸多則作效必矣

堅硬不潰名曰石癰當上灸百壯石子當碎出

東垣十書曰初覺癰疽發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視先乾處卽癰頭也取蒜切片如三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六七活五日六日三四活過十數日者不可灸若有十數頭作一處者用蒜研成膏

作薄餅鋪頭上聚艾燒之亦能活也若初發赤腫中間有一黃粟米頭用獨蒜切去兩頭取中間切片安瘡頭上著艾灸十四壯多至四十九壯

丹溪心法曰凡癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內熱若於生發之處艾灸以散其毒治之於早可以移深爲淺改重爲輕諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤爲切要此消患於未形之策

多灸則內服乳粉托裏散防火氣入心

醫壘元戎曰瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經曰陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及將潰所以不痛也

薛己醫按曰伍氏云凡用蒜餅灸者蓋蒜味辛溫有毒主散癰疽假火勢以行藥力也有只用艾炷灸者此可施於頑疽痼發之類凡赤腫紫黑毒甚者須以蒜艾同灸爲妙

凡治癰疽發背疔瘡若初灸即痛者由毒氣輕淺灸而不痛者乃毒氣深重悉宜內服追毒排膿外傅消毒之藥大抵癰疽不可不痛又不可大痛悶亂不知痛者難治

凡隔蒜灸者不論壯數則邪無所容而眞氣不損但頭項見瘡宜用騎竹馬法及足三里灸之

夫瘡瘍之證有諸中必形諸外在外者引而拔之在內者疎而下之灼艾之功甚大若毒氣鬱結瘀血凝滯輕者或可藥散重者藥無全功矣東垣曰若不針烙則毒氣無從而解是故善治毒者必用隔蒜灸舍是而用苦寒敗毒等劑其壯實內熱者或可彼怯弱氣虛者未有不敗者也又有毒氣沉伏或年高氣弱或服尅伐之劑氣益以虛膿因不潰者必假火力以成功大凡鍼灸若未潰則拔引鬱毒已潰則接補陽氣袪散寒邪瘡口自合其功甚大常治四肢瘡瘍氣血不足者只以前法灸之皆愈疔毒甚者尤宜灸蓋熱毒中隔內外不通不發泄則不解散若處貧居僻一時無藥則用隔蒜灸法尤便每三壯一易蒜片大

槩以百壯爲度用大蒜取其辛而能散用艾炷取其火力能透如法灸之必瘡發膿潰繼以神異膏貼之不日自愈一能使瘡不開大二內肉不壞三瘡口易合見效甚神丹溪云惟頭爲諸陽所聚艾壯宜小而少

凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻膿成而及時針之不數旬即愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷肉而不肯用殊不知瘡雖發於肉薄之所若其膿成必腫高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過一二分若發於背必腫高二三寸入針止於寸許况患處肉既已壞何痛之有何傷之慮凡怯弱之人或患附骨等疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血瀝盡而死者多矣

凡瘡既成膿皮膚不得疎泄昧者待其自穿殊不知少壯而充實者或能自解若老弱之人氣血枯槁或兼攻發太過不行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不悞事若毒結四肢砭刺少緩則腐潰深大亦難收斂毒結於頰項胷腹緊要之地不問壯弱急宜針刺

否則難治大抵瘡瘍之證感有輕重發有深淺淺者腫高而軟發於血脉深者腫下而堅發於筋骨然又有發於骨髓者則皮肉不變故古人制法淺宜砭而深宜刺使瘀血去於毒聚之始則易消若膿成之時氣血壯實者或自出怯弱者不行針刺鮮有不悞凡瘡瘍透膜十無一生雖以大補藥治之亦不能救此可爲待膿自出之戒也故東垣云毒氣無從而解膿瘀無從而泄過時不烙反攻於內內旣消敗欲望其生豈可得乎茲舉一二以告同道幷使患者知所愼云

若治元氣不足之證卽其初患便當內用參芪歸朮溫補脾胃外用桑枝葱熨接補陽氣使自消散若久而不能成膿者亦用前二法補助以速之若膿旣成而不潰用艾於當頭灸數炷以出之却服十全大補湯

又云癰有椒眼十數頭或如蜂窠蓮房膿血不出者用針橫直裂之如無椒眼之類只消直入取膿不必裂之一法當椒眼上箇箇灸之亦佳不必裂也又云

癰者皮薄腫高多有椒眼粒疽者皮膚頑硬狀如牛頸之皮癰成膿則宜針針宜用馬銜鐵爲之形如韭葉樣兩面皆利可以橫直裂之五六分許攻去毒血須先灸之而後裂疽成膿則宜烙可用銀篦大二寸長六寸火上燒令赤急於毒上熨烙得膿利爲度毒氣已成者宜用托裏以速其膿膿成者當驗其生熟深淺而鍼之膿生而用針氣血既泄膿反難成若膿熟而不針腐潰益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿不出外血反泄若瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷若元氣虛弱必先補而後針其膿一出諸證自退若膿出而反痛或煩躁嘔逆皆由胃氣虧損宜急補之若背瘡熱毒熾盛中央肉黯內用托裏壯其脾胃外用烏金膏塗於黯處其赤處漸高黯處漸低至六七日間赤黯分界自有裂紋如刀劃然黯肉漸潰矣當用鈹針利剪徐徐去之須使不知疼痛不見鮮血爲妙雖有裂紋膿未流利及膿水雖出而仍痛者皆未通於內並用針於紋中引之患於背胛之間肉腐膿出腫痛仍作此內有毒筋間隔膿未通耳尤宜引

之若元氣虛弱悞服剋伐患處不痛或肉將死急溫補脾胃亦有生者後須純補之藥庶可收斂若妄用刀針去肉出血則氣無所依附氣血愈虛元氣愈傷矣何以生肌收斂乎

針灸之法有太乙人神周身血忌逐年尻神逐日人神而其穴有禁鍼禁灸之論犯之者其病難瘳理固然也但瘡瘍氣血已傷肌肉已壞宜迎而奪之順而取之非平人針灸之比何忌之有外科精義云瘡瘍之證毒氣無從而解膿瘀無從而泄反攻於內內既消敗欲望其生豈可得乎危惡之發於致命之所禍在反掌腹癰囊癰二便不通胷腹脹悶脣疔喉痹咽喉腫塞其禍尤速患者審之

蜞針法治癰疽初作先以筆管一箇入螞蜞一條以管口對瘡頭使蜞吮瘡膿血其毒即散如瘡大須換三四條若吮正穴蜞必死矣累試累效若血不止以藕節上泥塗之若瘡頭未明以井邊泥塗上先乾處即是

癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼

其中心頓小艾炷灸之五壯而上若形狀稍大以黃稈紙蘸酒全貼認先乾處爲筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯止又法屈指從四圍尋按遇痛處卽是根就此重按深入自覺輕快卽此灸之更於別處灸若或大腫卽擣蒜爲餅焙乾蘸法酢灸熱更換頻頻罨或以熨斗火於蒜餅上熨之更換熱餅頻熨如覺患處走散卽以綿帛覆蓋勿令氣洩俟少間敷藥凡癰疽展大如龜之形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以白芷三分漢椒桑白皮各一分連鬚葱白十片取新汲水煎湯入酸酢半盞淋洗少頃其筋自現可以辨驗頭尾

豆豉餅治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑瘡惡瘡江西豆豉爲末唾津和作餅子如錢大厚如三文置患處以艾壯於餅上灸之餅乾再用唾津和作如瘡大用漱口水調作餅覆患處以艾鋪於餅上燒之如未成者用之卽消已成者縱不能全消其毒頓

減前人俱稱有奇功不可忽之

霹靂火治內疔之證發汗之妙方也凡瘡始覺不曾服出汗之藥過數日間外證皆罷或在胷腹或在脊肋赤焮腫起此乃毒氣入裏內疔之所發也宜用此法出汗毒氣方能出也先置水桶一箇鐵銚一箇令病人側臥於桶上四圍以衣衾蓋護勿令泄氣却以鵝卵石火燒極紅放銚內以銚安桶內以酢投於銚內淬之熏蒸出汗未透再加火力再淬之須令腫處汗透不必遍身出汗也

附子餅治潰瘍氣血虛不能收斂或風邪襲之以致氣血不能運於瘡所不能收斂用炮附子去皮臍研末以唾津和爲餅置瘡口處艾壯於餅上灸之每日灸數壯但令微熱勿痛如餅乾再用唾津和做以瘡口濕潤爲度

證治準繩曰砭法治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指輕撮筋稍令磁芒正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇

刺皆出毒入腹膨脹者難治

灸乃開結破硬之法倘有一點白粒如粟米起四圍微腫如錢便當於米粒上著艾灸十四五壯三日內灸者只成灸瘡而散三日外者其腫漸少宜多灸之或灸火著處則結熱可伸灸處先潰則毒勢分減庶免展開不致下陷及壞筋骨傷氣血也所謂灸至不痛者謂著皮肉未壞處則痛火至著毒處則不痛必令火氣至著毒處方止所謂灸至痛者謂初著毒處不痛至好肉則痛必令火氣至好肉方止畏灸者或用獨蒜瓣或用豆豉餅或用椒薑鹽爛擣捻作餅子如三錢厚鋪艾灸之熱則易新餅亦可散也

灸乃從治之意惟頭爲諸陽所聚艾炷宜小而少若少陽分野尤不可灸灸之多至不救亦有因灸而死者蓋虛甚孤陽將絕其脈必浮數而大且鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也

劉宗厚曰此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成痛者常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉尤宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上著艾灸之仍服

內托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸漬根深者郭氏治用白麪硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一粒一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互換用之紝入瘡內歹肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理即瘥矣蓋不止宜灸於瘡之始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設反逆不惟不愈恐致轉生他病之患也

鍼烙

凡用鍼烙先察癰疽之淺深及膿未成已成高阜而輭者發於血脉腫平而堅者發於筋脉皮色不相辨者發於骨髓高阜而淺者用鈹鍼開之疽始生白粒便可消退漸長如蜂窠者尋初起白粒上烙及四圍烙四五處如牛項之皮者疽頂平而淺者皆宜用火鍼烙之其鍼用圓鍼如筯如緯鋌大頭圓平長六七寸一樣二枚蘸香油於炭火中燒紅於瘡頭近下烙之宜斜入向輭處一烙不透再烙必得膿也瘡口烙

者名曰熟瘡膿水常流下不假按抑用紝藥使瘡口不合舊用紙撚及新取牛膝根如瘡口大小略刮去皮一頭繫線紝之不如用翠青搜膿等錠子臨用以糯米飯和成輭條子看淺深紝之外用拔毒膏貼之瘡毒未成烙之可散潰而未破針之可消但要用得其宜耳若當用針烙而不用則毒無從而泄膿瘀蝕其膏膜爛筋壞骨難乎免矣若毒深針淺膿不得出毒淺烙深損傷良肉不當其所他處作頭此皆不能瘉疾反增痛耳或瘰癧潰久不瘉漏瘡經年或通或閉癰疽瘡口不收皆因冷滯不能收斂亦因瘡口內外四畔烙之癰疽正發及膿見後紅腫焮開用鐵針燒赤四圍刺之則紅腫隨縮矣

古今醫統曰烙法方其已熟未潰之時用鐵一烙極是快意方扇火欲著時誠是驚人余常用矣臨時猶且顫悸況未曾經歷者乎烙後膿水流通百無所忌名曰熟瘡其瘡突者針口宜向下然須是熟於用烙者識淺深知穴道審生熟非其時則所出皆生血當其時則出黃膿瘀肉用尖針烙者不得法尖針頭細

其口易合惟用平圓頭者爲妙蓋要孔穴透或恐瘡口再合用牛膝根如瘡口之大小略割去粗皮插入瘡口外留半寸許則用嫩橘葉地錦草各一握研成膏傅之牛膝能使惡血常流二草溫凉止痛隨乾隨換此十全之功也

景岳全書曰按立齋云灼艾之法必使痛者灸至不痛不痛者灸至痛則毒必隨火而散否則非徒無益而反害之愚意癰疽爲患無非血氣壅滯留結不行之所致凡大結大滯者最不易散必欲散之非藉火力不能速也所以極宜用灸然又有孫道人神仙熏照方其法尤精尤妙若毒邪稍緩邪深經遠而氣有不達灸之爲良若毒邪熾盛其勢猛急而垂危者則宜用熏照方更勝於灸也

上古有砭石之制內經有九針之別制雖不同而去病之意則一也其瘡瘍一科用針爲貴用之之際雖云量其潰之淺深尤當隨其肉之厚薄若皮薄針深則反傷良肉益增其潰肉厚針淺則膿毒不出反益其痛用針者可不慎哉至於附骨疽氣毒流注及有

經久不消內潰不痛者宜燔針開之若治咽喉之患當用三稜針若丹瘤及癰毒四畔焮赤疼痛如灼宜用砭石去血以泄其毒則重者減輕者消如洪氏室患腹癰膿脹悶瞀以鈹針刺膿出即蘇一人患囊癰膿熟腫脹小便不利幾殆急針之膿水大泄氣通而愈大抵用針之法迎而奪之順而取之所謂不治已成治未成正此意也今之患者或畏針而不用醫者又徇患者之意而不針遂至膿已成而不得潰或得潰而所傷已深矣卒之夭枉者十常八九亦可悲矣

經曰天溫日明則人血淖溢而衞氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰則人血凝濇而衞氣沉是以因天時而調血脉也故凡遇天寒水冰或陰氣凝滯之時欲行鍼刺則先當溫衣覆蓋或以艾葉炒熱或熱鹽熱衣類先熨其處務令血脉溫和而後刺之則血瀉氣行其病立已若血寒脉濇遽爾用針則邪毒不瀉徒傷良肉反以益其病也

導引

保生祕要曰諸毒瘡腫導引法以兩手交叉抱頸以左右肩一上一下用意使氣血和暢內息綿綿遍身得汗毒自化解

運功瘰癧氣澀於皮膚疽毒皆發於臟腑患在前歸元發引患在背起艮行庭瘰癧之疾隨手可運毛竅發散腫毒之憂得力通關逐出大腸繞患處著意爲之

毒初起時先於患處內小圈而至大圈復用水以洗

之或毒成不散則自內裏用意以火攻出待出膿後則自外大圈旋轉至小圈仍用水而收口

醫案

李杲十書曰元好問飲酒太過脈候沉數九月間腦下項上出小瘡不痛不癢如白頭瘡凡四日後腦項麻木腫勢外散熱毒焮發又二日痛大作夜不得寐醫處以五香連翹湯後再邀予診視云膏粱之變不當投五香連翹湯已無及矣且疽已八日當先以火攻之然後用藥以大艾炷如兩核許者攻之百壯始覺痛次爲處方是足太陽膀胱之經其病逆當反治脈中得弦緊按之洪大而數又且有力必當伏其所

主而先其所因其始則同其終則異必先歲氣無伐天和以時令言之可收不可汗經與病俱禁下法當結者散之鹹以軟之然寒受邪而禁鹹遂制黃連消毒飲治之而愈

丹溪心法曰一男子年五十餘形實色黑背生紅腫近胛骨下痛甚脉數而洪緊食亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃蘗生附子苦蔞子甘草節羌活靑皮人參黃芪半夏生薑六貼而消此非內托之意歟嘗治一婦人年將七十形實性急而好酒腦生疽十五日脉弦緊急且濇予急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌炒人參入薑煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已此亦內托之意也

東陽李兄年踰三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過於色忽左腿外廉側上發一紅腫其大如栗一醫聞其大腑堅實與承氣湯二貼下之不效又一醫教與大黃硃砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後召余視之曰事去矣又一李兄四十餘面稍白神甚勞忽脅下生一紅腫如桃一人敎用補劑衆笑且排於

是以流氣飲十宣散雜進之旬餘後名余視之余曰非惟不與補劑抑且多得解利氣血俱憊難矣已而果然

一男子年近六十形素肥初夏於左膊外廉側生一核方圓二寸餘不甚痛名余治診其脉息緩大而弱余曰此因憂悶而生當氣升散之時須急與人參膏五六斤又看作何應病家名他外科以十宣散五六貼而瘡甚余曰此大虛也勿以輕小視之病家不信一外科仍以十宣散進之又五六貼瘡平陷出清水而死此可爲因虛而生癰疽者之例

一老人年七十患背疽徑尺餘已雜與五香十宣數十貼膿血腥穢嘔逆不食者旬餘病人自去喫內托散膈中不安且素有淋病三十年今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已急以參芪歸朮煮膏以牛膝湯入竹瀝飲之三日後盡藥一斤半淋止思食七日後盡藥四斤膿自湧出而得睡又兼旬而安

一男子年六十餘性好酒肉背疽見膿嘔逆發熱蓋其得內托十宣多矣醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香

以溫胃行氣時七月大熱脉洪數有力余因謂此脉證在潰瘍尤爲忌然形氣實只與人參膏和竹瀝飲之盡藥十五斤竹百餘竿而安余曰此病幸安也不薄味必再作仍厚味自若夏月醉後坐水池中又年餘左脅旁生一軟塊如餠二年後軟塊爲疽本人見膿血淋漓而脉洪數有力又嘔逆食少遂自以人參膏入竹瀝飲之又百餘竿而安今八十歲强健如舊此病兩以老年血氣弱專服人參竹瀝而愈若與內托十宣散恐未能若是之安全也

衞生寶鑑曰丁巳委余從軍廻住冬於曹州界以事至州有趙同知謂余曰家舅牛經歷病頭目赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發熱惡寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安臥一瘍醫於腫上砭刺四五百餘鍼腫赤不減其痛益甚不知所由然願請君一見余遂往診視其脉浮緊按之洪緩此證乃寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫經云天寒則地凍水冰人氣在身中皮膚緻密腠理閉汗不出血氣强肉堅濇當是之時善行水者不能往冰善穿地者不能

鑿凍善用針者亦不得取四厥必待天溫冰釋凍解而後水可行地可穿人脈亦猶是也又云冬月閉藏用藥多而少鍼石也宜以苦溫之劑溫筋散寒則已所謂寒緻腠理以苦發之以辛散之宜以托裏溫經湯麻黃苦溫發之者也故以爲君防風辛溫散之者也升麻苦辛葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以爲臣血流而不行者則痛以白芷辛溫當歸身辛甘溫以和血散滯濕熱則腫蒼朮辛甘溫體輕浮力雄壯能泄膚腠間濕熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏故以爲佐依方餌之以薄衣覆其首以厚被覆其身臥於煖處使經血溫腠理開寒乃散陽氣宣通大汗出後腫減八九分再服去麻黃防風加連翹鼠粘子腫痛悉去經言汗之則瘡已信哉斯言或人以仲景言瘡家雖身痛不可發汗其理何也余因此說乃營氣不從逆於肉理而生瘡腫作身疼痛非外感也若外感寒邪而作疼痛故戒之以不可發汗汗之則成痓也

戊午冬余從軍住冬於武城縣有賈倉使父年踰六

旬冬至後數日疽發於背五七日腫勢約七寸許不任其痛瘍醫曰膿已成可開發矣彼懼不從越三日醫曰不開恐變證生矣遂以燔鍼開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變證果生覺重如負石熱如焫火痛楚倍常六脉沉數按之有力此膏粱積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴凝復有用寒遠寒之戒乃思內經曰有假者反之雖違其時以從其證可也與瘍醫議急作清涼飲子加黃連秤一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除後月餘平復

陳錄判母年七十有餘亦冬至後腦出疽形可甌面大命瘍醫診視俟瘡熟以針出膿因怒笞侍女瘡輙內陷凹一韭葉許面色青黃不澤四肢逆冷汗出身清時復嘔吐脉極沉細而遲蓋因衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄已滌肥濃之氣獨存瘦悴之形加之暴怒精神愈損故有此寒變也病與時同與瘍醫議速製五香湯一劑加丁香附子各五錢劑盡瘍復大發隨證調治而愈內經曰凡治病必察其下

謂察時下之宜也諸痛痒瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也固當察時下之宜而權治故曰經者常也法者用也醫者意也隨所宜而治之可收十全之功矣

至元壬午五月二十八日王伯祿年踰五旬有七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微此乃脉證俱寒予舉瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔針啓之膿清稀解次日肘下再開之加呃逆不絕彥和與丁香柿蔕散兩服稍緩次日呃逆尤甚自利臍腹冷痛脹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸二七壯又處托裏溫中湯用乾薑附子木香沉香茴香羌活等藥㕮咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前後飲食不入此謂五虛況呃逆者胃中虛寒故也諸痛痒瘡瘍皆屬心火是言其定理也此證內外相反須當捨時從證也非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲

食倍進瘡勢溫膿色正彥和復用五香湯數服後月餘平復噫守常者衆人之見知變者知者之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣況醫乎哉守常知變豈可同日而語哉

薛己醫按曰一男子胷患癰腫高焮痛脈浮而緊以內托復煎散二劑表證悉減以托裏消毒散四劑而消

一男子腹患癰腫硬木悶煩熱便祕脈數而實以黃連內疏湯一劑少愈以黃連解毒湯二劑頓退更以金銀花散四劑瘡頭出水而消

一男子患腿痛而不焮腫內亦便利調和用托裏榮衞湯數劑而消

一婦人項患毒焮痛發寒熱以荊防敗毒散二劑少愈以小柴胡湯加連翹牛蒡子桔梗四劑而消

一男子肩患毒焮痛飲冷煩躁便祕脈數而實以清凉飲二劑少愈以金銀花散四劑悉退又以十宣散去桂加天花粉金銀花數劑瘡頭潰而痊

一婦人臂患腫惡寒不作膿以十宣散六劑而潰以

托裏散數劑而瘳

一男子患癰腫硬疼痛發熱煩躁飲冷脈沉實大便祕乃邪在臟也用內疏黃連湯疏通之以絕其源先投一劑候行一次勢退一二再進一劑諸證悉退乃用黃連消毒散四劑而消

一男子內股患毒腫硬痛甚不作膿隔蒜灸五十餘壯勢退七八以仙方活命飲四劑而膿成用十宣散六劑膿潰而愈凡瘡大痛或不痛麻木灸最良

一婦人臂腫未成膿飲食少思遇勞作痛發熱以補中益氣湯二劑痛少止以補氣血健脾胃而消

一男子素弱胷患癰飲食少而倦以六君子湯加芎歸黃芪膿成針之更以托裏藥而愈

一婦人脅患癰未成膿惡寒脈緊以十宣散加柴胡二劑表證悉退更以托裏散數劑膿潰而愈

一婦人臂患毒腫硬咽喉壅塞四肢逆冷發寒熱以五香連翹湯二劑頓愈以瘡科流氣飲四劑而消

一男子臂患癰脈弦緊有力以白芷升麻湯二劑頓退又二劑而消

一婦人肩下患毒脉弦緊以白芷升麻湯二劑表證已退更以托裏藥潰之而愈

一男子臂患癰不作膿灸以豆豉餅及飲托裏藥三十餘劑而潰又月餘而瘳

一男子膿熟不潰余欲針之補以托裏彼不信乃服攻毒藥反致惡心少食始悟而用針更以六君子湯加藿香當歸四劑少可再以加味十全大補湯數劑而斂凡瘡膿熟不行鍼刺膿內侵蝕輕者難療重者不治老弱之人或偏僻之處及緊要之所若一有膿宜急針之更以托裏庶無變證

一男子患毒作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以托裏藥潰之而愈大抵瘡疽之證寒熱虛實皆能爲痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以溫熱之劑散之因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡祕澀者利之慎勿槩用寒涼之藥况血脉喜溫而惡

寒若冷氣入裏血即凝滯反爲難瘥之證矣

一男子素弱肘患腫欲內消服凉藥反致作瀉少食以二神丸及香砂六君子湯加肉豆蔻而瀉止食進又以托裏藥而腫亦消丹溪云癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固次以行經活血藥佐之參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也又云腫瘍內外皆壅宜以托裏表散爲主如欲用大黃寧無孟浪之過潰瘍內外皆虛宜以接補爲主如欲用香散未免虛虛之失大抵癰腫之證不可專泥爲火經云營氣不從逆於肉理乃生癰腫又云形傷痛氣傷腫六淫七情皆能致之況稟有虛實及老弱不同豈可槩用寒凉之藥設若毒始聚膿未作勢不盛庶可消尤當推其病因別其虛實若槩用寒凉藥必致悞事如膿將成邪盛氣實用消毒之劑先殺其毒雖作膿不爲大苦潰亦不甚若就用托裏必益其勢如膿將成不成及不潰方用托裏膿成勢盛者針之膿一出諸證悉退矣

一男子膿熟不潰微痛少食倦怠發熱予爲針之膿

湧出熱益甚乃虛故也急以人參黃芪湯二劑熱愈甚此藥力尚未及也又二劑果應再以當歸補血湯數劑而痊東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁宜當歸補血湯主之

一婦人脾氣素弱患毒未作膿發寒熱兼嘔以不換金正氣散二劑而止以托裏散六劑而潰更以健脾藥而斂

一男子患癰膿成不潰投以補劑而潰更以健脾藥而愈丹溪云氣血壯實膿自涌出信夫

一男子潰而瘀血不腐以參芪歸朮峻補氣血更以桑木灸之腐而愈

一童子腋下患癰不斂膿清脉大倦怠懶食少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可

一男子腰患毒膿熟不潰針之膿大泄反加煩躁以聖愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥門冬五味

子兩月而愈此人後患濕氣遂爲痼疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他證必難治療慎之

一婦人患臂癰瘡口紫陷膿清不斂彼以爲毒未盡欲服攻毒之劑予謂瘡瘍之證腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈

一婦人患附骨癰久而不斂致腿細短軟脈來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脈澀遲緩者易愈以其有胃氣故也脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑粗散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一男子風襲瘡口牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托裏藥而斂

一男子患癰將斂遍身作痒脈浮以消風散二服而止更以托裏藥而愈

一男子肩下患疽已數日漫腫微痛頭甚多皆如粟許色不變不起發此氣血虛也診其脈果然先以仙

方活命二劑殺其大勢更以托裏藥而起發瘡頭雖潰但流血水氣血尚虛不能爲膿也彼欲服太乙錠子予謂此藥止能攻毒不能托裏彼不深信至四次飲食不進瘡色黑陷吃逆不絶胃氣虛極也不治强投溫中健脾之劑不應而死

一男子近脅患疽腫而不潰投大補之劑潰而已愈後患弱證而歿

一男子腰中患疽發而不潰其氣血止能起發不能培養爲膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸朮膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生凡大癰疽藉氣血爲主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脉大而膿愈多屬眞氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若瘰癧流注之證尤當

補益也否則更患他證必難措治慎之

一男子肩患毒腫硬作痛惡證迭見用白礬末三錢糊丸以葱頭七莖煎湯送下腫痛悉退再服諸證亦退更以仙方活命飲二劑出水而消此祕方名千金化毒湯本礬末葱湯調服因末難服故易爲丸

一男子臂患癰焮痛煩躁發熱作渴脉數而實時季冬予謂此熱毒內畜也須捨時從證欲治以內疎黃連湯彼以時當隆冬乃雜用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二劑後去二次諸證悉退以金銀花散加連翹山梔四劑出水而消大抵證有主末治有權宜治其主則末病自退用其權則不拘於時泥於守常必致病勢危甚況雜用攻劑動損各經故丹溪云凡瘡發於一經只當求責本經不可干擾餘經羅謙甫云守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變細事因而取敗者多矣

一上舍年踰四十因怒脅內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛余謂怒氣傷肝致血傷氣鬱爲患以小柴胡湯對四物倍用芎歸黃

芪貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用況此證爲氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求始視之虛證併臻診之胃氣更虛彼欲服余前藥余謂急者先治遂以四君子湯加酒炒芍藥炮乾薑四劑少安更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去乾薑又加黃芪芎歸肉桂數劑瘡色少赤幷微作痛又二十餘劑而膿成針之却與十全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛況各經血氣多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦膽腎心脾肺少血多氣然前證正屬膽經少血之臟人年四十以上陰血日衰且脈證俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裏表散爲主乃補氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂也若腫焮痛甚煩躁脈大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也凡患者須分經絡氣血地部遠近年歲老幼禀氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥槩治結腫

之證以致取敗者多矣

一婦人瘡潰後吐鮮血三椀許余用獨參湯而血止用四君熟地芎歸而瘡愈此血脫補氣陽生陰長之理也若用涼血降火沉陰之劑脾土生氣復傷不惟血不歸源而死無疑矣

一武職患腦疽內潰熱渴頭面腫脹如斗胷背色焮如塗丹煩熱便祕此表裏俱實若非苦寒之劑內疎外泄則不救遂針周項出膿及用清涼飲一劑加大黃五錢再用消毒散而痊

一男子瘡潰而煩渴不安以聖愈湯二劑而寧以人參黃芪當歸地黃四劑渴止又以八珍湯二十餘劑而愈大抵潰後有此證屬氣血不足須用參芪以補氣當歸地黃以養血若用苦寒之劑必致有悞

一男子患毒作渴右關脉數以竹葉黃芪湯治之少愈更以補中益氣湯加黃芩而愈

一男子潰後口乾遇勞益甚以補中益氣湯加五味子麥門冬治之而愈更以黃芪六一湯而斂

一男子患毒潰後作痛肢體倦怠瘡口不合飲食不

甘以六君子湯加黃芪川芎當歸四劑而愈更以托裏散月餘而斂

一男子潰後作痛脉數而無力以托裏散加生地黃黃蘗二劑而止更以托裏散數劑而安

一男子潰後發熱左手脉數而有力以人參敗毒散一劑而止更以托裏散而瘥

一男子潰後發熱焮痛不止煩躁便祕右手脉沉實以清涼飲一劑而止更以托裏消毒散四劑而瘳

一男子潰後作痛而脉濇以定痛托裏散飲之敷乳香定痛散而止更以托裏散數劑而愈

一男子潰而作痛脉浮緊以內補黃芪湯四劑而止又二十餘劑而愈

一男子項患毒潰而作痛以參芪地黃芎歸補之而止更以八珍湯加黃芪桔梗三十餘劑而愈

一男子患癰潰而作痛脉輭而濇余謂氣血虛欲補之彼不信乃服攻伐之劑反發寒熱始信之仍投大補藥而痊大抵瘡之始作也先發爲腫氣血鬱積蒸肉爲膿故多痛膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反

痛乃虛也丹溪云膿出而反痛此爲虛也宜以補之亦有穢氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之齊氏云瘡疽之證有臟腑氣血上下眞邪虛實不同也不可不辨如漫腫堅硬膿稠者瘡疽之實也腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足並冷脉弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利聲音不出精神不爽者悉臟腑之虛也大便鞕小便澀飲食如故腹滿膨脹胷膈痞悶肢體疼痛口苦喉乾煩躁多渴身熱脉大精神昏塞者悉臟腑之實也凡諸瘡疽膿水淸稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者氣血之虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠粘頭目昏重者氣血之實也頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也精滑不禁大便自利腰脚沉重睡臥不寧者下虛也肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫者眞氣虛也腫焮尤甚痛不可近多日不潰寒熱往來大便祕澀小便如淋心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也又曰眞氣

奪則虛邪氣勝則實又曰諸瘡爲痒爲虛也又曰診其脉洪大而數者實也細微而輭者虛也虛則補之和其氣托裏也實則泄之踈利而導其氣內經謂血實則決之氣虛則掣引之是也

一男子潰後發熱作痛脉浮數按之無力勞而尤甚以補中益氣湯治之而止更以十全大補湯而愈常治左手脉小於右手而熱者用血藥多於氣藥右手脉小於左手而熱者用氣藥多於血藥

一男子潰後發熱頭痛脉浮緊虛而兼表邪也以補中益氣湯加川芎白芷二劑而止更以托裏藥而愈

一婦人潰後發熱少寐四肢倦怠以黃芪人參湯治之而安更以十全大補湯加貝母遠志麥門冬酸棗仁香附月餘而愈

一婦人潰後發熱服清熱敗毒藥愈甚診之脉濇以四物湯加粟殼乳香沒藥二劑少止又二劑而安

一男子潰後發熱頭微痛日晡尤甚脉浮按之則濇以人參養榮湯加柴胡地骨皮而愈又月餘而斂

一男子潰而惡寒用四君子湯加桂倍用黃芪大料

四劑而止膿水尚多投八珍湯加桂數劑漸少惟瘡口不合以附子餅及十全大補湯每劑加炮附子五分數劑乃去附子又服月餘而愈

一男子潰後將愈因勞四肢發熱煩躁不寐以聖愈湯四劑而寧更以托裏藥而愈丹溪云有四肢熱逢風寒如炙於火者是人陰氣虛而陽氣盛也

一男子潰後畏寒脈虛以四君子湯加炮薑四劑而愈以十全大補湯月餘而斂仲景云脈虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脈虛宜托裏養血信夫

一婦人潰後發熱服涼藥反畏寒以十全大補湯二劑而止又以托裏藥而痊

一男子潰後發熱服涼藥益甚診之脈浮乃氣虛也以補中益氣湯加五味子麥門冬治之而止更以托裏藥而斂

一婦人潰後發熱脈浮而數虛而兼表證也以補中益氣湯倍柴胡升麻一劑而止以托裏藥月餘而斂

一男子患癰潰而飲酒焮痛發熱服黃連解毒湯二劑而止更以托裏消毒散而愈常治痛而大便祕脈

實者用清凉飲治之

一男子患癰時値陰寒忽惡寒右手脉有而似無此胃氣虛而不任風寒也以四君子湯加炮薑肉桂二劑少止又四劑而安丹溪云有衞氣虛衰不能溫分肉實表而惡寒者又有上焦之邪隔絕榮衞不能升降出表而惡寒者東垣云夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺於陰分也夜則惡寒晝亦惡寒是重陰無陽也當急瀉其陰峻補其陽夜則安靜晝則惡寒是陰氣上溢於陽中也

一男子胷患毒焮腫作嘔喜冷脉洪數以黃連解毒湯二劑頓退更以金銀花散六劑而消

一男子因瘡痛傷胃氣少食作嘔惡寒以六君子湯加當歸四劑少愈以十宣散加白朮茯苓陳皮數劑而膿成針之又以前散去防風白芷數劑而痊

一婦人脾氣素弱患毒未作膿發寒熱兼嘔以不換金正氣散二劑而止以托裏散六劑而潰更以健脾藥而斂

一男子作渴欲發疽以加減六味丸治之而消

一男子患腦疽發熱脈數無力以前丸治之不信自服滋陰藥以致不救

一男子日飲水數椀冬月亦然彼恃壯竊喜後口舌生瘡欲治以前丸彼以爲謬乃服生津液藥渴不能止發背疽而歿

一男子脚面發疽愈而作渴以前丸治之而愈夫加減八味丸治陰虛火動之聖藥也有是證者何以舍此

一富商稟賦頗厚素作渴日飲水數椀面發一毒用消毒藥潰而雖愈尺脈尚數渴亦不止時孟秋余謂此水涸火旺之脈也須服加減八味丸以補腎水制心火庶免疽毒之患彼不信至夏果脚背發疽脈數按之則濇而無力足竟黑腐而死

一男子稟頗實乏嗣服附子等藥致作渴左足大指患疽色紫不痛脈亦數而濇亦死大抵發背腦疽脫疽腫痛色赤水衰火旺之色尚可治若黑若紫火極似水之象也乃腎水已竭精氣已涸決不治

又一貴人病疽疾未安而渴作一日飲水數升愚遂

獻加減八味丸方諸醫大笑云此藥若能止渴我輩當不復業醫矣乃用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等生津液之藥止之而渴愈甚數劑之後茫無功效不得已而用此服之三日渴止因此相信遂久服不特渴疾不作血氣亦壯飲食加倍强健過於少壯之年蓋用此藥非余敢自執鄙見實有源流自爲兒時聞先君云有一士夫病渴疾諸醫皆用渴藥治療累載不安有一名醫診之使服加減八味丸不半載而疾痊因疏其病源今醫者治癰却以生津液止渴之藥誤矣其疾本起於腎水枯竭不復上潤是以心火上炎不能既濟煎熬而生渴今服八味丸降其心火生其腎水則渴自止矣復疏其藥性云內北五味子最爲得力此一味獨能生腎水平補降心火大有功效家藏此方親用有驗故敢詳著之使有渴疾者信其言專志服餌取效無爲庸醫所惑庶廣前人之志如臂痛腳氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣喘嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤多子

一婦人面患毒焮痛發熱作渴脈數按之則實以凉

膈散二劑少愈以消毒藥數劑而平

一男子肩患疽作渴脉數有力以黃連解毒湯三劑而止更以仙方活命飲四劑潰而愈

一男子患毒作渴右關脉數以竹葉黃芪湯治之少愈更以補中益氣湯加黃芩而愈

一人年三十面患瘡已潰作渴自服托裏及降火藥不應余診其脉浮而弱丹溪云潰瘍作渴屬氣血俱虛況脉浮虛投以參芪各三錢歸朮熟地各二錢數服渴止又以八珍湯加黃芪數劑脉斂而愈余治瘡瘍作渴不問腫潰但脉數發熱而渴以竹葉黃芪湯治之脉不數不發熱或脉數無力而渴或口乾以補中益氣湯若脉數而便祕以清凉飲尺脉洪大按之無力而渴以加減八味丸並效若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤妙

一男子患癰未作膿焮痛煩躁便閉脉實以內疎黃連湯二劑諸證悉退以四物加芩連四劑而消

一男子潰後便澀脉浮按之則濇以八珍湯加紅花桃仁陳皮杏仁治之而愈

一弱人潰後便祕而脉濇以四物湯加紅花桃仁黃芪治之而愈

一男子潰後便祕而脉浮以四君子湯加陳皮杏仁當歸治之而愈

一老人潰後大便祕小便赤澀診之脉浮數而濇以八珍湯加黃蘗知母治之而已愈後小便復數而赤大便祕口乾目花以加減八味丸滋腎丸治之而愈此證乃陰血虛陽火盛故用前藥有效向投苦寒之劑必致有悞矣

一男子潰後便澀肌膚作痒余以氣血虛不能營於腠理用補劑治之彼不信乃服風藥以致不救大抵瘡瘍始作便祕脉數而濇者宜降火凉血爲主潰後便祕脉濇者宜補血氣爲主若投風藥禍在反掌

舉人于廷器腿患多骨疽年餘出腐骨少許午前畏寒午後發熱口乾唾痰涎便頻數余以爲足三陰虧損朝用補中益氣湯暮用八味丸加黃芪當歸五味子各三十餘劑外用敷藥諸證漸愈又以十全大補之類喜其慎疾而愈

一男子上齶腫硬年餘方潰內熱作渴肢體消瘦六脉洪大左手尤甚用補中益氣湯六味丸出腐骨一塊仍服前藥諸證悉去瘡口亦斂

一婦人年三十餘素弱左手背漸腫二年後潰出清膿腫黯連臂內熱晡熱自汗盜汗經水兩月一至此肝脾氣血虧損朝用歸脾湯夕用逍遙散腫處頻用葱熨法兩月餘諸證漸愈瘡出腐骨仍服前藥前後共三百餘劑得愈

一婦左手指患疔痲痒寒熱惡心左半體皆痲脉數不時見曰凡瘡不宜不痛不可大痛煩悶者不治今作痲痒尤其惡也用奪命丹二服不應又用解毒之劑痲痒始去乃作腫痛余曰勢雖危所喜作痛但毒氣無從而泄乃針之諸證頓退又用解毒之劑而瘥

蘇庠盛厚博掌後患疔紅絲至腕惡寒發熱勢屬表證與奪命丹一服紅絲頓消又用和解之劑大勢已退彼又服敗毒藥發渴發熱紅絲仍見脉浮大而虛此氣血受傷而然以補中益氣湯主之而愈葢奪命既服瘡邪已散而復用敗毒之劑是誅伐無過失內

經之旨矣

一儒者患疔元氣素弱余補其氣血出膿而愈後因勞役瘡痕作痒乃別服敗毒散一劑以致口噤舌强手足搐搦痰涎上湧自汗不止此氣血復傷而致痙也用十全大補加附子一錢灌服而甦

一男子患疔服奪命湯汗不止瘡不痛熱不止便不利此汗多亡陽而眞氣傷矣用參芪歸术芎防五味二劑諸證悉退惟以小便不利爲憂余曰汗出故小便不利汗止則陽氣復而自利矣仍用前藥去防風

加麥冬倍用黃芩當歸四劑而小便利瘡潰而愈

表甥居富右手小指患疔色紫或云小瘡針刺出血敷以凉藥掌指腫三四倍黯而不痛神思昏憒煩躁不寧此眞氣奪而邪氣實也先以奪命丹一服活命飲二劑稍可余因他往或徧刺其手出鮮血椀許腫延臂腕焮大如瓠手指腫數倍不能潰余用大劑參芪歸术之類及頻灸徧手而腫漸消但大便不實時常泄氣此元氣下陷以補中益氣加骨脂肉蔻吳茱萸五味大便實而氣不泄又日以人參五錢麥冬三

錢五味二錢水煎代茶飲之又用大補藥五十餘劑而漸愈此證初若不用解毒之劑後不用大補之劑欲生也難矣

一人年二十脣患疔四日矣有紫脈自瘡延至口內將及於喉余曰此眞氣虛而邪氣實也若紫脈過喉則難治矣須針紫脈并瘡頭出惡血以泄其毒則可乃別用解毒之劑頭面俱腫求治甚篤余曰前日之言不誣矣診其脈洪數按之如無口中腫脹針不能入爲砭面與脣出黑血椀許勢雖少退略進湯水終

至不起

都憲張恆山左足指患疔痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯卽能行步欲速愈或用凉藥敷貼遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血毒纔得解脚底通潰腐筋爛肉甚多將愈誤用生肌藥反助其毒元氣虧損而不能愈余治以托裏藥喜其稟實客處三月餘方愈大凡疔患於肢節灸法有回生之功設投以凉劑收斂腠理隧道壅塞邪氣愈甚多致不起若毒未盡驟用生肌輕者反增潰爛重者必致危

七

一男子足指患疔腫焮痛赤用隔蒜灸人參敗毒散加金銀花白芷大黃二劑痛止又用十宣散加天花粉金銀花去桂數劑而愈

一男子足患疔瘡作痒惡心嘔吐時發昏亂脉浮數明灸二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荊防敗毒散而愈

一男子患疔發熱煩躁脉實以清涼飲下之而愈

一男子臂患疔遍身痳木脉數而實急針出惡血更明灸數壯始痛服防風通聖散得利而愈

一男子左手背患疔是日一臂痳木次日半體皆然神思昏憒遂明灸至二十餘壯尚不知痛又三十餘壯始不痳至百壯始痛以奪命丹一服腫始起更用神異膏及荊防敗毒散而愈

一老婦足大指患疔甚痛令灸之彼不從專服敗毒散致眞氣虛而邪氣愈實竟至不救葢敗毒散雖能表散瘡毒然而所感有表裏所發有輕重體段有上下所禀有虛實豈可一槩而用之耶且至陰之下藥

力難到專假藥力則緩不及事不若灸之爲良故下部患瘡皆宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若灸之而不痛者宜明灸之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內仍以膏藥貼之若針之不痛或無血者以針燒赤頻烙患處以痛爲度或不痛眼黑如見火光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅絲攻心腹者就於絲盡處刺去惡血宜服荆防敗毒散若絲近心腹者宜挑破瘡頭去惡水亦以膏藥貼之如痲木者服奪命丹如牙關緊急或喉內患者並宜噙一二九凡人暴死多是疔毒用燈照看遍身若有小瘡即是宜急灸之俟醒更服敗毒藥或奪命丹人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎

外科正宗曰一監生右顴下生疔三日形如魚目詢問起居但痲痒不常此即肺經受毒之證也用針刺入四五分其硬如骨有聲隨用蟾酥條插至三日猶不腐化此堅頑結聚之病藥力不及換用三品一條鎗插至七日外用糊紙封蓋至十一日脫出疔根一塊約有指許以長肉玉紅膏漸搽漸長先服托裏消

毒散加金銀花二錢白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥冬黃芪陳皮各一錢調理月餘候瘡生肉已平用珍珠散摻上結皮而愈

一監生中年喪妻繼娶幼室乃嬌態人也自服補腎助陽之藥以致腎水受傷不能上制心火左顴發生一泡先紫後黑痳木不知痛痒凡黑者腎經之毒也其毒不淺且喜瘡之四邊尚未走散此猶可取隨用針刺疔上量別藥不濟其事用冰蛳散厚糊作條插入患孔用糊紙密封勿令泄氣朝服加減八味丸以滋腎水午服益氣養榮湯接補眞氣以滋不足晚用琥珀蠟礬丸護心解毒候至十一日外疔根與藥結成一塊依期脫落次用生肌斂口補助調理脾胃之劑二十日而愈後因其不愼調理失於保節幾及三年復成虛損癆瘵而歿

一婦人年近四旬夫主不和愁鬱種種抱懷不散時値季夏歲荒之極腮發一疔六日後方延余視其時疔毒已經走散頭目脣項俱腫形色紫赤余曰肉腫瘡不腫疔毒走黃不治之證彼婦流涕歎曰一家皆

絕也余問曰何其如此婦又曰吾夫乃不肖之人婦有一女二子俱未適配設若婦死寄托於夫子女日後必爲流蕩輩也故婦在一家生婦逝一家死自然之理余時聞之沉吟不已如此何以得生不忍棄之況此瘡勢大又非藥力可回思之當先雇一貧人以飯餐飽再用火酒數杯隨用針刺腫上十餘處令彼噙吸惡血數椀將溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散蠟礬丸清心護裏兼服降火化痰開鬱安神之藥調治庶保不變吸血之後餘腫稍退至六日因夫妻反目復腫比前尤甚復用針刺其甚腫之上約十餘處出血三四椀針孔上小膏蓋貼餘腫仍敷其人出血多而其內必虛以人參養榮湯加香附貝母服數日後針口漸膿餘腫漸消原瘡處復得高腫仍用蟾酥條插化亦漸腐潰外用生肌斂口內服開鬱和中養血健脾等劑調理百日外方愈此病設若相論瘡勢形色則百無一生之理此功出於勉強行之亦得其生後二子一女相繼婚配其夫亦守其終見今已六旬半矣

一婦八年二十二歲右耳垂向前一寸生疔二日請余視之形有豆大頂陷灰色此肺經感毒發爲白刃疔也又驗其根脚緜輭毒不結聚爲陷伏陰證也未及針刺伊舅曰何恙也余直告曰疔瘡證彼聽冷笑不信余因辭不用藥隨其信否彼復請客醫治之視曰風熱疙瘩乃小恙也彼家告以某醫曾曰是疔瘡醫者點頭而笑曰此眞胡說患家喜悅天下事大相懸絕醫用消風散二服毒氣全收隨發昏憒喘急而死

一年少婦顴下生疔疙瘩作痒余欲針之彼家不信辭後自灸次日四邊漸腫瘡漸軟陷又三日頭面大腫復請治之余觀原瘡灸上已結黑靨乾陷無膿此毒氣內陷外肉已死又面目浮腫光亮發熱形狀不堪此正氣衰而邪氣實也雖治亦不效後必終死彼家方悔後延半月果歿

一男子上齶腫痛月餘以散風清熱藥俱已不效又兩月破流血水百日外方出細骨大小三十餘塊以十全大補湯併吹生肌散兩月餘而斂中存一小孔

簪脚大通鼻透氣致難全斂爲愈而不愈也

一男子左手上膊結腫年餘方出爛斑破流稀膿延至半年方出多骨一條如鵝膊骨一同長約四寸內服養血健脾藥外搽玉紅膏又月餘而斂

一男子小腿正面臁骨腫痛二年諸藥不應此多骨瘡也後破出骨一塊肌肉腐爛元氣虛弱以十全大補湯加山茱萸牛膝木瓜服至兩月餘不斂每日以神燈照法將火氣助之又出朽骨一塊上有蛀眼數十孔以二骨炭火煆紅爲末入生肌藥中用之收斂

問曰用骨者何此骨原禀氣血結成故用之復還元氣也此理合天然之數矣

一女人左口上牙根突腫如栗堅硬如石不痛此多骨疽也藥亦不效後三年始痛破流臭膿後出多骨形如小龞腫仍不退此骨未盡稍久又出小骨二塊色枯嶕嶒其腫方退以四君子湯加升麻陳皮外以甘草煎湯漱口生肌散日搽三次而收斂

寓意草曰黃鴻軒手臂忽生癰癤漫腫無頭痛極莫耐外科醫者咸謂熱毒所致揆之平素淡泊明志寧

靜居心絕無生熱致毒之因究莫識其所起也尊公我兼謂昌善議病盍舍樽俎而一代庖人乎昌曰吾議此證請先爲致賀後乃言之瘡瘍之起莫不有因外因者天行不正之時毒也起居傳染之穢毒也內因者醇酒厚味之熱毒也鬱怒橫決之火毒也治火毒與治諸毒原自天淵蓋火與元氣勢不兩立以寒凉折之則元氣轉漓矣鴻軒於四者總無其因不問知爲胎毒之餘也凡人稟受天地之氣有淸濁之不同惟純粹以精之體其福澤壽算俱不可限量然從父母構精而有身未免夾雜慾火於形骸所賴者惟在痘瘡一舉暗將所藏慾火運出軀外復其粹精之恆體如鑛金相似必經紅爐煆煉而查滓與精瑩始分之爲兩吾嘗以此法觀出痘者之眸子七八日後眼開之時黑白分明者精金也赤筋紅膜包裹者混金也至於瞳人模糊神光不現則全非金矣鴻軒幼時出痘太多元氣不能充貫又爲雜證所妨臟腑中之火毒雖盡而軀殼間之留滯猶存所以痘癰之發必於手足之委中曲池者則以零星小毒無處可容

而潛避於呼吸難到之處耳今之癰瘍正當委中之穴其爲痘毒何疑毒伏肘腋之下原無所害但粹精之體微有夾雜是亦寶鑑之纖塵白璧之微纇也日者太和元氣充滿周身將十五年前之餘滓盡欲化爲膿血而出他人見之爲毒吾早已卜其爲興者機矣豈有暢於四肢而不發於事業者哉治法外用馬齒莧熬膏攻之速破內用保元湯托之盡出仍以痘癰門藥爲治卽日自當痊愈必不似瘡毒之曠日持久但不識證而以治瘡毒寒凉瀉火諸藥投之適以增楚貽患耳孰謂外科小恙可無樽俎折衝之人耶如法治之潰出膿水甚多果不用生肌長肉而自愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十八卷目錄

醫部彙考三百六十八

外科附骨流注門

黃帝靈樞經（癰疽篇）
孫思邈千金方（附骨疽）
竇漢卿瘡瘍全書（流注證治　附骨證治）
朱震亨心法（附骨疽）
齊德之外科精義（論附骨）

李梃醫學入門　附骨疽　流注

薛己醫按　附骨疽　流注

王璽醫林集要　附骨疽

王肯堂證治準繩　附骨疽　流注

陳實功外科正宗　附骨疽　看法　治法

張介賓景岳全書　附骨證論治

方　瘡科流氣飲　敗毒流氣飲　方脉流氣飲　去毒散　九金六馬散　散血消核湯　二馬散　立效散　浸酒方　續骨散　輕脚散　嘣骨散　蠲脊散　蠲觝散　退創散　鈎鈎藤散　馬鞭散　妙草散　二妙散　四七湯　內塞散　黃狗下頦方　三生散　內托黃芪柴胡湯　內托黃芪酒煎湯　當歸散　漏蘆湯　應痛丸　貫衆湯　密陀僧散　黑丸子

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百八十八卷

醫部彙考三百六十八

外科附骨流注門

黃帝靈樞經

癰疽篇

發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏骨不急治三十日死矣

（註）此足少陰之毒也其狀不甚變者毒附於骨而不外發故皮膚不甚變爲癰毒之狀也

唐孫思邈千金方

附骨疽

凡附骨疽者以其無破（外臺作故）附骨成膿故名附骨疽喜著大節解中丈夫產婦喜著髀中小兒亦著脊背大人急著者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒纔手近便大啼呼卽是肢節有痛候也大人緩者先覺肌烘烘然經日便覺痛痹不隨小兒四肢不能動搖亦如不隨狀看肢節解中若有肌烘烘處不知是附骨疽令徧身或腫不至潰體皆有靑點大人亦有不別呼爲賊風風腫不知是疽也凡人身體患熱當風取凉風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露臥爲冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少未知取風冷何故而有此疾由其血盛肌嫩爲風折之卽使凝結故也凡初得附骨疽卽須急服漏蘆湯下之傅小豆散得消可服五香連翹湯

有久癰餘瘡敗爲深疽者在腨脛間喜生瘡中水惡

露寒凍不瘥經年成骨疽亦名胻瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血汁出百藥不瘥汁潰好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯夏月日日洗冬月四日一洗青肉多可傅白蔄茹散蝕去惡肉可三日傅之止後長傅家豬屎散得瘥止取豬屎燒灰作末如粉致瘡中令滿白汁出吮去隨更傅之瘥止若更青肉復著白蔄茹散如前法家豬屎散取平復凡骨疽百療不瘥者可瘡上以次灸之三日三夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從孔中出者名爲骨疽取先死烏雌雞一隻去肉取骨熬焦如炭取三家牛棓木刮取屑三家甑箄各一兩皆燒成灰合導瘡中碎骨當出數片瘥

宋竇漢卿瘡瘍全書

流注證治

血潰流注證多生膏粱形重之人有此疾者好食煎炒炙煿糖蜜之類其疽大者如雞卵形象猶如紫李只腫不紅內串經絡之間流注骨節之內偏身瘦疼百節疼痛用內托散加木瓜白芍連翹再服乳香護

心散黃礬丸外敷圍藥當以意消息切勿執方也

小腸流注證受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流氣飲治之

冷漏濕毒流注此毒或因足痒抓破有傷湯火風氣或因寒濕流注於足脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色常出臭血水先用三稜針刺周廻血出盡後用金絲膏貼之呼出毒水腐肉後以紫金膏貼看瘡已紅活再合隔紙膏貼之

氣毒流注證因喜怒不常飲食失節氣上停食或因負重努力傷其經絡宜服鐲毒流氣飲內托千金散黃礬丸護心丹此證乃乘虛感風濕熱相結而成初生一二漸至於多及二三五十者或徧體皆生先發汗以解風濕次用參芪之劑補之圍藥薑汁酢調次服內托千金散大加參芪霖雨加蒼朮澤瀉

附骨證治

夫附骨癰者卽貼骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此證之發因盛暑身熱賊風入於骨節與熱相搏復遇冷濕所折或居勞太過兩足下水或坐

臥濕地身體虛弱而受寒邪致風熱伏結壅遏附骨成疽著大骨節間其急者身不得動按之應骨痛經日便覺皮肉生急洪洪如肥狀其緩者一點痠疼漸覺長大行步艱難以致骨肉不相續若失治令身成膿不潰至死身變青黯但痛按之至骨久則結腫則成瘰癧其附骨疽久而卽腫結膿以此爲異若治附骨疽係賊風中之則病深膿多凡偏枯攣曲之生乃附骨疽之漸也四肢困倦乍寒乍熱小便赤大便澀無汗須用紫蘇蘄艾鳳仙草煎湯熱熨之使腠理開發以布拭乾再用乾被覆之燒乳香熏之如虛甚隨服人參膏略加附子以助其氣復以艾火攻之萬無不愈者

元朱震亨心法

附骨疽

環跳穴痛防生附骨疽以蒼朮佐黃蘗之辛行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛加杜牛膝以生甘草爲使大料煎入生薑汁食前飲之痛甚者恐十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動恐疽將成急掘地成

坎以火煆紅沃以小便赤體坐其中以席圍下體使熱氣熏蒸腠理開氣血暢而愈

附骨癰熱在血分之極初發時以青皮甘草治之破後當養血

齊德之外科精義

論附骨

夫附骨疽者以其毒氣深沉附著於骨也此疾與賊風相類而不同人不能辨治之誤矣蓋附骨疽者夏秋露臥爲冷折之風熱伏結附骨成疽賊風之候由風邪之氣搏於骨節故其痛深骨髓遇寒則痛甚附骨疽痛而不能轉初按之應骨皮肉微急洪洪如肥狀者是也其賊風皮骨不甚熱而索索惡寒時復汗出常欲熱熨痛處即得少寬其附骨疽初時但痛無時乍寒乍熱而無汗者經久不消陰極生陽寒化爲熱而潰也賊風不治久而變爲攣曲偏枯所以不同也認是賊風則服越婢治風之劑即得差矣認是附骨疽急宜服漏蘆湯或五香連翹散疏下之次用內消升麻湯及溻潰膏貼之之類縱不能消亦得浮淺

及有緩疽石疽與附骨疽亦相類而異者蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨髓之間有腫與皮肉相似若疼而堅硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛故名曰緩疽此二者其治初覺便宜補虛托裏溫熱之劑以取消矣其次調治臨疾制宜故不復具載

明李梴醫學入門

附骨疽

賊風因風邪搏於骨髓故其痛亦徹骨遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失治變爲攣曲偏枯宜越婢湯主之

緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓但緩疽其熱緩慢色紫黯久則皮肉俱爛石疽腫與皮肉相似疼痛堅硬如石二者初起便宜溫熱托裏補虛次乃隨證調治

外感因露臥風冷寒濕襲深者初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱爲熱便祕者漏蘆飲子主之有不敢下者須分經內托汗散在尻臀者內托羌活湯腿內近膝股漫腫木硬者內托芪柴湯腿外側者內托酒

煎湯左腿外側漫腫長闊行步作痛以手按至骨大痛者黄連消毒散通用檳蘇散敗毒散

內傷厚味及勞役與酒後乘凉浴水邪入髀樞環跳穴左右積痰瘀血搏成宜青草蒼蘗湯微汗服此不愈恐疽將成者急掘地坑用火燒紅沃以小便令患者赤體坐其上以被席圍抱下截使熱氣熏蒸腠理開氣血暢而愈

內傷生冷飲食寒凉藥物血凝於內飲食如常活命飲食少體倦者六君子湯加當歸藿香如因勞役傷食右腿偏腫者補中益氣湯

內傷鬱怒腫痛如錐赤暈散漫先用活命飲次用八物湯加柴胡牡丹皮山梔

內傷勞役兩腿腫痛寒熱食少此濕痰下注也補中益氣湯加半夏茯苓芍藥

內傷房室兩臀腫硬二便不通者腎氣丸料加車前子牛膝煎服兼用十全大補湯有寒熱者逍遥散

抑考附疽初起宜青皮甘草節二味煎服以行其氣或灸熨患處若膿已成即用火針使毒不得內潰帶

生用亦無妨且不痛又易斂口

附骨疽漫腫光色者用蜂房蛇退頭髮灰各等分爲末每三錢酒調服或神應膏爲丸梧子大每三十丸溫酒下外仍貼之已潰者用平肌散或狗頭骨燒煙熏之魚眼瘡亦妙

腿上一切寒濕瘡用鴿子糞煆過爲末乾糝如燥痛加黃丹少許桐油調敷凡癰疽生伏兔穴者不治

流注

流者行也注者住也或結塊或漫腫皆因素有痰火或外感風寒邪氣流行至其痰注之處而發或內傷鬱怒以致痰火驟發或內傷房室陰虛陽氣湊襲逆於肉理而成或內傷勞役飲食搏動而發或跌撲閃挫一時氣逆血凝而成或產後惡露未盡復被感傷凝注多生四肢或胷腹腰臀關節之處初起宜葱熨法實者十六味流氣飲敗毒散痰痛便祕者古半硝丸虛者二陳四物湯托裏益氣湯不換金正氣散六君子湯加芎歸補中益氣湯加木香枳殼選用令其自潰自消若潰久不斂者縱有表邪只托裏爲主十

全大補湯人參養榮湯補中益氣湯托裏抑青湯托裏益氣湯八味丸更佐以豆豉餅琥珀膏祛散寒邪補接陽氣膿成以火針破之內有膿管以藥線腐之若過用寒涼者不治

薛己醫按

附骨疽

附骨疽有因露臥風寒深襲於骨者有因形氣損傷不能起發者有因尅伐之劑虧損元氣不能發出者有因外敷寒藥血凝結於內者凡此皆宜灸熨患處解散毒氣補接陽氣溫補脾胃爲主若飲食如常先用仙方活命飲解毒散鬱隨用六君子湯補托榮氣若體倦食少但用前湯培養諸臟使邪不得勝正若膿已成即針之使毒不得內侵帶生用針亦無妨如用火針亦不痛且使易斂其隔蒜灸能解毒行氣葱熨法能助陽氣行壅滯此雖不見於方書余嘗用之大效其功不能盡述惟氣血虛脫者不應

流注

暴怒所致胷膈不利者調氣爲主抑鬱所致而不痛

者宜調經脉補氣血腫硬作痛者行氣和血潰而不斂者益氣血爲主傷寒餘邪未盡者和而解之脾氣虛濕熱凝滯肉理而然健脾除濕爲主閃肭瘀血凝滯爲患者和氣血調經絡寒邪所襲筋攣骨痛或遍身痛宜溫經絡養血氣

流注之證多因鬱結或暴怒或脾氣虛濕氣逆於肉理或腠理不密寒邪客於經絡或濕痰或閃仆或產後瘀血流注關節或傷寒餘邪未盡爲患皆因眞氣不足邪得乘之故氣凝血聚爲患也然此證或生於四肢關節或生於胷腹腰臀或結塊或漫腫或痛或不痛悉宜用葱熨法及益氣養榮湯固其元氣則未成者自消已成者自潰可全愈也若不補氣血及節飲食愼起居戒七情而專用寒涼尅伐者俱不治若久而不斂瘡口無陽者宜豆豉餅或附子餅灸之以祛散寒邪接補陽氣或外用琥珀膏貼之若內有膿管或生瘀肉而不斂者用針頭散腐之自愈錠子尤效

流注之證或因飲食勞倦脾胃傷損或因房勞陰虛

陽氣湊襲或因營氣不從逆於肉理或因腠理不密外邪客之或暴怒傷肝或鬱結傷脾或濕痰流注或跌撲血滯或產後惡露皆因氣血凝滯而成也或生於四肢關節或生於胷腹腰臀或結塊或漫腫或作痛皆元氣虧損所致悉宜葱熨及用益氣養榮湯固其元氣則未成者自消已成者自潰若久而不斂佐以豆豉餅琥珀膏祛散寒邪補接陽氣若內有膿管而不斂者用針頭散腐化之經云形傷痛氣傷腫又曰眞氣奪則虛邪氣盛則實若不補氣血節飲食愼起居戒七情而專用寒凉剋伐其不死者幸耳

王璽醫林集要

附骨疽

附骨疽乃流注之敗證也如用凉藥則內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減肌肉不生血爲脉絡血受冰則氣血不旺而愈滯宜用理脾脾健則血自生而氣自運行矣

又有白虎飛尸留連周朞或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐則爲終身廢疾矣

有毒自手足或頭面腫起或兼疼痛上至頸項骨節去處如瘰癧貫珠此風濕流氣之證也宜以加減小續命湯及獨活寄生湯治之

有兩膝腫痛起或至遍身骨節疼痛者此風濕痹又名歷節風宜附子八物湯治之

又有結核在項腋或兩乳旁或兩胯軟肉處名曰瘨癧癰屬冷證也

又有小兒宿痰失道致結核於頸項臀膊胷背之處亦冷證也俱宜熱藥敷貼

已上諸證皆緣於腎腎主骨腎虛則骨冷而爲患也所謂骨疽皆起於腎亦以其根於此也故用大附子以補腎氣腎實則骨有生氣而疽不附骨矣

王肯堂證治準繩

附骨疽

或問附骨疽何以別之曰凡患流注表未盡則餘毒附骨而爲疽在股外屬足太陽陽明經在股內屬足厥陰足少陰經又云風濕折熱熱結而附骨成疽蓋骨者腎之餘腎虛則骨冷而遂附著於骨也骨冷則

氣愈滯而愈積但能爲腫不能爲膿流注者傷寒之餘毒骨疽者流注之壞證也流注非傷寒之罪乃醫者表之未盡也骨疽非流注之過乃庸醫凉藥之誤也又云久得厚味及醉後涉水或履冰霜雪寒入髀樞積痰瘀血相搏而成疽初時暫痛無時乍寒乍熱而無汗久則痛深入骨而不移按之痛不止者是也初覺卽隔蒜灸之以多爲上宜勝金丹烏金散汗之壯實者一粒金丹下之或八陣散久則極陰生陽寒化爲熱肉腐而成膿膿成則宜烙十全大補湯加牛

膝木瓜補之有久潰毒結留連展轉經歲不已腐出朽骨者骨雖出而不愈有終身之咎視其白膿清稀者碎骨初脫肉深難取膿白而稠者碎骨將出肉淺可取大抵久腐出骨不論强弱老幼必須補益使氣血和暢正氣漸復邪氣漸退自然收斂十全大補湯人參養榮湯在所當用未成膿者以沖和膏貼之蓋有獨活能動盪氣血也已潰者宜服何首烏散此藥能調和陰陽也

流注

色黃不串流者俗曰馬瘨串流者名曰走散流注俗曰瓜藤馬瘨外形微腫骨節內疼甚名曰嘣骨馬瘨若遍身骨節內疼痛不能起坐無堆作熱不退者亦曰嘣骨馬瘨若脊背及髀骨上起堆或一二箇或三五箇名曰過脊馬瘨若尾骶上起堆作熱者名曰殺著馬瘨若髁骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖脚馬瘨若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬瘨此證因風熱走散四肢治當疏風散熱初起不可用火針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熟者可火針烙之流注入股者死　傷寒餘邪未盡者和解之以人參敗毒散次以小柴胡合二陳湯加羌活川芎枳殼當歸白朮　暴怒所致胷膈不利者調氣爲主宜方脈流氣飲　抑鬱所致而不痛者宜調經脈補氣血益氣養榮湯　腫硬作痛者行氣和血宜瘡科流氣飲　潰而不斂者益氣血宜人參養榮湯十全大補湯　脾氣虛濕熱凝滯肉理而致者但腫一塊不痛肉色不變飲食少思宜健脾除濕六君子湯加芎歸黃芪白芍肉桂　閃肭瘀血凝滯爲患者和氣血調

經絡宜方脉流氣飲次以二陳合四物加香附烏藥桔梗　寒邪所襲筋攣骨痛或遍身痛宜溫經絡養氣血宜大防風湯及五積散合敗毒散加川牛膝杜仲或獨活寄生湯次以四物湯加黃芪羌活杜仲病尚有潮熱者裏有寒邪未盡散宜榮衛返魂湯加乾葛升麻紫蘇川芎獨活薑水煎服　如無潮熱用榮衛返魂湯加獨活酒水各半煎服　接骨馬㾕用穿山蜈蚣白田柯石楠藤山良薑九節香紫金皮含笑葉煎水時時熱淋洗之却服續骨散九金六馬散

起堆核數枚但小些名馬疔又名馬鈴用紫金錘紫金皮紫河車天南星磨酢煖塗又用紫金皮紫金藤紅內消馬蹄香馬蹄藤煎酒服　鎖脚馬㾕用野芋子根馬藍草藜蘆子紫河車山枇杷根皮山布瓜根紫金皮搗爛鹽糟炒敷又以煎水熱淋洗之却服輕脚散九金六馬散　嗍骨馬㾕用穿山蜈蚣紫金皮石楠藤白田柯溪楓根九節香對節金鷺煎水淋洗却服嗍骨散九金六馬散四味浸酒方　過脊馬㾕用山枇杷根皮藜蘆子小樟子根皮天門冬天南

星仙人掌根山布瓜根赤牛膝半夏凌霄根皮佛桑花馬藍草野芋子根天銅柯普營子根皮赤毛桃根皮赤芎根皮搗爛半泔半酢調煖刷查封瓜藤馬瘨並效却服鐲脊散九金六馬散　瓜藤馬瘨用山布瓜根多赤葛子根皮樟柳根紫金皮紫金鍾落鴉鎗根七葉楊香天花粉眞珠簾根白芙蓉葉霄凌根皮溪楓根皮赤毛桃根皮搗爛鹽糟炒敷之又方山布瓜根葛合根紫河車藜蘆子馬鞭穢紫金皮山枇杷根皮凌霄根皮佛桑花落鴉鎗根白田柯搗爛鹽糟炒敷之又方山布瓜根紫金皮溪楓根皮搗爛酒炒敷之此方馬瘨並大效却服九金六馬散四味浸酒方又用洗腫方熱淋之　殺著馬瘨用紫河車山枇杷根皮藜蘆子山布根凌霄根皮佛桑花葛合根石薜搗爛酢調刷查封用洗腫方淋洗却以九金六馬散鐲骶散服之

諸馬瘨有熱者用去熱散有表者用荊防敗毒散有裏者用內疎黃連湯有表復有裏者用追疔奪命湯却用水金鳳搗爛敷堆核上卽效

馬瘨有熱未成服藥卽能退之若已成者但要出

膿其熱卽退若生堆核四五箇只一二箇未成膿餘者皆已出膿其熱亦不能退要五箇盡出膿熱方退也

若潰爛者卽係潰瘍宜查本門治之

流注起於傷寒傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡澀於所滯而後爲流注也如病尚有潮熱則裏有寒邪未盡散榮衞返魂湯方中可加升麻蘇葉如服此而熱不退可加乾葛如有頭疼加川芎並用薑水煎如無潮熱可用水酒相半煎酒大能行血生氣故也氣生血行病愈可必然流注須表者何也所以推其因究其源不忘病之根本也寒邪既盡表之太過則爲冷流注尤爲難治故宜略表爲妙表後第二節宜服溫平之藥乃十宣內補是也如不效第三節宜加附子或服四柱散數服卽止溫藥亦不可多用恐增痛苦反成膿血不乾第四節仍歸本方收效然表未盡則餘毒附骨而爲骨癰夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注之敗證也流注非傷寒之罪乃醫者表之未盡也骨癰非流注之過又庸醫涼藥之過也庸醫無識心盲志聾妄稱明見雖知爲骨癰而治之無法

又復托之凉藥烈之毒刃則毒氣滯凉藥觸鐵器則愈附骨而不能愈矣不然則人之骨何以有癰骨而成癰非藥所治故名附骨疽又名白虎飛尸畱連周朞展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈其不愈者至於終身有之此皆失於初也其骨腐者多爲副骨猶或可痊正骨腐則終身廢疾故膿白而清者碎骨初脫肉深難取膿黃而稠者碎骨將出肉淺可取宜以利刃取之

又有流注大如匏瓠覆椀見於胷背其證類發而甚

用榮衛返魂湯之後形勢一有微動卽非發矣宜以內補十宣與此方隨證通變用之可以內消大抵流注皆原於冷故爲痛者骨痛也骨者腎之餘腎虛則骨冷骨冷所以痛所謂骨疽皆起腎者亦以其根於此也故補腎必須大附子方能作效腎實則骨有生氣疽不附骨矣凡用藥不可執一貴乎通變

流注冷證多附骨內硬不消骨寒而痛筋縮不伸若輕用刀針並無膿血若止有乳汁清流或有瘀血宜用此藥敷之若稍緩止以軍薑白芷肉桂草烏等分

熱酒調敷骨寒除而痛止則氣溫和而筋自伸肉硬自消矣然治流注不可無木蠟以破積滯之氣消堅硬之腫最妙又不可多多則能解藥性蓋此證主於溫藥故也

或問足脛之間生瘡狀如牛眼或紫或黑膿水淋漓止處卽潰爛久而不斂何如曰此名濕毒流注暴風疾雨寒濕暑氣侵入腠理而成宜防風通聖散加木瓜牛膝防己之類或當歸拈痛湯加牛膝

或問脚膝間膿水不絕連年不愈何如曰此名下注瘡亦名濕毒瘡因脾胃濕熱下注以致肌肉不仁而成瘡也在外屬足太陽少陽經在內屬足厥陰足太陰經宜服防風通聖散加木瓜防己牛膝之類外用祛風等湯藥洗製女貞葉貼之

陳實功外科正宗

附骨疽

夫附骨疽者乃陰寒入骨之病也但人之氣血生平壯實雖遇寒冷則邪不入骨凡入者皆由體虛之人夏秋露臥寒濕內襲或房慾之後蓋覆單薄寒氣乘

虛入裏遂成斯疾也初起則寒熱交作稍似風邪隨後臀腿筋骨作痛不熱不紅疼至徹骨甚者屈伸不能轉側日久陰變爲陽寒化爲熱熱甚而腐肉爲膿此疽已成也凡治此證初起寒熱作痛時便用五積散加牛膝紅花發汗散寒通行經絡或萬靈丹發汗亦可次以大防風湯行經活血滲濕補虛又有生於尻臀部位漫腫作疼者內托羗活湯腿內近膝股漫腫木痛者內托芪柴湯腿外側者內托酒煎湯初起通用人參敗毒散加木瓜牛膝蘇木紅花虛者十全大補湯加羗活防己牛膝已成欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者卽針之膿稠而黃體實者十全大補湯膿清色白體虛者保元大成湯食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此調理可也又有風濕相成之證初起寒熱交作次傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱腫痛按之如泥不便起者宜當歸拈痛湯或茯苓佐經湯間服萬靈丹和之已上之證皆由元氣不足中來不可悞用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼等法如悞用之必致氣血冰凝內肉瘀

腐日久化爲汚水敗膿流而不禁者終死又有房慾勞傷寒熱互變氣血乖違經脈橫解受病日深以成斯疾者其患大腿漸漸腫如冬瓜上過胯腹下連足底牽連漫腫皮色不紅日久潰膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減元氣日衰身體縮小脣舌乾焦二便枯祕諸藥不效飲食不進者終爲不治

看法

初起身微寒熱飲食如常結腫微紅疼不附骨者順

已成舉動自便結腫成囊疼痛有時膿易成者爲吉

已潰膿稠腫消痛減身體輕便甦醒睡穩不熱者吉

潰後元氣易復飲食易進內肉易實膿水易乾者吉

初起身發寒熱漫腫色白肢體牽强疼痛附骨者險

已成舉動不便通腿漫腫不熱不紅不作膿者爲險

已潰膿水清稀氣穢腥臭腫痛不消形體日削者死

潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不止脣白皮枯者死

治法

初起發熱惡寒身體拘急腿腳腫痛脈浮緊者宜散之已成腿腳腫痛皮色不變上下通腫者宜散寒溫

經絡寒熱作腫色白光亮按之如泥不起者宜健脾滲濕身體無熱惡寒脈遲而濇腿腫不熱者宜養血溫經絡暑中三陰脈洪而數腿腳焮腫口乾便燥者宜下之已潰膿水清稀飲食減少形體消瘦者宜補中健脾胃潰後腫痛不減膿水不止虛熱不退者宜溫中養氣血愈後筋骨攣強曲伸不便者宜滋養氣血通利關節

景岳全書（臣張介賓著）

附骨證論治

附骨疽一證近俗呼爲貼骨癰凡疽毒最深而結聚於骨際者皆可謂之附骨疽然尤惟兩股間肉厚處乃多此證蓋此證之因有勞傷筋骨而殘損其脈者有恃酒力房而因爍其陰者有憂思鬱怒而畱結其氣者有風邪寒濕而湊滯其經者凡人於環跳穴處無故酸痛久而不愈者便是此證之兆速當因證調治不可遲也蓋其初起不過少陽經一點逆滯逆而不散則以漸而壅壅則腫腫則潰至其延漫則三陰三陽無不連及而全腿俱潰然此證無非元氣大虧

不能運行故致留滯不散而後致決裂誠危證也若潰後脉和雖見困弱之甚只以大補氣血爲主皆可保全若潰後脉反洪芤而煩躁不寧發熱口渴則必不可治至若治此之法凡以勞傷筋骨而致者宜大營煎兼大防風湯治之若酒色傷陰者宜八味丸六味丸或右歸丸兼大防風湯主之若憂思鬱怒結氣者宜瘡科流氣飲或五香連翹湯兼大防風湯主之若風寒外襲者宜五積散兼大防風湯主之大抵此證初起即宜用大營煎溫補氣血或兼仙方活命飲通行毒氣有火者宜速用連翹歸尾煎以解散其毒仍宜速用隔蒜灸或豆豉餅尋頭灸之以速散其毒最爲捷法其有濕熱痰飲等證當並求後法以治之庶免大害也若環跳久痛不已或見臀股微腫度其已成勢不能散只宜速用托補專固根本使其速起速潰則根本既實雖凶亦無大害必且易潰易斂而易愈也若脉見滑數按之軟熟膿已成也速宜針之無使久留以防深入之患其有不明利害苟圖目前或用尅伐消散再傷元氣或用寒涼敷藥以遏其毒

氣必致日延日甚而元氣日敗則一潰不可收拾矣考諸方書俱未詳及此證故悉其所因幷附治案

方

瘡科流氣飲

治陰發流注恚怒氣結堆核腫硬作痛或胷膈痞悶或風寒濕毒搏於經絡或血不和結成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭或陰發乳岩等證未成速散已成速潰敗膿自出惡肉自去非常之驗

桔梗　人參　當歸　桂　甘草　黃芪（鹽水炒）

厚朴（薑製）　紫蘇　白芍藥　烏藥　防風

枳殼　檳榔　南木香　川芎　白芷

右生薑煎服

疼痛加乳香沒藥

瘡乾加知母貝母

瘡不乾加炒皂角刺

流注加羌活獨活

氣滯加香附

胃虛加陳皮此乃行氣散血之劑若服之過度則氣血虛耗何以爲膿學者知之

敗毒流氣飲

治流注初發堆核硬痛不可忍用此疎邪流氣

羌活　獨活　青木香　赤芍藥　當歸　紫蘇

陳皮　香附　白芷　三稜　蓬莪术　枳殼

川芎　桔梗　柴胡　半夏薑製　赤茯苓

甘草

右生薑煎服熱加大黃黃芩虛加人參黃芪

方脉流氣飲

治陰發流注瘰癧及鬱結腫聚結塊或走注疼痛或心胷痞悶脅腹脹滿嘔吐不食上氣喘急欬嗽

瘀盛或面目四肢浮腫大小便祕者

紫蘇　青皮　白芍藥　當歸　白茯苓　烏藥

桔梗炒　半夏薑製　黃芪炒　川芎　枳實炒

陳皮　防風　南木香　大腹皮　甘草　檳榔

枳殼

右生薑煎服

流注加羌活獨活白芷梢

小便不通加木通梔子

浮腫加猪苓澤瀉

氣滯加香附

血滯加肉桂

嘔吐加藿香

瘰癧加夏枯草此行氣耗血之劑不過二三劑止之不可多服

去毒散

治馬瘨發熱者此藥退熱腫瘍亦效

吉面消　山烏豆　雞屎子　雞肶根　水坊子

過山龍　金凉傘大葉　白根子　紫金藤

九牛天竹　臭木待根　連叉大青　落鴉瓜藤

右木煎服

九金六馬散

治馬㾊流注馬瘴馬面馬腿馬挪癰疽腫瘍乳癰脊癰便毒頭風風核等發者

鐵馬鞭　白馬骨　地馬梢　紫金藤　馬蹄藤

金星草　金鷺根　金銀花　馬蹄金　紫金皮

山紅花根　金凉傘根　金腦香　山烏豆

雞屎子　毛裏金釵　水滾子　穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

散血消核湯

治前證

紫金皮　大薊根　山蘇木　溪楓根　山烏豆

雞屎子　赤牛膝　馬蹄金　馬蹄藤　鐵馬鞭

白馬骨　馬蹄香　穿山蜈蚣

右水煎入酒和服

二馬散

治前證

馬蹄金　鐵馬鞭　撥雪根

右水煎入少酒和服

立效散

治前證

水滾子根（多）　淡茶櫟根（中）　晚祥西根（少）

右水煎入酒和服或合六馬散亦效

浸酒方

治馬瘨創人此藥退創

老公鬚根　毛裏金釵根　狗骨子根　大葉毛吹曲

右浸酒煖服不可煎

續骨散

治接骨證

天燈心　紫背草　赤牛膝　山蘇木　釣鉤藤

馬蹄香　馬蹄金　紫金皮　天花粉　白馬骨

鐵馬鞭　臭木待根　酒鑪子根

右酒水各半煎服

輕脚散

治鎖脚證

天燈心　紫背草　赤牛膝　鈞藤根　山蘇木

酒鏝根　白馬骨　馬蹄金　鐵馬鞭　穿山蜈蚣

右酒水各半煎服

嘲骨散

治嘲骨證

馬蹄金　馬蹄藤　白馬骨　紫金皮　鈞鉤藤

鐵馬鞭　酒鏝根　馬蹄香　天燈心　山蘇木

赤牛膝　地茄根　紫金藤　李子根　烏苞子

臭木待根　穿山蜈蚣

右水酒各半煎服

鐲脊散

治過脊證

紫金皮　天燈心　酒鏝根　馬蹄香　馬蹄金

紫背草　狗骨根　地茄根　山蘇木　白馬骨

鐵馬鞭　臭木待根

右生地黃酒水各半煎服

鐲骶散

治殺著證

溪楓根　白田柯　赤牛膝　白馬骨　撥雪根

馬蹄藤　馬蹄香　地馬梢根　穿山蜈蚣

馬蹄金　金腦香

右水酒各半煎服

退創散

治馬痶滿身創人轉動不便

地馬梢根　白馬骨　鐵馬鞭　頭形花根

雞屎子　詐死子　馬蹄金　山茄根　狗骨根

對節金鶯根

右水煎入酒和服

鈎鈎藤散

治馬痶痽瘍病後筋脉拘急

石楠藤　羊帶歸根　天燈心　狗骨子根

眞珠簾根　豨薟草根　鈎鈎藤　伸筋藤

右水煎入酒和服

馬鞭散

治馬瘟

石楠藤　涼藤子　晚祥西　雪裏開　馬蹄金
鐵馬鞭　鬼腰帶根
右水煎入酒和服又用雪裏開搗糟炒敷之又用樟樹根皮山枇杷根皮搗糟炒敷之

妙草散

治前證

白根子　赤芎根皮
右搗糟炒敷之又用七層樓煎酒服之

二妙散

治滿身起堆是馬瘨

馬蹄香　香圓橘葉
右搗糟炒敷之又用秦椒酒煎

四七湯

治七情鬱結狀如破絮或如梅核鯁在咽間或中脘痞滿痰涎壅盛或喘惡心少食

厚朴一錢五分　半夏薑製七分　紫蘇葉
茯苓各一錢
右作一劑水一鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

內塞散

治陰虛陽氣腠襲患腫或潰而不斂或風寒襲於患處致氣血不能運至久不愈遂成漏證

附子用童便數椀浸三日夜切作四塊再浸數日夜童便一日一換炮　桂心　赤小豆　甘草炙　黃芪鹽水浸炒　當歸酒拌　茯苓　白芷　桔梗炒　川芎藭　遠志去心　厚朴薑製　人參各一兩　防風四錢

右爲末每服二錢空心溫酒下或酒糊爲丸鹽湯下亦可或煉蜜爲丸服亦可

黃狗下頦方

治肚癰少腹癰及腿上貼骨癰神效又云可治發背大抵此方治下部癰疽妙

黃狗下頦連舌連皮毛劈下入罐鹽泥封固鐵盞蓋口煆一炷香覺烟清即止務宜存性不可過過則無用矣視其骨灰正黑色者爲妙若帶白色其性已過勿用用時研極細　白斂末　生豌豆粉

右三味等分以各五錢爲率酒調空腹服外又以

三味等分爲敷藥香油調敷患處其驗以服藥後出臭汗及熟睡爲準史鶴亭太史親見顧天宇室人驗過

按此方世多用之萬氏家抄亦已收載然但知其可爲敷藥散腫止痛而不知其可以內服爲下部癰疽內消之聖藥也予有轎夫環跳穴痛甚如雞啄火灼適製有藥以酒調三錢飲之未愈更進一服霍然如失明日舁轎如故了無苦矣

三生散

治諸瘡大痛不辨肉色漫腫光色名附骨癰如神

露蜂房　虵退　頭髮洗淨各等分

右燒灰存性研細酒下三錢

內托黃芪柴胡湯

治附骨癰

黃芪二錢　柴胡　土瓜根酒洗淨各一錢

羌活半錢　連翹一錢三分　官桂　黃蘗

生地黃各二分　當歸七分半

右㕮咀作一服水一盞酒一盞同煎至一盞去滓

熱服宿食消盡一服而愈昔賈德茂男年十歲丁未四月十一日於左腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大其左脚乃肝之髀土也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脈左部細而弦按之緩而微有力爲製此方主治一方無黃蘗

內托黃芪酒煎湯

黃芪　當歸尾各二錢　柴胡一錢半　連翹

肉桂　鼠黏子炒各一錢　升麻七分　黃蘗

炙甘草各半錢

右㕮咀好糯米酒一盞水一大盞半同煎至一大盞去滓空心宿食消盡溫服待少時早膳壓之使不令大熱上攻中上二焦也丁未季春蒲度主老年七十因寒濕地氣得附骨疽於左腿外側足少陽膽經之分微侵足陽明分闊六七寸長一尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一服立止再服堅硬腫消

當歸散

治附骨癰及一切惡瘡

當歸半兩　山梔子十二枚　木鼈子一枚去殼

甘草一兩

右爲細末每服三錢冷酒調服

漏蘆湯

治附骨疽

漏蘆去蘆　升麻　連翹　麻黃去根節各一兩

防己　木香　白蘞　沉香各半兩　大黃剉炒一

兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至七分入芒硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三二行未利再服

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮去皮　當歸　黑牽牛　草烏頭炮各一兩

右爲細末酢糊爲丸如小豆大每服三十丸空心酢湯下

貫衆湯

治附骨癰生股上伏肉間淋漯

貫衆　地骨皮　穀精草　枇杷葉拭去毛刷炙

荆芥去梗　蜀椒去目并合口者各一兩

右搗篩以水三升煑取二升和滓淋漯蘸布帛搨之

密陀僧散

杏仁去皮尖及雙仁者二七枚　自然銅酢淬

密陀僧各半兩

右用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨候筒黃色取出研極細看瘡大小用藥以新汲水調勻用雞翎掃塗癰上甚者不過二七日效

黑丸子

治風寒襲於經絡腫痛或不痛或打撲跌墜筋骨疼痛瘀血不散遂成腫毒及風濕四肢疼痛或手足緩弱行步不前并婦人血風勞損

百草霜　芍藥各一兩　當歸　白芨各四錢

赤小豆　白蘞各一兩六錢　骨碎補焙八錢

川烏炮二錢　南星焙三錢　牛膝焙六錢

右爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸鹽湯或酒下風疾哽吃煨葱一莖溫酒下孕婦勿服

單方

環跳穴痛防生附骨癰以蒼朮佐黃蘗之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子黃芩體虛者加土牛膝以生甘草爲使大料煎入生薑汁帶辣食前飲之病甚者恐朮蘗桂枝十數貼發不動少加麻黃一兩貼又不動者恐癰將成矣急撅地成坑以火煅紅沃以小便赤體坐其上以被席圍抱下體仗熱氣熏蒸腠理開血氣暢而愈

久癰瘡敗壞成骨疽以龍骨末粉瘡四面厚二分以

膏著瘡中日二易蟲出如髮盡愈膏方用大蝦蟆一枚自死者亂髮一塊雞子大猪脂一斤取上二味內脂中煎略消盡下待冷更內鹽一合攪和前藥用（千金下同）

又方槲皮燒末飲服方寸匕

又方新剝鼠皮如錢孔大貼腫上卽膿出已潰者取脊上脂貼之

附骨疽漏蜣蜋七枚同大麥搗敷（劉涓子）

附骨壞瘡久不瘥膿汁不已或骨從瘡孔中出用蝦蟆一箇亂頭髮一雞子大猪油四兩煎枯去滓待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煅龍骨末摻四邊以前膏貼之（錦囊）

積年骨疽一捏一汁出者熬飴糖勃瘡上仍破生鱓魚潝之頃時刮視蟲出更洗傅藥蟲盡則愈（肘後）

骨疽膿出黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令滿紮定以水一盞石器內煑至乾焦爲末猪油調搽少痛勿怪（危氏方）

附骨疽瘡狗頭骨燒烟日熏之（聖惠）

香附餅治瘰癧流注腫塊或風寒襲於經絡結腫或痛用香附爲末酒和量大小做餅覆患處以熱熨斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用薑汁作餅

鍼灸

千金方曰附骨疽灸間使後一寸隨年壯立瘥

醫案

李杲十書曰蒲津王世祥年七十感寒濕地氣二月間得附骨癰於左腿外側足少陽之分少侵足陽明分闊六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤深以指按至骨大痛又行步作痛與柴胡鼠黏子各一錢半連翹肉桂各一錢黃芪歸梢各二錢黃蘗甘草各五分升麻七分酒煎服少時以早膳壓之藥下咽疼痛立止二日後柔軟而腫消矣

賈德茂男十歲四月天氣大熱於左足大腿近膝股

內足厥陰肝之經少侵足太陰脾之經分出附骨疽不辨肉色漫腫皮澤木硬病勢甚大其脉在三部細弦按之洪緩略有力用黃芪二錢柴胡梢生地各一錢連翹一錢二分肉桂土瓜根各三分酒黃蘗二分歸尾七分半酒水煎空心服一劑愈

朱震亨心法曰朱紹八官右腿腫生附骨癰喫草藥酒多生膈痰熱壅無力予用人參黃連茯苓各一錢苦葽子四十九粒分二貼入竹瀝熱飲而愈

衛生寶鑑曰至元壬午有王伯祿者年五十七右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚凉六脉沉細而微脉證俱寒瘍醫孫彥和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燔針起之膿清稀次日再開之加吃逆不絕彥和與丁香柿蒂湯兩服稍緩待日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿飲食減少時發昏憒於左乳下黑盡處灸之二七壯又處以乾薑附子木香沉香茴香羌活數藥㕮咀一兩半欲與服或者曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前後飲食

不入此謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆屬心火是定理也此證內外相反須當捨時從證非大方辛熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去飲食進瘡勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常者衆人之見知變者大人之事知常而不知變細事因而取敗者亦多矣况醫乎守常知變豈可同日而語哉

薛己醫按曰大尹都成慶患附骨疽內痛如錐外色不變勢不可消喜其未用寒劑祇因痛傷胃氣而不思飲食用六君子湯治之飲食少進更以十全大補二十餘劑而膿成針去仍以大補湯倍用參芪歸朮加麥門五味遠志貝母數服膿漸止而瘡亦愈按二證蓋因濕熱滯於肉理眞氣不能運化其始治宜實脾土和氣血隔蒜灸而疽自消矣

李戶部孟卿環跳穴患附骨疽彼謂小瘡遂服敗毒之劑更用寒凉藥敷之因痛極刺之膿瘀大泄方知爲癰也請予治診其脈右關浮大此胃氣已傷故瘡口開張肉紫下陷捫之不熱彼云瘡內更覺微冷自

意必成漏矣遂以豆豉餅灸之飲以六君子湯加藿香砂仁炮薑數劑胃氣漸醒飲食漸進患處漸煖肌肉漸生再以十全大補湯而愈

王時亨室產後腰間腫痛兩腿尤甚此由瘀血滯於經絡而然也不早治必作骨疽遂與桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸數服而痊亦有惡血未盡臍腹刺痛或流注於四肢或注股內疼痛如錐或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣所壅遏血畜經絡而然宜沒藥丸治之亦有經血不行流注四肢或股內痛如錐或因水濕所觸經水不行而腫痛者宜當歸丸治之凡惡血停滯爲患匪輕治之稍緩則流注而爲骨疽多致不救

一婦人患附骨癰久而不斂致腿細短軟脈來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脈澀遲緩者易愈以其有胃氣故也脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也若煩痛尚未痊也洪滑粗散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一男子腰中患此發而不潰其氣血止能起發不能

培養爲膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參芪歸术膏斤餘膿少稠數斤膿漸稠肌肉頓生大凡癰疽藉氣血爲主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脈大而膿愈多屬眞氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之禍不免矣及患後當調養若瘰癧流注之證尤當補益否則更患他證必難措置愼之

一女髀樞穴生附骨疽在外側廉少陽經分始末用五香湯十宣散一日惡寒發熱膈滿猶大服五香湯一夕喘死此升散太過孤陽發越於上也

一人年踰四十夏患附骨疽予以火針刺去瘀血更服托裏藥而愈至秋忽不飲食痰氣壅甚勞則口舌生瘡服寒藥腹痛彼疑爲瘡脾胃脈輕取似大按之無力此眞氣不足虛火炎上也治以八味丸彼不信

自服二陳四物幾殆復請予仍以前丸治之而愈

一人附骨癰畏針不開臀膝通潰脉數發渴煩躁時嗽飲食少思齊氏曰瘡瘍煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋此惡證也膿出之後若脉洪數難治微濇遲緩易治刺之膿出四五椀即服參芪歸术大劑翼日脉稍斂更服八珍湯加五味子麥門冬肉桂白蘞三十餘貼脉緩膿稠三月乃愈

一老人腿患附骨疽腫硬大按方痛口乾脉弱腫聚不潰飲食少思予謂腫下而堅者發於筋骨肉色不變者發於骨髓遂托以參芪等藥三十餘劑膿雖熟不穿予謂藥力難達必須針刺不聽至旬日方刺湧出清膿五六椀然衰老氣血不足養毒又久竟不救大抵瘡瘍旬日不退宜托之有膿刺之有腐肉取之虛則補之此十全之功也

一人患貼骨疽腿細短輭瘡口不合以十全大補湯外灸附子餅貼補藥膏調護得宜百貼而愈

一後生叉骨痛以風藥飲酒一年予以防風通聖散去硝黃加牛犀角浮萍百餘帖成一疽得皮革膿出

而愈後五六年其處再痛予曰舊病作無能爲矣蓋發於新娶之後多得香辣肉味若能茹淡遠房勞猶可生也出膿血四五年延及腰背皆空又三年而死此純乎病熱者

一婦年四十餘近環跳生疽尺脈沉緊腿不能伸經曰脾移寒於肝癰腫筋攣蓋脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消

一少年天寒極勞又骨痛兩月後生疽深入骨邊臥二年取剩骨而安此寒搏熱者也取久疽及痔漏中朽骨用烏雞脛骨以砒實之鹽泥固濟火煅紅地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入竅內更以膏貼之

一婦人因怒脅下腫痛胷膈不利脈沉遲以方脈流氣飲數劑少愈以小柴胡湯對二陳加青皮桔梗貝母數劑頓退更以小柴胡湯對四物二十餘劑而痊

一男子腿患潰而不斂用人參養榮湯及附子餅更以補劑煎膏藥貼之兩月餘而愈

一男子腿患腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中益氣湯加半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之彼謂氣無補法乃服方脉流氣飲愈虛復求治以六君子湯加芎歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消夫氣無補法俗論也以其爲病痞悶壅塞似難於補殊不知正氣虛而不能運行則邪氣滯而爲病經云壯者氣行則愈怯者則著而爲病苟不用補法氣何由而行乎

一男子臂腫筋攣骨痛年餘方潰不斂診其脉更虛以內塞散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸之而愈精要云留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰多成瘻宜早服內塞散排之

一男子腿患久而不斂飲大補藥及灸附子餅更用鍼頭散紝之而愈

一男子臂患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熱以八珍湯加柴胡地骨皮牡丹皮月餘寒熱少止繼以益氣養榮湯及附子餅灸之兩月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而痊

一婦人膿潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內塞散灸以附子餅而瘳

一婦人久而不斂忽發寒熱予決其氣血俱虛彼反服表散之劑果大熱而死大抵流注之證多因鬱結或暴怒或脾氣虛濕氣逆於肉理或腠理不密寒邪客於經絡或閃仆或產後瘀血流注關節或傷寒餘邪未盡爲患皆因眞氣不足邪得以乘之常治鬱者開之怒者平之閃仆及產後瘀血者散之脾虛及腠理不密者除而補之傷寒餘邪者調而解之大要以固元氣爲主佐以見證之藥如久而瘡口寒者更用豆豉餅或附子餅灸之有膿管或瘀肉者用針頭散腐之自愈錠子尤效若不補血氣及不愼飲食起居七情俱不治

一男子元氣素弱將欲患此胷膈不利飲食少思予欲治以健脾胃解鬱結養血氣彼不從乃服辛香流利之劑致腹脹又服三稜蓬术厚朴之類飲食愈少四肢微腫兼腰腫一塊不潰而歿葢此證本虛痞今用剋伐之劑何以不死況辛香燥熱之劑但能刦滯

氣衝快於一時若不佐制過服則益增鬱火煎熬氣液而爲痰日久不散愈成流注之證

一男子臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉浮大而澀乃氣血俱損須多服生血氣之劑庶可保全彼惑於火尚未盡仍用凉藥內服外敷幾危始求治其形甚瘁其脉愈虛先以六君子湯加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以十全大補湯外以附子餅灸之僅年而瘥

通府李廷儀患流注吐痰氣促自恃知醫用化痰理氣等劑半載而潰用托裏等劑膿水淋漓腫硬不消寒熱往來飲食少思肌肉消瘦大便不實手足時冷兩尺脉浮大按之微細余曰此屬命門火衰當用八味丸不信乃服參芪歸术之類更加痰喘泄瀉服八味丸益氣湯年餘而痊

一婦人背患流注內潰脹痛服流氣化痰之劑自汗盜汗脉大而弱此元氣虧損之證也與參芪各一兩歸术各五錢肉桂三錢服而針之至夜半始出稀膿二椀許翌日大汗倦甚煩熱作渴揚手氣促脉洪大

而數仍用前藥加附子一錢炙甘草二錢二劑脉證悉退又以六君子加薑桂二十餘劑始離牀褥後因勞復寒熱作渴汗出時仲冬寢幃氣出如霧用十全大補加桂附二劑而痊

一婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目劄手揚足擲難以候脉視其面黃中見青此肝木乘脾土也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏茯苓而安

一弱人流注內潰出敗膿五六椀是時口眼歪斜以獨參湯加附子二錢二劑少愈更以十全大補之劑月餘而痊大抵瘡瘍膿血既泄當大補氣血爲先雖有他證當以末治之

一儒者患流注發熱作渴頭痛自汗脉洪大按之無力此氣血虛寒也用十全大補加麥門五味治之其證益甚仍用前藥加附子一錢四劑諸證悉退却去附子加肉桂二十餘劑氣血漸復又因勞心發熱惡寒飲食減少此脾胃復傷元氣下陷用補中益氣加附子一錢二劑熱止食進仍用大補元氣而安後因

考試不利懷抱不舒更兼勞役飲食日少形氣日衰吐痰作渴頭痛惡寒或熱來復去或不時而動仍用補中益氣數劑諸證漸愈元氣漸復乃去附子再加肉桂五分百餘劑而愈

外科正宗曰一男子中寒發散未盡大腿腫痛脉浮數而無力此風寒未盡內虛故也以五積散去麻黃加牛膝二服疼痛稍減又以內托黃芪酒煎湯四服痛腫俱消惟腿外側結腫一塊不退此瘀血凝滯欲作膿也以托裏藥候膿熟針之更以十全大補湯而斂

一男子勞碌過寒每發腿疼發則寒熱嘔吐胷痞不食此因氣惱飲食不節脾胃受傷故脾氣有虧飲食不能運化痰滯中脘濕熱動而下流注爲脚氣以開結導引丸二服行去停痰又以半夏佐經湯數服嘔止膈利更以附子六物湯數劑消而不發

一老人年六旬過慾腎虛致筋攣痹縮脚膝無力不能步履外貼祛風逐濕膏內服三因勝駿丸而愈

一男子右腿腫痛兩月餘昏沉危篤余曰膿已成久

強開之出膿盆許以獨參湯連進二服而甦以十全大補湯調理百日外而安

一男子房事後陰寒大腿無形作痛至夜尤甚不能步履醫以散寒除濕消痰止痛藥治之其痛益增診之脉細濇而無力此氣血不足寒氣所乘之證當以大防風湯二劑疼痛頓減又四劑其疾痊安

一男子暑月慾後當風睡臥致寒氣襲於左腿遂成腫痛寒熱交作胷痞不食以保安萬靈丹葱湯化服洗浴發汗以散骨髓寒毒後以大防風湯去羌活加紅花破故紙溫暖腎經通行經絡腫痛漸消血脉漸和後以三因勝駿丸間服調理兩月而愈

一監生以慾後受寒致成腿痛予以暖腎氣溫經絡散寒邪藥治之彼以爲緩請內醫日服表散之劑外邪雖散其內必虛又以小柴胡湯等藥調理致虛熱發作口燥咽乾煩渴不已又以知母石膏湯清其上防風木瓜威靈仙等劑攻其下衆議紛紛雜藥妄進致病愈劇仍復請治其時腿患愈腫其形縮小此必死之證也況此證原從腎經受寒非附子破故紙不

能通達關節非羌活防風牛膝不能通行閉滯非人參白术炙甘草不能使脾氣行達四肢非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血凡病從虛而入者先補其虛後攻其病況治此證不加溫補而反用發散解肌以正風寒有餘之法治之不死何可得也後果死

景岳全書曰有魏生者年三十餘素多勞碌忽患環跳酸痛數月後大股漸腫延予視之曰此附骨疽也速當治之與以活命飲二劑未及奏效而腫益甚因慌張亂投或清火或解毒遂致嘔吐發熱飲食不進其勢甚危然後懇求相救遂以參芪內托散大加炮薑數劑而嘔止食進其腫軟熟知其膿成即爲針之針處出膿不多復以九味異功煎與之遂得大潰且瓣瓣出膿潰者五六處而腿肉盡去止剩皮骨矣潰後復嘔惡發熱不食遂以十全大補湯及九味異功煎相間與之然後熱漸退食漸進稍有生色然足筋短縮但可豎膝仰臥左右挨緊毫不能動動則極痛自分已成廢物此後凡用十全大補湯八十餘劑人

參三斤而腿肉漸生筋舒如故後成一精壯男子此全得救本之功也

一男子陳姓者年近三旬素不節慾忽見環跳酸痛月餘不愈予曰此最可畏恐生癰毒之患彼不信又謀之一庸醫反被其詬曰此等胡說眞可笑也筋骨之痛亦常事耳不過風熱使然何言癰毒遂用散風清火等藥至半年後果見微腫復來求治予曰速用托補以救根本尚不遲也彼又不信而謀之瘍醫曰豈有腫瘍未潰而遽可溫補耶復用清火消毒之劑及其大潰而危再延余視則證脉俱敗方信予言而痛悔前失已無及矣

一膏粱子茅姓者年未三旬素以酒色爲事亦患此證早令服藥執拗不從及其腫而膿成令速針之亦畏痛不從而偏聽庸流敷以苦寒解毒之藥不知膿既已成尤不可解但有愈久愈深直待自潰而元氣盡去不可收拾矣

古今圖書集成 骨流注門之五十五

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百八十九卷目錄

醫部彙考三百六十九

外科遊風丹毒斑疹門

黃帝素問（至眞要大論）

孫思邈千金方（丹毒　癮疹）

竇漢卿瘡瘍全書（丹毒）

成無己明理論（丹證難易）

劉完素六書（金絲瘡）

張潔古活法機要 斑論

朱震亨心法 證屬風熱

戴思恭證治要訣 發丹

李梴醫學入門 斑疹遊風

薛己醫按 赤白遊風 丹毒 斑疹

陳實功外科正宗 論證治

張介賓景岳全書 斑疹丹毒

方 金花散 又方 又方 又方 搨方 五香湯 搨方 朱氏家傳方 又方 聖塗散 麻黃散 拔毒散 郭氏金黃散 風丹 又方 又方 如冰散 升麻膏 升麻湯 漏蘆湯 石南湯 又方 又方 又方 又方 又方 又方 又方 又方 又方 青羊脂膏 漏蘆散 消毒丸 調中湯 消毒犀角飲子 通聖散 元參升麻湯 化斑湯 大建中湯 化斑解毒湯 除濕胃苓湯 紫雪散 柏葉散 升麻葛根湯 大連翹飲

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百八十九卷

醫部彙考三百六十九

外科游風丹毒斑疹門

黃帝素問

至眞要大論

少陽司天客勝則丹胗外發及爲丹熛

註 丹胗卽斑疹因火熱而發於外丹熛卽赤游發於外而欲游於內也

唐孫思邈千金方

丹毒

丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者徧身有癢有腫無定色有白丹者肉中腫起癢而腹痛微虛腫如吹狀癮疹起也有雞冠丹者赤色而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠肌理也一名茱萸丹有水丹者由遍體熱起遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著股及陰處此雖小疾不治令人致死

癮疹

素問云風邪客於肌中則肌虛眞氣發散又挾寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行則爲癢也所以風疹瘙癢皆由於此又有赤疹者忽起如蚊蚋啄煩癢極者重沓壟起搔之逐手起又有白疹者亦如此赤疹熱時卽發冷卽止白疹天陰冷卽發白疹宜煑礬石汁拭之或煑蒴藋和少酒以浴之良或煑石楠汁拭之良餘一切如治丹方法俗呼爲風屎亦名風尸

宋竇漢卿瘡瘍全書

丹毒

內丹者從脅下至腰下腫發赤色名曰內丹如早覺可治至腰便不可治其病多大小便不通有不過三日而飛遍身青黑色而死用救急丹酢磨傅內丹處更服連翹敗毒散

游丹者卽遍身丹毒也初發兩手青腫徹上下急痛若經一宿二宿腫氣遍身入心內者卽死初覺急治之宜服五香連翹湯木香流氣飲以金箍散敷之宜用治疔之法治之

小兒患赤游火丹皆從母胎中受蘊熱故發皮膚遊走不定從腹起於四肢收者輕四肢收於腹者重急治得生小兒赤遊丹固蘊熱所致卽胎毒也或母懷胎之時好食辛辢毒物沐浴熱湯冬天炭火以致熱氣入胎嗜慾無度或生下火烘衣裳或火烘牀褥以致熱毒內外交攻半歲上下無有不發者初起身體發熱燃火視之其色紅赤啼哭不止其光遊走不定發於四肢者生發於腰腹者死急用碗鋒砭去其紫血自下而上則毒血流下不可逆砭急用乳香末雞子清調匀塗砭處時用芭蕉根汁塗之內服硃砂化

毒丹生蜜調下再用紫金錠水磨汁下

又有十種丹毒一飛竈丹從頭頂腫起漸發紅腫頸項俱浮眼睛紅色用生葱一束搗爛取汁塗之又方以朴硝五錢雄黃末二錢和勻芭蕉根汁調和用敗筆蘸汁潤之須令病者臥之將此汁自下潤至巔頂其毒從百會穴出若隨下潤之則毒氣侵於咽喉亦難治大人患此亦同治法二吉竈丹從頭額腫痛用赤小豆末雞子清調敷之前方亦妙三鬼火丹從面上起赤腫用伏龍肝末雞子清調敷再用芭蕉根汁潤之益母草灰爲末酢調敷之亦妙四天火丹從背上起赤點用桑皮末羊脂調敷之五天竈丹從臂上起赤腫黃色用柳樹枝燒灰爲末蜜調敷之六水丹兩脅虛腫用生鐵屑末或針砂或銹釘末豬糞調塗七胡亥丹從臍上起黃腫用檳榔末米酢調敷之八野火丹從兩脚上起赤腫用乳香末羊脂調敷之九煙火丹亦從兩脚上起赤白點用猪槽下土麻油調搽十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調搽

腎氣游風毒在脚肚受在膀胱經冷氣傷腎復傷膀

胱此乃風毒也當用紫蘇流氣飲檳榔丸

飛游毒因榮衛受肌熱而生赤腫走注不定用溫水洗患處三稜針刺毒上二三十針或磁鋒砭之亦妙後用拔毒散敷之內服解毒十宣湯

金成無己明理論

丹證難易

丹毒自腹內生出四肢者則易愈自四肢入腹者則難治

劉完素六書

金絲瘡

一名紅絲瘡其狀如線或如繩巨細不一經謂丹毒是也但比烟毒不甚廣闊人患此頭上有之下行至心則死下有之上行者亦然可於瘡頭截經刺之出血後嚼萍草根塗之自安

元張潔古活法機要

斑論

斑疹之病其爲證各異瘡法焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅點行皮膚之中不出者屬少

陰君火也謂之疹凡顯斑證若自吐瀉者愼勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之安裏解毒須安五臟防風湯是也如大便不澀者須微發之藥錢氏方中甚多宜選用之如大便祕宜微利之當歸丸棗變百祥丸是也初知斑疹若使之斑疹幷出小兒難禁是以別生他證也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若能吐利尤不可下也便宜安裏若不吐瀉者先安裏藥三五服如能食而大便祕結內實者宜疎利之若內虛而利者宜用裏藥末後一服調微發之藥服之大抵安裏之藥多發表之藥少祕則微疎之令邪氣不壅併而能作番次使兒易禁也身溫煖者順身京者逆二者宜多服防風湯和之安裏若大便實祕能飲食而內實宜當歸丸微利之

朱震亨心法

證屬風熱

風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以

微汗散之切不可下

內傷斑者胃氣極虛一身火游行於外所致宜補以降於陰證略例中求之發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理

疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者蓋疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之

癮疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癮疹也發則多癢或不仁者是兼風兼濕之殊色紅者兼火化也

黃瓜水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹浮小有頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

斑疹之病其爲證各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦相火也謂之斑小紅靨行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹

又傷寒陽證發斑有四惟溫毒發斑至重紅赤者爲胃熱也紫黑者爲胃爛也一則下之早一則下之晚乃外感熱病發斑也以元參升麻白虎等藥服之

陰證發斑亦出背胷又出手足亦稀少而微紅若作熱證投以凉藥大誤矣此無根失守之火聚於胷中上獨熏肺傳於皮膚而爲斑點但如蚊蚋虱蚤形狀而非錦紋也只宜調中溫胃加以茴香芍藥或以大建中之類其火自下斑自消退可謂治本而不治標也

明戴思恭證治要訣

發丹

發丹色狀不一痒痛亦異大槩皆因血熱肌虛風邪所搏而發然色赤者多以赤故謂之丹宜消風散入燒楓樹子存性爲末酒調服有發而色白者謂之冷瘼宜消風散雜黑神散酒調此病多緣肌肉踈爲風邪所襲而成風熱則赤風冷則白此今人呼赤爲丹白爲瘼所以用酒調土硃服之而愈者亦以脾主肌肉土能入脾各從其類古方一名爲癮疹非特分寒熱亦兼備四氣近世方論呼爲白婆瘼赤爲血風赤白二證並可用烏藥順氣散和消風散酒調服白者多用順氣散赤者多用消風散病此者俱宜用煎藿

香正氣散有人一生不可食雞肉及獐魚動風等物纔食則丹隨發以此見得係是脾風脾主一身之肌肉藿香正氣散乃治脾之藥而土硃亦入脾之藥此方屢試應驗

李梴醫學入門

斑疹游風

斑屬三焦無根之火疹屬心火其上侵於肺則一也外因初起頭疼身大熱口知味者忌大汗下宜解肌微汗有自吐瀉者卽愈內因頭或微疼但手心熱脾胃虛者宜大補以降其火體壯者宜清肺以化其痰有色痕而無頭粒重者紅如錦繡成片多發在胷腹傷寒誤溫誤下心火所主雜病全是風熱挾痰手少陽相火自裏發外治宜安裏藥多發表藥少

外感者敗毒散加紫草或升麻葛根湯加元參咽痛者元參升麻湯狂言或見血者陽毒升麻湯渴者化斑湯便閉者防風通聖散微利之便不甚閉去硝黃身疼加蒼朮羌活痰嗽加半夏熱甚者黑奴丸斑爛者黑膏

內傷發斑輕如蚊迹疹子者多在手足初起無頭疼身熱乃胃虛火游於外宜調中益氣湯黃芪建中湯

內傷痰熱上攻頭面者升麻葛根湯加元參貝母黃芩生地麥門冬

內傷挾外感者調中疎邪湯參蘇飲

疹有頭粒或如粟米或如蚊蟲咬迹微紅或隨出隨沒或沒而又出紅靨隱隱皮膚表分欲出不出但作瘙痒全無腫痛名曰癮疹當春發在傷寒最重即溫毒也升麻葛根湯加牛蒡子荊芥防風或鼠粘湯

赤疹因天熱燥氣乘之稍凉則消川芎茶調散人參羌活散胡麻散裏熱者解毒湯

白疹因天寒冷氣折之稍煖則消惺惺散裏虛者理中湯

似赤似白微黃隱於肌肉之間四肢重著此風熱挾濕也多因浴後感風與汗出解衣而得宜消風散寒加官桂暑加黃芩柴胡濕加蒼朮茯苓如肢體不仁者黃連橘皮湯遍身疹多痛極者古苦皂丸又有斑疹並出者不可槩用風藥恐變痰嗽渴嘔瘡疹

面生紫赤癮疹及雀子斑汗斑皆此類之緩者疹色赤者又名丹疹或遍五色因血盛熱毒畜於命門被風毒逐動相火則發滿遍身甚則肌爛寒月升麻葛根湯暑月人參羌活散熱加黃芩元參冷加黃芪白芷詳小兒門外治土硃散浮萍湯

凡斑疹赤色身煖自胷腹散四肢者吉黑色身涼自四肢入腹者死舊分癮疹丹疹各類今合一以其因治同也

薛己醫按

赤白遊風

赤白遊風屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒閉腠理內熱怫鬱或陰虛火動外邪所乘或肝火風熱治法風熱小柴胡湯加防風連翹血熱四物湯加柴胡山梔丹皮風熱相搏荊防敗毒散內熱外寒加味羌活散胃氣虛弱補中益氣湯加羌活防風及消風散血虛加味逍遙散六味丸若肝腎虛熱六味丸則火自息風自定癢自止若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣

受傷相火翕合血隨火化反爲難治矣

丹毒

凡小兒丹毒徧身俱赤不從砭治以致毒氣入腹則不救蓋此證乃惡毒熱血蘊畜於命門遇相火而合起也如霞片者須砭去惡血爲善如腫起赤色游走不定者宜先以生麻油塗患處砭之以洩其毒凡從四肢起入腹者不治雖云丹有數種治有數法無如砭之爲妙嘗見患稍重者不用砭法俱不救

斑疹

脈浮者消風爲主脈浮數者祛風清熱脈沉數者瀉火爲主脈數按之沉實者解表攻裏

陳實功外科正宗

論證治

火丹者心火妄動三焦風熱乘之故發於肌膚之表有乾濕不同紅白之異乾者色紅形如雲片上起風粟作癢發熱此屬心肝二經之火治以凉心瀉肝化斑解毒湯是也濕者色多黃白大小不等流水作爛又且多疼此屬脾肺二經濕熱宜清肺瀉脾除濕胃

苓湯是也腰脅生之肝火妄動名曰纏腰丹柴胡清肝湯外以柏葉散如意金黃散敷之

赤游丹受毒於未生前發病於有生後蓋身在胞胎皆賴父精母血藉以生養父母不能節慾而淫火猖熾胎必侵受又不戒厚味及炭火烘熏重衾疊褥往往受熱貽之於子及至生後熱湯洗浴烘熏衣物觸動內毒發時身先發熱啼叫驚搐次生紅腫光亮發熱瞬息遊走發無定處先從頭額起者名天罩丹以升麻葛根湯母子同服餘皆起於腹背流入四肢者輕起於四肢流入胷腹者重有此總皆先砭惡血爲要砭血之後先用精猪肉切片貼之一時許換如意金黃散用水芭蕉搗汁調敷甚者日換二次內以大連翹飲消毒犀角飲五福化毒丹毒氣入裏腹脹堅硬不乳者紫雪散下之三日後身漸徹凉砭血之處肉便軟活聲清腹軟乳哺如常者順反此爲逆

景岳全書

臣張介賓著

斑疹丹毒

斑疹一證雖已有正門詳載然彼以小兒麻疹爲言

其有非麻疹而無論大人小兒忽患斑疹小瘡者此雖與彼相類而實有小異也是亦不可不辨而治之蓋多由風熱外感之證耳治此之法脈浮而身熱有表證者惟散風邪爲主脈浮而數者祛風兼清熱脈沉滑而無表證者清火爲主脈浮沉俱滑數而表裏兼見者宜表裏雙解之然惟小兒多有此證須察其表裏虛實酌而治之可也總之小兒脆弱宜安裏之藥多攻發之藥少祕則微泄之結則微導之但令邪氣不壅而散之易則證輕而自安矣大抵身溫煖者順身凉者逆

方

金花散

治一切丹毒熱痛焮赤

鬱金　黃連　黃芩各一兩　糯米三合

右爲末每用蜜水調如泥雞翎掃丹上乾卽易之

鬼遺有甘草山梔仁大黃各一兩

又方

治一切丹毒惡氣攻刺身體赤腫疼痛不可忍

車前子　益母草　地膽草

右等分爛研乾再塗之如無新者只以乾者爲末冷水調敷

又方

赤小豆一升　羊角燒灰半兩

右爲末雞白和塗如無羊角即單用小豆亦良

又方

治丹毒瘤

蜈蚣乾者一條　白礬如皂子大　雷丸一箇

百部二錢

右爲細末酢調搽之

搨方

升麻　漏蘆　芒硝各二兩　梔子二十枚

黃芩三兩　蒴藋五兩

右件以水三升浸良久煮取二升以故布染汁搨後須服漏蘆湯

五香湯

主熱毒氣卒腫痛結核或似癰疽使人頭疼寒熱氣急者數日不除則殺人

青木香　藿香　沉香　丁香　薰陸香各一兩

右以水五升煮取二升分三服不瘥更服之

搨方（鬼遺方）

治丹癰疽始發焮熱浸淫長成

升麻　芒硝　黃芩各三兩　黃連　芎藭

大黃各二兩　當歸　甘草炙　麢羊角屑各一兩

右㕮咀以水一斗三升煮取五升絞去滓鐺中內芒硝上火攪令成沸盡滓稍分適冷熱貼帛搨腫上數過其熱隨手消散王練甘林所祕而不傳者

朱氏家傳方

治火丹

伏龍肝　猪槽下土多年者　硃砂少許

右爲末雞子淸調鵝毛掃

又方

蹢躅花根　曲蟮土　壁上多絲蟲窠　百草霜

伏龍肝　猪槽下土

右如上法用之

聖塗散（鄭愈）

治諸般丹毒

凌霄花　萬州黃各一分　苧根半兩切焙

右同杵爛以酒和蜜同調服少許仍塗丹上立效

麻黃散（千金）

治惡毒丹及風疹

麻黃　升麻　葛根各一兩　射干　雞舌香

甘草炙各半兩　石膏半合

右㕮咀以水三升煑取一升大人作一服三歲兒分三服日三

拔毒散

治熱毒丹腫游走不定

石膏生　寒水石生各四兩　黃蘗　甘草各一兩

右爲細末以新水調掃之或紙花子小貼尤妙凉水潤之

郭氏金黃散

治熱毒丹流遊走不定疼痛不止

寒水石二兩　鬱金一對　藍實　大黃　黃蘗

黃連　景天各一兩

右爲細末用雞子清調敷木亦可

風丹

痛者爲丹毒痒者爲風丹

白朮七分　枳實炒　黃芩四錢

右分八貼下之食前

又方

治風丹徧身癢因酒得者

浮萍半兩　防風　黃芪　羌活三錢　乾葛

麻黃各一錢　生甘草半錢　當歸二錢

右水煎服

又方

治冷丹風

防風　甘草　白殭蠶　蟬退　川芎　白芷

茯苓　荊芥　陳皮　厚朴　蒼耳子　人參

右爲末豆淋酒調服二錢

如冰散

治風邪熱毒壅滯肌肉榮衞不宣蘊積成腫血澀

膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝焮

赤熱痛

片腦一錢另研　朴硝五兩另研　寒水石

蛤粉各三兩　白芷一兩

右爲細末研勻每用新汲水調稀稠得所以雞翎

塗掃不令藥乾

升麻膏（千金方下同）

治丹毒

梔子四十枚　升麻　白薇（一作白蘞）　漏蘆　連翹

芒硝　黃芩各二兩　蛇銜　枳實各三兩

蒴藋四兩

右十味微搗碎以水三升浸半日以猪膏五升煎令水氣盡去滓膏成敷上諸丹皆用之及熱瘡腫上日三

升麻湯

治丹毒

升麻　漏蘆　芒硝各二兩　梔子二十枚

黃芩三兩　蒴藋五兩

右六味㕮咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故

帛染汁搨諸丹毒上常令濕搨後須服飲之并漏蘆湯

漏蘆湯

治前證

漏蘆　白芨　黄芩　麻黄　白薇　枳實
升麻　芍藥　甘草各二兩　大黄三兩

右十味㕮咀以水一斗煑取三升分三服快下之無藥處單用大黄亦得

石南湯

治六十四種風淫佚走人皮中如蟲行腰脊强直五緩六急手足拘攣癮疹搔之作瘡風尸身癢卒面目腫起手不得上頭口噤不能言

石南　乾薑　黄芩　細辛　人參各一兩
桂心　麻黄　當歸　川芎藭各一兩五錢
甘草二兩　乾地黄十八銖　食茱萸三十銖

右十二味㕮咀以水六升酒三升煑取三升分三服大汗勿怪

又方

治風瘙癮疹心迷悶亂

天雄　牛膝　桂心　知母各四分　苦蔞根

白朮各五分　防風六分　人參二兩　乾薑

細辛各三分

右十味治下篩酒服半錢匕加至一匕爲度

又方

治瘙痒皮中風虛

枳實三升　松葉切一升　獨活　蓯蓉　黃芪

秦艽各四兩　丹參　蒴藋各五兩

右八味㕮咀以酒二斗浸六宿每服二合日二稍加之

又方

白朮三兩　戎鹽　礬石各半兩　黃連　黃芩

細辛　芎藭　茵芋各二兩

右八味㕮咀以漿水一斗煮取三升洗之日三良

又方

馬藺子　蒴藋　礬石　茺蔚子　蒺藜子

茵芋　羊桃　萹竹各二兩

右八味㕮咀以漿水三斗煑取一斗二升內礬石洗之日三

又方

蒴藋　防風　羊桃　石南　茵芋　芫花

蒺藜　礬石各一兩

右八味㕮咀以漿水一斗煑取五升去滓內礬石令小沸溫浴之

又方

治癮疹痒痛

大黃　升麻　黃蘗　當歸　防風　芍藥

黃芩　青木香　甘草各二兩　楓香五兩

芒硝一分　地黃汁一升

右十二味㕮咀以水一斗煑取三升去滓下芒硝令消帛染搨病上一炊久日四五度

又方

治舉體痒痛如蟲嚙痒而搔之便脫落作瘡

大黃二兩　礬石三兩　蒺蔾子三升　蛇牀子

茺蔚子各二升　防風五兩　大戟一斤

右七味㕮咀酒四升水七升煑取四升去滓內礬石以帛染拭之

又方

治風瘙瘇瘡痒在頭面搨洗之

大黃　芒硝各四升　莽草二分（一本作甘草三兩）

黃連六分　黃芩八分　蒺藜子五合

右六味㕮咀以水七升煑取三升去滓下硝以帛染搨洗日一度勿近目

又方

治身體赤癮疹而痒搔之隨手腫起

莽草二分　當歸　芎藭　大戟　細辛　芍藥

芫花　蜀椒　附子　躑躅各四分　猪膏二升半

右取十味㕮咀以酒漬一宿脂膏煎之候附子色黃膏成去滓以傅病上日三

青羊脂膏

治風熱赤疹搔之逐手作瘡

芍藥　甘草各三兩　寒水石　白芷　白芨

黃芩　防風　黃芪　升麻各四分　竹葉切

石膏各一升　青羊脂四兩

右十二味㕮咀先以水八升煑石膏竹葉取四升去滓浸諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傅病上良

漏蘆散（寶鑑）

治臟腑積熱發爲腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆　升麻　大黃　黃芩各一兩　藍葉

元參各一兩

右爲粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

消毒丸

治時毒疙瘩惡證

大黃　牡蠣燒　白殭蠶炒各一兩

右爲末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔梗鼠黏子尤妙

調中湯（丹溪　下同）

治內傷外感而發陰斑

陳皮　砂仁　藿香　芍藥炒　甘草炙　桔梗

半夏　白芷　羌活　枳殼各一錢　川芎

麻黃　桂枝各半錢　蒼朮一錢半

右㕮咀薑三片水煎服

消毒犀角飲子

治斑及癮疹

牛蒡子六錢（正宗作黃連）　荊芥　防風各三錢

甘草一錢

右㕮咀水煎服

通聖散

川芎　當歸　麻黃　薄荷　連翹　白芍

黃芩　石膏　桔梗各一兩　滑石三兩　荊芥

梔子　白朮各二錢半　甘草

右剉水煎服如身疼加蒼朮羌活痰嗽加半夏每服細末三錢生薑三片擂細盪起煎沸服之

元參升麻湯

斑在身治汗下吐後毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

元參　升麻　甘草各等分

右㕮咀水煎服

化斑湯

治傷寒汗吐下後發斑脈虛

知母六兩　石膏一斤　甘草二兩　粳米六合

人參

右㕮咀時時煎服

大建中湯

黃芪　當歸　桂心　芍藥各二錢　人參

甘草各一錢　半夏　黑附炮去皮各二錢半

右㕮咀每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎食前

服

化斑解毒湯（正宗下同）

治三焦風熱上攻致生火丹延及遍身痒痛者

元參　知母　石膏　人中黃　黃連　升麻

連翹　牛蒡子各等分　甘草五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分不拘時服

除濕胃苓湯

治脾肺二經濕熱壅遏致生火丹作爛疼痛者

防風　蒼朮　白朮　赤茯苓　陳皮　厚朴

猪苓　山梔　木通　澤瀉　滑石各一錢

甘草　薄桂各三分

水二鍾燈心二十根煎八分食前服

柏葉散

治三焦火甚致生火丹作痒或作痛延及遍身

側柏葉炒黃爲末　蚯蚓糞韭菜地內者佳

黃蘗　大黃各五錢　赤豆　輕粉各三錢

右爲細末新汲水調搽

升麻葛根湯

治小兒丹毒身體發熱面紅氣急啼叫驚搐等證

木通　甘草各五分　升麻　乾葛　白芍

柴胡　黃芩　山梔各一錢

水二鍾煎八分不拘時母子同服

大連翹飲

治小兒丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡痧疹頸項生核或傷風寒時行發熱等證並宜服之

連翹　瞿麥　滑石　車前子　牛蒡子　赤芍

山梔　木通　當歸　防風　黃芩　柴胡
甘草　荊芥　蟬蛻　石膏各五分

水二鍾燈心二十根煎八分母子同服

紫雪散

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨脹氣急不乳即宜此藥救之又治傷寒熱躁發狂及外科一切畜毒在內煩躁口乾恍惚不寧等證

升麻　寒水石　石膏　犀角　羚羊角各一兩
元參二兩　沉香　木香各五錢　甘草八錢

水五椀同藥煎至一椀濾清再煎滾投提淨朴硝三兩六錢微火漫煎水氣將盡欲凝結之時傾入椀內下硃砂冰片各二錢金箔一百張各預研細和勻椀頓水內候冷凝成雪也大人每用一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之即效病重者加一錢亦可或用淡竹葉燈心湯化服

單方

火焰丹毒酢和石灰塗之或同青靛塗（摘元方）

丹毒腫痒陽起石煅研新水調塗（事親）

諸丹熱毒土朱青黛各二錢滑石荊芥各一錢爲末每服一錢半蜜水調下仍外傅之（直指方）

火焰丹毒水調芒硝末傅之（梅師方下同）

老小火丹黃芩末水調塗之

五色丹毒苧根煮濃汁日三浴之（外臺）

火焰丹腫老鴉眼睛草葉入酢細研傅之能消赤腫

（圖經）

五色丹毒蒴藋葉搗傅之（千金方）

火丹赤腫遍身者大黃磨水頻刷之（急救方）

赤遊風丹漸漸腫大五味子焙研熱酒服一錢自消神效（保幼大全）

熱遊丹腫苦蔞仁末二大兩釀酢調塗（集驗方）

風熱丹毒浮萍搗汁遍塗之（子母祕錄）

身面丹腫如蛇狀者以雨滴階上苔痕水花塗蛇頭上卽愈（得效方）

赤遊丹毒麻仁搗末水和傅之（千金方）

纏蛇丹毒糯米粉和鹽嚼塗之（濟急方）

丹毒如火赤小豆末和雞子白時時塗之不已隨手卽消（小品方）

火焰丹毒從頭起者生葱汁塗之

五色丹毒無常色及發足踝者搗蒜厚傅乾則易之（肘后方下同）

赤火丹毒蕓薹葉搗傅立消如無鮮者以乾者爲末水調傅亦可搗汁服之

丹從臍起檳榔末油調傅之（本事方）

赤遊火丹新生荷葉搗爛入鹽塗之（摘元方）

野火丹毒自兩足起乳香末羊脂調塗（活幼新書）

火竈丹毒赤從背起柳木灰水調塗之（外臺）

五色丹毒俗名遊腫犯者多死不可輕視以楡白皮末雞子白和塗之（千金髓）

火焰丹毒梔子搗和水塗之（梅師方）

赤遊火丹母猪屎水絞汁服幷傅之（外臺）

五色丹毒蜜和乾薑末傅之（肘後方）

五色丹毒黃龍湯飲二合幷塗之良（千金）

野火丹毒從背上兩脅起者殭蠶二七枚愼火草同搗塗之甚效（産乳）

火丹癮疹以酪和鹽煑熱摩之卽消（千金翼）

赤丹用黃瓜種中瓤水去子以器貯之用時以水塗患處（初虞世下同）

又方凡赤丹用臘雪貯器中久化爲水以水塗赤遊妙

諸丹毒腫蚯蚓矢水和傅之（聖惠）

赤遊風腫蕎麥麵苦酒調傅（兵部手集）

熱赤遊丹苦蔞仁末二大兩釅酢調塗之

五色丹毒煑栗皮有刺者洗之佳

有人眼赤鼻張大喘渾身出黑斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結於下焦也白礬滑石各一兩爲末作一服水二椀煎減半不住服盡卽安（奇疾方）

天行發斑赤黑色青木香一兩水二升煑一升服（外臺）

身面卒得赤斑或瘭子腫起不治殺人羖羊角燒灰雞子清和塗甚妙（肘后方）

一切丹毒徧身蕓薹子一兩以酒一大盞和研去滓煎五七沸無時溫服一合

又方仙人水鑑治火丹蕎麥麵黃連各少許右二味同研細塗立差切不得入油及鹽

火焰丹毒銀硃調雞子清塗之（怪證方）

丹毒浸淫走串皮中名火丹以蠐螬搗爛塗之（刪繁）

遍身赤丹羚羊角燒灰雞子清和塗之神效（外臺）

赤斑如瘡瘙痒甚則殺人羚羊角磨水摩之數百遍爲妙（肘后方下同）

五色丹毒鹿角燒末猪脂和敷

白遊風腫螺螄肉入鹽少許搗泥貼之神效（摘元方）

丹毒瘤腫用蜈蚣一條白礬一皂子大雷丸一箇百部二錢研末酢調傅之（衍義）

赤遊火丹新生荷葉搗爛入鹽塗之（摘元）

五色丹遊多致殺人蒲席燒灰和雞子白塗之良（千金）

發丹如瘤生綿羊腦同朴硝研塗之（瑞竹堂方）

五色丹毒甑帶燒灰雞子白和塗之（易簡方）

赤白丹腫水蛭十枚令咂病處以皮皺肉白爲效冬月無蛭地中掘取暖水養之令動洗淨人皮膚以竹筒盛蛭合之須臾咬咂血滿自脫更用饑者（藏器）

一切丹毒水和曲蟮泥傅之（外臺）

身面白丹白瓷瓦末和猪脂塗之（梅師方）

赤黑丹疥或痒或燥不急治遍身卽死白瓷末猪脂和塗之（總錄）

赤瘤丹毒無名異末葱汁調敷立消（簡便方）

熱毒丹瘡用愼火草搗汁拭之日夜拭一二十遍

風熱癮疹浮萍蒸過焙乾牛蒡子酒煑曬乾炒各一

兩爲末每薄荷湯服一二錢日二次（錄驗）

風瘙癮疹赤小豆荊芥穗等分爲末雞子清調塗之

風疹用沙蜜一斤糯飯一升麪麴五兩熟水五升同入瓶內封七日成酒尋常以蜜入酒代之亦良

風疹入腹身體強舌乾硬用蔓青子三兩爲末每溫酒服一錢（聖惠）

遊風癮疹以楮葉摻動用鹽泥二兩百合半兩黃丹二錢酢一分唾四分搗和貼之（摘元方）

兩頰赤痒其狀如痱名頭面風以杏仁頻頻揩之內服消風散（證治要訣）

老幼風疹茱萸煎酒拭之良（兵部手集）

風瘙癮疹心下迷悶巴豆五十粒去皮水七升煑二升以帛染拭之隨手愈（千金翼）

皮膚風疹枳實酢浸火炙熨之即消（外臺）

風疹作痒枳殼三兩麩炒爲末每服二錢水一盞煎六分去查溫服仍以汁塗（經驗方）

白疹瘙痒遍身者小枸橘細切麥麩炒黃爲末每服二錢酒浸少時飲酒仍以枸橘煮湯洗患處（急救方）

癮疹風瘡疼痛白殭蠶焙研酒服一錢立瘥（聖惠）

風氣瘙痒及癮疹蜂房炙蟬蛻等分爲末酒服一錢日三服

又方用露蜂房煎汁入芒硝傅之日五次（梅師方）

風瘙癮疹作痒成瘡用蠶沙一升水五斗煮取一斗二升去查洗浴避風聖惠方入苦酒搗泥塗之（外臺）

烟火丹毒從兩股兩脅起赤如火景天草眞珠末各一兩搗如泥塗之乾則易（產乳方下同）

火竈丹毒從兩脚起如火燒五加根葉燒灰五兩取煆鐵家槽中水和塗之（產乳方）

赤遊風腫忽然腫癢不治則殺人用野葡萄根搗如泥塗之卽消（通變要法）

纏腰火丹用寶鈔一張燒化存性研爲細末用米酢調稀雞翎蘸塗患上一日三次卽愈忌食發物（正宗）

風疹瘙癢甚不能忍者赤土研末空心溫酒服一錢（御藥院方）

風瘙癮疹胡燕窠土水和傅之（千金）

卒發風疹酢漿和石灰塗之隨手滅（外臺）

一切風疹水煑芒硝湯拭之（梅師）

風瘙癮疹白朮爲末酒服方寸匕日二服（千金）

遍身風疹痹痛不可忍胷頸臍腹及近陰皆然者亦多痰涎夜不得睡用苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁石器熬成膏和末丸梧子大每服三十丸食後溫水服次日便愈（衍義）

二服（錄驗）

風熱癮疹牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服二錢日

風瘙癮疹身痒不止用蒼耳莖葉子等分爲末每服二錢豆淋酒調下（聖惠）

風瘙癮疹及瘩癗牛膝末酒服方寸匕日三服（千金 下同）

癮疹入腹體腫舌强車前子末服之良

瘡疹不快板藍根一兩甘草一分爲末每服半錢或一錢取雄雞冠血三二點同溫酒少許調下（錢氏方 下同）

斑疹不快釣藤鉤子紫草茸等分爲末每服一字或半錢溫酒服

瘡疹不出蘿蔔子生研末米飲服一二錢良（易簡方）

風疹作癢枳殼三兩麩炒爲末每服二錢水一盞煎

六分去滓溫服仍以汁塗（經驗方）

肥脉癮疹曹姓帛拭之愈（千金方）

癮疹瘙癢白蜜不拘多少好酒調下有效

赤遊風疹芭蕉根搗爛塗之（肘後方）

鍼灸

外科正宗曰小兒赤遊丹毒紅赤焮腫遊走不定須砭之用鈹針鋒尖向患上以重筯在針上面擊之密砭去血多者爲妙血紅者輕紫者重黑者死砭畢溫湯洗淨用乾精猪肉縫大片貼砭處一時許方用如意金黃散水芭蕉根搗汁調敷

醫案

丹溪心法曰一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹熛用諸般敷貼丹熛藥及用刀於箇箇丹頭出血丹皆不退後以半陳生薑加補劑治嘔不效遂純用參半兩歸朮各錢半濃煎一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神氣始復

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以炒芩炒連歸芎芍地桔草黍黏紫葳各一錢防風黃

芪各半錢凡五六貼而安

薛己醫按曰一婦人患斑作痒脉浮以消風散四劑而愈

一婦人患斑作痒脉浮數以人參敗毒散二劑少愈更以消風散四劑而安

一男子患斑赤紫焮痛發熱喜冷脉沉實以防風通聖散一劑頓退以荆防敗毒散加芩連四劑而愈

一婦人患斑痒痛大便祕脉沉實以四物湯加芩連大黃槐花治之而愈

一老人患疹色微赤作痒發熱以人參敗毒散二劑少愈以補中益氣湯加黃芩山梔而愈

一小兒患疹作痛發熱煩渴欲服清凉飲下之診其脉不實舉指不數此邪在經絡也不可下遂用解毒防風湯二劑而愈此證小兒多患之須詳審在表在裏及邪之微甚而治之

一男子每至秋冬遍身發紅點如斑作痒此寒氣收斂腠理陽氣不能發越怫鬱內作也宜以人參敗毒散解散表邪再以補中益氣湯益氣實表彼以爲熱

毒自用凉藥愈盛復請以補中益氣湯加茯苓半夏羌活四劑更以補中益氣湯數劑而愈

一男子秋間發疙瘩此元氣虛而外邪所侵也先用九味羌活湯二劑又用補中益氣加羌防而愈後不愼起居盜汗晡熱口乾唾痰體倦嬾言用補中益氣湯加減八味丸而愈

一婦人患赤白遊風晡熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛而筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱而歿

一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭運日晡益甚用加味逍遙散而愈

一婦人患前證數用風藥煎湯泡洗以致腹脹而歿

一女子赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡湯加生地黃連翹牡丹皮而愈

一男子患丹毒焮痛便祕脉數而實服防風通聖散不應令砭患處去惡血仍用前藥卽愈

一小兒腿患丹如霞遊走不定先以麻油塗患處砭出惡血毒卽散更以金銀花散一劑而安

一小兒患之外勢雖輕內則大便不利此患在臟也服大連翹飲敷神功散而瘥

一小兒遍身皆赤砭之投解毒藥而即愈

一小兒遍身赤赤不從砭治以致毒氣入腹遂不救此證乃惡毒熱血蘊畜於命門遇相火而合起也如霞片者須砭去惡血爲善如腫起赤色遊走不定者宜先以生麻油塗患處砭之以洩其毒大法無如砭之爲善

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十卷目錄

醫部彙考三百七十

外科癘瘍癜風門一

黃帝素問（風論　脈要精微論）
孫思邈千金方（惡疾大風）
劉完素六書（總論）
張潔古活法機要（癘風）
朱震亨心法（論　證治）

李梴醫學入門（癘風治法　赤白癜治法）

薛己醫按（總論　本證治法　兼證治法　變證治法　類證治法）

王肯堂證治準繩（烏白癩　痞𤺄　紫癜風　白癜風　白駮　癧瘍風）

喻昌醫門法律（論癘風）

張介賓景岳全書（論證　禁忌）

陳士鐸石室祕錄（治法）

方

樺皮散　二聖散　補氣瀉榮湯　醉仙

一散　通天再造散　加味逍遙散　寶鑑

換肌散　升麻湯　加味清胃散　透經解攣

湯　秦艽地黃湯　易老祛風丸　羌活當歸

散　羌活白芷散　海藏愈風丹　苦參消石

酒　大白膏　大黑膏　浸酒法　雷丸散

雷丸散　白花蛇丸　行藥　防風天麻丸

歛墨丸

藝術典第三百九十卷

醫部彙考三百七十

癘瘍癜風門一（白駮瘖癗汗斑附）

黃帝素問

風論

風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤䐜而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也

註　衛氣所行之道不利故使肌肉憤然高起而有

癰瘍衞氣凝滯於項背之間不能循行於周身之膚腠故其肌肉麻痹而不知痛痒也癘者有榮氣熱胕其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰

註　風傷榮氣搏而爲熱熱出於胕肉之間則肌脉外內之氣不清矣風邪與榮衞搏於皮膚之外則榮衞之氣不清故鼻柱陷壞面色敗惡而皮膚潰癩也

風寒客於脉而不去名曰癘風或名曰寒熱

註　風寒之邪客於脉中而不去則榮氣受傷亦名曰癘風榮病則寒熱少氣故或名曰寒熱

脉要精微論

脉風成爲癘

註　癘者麻癜惡厲之疾風乃陽熱之邪血乃陰濕之液濕熱生蟲是以風入於脉久則變爲蟲癩之厲瘍

唐孫思邈千金方

惡疾大風

惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不煖有尋常患熱不能暫凉有身體枯槁者有津汗常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如麩手下作瘡者（一作卒不作瘡）有瘡痍荼毒重疊而生晝夜苦痛不已者有直置頑鈍不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此候雖種類狀貌不同而難療易療皆在前人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫教直希望藥力不能求己故難療易療屬在前人不關醫藥余嘗手療六百餘人瘥者十分有一莫不一一親自撫養所以深諳姑與共語覺難與語不受入卽不須與療必定終有觸損病既不瘥乃勞而無功也又神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷潁陽之風所以非止瘥病乃因禍而取福也故余所睹病者其中頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未

肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因玆亦可自致神仙余嘗問諸病人皆云自作不仁之行久久幷為極猥之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師教命餐進藥餌何有不除余以貞觀年中將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之惟須求之於己不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痹羞見妻子不告之令知其後病成狀貌分明乃云犯藥卒患此皆自誤然斯疾雖大癘之於微亦可卽瘥此疾一得遠者不

過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死甚可悲悼一遇斯疾卽須斷鹽常進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除不交俗事絕乎慶弔幽隱巖谷周年乃瘥瘥後終身慎房事犯之還發玆疾有吉凶二義得之修善則吉若還同俗類必是凶矣

金劉完素六書

總論

內經曰癘風者有榮氣熱附其氣不清故使鼻柱壞

而色敗皮膚瘍潰故先風寒客於脈而不去名曰癘風又曰脈風成爲癘俗云癩病也故治法云大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉病故汗出百日王注曰泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百日泄榮氣之怫熱凡三百日鬚眉生而止鍼怫熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也先樺皮散從少至多服五七日後灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈再灸後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年鍼灸藥止述類象形此治肺風之法也然非止肺臟有之俗云鼻屬肺而病發於肺端而言之不然如此者既鼻準腫赤脹但爲瘡之類乃謂血隨氣化既氣不施化則血聚矣血既聚使肉腐爛而生蟲也謂厥陰主生五蟲厥陰爲風木故木生五蟲蓋三焦相火熱甚而制金金衰故木來尅侮經曰侮勝也宜瀉火熱利氣之劑蟲自不生也法云流水不腐戶樞不蠹此之謂也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之煎局方內升麻湯下錢氏瀉青丸余合隨經言之故病風者陽氣先受上也

元張潔古活法機要

癘風

癘風者榮氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去故名癘風又曰脉風俗曰癩治法刺肌肉百日汗出百日凡二百日鬚眉生而止先樺皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年病愈

朱震亨心法

論證治

大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳蟲於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘩與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受

者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此夫或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脫體若不能絕味絕色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三年後皆再發孫眞人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫眞人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈

此疾非止肺臟有之以其病發於鼻從俗呼爲肺風也鼻準腫赤脹大而爲瘡乃血隨氣化也氣既不施則血爲之聚血既聚則使肉爛而生蟲也生蟲者厥陰主之以藥緩疎泄之煎局方升麻湯下瀉青丸餘病各隨經治之

明李梴醫學入門

癘風治法

癩即內經癘風受天地間肅殺風氣酷烈暴悍最爲可畏一因風毒或汗出解衣入水或酒後當風一一因

濕毒或坐臥濕地或冒雨露三因傳染然未必皆由外也內傷飲食熱毒過甚大寒大熱房勞穢污以致火動血熱更加外感風寒冷濕而發初起身上虛癢或起白屑紫雲如癜風然或發紫泡疙瘩流膿上先見者氣分受病上體必多下先見者血分受病下體必多上下俱見者氣血俱病從上而下者爲順風從下而上者爲逆風但從上從下以漸來者可治頓發者難愈治失其法以致皮死麻木不仁脉死血潰成膿肉死割切不痛筋死手足緩縱骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲啞甚則蝕傷眼目腐爛玉莖攣拳肢體病至於此天刑難解

胃與大腸無物不受脾主肌肉肺主皮毛然瘡痂雖見於皮肉而熱毒必歸於腸胃故法必先治陽明初起宜防風通聖散在上用麻黃以去外毒在下用硝黃以去內毒上下俱見者用生料防風通聖散以解表攻裏三五日後卽服醉仙散以吐惡涎服後又服防風通聖散去硝黃麻黃多服久服待胃氣稍定用再造散以下其蟲又有宜先下蟲而後吐涎者吐下

後仍以防風通聖散量加參芪熟地以固氣血或脾胃弱者白朮當倍用

蟲因火盛氣血沸騰充滿經絡外瘡延蔓內蟲攻注蝕肝眉脫蝕心足底穿蝕脾聲啞蝕肺鼻崩蝕腎耳鳴如雷宜先服瀉青丸以瀉肝火次隨證救治虛癢者四物湯加酒芩調浮萍末痒甚加荊芥蟬退搔痒皮皺白屑者白花蛇丸眉髮落者三蛇丹或柏葉煎眉脫鼻崩者換肌散補氣瀉榮湯蝕眼者蘆薈丸肢節廢者鐲皮散通用凌霄花散胡麻散加味苦參丸大楓丸換骨丸大麻風丸紫雲風丸活神丹腎氣丸四聖不老丹八物湯外治摩風膏浴癩方髮落不生者先用生薑擦三次後用半夏爲末麻油調搽諸方選用之

赤白癜治法

面皮頸項身體皮肉變色赤者謂之赤癜白者謂之白癜乃肝風搏於皮膚血氣不和所生

赤屬血血熱者九味羌活湯加金銀花連翹或四物湯加柴胡山梔牡丹皮虛者逍遙散加山梔或腎氣

丸

白屬氣氣熱者敗毒散或小柴胡湯加防風連翹虛者補中益氣湯加羌活防風如果係風毒者胡麻散單蒼耳丸單浮萍丸此疾久者只宜滋養氣血則火自息風自定痒自止若用祛風辛苦之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛變爲難治

身上虛痒血不榮於腠理故也宜四物湯加黃芩入紫浮萍末調服或單凌霄花爲末酒調服徧身及頭上風屑癢者單苦參丸或薄荷蟬退等分爲末酒調服

薛己醫按

總論

內經云風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉膹䐜而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也有榮衛熱胕其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰癘風其治法當刺肌肉骨髓以泄榮衛之怫熱靈樞經以銳針刺腫上出惡血近代先哲云感

天地肅殺惡氣所致其上體先見或多者毒在上也下體先見或多者毒在下也蓋氣受邪則上多血受邪則下多氣血俱受則上下齊見若眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝脚底先痛或穿者毒在腎徧身如癬者毒在脾目先損者毒在心此五臟受證之重也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三曰血死爛潰四曰筋死指脫五曰骨死鼻柱壞此五臟受傷之不可治也若聲啞目盲尤爲難治大抵此證多由勞傷氣血腠理不密或醉後房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱相火血隨火化而致故淮揚嶺南閩越間多患之治當辨本證兼證變證類證陰陽虛實而治焉若妄投燥熱之類膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈傷相火愈旺反致敗證矣

本證治法

一癘瘍所患非止一臟然其血氣無有弗傷兼證無有弗雜况積歲而發見於外須分經絡之上下病勢之虛實不可概施攻毒之藥當先助胃壯氣使根本

堅固而後治其瘡可也經云眞氣奪則虛邪氣盛則實凡云病屬有餘當認爲不足

一癘瘍當知有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺有攻補之不一蓋兼證當審輕重變證當察先後類證當詳眞僞而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治之蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形氣則虛也

一癘瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針蓋以針血不如發汗之周遍也然發汗卽出血出血卽發汗二者一律若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗取委中出血則效若惡毒蘊結於臟非蕩滌其內則不能痊若毒在外者非砭刺遍身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭內泄其毒決不能退若上體患多宜用醉仙散取其內畜惡血於齒縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血下體患多宜用再造散令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一二日更刺之以血赤爲度如有寒熱頭疼等證當大補血氣

一癘瘍服輕粉之劑若腹疼去後兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫疼穢水時流作渴發熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜用小柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便祕結此爲熱毒内淫宜用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃湯若穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲冷此爲虛熱也宜用七味白朮散

一癘瘍手足或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血當用加味逍遙散加生地黃及換肌散兼服

一癘瘍生蟲者五方風邪翕合相火制金木盛所化内食五臟而證見於外也宜用升麻湯送瀉青丸或樺皮散以清肺肝之邪外灸承漿以疏陽明任脈則風熱息而蟲不生矣肝經虛熱者佐以加味逍遙散六味地黃丸

一癘瘍久而不愈有不慎起居飲食内火妄動者有臟腑傷損氣血疲之者有用攻伐之藥氣血愈虧者有不分兼變相雜用藥失宜者有病人諱疾忌醫者

一癘瘍愈而復發有不戒厚味内熱傷脾者有不戒

房勞火動傷腎者有不戒七情血氣傷損者有餘毒未盡兼證干動者有氣虛六淫外乘者古人云此證百無一生正謂此耳

兼證治法

一頭目眩運若右寸關脉浮而無力脾肺氣虛也補中益氣湯若左關尺脉數而無力肝腎氣虛也用六味地黃丸若右寸尺脉浮大微細者陽氣虛也用八味地黃丸血虛者四物湯加參苓白朮氣虛者四君子湯加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清肝散肝經虛者六味地黃丸脾氣虛弱者補中益氣湯脾氣有痰者半夏白朮天麻湯砭血過多者芎歸湯發熱惡寒者聖愈湯大凡發熱則眞氣傷矣不可用苦寒藥恐復傷脾胃也

一口喎目斜若手足牽搐或眉稜痒痛屬肝經血虛風熱用加味逍遙散六味地黃丸以生肝血滋腎水若寒熱往來或耳聾脅痛屬肝火熾盛先用小柴胡合四物湯以清肝火生肝血若筋攣骨痛或不能動履用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源若因服燥

藥而致者用四物湯加生甘草金銀花以解熱毒益陰血凡此俱屬肝經血燥所致須用六味地黃丸補中益氣湯爲主若因怒氣房勞而甚者用六味地黃丸十全大補湯爲主若因勞傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯爲主

一夏秋濕熱行令若飲食不甘頭目眩運遍身酸軟或兩腿痳木口渴自汗氣促身熱小便黃數大便稀溏濕熱傷元氣也用清燥湯如夏令用清暑益氣湯若自汗盜汗氣高而喘身熱而煩其脉大此元氣內傷也用補中益氣湯若嘔吐少食肚腹痞悶大便不實脾胃受傷也用六君子湯若胷腹不利飲食少思吐痰不止脾胃虛痞也用四君子湯若形氣倦怠肢體痳木飲食少思熱傷元氣也用人參益氣湯

一熱渴便濁若夜安晝熱者熱在氣分也用清心蓮子飲晝安夜熱者熱在血分也四物二連湯俱佐以六味地黃丸若寒熱往來者肝經血虛也用加味逍遙散六味地黃丸

一小便不利若因服燥藥而致者用四物湯加炒黑

黃蘗知母生甘草以滋陰血若頻數而色黃者用四物湯加參朮麥門五味子以生氣血若短而色黃者用補中益氣湯加山藥麥門五味以滋化源經云無陰則陽無以生無陽則陰無以化

一大便不通若血虛內熱而澀滯者用四物湯加麥門五味子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者四物湯加連翹生甘草以生血清熱若服尅伐之藥而致者用四物湯加芎歸以助氣生血若作渴飲冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以清胃火若作渴飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯以補氣生津若內熱作渴面赤飲湯者用四物湯送潤腸丸以凉血潤燥若腸胃滿脹燥在直腸而不通者用猪膽汁導之腸胃氣虛血涸而不通者用十全大補湯若肝膽邪盛脾土受侮而不能輸化者用小柴胡湯加山梔郁李仁枳殼治之

一怔忡無寐或兼衄血便血若內熱晡熱作渴飲湯肢體倦怠此脾血虛而火動也用四君子加芎歸若思慮傷脾動火而致用歸脾湯加山梔若發熱晡熱

用八珍湯加酸棗仁茯神遠志若因心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安不必專於清熱治痰

一發熱惡寒若肢體倦怠煩躁作渴氣高而喘頭痛自汗者此內傷氣血也用補中益氣湯加五味麥門倦怠食少大便不調小便頻數洒淅惡寒者此脾肺氣虛也用升陽益胃湯煩躁作渴體倦少食或食而不化者此脾氣虛熱也用六君子湯

一發熱在午前脉數而有力者氣分熱也用清心蓮子飲脉數而無力者陽氣虛也用補中益氣湯午後脉數而有力者血分熱也用四物湯加牡丹皮脉數而無力者陰血虛也用四物湯加參朮熱從兩脅起者肝虛也用四物湯加參朮黃芪從臍下起者腎虛也用四物湯加參朮黃蘗知母五味麥門肉桂或六味丸其熱晝見夜伏夜見晝止或去來無定或時起作無定處或從脚起者此無根虛火也須用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若形體惡寒喜熱飲食者陽氣虛寒也

急用八味丸

一口乾若惡冷飲食者胃氣虛而不能生津液也用七味白朮散若喜冷飲食者胃火盛而消爍津液也須用竹葉石膏湯夜間發熱口渴者腎水弱而不能上潤也當用六味地黃丸若因汗下之後而有前患者胃氣虛也宜用八珍湯主之

一作渴若煩躁飲冷者屬上焦實熱用涼膈散兼大便祕結者屬下焦實熱用清涼飲若用尅伐之藥而渴者氣血虛也急用八珍湯六味丸

一耳聾耳鳴若左寸關脈弦數者心肝二經虛熱也用四物湯加山梔柴胡生陰血右寸關脈浮大者脾肺二經虛熱也用補中益氣湯加山梔桔梗培陽氣若因怒便作用小柴胡湯加山梔芎歸清肝涼血若午前甚用小柴胡湯加參芪歸朮補氣清肝午後甚用四物湯加酒炒黑黃蘗知母五味補陰降火如兩足心熱屬腎虛用六味丸以壯水之主兩足冷屬陽虛用八味丸以益火之源

一項强口噤腰背反張者氣血虛而發痙也仲景云

足太陽病發汗太多則痙風病下之則痙復發汗則加拘急瘡家發汗則痙蓋風能散氣故有汗而不惡寒曰柔痙寒能澀血故無汗而惡寒曰剛痙皆因內虛復汗亡津血筋無所養而然悉屬虛象非風證也當大補氣血爲主故產婦潰瘍勞傷氣血濕熱相火誤服尅伐之劑者多患之其義可見

一婦女經閉若因鬱火傷脾以歸脾湯加山梔丹皮氣血俱虛以八珍湯加山梔丹皮若因服燥藥傷血以四物湯加生甘草若經候過期而來者氣血虛也八珍湯倍用參朮先期而來者血虛熱也四物湯倍加參朮牡丹皮將來而作痛者氣虛血滯也四物湯加茯苓白朮香附色紫而成塊者血熱也四物湯加山梔丹皮作痛而色淡者血氣虛也用八珍湯其血崩之證肝火不能藏血者用加味逍遙散脾虛不能統血者用補中益氣湯凡此皆六淫七情虧損元氣所致當審其因而調補胃氣爲善

變證治法

一身起疙瘩搔破膿水淋漓若寒熱往來者肝經氣

血虛而有火也用八珍散加丹皮柴胡寒熱內熱者血氣弱而虛熱也用八珍散倍用參朮若惡寒形寒者陽氣虛寒也用十全大補湯若肌膚搔之如帛隔者氣血不能外榮也用人參養榮湯若面部搔之麻痒者氣血不能上榮也用補中益氣湯若痿軟筋攣者血氣不能滋養也用補中益氣湯佐以六味地黃丸

一口舌生瘡或咽喉作疼若飲食喜冷大便祕結者實熱也用四順清凉飲肌熱惡熱煩渴引飲者血虛也用當歸補血湯飲食惡寒大便不實者虛熱也用十全大補湯熱從下或從足起者腎虛熱也用加減八味丸若飲食難化四肢逆冷者命門火衰也用八味地黃丸

一牙齒作痛或牙齦潰爛若喜寒惡熱屬胃火加味清胃散爲主惡寒喜熱屬胃虛補中益氣湯爲主

一自汗盜汗蓋自汗屬氣虛盜汗屬血虛自汗用補中益氣湯送六味地黃丸盜汗用當歸六黃湯內芩連黃蘗炒黑用送六味地黃丸若因勞心而致以歸

脾湯倍用茯神酸棗仁

一唾痰或作喘若右寸脉浮緩者肺氣虛也用六君子湯加桔梗右寸脉洪滑者肺經有熱也用瀉白散右寸關脉浮緩遲弱者脾肺氣虛也用六君子湯加桔梗黃芪右寸關脉洪滑遲緩者脾熱傳肺也用瀉白瀉黃二散右尺脉微弱者命門火衰而脾肺虛也用人參理中丸如不應用八味地黃丸右寸脉洪數者心火尅肺金也用人參平肺散如不應用六味地黃丸右寸關脉洪弦數者心肝二經有熱也用柴胡清肝散如不應佐以牛黃清心丸清其風熱仍用六味地黃丸以鎮陽光左尺脉數而無力者腎虛而水泛上也用六味地黃丸加五味子以滋陰如脉微細或手足冷或兼喘促急用八味地黃丸以補陽

一舌赤裂或生芒刺兼作渴引飲或小便頻數不時發熱或熱無定處或足心熱起者乃腎水乾涸心火亢盛用加減八味丸主之佐以補中益氣湯若誤用寒涼之劑必變虛寒而歿

一口舌生瘡作渴不止不時發熱或晝熱夜止或夜

熱晝靜小便頻數其熱或從足心或從兩脅或從小腹中起外熱而無定處者此足三陰虧損之證也用加減八味丸爲主佐以十全大補湯若誤用寒凉治火之劑復傷脾胃胷腹虛痞飲食少思或大便不實小便不利胷腹膨脹肢體患腫或手足俱冷者此足三陰虧損之虛寒證也急用加減金匱腎氣丸亦有復生者

一肚腹脹腫若朝寬暮急屬陰虛暮寬朝急屬陽虛朝暮皆急陰陽俱虛也陽虛者朝用六君子湯夕用加減腎氣丸陰虛者朝用四物湯加參术夕用加減腎氣丸眞陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉口吸氣冷者此眞陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不救也

一發熱惡寒若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入陽中則惡寒也用補中益氣湯尺部脉微名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱也用六味地黃丸若暑熱令而肢體倦怠此濕熱所乘屬形氣虛而病氣實也

當專補陽氣用補中益氣湯若發熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱屬形病俱虛也當專補陰血用當歸補血湯

一發熱作渴若右寸關脈浮大而無力者脾肺之氣虛也用補中益氣湯數而有力者脾肺之氣熱也用竹葉石膏湯寸脈微數而無力者肺氣虛熱也用竹葉黃芪湯尺脈微細或微數而無力者命門火衰也用八味地黃丸左寸關脈數而有力者心肝之氣熱也用柴胡梔子散數而無力者心肝之氣虛也用六味地黃丸尺脈數而無力者腎經虛火也用加減八味丸大凡瘡愈後口渴或先渴而患瘡或口舌生瘡或咽喉腫痛或脣裂舌黃目赤痰涎上湧者皆敗證也非此丸不能救

一眼目昏弱或內障黑花屬血虛勞神用滋陰腎氣丸若視物無力或見非常之狀屬陰精虛弱用滋陰地黃丸若視物無力或視物皆大屬陽盛陰虛用六味地黃丸若目緊體倦或肌膚麻木屬脾肺氣虛用神效黃芪湯若至夜目暗燈下亦暗屬陽虛下陷用

決明夜靈散若眼暗體倦內障耳鳴屬脾胃氣虛用益智聰明湯蓋五臟六腑之精氣皆禀受於脾土上貫於目脾爲諸陰之首目爲陰血之宗當補脾土爲善

一衄血吐血若左寸關脈數而無力血虛也四物加參术浮而無力氣虛也補中益氣湯尺脈數或無力腎虛也六味地黃丸右寸關脈數而有力者肺胃熱也犀角地黃湯數而無力者肺胃虛熱也先用濟生犀角地黃湯後用四物湯加參苓白术尺脈數而無力陰虛也用六味地黃丸若面黃目澀眵多手麻者脾肺虛也用黃芪芍藥湯

一飲食少思若因胃氣虛而不能食用四君子湯若因脾氣虛而不能化用六君子湯大便不實或嘔吐者脾氣虛寒也用六君子湯加乾薑木香若作嘔口渴或惡冷飲食者胃氣虛熱也用五味異功散喜冷飲食胃氣實熱也用瀉黃散

一帶下因經行產後外邪入胞傳於五臟而致之其色青者屬於肝用加味逍遙散加防風濕熱壅滯小

便赤濇用前散加炒黑龍膽草肝血不足或燥熱風熱用六味丸逍遙散色赤者屬於心用小柴胡湯加黃連山梔當歸思慮過傷者用妙香散六味丸色白者屬於肺用六味丸補中益氣湯加山梔色黃者屬於脾用六味丸六君子湯加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬於腎用六味丸氣血俱虛用八珍湯陽氣下陷用補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃蘗氣虛痰飲四七湯送六味丸若病久元氣下陷或尅伐所傷但壯脾胃升陽氣爲善若拘於人之肥瘦而用燥濕瀉火之藥反傷脾胃爲患不淺

一二便下血若右關脉浮數氣虛而熱也用四君子加升麻當歸尺脉浮大或微弱元氣下陷也用補中益氣湯左關脉洪數血虛也用四物湯加炒山梔升麻秦艽脉遲緩或浮大氣虛也用四君子湯加升麻炮薑尺脉洪數或無力者腎虛也用六味地黃丸若因房勞傷損精氣陰虛火動而小便下血諸血病者不問脉證百端但用前丸料煎服爲善

一泄瀉在五更或侵晨乃脾腎虛五更服四神丸日

間服白朮散或不應或愈而復作急用八味丸補命門火以生脾土其瀉自止

一大便不通屬脾肺虧損大腸津液乾涸或血虛火鑠不可計其日期飲食數多必待腹滿脹自欲去而不能乃熱在直腸間也用猪膽汁潤之若妄服苦寒辛散之劑元氣愈傷或通而不止致成中痞之證若氣血虛者用八珍湯加麻子仁腸胃虛者用補中益氣湯加麻子仁腎液不能滋潤用六味地黃丸加麻子仁若厚味積壅小便淋祕者肝腎虛也用六味地黃丸以滋腎水用補中益氣湯以補脾胃若發熱晡熱用六君子湯加味逍遙散養陰血清風熱若兼筋骨痛先用透經解攣湯秦艽地黃丸後用八珍散加牡丹皮柴胡主之若誤服風劑而傷陰血者用易老祛風丸若在兩股或陰囊或兩足必用四生散地黃丸爲善若誤服草烏川烏之類或敷巴豆砒石等味肌肉腐潰反成癘證治者審之

一面赤瘙痒或眉毛脫落屬肺經風熱用人參消風散樺皮散氣虛用補中益氣湯加天麻殭蠶血虛用

加味逍遙散加鈎藤鈎面發紫泡或成塊或眉毛脫落屬肝經風熱先用小柴胡湯加山梔丹皮鈎藤鈎後用加味逍遙散凡證屬肝經血燥生風但宜滋腎水生肝血則火自息風自定痒自止

一遍身疙瘩或癮疹瘙痒此風熱傷血用羌活當歸散氣虛者佐以補中益氣湯加山梔鈎藤鈎血虛者佐以加味逍遙散加鈎藤鈎若手足皴裂不問黯白或在手足腿腕搔起白皮此風熱而祕濇用清胃散加芍藥蓋腎開竅於二陰精血不足則大便祕塞而不通矣須用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源

一小便不利若不渴而不利者熱在下焦血分也用滋腎丸渴而不利者熱在上焦氣分也用清肺散腎經陰虛而不利者用六味地黃丸熱結膀胱而不利者用五淋散元氣虛而不能輸化者用補中益氣湯脾肺之氣燥而不能化生者用黃芩清肺飲若轉筋便閉氣喘不問男女孕婦急用八味丸緩則不救

一白濁足三陰經主之屬厚味濕熱所致者用加味清胃散肝腎虛熱者用六味地黃丸爲主佐以逍遙

散脾腎虛熱者用六味丸佐以六君子湯肝脾鬱滯者六味丸佐以歸脾湯脾肺氣虛者六味丸佐以補中益氣湯濕痰下注者益氣湯佐以六味丸

類證治法

類證者與癘形狀相似而所因不同也

一兩臁如癬搔痒久則膿水淋漓或搔起白皮者名腎臟風也用四生散以祛風邪用六味地黃丸以補腎水若頭目不淸內熱口乾體倦痰熱血燥秋間益甚故俗名雁來風宜用羌活白芷散加味逍遙散氣虛者佐以補中益氣湯加皂角刺鈞藤鉤血虛者佐以八物湯加柴胡牡丹皮或加味逍遙散兼服

一肢體或腿臂腕間患瘖癗而遊走不定者赤曰赤遊風白曰白遊風爲血虛陰火內動外邪所搏之證白用人參消風散赤用加味逍遙散氣血俱虛用八珍湯晡熱內熱用加味逍遙散六味地黃丸

一遍身或頭面起疙瘩或如霞片或破而膿水淋漓或痒痛寒熱乃肝火血虛也用加味逍遙散若口苦脅痛小便淋瀝肝火血熱也用柴胡淸肝散若婦女

夜間讝語發熱熱入血室也用小柴胡湯加山梔生地黃血虛者四物合小柴胡湯病退却用逍遙散以健脾胃生陰血此證多因怒氣而發者治當審之

一婦人肢體癮疹疙瘩搔破成瘡膿水淋漓熱渴眩運日晡益甚者用四物湯加柴胡山梔丹皮清肝火補肝血若煩熱體倦頭目不清用八珍散加丹皮山梔補脾氣生陰血若自汗盜汗月水不調肚腹作痛用八珍湯六味丸若食少體倦心忪盜汗經閉寒熱用八珍湯佐以加味逍遙散若病久元氣怯弱用十全大補湯佐以歸脾湯

一女子十三四或十六七而天癸未至或婦人月經不調發赤斑痒痛此屬肝火血熱用小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮防風

一生蟲者乃相火制金不能平木而化耳非風邪所生也但滋腎水生肝血或佐以灸承漿之類說見本證

一敷砒霜患處作痛或腐潰用濕泥頻塗換之若毒入腹胷膈苦楚或作吐瀉飲冷米醋一二盃即止多

亦無妨生菉豆末芝麻油俱可

一敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉用防己煎湯解之

一服辛熱藥而眉髮脫落者乃肝經血傷而火動非風也用四物湯六味丸以滋肝血生腎水

一服川烏草烏等藥悶亂流涎或昏憒嘔吐或出血吐血用大豆遠志防風甘草任用一味煎湯解之大凡服風藥過多皆宜用之未應急用甘草生薑汁

一敷貼巴豆之藥患處作痛肌肉潰爛以生黃連爲末水調敷之若毒入內吐瀉等證更以水調服一二錢大小豆菖蒲汁俱可

一敷貼藜蘆毒入內煎葱湯解之

一服祛風剋伐之藥嘔吐少食胸膈不利或形氣倦怠等證用六君子湯以補陽氣若煩躁作渴飲食不思或晡熱內熱面赤發熱用四物湯加參朮以生陰血餘從各門治之

王肯堂證治準繩

烏白癩

夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑

或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癮疹赤黑手足頑麻針刺不覺痛脚下痛頑不得踏地凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痒而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之證大同小異故不別錄也

夫白癩病者其語聲嘶嗄目視不明四肢煩疼身體大熱心中懊憹手脚緩縱背膂拘急內如針刺或生癮疹而起往往正白在皮肉裏鼻有息肉目生白珠當於瞳子視無所見名白癩也

痦癗

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣并則生痦癗狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡也

紫癜風

夫紫癜風者由皮膚生紫點搔之皮起而不痒痛者是也此皆風濕邪氣客於腠理與氣血相搏致榮衞否澀風冷在於肌肉之間故令色紫也

白癜風

夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交并邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散令皮膚皴起生白斑故名白癜風也

白駮

病源論云風白駮者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駮此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也

夫白駮者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不發痒不能早療卽便浸淫也

癧瘍風

夫風邪積熱居於肺腑久而不散流溢皮膚令人頸邊胷前腋下自然斑駮點點相連其色微白而圓亦有紫色者亦無痛痒謂之癧瘍風也凡此皆風熱伏留肌腠之間氣血不和乃生此疾也

醫門法律 臣喻昌著

論癘風

凡治癘風之法以清榮衛爲主其汗宜頻發血宜頻刺皆清榮衛之捷法也生蟲由於肺熱其清肅之令不行故由皮毛漸及腠理腸胃莫不有蟲清其金則蟲不驅自熄試觀金風一動旱魃絕蹤其理明矣然清肺亦必先清榮衛蓋榮衛之氣腐而不清傳入於肺先害其清肅之令故也苦藥雖能瀉肝殺蟲亦能傷胃不可久服胃者榮衛從出之源也久服苦寒榮衛轉衰而腐敗壅鬱不可勝言矣所以苦參丸之類榮衛素弱穀食不充之人不宜服也大楓子油最能殺蟲驅風然復過於辛熱風未除而目先壞者多矣其硫黃酒服之必致腦裂之禍又醉僊散入輕粉和末日進三服取其人昏昏若醉毒涎從齒縫中出癘未瘥而齒先落矣蓋除癘之藥服之近而少癘必不除服之久且多癘雖除藥之貽害更大惟易老驅風丸東坡四神丹二方可以久服取效取爲法焉

要知脈風成則爲癘然人之榮血正行於十二經脈之中者也用平善之藥生血清熱爲主驅風殺蟲爲之輔更行汗之刺之之法無不愈者且非極意懲創之

人不可與治以戒色慾禁卩腹二者非烈漢不能也者婆惡病論曰疾風有四百四種總而言之不出五種卽是五風所攝云何名五風一曰黃風二曰青風三曰白風四曰赤風五曰黑風其風合五臟故曰五風五風生五蟲黃風生黃蟲青風生青蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五臟若食人脾語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人心遍身生瘡若食人肺鼻柱崩倒鼻中生息肉若食人腎耳鳴啾啾或如車行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痹若食人筋肢節墮落五風合五臟蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於人身名曰疾風疾風者是癘病之根本也病之初起或如針錐所刺名曰刺風或如蟲走名曰遊風遍身掣動名曰瞤風不覺痛痒名曰頑風肉起如桃李小棗核從頭而起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓赤白青烏斑駮名曰癘風或徧體生瘡或如疥癬或如魚鱗或如榆莢或如錢孔或痛或痒黃汁流出肢節壞爛悉爲膿血或不痒不痛或起或滅青黃赤白黑變易不定病起之

由皆因冷熱交通流入五臟通徹骨髓用力過度飲食相違房室不節虛勞動極汗流徧體因茲積熱徹五臟飲食雜穢蟲生至多食人五臟骨髓皮肉筋節久久敗壞名曰癘風是故論曰若欲療之先服阿魏雷丸散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後與藥療千萬無有不差人得此疾速宜棄家室財物入山靜養療治無有不差

景岳全書 臣張介賓著

論證

癘風卽大風也又謂之癩風俗又名爲大痲風此病雖名爲風而實非外感之風也實以天地間陰厲濁惡之邪或受風木之化而風熱化蟲或受濕毒於皮毛而後及營衞或犯不潔或因傳染皆得生蟲蓋蟲者厥陰主之厥陰爲風木主生五蟲也蟲之生也初不爲意而漸久漸多遂致不可解救誠最惡最危最醜證也又千金云自作不仁極惡之業也所以最爲難治觀孫眞人云嘗治數百人終無一人免於死者蓋無一人能守禁忌故耳惟一婦人病愈後又服加

減四物湯百餘劑半年之上方得經行十分全愈又丹溪治五人亦惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也外三四人者越二三年皆復作而死由此觀之可見此證非得出奇祕方鮮能取效故余逢此證不敢强以爲知而妄施治療亦不敢强言治法以惑後人至若古人論治之法亦甚詳悉用之得宜雖病根未必可拔而延保餘年夭枉亦自可免由是徧求諸說則惟薛立齋癘瘍機要論列已全

癘瘍之有兼證變證凡如表裏臟腑諸病無不有之其各治法已悉各門但有所値卽宜隨證參用之左右逢源無弗善也重錄贅繁茲不贅及

禁忌

患斯疾者多由嗜慾不謹所致治斯疾者速當斷戒葷腥鹽醬一切厚味只宜清心寡慾絶色忘慮幽隱林泉屛棄世務早早救療庶幾可活稍不守禁每愈而復作及致危劇莫能再救總以不守禁忌也

石室祕錄　臣陳士鐸著

治法

瘴癘者乃兩粵之氣鬱蒸而變之者也其氣皆熱而非寒其證皆頭痛而腹滿土人服檳榔無碍者辛以散之也蓋火氣得寒反抑鬱而不伸檳榔氣辛同氣易入其味却散故適與病相宜然止可救一時之急終不可恃之爲長城也今立一方可長治瘴癘之侵人參半夏檳榔各一錢白朮五錢茯苓麥冬各三錢陳皮甘草枳殼柴胡各五分五味子五粒水煎服此方之妙全非治瘴癘之品而服之自消蓋健脾則氣旺氣旺則瘴癘不能相侵即既感者方中亦有去瘴癘之藥豈有不奏功立應者乎此瘴癘治法又宜知之也

或人有感癘而成大麻風者又不可如是治法蓋大麻風純是熱毒之氣裹於皮膚之間濕氣又藏遏於肌骨之內所以外證皮紅生點鬚眉盡落徧體腐爛臭氣既不可聞人又安肯近而與治余心痛之乃立一奇方用元參蒼朮熟地蒼耳子薏仁茯苓各四兩名爲四六湯各爲末蜜爲丸每日吞用一兩二料必然全愈蓋此方之妙能補腎健脾而加入散風去濕

正補則邪自退不必治大風而大風自治矣急宜先刻一張廣行施捨功德又何可量哉止忌房事而已

又方用檳榔一錢柴胡八分白朮白芍白芥子茯苓各三錢車前子二錢枳殼五分水煎服有火加黃連五分水煎服二劑即瘡消亦妙方也

大麻風余有奇方用蒼朮熟地元參蒼耳子白芥子車前子生甘草各二兩金銀花十兩蒲公英四兩各爲末蜜丸一料全愈

方一

樺皮散（河間下同）

治肺癰風毒遍身癮疹搔痒

枳殼　樺皮各四兩並炒存性　甘草炙半兩

杏仁去皮尖水一椀煎令減半取出令乾另研

荆芥穗各二兩

右爲末每服二錢食後溫酒調下

二聖散

疎風和血

大黃半兩　皂角刺三錢

右將皂角刺燒灰研細用大黃半兩煎湯調下二錢早服樺皮散以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

此爲緩治

補氣瀉榮湯（東垣）

升麻　連翹各六分　蘇木　當歸　全蠍

黃連　地龍去土　黃芪各五分　黃芩生四分

桔梗五分　人參二分　生地四分　桃仁三粒

甘草一分半　梧桐淚一分　水蛭三條炒煙盡

蝱蟲去翅足微炒三箇　麝香少許

右剉如麻豆大除連翹另剉梧桐淚研白豆蔻二分爲細末二味另放麝香蝱蟲水蛭三味爲末另放外都作一服水二大琖酒一匙入連翹煎至一琖六分再入梧桐淚白豆蔻二味并麝香等三味再上火煎一二沸去查稍熱早飯後午飯前服忌酒濕麪生冷鞕物

醉仙散（寶鑑）

治癘風遍身麻木

胡麻子炒　牛蒡子炒　枸杞子　蔓荊子炒各一兩　白蒺藜　苦參　防風　苦蔞根各五錢

右爲細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人病之輕重虛實用病重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忌一切炙煿厚味止可食淡粥時菜諸蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥力

通天再造散

治大風惡疾

鬱金半兩　大黃煨　皂角刺黑大者炒各一兩

白牽牛六錢半生半炒

右爲末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

加味逍遙散

治血虛有熱徧身瘙癢心煩目昏怔忡頰赤口燥咽乾發熱盜汗少食嗜臥

當歸　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒各一錢

柴胡五分　牡丹皮　甘草炙　山梔炒各八分

右作一劑水煎服

寶鑑換肌散

治癘風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇　黑花蛇各三兩酒浸　地龍去土

當歸　細辛　白芷　天麻　蔓荊子　威靈仙

荆芥穗　菊花　苦參　紫參　沙參　木賊草

白蒺藜炒　不灰木　甘草　天門冬去心

赤芍藥　九節菖蒲　定風草　何首烏不犯鐵

胡麻子炒　川芎　草烏頭炮去皮臍　蒼朮

木鼈子各一兩

右各另爲末每服五錢溫酒調下食後酒多尤妙

升麻湯

治風熱身如蟲行或脣反綻裂

升麻三分　茯苓　人參　防風　犀角鎊

羌活　官桂各二錢

右每服四錢水煎下瀉青丸方見中風

加味清胃散

治熱毒在表以此發散之

升麻　白芷　防風　白芍藥　乾葛　甘草

當歸　川芎藭　羌活　麻黃　紫背浮萍

木賊草各等分

右每服五七錢水煎服

透經解攣湯

治風熱筋攣骨痛

穿山甲三錢炮　荊芥穗　紅花　蘇木　羌活

當歸　防風　蟬蛻去土　天麻　甘草各七分

白芷一錢　連翹　川芎各五分

右水酒各半煎服

秦艽地黃湯

治風熱血燥筋骨作痛

秦艽　生地黃　當歸　川芎　羌活　防風

甘草　白芷　升麻　白芍藥　大力子蒸

荊芥　蔓荊子各一錢

右水煎服

易老祛風丸

治疥癩風瘡

黃芪　枳殼炒　防風　芍藥　甘草　地骨皮
枸杞子　熟地黃　生地黃各酒拌杵膏
右各另爲末入二黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸白湯下

羌活當歸散

治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或癮疹瘙痒膿水淋漓

羌活　當歸　川芎　黃連酒浸炒　鼠黏子蒸
防風　荆芥　甘草　黃芩酒浸炒　連翹
白芷　升麻各一錢
右用酒拌曬乾水煎服

羌活白芷散

治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活　白芷　輭柴胡　荆芥　蔓荆子　防風
猪牙皂角　甘草　黃芩酒炒　黃連酒炒各一錢
右水煎服

海藏愈風丹

治癘病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癘風癮疹皮膚瘙痒搔破成瘡并皆主之

苦參一斤取末四兩　皂角一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一椀挼成汁去查入砂器中文武火熬

土花蛇一條去腸陰乾酒浸取淨肉曬乾為末大風證用之　白花蛇　烏梢蛇各取一條依前酒浸取肉為末

右為末入前二味和丸梧子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出為度

愚按前方果係癘風用之必效若肝經血熱脾經血虛腎經虛火脾肺氣虛遍身作痒搔破成瘡或內熱生風而眉鬢脫落或皮膚赤暈或搔起白屑而類癘風者服之反成癘風矣

苦參消石酒

浸酒法見後

苦參　消石　清酒

右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日

然後與苦參同入酒甕中盛浸之七日漸漸服之飲法空腹服之一日三服初七日中一服如半鷄子許七日後可飲一升任情飲之多則爲善患去則速風動亦多勿使醉吐寧漸少飲不用多飲亦白二風此藥至日無有不愈餘非難治何以故熱爲根本故苦參能治熱消石除熱消蟲赤白二蟲但聞消石氣皆變爲水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五年以外加黃消石加酒苦參乃至三四兩無有不愈乃至三十年無鼻柱肢節墮落者但非黑蟲皆得永愈第一忌房室大嗔怒大熱食禁粘食五辛生冷大酢酪白酒猪魚鷄犬驢馬牛羊等肉皆爲大忌其餘不禁此爲對治非正報也若人頑痹不覺痛痒處者當作大白膏藥摩之一日三四度七日徹或二三七日徹乃至七七四十九日名曰一大徹頑痹即覺痒平復如本即止摩若不平復但使摩之以瘥爲限不過兩大徹三大徹無有不愈針刺灸燒割劫亦不及摩之爲良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈

大白膏

白芷　白朮　前胡　吳茱萸各一升　蜀椒　細辛各三兩　當歸　桂心各二兩　苦酒四升　芎藭二升

右十味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤銅器中煎令沸三上三下候白芷色黃膏成貯以瓶中隨病摩之卽愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

大黑膏

烏頭　芎藭　雄黃　胡粉　木防己　木麻　黃連　雌黃　藜蘆　礬石各半兩　巴豆　杏仁去皮尖各四十粒　黃蘗一錢八分　松脂　亂髮各如鷄子大

右十五味擣篩爲末以猪脂二斤合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傅先以鹽湯洗然後塗之勿令婦人小兒雞犬見若患人眉睫墮落不生者服藥後經一百日外卽以鐵漿洗其眉睫處所一日三度洗之生毛則速出一大徹眉睫如本與不

患時同也

浸酒法

苦參去上黃皮薄切曝乾擣令散莫使作末

右秤取三十斤取不津甕受兩斛者甕底鑽作孔著二三十青石子如桃李鷄子許九過底孔上二三寸然後下苦參消石末酒一時著甕中遣童子年十三四者和合調停然後即與五六重故紙紮甕口上泥之莫使漏氣取酒服時須孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開瓮口取酒酒欲盡時開瓮取苦參滓急絞取酒其滓去却其酒密處盛之莫使漏氣服酒法一一如前無有不愈若患不瘥除者皆由年多十年者更作此藥酒至兩劑無有不愈依法如前雖良醫治之亦須好酒須行忠直不得不孝不義患除則速矣服藥時先令服長壽延年符能蕩除身中五臟六腑遊滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無疑符力亦是不可思議神力先服藥者無有不效又生造藥入瓮中時令童子小兒和合

訖卽告符書鎭藥符鎭在甕腹令藥不壞久久爲好一切神鬼不敢近之矣

長壽延年符



（此符式合用朱書之）

先服此符然後服藥一服之後更不須再服書符要六合日勿令小兒女子六畜雞犬等見之符成不忌

雷丸散

雷丸　硃砂研水飛　阿魏各一兩　硝石五兩一兩細研四兩酒浸用　雄黃細研水飛　雌黃細研各七錢半　紫石英細研研水飛　犀角屑　藜蘆各半兩　盤蝥　芫青並去頭足翅各二十箇用芝麻一合同炒芝麻熟去之只用盤芫二味

右爲細末取苦參五兩同硝石搗碎用生絹袋盛入瓷瓶中用無灰酒一斗浸七日密封每服一中盞溫過食前調雷丸散二錢

雷丸散

雷丸　雄黃研水飛　硃砂研水飛　滑石

紫石英研　犀角屑　牛黃研各半兩　螌蝥去頭足翅　芫青各二十箇去頭足翅並用糯米炒

白蘞　阿魏各二錢半

右爲細末入研令勻每服一錢空心清酒調下

右二方皆本耆婆方而增損之傳用皆效以藥有難致拘方取足則畢世不成矣小有出入亦何不可故備列焉

白花蛇丸

丹陽荆上舍得癘疾一僧療之而愈以數百金求方祕不肯傳館賓袁生窺知藏衲衣領中因醉之而竊錄焉用者多效

白花蛇　烏梢蛇並去頭尾連骨生用各一條

漏蘆半斤洗淨去苗取四兩　荆芥穗一兩半

防風去苗　金銀花去葉　槐花　乾生地黃

苦參　蟬退用草鞋踏去土　枸杞子各二兩

黃芩　黃連　山梔子　黃蘗　川芎　烏藥

全蠍酢浸一日去鹽味　何首烏不可犯鐵器

牛膝去蘆　牛蒡子　連翹　細辛　白蒺藜

威靈仙　天花粉　金毛狗脊　胡麻子炒

蔓荊子各一兩

右共爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服五六十丸清茶送下空心午後臨臥各一服一僧加風藤一兩如上頭面者加香白芷肌肉潰爛加大皂角各一兩

行藥

大黃　白牽牛　檳榔各一兩　甘草三兩

輕粉五分

右共爲細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙調服五更時進病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或二十日一次以三五遍爲度

防風天麻丸

治癘風癩病此方料是神仙所傳一年中常療數人初服藥有嘔吐者不可怪服藥得安如故其效如神

防風去蘆　天麻　升麻　白附子炮　定風草

細辛去苗　川芎　人參去蘆　丹參去蘆

苦參去蘆　元參去蘆　紫參去蘆　蔓荊子

威靈仙　穿山甲炒　何首烏另搗爲末各一兩

蜈蚣一對

右爲細末與何首烏末拌勻每藥末二兩胡麻一斤淘淨曬乾炒香熟另碾爲極細末與藥末一處拌勻煉蜜和丸共作九十丸每服一丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日病人大忌房勞將息愼口

歛墨丸

治癘風神效

歛墨燒存性　兩頭尖　甘草炙　香白芷

防風去蘆各二兩　川芎一兩　五靈脂三兩淨

麝香另研　乳香另研各三錢

右爲細末酒糊丸每兩作十九每服一丸食後細嚼溫酒送下茶清亦得日進二服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八六二

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十一卷目錄

醫部彙考三百七十一

外科癘瘍癜風門二

方二　乳香丸　神仙退風丹　天麻散　何首
烏散　六香散　八金散　渫洗藥　生
眉膏　防風通聖散　消風散　子和生眉散
烏蛇散　女萎膏　蜀水花膏　蝟皮丸
硫黃散　大黑神膏　蜂房釀酒　白花蛇散
鯪鯉甲丸　天麻煎　苦參酒　又方　桂
枝酒　荊瀝湯　白朮酒　依源麻黃續命湯
八風防風散　龍蛇散　何首烏散　當歸
散　二黃膏　四神散　白花蛇散　酸石榴
丸　硫黃膏　灰藋膏　烏蛇散　苦參散

摩風膏　又方　又方　又方　麢羊角散
秦艽湯　烏蛇散　荊芥散　防風散　蒺藜
九　黑龍丸　莽草膏　又方　柳枝湯　丹
參湯　垂柳湯

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百九十一卷

醫部彙考三百七十一

外科癘瘍癜風門二（白駮痦癗汗斑附）

方二

乳香丸

治癘風神効

通明乳香二十兩　苦參肥好者去蘆剉四兩

右先用好酒五升浸苦參於瓶內以重湯煑一伏時常用文武火慢熬令小沸爲候一伏時取出濾

去柤將酒浸乳香於銀砂石器內煎如餳入天麻四兩爲末大麻仁二兩另研如膏入於乳香膏內攪令勻慢火熬之可丸如梧桐子大每服二十丸用大麻仁酒送下空心及晚食前服之

神仙退風丹

知母　貝母　烏梅肉　海桐皮　金毛狗脊

右各等分爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心日中臨睡各服三十丸又每夜第一次睡覺時急於頭邊取三十丸便服並用羊蹄根自然汁下大忌酒及房勞一切發風之物只喫淡粥一百日皮肉漸皆復舊半年後須忌房事服藥時每夜專用一二勤謹人就病人睡處坐守等候第一次睡覺時便扶起喫藥一服華宮使親見林承務服之取效治癘風如此神妙若不禁忌恐無益也

天麻散

治一切癘風癩疾

天麻二兩　何首烏　胡麻子各三兩　蔓荊子

威靈仙　菖蒲　荊芥穗　地骨皮　苦參去蘆

白蒺藜　甘菊花　牛蒡子炒各一兩　薄荷半兩

右爲細末每服三錢溫酒調下茶清亦得日進二服先食前服半月次食後服半月大有神效

何首烏散

治癘風癩疾

何首烏一斤入白米泔浸一七日夏月逐日換水用竹刀刮令碎九蒸九曬　胡麻子四兩九蒸九曬

右爲細末每服二錢食前溫酒或薄荷湯調下

六香散

淋渫癩病其效如神

甘松去土　零陵香　香白芷　茅香去土剉

香附子炒　藿香　川芎各二兩　三柰子半兩

右除三柰子另研餘七味同爲㕮咀分作四劑每用一劑以水六大碗煎至三碗去柤却入三柰子攪勻乘熱洗瘡若瘡不破用鈹針於疙瘩瘡上刺破令惡血出盡然後淋洗一伏時洗一番浴室毋令透風臥處須令暖和得所一月之間不可出外水火亦就其中洗了拭乾用八金散點若熱不可

飲冷水

八金散

金精石　銀精石　陽起石　元精石　磁石

石膏　滑石　禹餘糧石

右件各等分碾末入金銀坩鍋子內盛之用鹽泥固濟口以文武火煅煉紅透放冷研如粉入水銀半兩輕粉一錢研令不見星子却入餘藥再研勻令患人先洗瘡拭乾便用小油調稠硬作劑子於有瘡處擦上藥兼治疙瘩擦藥之後大忌飲水宜禁身靜坐至三日口中涎出爲度二次藥了用貫衆湯漱口不可嚥下藥汁兩手便洗淨不可近口鼻耳目第四日一伏時依前上藥第七日不可更用見效即止

渫洗藥

何首烏　荊芥　防風　馬鞭草　蔓荊子各等分

每用十兩水一斗煎數沸無風處洗出汗

生眉膏

治眉毛脫落

白花蛇　烏蛇　羊糞炒黑　土馬鬃　半夏各等分炒黑色

右爲細末用生薑自然汁調勻擦在眉上一日須三次爲佳

防風通聖散

治風熱熾盛大便祕結發熱煩躁表裏俱實者

防風　當歸　川芎　芍藥　大黃煨　芒硝
連翹　薄荷　麻黃　桔梗　石膏煅　黃芩炒各
一兩　白朮　山梔　荊芥各二錢五分　甘草二
兩　滑石三兩　白芷　蒺藜炒　鼠黏子各五錢

右爲末每服三五錢白湯調下

消風散

治風熱癮疹瘙痛或膿水淋漓或頭皮腫癢

荊芥穗　甘草炙各二錢　陳皮五錢　人參
白殭蠶炒　茯苓　防風　芎藭　蟬殼去土
羌活　藿香各一兩　厚朴薑製五錢

右每服五七錢薑水煎

子和生眉散

治癘風眉毛脫落

半夏　羊糞各等分

右爲末薑汁調塗眉稜上如不應當參類證眉脫條治之

烏蛇散

治癧瘍風斑駁如白癜

烏蛇三兩　犀角屑一兩　防風　羌活　黃芩　苦參並去蘆各二兩　人參　丹參　元參　沙參並去蘆　桂心　秦艽去蘆土　川芎　梔子仁　白蘚皮　川升麻　通草　白蒺藜　枳殼麩炒去瓤各一兩

右爲細末每服二錢溫酒調下食後良久服之忌雞猪魚蒜熱麪等物

女萎膏

治身體癧瘍斑駁

女萎　附子　雞舌香　木香　白芷各半兩　麝香另研一錢

右件細剉用臘月猪膏半斤煎藥看黃焦便去滓

入麝香攪令勻放凝用粗布擦斑駮上微疼塗之

即瘥

蜀水花膏

治瀝瘍

麝香一錢另研　蜀水花　鷹糞白　白附子

白蘞　當歸各一兩

右件剉碎用猪脂一斤合煎諸藥焦黃去柤候冷

入麝香攪令勻於瓷盒中盛先擦微破塗敷之

蝟皮丸

治烏癩

蚺蛇頭燒存性　魁蛤鍛粉　蝟皮燒存性各一枚

蜈蚣一條半　䗪蟲去頭足翅　蠐螬焙乾

紅娘子去頭足翅　水蛭糯米炒熟　蜘蛛炒

盤蝥去頭足翅各三箇　鮫鯉甲三片　龍骨研

川椒炒　川大黃　黃連　麝香研　桂心

水銀各半兩　石膏細研　川芒硝各一兩

滑石研水飛　甘遂與胡麻同炒以胡麻熟爲度

白礬枯各二錢半　附子二枚炮去皮臍　雷丸

巴豆去皮膜心油各十五粒

右爲細末入研令勻煉蜜和丸如小豆大每服一丸溫水送下空心臨臥各一服未覺每服加一丸如小便莖中痛卽有蟲下皆死也細觀形狀痛多卽減一丸痛少則加至二丸以瘥爲度

右方乃攻毒取蟲之峻劑非灼知臟腑有蟲毒及精神可勝攻下者不可輕服

硫黃散

治烏癩瘡久不瘥

雄黃　雌黃　金星石　銀星石　握雪石
硫黃　水浮石　寒水石　密陀僧　馬牙硝
不灰木　槐白皮　蟬蛻　亂髮灰　蜂窠灰
蝸牛子　牡蠣　麝香各一錢　白礬五錢

右研細用水銀半兩以津唾殺研如泥另入膩粉二錢半用生清油四兩調勻於患處徧塗之立效

大黑神膏

治烏癩及諸癩遍身生瘡多膿血

川烏頭　芎藭　川升麻　防己去皮　黃蘗

藜蘆　黃連　白礬細研　雄黃　雌黃並細研
胡粉各半兩研　巴豆　杏仁各十四粒　松脂
亂髮各如雞子大

右剉如大豆粒用猪脂二升并藥同煎以亂髮消盡爲度綿濾去柤後入雄黃雌黃胡粉白礬攪勻收入瓷器中每用塗於瘡上一日至夜三次塗之每次以熱鹽湯洗過然後更塗之藥勿令入口眼

蜂房釀酒

治烏癩

露蜂房五兩　苦參四斤

右件細剉用水三升煮取一斗二升去柤浸麴四斤半炊糯米三斗入麴蘗搜拌如常醞法酒熟濾去糟每溫一小盞食前服之

白花蛇散

治癩病語聲嘶嗄者

甘草炙半兩　白花蛇酒浸　晚蠶蛾去頭足翅
天麻　槐子　羌活　防風各去蘆　蔓荊子
威靈仙　白蘚皮　枳殼去瓤麩炒各一兩

右爲細末每服二錢溫酒調服不拘時日進二服

鯪鯉甲丸

治白癩

鯪鯉甲三片　蝮蛇半條　魁蛤半枚　水蛭生
蜘蛛生　蟹螯　蝱蟲並去頭足翅各二箇
蠐螬生三箇　蜈蚣一條　龍骨半兩細研
石膏一兩細研水飛　白礬枯　滑石　川芒硝
硝石　水銀與硝石點楮汁研令星盡　川大黃
黃連　桂心各半兩　附子炮去皮臍二枚
雷丸十枚　巴豆十二粒去油　川椒二錢半

右爲細末煉蜜和丸梧桐子大每服二丸空心臨臥溫水送下日進二服

天麻煎

治白癩

天麻一斤　天蓼木三斤

右件剉如大豆粒用水三斗入銀鍋或石鍋中熬至一斗二升濾去柤却於慢火上熬如稀餳每服半匙食前用荆芥薄荷酒調下

苦參酒

治周身白點如脂如榆莢搔之白屑落或癢或痛色白漸展世呼白癩

苦參五斤　露蜂房五兩　蝟皮一具

右剉碎用水三斗煑取一斗去柤浸細麴五斤炊黍米三斗拌如常醞法酒熟壓去糟每於食前溫飲一小盞

又方

治白癩

蟠蝥十四枚　大蝮蛇一條乾者首尾全

右件用酒七升入瓶中用糠火煨酒及一升濾去柤每用薄塗於白癩上

桂枝酒（千金方下同）

治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所損

乾薑五兩　桂枝　芎藭　獨活　牛膝　薯蕷

甘草各三兩　附子　防風　茯苓　天雄

茵芋　杜仲　蒴藋根　白朮各四兩　蹢躅

猪椒葉根皮各一升　大棗四十枚

右十八味㕮咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六合

荆瀝湯

治心虛寒陰氣傷寒損心驚掣悸語聲寬急混濁口喎冒昧好自笑厲風傷心

荆瀝三升　母薑取汁一升　麻黃　白朮　芎藭各四兩　防風　桂　升麻　茯苓　遠志　人參　羌活　當歸各三兩　防己　甘草各二兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煑取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一

白朮酒

補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無窮

白朮切　地骨皮　荆實各五斗　菊花三斗

右四味以水三石煑取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨量飲之常取半醉

勿令至吐

依源麻黃續命湯

治肺虛寒厲風所中噓吸戰掉聲嘶塞而散下氣息短而憊四肢痹弱面色青白遺失便利冷汗出

大棗五十枚　杏仁　白朮　石膏各四兩

桂心　人參　乾薑　茯苓各三兩　當歸

芎藭　甘草各二兩　麻黃六兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煑麻黃去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服舊方無白朮茯苓今方無黃芩轉以依經逐病增損

八風防風散

治肺寒虛傷語言嘶下拖氣用力戰掉緩弱羸瘠

厲風入肺

防風　獨活　芎藭　秦椒　乾薑　黃芪

附子各四十二銖　天雄　麻黃　五味子

山茰　石膏各三十六銖　秦艽　桂心　薯蕷

細辛　當歸　防己　人參　杜仲各三十銖

甘草十二銖　貫衆二枚　甘菊　紫菀各二十銖

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至二兩匕日再

龍蛇散

治風虛頑痲遍身紫白癜風癮疹痒痛者

白花蛇去骨焙　黑梢蛇去骨焙　萆薢　天麻

黃芪　金毛狗脊　自然銅　骨碎補　楓香研

草烏頭用鹽水浸剉　地龍各一兩　乳香

没藥各三錢　麝香二錢

右爲細末酒糊丸梧子大每服十五丸酒下食後酒調末服亦得

何首烏散

治白癜紫癜諸風筋骨疼痛徧身疥癬手足皸裂睡臥不穩行步艱難兼療癘疾眼斷白仁鼻梁崩塌並宜服之

何首烏　蔓荊子　石菖蒲　荊芥穗　甘菊花

枸杞子　苦參去蘆　威靈仙各半兩

右爲細末每服五錢食後溫酒調下或茶清或蜜水亦得日進二服

當歸散

治皮風紫白癜風

當歸　赤芍藥　苦參各半兩　赤土一兩

右爲細末生猪脂二兩熬油去柤同蜜一兩作一處調藥隔一宿每服一大匙熱酒調下空心食後各一服並忌雞鴨無鱗魚豆腐等物

二黃膏

治紫白癜風瘡癬疥

雄黃　雌黃　砒各半錢　白礬　黃丹並另研

蛇牀子爲末　蕳茹各一兩　白膠香另研

輕粉各一錢

右件用清油四兩入巴豆四粒煎黃色去巴豆入諸藥又入黃蠟少許熬成膏子先用荆芥湯洗後用藥擦神效

四神散

治紫白癜風

雄黃　雌黃　硫黃　白礬各等分

右研爲細末每用時先浴令通身汗出次用生薑

蘸藥擦患處良久熱湯洗當日色淡五日除根

白花蛇散

治紫癜風

白花蛇二兩　晚蠶蛾二錢半　白殭蠶炒

烏犀角屑　天麻　麻黃去節　天南星薑製

何首烏　白附子炮　萆薢酒浸　白蘚皮

羌活去蘆　蔓荊子　桂心　防風去蘆各半兩

磁石一兩酢淬爲末研

右爲細末入研令勻每服二錢食前溫酒調下忌熱麵猪魚蒜等物

酸石榴丸

治紫癜風其效如神

酸石榴七枚去皮瓷盆盛飯甑上蒸爛絞取汁

羌活　防風　薄荷葉　人參各一兩　茺蔚子

白附子炮　苦參　烏喙　犀角屑各半兩

冬消梨二十枚去皮核搗絞取汁

右件爲末取前二汁煎如膏和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒送下不拘時候

硫黃膏

治紫癜風

硫黃　白礬並細研各一兩　硇砂細研　白附子各半兩　附子　雄黃細研各七錢半　蛇蛻一條

右爲細末入研令勻用清油四兩黃蠟二兩先煎油三五沸下蠟後入藥末煎成膏每取塗所患處日三度用之

灰藋膏

治紫癜風

灰藋草不以多少燒灰用重紙襯木淋取汁熬膏

蝦蟆灰　白礬灰　硫黃各半兩　雄黃二錢　硃砂七錢半水飛　膩粉研　麝香研各一錢

右外藥爲細末同研令勻用灰藋膏調塗所患處乾卽再塗之

烏蛇散

治身體頑痲及生白癜風

烏蛇三兩酒浸　白殭蠶炒　獨活去蘆　天麻　胡麻子各二兩　天南星二錢半　白附子炮

川烏頭炮去皮臍　防風去蘆　細莘去苗

枳殼去穰麩炒　桂心　蟬蛻各半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

苦參散

治肺臟久積風毒皮膚間生白癜不止

苦參去蘆三兩　松脂　附子去皮臍　梔子仁

木蘭皮　露蜂房各一兩　烏蛇二兩酒浸

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候

摩風膏

治白癜風

附子　川烏　防風各二兩　凌霄花　蹢躅花

露蜂房各一兩

右件細剉用猪油三斤煎煉看藥黃焦去柤候冷收瓷盒中用摩風癜上以瘥爲度

又方

硫黃　密陀僧　膩粉　乳香並另研　杏仁

白殭蠶炒

右爲細末酥調成膏用漿水洗瘡以生布擦破塗

之日夜四五次甚妙

又方

治白癜風

紅灰藋草　蒼耳根莖各五斤　茄子根莖三斤

右件並曬乾一處燒灰用水一斗煎湯淋取汁却於鐺內熬成膏以磁盒盛用好乳香半兩研又入鉛霜膩粉各二錢半相和入於膏內用煉成黃牛脂二兩入於膏內調攪令勻每取摩塗所患處一日塗三上夜塗一上

又方

治白癜風

核桃初生青者五枚　白礬二錢五分細研

硫黃半兩細研

右件和研爲膏日三兩次塗之瘥

麢羊角散

治風熱皮膚生瘖癗痒痛

麢羊角屑　烏蛇肉酒浸　川大黃　元參去蘆各一兩　枳殼麩炒　白蒺藜　甘草炙各半兩

秦艽去蘆土　防風去蘆各七錢半

右件㕮咀每服五錢水一中盞煎至七分去柤入牛蒡根汁半合更煎一兩沸溫服不拘時候

秦艽湯

治風熱毒氣客於皮膚遍身生痦癗如麻豆

秦艽去蘆一兩　防風去蘆　黃芩　麻黃去節
甘草炙　元參去蘆　犀角屑　牛蒡子炒
枳殼去穰麩炒　川升麻各七錢半

右件㕮咀每服五錢水一中盞煎至七分去柤溫服不拘時候

烏蛇散

治風熱遍身生痦癗瘙痒

烏蛇肉酒浸二兩　羌活去蘆　白蘚皮　桂心
甘草炙　枳殼去穰麩炒　蒲黃炒　蔓荊子
芎藭　當歸去蘆各半兩　天麻　麻黃去節
秦艽去蘆　牛蒡子炒　藁本去蘆　白殭蠶炒各七錢半

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

荊芥散

治風熱皮膚瘙痒生瘖瘟

荊芥　赤茯苓去皮　苦參去蘆各一兩　天麻

蔓荊子　人參去蘆　防風　獨活各去蘆

枳殼麩炒各半兩　牛蒡子炒　黃芩各七錢半

烏蛇肉二兩酒浸

右爲細末每服同前法

防風散

治風瘖瘟

甘草炙一兩　防風去蘆　杏仁麩炒另研爲泥

白殭蠶炒各一兩

右爲細末每服三錢空心蜜水調下或溫酒調服

亦得日進二服

蒺藜丸

治風瘙痒生瘖瘟

白蒺藜　秦艽去蘆　赤茯苓去皮各一兩

羌活　苦參並去蘆　黃芩　細辛去苗各半兩

枳殼七錢半去穰麩炒　烏蛇肉三兩酒浸

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫蜜湯送下不拘時候

黑龍丸

治風毒上攻頭面多生瘖癗

羌活去蘆　薄荷葉　蔓荊子　細松烟墨

獨活去蘆各一兩　川芎　甘草炙　白附子炮

山梔子　防風去蘆　荊芥穗　天南星薑汁製

草烏頭生　白殭蠶炒　川烏頭炮去皮臍

白芷各半兩

右爲細末煉蜜和丸每一兩作十丸每服一丸細嚼茶湯或溫酒送下食後服

莽草膏

治風瘙痒皮膚生瘖癗體腫疼痛

莽草一兩　當歸去蘆　芎藭　大戟去皮

川椒　附子　細莘去苗　赤芍藥　芫花

躑躅花　蒴藋各二兩

右細剉用酢三升浸一宿用猪脂三斤同煎令附子色黃爲度綿濾去柤每塗摩病處日三五上

又方

治風瘙痒皮膚生痦癗搔之成瘡宜用此粉身卽瘥

芎藭　麻黃根剉　白芷各三兩　雷丸五兩

藿香二兩　藜蘆一兩半

右爲細末入英粉五兩相和令勻逐日粉身上

柳枝湯

治風瘙皮膚生痦癗搔之腫癢

嫩柳枝　桃枝　蒴藋　苦參各五兩　茵陳

狼毒　青葙葉　麻黃各三兩　槐白皮四兩

右細剉和勻每取一斤用水五斗煑取四斗去柤更入鹽及朴硝各二兩攪勻看冷熱於溫室中洗浴浴罷衣覆出汗瘥切愼外風

丹參湯

治風熱皮膚生痦癗苦痒成疥

丹參　苦參各四兩　蛇牀子生用三兩

右件藥用水一斗五升煎至七升去柤乘熱洗之

垂柳湯

治皮膚風熱生瘡瘖癗或痒痛

楊柳一斤　杏仁　白礬生用各三兩

右件用水一斗五升煎至七升去柤於無風處洗浴極妙

單方

大風癘疾眉髮墮落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬青鹽各一斤爲末罐子固濟炭火一秤煆之從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩和入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢荊芥湯下（聖惠）

大風及丹石熱風手足不遂用消石一兩生烏麻油二斤置鐺中以土墼蓋口紙泥固濟火煎初時氣腥熱則氣香更以生麻油二斤合煎得所收不津器中服時坐室中作小低屋燃火於內服一大合發汗力

壯者日二服三七日頭面疱瘡皆減也必以燃火爲使（婆羅門僧方）

癘風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更好（直指方）

大風癩瘡乃營氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮淨以水洗一斤暴納粟米飯中蒸至米熟時食之（總錄）

又方用苦參五兩切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三服常服不絕若覺痺卽瘥（蘇頌）

又方用苦參末二兩以猪肚盛之縫合煑熟取出去藥先餓一日次早先飲新水一琖將猪肚食之如吐再食待一二時以肉湯調服無憂散五七錢取出大小蟲一二萬爲效後以不蛀皂角一斤去皮子煑汁入苦參調糊下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩半芍藥末五錢人參末三錢丸梧子大每服三五十丸溫酒或茶下日三服仍用麻黃苦參荊芥煎水洗之

惡瘡癩疾但是惡瘡遍體面目有瘡者皆可服之用

白艾蒿十束如升大者取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍服之（梅師方）

白癩風瘡乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之覺痺即瘥（肘後方）

大風癘疾用嫩蒼耳荷葉等分爲末每服二錢溫酒下日二服（袖珍方）

又方用蒼耳葉爲末以大楓子油和丸梧子大每服三四十丸以茶湯下日二服（乾坤生意）

又方五月五日或六月六日五更帶露采蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鯉魚一尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二椀慢火煑熟令喫不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日

大風癩瘡大黃煨皂角刺各一兩爲末每服方寸匕空心溫酒下取出惡毒物如魚腦狀未下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄黃花蛇藥名通天再造散（十便良方）

癘風鼻塌手足攣曲節間痛不可忍漸至斷落用萞麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大以小瓶子入水一

升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚擘破面東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜猪肉試之如不發是效也如發動再服直候不發乃止（杜壬方）

大風惡癩三月四月采天雄烏頭苗及根去土勿洗搗汁漬細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出曬乾又浸如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪肉雞蒜犯之卽死

大風癬瘡遍身黑色肌體麻木痹痛不常草烏頭一斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩鹽四兩同入銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽幷藥再炒令黑煙出爲度取一枚擘破心內如米一點白者始好白多者再炒乘熱杵羅爲末酢麪和丸梧子大每服三十丸空心溫酒下草烏性毒難製五七日間以黑豆煮粥食解其毒（濟療方）

癘風有蟲眉落聲變預知子膏用預知子雄黃各二兩爲末以乳香三兩同水一斗銀鍋煑至五升入二末熬成膏瓶盛之每服一匙溫酒調下有蟲如尾隨

大便而出（聖惠方）

大風癘疾凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒全蠍炒各七箇爲末每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗爲效事親加蟬蛻五品各九箇作一服（家珍）

遍體癩瘡葎草一擔以水二石煑取一石漬之不過三作愈（獨行方）

烏癩風瘡葎草三秤切洗益母草一秤切以水二石五斗煑取一石五斗去查入瓮中浸浴一時方出坐密室中入暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又浴如浴時瘙痒不可忍切勿搔動少頃漸定後隔三日一作以愈爲度（總錄）

大風癩疾百靈藤四兩水一斗煑三升去查入粳米四合煑粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗汗後皮膚起如麩片每隔日一作五六十日後漸愈毛髮卽生（聖惠）

又方浮萍草三月采淘三五次窨三五日焙爲末不得見日每服三錢食前溫酒下常持觀音聖號忌猪魚雞蒜

又方七月七日取紫背浮萍日乾爲末半升入好消風散五兩每服五錢水煎頻飲仍以煎湯洗浴之（十便良方）

大風瘡裂大楓子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之（衞生方）

惡疾風瘡狠毒秦艽等分爲末每服方寸匕溫酒下日一二服（千金）

大風癘疾大麻仁三升淘曬以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯煑數沸收之每飲一小盞兼服茄根散乳香丸取效（聖惠下同）

大風癘疾眉髮不生用側柏葉九蒸九曬爲末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸至十丸日三夜一服百日即生

大風惡瘡松葉二斤麻黃節去五兩剉以生絹袋盛清酒一斗浸之春夏五日秋冬七日每溫服一小琖常令醺醺以效爲度

大風癘疾摩勒香一斤即乳頭內光明者細研入牛乳五升甘草末四兩磁盒盛之安桌子上置中庭安

劍一口夜於北極下禱祝去盒子蓋露一夜次日入甑中蒸熟三斗米熟卽止夜間依前祝露又蒸如此三次乃止每服一茶匙空心及晚食前溫酒調服服後當有惡物出至三日三夜乃愈也

又方用黃蘗末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取下蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效散如四肢腫用鍼刺出水再服忌一切魚肉發風之物取下蟲大小長短其色不一約一二升其病乃愈也（仁存方）

又方楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取起瓦焙研末二兩白花蛇烏蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠍蜈蚣蟾酥雄黃各五錢苦參天麻各一兩爲末水煎麻黃豉汁熬膏和丸梧子大朱砂爲衣每服五十丸溫酒下一日三服以愈爲度（集效良方）

又方大楓子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下仍以苦參湯洗之（普濟方）

大風惡疾眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味彌佳次用熟水入菉豆麪

濯之三日一洗頭一日一洗面不過十度愈（聖惠）

大風癩疾鱟膽散用鱟魚膽生白礬生綠礬膩粉水銀麝香各半兩研不見星每服一錢井華水下取下五色涎爲妙（總錄）

癩風蟲瘡乾蝦蟆一兩炙長肥皂一條炙去皮子蘸酒再炙爲末以竹管引入羊腸內繫定以麩鋪甑內置藥麩上蒸熟入麝香半錢去麩同搗爲丸如梧子大每溫酒服二十一丸（直指）

癘風痛痒白頸蚯蚓去土以棗肉同搗丸梧子大每美酒下六十丸忌葷蒜（心統）

癘風成癩袪風散用東行蠍虎一條焙乾大蠶沙五升水淘炒各爲末以小麥麪四升拌作絡索曬乾研末每服一二合煎柏葉湯下日三服取效（寶鑑）

大風龍膽膏治大風疾神效用冬瓜一箇截去五寸長去瓤掘地坑深三尺令淨安瓜於內以烏蛇膽一箇消梨一箇置於瓜上以土隔蓋之至三七日看一度瓜未甚壞候七七日三物俱化爲水在瓜皮內取出每用一茶匙以酒和服之三兩次立愈小可風疾

每服一匙頭（博濟方）

治癩白花蛇膏白花蛇五寸酒浸去皮骨炙乾雄黃一兩水飛研勻以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮研爛同煉爲膏每服一錢溫酒化下日三須先服通天再造散下去蟲物乃服此除根（三因）

又方白花蛇烏梢蛇各取淨肉二錢酒炙雄黃二錢大黃五錢爲末每服二錢白湯下三日一服名白花蛇散（潔古）

癘風手足麻木眉毛脫落皮膚搔痒及一切風瘡白花蛇烏梢蛇土蝮蛇各一條並酒浸取肉曬乾苦參頭末四兩爲末以皂角一斤切酒浸去酒以水一椀挼取濃汁石器熬膏和丸梧子大每服七十丸煎通聖散下以粥飯壓之日三服三日一浴取汗避風名三蛇愈風丹治例無蝮蛇有大楓子肉三兩

大風用烏蛇三條蒸熟取肉焙研末蒸餅丸米粒大以餵烏雞待盡殺雞烹熟取肉焙研末酒服一錢或蒸餅丸服不過三五雞卽愈（朝野僉載）

又方大烏蛇一條打死盛之待爛以水二椀浸七日

去皮骨入糙米二升浸一日曬乾用白雞一隻餓一日以米飼之待毛羽脫去殺雞煑熟食以酒下之喫盡以熱湯一盆浸洗大半日其病自愈（祕韞）

白癩大蝮蛇一條勿令傷以酒一斗漬之糠火溫令稍熱取蛇一寸和臘月猪脂擣傅（肘后方）

大風癘疾鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒各一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全蠍去土炒白殭蠶炒各一兩地龍去土炒半兩蠍虎全者炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃酢熬一分龍腦半錢右爲末每服一錢匕溫蜜湯調下日三五服（總錄）

風癩濕爛五倍子末津調塗之（普濟方）

大風癩瘡油調五靈脂末塗之（摘元方）

又方名蒼耳丸蒼耳葉不計多少陰乾爲細末每用五兩取粟米二合煑作粥即研如膏却用莨菪子淘去浮者炒令黃黑色擣爲末用一兩相和令勻丸如菉豆大每服二十丸空心溫酒送下晚食前再服

又方附子硫黃各半兩研蒼耳一握陰乾爲細末用

酢調先以生布揩擦微赤破敷塗之乾卽更塗一方
加鐵精無蒼耳

又方蒴藋二斤防己半斤並燒灰用水淋取釅汁洗
癧瘍訖後別用酢研防己塗之卽愈

又方羊蹄草根蘸酢於生鐵上磨旋旋刮取塗於患
處未瘥更入硫黃少許同磨搽之

又方青胡桃皮三枚硫黃一錢半細研上件搗爛入
醬少許更研令勻先用淸泔洗之然後塗於患處

又方鯽魚骨用三年陳酢研磨如糊先用生布擦
令肉赤卽塗其上

又方五月收赤脚蜈蚣燒灰酢調塗之

又方用自死蜣蜋爲末先用布揩擦患處令熱敷之
一宿卽瘥

癧瘍風病白色成片以布拭酢摩硫黃附子塗之或
硫黃白礬擦之（集驗方）

又方七月七日取紫背浮萍日乾爲末半升入好消
風散五兩每服五錢水煎頻飲仍以煎湯洗浴之（奇效良方）

風瘡疥癩血見愁草同滿江紅草搗末傅之（乾坤祕韞）

眉毛脫落蔓菁子四兩炒研酢和塗之（聖惠）

又方核桃皮搗泥入醬少許硇砂少許令勻先以泔洗後傅之（外臺方）

又方薰陸香白蘞同研日日指之幷作末水服之（千金）

眉毛脫落垂柳葉陰乾爲末每薑汁於鐵器中調夜夜摩之（聖惠方）

大風白癩天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煑糯米作粥空心食之病在上吐出在中汗出在下泄出避風

又方天蓼三斤天麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如餳每服半匙荊芥薄荷酒下日二夜一一月見效（聖惠方）

癩風眉落生半夏羊屎燒焦等分爲末自然薑汁日調塗（總錄）

惡瘡似癩十年不瘥者全蛇蛻一條燒灰猪脂和傅仍燒一條溫酒服（千金下同）

惡瘡似癩及馬疥大如錢者自死蛇一條水漬至爛去骨取汁塗之隨手瘥

紫癜白癜兩般風附子雄黃最有功薑汁調勻茄蔕蘸擦來兩度更無蹤

又方以信石白者爲上研極細用眞香油調如薄粥過一宿取清油傅之愈

又方用金獅草挼碎擦之累效

白癜風草烏半兩巴豆二錢半爲細末以酢和爲劑用絹帛裹定浴後擦之其藥力自下矣

白點漸長如癬用紫桂散桂不以多少去粗皮爲細末唾津和調敷每日三四次塗傅之甚妙

又方蘿蔔白汁生白礬二錢先用生布揩令微破調之不過三上瘥

又方楸木白皮細剉用水五斗煑取五升濾去柤於慢火上再熬如稠膏用不津器收每用膏以手摩塗所患處日三五次上效

又淋洗方桑柴灰三斗入大甑內蒸使氣溜於釜中取湯淋汁熱洗不過五六度瘥

赤白癜風膽礬牡蠣粉各半兩生研酢調摩之（總錄）

紫白癜斑貝母南星等分爲末生薑帶汁擦之

又方用貝母乾薑等分爲末如澡豆入密室中浴擦得汗爲妙（德生堂）

又方用貝母百部等分爲末自然薑汁調搽（聖惠）

汗斑癜風羊蹄根二兩獨科掃帚頭一兩枯礬五錢輕粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴用爪抓患處起粗皮以布包藥著力擦之暖臥取汗卽愈也此乃鹽山劉氏方若用硫黃更妙方（經驗）

身面白癜以酒服生胡麻油一合一日三服至五斗瘥忌生冷猪雞魚蒜等百日（千金）

又方用小麥攤石上燒鐵物壓出油搽之甚效（正傳）

又方杏仁連皮尖每早嚼二七粒揩令赤色夜臥再服（總錄下同）

又方用青核桃皮一箇硫黃一皂子大研勻日日摻之取效

又方楸白皮五升水五斗煎五升去滓煎如稠膏日三摩之

赤白癜風生薑頻擦之良（易簡）

又方桑枝十斤益母草三斤以水五斗慢火煑至五升去滓煎如稠膏每臥時溫酒調服半合以愈爲度（聖惠下同）

癜風白駮聖惠用蛇皮灰酢調塗

紫癜風除風散以白花蛇頭二枚酒浸炙蠍梢一兩炒防風一兩爲末每服一錢溫酒下日一服（總錄）

紫白癜風烏蛇肉酒炙六兩熟地黃四兩枳殼麩炒白蒺藜炒五加皮防風桂心牛膝天麻各二兩剉片以絹袋盛浸於無灰酒二斗中密封七日每溫服一小盞忌雞鵝魚肉發物（聖惠）

赤白癜風猪脏一具酒浸一時飯上蒸熟食不過十具（壽域方）

又方白煑猪肚一枚食之頓盡忌房事（外臺）

白癜風驢尿薑汁等分和勻頻洗（總錄）

白癜風疾白蒺藜子六兩生擣爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效（千金）

白癜駁風桑柴灰二斗甑內蒸之取釜內熱湯洗不

過五六度瘥（聖惠下同）

白駁癜風麻鞋底燒灰擦之

又方桂心爲末以唾調塗駁上日再塗卽愈

又方取樹空中水溫熱洗之然後搗桂心牡蠣等分爲末用香油調搽白駁上日三夜一

又方先用新布擦令赤用酢摩巴豆塗之效

又方鰻鱺魚脂先洗拭駁上擦令微痛用魚脂塗之一上便愈

身面白駁鮎魚半斤一頭去腸以粳飯鹽椒如常作鮓以荷葉作三包繫之更以荷葉重包令臭爛先以布拭赤乃炙鮓包乘熱熨令汗出以綿衣包之勿令見風以瘥爲度（總錄）

治風瘖瘺牛膝散用牛膝酒浸搗爲末每服二錢食前溫酒調下兼治骨疽風癩皆效

鍼灸

靈樞經曰病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺其肌肉故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼

癘風者素刺其腫上已刺以銳鍼鍼其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食

衛生寶鑑曰內經曰脉風成癘又云風氣與太陽俱入行諸脉俞散分肉之間衛氣相干其道不利故使肉膹脹而有傷衛氣有所凝而不行故肌肉不仁也

夫癘風者有榮衞熱胕其氣不淸故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脈不去名曰癘風或名曰寒熱病大風之病骨節重眉鬚墮名曰大風刺其肌肉故汗出百日刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼

景岳全書曰癘瘍砭刺之法張子和謂一汗抵千鍼蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗卽出血出血卽發汗二者一也若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺委中出血則效若惡毒蘊結於臟腑非蕩滌其內則不能瘥若毒在外者非砭刺遍身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭內泄其毒決不能退若上體多宜用醉仙散取其惡血從齒縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血若下體多宜用再造散令惡血陳蟲從穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一二日更刺之以血赤爲度如有惡熱頭痛等證以大補氣血爲主

醫案

儒門事親曰朱葛解家病癩疾求治於戴人戴人辭之待五六月間可治之時也今春初尚寒未可服藥我已具行裝到宛丘待五六月製藥朱解家以爲託辭後戴人果以六月間到朱葛乃具大蒜浮萍等藥使人召解家曰藥已成矣可來就治解爲他藥所惑竟不至戴人曰向日我非託也以春寒未可發汗暑月易發汗針同發汗也但無藥者用針一汗可抵千針故高供奉採萍歌曰不居山兮不在岸採我之時

七月半選甚癱風與瘓風些〻小微風都不筭豆淋酒內下三九鐵幞頭上也出汗噫文士相輕醫士相疾文士不過自損醫士至於害人其解家之謂與

陽夏張主簿病癩十餘年眉髮皆落皮膚皴澀如樹皮戴人斷之曰是有汗者可治之當大發汗其汗出當臭其涎當腥乃置燠室中徧塞風隙以三聖散吐之汗出周身如臥水中其汗果粘臭不可聞痰皆腥如魚涎兩足心微有汗次以舟車丸濬川散大下五七行如此數次乃瘳

衞生寶鑑曰戊寅歲正月段庫使病大風滿面連頸極痒眉毛已脫落須以熱湯沃之則稍緩晝夜數次沃之或砭刺亦緩先師曰脉風者癘風也榮衞熱胕其氣不清故使鼻柱壞皮膚色敗大風者風寒客於脉而不去治之當刺其腫上以銳針針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食

薛己醫按曰一男子冬間口苦耳鳴陰囊濕痒來春面發紫塊微腫麻木至冬〻遍身色紫不知痛痒至春紫處俱大至夏漸潰又至春眉落指潰此患在肝膽

二經令刺手指縫井臂腿腕出黑血先與再造散二服下毒穢更以小柴胡合四物湯加白芷防風天麻角刺漸愈又與換肌散但遍體微赤此血虛有火因家貧未得調理秋間發熱至春面仍發塊用前散并養血藥喜年少謹疾得愈

一膏粱之人鼻壞眉落指脫體潰熱渴晡甚用四物湯加酒炒黑黃蘗知母五味麥門白芷天麻角刺三十餘劑熱渴少止時仲夏精神倦怠氣喘身熱小便黃數大便稀溏此元氣虛而時熱勝也用補中益氣湯頓安乃與換肌散及益氣湯兼服二月更以生脉代茶飲瘡少退時至仲秋眩運少食自汗體重大便溏數此亦時濕之證用清燥湯調理而愈又用補中益氣湯少加酒炒黑黃蘗知母角刺天麻兩月餘而瘥又因勞倦耳聵熱渴誤服祛風散病氣益劇身發赤疹與益氣聰明湯月許而愈

一男子赤痛熱渴膿水淋漓心煩掌熱目昧語澀怔忡不寧此心經受證也用安神丸兼八珍湯少加木通炒黑黃連遠志元氣漸復却行砭刺外邪漸退但

便燥作渴用柴胡飲八珍湯而愈用換肌散而痊

一男子肚見青筋面起紫泡發熱作渴寅卯時甚脉弦數腿轉筋小便澁此肝經火證先用柴胡飲熱退便利却用小柴胡合四物湯加龍膽草炒山梔三十餘劑及八珍湯加柴胡山梔養其氣血乃用換肌散去其內毒而安年餘因勞役飲食失宜寒熱頭痛遍身赤疹自用醉仙散而歿

一男子面發紫疙瘩膿水淋漓睡中搐搦遍身痲木漸發赤塊勞怒則痒肝脉洪大砭刺臂腿腕各出血用清胃湯加大黃角刺四劑煎下瀉青丸肝脉少退以升麻湯數劑下前丸諸證少愈却用寶鑑換肌散斤許又用小柴胡合四物湯加參朮天麻角刺百餘劑及六味地黃丸半載而愈後因勞遍身痲痒脉微而遲此氣血俱虛不能榮於腠理用十全大補湯加五味麥門調理年餘而安

一男子面赤發紫泡下體痒痛午後發熱大便燥黑此火盛而血虛也用再造散及四物湯加防己膽草及刺腿指縫出毒血而便和仍以前藥加白朮白芷

茯苓羌活獨活而便黃仍以四物去膽草防己少用獨活加元參萆薢五十餘劑而瘡退却用補中益氣湯加天麻麥門而氣血漸充時仲秋霪雨遍身酸痛用清燥湯而安隨用換肌散胡麻散八珍湯兼服而愈

一上舍面發腫肌如癬後變疙瘩色紫搔之出水此脾肺之證也先用清胃湯以清胃熱解表毒又用四物湯加山梔黃芩柴胡皂角刺甘草節以養血祛風熱及砭臂腿腕手足指縫并患處以去毒血疎通隧道乃與八珍湯加白芷皂角刺五加皮全蠍及二聖散兼服月餘以養陰血治瘡毒又與補氣瀉榮湯少愈再與換肌散而全愈後因勞倦遂發赤暈日晡尤甚以四物加丹皮柴胡山梔并用補中益氣湯年餘雖勞而不發

一男子遍身如癬搔痒成瘡色紫痲木掐之則痛小便數而少此脾胃受邪證多在表用清胃散更砭刺患處并臂腿腕出黑血神思漸爽但惡寒體倦口乾此邪氣去而眞氣虛也以大劑參芪芎歸蒺藜桔梗

數劑元氣頓復却用八珍湯加黃芪白芷蒺藜天麻軟柴胡及二聖散治之其瘡漸愈後用換肌散八珍湯等藥調理半載而痊後仍發誤用尅伐攻毒患兩感傷寒而死

一男子遍身疙瘩搔則不痒掐則不痛便閉作渴此邪在內也以再造散二服微下三次用桃仁承氣湯加當歸四劑及砭惡血漸知痛痒但形體倦怠用培養之劑復其元氣又用二聖散其瘡頓愈更用大補年餘而康後患痰涎壅盛舌强語澀用二陳蒼术知蘗澤瀉四劑而愈再用補中益氣湯調理而安

一男子素淸苦眉盡落病在肝膽二經也乃刺臂腿腕及患處出黑血空心服八珍湯加五味胡麻首烏威靈仙食後服換肌散喜其無兼變之證又能篤守禁忌不半年而痊

一儒者脚心或痒痛或痲痒或腫脹二年後身體作痒漸變疙瘩發熱耳鳴日晡益甚此屬腎虛也乃砭刺臂腿腕及手足指縫去其瘀血用六味地黃丸料加五味柴胡五十餘劑以補腎又用換肌散祛風丸

以治瘡各斤許瘡漸愈得滋補守禁而痊

一上舍遍身患之形病俱虛余謂須用調補元氣完復方治其瘡不信恰服蛇酒以攻內毒更敷砒霜等藥以蝕外毒頓加嘔吐清水體痛如錐或以爲毒氣外發余曰脾主肌肉此因毒藥傷脾而然也反服祛毒之劑吐瀉不止而死

一男子用藥熏洗汗不止喘嗽不食腹鳴足冷肢體抽搐此因熱傷元氣腠理不密亡陽耳是日果卒

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十二卷目錄

醫部彙考三百七十二
外科浸淫疥癬門一
張機金匱要略（浸淫病脈證治）
孫思邈千金方（疥癬）
朱震亨心法（用藥法　諸瘡證治　［搔癢］）
李梴醫學入門（五疥證治）
薛己醫按（瘡疥）

王肯堂證治準繩（總論　證治　浸淫瘡）

陳實功外科正宗（疥瘡　頑癬）

陳士鐸石室祕錄（治法）

方一（當歸飲子　除濕散　苦參丸　神效散　香疥藥　八仙散　又方　五龍膏　楓實膏　消毒散　枳殼散　枳殼丸　苦參丸　赤小豆散　脂調散　掃疥散　祕傳一擦光　一上散　藺茹散　本事方　又方　丹砂膏　巴豆膏　神異膏　白礬散　苦參散　苦參湯）

藝術典第三百九十二卷

醫部彙考三百七十二

外科浸淫疥癬門一

漢張機金匱要略

浸淫病脈證治

浸淫瘡從口流向四支者可治從四支流來入口者不可治

浸淫瘡黃連粉主之

唐孫思邈千金方

疥癬

凡瘡疥小秦艽散中加烏蛇肉二兩主之黃芪酒中加烏蛇脯一尺亦大效

凡諸疥癬皆用水銀猪脂研令極細塗之

凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或嚼鹽塗之又以穀汁傅之又以蒜墨和傅之（千金翼蒜作酥）又以薑黃傅之又以鯉魚鮓糝傅之又以牛李子汁傅之若以此救不瘥乃以諸大方治之

元朱震亨心法

用藥法

膿窠治熱燥濕爲主用無名異乾疥開鬱爲主用茱萸蟲瘡如癬狀退熱殺蟲爲主蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺蟲樟腦松香頭上多加之黃連方解石蛇牀定癢殺蟲松皮炭主膿若腫多者加白芷開鬱痛多加白芷方解石蟲多加藜蘆蟠蝥癢多加枯礬陰囊瘡加茱萸濕多香油調乾癢出血多加大黃黃連猪脂調紅色加黃丹青色加青黛蟲多加錫灰蕪荑檳榔在上多服通聖散在下多須用下若脚腫

出血宜分濕熱用藥

瘡有三種膿泡瘙治熱爲主

諸瘡證治

春天發瘡疥宜開鬱爲主不宜抓破敷

諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黃連黃芩詳上下根梢用及引經藥則可又云諸瘡以當歸黃連爲君連翹甘草黃芩爲佐

諸痛癢瘡瘍屬火若禀受壯盛宜四物加大承氣湯下之

若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黃連黃芩大力子甘草在下者加黃蘗若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風荊芥白芷連翹取其氣能勝濕

此雖皮膚小疾不足爲害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癆噴膚尤爲煩擾甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傅藥須內宣其毒可也升麻和氣飲消毒飲四順清涼飲犀角飲皆可用

瘡如牛皮模樣癢甚不可忍者又疼用黃連木香黃

蘗皮杉木節二箇明礬少許以上各等分研末用好眞油調傅必效

瘙癢

癢證不一疥癬作癢當求之瘡疥證血虛皮膚燥癢者宜四物湯加防風七錢如以四物湯半貼水二盞調消風散一錢亦可婦人血氣或遍身癢或頭面癢如蟲行皮中緣月水來時爲風所吹不然則是產蓐中食動風物致之亦宜如前四物湯調消風散有脾虛身癢本無疥癬素非產蓐潔然一身痒不可任此乃脾虛所因經云諸痛爲實諸癢爲虛又云脾主身之肌肉宜實脾爲先四獸飲去草加藿香厚朴川芎當歸各半錢薑棗煎服名增損養胃飲

明李梴醫學入門

五疥證治

五疥乾濕蟲砂膿也由五臟蘊毒而發屬足三陰者尤多

瘡有偏體難分經絡必憑外證以斷虛實焮腫作痛便祕硬發熱者爲風毒濕熱漫腫癢痛晡熱或時寒

熱體倦少食便順利者爲血虛風熱

乾疥瘙癢皮枯屑起便閉者爲心肝火鬱於肺四順清涼飲古荊黃湯搜風順氣丸久者天門冬膏便利者爲相火鬱於肺活血順燥生津飲或四物湯加黃芩連麴天門冬久者腎氣丸久虛古烏荊丸如素有肺風面上多粉刺者樺皮散

濕疥焮腫作痛久則水流如黑豆汁便祕爲脾鬱濕熱毒防風通聖散俱酒蒸或炒大黃另用酒煨炒三次加木鼈子或升麻葛根湯加天麻蟬退荊芥復元通氣散濕勝者除濕丹便利者爲脾虛濕熱補中益氣湯量加黃芩清熱芎芷燥濕胃火作渴者竹葉黃芪湯脾鬱盜汗不寢者歸脾湯濕澀脹腹者胃苓湯加黃連久者二妙蒼蘗丸濕勝單蒼朮膏脾肺風毒者何首烏散

砂疥如砂子細箇或痛或癢抓之有水焮赤乃心血凝滯便祕者當歸丸或涼膈散合四物湯久者酒蒸黃連丸胷次多痰者牛黃清心丸心煩口乾小便不利者連麴飲便利者活血四物湯久者當歸飲

火盛生蟲卽腐草爲螢之意也蟲疥癢不知痛延蔓易於傳染便閉者肝風熱甚蘆薈丸或敗毒散磨羚羊角汁刺之久者古苦皂丸便利者肝經火鬱逍遙散磨羚羊角汁刺之久不愈者胡麻散但諸瘡久則生蟲蟲須兼外治敷洗

含漿稠膿色厚焮痛便祕者爲濕熱五香連翹湯升麻和氣飲或竹葉石膏湯合四物湯含漿膿清色淡不痛便利者爲腎經虛火八味逍遙散或四物湯加知母黃蘗或四生散腎氣丸

上體多兼風熱下體多兼風濕肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛損腎枯火炎縱有便祕發熱作渴等證只宜滋陰降火略加秦艽蒼耳連翹之類決不可純用風藥凉血傷胃因皮膚之疾而壞臟腑者有之通用連歸湯氣虛四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲濕合平胃散

開毒鬱須辛溫吳萸白芷之類退肌熱須苦寒芩連大黃之類殺蟲須水銀之類此丹溪外治三法也乾疥吳茱萸散或黃連大黃爲末豬膽汁調搽濕疥一

上散砂疥剪草散蟲疥硫黃餅膿窠三黃散通用摩風膏洗藥用荊芥黃蘗苦參等分煎湯癢加蛇牀子川椒腫加葱白

疥癬皆血分熱燥以致風毒尅於皮膚浮淺者爲疥深沉者爲癬疥多挾熱癬多挾濕疥發手足徧身癬則肌肉癮疹或圓或斜或如莓苔走散風癬卽乾癬搔之則有白屑濕癬如蟲行搔之則有汁出頑癬全然不知痛癢牛癬如牛頸皮厚且堅馬癬微癢白點相連又曰狗癬

諸風濕蟲癬與疥瘡大同初起有可下者打膿散去黃連金銀花穿山甲芒硝加赤芍白芍水酒各半煎臨熟入大黃露一宿五更服有可汗者四物湯加荊芥麻黃各五錢浮萍一兩葱豉煎服取汗一切癩癬皆效經久不敢汗下者只用防風通聖散去硝黃加浮萍皂刺水煎服久年不愈體盛者兼吞頑癬丸或古龍虎丹用何首烏白芷蘇木等分入猪油及鹽少許浸酒送下體虛者不可妄用風藥氣虛者何首烏散消風散血燥者四聖不老丹或腎氣丸久服自效

有蟲者俱宜間服蠟礬丸外治乾癬用狼毒草烏各二錢半盤蝥七枚生爲末津唾調搽濕癬用枯礬黃連各五錢胡粉黃丹水銀各二錢爲末用豬脂油二兩夾研令水銀星散盡磁罐收貯搽之牛癬用舊皮鞋底燒存性入輕粉少許爲末麻油調敷馬疥癬用馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日即愈通用麻油二兩入巴豆萞麻子各十四粒盤蝥七枚熬煎三味枯黑去滓却入白蠟五錢蘆薈末三錢攪勻磁罐收貯刮破塗之或用川槿皮浙剪草木鼈子等分爲末酢調敷洗藥用紫蘇樟腦蒼耳浮萍煎湯

血風瘡乃三陰經風熱鬱火血燥所致瘙癢不常抓破成瘡膿水淋漓內證晡熱盜汗惡寒少食體倦所以不敢妄用風藥大槩肝風血燥寒熱作痛者當歸飲加柴胡山梔痛癢寒熱者小柴胡湯加山梔黃連夜熱譫語者小柴胡湯加生地肝脾鬱火食少寒熱者八味逍遙散脾虛晡熱盜汗不寐者歸脾湯加山梔熟地腎虛有熱作渴欬痰者腎氣丸通用遍身者四物湯加浮萍黃芩等分甚者紫雲風丸換骨丸三

蛇丹兩足痛癢者當歸拈痛湯如因飲酒後徧身癢如風瘡抓至血出又痛者用蟬退薄荷等分爲末每二錢水酒調服凡身發癢者通用外治摩風膏大馬齒膏

薛己醫按

瘡疥

瘙癢或膿水浸淫者消風除濕癢痛無膿者祛風潤燥焮痛或發寒熱者表散之搔癢或疼午後尤甚者降火益陰焮痛大便閉塞者滋陰瀉火搔起白屑耳作蟬聲者祛風清熱

疥瘡屬脾經濕毒積熱或肝經血熱風熱或腎經陰虛發熱其體倦食少爲脾經濕熱用補中益氣湯飲冷作痛爲脾經積熱用清熱消毒散搔癢發熱爲脾虛風熱用人參消風散搔癢作痛爲風熱用當歸飲子便祕作痛爲熱毒用升麻和氣飲熱渴便利爲脾肺虛熱用竹葉黃芪湯內熱晡熱或時寒熱屬肝經血虛風熱用加味逍遙散六味丸體倦少食或盜汗少寢爲脾氣鬱結用加味歸脾丸逍遙散地黃丸若

發熱盜汗或吐痰口乾者爲腎經虛熱用六味丸料煎服

王肯堂證治準繩

總論證治

夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺經風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者爲疥風毒之深沉者爲癬蓋癬則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也久而不愈延及徧身浸淫潰爛或癢或痛其狀不一二者皆有細蟲而能傳染人也疥有五種一曰大疥焮赤癢痛作瘡有膿二曰馬疥隱起帶根搔不知痛三曰水疥瘖瘟含漿摘破出水四曰乾疥癢而搔之皮起乾痂五曰濕疥薄皮小瘡常常淫汁是也癬之狀起於肌膚癮疹或圓或斜或如莓苔走散內藏汁而外有匡其名亦有六焉一曰乾癬搔則出白屑索然彫枯二曰濕癬搔則多汁浸淫如蟲行三曰風癬搔則痹頑不知痛癢四曰牛癬其狀如牛領之皮厚而且堅五曰狗癬時時作微癢白點相連六曰刀癬則輪郭全無縱橫不定是也治法當以殺蟲滲濕消毒

之藥敷之內服和脾淸肺除風散濕之劑庶絕其根又面上風癬初起瘖癗或漸成細瘡時作痛癢發於春月名吹花癬女人多生之此皆肺經蘊積風熱陽氣上升發於面部或在眉目之間久而不愈恐成風疾治法當清心火散肺經之風熱然後以消毒散熱之藥敷之則自愈矣

嚴子禮云夫痂疥之爲病雖苦不害人然而至難可者多矣素問云諸痛癢瘡瘍皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節蘊毒於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至徧體或癢或痛或焮或腫或皮肉隱嶙或抓之凸起或膿水浸淫治宜內理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈

夫痂疥者皆由風熱而生徧體搔癢搔之皮起或血出或水出結作乾痂其中有蟲人往往以針頭挑出狀如水內瘑蟲此蓋由肌肉之間深受風邪熱氣之所致也

乾疥者但搔之皮起作乾痂此風熱氣深在肌肉間

故也

濕疥者起小瘡皮膚常有黃水出此風熱毒氣入皮膚間故也

夫瘑瘡者由腠理虛風濕之氣入於血氣結聚所生也多著手足遞相對生如新生茱萸子痛癢爬抓成瘡黃汁出浸淫生長坼裂時瘥時發變化生蟲故名瘑瘡也

夫瘑瘡積久不瘥者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間生長則常癢痛故經久不瘥也

病源論云癬發之狀皮膚癮疹有如錢文漸漸長廕或圓或斜癢痛有匡闌癬內生蟲搔之有水此由風濕邪氣客於腠理復値寒濕與血氣相搏血氣閉澀則發此疾

風癬者是惡風冷氣客於皮膚折於血氣所生亦作圓文匡闌但抓搔頑痹不知痛癢內亦有蟲

又有逸風瘡生則徧體狀如癬疥而癢此由風氣逸於皮膚因名爲逸風瘡也

乾癬者但有匡闌皮枯索癢搔之白屑起是也亦是

風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生究其患則風毒氣多濕氣少蓋風沉入深故無水而爲乾癬中亦有蟲

又有白癬其狀白色而癢此由腠理虛而受風風與氣并血澀而不能榮肌肉故也

濕癬者亦有匡闌如蟲行浸淫赤濕遇癢搔之多水成瘡蓋風毒氣淺濕氣偏多而爲濕癬中亦生蟲

癬在頸項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈一兩甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭乾傅之神妙

浸淫瘡

浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止搔癢者初如疥搔之轉生汁相連著是也仲景云從口流向四肢者可治從四肢來流入口者不可治

運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

陳實功外科正宗

疥瘡

夫疥者微芒之疾也發則令人搔手不閒但不知其何以生者疥曰吾不根而生無母而成乃稟陰陽氣育濕熱化形常列以王侯掌上每親於士庶之身可使文人閣筆繡女停針無分貴賤一例施行醫問曰不生於身獨攻於手者又何也疥曰手掌乃太陰濕土所主手心又少陽相火所司土能生我火能化我此生皆賴濕土陽火所化故生者必自出於手掌醫曰然哉但其形知動而不知靜能進而不能退自非清氣所化也又脾主消納胃主傳化人之飲食未有不愛厚味者厚味之中濕熱並化致生此瘡又清氣隨脉循行濁氣留滯不散停留肌膚積日不解隨後生熱發癢故癢熱之中濕火混化爲蟲形隨濕化動隨火化此無情而之有情也既化之後潛隱皮膚展轉攻行發癢鑽刺化化生生傳遍肢體近則變爲疥癬久則變成頑風多致皮膚枯槁浸淫血脉搔癢無度得湯方解外以繡毬丸搽擦堪爲止癢殺蟲內服消風散亦可散風凉血必得兼戒口味辛熱莫啜忌洗熱湯其煩自脫

頑癬

頑癬乃風熱濕蟲四者爲患發之大小圓斜不一乾濕新久有殊風癬如雲朵皮膚嬌嫩抓之則起白屑濕癬如蟲行搔之則有汁出頑癬抓之則全然不痛牛皮癬如牛項之皮頑硬且堅抓之如朽木馬皮癬微癢白點相連狗皮癬白斑相簇此等總皆血燥風毒尅於脾肺二經初起用消風散加浮萍一兩葱豉作引取汗發散久者服首烏丸蠲礬丸外擦土大黃膏川槿皮散選而用之亦可漸效

石室祕錄 臣陳士鐸著

治法

人生瘡生疥用蒼耳草半斤苦參四兩生甘草金銀花荊芥防風各一兩生黃芪三兩水煑湯一大鍋乘熱熏之外用席二條裹住身上用衣蓋之使氣不散俟稍凉浴之必至渴寒而後已次日再浴將滓再煎如前浴之三日瘡疥必全愈也

疥瘡不必用湯藥用輕粉蘇葉末防風末各一錢核桃肉不去油猪板油各三錢白薇末二錢搗成丸如

彈子大擦患處一日即愈

黃水瘡凡毒水流入何處即生大水泡瘡即爲黃水瘡手少動之即破此熱毒鬱於皮毛也當以湯洗之即愈方用雄黃防風各五錢水十碗煎數沸去滓洗瘡上即愈

頑癬治之亦易用楝樹皮白薇杜大黃根各一兩輕粉蝸牛火焙乾各三錢冰片生甘草各一錢共爲細末先以荔枝殼扒碎其癬皮而後以此藥末用麻油調搽之三日即結靨而愈

方一

當歸飲子

治瘡疥風癬濕毒燥癢

當歸　川芎　白芍藥　生地　防風　白蒺藜

荊芥各一錢半　何首烏　黃芪　甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服或爲末亦可

除濕散

大治一切風毒疥癬癩癢狀如風癩

苦參　何首烏　荊芥穗　蔓荊　薄荷各一兩

白芷　天麻　川芎　防風並生用　烏蛇酒浸一宿焙乾各半兩

右爲細末每服三錢茶酒任調下無時日進三服六日一浴令汗出血氣宣通六日膚澤如故

苦參丸

治徧身瘙癢疥癬瘡瘍

苦參四兩　元參　黃連　大黃剉碎炒香　獨活　枳殼炒　防風各二兩　黃芩　梔子　菊花各一兩

右爲細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服三十丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

神效散

治乾濕膿窠諸種疥癬

檳榔　蛇牀子各一兩　全蠍半兩　倭硫黃一兩五錢

右化開硫黃入荊芥末三錢滾數沸候冷加輕粉二錢冷再碾末加三柰半兩炒共爲細末先將小油滾過候冷調上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥

氣神效

香疥藥

治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬瘡

輕粉　水銀　樟腦各三錢　大楓子去殼

川椒各四十九粒　柏油燭一對　杏仁少許

右爲細末疥用絹包裹瘡上熨黃水瘡摻上此藥功效如神

八仙散

治遊風腫癢疥癬瘡或因洗頭遊風瘙癢生瘡

細辛　荊芥　白芷　黃芩　川芎　防風

地骨皮　甘草各等分

右共爲粗末每用藥二兩水二椀煎十沸去滓熱搨患處

又方

治一切男子女人渾身疥癬一家染易經年搔癢不效者

百部半兩碎切　亂髮　木香碎切　檳榔搥碎

苦參碎切各一兩　鯽魚一箇不要見水切成片

川椒三銖

右以油五兩煎煎前藥得所去藥却用麝香一分膩粉十錢硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉出磁器盛之非時使也

五龍膏

治疥癬

硫黃　白礬　白芷　吳茱萸　川椒各等分

右爲細末煎油調塗之

楓實膏

治風瘡燥癢疥癬

大楓子肉半兩　輕粉　枯礬各些少

右擣爲膏以擦瘡上

消毒散（局方）

防風去蘆一兩　甘草二兩　荊芥穗三兩

鼠黏子四兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎七分去柤食後溫服

枳殼散

治痂疥瘙癢痲痹

枳殼麩炒二兩　白蒺藜子半升　蔓荊子

苦參各一兩

右爲細末每服三錢溫酒調下不拘時日進二服

枳殼丸

治一切風熱生瘡疥

枳殼麩炒四兩　苦參八兩

右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服三十丸食後溫酒送下

苦參丸

治痂疥搔癢

苦參一斤爲末　皂角二斤

右用皂角將水一斗浸揉濃汁濾去柤用汁熬成膏子和苦參末爲丸如梧桐子大每服三五十丸煎荊芥酒送下或薄荷酒亦得不拘時候

赤小豆散

治乾濕疥

赤小豆二合炒乾內酢中如此七次　升麻

薏苡仁　黃芪剉各七錢半　人參　白蘞
瞿麥穗　當歸切　黃芩　猪苓　甘草炙
防風各半兩

右爲細末每服三錢匕空心粥飲調下日二夜一

脂調散

治疥瘡膿窠瘡神效

蛇牀子二兩　蕳茹　草烏頭　荊芥　花椒
苦參各一兩　雄黃　硫黃　明礬各半兩

右爲細末猪油調搽

掃疥散

治諸疥瘡熱瘡偏身瘡癤神效

大黃　蛇牀子　黃連　金毛狗脊　黃蘗
苦參各五錢同研爲極細末入後藥　硫黃
水銀茶末殺之各四錢　輕粉一錢　雄黃
黃丹各二錢五分　大楓子去殼　木鼈子去殼各
五錢同前六味細末杵擂勻

右用生猪脂調洗浴後搽瘡上此藥宜曬合之不見火塗瘑疥效如神故名掃疥

秘傳一擦光

治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡神效

蛇牀子　苦參　蕪荑各一兩　枯礬一兩二錢

硫黃三錢　輕粉　樟腦各二錢　大楓子肉

川椒　雄黃各五錢

右爲細末生猪油調傅

一上散

治諸般疥瘡或痛或癢或喜湯火烘洗者

蛇牀子炒　雄黃別研　黑狗脊　寒水石別研

白膠香銅銚熬鎔過傾乾石頭上放冷研各一兩

白礬　黃連各半兩　硫黃另研二錢五分

盤蝥十四枚去翅足　吳茱萸三錢

右爲細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡痂然後用前藥傅可一次愈一方無白膠香白礬黃連吳茱萸

腫多加白芷開鬱

痛多加白芷方解石

癢多加枯礬

陰囊瘡加吳茱萸濕多香油調

乾癢出血多加大黃黃連猪脂調

蟲多加蕪荑錫灰檳榔藜蘆螌蝥

欲紅色加黃丹青色加青黛

蔄茹散

治疥經年不瘥

水銀一錢　好茶二錢　蔄茹三錢　輕粉少許

右爲細末每用不拘多少麻油調塗之

本事方

治疥瘡不問新久

白蕪荑一兩　檳榔　吳茱萸各半兩　硫黃二錢

另研

右爲末麻油調抓破揩之

又方

治疥癩瘡凡春大發焦疥開鬱爲主不宜抓破

白礬　吳茱萸　蛇牀子各二錢　黃蘗　大黃

硫黃各一錢　寒水石二錢半　樟腦五分

輕粉十盞　檳榔一箇

右爲末猪油調搽

丹砂膏

治一切惡瘡疥瘙癢不止宜用此藥殺蟲

朱砂　雄黃　雌黃並研細　亂髮　白蠟

松脂研末各一兩　蔄茹爲末二兩　巴豆十粒

猪脂二斤

右件藥先以猪脂煎亂髮令消盡次下巴豆蠟松脂煎十餘沸用綿濾去柤候稠卽入雄黃朱砂等末攪令勻磁盒內盛不拘時候用少許摩塗之以瘥爲度

巴豆膏

治一切疥瘡有蟲時作瘙癢

巴豆七粒　蕪荑　硫黃研細　白礬枯各半兩

猪脂三兩

右爲細末煉猪脂成油入前藥末調和令勻每服蓮子大於手掌內搓塗之

神異膏

治一切瘡疥

雄黃　蛇牀子各三錢　巴豆七粒　皂角一定

輕粉半字　全蠍七枚　黃蠟半兩　清油一兩

右先用皂角全蠍巴豆煎油變色去了三味入黃蠟化開取出冷入雄黃蛇牀子末輕粉和勻成膏先用苦參湯溫洗却以藥擦瘡疥上神效

白礬散

治一切疥

蛇牀子七錢　白礬枯　硫黃　雌黃並細研

胡粉　黃連各一兩

右爲細末研令勻以猪膏和稀麪糊每以鹽漿水洗拭乾塗之

苦參散

治一切疥及風瘙癢搔之成瘡

苦參　丹參各四兩　蛇牀子半斤

右爲細末先以溫水洗瘡拭乾敷之

苦參湯

治諸瘡著白痂復發

苦參　蛇牀子　荊芥穗　白礬各等分

右㕮咀煎湯放溫洗

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十三卷目錄

醫部彙考三百七十三

外科浸淫疥癬門二

方二

一笑散　神捷散　殺疥藥　又方　又
方　又方　又方　擦掌丹　一上散
秦艽丸　皂角膏　又方　烏頭散　黃連散
又方　治癬方　何首烏散　白蒺藜散
苦參丸　三神丸　胡粉散　銀粉散　八寶
散　五倍子散　丁香散　水銀膏　定粉膏
淋洗方　黃連膏　又方　又方　砒霜散
又方　鯽魚膏　凌霄花散　昨葉荷草散
是齋方　烏蛇丸　白花蛇丸　雄黃膏
丹參湯　羅氏柏脂膏　一抹散　黃連散

又方（螺殼散　荊芥散）
單方
鍼灸
醫案

藝術典第三百九十三卷

醫部彙考三百七十三

外科浸淫疥癬門二

方二

一笑散

治渾身疥癩搔癢生惡瘡

檳榔　藁本　硫黃　蛇牀子　枯礬　五倍子

白膠香各等分

右爲細末濕者乾傅乾者香油調敷如頭上瘡便

搽上不用剃甚者不過三五次平復如故

神捷散

治諸疥瘡

吳茱萸　白蒺藜各一兩　蕪荑　輕粉各半兩

赤小豆四十九粒　石硫黃少許研

右爲細末研勻每用半錢匕生油調於手心內摩熱後徧揩周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根生切一兩　草烏頭一箇　硫黃一錢

白礬半錢　生薑一分

右以米泔水淹一宿研極細入釅酢和勻入浴時抓破瘡傳之遲頃以溫湯洗去妙

又方

治疥神效

狼毒　細辛　水銀各一錢　輕粉半錢

右爲細末油蠟和劑作兩丸綿裹兩手將於周身疥多處擦之

又方

信石　雄黃　硫黃　牙硝　花椒各二錢

蛇牀子四錢　枯礬三錢　大楓子二十一箇

巴豆六分

右共爲末以茶子油調搽

又方

大楓子肉　蛇牀子　水銀各三錢　檳榔

樟腦　雄黃各二錢　木鼈子七箇

右共爲末燭油調搽

又方

枯礬半斤　牙硝四兩　硫黃八錢　膽礬三錢

信石二錢

右共爲末以茶子油調搽

擦掌丹

枯礬　樟腦各二錢　水銀一錢　信石三分

大楓子肉三箇　核桃肉五錢

右共研末作丸放於掌心擦鼻內聞香

一上散

治風痒裂坼燥瘡

苦參一兩　白芷　焰硝　枯礬各半兩　白芨

荊芥穗各三錢　寒水石二兩煅

右爲末油調搽

秦艽丸

治徧身生疥乾痒搔之皮起

秦艽　黃芪　大黃各二兩　漏蘆

防風　黃連各一兩半　烏蛇肉

右爲細末煉蜜和搗三百下丸如梧子大每服三十丸食後溫酒送下

皂角膏

治皮膚風熱生疥乾痒

猪牙皂角　巴豆去皮　烏頭生　吳茱萸

硫黃　膩粉　白礬枯　黃蠟各二錢半

右爲細末研令勻先入清油三二合以慢火消蠟了攪和令勻日用二三次塗之

又方

治疥瘡生乾痂瘙痒不止

硫黃二錢半爲細末　巴豆　黃蠟各半兩

猪脂一斤

右先煎猪脂令沸入巴豆煎候黃次下蠟鎔開方下硫黃末攪令勻盛於磁盒內日三五度塗之

烏頭散

治濕疥常有黃水搔癢不絕

川烏頭　藜蘆　馬藺根　石菖蒲　杏仁

苦參　硫黃研細　膩粉　白礬枯各半兩

右爲細末研令勻用時先以桃湯洗拭乾後以油漿水和塗之三日一塗不過三兩上瘥

黃連散

治濕疥有黃水皮膚瘙痒

黃連二兩　蛇牀子半兩　赤小豆　糯米

胡粉各一兩　水銀一兩半

右件爲細末以生清油和研候水銀星盡如膏旋取塗之

又方

治濕疥徧身

黃蘗　綠礬　膩粉　硫黃細研各等分

右爲細末研令勻用生油調塗之

治癬方

浮萍一兩　蒼耳　蒼朮二兩　苦參一兩半

黃芩半兩　香附二兩半

右爲末酒調服或酒糊丸

何首烏散（羅氏）

治脾肺風毒攻腫偏身癬變成癮疹搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痹手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癜白癜頑痹等風並宜服之

荊芥穗　蔓荊子　威靈仙　何首烏　甘草炙

防風　蚵蚾草各等分

右擣羅爲末每服一錢食後溫酒調下

白蒺藜散

治一切癬及疥風痒瘑瘡等疾

蒺藜　秦艽　枳殼麩炒　獨活　防風各二兩

人參　苦參　元參　丹參　沙參　甘菊花

梔子仁　黃芩　茯神去木　茱萸　細辛

麻黃去節各二錢半　烏蛇四兩酒浸取肉

右爲細末每服二錢食前溫酒調下

苦參丸

治一切癬皮膚瘙痒

苦參一斤半剉　菖蒲四兩　烏蛇八兩酒浸取肉

右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每服三十丸熟水送下不拘時候

三神丸

治一切癬

蒺藜炒　海桐皮剉　草烏頭鹽炒熟去鹽不用各一兩

右爲細末麪糊和丸如菉豆大每服十丸加至十五丸溫酒鹽湯送下

胡粉散

治一切癬瘡瘙痒甚者

胡粉另研　雄黃另研　硫黃另研各一錢半

大草烏三錢生用　盤蝥一錢　蠍稍三錢

麝香三分　砒五分

右爲細末先用羊蹄根蘸酢擦動次用藥少許擦

患處

銀粉散

治一切頑癬

輕粉　黃丹　白膠香　瀝青各等分

右爲細末麻油調拭淨或抓破竹篦挑搽二次便乾數次剝去殼也治牛皮癬如神

八寶散

治風癩松皮頑癬久不愈者一鄉人患此疾數年不愈後得此方試用有效

藿香　破故紙　檳榔　大腹皮　雄黃　輕粉

硫黃　白礬枯各一兩

右爲細末小油調擦日上三五次痒則擦之

五倍子散

治癬久不瘥

五倍子一兩火燒煙盡　黃蘗剉炒　膩粉

漏蘆　白礬煆各一分

右爲細末先用鹽漿水洗拭乾敷之

丁香散

治一切癬

丁香研　蝦蟇灰各一兩　麝香研一錢半

白礬熬令汁枯研　五倍子研　膩粉研各半兩

右研勻乾傅癬上以瘥爲度

水銀膏

治一切癬

水銀二錢半　蕪荑仁研末　薑黃研末各半兩

酥二兩

右先將酥和水銀以柳槌研攪候水銀散卽下蕪荑薑黃攪勻磁盒盛旋取塗癬上日二三次

定粉膏

治乾濕癬風癬不拘年月

定粉　水銀　蕪荑　胭脂各一分

右同研勻用陳猪脂一兩同研成先用湯洗後以膏子臨臥塗之一上便瘥本法猪脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

淋洗方

楝實半斤（如無實卽以根皮代之）　楝葉及嫩枝細剉

凌霄花及藤細剉各一升　枳殼　蛇牀子

地楡　丹參　皂莢　苦參並細剉各三兩

右同煎濃汁熱洗患處

黃連膏

治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱

赤黑痒不可忍搔之出血

水銀一錢　黃連　黃蘗　豉細研　蔓菁子

杏仁湯浸去皮尖雙仁細研各半兩

右先以水銀於掌中唾研如泥次入乳鉢內下生

油一合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五

度塗瘡上

又方

治癬

蘆薈　大黃　輕粉　雄黃　蛇牀子　槿樹皮

檳榔

右先刮破癬用酢調末塗之

又方

綠蘿根不拘多少　花椒一兩　信些少　防風

白芨　百部　白蘞各半兩　江子十五粒

右各爲末和綠蘺根擣熟成團將藥於癬上擦之候痛過洗浴

砒霜散

治諸癬不問乾濕積年不瘥

砒霜二錢半研　硫黃研　密陀僧研　膩粉研各七錢半

右件同研令勻如癬乾即用生油調塗若癬濕即用藥摻之

又方

治癬疥瘡痒不可忍

皂角三錠煨去皮子　黃連半兩　膩粉二錢半

右將皂角黃連別爲末用米醋二大盞入皂角末同煎如稀餳用綿濾去柤入黃連末膩粉調令勻候癬發時惡水出便可先用槿樹白皮搔破後塗藥三兩上便愈

鯽魚膏

治諸癬瘡或乾或濕痒痛不可忍

鯽魚中者一尾　亂髮雞子大二枚　猪脂半斤

雄黃一兩半　硫黃一兩

右件藥先煎猪脂令沸即下魚煎令煙盡次下髮令消濾去柤下雄黃硫黃末攪令勻於甆器中不拘時候以瘥爲度

凌霄花散

治風濕兼熱生諸癬久不愈

凌霄花　黃連　白礬各二錢半　天南星

雄黃　羊蹄根各半兩

右爲細末抓破用生薑汁調藥擦之如癬不痒只用清油調藥立效

昨葉荷草散

治一切癬無問風濕氣血與夫相染而生並宜用之

昨葉荷草一兩即瓦上曬乾　枯白礬一錢

雄黃半錢

右爲細末用羊蹄菜根先蘸酢擦癬上令痒破即用藥末乘濕塗敷不過兩三次即愈

是齋方

治諸癬

貫衆　吳茱萸　官桂各等分

右爲細末先用手抓破用藥擦之米酢調敷亦得

烏蛇丸

治一切風癬多年不瘥者

烏蛇酒浸去骨　白附子炮　附子小便浸一宿

天麻各二兩　苦參十兩　槐花半斤　全蠍炒

羌活　乳香　殭蠶炒各一兩半

右爲細末用生薑汁一斤蜜一斤二味同熬成膏入藥和丸如梧桐子大每服三四十丸空心用溫酒送下夜晚荊芥湯送下

白花蛇丸

治風癬瘡皮膚瘙癢久不瘥

白花蛇三兩酒浸　苦參二兩　麥門冬一兩半

黃芩　防風　白蘚皮　甘草炙　枳殼麩炒

梔子仁　赤芍藥　大黃　蒼耳子　羌活

黃芪剉　白蒺藜各一兩

右件爲細末煉蜜和擣三五百下丸如梧子大每服三十丸食後薄荷酒送下

雄黃膏

治風毒疥癬

雄黃細研　膩粉研　白礬枯　川椒　藜蘆各二錢半　附子半兩炮去皮臍

右爲細末入乳鉢內再研如粉用煉了臘月猪脂半斤黃蠟二兩淨鐺內慢火煎候蠟銷傾於磁盒內入雄黃等末攪勻每日四五度取少許敷塗之

丹參湯

治風癬瘙癢洗浴

丹參　蛇牀子各三兩　苦參五兩　白礬研二兩

右除白礬外篩爲粗散用水三斗煎至二斗濾去柤入白礬攪令勻乘熱於避風處洗浴用水冷爲度拭乾了用藜蘆末粉之相次用之以瘥爲度

羅氏柏脂膏

治乾癬

柏油一斤　黃蠟半兩　杏仁四十五粒剉碎

砂硝一抄

右件相和於鐵器內用老生薑葱白三根一順攪五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

一抹散

治乾癬不瘥

天南星　草烏頭各一枚生用

右爲細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

黃連散

治濕癬痒不可忍

黃連　黃蘗　胡粉各一兩研細　雄黃半兩研細

右爲細末同研令勻先用溫漿水洗瘡然後取藥敷之不過四五度卽瘥

又方

黃連　明礬煅各半兩　胡粉　黃丹　水銀各二錢

右爲細末用猪脂油一兩夾研令水銀星盡散磁盒收用

螺殼散

治濕癬痒不可忍

螺殼一兩　亂髮灰　龍腦　胡粉研各半兩

右爲細末研勻以油淀和塗之

荊芥散

治多年濕癬

荊芥穗不拘多少以瓦罐盛鹽泥固濟只留一竅用炭火燒候出青煙便去火用濕紙塞了竅放冷取出研細末半兩　麝香一錢　膩粉五錢

右研勻先以口含鹽漿水抵洗瘡令破帛子搵乾了以生油調藥傳之

單方

年深疥癬遍身延蔓用硫黃艾葉研勻作撚浸油點燈於被中熏之以油塗口鼻耳目露之（集元方）

乾濕二癬取東壁土傅之極效

赤黑丹疥或燥或痒不急治延及遍身卽死白磁末猪脂和塗之（總錄）

牛皮血癬用煙膠寒水石各三錢白礬二錢花椒一錢半爲末臘猪脂調搽（積德堂方）

一切頑癬用銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖

過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡臁瘡及蟲咬（筆峯雜興）

蟲癬瘙痒水銀胡粉等分研傅

又方水銀蕪荑和酥傅之（外臺）

牛皮惡癬五更食炙牛肉一片少刻以輕粉五分溫酒調下（直指方）

瘡癬有蟲銀朱牛骨髓桐油調搽（醫方摘要）

疥癬有蟲石灰淋汁洗之數次（千金方）

下體癬瘡艌船灰牛糞燒烟熏之一日一次即愈（摘元）

疥癬有蟲硫黃末以雞子煎香油調搽極效（救急良方）

牛皮癬瘡石榴皮蘸明礬末搽之切勿用醋蟲即沉下（直指方）

癬瘡作痒螺螄十四箇槿樹皮末一兩入椀內蒸熟入礬紅三錢擣勻搽之（集效方）

疥瘡熏法熟蘄艾一兩木鼈子三錢雄黃二錢硫黃一錢爲末揉入艾中分作四條每以一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通聖散（摘要）

癬瘡作痒刺薊葉擣汁服之（千金下同）

血熱生癬地黃汁頓服之

身面惡癬蛇含草入生礬研傅二三次斷根（直指方）

積年頑癬天陰卽癢搔出黃水狼把草搗末摻之

乾濕蟲疥狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被蒙頭恐藥氣傷面目（經驗方）

積年疥癩狼毒一兩半生研半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化爲末同以淸油浸藥高一寸三日待藥沉油淸遇夜不見燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥琖上吸氣取效（永類方）

積年乾癬生痂搔之黃水出每逢陰雨卽痒用狼毒末酢調塗之（聖惠）

疥瘡瘙痒藺茹末入輕粉香油調傅之（多能鄙事）

癬瘡有蟲猫兒眼睛草曬乾爲末香油調搽之（易簡方）

惡癬有蟲莨菪根搗爛蜜和傅之（千金翼）

疥癬蟲瘡藜蘆末生油和搽塗

疥癬滿身不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯洗浴甚能解痛生肌肉（博濟方）

疥癬蟲瘡山豆根末臘猪脂調塗（備急方）

經年頑癬羊蹄根搗三錢入川百藥煎二錢白梅肉擂勻以井華水一盞濾汁澄清天明空心服之不宜食熱物其查抓破擦之三次卽愈

細癬用羊蹄根五升桑柴灰煑四五沸取汁洗之仍以羊蹄汁和礬末塗之（千金）

濕癬浸淫日廣痒不可忍愈後復發出黃水羊蹄根搗和大酢洗淨塗上一時以冷水洗之日一次

疥瘡有蟲羊蹄根搗和猪脂入鹽少許日塗之（祕要）

風癬有蟲菖蒲末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕酒一日每服半升或一升（千金）

癬瘡作痒雀兒草卽酸母草擦之數次愈（永類方）

風疽瘡疥凡腳腨及曲脷中痒搔則黃汁出者是也以青竹筒三尺著大豆一升在內以馬屎糠火燒熏以器兩頭取汁擦之先以泔清和鹽洗之不過三度極效（千金）

浸淫癬瘡瓦雀屎以醬瓣和研日塗之（千金翼）

又方韭根炒存性搗末猪脂和塗之數度愈（經驗方）

疥瘡痛痒煑薤葉搗爛塗之（肘後方）

疥癬濕瘡松膠香研細少入輕粉先以油塗瘡糝末在上一日便乾頑者二三度愈（鬼遺方）

瘡癩端午日午時采翻白草每用一握煎水洗之

蟲癬淸晨采露水絲瓜葉七片逐片擦七下如神忌雞魚發物（攝生衆妙方）

身面癬瘡日午搗桃葉取汁搽之（千金）

一切癬鹿棃根刮皮搗爛酢和麻布包擦之乾者爲末以水和搗（經驗方下同）

頭面癬瘡生白果仁切斷頻擦取效

疥瘡瘙痒油核桃一箇雄黃一錢艾葉杵熟一錢搗勻綿包夜臥裹陰囊歷效勿用洗（集簡方）

癬蔓延成濕瘡用蘆薈一兩炙甘草半兩研末先以溫漿水洗癬拭淨傅之乾便瘥眞神奇方也

風癬有蟲海桐皮蛇牀子等分爲末以臘猪脂調搽之（如宜方）

積年疥瘡猪肚內放皂角煑熟去皂角食之（袖珍方）

癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時搽之（簡便方）

膿泡疥瘡柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入唾津不見星乃止以溫湯洗淨瘡以藥塡入（經驗方）

疥瘡瘙痒巴豆十粒炮黃去皮心右順手研入酥少許膩粉少許抓破點上不得近目併外腎上如熏目著腎則以黃丹塗之甚妙（千金）

荷錢癬瘡巴豆仁三箇連油杵泥以生絹包擦日一二次三日全好（經驗方）

癬瘡濕痒搗楮葉傅之（聖惠）

疥瘡有蟲猪膏煎芫花塗之（肘後方）

牛皮癬舊皮鞋底燒灰存性輕粉少許麻油調搽（直指方下同）

眉鍊癬瘡生眉中者穿山甲前膊灸焦爲末清油和輕粉調傅

頭面錢癬槿樹皮爲末酢調重湯頓如膠傅之（經驗方）

牛皮風癬川槿皮一兩大楓子仁十五箇半夏五錢剉河水井水各一椀浸露七宿入輕粉一錢入水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙（扶壽方）

牛皮風癬牛蹄甲驢糞各一兩燒存性研末油調抓破敷之五七日即愈（經驗方）

一切癬瘡五倍子去蟲白礬燒過各等分爲末搽之乾則油調（簡便方）

牛皮風癬生驢皮一塊以砒硝醃過燒灰油調搽之名一掃光（李樓奇方）

積年癬瘡用盤蝥半兩微炒爲末蜜調傅之（外臺）

又方用盤蝥七箇醋浸露一夜搽之（永類）

癢疥以狨脂塗之妙（藏器）

瘡癬痛痒初生者嚼鹽頻擦之妙（千金翼）

浸淫濕瘑疥瘡胡燕窠大者用托子處土爲末以淡鹽湯洗拭乾傅之日一上（小品方）

人疥馬疥馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日內愈神效（集驗方）

濕瘑瘡癬荊木燒取汁日塗之

頭上瘡癬蜂房研末臘猪脂和塗之效（聖惠）

兩脚癬瘡白犬血塗之立瘥（良方）

浸淫惡瘡有汁多發於心不早治流至遍身則殺人

熬秫米令黃黑杵末傳之（肘後方）

浸淫諸瘡猪牙車骨年久者搥破燒令脂出乘熱塗之（普濟方）

濕瘑浸淫新羊屎絞汁塗之乾者燒煙熏之效（總錄）

治癬積年不瘥者用蟹螯一箇去頭翅足以針劄燈焰上燒米酢內淬成黑灰存性研爲細末用紅棗一箇湯泡剝去皮核與蟹螯一處同研爛先以手抓或生布擦動癬然後搽藥不可侵好肉恐有毒

牛皮癬用清香油一兩入全蠍七枚巴豆二十枚盤蝥十枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟一錢候鎔收起朝擦暮愈不損皮肉

又方綠蘺根去粗皮取細皮貼肉者擣爛用酢調塗癬上立愈

治癬用藜蘆細擣爲末生油調傳

治癬神效方藜蘆根半兩輕粉二錢半右爲細末凉水調搽癬上

癬疥久不瘥取鮮羊蹄根擣絞取汁用膩粉少許調如膏塗傳患處三五遍卽瘥如乾卽用猪脂調和傳

之

又方取楮皮枝中白汁塗癬甚妙

治癬濕痒用楮葉半斤細切擣傅癬上

五種瘡癬以韭根炒存性旋擣末以猪脂調傅之三五度瘥

治一切癬半夏散以半夏三兩擣爲末以陳醬汁調和如糊摩塗癬上日兩三度即瘥

癬瘡取蟾蜍燒爲末用猪脂和傅之

瘡如牛皮模樣痒甚不可忍者又疼用黃連木香黃蘗皮杉木節二箇明礬少許以上各等分爲末用好眞香油調塗大效

又方蟠蝥五月五日取十枚麝香半錢同研爲細末酢調癬上出少黃水瘥

又方草川烏二枚乾蠍五箇爲細末油調作膏塗之

有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止粘著衣被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以菖蒲三斗剉日乾之舂羅爲末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣被覆之旣不粘衣被又復得睡不五七

日其瘡如失應手神效

疥瘡取楝根去外皮切皂角去皮子等分下篩脂和搔疥去痂塗之護風勿使女人鷄犬見

瘑疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘥後復發取羊蹄根去皮細切熟熬以大酢和先洗淨傅上一時再以冷水洗之日一傅瘥若爲末傅尤妙（千金翼）

沙瘡用水萵苣燒灰存性香油調傅立愈濕者乾傅

又方生韭一握切研用溫酢五合浸良久以布絞取汁塗瘡上日三四度用之

乾瘑濕瘑疥癬取連根生葱白猪脂和搗塗之

又方伏龍肝亂髮燒各七錢半爲末猪脂和塗

又方以雞冠血和黃連末塗之

香瓣瘡方治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈羖羊鬚荊芥乾棗去核各二錢右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油調塗先以溫湯淨洗拭乾塗藥三二次效亦治兩吻生瘡

卒得浸淫瘡不早治則遶身周匝能殺人外臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心用雄雞冠上刺血傅之日

三五度井治燥癬作痒

浸淫瘡痛不可忍發寒熱者刺薊末水調敷瘡上乾即易之

又方鯽魚一尾長三寸者豆豉一合杵如膏塗之亦療馬鞍瘡

又方苦瓠一兩虵退燒半兩露蜂房微炙半兩梁上塵爲末油調塗

鍼灸

甲乙經曰疥癬陽谿主之

醫學綱目曰手疥灸勞宮太陵

瘡疥頑癬取絕骨三里各寸半瀉間使解谿各五分血郄三寸

渾身生瘡疥取曲池合谷三里絕骨行間委中

證治準繩曰灸法曰中時灸病處影上三炷灸之咒曰癬中蟲毛戎戎若欲治待日中

又法八月朔日日出時令病人正向東面戶內長跪

平舉兩手持胷兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯或七壯十日愈

醫案

儒門事親曰貨生藥焦百善云有蕘夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言可治濃煎一椀服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流痛不可忍灸焫熏渫硫黃蕳茹白殭蠶羊蹄根之藥皆不效其人姿性妍好以此病不能出嫁其父母求療於戴人戴人曰能從余言則瘥父母諾之戴人以鈚針磨令尖快

當以痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不書以告後人恐爲癬藥所誤濕淫於血不可不砭者矣

蔡寨成家童子十歲病滿腹胷濕癬每爬搔則黃水出已年餘矣戴人先以苦瓜蔕末作丸上涌涌訖次以舟車丸濬川散下三五行次服凉膈散加朴硝煎成時時呷之不數日而愈

潁皐韓吉卿自胛至足生濕䘌瘡大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類蟲行袴襪愈而復生瘢痕成凹十餘年不瘥戴人哂之曰此濕䘌瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

薛己醫按曰一婦人患瘡疥作痒膿水不止脉浮無力以消風散四劑少愈更以四生丸月餘而平

一男子痒少痛多無膿水以芩連荆防山梔薄荷芍藥歸梢治之而愈

一男子焮痛發熱脉浮數以人參敗毒散四劑少愈更以當歸飲子數劑而愈

一男子焮痛寒熱便祕脉數有力以防風通聖散三劑少愈更以荊防敗毒散加黃芩山梔四劑而愈

一婦人作痒午後尤甚以當歸飲子數劑少愈更以人參荊芥散數劑而安

一男子久不愈搔起白屑耳作蟬聲以四生散數服痒止更以當歸飲子數劑而瘥

一男子下體居多焮痛日晡尤甚腿腕筋紫而脹就於紫處刺去瘀血以四物湯加芩連四劑而安患在上體若臂腕筋紫脹亦宜刺去其血以前湯加柴胡黃芩即愈

一男子搔痒成瘡日晡痛甚以四物加芩連荊防數劑而止更以四物加蒺藜何首烏黃芪二十劑而愈

稽勳李龍岡遍身患此腿足爲甚日晡益焮口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣六味丸而痊

一儒者患在臂腳日晡或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處發腫小便赤澀此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五味子麥門冬而愈

一儒者患此誤用攻伐之劑元氣虛而不能愈用補

中益氣湯加茯苓其瘡頓愈又因調養失宜日晡益甚用八珍湯加五味麥門五十餘劑而愈

一男子色黯作痒出黑血日晡益甚其腿日腫夜消余以爲氣血虛而有熱朝用補中益氣湯夕用加味逍遙散而愈

一男子時疫愈後所患如之用前藥補養而愈有同患用砭法出血而死此因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉

一婦人久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地黃治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用逍遙散以補脾胃生陰血亦有寒熱如瘧亦治以前藥

醫學綱目曰智化寺一僧患瘡疥自用雄黃艾葉等藥燃於被中熏之翊日遍身焮腫皮破水出飲食不入余投以解藥不應而死蓋藥毒熏入腹內而散眞氣其禍如此

一儒者善噯患痒余以爲內有濕熱腠理不密外邪

所搏也與補中益氣湯加白芷川芎治之不從自服荊防敗毒散盜汗發熱作渴焮痛膿水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十四卷目錄

醫部彙考三百七十四

外科反花天泡楊梅門

竇漢卿瘡瘍全書（天泡　楊梅）

薛己醫按（反花　天泡　楊梅）

王肯堂證治準繩（天泡　楊梅）

陳實功外科正宗（翻花　天泡　楊梅瘡總論　看法　治法）

張介賓景岳全書（天泡　楊梅　結毒）

方
清肌燥濕湯　泥金刮毒膏　汗藥　煎藥
熏洗方　點藥　行藥　點藥　武定侯
方　藜蘆膏　臙脂散　甘草塗傳方　惡實
根塗傳方　換肌消毒散　蠲痹消毒散　蠲
毒換肌散　楊梅瘡丸藥　發黴瘡毒方　圍
藥方　廣瘡膏　熏法　洗藥方　水銀膏
消風散　對金丸　黃蠟膏　末藥方　搽楊
梅瘡方　又方　神異膏　防風通聖散　大
連翹飲　冰螄散　珍珠散　解毒瀉心湯
清脾甘露飲　胡粉散　石珍散　加味遺糧
丸　解毒天漿散　升麻解毒湯　歸靈湯
防風必效散　翠雲散　鵝黃散
單方
醫案

藝術典第三百九十四卷

醫部彙考三百七十四

外科反花天泡楊梅門

宋竇漢卿瘡瘍全書

天泡

此瘡之發不拘老幼皆由受酷暑熱毒之氣蒸入肌肉初生一疱漸至遍體漫爛無休合家相染此證須要淨湯淋洗切勿以穢氣觸之內服清肌燥濕湯外用泥金刮毒膏

楊梅

一名廣東瘡一名徽瘡皆臟腑之積毒脾家之濕熱其起也有三因男子與生疳瘡婦人交熏其毒氣而生或體虛氣弱偶遇生瘡之人穢氣入於腸胃而生或先患瘡之人在於客厠去後其毒氣尚浮於客厠之中不知偶犯其毒氣熏入孔中漸至臟腑或在頭頂中或在肋下或糞門邊先起有雄有雌雄者大如白果遍身生五六十或百枚分顆不成片雌者小如豆瓣遍身連片膿汁淋漓深能累人嬰兒患此者皆父母胎中之毒也宜用汗藥宜用服藥宜用搽藥不可服丸劑恐內藏輕粉易愈故也但輕粉乃水銀昇者腐腸爛骨害不旋踵

薛己醫按

反花（瘡有努肉凸出者是）

翻花瘡者由瘡瘍潰後肝火血燥生風所致或瘡口努肉突出如菌大小不同或出如蛇頭長短不一治法當滋肝補氣外塗藜蘆膏努肉自入須候元氣漸復膿毒將盡塗之有效不然雖入而復潰若誤用刀

針蝕藥灸火其熱益甚或出血不止必致寒熱嘔吐等證須大補脾胃爲善

天泡

脈浮發熱或拘急者發散表邪脈沉發熱便祕者解表攻裏發熱小便赤澀者分利消毒

屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患受證在肝腎二經故多在下體發起有先筋骨痛而後患者有先患而後痛者初起脈浮數邪在脾肺經也先用荆防敗毒散解散之脈弦數邪在肝膽經也先用龍膽瀉肝湯清解之脈沉數邪在臟腑也先用內疎黃連湯通導之後用換肌消毒散爲主愈後再無筋骨疼痛之患若瘡凸赤作痛熱毒熾盛也瘡微作痛毒將殺也瘡色白而不結痂陽氣虛也色赤而不結痂陰血虛也瘙痒脈虛浮氣不能相榮也搔痒脈浮數血不能相榮也臀背間或頸間作痒膀胱陰虛也陰器間或股內痒肝經血虛也陰囊作痒重墜肝經陰虛濕熱也小便頻數短少色赤肝經陰虛也小便頻數色白短少脾肺氣虛也面目瘙痒或變赤外邪相搏也

眉間痒或毛落肝膽血燥也飲食少思口渴飲湯胃氣虛也飲食難化大便不實脾氣虛也侵晨或夜間泄瀉脾腎虛也若治失其法有蝕傷眼目腐爛玉莖拳攣肢體者但用九味蘆薈丸以清肝火六味丸以生腎水蠲痹解毒飲以養血祛邪亦有可愈者若誤用輕粉等劑反爲難治

楊梅

濕勝者宜先導濕表實者宜先解表裏實者宜先踈內表裏俱實者解表攻裏表虛者補氣裏虛者補血表裏俱虛者補氣血

王肯堂證治準繩

天泡

天泡瘡即丹毒之類而有疱者由天行少陽相火爲病故名天泡爲火熱客於皮膚間外不得泄怫熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裏達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦熱也則服凉膈散若從身半巳下起者則服黃連解毒和四物湯若發於

秋冬則宜升麻葛根犀角或加糵芩一二味外傅如馬齒莧吳藍赤小豆苧根之類皆解毒消腫可用於初起之時或蚶殼或龜甲水龍骨各煅存性則收濕生肌可用於浸淫之後

楊梅

或問廣瘡何如曰此肝腎二經濕熱或色慾太過腎經虛損感邪穢之氣而成或因下疳畜毒纏綿不已而作一名翻花瘡肉反於外狀如蠟色有如綿花故又名綿花瘡此則邪毒盛細小者名廣豆或如赤根膿窠此則邪毒淺凡患此證先宜食毒物以發之後服通聖散之類須用土茯苓對停服毒勢旣殺八珍十全大補湯之類以補氣血必守禁忌方獲全愈大忌房勞如犯之服藥不效慮後結毒一忌酸酢酸斂邪毒後結廣癬一忌白腸能發鬱火以致纏綿不已一忌輕粉及冷水致後筋骨疼痛結成風塊或一二年或數年方發其狀堅硬肉色平淡或痛或痒多結於骨節頭面喉鼻之間經絡交會之處已破則膿水淋漓甚可畏也輕則發廣癬亦名千層癬多生手心

足底重疊不已又有餘毒亦名氣毒筋骨疼痛來去不定亦名濕毒筋骨痛酸乍作乍止宜隨其淺深治之先服消風敗毒後服補劑瘡勢盛及結毒深者必用熏藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯大補湯之類弱者不宜熏恐不能勝火氣也

陳實功外科正宗

翻花

翻花者乃頭大而帶小小者如豆大者若菌無苦無疼揩之每流鮮血久亦虛人以唾津調冰螄散徧擦正面上用輭油紙包裹根帶細處用綿連紙紥緊十日後其患自落換珍珠散摻之收口又有根帶不小如鼈棋子樣難紥以前藥搽上用麪糊綿紙封上二重用心勿動亦以十日乃落摻珍珠散

天泡

天泡者乃心火妄動脾濕隨之有身體上下之不同寒熱天氣之微異上體者風熱多於濕熱宜涼血散風下體者濕熱多於風熱宜滲濕爲先外用胡粉散石珍珠散搽之自愈此不早治變爲頑風紫癜則難

痊矣

楊梅瘡總論

夫楊梅瘡者以其形似楊梅又名時瘡因時氣乖變邪氣湊襲又名綿花瘡以其綿綿難絕有此三者之稱總由濕熱邪火之化但氣化傳染者輕精化慾染者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部見之皮膚作痒筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝腎受毒其患先從下部見之筋骨多疼小便澀淋其形大而且硬如氣化者毒在皮膚未經入裏宜服萬靈丹洗浴發汗解散皮膚之毒精化者毒在骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以瀉骨中之毒甚者二服皆可行散之後體實者升麻解毒湯體弱者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡根淡白內毒已解方用點藥輕者半年重者一載始能得愈如患者不遵此法欲其速愈妄用熏條擦藥哈吸等法往往致成後患者多矣

看法

初起無頭痛筋骨不作痛小水無澀淋瘡乾細者輕

已生頭面稀少口角無瘡項下胷背雖多穀道尚無者可治初生瘡發下疳次生魚口復作筋骨疼痛瘡發非祥瘡生紅紫堅硬手足多生形如湯潑泡生害非輕淺

治法

初起先從澀淋次傳筋骨作疼後發其瘡亦宜攻利若外無疳瘡內無筋骨作痛時氣所感者微散之瘡從交媾不潔乃生下疳小水澀滯不通當行導利上部作痒瘡多消風清熱下部作疼痒甚瀉濕爲先紅紫盛瘡高涼血解毒淡白毒輕瘡薄攻補兼行手足皮膚枯槁鵝掌風生柏葉二礬煎湯熏洗即好頭髮眉毛脫油風何須說神應養眞丹早服稀疎脫點點楊花癬片片癩風瘡宜服換肌丸效應如同掃

景岳全書　臣張介賓著

天泡

天泡瘡形如水泡皮薄而澤或生頭面或生偏身乃太陰陽明風熱所致故見於皮毛肌肉之間宜清血涼血熱解則愈如兼表邪而發熱脉數者宜荆防敗

毒散如火盛者或加芩連連翹金銀花元參之屬如焮腫疼痛脉數便結者此表裏俱實也宜防風通聖散雙解之如外多毒水以金黃散敷之無有不愈

楊梅

楊梅瘡一證以其腫突紅爛狀如楊梅故爾名之其在西北人則名爲天泡瘡東南人又謂之廣東瘡凡毒輕而小者狀類茱萸故名茱萸瘡毒甚而大者泛爛可畏形如綿花故名綿花瘡大都此證必由淫毒傳染而生蓋此淫穢之毒由精泄之後氣從精道乘虛直透命門以灌衝脉所以外而皮毛內而骨髓凡衝脉所到之處則無處不到此其爲害最深最惡設初起時去毒不淨或治失其宜而隨至敗爛隕命者蓋不少矣或至二三十年之後猶然發爲瘋毒或致爛頭或致爛鼻或四肢幽隱之處臭爛不可收拾或遺毒兒女致患終身其惡如此靜而思之則有見此惡道而不爲寒心知避者其愚亦甚矣故凡治之之法最當知切要不可不愼也亦有不因淫毒傳染偶中濕熱而患者此不過在皮毛肌肉之間淸去濕熱

自當全愈無足慮也

今人每遭此毒或畏人知或畏毒甚而大用攻擊峻利等藥多致邪毒未除而元氣先敗或成痨瘵或卽殞命或愈久愈甚以致敗壞不能收斂皆元氣先敗之故也余見之多矣故凡被此病者切不可驚慌亦不可專肆攻擊但按法漸解其毒務使元氣毫無損傷則正能勝邪雖毒無害若正不勝邪則微毒亦能殺人此其要也不可不察

廣瘡治法凡其初起而元陽未傷毒亦未甚宜速用清利使從小便利去其毒惟換肌消毒散爲第一其次則五加皮飲亦妙或兼火邪者宜祕仙方餘糧湯或稟氣多弱者宜茯苓膏凡此諸藥或十日或半月甚者一月無不見效

凡生瘡毒者宜服槐花蕊至二三升則毒從小便泄去可免終身之患眞神方也

此瘡初起時多有先下疳次便毒而後瘡出是爲一套若便毒勢甚腫痛熱祕而元氣素強者卽宜用會膿散或牡蠣散先去其毒之大勢而後用前方諸藥

亦要著也

此瘡久而不愈或元氣素弱或因尅伐致虛但見有正不勝邪之勢則當酌其輕重或以純補元氣爲主凡脾腎陰陽氣血皆宜隨證用方但使氣血得復則雖毒無害最忌見不眞而執兩端則終歸無益亦是要著

飲食宜否有謂宜忌口者有謂不宜忌口者而任其發透總之亦有其要葢瘡毒初染毒本未甚此時只宜清利使毒漸消爲善若食發物則愈發愈多而毒愈甚矣此則宜忌之時也若瘡毒已久元氣已弱膿汁既多血氣既耗斯時也非以藥食滋補則日見消敗何以收效此則不宜忌者也宜忌不宜忌亦宜補不宜補之法耳使不知辨安能無誤

瘡生頭面或遍身不便處欲其速愈但用點藥則二三日可以脫落亦神妙者也但此惟治標之法耳

瘡毒久畜發爲風毒亦名楊梅癰漏或蝕筋或附骨潰爛不收最爲惡候近來治法惟五寶丹爲最效及徐東臯楊梅癰漏方或祕傳水銀膏宜擇用之

結毒

結毒者熏火收遏瘡毒而沉於骨髓也又有未經熏擦見苗未久服藥不多內毒未盡便用點藥收斂鬱遏毒氣者亦能致之發則先從筋骨疼痛日後漸漸腫起發無空處隨便可生發在關節中則損筋傷骨縱愈曲直不便發於口鼻則崩梁缺唇雖痊破形更相發於咽喉者更變聲音發於手足者妨於行走苦楚一生毒遺數代情關一錯禍起百端初起筋骨疼痛服金蟾脫甲酒發汗自愈虛弱者芎歸二朮湯頭疼欲破者天麻餅子併吹鼻碧雲散年餘流串筋骨不愈者五寶散虛弱者潰爛疼痛不斂者十全大補湯同土茯苓煎服初起筋骨痛甚者雷火針法已潰腐爛者解毒紫金膏依法施治年遠毒盛者元武丹兼外擦靈藥年代淺近者只在百日自然可愈毋得再熏爲禍害人也治法俱照楊梅瘡證

方

清肌燥濕湯

治天泡瘡

蒼朮　白朮　升麻　甘草　澤瀉　木通

生地　白芍　苦參　黃蘗　知母　黃芩

茯苓　枳殼　連翹　小柴胡

水二鍾薑三片棗二枚煎服

泥金刮毒膏

治前證

韭地蚯蚓糞三錢　元明粉二錢　滑石末一錢

右研細末新汲水調勻鵝毛潤患上三兩日然後再用茶洗淨將檳榔天花粉黃連黃蘗末各一錢面粉四錢和勻乾摻自愈

汗藥

治楊梅瘡

升麻　白芷　甘草　蒼朮　當歸　穿山甲
赤芍　羌活　獨活　防風　荊芥　柴胡
麻黃　連翹　木通　薄桂　桔梗　金銀花

水酒各一鍾煎八分乘熱服之以衣覆身出汗爲妙

煎藥

治前證

人參　白朮　防風　連翹　金銀花各一錢
木瓜二錢　白蘚皮一錢半　皂莢子　薏苡仁
當歸　川芎　白芍　熟地各八分　升麻
甘草各三分

用冷飯團四兩水六椀煎至四椀濾去滓每藥一

劑用汁二椀煎八分在上食後在下食前偏身不拘時服忌茄子糟物牛肉茶葉服四十劑方無後患巔頂加藁本

熏洗方

夏天一日一洗冬天兩日一洗

防風　芍藥　山梔　苦參　薄荷　金銀藤

蒼朮　黃蘗　地楡　黃芩　連翹　蘄艾

地骨皮　花粉　豨薟草各三錢　鉛一斤

紫蘇一把

水二斗煎數沸去查傾在浴盆內將板一片放在盆上坐之上下周圍以席遮護無風處拭乾後搽

點藥

點藥

珍珠一錢　麝香二分　杏仁去皮　輕粉各五錢

右四味各另研和勻用雄猪膽汁調勻搽入肌肉不見藥爲效如有水出再挹再搽

行藥

服藥久不愈

白殭蠶三錢　全蠍七枚焙　當歸　白芷
穿山甲炮各二錢　大黃焙四錢

右爲末五更空心蜜湯調下作丸酒下亦可利行數次薄粥補之或次日或隔一日如前服則濕熱蟲毒自消

點藥（景岳全書下同）

治綿花瘡

杏仁取霜　真輕粉

二味等分爲末敷於瘡上二三日卽痂脫落

武定侯方

治前證

雄黃一錢半　杏仁去皮三十粒　輕粉一錢

右同細末用雄猪膽汁調敷之二三日卽愈百發百中天下第一方也

藜蘆膏

治一切瘡疽努肉突出不問大小長短

藜蘆

一味爲末以生猪脂和研如膏塗患處周日易之

臙脂散

治反花瘡

臙脂　貝母　胡粉各一分　硼砂　沒藥各半分

右研細先以溫漿水洗拭後傅藥

甘草塗傅方

治反花瘡

甘草半生半炒　礬石　人中白　密陀僧各半兩

右爲細末以童子小便半盞以火熬用竹篦攪成膏取塗瘡上日五次

惡實根塗傅方

治反花瘡並諸瘡積年不瘥者

惡實根研末四兩　猪脂二兩

右調和糊塗瘡上日三四次

換肌消毒散

治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓五錢　當歸酒洗　白芷　皂角刺

薏苡仁各一錢　白鮮皮　木瓜不犯鐵器

木通　金銀花各七分　炙甘草五分

右水煎服

蠲痺消毒散

治時瘡肢節拘攣

薑黃　土茯苓　獨活各五錢　白朮　當歸各一錢五分　赤芍藥一錢　白芷五分

右水煎服

蠲毒換肌散

治楊梅瘡

冷飯團白色者木搥打碎四兩

右以長流水四大椀入砂鍋內煎至三椀入後藥

黃苦蔞連仁切一箇　黃芪用鹽水炒三錢

白芍藥　當歸各一錢半　木瓜　白芷　風藤

白蘚皮　貝母　天花粉　穿山甲　皂角刺

甘草節各一錢　漢防己七分　金銀花三錢

鼈蝨胡麻炒研二錢　猪胰子切碎一兩

右再煎至一大椀通口頓服胃弱者分爲二服日三服

楊梅瘡丸藥

白花蛇四寸酥炙　露蜂房一枚煅　全蠍四枚酒浸蜜炙去足螯　蜈蚣二條煅　龜板一兩酥炙
雄黃　飛丹各一錢　槐花米　雨前茶各五錢
孩兒茶　辰砂各五分爲衣　麝香三分同炒爲衣
右用黃米飯爲丸日進二三服好酒送下七日後瘡即光矣

發黴瘡毒方

雄羊肉一斤水八椀煮熟入後藥再煮　川芎
大黃　蟬蛻　麻黃　威靈仙各一兩（虛者少用）
共五味入羊肉內煎至一大椀空心服其羊肉任意食之蓋被取汗天明洗浴只用一貼立效

圍藥方

丁香　檀香　沉香　乳香各五錢　麝香一錢
桑霜二兩　赤石脂三兩
鹻水調圍

廣瘡膏

亦治結毒
黃連　黃蠟各三錢　木鼈去殼　蘄艾各二錢

韶粉　白蠟各一錢半　雄黃一錢　龍骨五分

冰片一分　爐甘石五錢

香油煎膏原方有樟腦三錢恐作痛故去之

熏法

治楊梅瘡毒流注四肢或徧身結成大瘡久不能愈者用此法熏之極妙能收輕粉毒

好蘄艾葉一斤揉熟　雄黃　黃丹各一兩

松香四兩　蒼朮半斤米泔製過

右四味爲末入艾拌勻用黃紙做成藥筒五寸長以火燒著一頭將烟熏瘡口待筒燒過一半去筒用水銀膏貼之次日又洗又熏之半月有效如重二十日有效

洗藥方

石菖蒲　荆芥　防風　羌活　獨活　金銀藤

地骨皮　何首烏　甘草

右日日煎湯洗之

水銀膏

亦治臁瘡

無名異　水銀　銀朱　黃丹　百草霜各等分

右研極細和勻用桐油調成膏油紙攤作隔紙膏貼之其油紙先用黃連黃蘗煎湯刷數遍然後攤貼

消風散

治久年楊梅漏毒瘡（葉心仰方下同）

川連　黃蘗　黃芩　防風　荊芥　梔子

連翹　赤芍　白芍　川芎　陳皮　牛膝

甘草　蒺藜　京子　木瓜　苦參　元參

羌活　獨活　生地　大黃

用水煎服實者服七八貼虛者少服再服對金丸收功

對金丸

治久年漏毒楊梅瘡

上好輕粉不拘多少用黃連一錢黃蘗黃芩各二錢三味以水煎濃汁濾去查入輕粉於汁內浸一宿次日去汁曬乾爲細末四錢　雄黃　乳香生

硃砂　沒藥生　白芷曬乾　公丁香各二錢半

歸鬚曬乾　淨槐花曬乾　淨金銀花各一兩

十味共爲末米糊爲丸如菉豆大每日早晚空心服十九俱用土茯苓煎湯送下服至六七日內牙齒肉疼痛時其丸莫服停止三五日俟痛止後每日仍服二次收功其丸雖小力量最大切不可多服謹慎謹慎小兒只可服二三丸

黃蠟膏

治年久毒漏楊梅癧疽裏外臁痛身上爛者

川黃連　黃蘗　荊芥　白芷　紫草　苦參

鬱金各一錢　大楓子九箇

右作一貼用麻油一盞猪油一斤如銅錢大將藥入油內同煎煎至藥查黑色用櫻一片濾去查再煎先放松香二錢鎔化後入黃蠟五錢白蠟五錢鎔化取起將椀盛著再入後末藥

末藥方

輕粉一錢　枯礬五分　兒茶八分　自然銅煉過酢淬七次用六分　髗殼燒灰二錢

五味共研末入前黃蠟膏內

搽楊梅瘡方

烏棗肉燒灰一兩　膽礬七分　輕粉二錢

用猪膽汁調搽

又方

搽楊梅頑瘡久不愈者

升過鉛粉一錢　眞輕粉二錢　杏仁七箇

三仙丹一分

右將鉛粉輕粉三仙丹共爲細末後擂杏仁極爛似糍樣更將草藥仙草葉擂爛作餅子貼此藥於瘡上六七日取下即愈先將苦薺菜煎水洗去皮方用此藥搽於瘡上

神異膏

治癰疽瘡毒甚效此瘡瘍中第一藥也

露蜂房兒少者　杏仁去皮尖雙仁各一兩

蛇蛻鹽水洗焙　元參各半兩　黃芪三錢

男子髮洗如雞子一團　黃丹十二兩　麻油二斤

先以杏仁元參黃芪入油煎至將黑色方入蜂房蛇蛻亂髮再煎至黑濾去查徐徐下黃丹慢火煎

以柳枝不住手攪滴水捻輭硬得中即成膏矣

防風通聖散

治一切風熱積毒瘡腫發熱便祕表裏俱實者

芍藥炒　芒硝　滑石煅　川芎　當歸酒拌

桔梗　石膏煅　荊芥　麻黃各四分半　薄荷

大黃煨　山梔炒　白朮炒　連翹　甘草炙

防風　黃芩炒各五分

作一劑水二鍾煎八分服

大連翹飲

治斑疹丹毒瘙痒或作痛及大人小兒風邪熱毒焮痛或作痒小便澀

連翹　瞿麥　荊芥　木通　芍藥　當歸酒拌

蟬蛻　甘草　防風　柴胡　滑石煅　山梔炒

黃芩各一錢

作一劑水一鍾半煎七分如小兒宜爲細末每服一二錢滾湯調下

冰螄散（正宗下同）

治翻花瘡

大田螺五枚去殼線穿曬乾　白砒一錢二分麪裹
煨熟　冰片一分　硇砂二分

用曬乾螺肉切片同煨熟白砒研爲細末加片硇
再研密收

珍珠散

治前證

青缸花五分　珍珠一錢入豆腐內煑數滾研細
眞輕粉一兩

右三味共研千轉細如飛麪密收

解毒瀉心湯

治心經火旺酷暑時臨致生天泡發及徧身者

黃連　防風　荆芥　山梔　黃芩　牛蒡子
滑石　元參　知母　石膏各一錢　甘草
木通各五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

清脾甘露飲

治脾經濕熱鬱遏乃生天泡下體多而疼痛者

白朮　赤茯苓　山梔　茵陳　麥門冬　生地

黃芩　枳殼　蒼朮　澤瀉　連翹　甘草

元明粉各等分

右水二鍾竹葉燈心各二十件煎八分食前服

胡粉散

治天泡紅腫發熱急脹疼痛用針挑破摻此藥

杭粉一兩　輕粉　石膏煅　蛤粉各二錢

共研極細挹乾患上用此摻之或用絲瓜葉搗汁調搽亦好如冬月無此用染布青缸汁調搽

石珍散

治天泡日久作爛疼痛不已膿水淋漓者

石膏煅　輕粉各一兩　青黛　黃蘗末各三錢

右共研極細甘草湯洗淨以此藥摻之其疼即止

加味遺糧丸

治楊梅初起筋骨疼痛及已成數月延綿不已幷楊梅風毒誤服輕粉癱瘓骨疼不能動履

川芎　當歸　防風　薏苡仁　木瓜　金銀花

木通　白癬皮　茅山蒼朮　威靈仙各一錢

甘草五分　皂莢子五箇切片微炒　仙遺糧二兩

瘡久氣虛者加人參水二椀煎八分量病上下食前後服腿腳之下加牛膝一錢病淺者一月可退病深者百日可痊忌牛肉燒酒海腥煎炒此瘡發時多先起於下疳若以此方預服之可以止其不發梅瘡也

解毒天漿散

治楊梅瘡不問新久遍身潰爛及筋骨作疼者

天花粉二錢　防風　防己　皂角針　白蘚皮
連翹　川芎　當歸　風藤　木瓜　金銀花
蟬蛻　薏苡仁各一錢　甘草五分　土茯苓二兩

下部加牛膝水二鍾煎八分臨服入酒一杯量病上下服之

升麻解毒湯

治楊梅瘡筋骨疼痛久而不愈及治遠年近日流注結毒皮肉破爛咽喉損破者並宜服之

川升麻　新鮮皂角針各四錢　上白土茯苓一斤

右項已上加白芷咽內加桔梗胷腹加白芍肩背加羌活下部加牛膝各一錢用水八椀煎至四椀

作四次一日服盡每次頓熱加麻油三茶匙和勻量病上下食前後服之瘡甚者不過十服

歸靈湯

治楊梅瘡不問新久但元氣虛弱者

川芎　當歸　白芍　熟地　薏苡仁　木瓜

防己　天花粉　金銀花　白蘚皮　人參

白朮各一錢　甘草五分　威靈仙六分

下部加牛膝五分水三鍾煎二鍾二次量上下食前後服之查再煎八分服

防風必效散

治楊梅瘡濕熱太盛瘡高稠密元氣素實者

防風　防己　荊芥　白蘚皮　連翹　槐花

蒼朮　皂角針　風藤　木通　白芷　天花粉

木瓜　金銀花　翻白草各一錢　甘草五分

土茯苓四兩

初起加大黃三錢水三椀煎二椀二次服查再煎一椀服後飲酒一大杯卽靜睡一時許更妙

翠雲散

治楊梅瘡已服內藥根脚不紅瘡勢已退者

銅綠　膽礬各五錢　輕粉　石膏煆各一兩

共研極細磁罐收貯濕瘡乾摻乾瘡公猪膽汁調塗三日點三次其瘡自乾而愈

鵝黃散

治楊梅瘡潰爛成片膿穢多而疼甚者

石膏煆　輕粉　黃蘗炒

右各等分爲極細末乾摻爛上卽可生疤再爛再摻毒盡乃愈此解毒止痛收乾之效藥也

單方

反花惡瘡胡粉胭脂各一兩爲末鹽湯洗淨敷之日五次（聖惠下同）

反花瘡毒初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出於外鵓鴿屎三兩炒黃爲末溫漿水洗後敷之

反花惡瘡肉出如飯粒根深膿潰柳枝葉三斤水五升煎汁二升熬如餳日三塗之

反花惡瘡鯽魚一箇去腸以羯羊屎塡滿燒存性先以米泔洗過搽之

反花惡瘡內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出於外鼠尾草根切同猪脂搗敷（總錄下同）

又方蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上

又方藜蘆末猪脂和傅日三五上

又方雞腸草研汁拂之或爲末猪脂調擦極效（醫林正宗）

又方馬齒莧一斤燒研猪脂和傅

天泡濕瘡龍葵苗葉搗敷之

又方天泡草鈴兒搗敷之亦可爲末油調敷（雜興方）

天泡熱瘡藍葉搗敷之（聖惠）

天泡濕瘡花粉滑石等分爲末水調搽之（普濟方下同）

又方無名異末井華水調服之

又方野菊花根棗木煎湯洗之（集成）

又方黃藥子末搽之（集簡方下同）

又方生百合搗搽一二日卽安

又方絲瓜汁調辰粉頻搽之

又方荷花貼之（簡便方）

又方蓮蓬殼燒存性研末井泥調塗神效（海上方）

楊梅毒瘡用銅綠醋煮研末燒酒調搽極痛出水次

日卽乾或加白礬等分研摻（簡便方）

又方黑鉛廣錫各二錢半結砂蜈蚣二條爲末紙捲作撚油浸一夜點燈日照瘡二次七日見效（集元方）

楊梅毒瘡水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五分爲末以紙捲作小撚染油點燈日照瘡三次七日見效

又方用水銀黑鉛結砂銀硃各二錢白花蛇一錢爲末作紙撚七條頭日用三條自後日用一條香油點燈放被內熏之勿透風頭上有瘡連頭蓋之

又方水銀一錢二分黑鉛白錫各八分共結砂黃丹四分硃砂六分爲末分作十二紙撚以香油浸燈盞內點於小桶中以被圍病人坐之以鼻細細吸咽三日後口吐出惡物爲效

楊梅瘡癬汞粉大楓子肉等分爲末塗之卽愈（衞生下同）

又方用輕粉二錢杏仁四十二箇去皮洗瘡拭乾搽之不過三日卽愈乾則以鵝膽汁調

楊梅毒瘡用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢半槐花炒龜板炙各一兩爲末糊丸梧子大每服一錢冷茶下

日二服七日愈（統旨）

又方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉各二錢搗丸分作三服初日雞湯下二日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七日痂落（經驗方）

又方用豶猪腎一對去膜批開各摻輕粉一錢紮定麻油二兩煨熟頓食若口腫牙疼仍服金銀花藥

又方用大雞卵一枚去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食

楊梅毒瘡銀硃官香等分爲末以紙捲作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日一作七日愈

又方銀朱二錢孩兒茶龍掛香皂角子各一錢爲末如上法用

又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和水以油紙攤貼瘡痂自脫也

楊梅毒瘡酢調膽礬末傅之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二上卽乾

楊梅毒瘡用冷飯團四兩皂角子七箇水煎代茶飲淺者二七深者四七見效（雜興方下同）

又方冷飯團一兩五加皮皂角子苦參各三錢金銀花一錢好酒煎日一服

楊梅癬瘡水萍煎汁浸洗半日數日一作（集簡方下同）

楊梅毒瘡乃陽明積熱所生槐花四兩略炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿用

椰子瓢主治楊梅瘡筋骨痛燒存性臨時炒熱以滾酒泡服二三錢暖覆取汗其痛卽止神驗（時珍）

楊梅瘡爛古牆上螺螄殼辰砂等分片腦少許爲末擦之

楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨減

又方大楓子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之（衞生方）

楊梅天泡天花粉芎藭各四兩槐花一兩爲末米糊丸梧子大每空心淡薑湯下七八十丸（簡便方）

楊梅諸瘡水銀一兩朱砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武火煉升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分灑太乙

膏上貼之絕效名五寶霜

又方粉霜一味搽之（集簡方）

又方龍掛香孩兒茶皂角子各一錢銀朱二錢爲末紙捲作撚點燈置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥瘡即乾（集簡方）

楊梅瘡不拘新久輕重皆效名金蟾蛻甲酒用好酒五斤大蝦蟆一箇浸酒內封瓶口煮香二枝取起待次日隨量之大小以醉爲度冬夏蓋煖出汗爲效存酒次日只服量之一半酒盡瘡愈又治楊梅結毒筋骨疼痛諸藥不效者更妙服七日後不許見風爲要忌口及房事百日絕根矣

醫案

薛己醫按曰判官張承恩內股患癰將愈翻出一肉如菌余曰此屬肝經風熱血燥當清肝熱養肝血彼謂不然乃內用降火外用追蝕蝕而復翻翻而復蝕其肉益大元氣益虛始信余言遂內用梔子清肝散外用藜蘆膏而痊

一上舍素膏粱善怒耳下結一核從潰而瘡口翻張如菌焮連頭痛或胷脅作脹或內熱寒熱或用清熱消毒之藥年餘未瘥余用補中益氣湯六味地黃丸

而尋愈

一男子背瘡斂如豆許翻出肉寸餘用消蝕割繫法屢去屢大此肝經血虛風熱余用加味逍遙散三十餘劑塗藜蘆膏而消又用八珍散倍用參芪歸朮而斂

一婦人素善怒臂患癰瘡口出肉長二寸許此肝脾鬱怒氣血虛而風內動用加味逍遙散塗藜蘆膏而愈後因怒患處脹悶遍身汗出如雨此肝經風熱風能散氣故耳仍用前散并八珍湯而愈

一男子項患腫痰涎涌甚用散堅行氣等劑腫硬愈甚喘氣發熱自汗盜汗體倦食少余曰此屬足三陰虧損當滋化源不信及追蝕患處開翻六寸許參巖色赤日出鮮血三月餘矣肝脈弦洪緊實余用大補湯加麥門五味五十餘劑諸證漸愈血止三四復因怒飲食頓少其血湧出此肝傷不能藏脾傷不能攝也用補中益氣湯爲主加五味麥門其血頓止再以六味丸加五味子常服瘡口斂至寸許遂不用藥且不守禁而歿

一小兒患天泡瘡焮痛發熱脉浮數挑去毒水以黃蘗滑石末敷之更飲荆防敗毒散二劑而愈

一男子焮痛發熱服祛風清熱藥愈熾診其脉沉實乃邪在內也用防風通聖散一劑頓愈又以荆防敗毒散二劑而安夫此證雖屬風熱當審其表裏治之方無悞矣

毛閣老孫年十餘歲背側患水泡數顆發熱脉數此肺胃經風熱所致名曰天泡瘡遂以荆防敗毒散加芩連服之外去毒水以金黃散敷之又四劑而愈

楊文魁腹患此延及腰背焮痛飲冷數脉按之愈大乃表裏俱實也以防風通聖散一劑更敷前散勢減大半再以荆防敗毒散二劑而愈

一男子患楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水淋漓少食無睡久而不愈以八珍湯加茯神炒酸棗仁服每日以蒜搗爛塗患處灸良久隨貼膏藥數日少可卻用豆豉餅灸更服十全大補湯而愈凡有腫硬或作痛亦用蒜灸及敷沖和膏內服補藥並效

一男子玉莖患楊梅瘡腫痛先以導水丸龍膽瀉肝

湯各四服少愈再以小柴胡湯加黃蘗蒼术五十餘劑而平

一男子玉莖腫潰小便赤色肝脉弦數以小柴胡湯加木通青皮龍膽草四劑又以龍膽瀉肝湯數劑而痊

一童子玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞蘆薈丸更貼神異膏月餘而安

一男子遍身皆患左手脉浮而數以荊防敗毒散治之表證乃退以仙方活命飲六劑瘡漸愈兼飲萆薢

湯月餘而愈

一婦人焮痛便祕作渴脉沉實以內疎黃連湯二劑裏證已退以龍膽瀉肝湯數劑瘡毒頓退間服萆薢湯月餘而愈

一男子患之發寒熱便祕作渴兩手脉實以防風通聖散治之而退以荊防敗毒散兼龍膽瀉肝湯而痊

一男子愈後腿腫一塊久而潰爛不斂以蒜搗爛敷患處用艾隔蒜灸之更貼神異膏及服黑丸子并托裏藥兩月而愈

一婦人燃輕粉藥於被中熏之致遍身皮塌膿水淋漓不能起居以滑石黃蘗菉豆粉末等分鋪席上令可臥更飲金銀花散月餘而痊

一男子愈後但背腫一塊甚硬肉色不變年餘方潰出水三載不愈氣血俱虛飲食少思以六君子湯加當歸藿香三十餘劑少愈更飲萆薢湯兩月餘而愈

一男子患之勢熾兼脾胃氣血皆虛亦服前藥而瘥

一婦人患之皆愈唯兩腿兩臁各爛一塊如掌兼筋攣骨痛三載不愈諸藥不應日晡熱甚飲食少思以萆薢湯兼逍遙散倍用茯苓白朮數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜仲木瓜三十餘劑而痊

一儒者患前證色焮赤作痛大便祕而不實服祛風敗毒等藥舌痛口乾脈浮而數此邪氣去而陰虛所致用六味丸料加山梔當歸四劑脈證頓退又用八珍湯加山梔丹皮瘡色漸白後用四君加歸芪而愈

一患者服攻毒等藥患處凸而色赤作痛肢體倦怠惡寒發熱脈浮而虛此元氣傷而邪氣實也用補中

益氣湯二劑而痊

一儒者患之誤服祛風消毒之藥致傷元氣因勞役過度內熱口乾齒齦腫痛右關脉洪數而虛此脾胃受傷而火動用清胃散之類而愈

進士劉華甫患之數月用輕粉硃砂等藥頭面臂臀各結一塊二寸許潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥脣裂小便淋漓痰涎上湧飲食少思此脾胃傷諸臟弱而虛火動也用六君子二十餘劑又用補中益氣加山茱萸山藥麥門五味服之胃氣復而諸證愈唯小便未清涎未止用加減八味丸而痊

一儒者患之頭面搔痒或成粒或成片或出水脾肺脉俱洪數此風邪所傷先用荊防敗毒散加萆薢鉤藤鉤數劑漸愈但口乾內熱用四物加山梔鉤藤鉤金銀花甘草節而愈後遍身搔痒內熱口乾佐以六味丸而痊

外科正宗曰一男子患楊梅瘡兩月餘自服敗毒涼劑不應筋骨疼痛表裏寒涼雜投以致毒沉難出必以辛熱發之用萬靈丹葱酒煎服洗浴蓋之先出冷

汗如雨次出熱汗疼痛減其大半以歸靈湯服至月餘瘡勢始定以萆薢湯兼補中益氣湯又兩月餘而始痊愈

一女人丈夫生瘡所襲筋骨至疼遇晩寒甚以人參敗毒散四劑其寒乃退疼尚不止又以萬靈丹發汗二次方出點如豆大頭面及背肉無餘隙此毒之盛也以防風通聖散二劑通利大小便去硝黃加皂角針金銀花又十餘劑其瘡漸大小者如錢大者若杯氣穢作爛起坐不堪外以石珍散摻爛上結疤又爛又摻內服加味遺糧湯兩月餘瘡始漸乾輕者收斂而脫重者又半年方得痊愈

一庠生患楊梅瘡月餘乃求速愈予曰此患非他恙所比若速愈必遺毒於後日辭不敢治更醫醫曰半月全愈後亦無患因喜不勝用水銀膽礬等藥搽擦手足二心半月內其瘡果愈隨後骨疼諸藥不應半年後內毒方出作爛痛不堪言遍腿相串並無一空又二年腿脚曲而不直竟成痼疾終身又兼耳聾全不相聽

一妓者患楊梅瘡欲其速愈以照藥熏之三日後吐鮮血數盆亦死此求速愈自取危亡者也

一男子患楊梅瘡熏藥之後六年患結毒兩腿骨痛半年始腫以雷火針於腫小者一處腫大者三處針之七日後作膿腐潰內服仙遺糧湯兩月餘其疼漸止腫亦漸消又兩月方得腐盡肌生更服十全大補湯三月而斂

一男子玉莖結毒半年陽物已損七八遇方士以熏藥照之患上流血不止人似鬼形予曰毒發已傷元氣再加熏火一逼血得熱而妄行故去盆許血乃有限之物也恐其難保先以四物湯兼黃連解毒湯合而服之六劑其血乃止更以八珍湯加麥冬五味子黃蘗知母十餘服元氣乃定外以甘草湯浴洗患上以銀粉散搽之如此月餘氣血漸醒紅肉漸生陽物復長大半仍用前湯加土茯苓二兩煎服此不捨其根本共約有四月之久其疾乃愈

一男子患結毒頭疼欲破至夜尤甚苦楚不睡自以解毒藥治之俱不相應診之寸關脉細數而無力此

虛陽之火上攻以補中益氣湯加茯苓一兩服至三劑其疼漸止又十餘劑其疾全安而不再發

一男子患結毒自膝以下腐爛無空伏枕半年內以芎歸二朮湯外以甘草白芷歸尾葱白煎洗三日一度以解毒紫金膏搽之如此三月餘漸漸而安唯足不能步履以史國公藥酒加土茯苓一斤浸煮又服半年其足方能步履又一料行步居然如舊

一婦人患結毒頭疼手腕俱痛診之脉滑而弦此痰毒相益之病也以天麻餅子服之半月頭痛痊安又以二陳兼四物湯加紅花升麻黃芩服至月餘而愈

一男子患結毒頭額腐爛外搽解毒紫金膏內以萆薢湯兩月餘而斂又一人小腿患之年餘仍以前藥而愈

一婦人患結毒咽間損壞半年湯藥難下幾死服結毒紫金丹外吹結毒靈藥一月內其疾痊安又一女人手膊頭背腫痛六七年不潰諸藥不應仍服前藥而安

一男子患結毒咽喉腐爛于以遺糧湯內服外用解

毒生肌藥治之彼以爲緩仍用熏藥熏之口爛大便純去黑血及遍身浮腫飲食不進肌破三月而死

景岳全書曰余嘗治一少年因偶觸穢毒遽患下疳始潰龜頭敷治不效隨從馬口延入尿管以漸而深直至肛門逐節腫痛形如魚骨每過夜則膿結馬口脹不得出潤而通之則先膿後尿敷洗皆不能及甚爲危懼余嘗遇一山叟傳得槐花蕊方因以治之不十日而莖根漸愈半月後卽自內達外退至馬口而全愈疳愈後卽見些微廣瘡復與五加皮飲十餘劑而全愈向彼傳方者曰此方善治淫瘡熱毒悉從小便瀉去所以能治此瘡但服此者可免終身瘡毒後患然猶有解毒奇驗則在瘡發之時但見通身忽有雲片紅斑數日而沒者卽皆瘡毒應發之處瘡毒已解而瘡形猶見是其驗也余初未之信及此人瘡發之時瘡固不多而通身紅斑果見凡兩日而沒余始知藥之有奇一至如此

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二八六四

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十五卷目錄

醫部彙考三百七十五

外科癭瘤肬痣門

黃帝靈樞經（刺節眞邪篇）

竇漢卿瘡瘍全書（諸瘤　雀子斑）

陳無擇三因方（癭瘤）

張從政儒門事親（癭）

朱震亨心法（癭氣）

薛己醫按（論瘤　疣）
李梴醫學入門（癭瘤疣疣）
王肯堂證治準繩（瘤證治法）
陳實功外科正宗（癭瘤論　看法　治法　雀斑　枯筋箭　黑子　血痣）
張介賓景岳全書（瘤贅）
陳士鐸石室祕籙（癭瘤治法不同）
方（海藻丸　守癭丸　白頭翁丸　海藻散堅丸　木通散　五癭丸　昆布丸　藻藥散　二海丸　消癭散　含化丸　通氣丸　昆布散　破結散　玉壺散　人参化癭丸　寶金散　海帶丸　昆布散　又方　神驗方　神效開結散　清上消鬱湯　解下除濕湯）

枯瘤膏　井金散　造土黃法　黃龍膏　枯瘤方　神驗點方　龍骨散　麻藥方　止血藥　桃紅散　梅花散　箍藥　又方　祛風換肌膏　玉面桃花粉　一井散　小黃膏　五癭方　又方　陷脈散　又方　生肉膏　清肝蘆薈丸　芩連二母丸　順氣歸脾丸　通氣散堅丸　調元腎氣丸　海藻玉壺湯　活血散癭湯　六軍丸　枯瘤方　祕傳斂瘤　琥珀黑龍丹　十全流氣飲　涼血地黃湯　玉容丸　玉肌散
單方
鍼灸
醫案

藝術典第三百九十五卷

醫部彙考三百七十五

外科瘻癘疣瘜門

黃帝靈樞經

刺節眞邪篇

虛邪之入於身也深寒與熱相搏久畱而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕有所疾前筋筋屈不能伸邪氣居其間而不反發爲筋溜有所結氣歸之衞氣畱之不

得反津液久留合而爲腸溜久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易甚連以聚居爲昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則爲骨疽有所結中於肉宗氣歸之邪留而不去有熱則化而爲膿無熱則爲肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也

註 此言形傷則病氣氣傷則病形也結氣歸之者寒熱相搏之氣歸於邪留之形所也凡此數氣發無定處而有肉枯骨蝕筋溜昔瘤之定名

宋竇漢卿瘡瘍全書

諸瘤

此證受在六腑流在經絡風寒濕熱傷於心肝脾腎之間血聚不散日漸增長或有破者可將梅花散傳之已結聚者先用點藥敷於瘿瘤中心待七日後方可取去惡物後用膏藥貼之內服祕方流氣飲治之不可輕易

雀子斑

此證出於肺經或母受胎之際不守禁忌因夫醉酒

當風行房感集邪氣況肺爲五臟之蓋故肺風發外而成雀子斑也宜用驅風換肌膏治之

陳無擇三因方

癭瘤

癭多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠寖大寖長堅硬不可移者名曰石癭皮色不變者名曰肉癭筋脈露結者名曰石癭赤脈交結者名曰血癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄決破則膿血崩潰多致夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤氣瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人惟脂瘤破而去其脂粉則愈

元張從政儒門事親

癭

夫癭囊腫悶嵇叔夜養生論云頸如險而癭水土之使然也可用人參化癭丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水甕中常食亦可消矣

朱震亨心法

癭氣

癭氣先須斷厚味

結核或在項在頸在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

明薛己醫按

論癅

內經云肝統筋而藏血心裹血而主脉脾主肉而統血肺主氣而司腠理腎統骨而主水若怒動肝火血涸而筋攣者其自筋腫起按之如筋久而或有血縷名曰筋癅用六味地黃丸四物山梔木瓜之類若怒動肝火陰血沸騰外邪相搏而爲腫者其自肌肉腫起久而有赤縷或皮俱赤名曰血癅用四物茯苓遠志之類若鬱結傷脾肌肉消薄外邪所搏而爲腫者其自肌肉腫起按之實軟名曰肉癅用歸脾益氣二湯若勞傷肺氣腠理不密外邪所搏而壅腫者其自皮膚腫起按之浮軟名曰氣癅用補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而爲腫者其自骨腫起按之堅硬名曰骨癅用地黃丸及補中益氣湯主之夫瘤者

留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血乖違當求其屬而治其本大凡屬肝膽二經結核八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺金生腎水若屬肝火血燥須生血凉血用四物二地丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者補中益氣兼服若治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒氣凝於瘡口榮氣不能滋養於患處以致久不生肌而成漏者悉調補脾胃則氣血壯而肌肉自生矣若不慎飲食起居及六淫七情或用寒凉蝕藥蛛絲纏芫花線等法以治其外則誤矣

疣

疣屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋攣也宜以地黃丸滋腎水以生肝血爲善若用蛛絲纏螳螂蝕著艾灸必多致誤大抵此證與血燥結核相同故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗證

李梴醫學入門

癭瘤疣疣

舊分五癭六瘤惟薛立齋止言五瘤蓋癭瘤本共一種皆痰氣結成惟形有大小及生頸項徧身之殊耳立齋云肝統筋怒動肝火血燥筋攣曰筋瘤心主血勞役火動陰火沸騰外邪所搏而爲腫曰血瘤脾主肉鬱結傷脾肌肉消薄外邪搏而爲腫曰肉瘤肺主氣勞動元氣腠理不密外邪搏而爲腫曰氣瘤腎主骨勞傷腎水不能榮骨而爲腫曰骨瘤瘤之名有五者此也仁齋云筋脉呈露曰筋癭赤脉交絡曰血癭皮色不變曰肉癭隨憂愁消長曰氣癭堅鞕不可移曰石癭癭之名有五者此也癭瘤俱內應五臟藥治相同

癭瘤所以兩名者以癭形似櫻桃一邊腫大似櫻桃垂皮而寬不急原因憂恚所生故又曰癭氣今之所謂影囊者是也瘤初起如梅李皮嫩而光漸如石榴瓜瓠之狀原因七情勞役復被外邪生痰聚瘀隨氣留住故又曰瘤總皆氣血凝滯結成惟憂恚耗傷心肺故癭多著頸項及肩勞慾邪氣乘經之虛而作故

瘤隨處有之

癭瘤或軟或鞕無痛無癢體實者海藻散堅丸海帶丸痰火盛者舐掌散神效開結散此皆化痰行氣破堅之劑久虛者不可妄服虛者筋瘤腎氣丸或八物湯加山梔木瓜炒黑龍膽草肝火盛者間以蘆薈丸暫服血瘤四物湯加茯苓遠志肉瘤歸脾湯補中益氣湯骨瘤腎氣丸補中益氣湯

通用初起者十六味流氣飲單蜘蛛方稍久者蠟礬丸常服自然縮小消磨外敷南星膏切不可輕用針刀決破破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人但有一種脂瘤紅粉色全是痰結用利刀破去脂粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點其蒂俟茄落即用生肌斂口藥敷之防其出血

疣多患於手背及指間或如黃豆大或如聚粟或如熟甚拔之則絲長三四寸許又曰手背發

風熱血燥筋縮者八味逍遙散加黃連或清肝益榮湯怒動肝火者柴胡清肝湯亡精腎枯筋縮者腎氣丸誤用寒涼降火之藥及螳蜋蝕蜘蛛絲纏芫花漿

線繫著艾灸等法輕者反劇實者大潰腫痛發熱出血而死慎之

疣瘡如魚鱗痣與千日瘡一樣多生手足又名晦氣瘡宜艾灸初起者則餘者皆落神效

王肯堂證治準繩

瘤證治法

六瘤者隨氣凝結皮膚之中忽然腫起狀如梅李皮輭而光漸如盃卵若發腫都輭不痛者血瘤發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤氣結微腫久而不消後亦成膿諸瘤贅等至年衰皆自內潰治於壯年可無後憂按之推移得動者可用取法去之如推之不動者不可取也瘤無大小不量可否而妄取之必妨人命俗云瘤者留也不可輕去不爲無理

治法先以鐵罐膏點瘤頂上令肉黑腐不痛方可以刀剪去黑腐又以藥塗令肉腐潰又可剪之又塗又剪瘤根去盡爲度若怕針刀者卻以井金散塗之令肉黑極十分腐爛方可用刀剪之刮之若稍有些〻肉不黑盡恐肉未死肉未死血亦未死血未死則不可

剪刮恐血來多致有昏運之失其肉十分黑極十分腐爛推得動者此肌肉死也肌死則血死其血死乃可剪刮無妨雖血瘤肉瘤取之亦無妨也小瘤取之則愈大瘤取之有半載肌肉痲痹也宜服養氣血藥久之自愈

陳實功外科正宗

癭瘤論

夫人生癭瘤之證非陰陽正氣結腫乃五臟瘀血濁氣痰滯而成癭者陽也色紅而高突或蒂小而下垂瘤者陰也色白而漫腫亦無痒痛人所不覺薛立齋分別甚詳肝統筋怒動肝火血燥筋攣曰筋瘤心主血暴急太甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而腫曰血瘤脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土氣不行逆於肉裏而爲腫曰肉瘤肺主氣勞傷元氣腠理不密外寒搏而爲腫曰氣瘤腎主骨恣慾傷腎腎火鬱遏骨無榮養而爲腫曰骨瘤予曰筋瘤者堅而色紫壘壘青筋盤曲甚者結若蚯蚓治當清肝解鬱養血舒筋清肝蘆薈丸是也血瘤者微紫微紅軟硬間雜皮膚

隱隱纏若紅絲擦破血流禁之不住治當養血凉血抑火滋陰安斂心神調和血脉芩連二母丸是也肉瘤者輭若綿高似饅皮色不變不緊不寬終年只是覆肝然治當理脾寬中疎通戊土開鬱行痰調理飲食加味歸脾丸是也氣瘤者輭而不堅皮色如故或消或長無熱無寒治當清肺氣調經脉理勞傷和榮衛通氣散堅丸是也骨瘤者形色紫黑堅硬如石疙瘩高起推之不移昂昂堅貼於骨治當補腎氣養血行瘀散腫破堅利竅調元腎氣丸是也此瘤之五名治瘤之五法惟在此也又觀立齋云筋骨呈露曰筋癭赤脉交結曰血癭皮色不變曰肉癭隨憂喜消長曰氣癭堅硬不可移曰石癭此癭之五名也通治癭瘤初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選用服此藥自然縮小消磨切不可輕用針刀掘破出血不止多致立危久則膿血崩潰滲漏不已終至傷人又一種粉瘤紅粉色多生耳項前後亦有生於下體者全是痰氣凝結而成宜鈹針破去脂粉以三品一條鎗插入數次以

淨內膜自愈又一種黑砂瘤多生臂腿腫突大小不一以手攝起內有黑色是也亦用針刺內出黑砂有聲輭硬不一又一種髮瘤多生耳後髮下寸許輭小高突按之不痛亦針之粉髮齊出又一種蛔蟲瘤生於脅下又一種疽瘤連生肩膊詳在後治驗中予觀古又有風瘤矣但其形狀之異皆五臟濕熱邪火濁氣瘀血各感而成此非正病也已上數瘤皆親手治驗非謬也

看法

初起紅色光亮微熱微痛根脚浮淺不堅實者爲易

已成紅赤高腫作熱焮痛頂破皮穿膿潰腫消者易

已潰膿稠色鮮根脚縮小內肉漸生外皮漸緊者順

潰後氣體平和飲食如故腫消痛止口平收斂者順

初起肉色不變寒熱漸生根脚散漫時或陰痛者險

已成堅硬如石舉動牽強欬嗽生痰皮寒食少者逆

已潰無膿惟流血水腫不消痛不止脾氣衰弱者逆

破後血水不止腫硬更增敗腐不脫啘氣惡心者死

治法

初起自無表裏之證相兼但結成形者宜行氣散血已成無痛無癢或輭或硬色白者痰聚也行痰順氣已成色紅堅硬漸大微痒微疼者補腎氣活血散堅形如茄帶癅大下垂者用藥點其帶茄落生肌收斂已破流膿不止癅仍不消宜健脾胃爲主佐以化堅已潰出血不常癅口開泛者宜養血凉血佐以淸肝潰後癅腫漸消脾弱不能收斂者補腎氣兼助脾胃

雀斑

雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而爲斑當以六味地黃丸以滋化源外以玉容丸早晚搽洗漸愈女人黧黑斑者水虧不能制火血弱不能華肉以致火燥結成斑黑色枯不澤朝服腎氣丸以滋化源早晚以玉容丸洗面斑上日久漸退兼戒憂思動火勞傷等件但此生於夫主不利疑事不決者常有之

枯筋箭

因憂鬱傷肝肝無榮養以致筋氣外發初起如赤豆大枯點微高日久破裂攢出筋頭蓬鬆枯槁多生胷乳間宜用絲藥線齊根緊七日後其患自落以珍

珠散摻之其疤自收兼戒口味不發

黑子

黑子痣名也此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不散凡人生此終爲不吉面部不善者去之宜細銅管將痣套入孔內撚六七轉令痣入管一拔便去有浮淺不能拔者用針挑損痣上搽冰螄散少許糊紙蓋之三日自脫或灰米膏點之亦可落後珍珠散乾摻生皮而愈忌醬酢無斑

血痣

血痣由於肝經怒火鬱結其形初起色紅如痣漸大如豆揩之血流治血箭以桃花散涼水調敷或金墨塗搽自止血痣須用冰螄散枯去本痣以珍珠散搽之生皮乃愈甚者內服涼血地黃湯兼戒口味始痊

景岳全書（臣張介賓著）

瘤贅

按瘤贅一證如前薛己論中已盡其略然此五瘤之外又惟粉瘤爲最多蓋此以腠理津沫偶有所滯聚而不散則漸以成瘤是亦粉刺之屬但有深淺耳深

者在皮裏則漸大成瘤也余嘗聞之先輩曰瘤贅既大最畏其破非成膿者必不可開開則牽連諸經漏竭血氣最難收拾無一可活及詳考薛按所載數人凡其潰破者皆至不治誠信然也不可不知

蛛絲纏法可治瘤贅未甚大者其法最妙余嘗見一人於腹上生一瘤其大如核桃一治者取蛛絲撚成粗線纏紮其根數日其絲漸緊根漸細屢易屢細不數日竟成脫落誠奇法也可見諸線日鬆惟蛛絲日緊物理之妙有當格致者如此然亦纏治宜早若形勢既大恐不宜也

石室祕籙

臣陳士鐸著

癭瘤治法不同

癭瘤不同癭者連肉而生根大而身亦大瘤者根小而身大也即瘤之中又各不同有粉瘤有肉瘤有筋瘤有物瘤筋瘤不可治亦不必治終身十載不過大如核桃粉瘤則三年之後彼自然而出粉如線香末出盡自愈亦不必治也肉瘤最易治用水銀硼砂各一錢兒茶血竭各三錢冰片麝香各三分黃蘗五錢

各爲細末將此藥擦於瘤之根處隨擦隨落根小者無不落也物瘤則根大最難治不時而動無故而鳴或如蟲鳴或如鳥啼必須用刀破其中孔則物自難居必然突圍而出後用生肌神藥敷之則瘤化爲水平復如故矣此乃不敬鬼神觸犯歲君而得病不可測非理可談故內經不言然世未嘗無此病也生肌散用沒藥乳香去油象皮廣木香末人參各一錢三七根末千年石灰各三錢輕粉五分麒麟血竭兒茶各二錢冰片三分爲絕細末研無聲爲度修合時須用端午日不可使一人見之

癭瘤不同形亦各異然皆濕熱之病也由小而大由大而破由破而死矣初起之時即宜用小刀割破略出白水以生肌散敷之立愈倘若失治漸漸大來用藥一點點其陷處半日作痛必然出水其色白者易愈黃者紅者皆難愈然服此藥無不愈也點藥用水銀硼砂輕粉鷹糞鵲糞綠礬皂礬各一錢冰片潮腦各五分麝香三分爲絕細末用針刺一小孔然後乘其出血之時將藥點上則粘連矣約用一分以人乳

調之點上大如雞子一日點三次第二日必然流水流水時不可點恐過疼則難收口矣三日後必然水流盡而皮寬如袋後用煎方自然平復如故煎方用人參山藥各三錢茯苓白芍各五錢薏仁黃芪各一兩澤瀉二錢豬苓生甘草陳皮各一錢水煎服十劑全消如故但忌房事一月餘無所忌若犯房事必破不能收口終身成漏矣

人有病手臂生瘡變成大塊如拳頭大者必須用刀割去人必運絕不可學也吾有奇方止用小刀略去其皮一分後以末藥敷之即化爲水神方也方用人參三錢甘草一錢硼砂冰片各一分輕粉半分各爲末摻之即化爲水矣此方乃化毒奇方不可輕視更有人肚上生瘡結成頑塊終年不去者亦可照上法治之立效

人有足上生瘤如斗大者不必破之止用針輕輕刺一小針眼以前藥敷之必流水不止必用煎方治之方用人參黃芪各三兩生甘草薏苡仁各五兩白芥子三錢水煎服二劑即消盡其水而人絕無憊也內

外雙治之法也此方之妙乃補其本源之氣又利水而不走其氣刺其孔而出水未免大損元氣今補其氣又何懼水之盡出哉

方

海藻丸

治癭瘤通用

海藻洗曬　川芎　當歸　官桂　白芷　細莘

藿香　白蘞　昆布洗曬　明礬煅各一兩

海蛤煅　松蘿各七錢半

爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後吞嚥下

守癭丸

治癭瘤結硬

通草二兩　杏仁去皮尖研　牛蒡子各一合

昆布洗　射干　訶黎勒　海藻洗各四兩

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後噙化

日三

白頭翁丸

治氣癭氣瘤

白頭翁半兩　昆布洗十分　桂心三分　通草

海藻洗各七分　連翹　元參各八分　白蘞六分

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸用酒

送下忌蒜麪生葱豬魚

海藻散堅丸

治肝經癭瘤

海藻　昆布各二兩　小麥四兩酢煑炒乾

龍膽草二兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸臨臥白湯

送下并噙化嚥之

木通散

治頸下卒生結囊欲成癭

木通　松蘿　桂心　蛤蚧酥炙　白蘞　琥珀

海藻洗　昆布洗各一兩

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調下

五癭丸

菖蒲二兩　海蛤　白蘞　續斷　海藻　松蘿

桂心　倒掛草　蜀椒　半夏各一兩　神麴二兩

羊靨百枚

右爲細末以牛羊髓脂爲丸如梧子大每服三丸

食後臨臥噙化服

昆布丸

檳榔　昆布　海藻各二兩

右爲末煉蜜丸彈子大每用一丸含嚥化下

藻藥散

治氣癭

海藻酒洗一兩　黃藥子二兩

右爲末置掌中以舌時時舐以津嚥下消三分之二止藥先須斷厚味戒酒色按本草黃藥子主諸惡腫瘡瘻斗門方以浸酒療項下癭氣醫學綱目

及丹溪誤作黃蘗蓋蘗藥字相近又誤蘗爲連則其失愈遠矣

二海丸

治氣癭

海藻　昆布各酒洗曬乾

右等分爲末煉蜜丸杏核大稍稍嚥汁又用海藻洗淨切片油酢煑熟作常菜食之

消癭散

治癭氣

海藻酒洗　海帶酒洗　昆布酒洗　海馬酒炙

海紅蛤　石燕並煅　海螵蛸各一兩

右爲末清茶下兼服含化丸兼灸相濟以收全功

含化丸

治癭氣

海藻　海蛤煅　海帶　昆布　瓦壟子煅

訶子去核　文蛤背有斑文者　五靈脂各一兩

豬靨十四箇焙乾另研

右爲末煉蜜丸臨臥含化時時嚥下兼灸法以助

丸功

通氣丸

治癭氣

海藻　海帶　昆布　夏枯草　木通各一兩

訶子　薄荷各五錢　杏仁少許

右爲末煉蜜丸如芡實大每用一丸噙化兼灸以泄癭氣方效

昆布散

治癭氣去風火鬱滯散痰氣壅結

防風　荊芥　黃連酒炒　昆布　海藻　海粉

羌活　升麻　連翹　青皮　膽星　貝母

牛蒡子炒　夏枯草　沉香　香附子　撫芎

黃芩酒炒

右薄荷煎服或末或丸俱可痰多加南星半夏又宜灸天突穴爲妙

破結散（三因）

海藻洗　草龍膽　海蛤　通草　昆布　松蘿

礬石枯各三分　麥麴四分　半夏　貝母各二分

右爲末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜諸雜毒物十日知二十日愈

玉壺散

治三種癭

海藻洗　海帶洗　昆布　雷丸各一兩　青鹽　莪朮各半兩

右等分爲細末陳米飲丸如榛子大噙化以煉蜜丸亦好

人參化癭丸（子和）

海帶　海藻並洗焙　海蛤焙　昆布　澤瀉炒　連翹各等分　豬靨　羊靨各十枚

右爲末蜜丸如芡實大臨臥噙化一二丸忌油膩物豬羊靨即豬羊外腎乃囊中之卵也

寶金散（羅氏）

治癭氣無不瘥

豬羊靨十對煖水洗去脂膜曬乾杵爲細末

海藻洗　海帶洗各二兩　丁香　琥珀研　木香　麝香研各二錢半　眞珠研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶杵爲細末入下項藥末合和再研細重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜臥服垂頭而睡若在室男女十服必效如男子婦人患者一月見效有胎不可服

海帶丸

治癭氣久不消

海藻洗　貝母　靑皮　陳皮各等分

右件爲細末煉蜜丸如彈子大食後噙化一丸效

昆布散

治癭氣結腫胷膈不利宜服

昆布洗　海藻洗　松蘿　半夏湯泡　細莘

海蛤細研　白蘞　甘草炙各一兩　龍膽草

土瓜根　檳榔各二兩

右爲細末每服二錢食後溫酒調下

又方

治癭氣胷膈壅塞頸項漸粗宜服此方

海藻洗　昆布洗各二兩　射干　羚羊角鎊

木通　商陸　杏仁泡去皮尖麩炒黃各一兩

牛蒡子一兩半微炒

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

神驗方

治癭氣

琥珀　桔梗各半兩　鵪鶉骨　昆布洗各一兩

赤小豆酒煮熟焙　小麥酒煮各三分

右爲細末煉蜜丸如小彈大綿裹一丸常噙嚥津

神效開結散

治癭疾不問年歲極驗

沉香　木香各一兩　橘紅四兩　豬靨子十對

珍珠四十九粒煅

右爲末每服一錢臨臥冷酒調搽徐徐嚥下輕者三五服重者一料全愈修合用除日效忌鹹酸油膩滯氣等物

清上消鬱湯

治痰火氣血鬱結作核成瘤脉弦而滑在上部者

昆布洗　元明粉　陳皮　半夏薑製　黃連

海藻　莪朮　川芎　香附　青黛　白芥子

右薄荷煎服

解下除濕湯

治濕熱鬱結氣血凝滯作核成瘤在下部者

海藻洗　黃蘗　三稜　香附　青皮　梔子炒

連翹　檳榔　木通

右薄荷煎服

枯瘤膏

治六瘤瘰癧痔漏如無此膏以鐵罐膏代之更捷

草烏四兩　川烏二兩　乾桑耳　桑朽木各一兩半　礦石灰　桑柴灰　蕎麥稭灰各一椀

右將草烏川烏桑耳桑朽木共燒成灰和礦石灰桑柴灰蕎麥稭灰一處裝入酒漏內以椶塞其漏竅用水二斗煎滾淋汁慢火熬濃以十椀取一椀爲度以厚實磁器收貯密封固如用入礦石灰調勻爲糊點瘤頂上以濕紙數重貼藥上如若未乾不須貼若留久藥乾以唾調塗直待十分黑腐以刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却

用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀後却以膏藥貼之去盡腐肉爲度

井金散

治六瘤大有神效

土黃三錢　硇砂生曬乾　雄黃各二錢　輕粉
朱砂　乳香　沒藥各一錢　麝香　片腦各少許

右爲末以唾調爲稀糊塗瘤頂上唾濕紙兩重蓋之後用黃龍膏貼紙上間日一度上藥次添藥徹的周迴大如韭葉後根搖自然有裂縫隨後自下來若腐肉未去盡者掞針頭散於瘡口腐肉上貼膏藥一日一換直待腐肉去盡爲度

造土黃法

信石生用二兩　硇砂生二錢　木鼈子肉
巴豆肉各五錢

右以信硇研末以木鼈巴豆搗成膏入石腦油和作一塊油紙數重包裹埋於土坑內四十九日取出磁器收貯聽用如無石腦油亦可

黃龍膏

凉肌退腫

黃蘗　黃芩　大黃

右爲末蜜水調爲糊餅貼瘤上

枯瘤方

白砒　硇砂　黃丹　輕粉各一錢

朱砂　乳香　沒藥各三錢　盤蝥生用三十箇

右研爲末糯米粥爲丸捏作棋子樣曝乾先灸破瘤頂三炷以藥餅蓋上用黃蘗末以水調貼之數日自然乾枯落下

神驗點方

點瘤贅

桑柴灰　棗樹灰　黃荊灰　桐殼灰各二升半

右以沸湯淋汁五椀許澄清入盤蝥四十箇穿山甲五片乳香腦子不拘多少約五椀煎作一椀用磁器盛之乳香腦子候冷方入臨用時入新石灰調成膏神妙敷瘤上乾以清水潤之其效如神

龍骨散

一名青龍散生肌肉

訶子肉　龍骨生　細茶各等分

右末乾掺

痲藥方

南星　半夏　川烏　川椒　石灰　草烏各等分

右六味各生爲末酢調塗瘡上用藥則不痛

止血藥

京墨煆　百草霜各等分

右爲末掺之卽以手按住

桃紅散

止血大效

石灰十兩　麻油　大黃五錢水浸透取汁各半盞

右將石灰炒紅入麻油大黃汁和勻慢火炒如桃花色磁器收貯聽用

梅花散

治瘿瘤

寒水石　龍骨　血竭　黃丹

右爲細末乾掺

箍藥

治前證

草烏八兩　川烏四兩　乾桑葉　朽木各三兩

桑柴灰二椀　石灰未化者一斤

右二灰研四味俱燒存性同研勻水十椀淋汁熬膏圍之

又方

治痰瘤

陳皮　半夏　茯苓　甘草　升麻　鼠黏子

連翹　柴胡　昆布　黃芩　桔梗

右水煎服時以自溺搽瘤上甚妙

驅風換肌膏

治雀子斑

肥皂二斤　甘松　三柰　白芷各二兩　薄荷

花粉　黃蘗末　細莘　乾葛　草果　防風

獨活各一兩　輕粉五錢

右爲末成丸每朝洗面用之再用玉面桃花粉

玉面桃花粉

杏仁研泥　面粉各三錢　輕粉　白芷各一錢

麝香　氷片各二分

右以雞子清調勻每服少許如婦人搽面法

一井散

枯瘤神驗

硇砂　粉霜　雄黄各二錢　輕粉　沒藥

乳香各一錢　土黄三錢

右爲細末以津調塗瘤頂外邊徹一韭葉闊以花紙貼之上用小黄膏貼之

小黄膏

黄蘗　黄芩　大黄各等分

右爲細末以水調爲糊比前藥大一遭三日一易至八九日不取直候可取

五癭方（千金方下同）

治石癭氣癭勞癭土癭憂癭

海藻　龍膽　海蛤　通草　昆布　礐石（一作礬石）

松蘿各三兩　麥麯四分　半夏二分

右九味治下篩酒服方寸匕日三禁食魚豬肉五辛生菜難消之物十日知二十日愈

又方

海藻　海蛤各三兩　昆布　半夏　土瓜根

松蘿各一兩　通草　白蘞　龍膽各二兩

右九味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

陷腫散

治二三十年癭瘤及一切瘤

烏鰂骨　石硫黃各一兩　白石英　紫石英

鍾乳石各二分　丹參三分　琥珀　附子

胡燕屎　大黃　乾薑各四分

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕卽傅若瘡乾豬脂和傅日三四以乾爲度若汁不盡者至五劑十劑止藥令人不痛若不消加芒硝二兩佳

又方

昆布　桂心　逆流水柳鬚各一兩　海藻

乾薑各二兩　羊靨七枚陰乾

右六味爲末蜜丸如小彈子大含化一丸嚥津

生肉膏

治瘻瘤潰漏及金瘡百瘡

當歸　附子　甘草　白芷　芎藭各一兩

薤白二兩　生地黃三兩

右七味㕮咀以豬脂三升半煎白芷黃去滓稍以傅之日三

清肝蘆薈丸

治惱怒傷肝致肝氣鬱結爲瘤其堅硬色紫壘壘青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川芎　當歸　白芍　生地酒浸搗膏各二兩

青皮　蘆薈　昆布　海粉　甘草節　牙皂

黃連各五錢

右爲末神麴糊爲丸如梧桐子大每服八十丸白滾湯量病上下食前後服之

芩連二母丸

治心火妄動逼血沸騰外受寒凉結爲血瘤其患微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏如紅絲皮破血流禁之不住者宜服

黃連　黃芩　知母　貝母　川芎　羚羊角

當歸　白芍　生地　熟地　蒲黃　甘草減半

地骨皮各等分

右爲末側柏葉煎湯打寒食麪糊爲丸如桐子大每服七十丸燈心湯送下或作劑服之亦效

順氣歸脾丸

治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉瘤軟如綿腫如饅脾氣虛弱日久漸大或微疼或不疼者服之

陳皮　貝母　香附　烏藥　當歸　白朮

茯神　黃芪　酸棗仁　遠志　人參各一兩

木香　甘草炙各三錢

右爲末合歡樹皮四兩煎湯煮老米糊丸如桐子大每服六十丸食遠白滾湯送下

通氣散堅丸

治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結爲瘤色白不赤軟而不堅由陰陽失度隨喜怒消長者宜服

陳皮　半夏　茯苓　甘草　石菖蒲　枳實炒

人參　膽南星　天花粉　桔梗　川芎　當歸

貝母　香附　海藻　黃芩酒炒各等分

右爲末荷葉煎湯跌爲丸寒豆大每服一錢食遠燈心二十根薑三片泡湯送下

調元腎氣丸

治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養遂生骨瘤其患堅硬如石形色或紫或不紫推之不移堅貼於骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脚膝無力者並服之

淮生地酒煮搗膏四兩　山萸肉　山藥　丹皮茯苓各二兩　人參　當歸身　麥門冬搗膏澤瀉　龍骨　地骨皮各一兩　黃蘗鹽水炒知母童便炒各五錢　木香　砂仁各三錢

右爲末鹿角膠四兩老酒化稠加蜜四兩同煎滴水成珠和藥爲丸如桐子大每服八十丸空心溫酒送下忌白蘿蔔火酒房事

海藻玉壺湯

治癭瘤初起或腫或硬或赤不赤但未破者服之

海藻　貝母　陳皮　昆布　青皮　川芎

當歸　半夏　連翹　甘草節　獨活各一錢

海帶五分

水二鍾煎八分量病上下食前後服之凡服此門藥餌先斷厚味大葷次宜絕慾虛心者爲妙

活血散癭湯

治癭瘤已成日久漸大無痛無痒氣血虛弱者

白芍　當歸　陳皮　川芎　半夏　熟地

人參　茯苓　丹皮各一錢　紅花　昆布

木香　甘草節各五分　青皮　肉桂各三分

水二鍾煎八分量病上下服後飲酒一小盃

六軍丸

治癭瘤已成未潰不論年月新久並宜服之

蜈蚣去頭足　蟬蛻　全蠍　殭蠶炒去絲

夜明砂　穿山甲

以上等分爲細末神麴糊爲丸如粟米大硃砂爲衣每服三分食遠酒下忌大葷煎炒日漸可消

枯瘤方

治瘤初起成形未大者及根蒂小而不散者用此

白砒　硇砂　黃丹　輕粉　雄黃　乳香
沒藥　硼砂各一錢　田螺三枚取肉曬乾切片
盤蝥二十箇

共研極細糯米粥調和捏作小棋子樣曝乾先灸瘤頂三炷以藥餅貼之上用黃蘗末水調蓋敷藥餅候十日外其瘤自然枯落次用斂口藥

祕傳斂瘤

治癭瘤枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

雞蛋十五枚煑熟用黃熬油一小鍾　海螵蛸
血竭　輕粉　龍骨　象皮　乳香各一錢

右各等細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚甘草湯洗淨患上雞翎蘸塗膏藥蓋貼

琥珀黑龍丹

治五癭六瘤不論新久但未穿破者并宜服之

琥珀一兩　血竭三兩　京墨　五靈脂炒
海帶　海藻　南星薑製炒各五錢　木香三錢
麝香一錢

以上各爲細末和勻再研煉蜜丸一錢重金箔爲

衣曬乾密收每用一丸熱酒一盃量病上下食前後化服如患在下部服後隨用美膳壓之

十全流氣飲

治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏乃生氣瘿肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥

香附八分　陳皮　赤茯苓　烏藥　川芎
當歸　白芍各一錢　青皮六分　甘草五分
木香三分

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

凉血地黃湯

治血箭血痣內熱甚而逼血妄行出血如飛者

黃連　當歸　生地　山梔　元參　甘草各等分

水二鍾煎八分量病上下服之

玉容丸

治男婦雀斑酒刺及身體皮膚粗槁並用此洗

甘松　山樝　細辛　白芷　白蘞　白芨
防風　荊芥　殭蠶　山梔　藁本　天麻
羌活　獨活　陀僧　枯礬　檀香　川椒

菊花各一錢　紅棗肉七枚

以上共爲細末用去盡弦膜肥皂一斤同搥作丸如秋冬加生蜜五錢如皮膚粗槁加牛骨髓三錢早晚洗之肌膚自然瑩潔如玉溫潤細膩

玉肌散

治一切風濕雀斑酒刺白屑風皮膚作痒者並效

菉豆半升　滑石　白芷　白附子各二錢

共爲細末每用三匙早晚洗面時湯調洗患上

單方

項下氣癭用自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其癭自消或火燒煙氣久久吸之亦可（直指方下同）

又方鍼砂入水缸中浸之飲食皆用此水十日一換砂半年自消散

項下癭疾鼠黏子根一升水三升煮取一升半分三服或爲末蜜丸常服之（救急方）

項下癭氣黃藥子一升洗剉酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及戒怒仍以線逐日度之乃

知其效也（斗門方）

癭氣用海藻一斤絹袋盛之以淸酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服二合日三酒盡再作其查暴乾爲末每服方寸匕日三服不過兩劑卽瘥（范汪方）

癭氣初起海藻黃連各一兩爲末時時舐嚥先斷一切厚味（丹溪）

五癭結核壘壘腫硬以昆布一兩洗去鹹曬乾爲散每以一錢綿裹好酢中浸過含之嚥汁味盡再易之（聖惠）

癭瘤結氣海帶頻食之自愈

項下癭氣用小麥一升酢一升漬之曬乾爲末以海藻洗硏末三兩和勻每以酒服方寸匕日三（小品）

蜘蛛網纏贅疣疣日消爛屢有驗（續博物志）

疣瘤初起柳樹上花蜘蛛絲纏之久則自消（簡便方）

疣瘤用稻上花蜘蛛十餘安桃枝上待絲垂下取東邊者撚爲線繫之七日一換自消落也（總微論）

癭瘤用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服妙（摘要）

又方取鹿靨以佳酒浸令沒炙乾納酒中更炙令香含嚥汁味盡更易盡十具愈（千金）

又方開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢眞硃砂罐煅四十九粒橘紅四錢爲末臨臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物（集要）

又方用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚥汁日一具七日瘥（外臺）

又方用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩爲末蜜丸芡子大每含一丸嚥津（千金）

又方用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢爲末搗二靨和丸彈子大每服一丸含化嚥汁（雜病治例）

又方水涯露出柳根三十斤水一斛煑取五升以糯米三斗如常釀酒日飲（范汪方）

又方秫米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煑取二升漬麴末五兩如常釀酒每旦一

盞日再服（崔氏）

身面粉瘤人精一合青竹筒盛於火上燒以器承取汁密封器中數上塗之取效止（肘後方）

枯瘤方以銅綠爲末草刺瘤破摻上以膏藥塗之

粉瘤紅玉膏石灰一塊如錢大糯米十四粒同鹻水化開一夜加辰砂少許挑破點之（瘡瘍全書下同）

消瘤方蕎麥灰半椀灰條菜灰半椀風化石灰一椀同和一處淋灰三椀熬膏以木鼈一二枚巴豆五六十粒二件去殼并油胡椒四十九粒各研細爛共研細入灰汁內再熬成膏入罐內蠟紙封之用時不分大小用藥點於瘤上其藥自至根再上候茶褐色須臾其瘤皆黑色不須再搽二三日自乾枯有瘡口用紫金散敷之

紫金散黃丹一錢五分輕粉二錢五分共爲細末乾摻瘡口

藥線繫瘤法先用芫花根洗淨帶濕不犯鐵器搗取汁用生絲線浸汁中一宿陰乾以線繫瘤上一夜卽落不過二次將龍骨細茶訶子末三味敷瘡口如無

根以芫花煎濃汁浸之亦妙

痣黶疣贅用花鹻及礦灰以小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上即去須新合乃效（總錄下同）

面黶黑痣以草劃破銅錢末傅之三日勿洗水自落厚者再上之

䵟黯斑點赤皰密陀僧二兩細研人乳調夜塗旦洗（聖惠）

凡人身有努肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手速擦二七遍以後自得消平孕婦勿用

面身有瘢痕用眞玉日日磨之久則自滅（聖濟錄）

粉查面䵟雲母粉杏仁等分爲末黃牛乳拌蒸夜塗旦洗（總錄）

面上䵟黯雞子一枚去黃朱砂末一兩入雞子內封固入白伏雌雞下抱至雛出取塗面即去不過五度面白如玉此陳朝張貴妃常用出西王母枕中方（外臺）

面皰水銀胡粉等分研臘猪脂和夜塗旦洗拭勿見水三度瘥（肘後方）

又方烏蛇肉二兩燒灰臘豬脂調傅（聖惠）

粉刺面皯白石脂六兩白蘞十二兩爲末雞子白和夜塗旦洗（總錄）

身面疣目苦酒漬石灰六七日取汁頻擦之自落（千金）

面黶疣痣水調礦灰一盞好糯米全者半插灰中半在灰外經宿米色變如水精光以針微撥動點少許於上經半日汁出剔去藥不得著水二日而愈也（集元方）

身面瘢痕禹餘糧半夏等分爲末雞子黃和傅先以布拭乾勿見風日三十日十年者亦滅（總錄）

手足疣目鹽傅上以舌舐之不過二度瘥（肘後方）

身面疣目蠟紙捲硫黃末少許點之焠之有聲自去（普濟方）

疣目瘊子白礬地膚子等分煎水頻洗之（多能鄙事）

身上瘢痕黃礬石燒令汁盡胡粉炒令黃各八分細研以臘月豬脂和研如泥以生布揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分和人乳塗之其瘢自滅肉平如故（海上集驗方）

面上皯皰薺苨肉桂各一兩爲末每用方寸匕酢漿服之日一服又滅瘢痣（總錄）

面多皯䵳雀卵色苦酒浸白朮日日拭之極效（肘後方）

粉查面皯山慈姑根夜塗旦洗（普濟方）

又方艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三徧以五色布納於中同煎令可丸時每以少許傅之自爛脫甚妙（外臺）

面皯風瘡香附子甘松各四兩黑牽牛半斤爲末日用洗面（婦人良方）

面上雀斑三柰子鷹糞密陀僧蓖麻子等分研勻以乳汁調之夜塗旦洗去

面上瘢黶取鐵搨帚地上自落葉并子煎湯頻洗數次自消（卽馬蘭草）

面皰鼻皶馬藺子花杵傅之佳（肘後方）

面上黑斑蒼耳葉焙乾爲末食後米飲調服一錢一月愈（摘元方）

手足疣目蒴藋子揉爛塗之（聖惠）

面上瘢痕蒺藜子山梔子各一合爲末酢和夜塗旦

洗（救急方）

黑子疣贅續隨子爲末津調時塗之自落（普濟方）

面上雀斑蓖麻子仁密陀僧硫黃各一錢爲末用羊髓和勻夜夜傅之（摘元方）

身面黑痣藜蘆灰五兩水一大椀淋汁銅器重湯煑成黑膏以針微刺破點之不過三次效（聖惠）

面上䵟黯白附子爲末臥時漿水洗面以白蜜和塗紙上點之久久自落（易簡方）

痰瘤結核疣子南星膏治人皮肌頭面上生瘤及結核大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痒宜用此藥不可輒用針灸生天南星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾者爲末醋調先用針刺令氣透乃貼之覺痒則頻貼取效（濟生方）

贅疣焦法甘草煎膏筆䊪瘤之四圍上三次乃用芫花大戟甘遂等分爲末酢調別以筆䊪其中勿近甘草次日縮小又以甘草膏䊪小暈三次如前仍上此藥自然焦縮（得效方）

面瘡刺粉菟絲子苗絞汁塗之不過三上（肘後方）

面上風刺黑牽牛酒浸三宿爲末先以薑汁擦之後用藥塗之（摘元方）

面上粉刺癗子如米粉黑牽牛末對入面脂藥中日日洗之（聖惠）

面上雀斑黑牽牛末雞子清調夜傅旦洗（摘元方）

身面粉刺白蘞二分杏仁半分雞屎白一分爲末蜜和雜水拭面（肘後方）

面上紫塊如錢大或滿面俱有野大黃四兩取汁穿山甲十片燒存性川椒末五錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾入酢潤濕數次如初（積德堂方）

少年面皰用浮萍日挼盦之并入汁少許（外臺）

又方用紫背浮萍四兩防己一兩煎濃汁洗之仍以萍於斑點上熱擦日三五次物雖微末其功甚大不可小看（普濟）

粉渣面點溝渠小萍爲末日傅之（聖惠方）

滅諸瘢痕春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和酥傅之（總錄）

手足生疣取白粱米粉鐵銚炒赤研米以衆人唾和

之塗厚一寸卽消

身面疣目七月七日以大豆拭疣上三遍使本人種豆於南向屋東頭第二溜中豆生葉以熱湯沃殺卽愈（外臺祕要）

面黯雀卵苦酒漬水常常拭之（肘後方）

身面疣目盜酸酒酵洗而呪之曰疣疣不知羞酸酒酵洗爾頭急急如律令呪七遍自愈（外臺）

面黶痣點蔓菁子研末入面脂中夜夜塗之亦去面皺（聖惠）

面上黑子芫荽煎湯日日洗之（小說）

又方每日以煖漿水洗面以布揩赤用白檀香磨汁塗之（外臺）

身面瘢痕馬齒莧湯日洗二次（聖惠）

腋下瘿瘤用長柄壺盧燒存性研末搽之以消爲度一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許其狀如長瓠子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈（集簡方）

面上黑斑桑耳焙研每食後熟湯服一錢一月愈（摘元）

方

身面疣目杏仁燒黑研膏擦破日日塗之（千金方）

面上皯皰杏仁去皮搗和雞子白夜塗之旦以暖酒洗去（食療）

粉皶面䵟杏花桃花各一升東流水浸七日洗面三七遍極妙（總錄）

雀卵面皰桃花冬瓜仁研末等分蜜調塗之（聖惠下同）

面上粉刺𤷍子如米粉用桃花丹砂各三兩爲末每服一錢空心井水下日三服二十日小便當出黑汁面色瑩白也

又方用乾柹日日食之（普濟方）

面上黶子七月七日午時取甜瓜葉七枚直入北堂中向南立逐枚拭黶卽或去也（淮南畢萬術）

面上皶皰䵟黯用木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日曬乾搗末每漿水服方寸匕日三服或用酒漬之加梔子仁一斤（錄驗）

又方用白附子冬瓜子白芨石榴皮等分爲末酒浸三日洗面後傅之久則面瑩如玉

又方皂角子杏仁等分研勻夜以津和塗之（聖惠）

又方用無槵子肉皮搗爛入白麪和丸每用日洗面去垢及黚甚良（集簡方）

疵痣黑子巴豆一錢石灰炒過人言一錢糯米五分炒研點之（怪病方）

又方用寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬膏刺破以自己唾調點之自落也（皆效方）

又方以豬脂揩之令血出少許神驗不可加（千金）

面上皯皰鹿角尖磨濃汁厚塗之神效

又方鹿脂塗之日再（聖惠）

面黚雀斑白茯苓末蜜和夜夜傅之二七日愈（集驗方）

又方鸕鶿骨燒研入白芷末豬脂和夜塗旦洗（摘元方）

鼻面酒皶鸕鶿屎一合研末以臘月豬脂和之每夜塗旦洗（千金方）

疵痣黑子螌蝥三箇人言少許以糯米五錢炒黃去米入蒜一箇搗爛點之（良）

滅痕鷹矢白和人精傅三日（千金）

又方鷹矢白二兩殭蠶一兩半爲末蜜和傅（聖惠）

又方鷹矢白白附子各一兩爲末酢和傅日三五次痕滅止（總錄）

身面疣目每月望子時以秃帚掃疣目上三七遍（聖惠）

又方牛口涎頻塗之自落（千金）

又方硇砂硼砂鐵銹麝香等分研搽三次自落（集效方）

雀斑面皰七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過濾汁調胡粉傅之（普濟方）

黥刺雕青以白馬尿搽上再以汗調水蛭末塗之（子和）

身面赤疵常以銀指令熱久久自消（千金翼）

䵟䵴用李核仁去皮細研以鷄子白和如稀餳塗之至旦以漿水洗去後塗胡粉不過五六日效忌見風（海上方）

又方孝子衫燒灰敷之（藏器）

粉刺黑斑五月五日收帶根益母草紫花者曬乾燒灰以商陸根擣自然汁加酸酢搜和灰作餅炭火煅過收之半年方用入面藥（閨閣事宜下同）

又方五月五日採益母草根苗具者勿令著土暴乾擣羅以麪水和成團如鷄子大再暴乾仍作一爐四

旁開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久卽去大火留小火養之勿令火絕經一伏時出之瓷器中研治篩再研三日收用如澡豆法日用一方每十兩加滑石一兩臙脂一錢

藜莖灰荻灰蒿灰等分水和蒸取汁煎膏點贅黑子蝕惡肉（時珍）

消滅瘢痕以猪脂三斤飼烏鷄一隻三日後取矢同白芷當歸各一兩煎十沸去查入鷹矢白半兩調敷（外臺）

雀卵面皰雞卵酢浸壞取出傅之（聖惠下同）

消滅瘢痕雞子五七枚煑熟取黃炒黑拭塗日三久久自滅

面皰鷹矢白二分胡粉一分蜜和傅之（外臺）

鍼灸

靈樞經曰手太陽之別名曰支正上腕五寸虛則生疣小者如指痂疥取之所別也

甲乙經曰振寒熱頸項腫實則肘攣頭項痛狂易虛則生疣小者痂疥支正主之

癭天窻（一作天容）及臑會主之

癭瘤氣舍主之

千金方曰癭惡氣灸天府五十壯（千金翼作胷堂百壯）

癭上氣短氣灸肺俞百壯

癭上氣胷滿灸雲門五十壯

癭勞氣灸衝陽隨年壯

癭氣面腫灸通天五十壯

癭灸天瞿三百壯橫三間一寸灸之又灸中封隨年壯在兩足趺上曲內宛宛中

諸癭灸肩髃左右相當宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取瘥止

又法灸風池百壯俠項兩邊

又法灸兩耳後髮際一百壯

又法灸頭衝（一作頭）在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注處灸之各隨年壯（千金翼名臂臑）

天府臑會氣舍主癭瘤氣咽腫

腦戶通天消濼天突主頸有大氣

通天主癭灸五十壯胷堂羊矢灸一百壯

本事方曰治果報面生贅瘤方用艾丸灸十壯即用酢磨硫黃塗紙上剪如螺螄掩子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候癢擠出膿如菉豆粉即愈（按硫黃羅謙甫作雄黃）

李杲十書曰諸癭惡氣天府七七壯衝陽隨年壯

醫案

儒門事親曰新寨婦人年四十餘有癭三瓣戴人令以鹹吐之三涌三汗三下癭已半消次服化癭之藥遂大消夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法耳

戴人在西華衆人皆訕以爲吐瀉而已一日魏壽之與戴人入食肆中見一夫病一瘤正當目之上綱內眥色如灰李下垂覆目睛不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤如何其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀

割別有術焉其人從之乃引入一小室中令仰臥一牀以繩束其胻刺乳中大出血先令以手揉其目瘤上亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎

郜城戴人之鄉也一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一類鷄距一類羊角腕不能制向明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者爲膠瘤在面者爲粉瘤此膠瘤也以鈹針十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平瘤核更不再作婚事復成非素明者不敢用此法耳

薛己醫按曰長洲王天爵辛丑春左腿環跳患瘤狀如大桃按之濡軟恪服除濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脉洪大而虛氣瘤也肺主之蓋膽屬木肺屬金然發於膽經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰矣遂用十全大補湯數劑出清白稀膿甚多頓加寒熱煩渴頭痛殊類傷寒狀余謂此因膿泄而血氣益虛耳仍用前湯其勢益甚脉洪數大按之如無乃加附子一錢其勢愈甚而脉

復如前此虛甚而藥未能及也更加附子二錢三劑諸證頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸證更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子一錢服之諸證悉愈二日不服內病悉至患處復潰二年後又患服前藥不應診其尺脈微細如絲此屬命門火衰用八味丸爲主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之證而歿

一男子左腿外側近臀腫一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此膽經受證故發於腿外側診其脈左尺洪數右關弦洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊

一男子腹患瘤膿水淋漓此足三陰之證用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂

一老儒眉間患瘤二年其狀如紫桃下墜蓋目按之如水囊此肝脾之證膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿目即開以炒黑膽草山梔芎歸芍藥柴胡白朮茯苓

之類而愈

嘉善周上舍兩耳下項間筋攣壅腫堅硬欬嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚余診之左關弦澀左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須滋腎水生肝血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲速效乃外敷商陸石灰等藥內服海藻蓬朮之類至秋金旺之際元氣愈虛其腫愈甚而歿

鎭江孫上舍缺盆間腫如覆甌堅硬色赤內熱晡熱自汗盜汗就治於余曰賤疾皆以散堅行氣降火破血之劑欲其內消而反甚其脈左尺洪數按之而弱左關洪數按之而澀此怒氣傷肝血涸而筋攣也因其急於仕進余辭不能治彼亦不信後果歿此證若補脾肺滋肝腎則木得水而敷華筋得血而滋潤多有得生者

府庠朱宏仁年二十兩手皆近中指患五疣中一大者如黃豆餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益榮湯五十餘劑而愈

府庠沈姬文幼嚙指甲及長不能自禁余曰此肝火

血燥也又頸側常生小疣子屢散屢發又臂生一塊如菉豆大若觸碎如斷束縷扯之則長縱之則縮後兩鬢發白點求治余曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪爲筋之餘膽行人身之側正與齧爪生疣等證相應須滋補腎水以生肝膽則諸病自愈矣乃與六味地黃丸服之二年白點自退疣亦不生

一男子臉患疣初如赤甚雜用敷貼之藥翻張如菌又用腐蝕焮大如瘤此足三陰經虛證悉具治以補脾肺生肝腎等劑而尋愈

一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應或以爲血鼈服行氣逐血之劑後手背結一肬子漸長寸許形如鼈狀肢節間如豆大者甚多彼泥鼈生子發於外亦用行血虛證悉至左尺洪數關脈洪數弦余以爲腎水不能生肝木以致肝火燥而筋攣用六味地黃丸生腎水滋肝血三月餘諸證悉愈

一男子因勞役過度面色青黑發熱欬嗽面生肬子腹內一塊攻上攻下作痛口乾小便祕澀服消尅之藥愈甚察其脉左右關俱弦洪元氣弱甚此肝脾受

病而筋攣也投以加味逍遙散合地黃丸料元氣遂復若誤以爲血髓之類消之必致不起

一男子素膏粱醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆如肬子如鼠乳大小不一用清熱消毒等藥半載之間腿內股亦然又用化痰之藥寒熱吐痰頸間俱作肝腎脈浮數按之而弱余以爲足三陰經血虛火熾法當滋化源彼不信別服四物黃蘗知母之類諸證蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中益氣湯三十餘劑諸證漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五十餘劑諸證尋愈於是夕改用六味丸加五味子又半載諸證悉愈

一婦人左手背并次指患五六枚如熟葚內熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸證自愈不信乃用艾灸手腫脹發熱手指皆攣兩脅項及胷乳間皆患疣經行無期余用加味逍遙散少加炒黑黃連數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯其患漸愈又百餘劑經行如期再用地黃丸三料而痊

一婦小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胷痞小便淋漓或用行氣化痰等劑前證愈甚月經兩月餘而一行或以爲內有肉鼈啖飲其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一疣如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患數枚疑以鼈子行於外仍行驅逐兩耳下各患腫又疑爲瘡毒余曰此屬肝火血燥也用加味逍遙加味歸脾二藥兼服佐以六味丸三月餘而愈

一婦人患疣用蛛絲纏芫花線螳螂啖毒藥蝕著艾灸大潰腫痛發熱出血余曰此陰血虛也不信仍服降火之藥而歿

外科正宗曰一男子臀瘤五年形如覆瓢按之隱隱黑色此黑粉瘤也以針破之按出黑砂兼黑粉共約椀許用三品一條鎗插入患內十餘日每次捺出黑膜其瘤漸消內服十全大補湯健脾胃養氣血月餘而斂

一男子腮上生瘤半年形若覆桃皮色不變按之微紅此粉瘤也針破之捺去脂粉插前藥半月而愈

一義烏兵士肩膊下連生小瘤五枚三月餘漸發癢異狀以手捫之內則噏噏攻動余視之內動果如蝦鞠此必有異蟲以針破其一枚先出紅水一匙少頃攻出黑嘴粉紅蟲一枚依然如舊其人漸覺昏運此泄氣之過也餘瘤停止服補中益氣湯數劑外以膏蓋又五六日患者方健漸漸破之仍以補藥十餘服而愈

一婦人并一女子耳後髮際下一寸各生一瘤半年餘漸漸而大此乃粉瘤用針破之先出脂粉後出頭髮數根長約二尺餘齊根剪斷出血少許俱用插藥數日化出內膜而愈以此觀之知有髮瘤也

一婦人腰間生一肉瘤三年餘方漸微痛一日潰後出小蛔三條長約五寸置溫湯中遊動半時方息其時患者形體衰弱面黃肌瘦口乾發熱朝以八味丸午用人參養榮湯至百日外元氣漸醒又百日其口方收余意度之其蛔乃經絡氣血所化

一婦人氣衝穴生瘤紅紫堅硬乃血瘤也請視之心肝二脉俱洪數其患得之心氣鬱結肝氣受傷之故

辭不可治後請京師明公醫治其時頭已穿潰雖強投補托化堅涼血等劑日潰日爛終至不應破經兩月一旦湧出紫血盆許隨即身亡後人問曰何以致此余曰心脈洪數心火旺也肝脈弦數肝氣傷也火旺逼血妄行肝氣傷不能藏血後破之必出血不止多致危亡預辭不治者此意也

景岳全書曰余於三旬之外忽於臂下肛門前骨際皮裏生一小粒初如菉豆許不以爲意及半年而如黃豆矣又一年而如皂子復如栗矣此時乘馬坐椅皆有所碍而漸至痛矣然料此非敷藥可散又非煎藥可及使其日漸長大則如升如斗懸掛腰股間行動不便豈不竟成廢人乎抱憂殊甚謀之識者皆言不可割刺恐爲禍不小余熟籌數月莫敢妄動然竊計此時乘小不取則日後愈大愈難矣將奈之何嘗見人臂股間受箭傷者未必卽死此之利害不過如是遂決意去之一日飲酒微醺乘醉以柳葉針刺之所出者皆如豆腐白皮之屬蓋卽粉瘤也刺後頓消余甚快然及兩日後則腫如熱癰余以會通膏貼三

日膿潰而愈余又怏然不兩日又腫起更熱更大余則大懼大悔謂瘤贅誠不可刺也然無奈復以會通膏貼之又三日而大潰出一囊如魚脬者然後收口全愈今愈後數十年此間仍有一小竅誠險證也向非余之勇決則此後不知作何狀使開之再遲則眞有不可收拾者是以病不早治則不知所終此亦可爲治病者之鑑

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十六卷目錄

醫部彙考三百七十六

外科熱瘡痤疿門

黃帝素問（生氣通天論　氣交變大論）

孫思邈千金方（熱瘡疿子）

戴思恭證治要訣（疿子）

李梴醫學入門（疿痤）

王肯堂證治準繩（痤）

陳實功外科正宗（痤疿）

陳士鐸石室祕錄（皮毛治法）

方（旋覆花丸　膿胞瘡方　又方　白蒺藜散　密陀僧散　白金散　玉粉散　七寶散　赤石脂散　苦參湯　鵝黃散　消風散）

單方

醫案

外科湯火灸凍漆瘡門

孫思邈千金方（火瘡等病）

張從政儒門事親（凍瘡）

薛己醫按（論湯火瘡）

李梴醫學入門（湯火瘡　凍裂）

王肯堂證治準繩（湯火瘡　手足皴裂）

陳實功外科正宗（湯火　凍風　漆瘡）

陳士鐸石室祕錄（湯火傷　凍瘡）

方（麻子膏　黃蘗散　柏葉散　湯火傷方　清凉膏　水霜散　止痛膏　神效當歸膏　止痛生肌散　柏皮膏　綠雲散　四時貼護方　內補黃芪丸　東垣潤肌膏　初虞世方　雉腦膏　柏葉膏　四順清凉飲　珍珠散　三白散　化斑解毒湯　碧玉膏）

單方

鍼灸

醫案

藝術典第三百九十六卷

醫部彙考三百七十六

外科熱瘡痤疿門

黃帝素問

生氣通天論

汗出偏沮使人偏枯汗出見濕乃生痤疿膏粱之變足生大疔受如持虛勞汗當風寒薄爲皶鬱乃痤

（註）夫皶與痤疿乃血滯於膚表之輕證蓋言陽氣外衞於皮膚之間爲邪所薄則淡滲於皮毛之血

而爲病矣故曰汗出偏沮使人偏枯者言陽氣之若天與日宜普偏於九州也乃生痤疿寒薄爲皶者言陽氣之外衛而在於皮毛之間也膏粱之變足生大疔者言陽氣之通會於腠理也

氣交變大論

歲木不及復則炎暑流火濕性燥病寒熱瘡瘍疿疹癰痤

註 皆暑熱爲病也

唐孫思邈千金方

熱瘡疿子

凡熱瘡起便生白膿卽今俗名膿窠瘡是也其初起卽淺但出黃汁名肥瘡又名黃爛瘡初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢坼裂春夏秋冬隨瘥劇者名瘑瘡

明戴思恭證治要訣

疿子

疿素問謂之疿痤香撲粉入朴硝末如常撲使更入少許枯白礬末

李梴醫學入門

疿痤

夏暑心神鬱燥熱逼汗漬成瘡偏身或出膿血赤爛如火用南星半夏黃連黃蘗各一錢五倍子黃丹各五分爲末乾摻如癢加枯礬雄黃常服黃連阿膠丸以清火

熱汗浸漬成瘡癢痛不止用黃芪當歸防風荊芥穗地骨皮木通各二錢白礬一兩爲末每藥一兩水三大椀煎五六沸濾去滓稍熱淋洗患處拭乾避風少時立效輕者只用臘雪水和蛤粉敷之

疿痤瘡因汗出冗濕而生輕者狀如撒粟用青蒿煎湯洗之或棗葉亦好重者熱汗浸漬匝匝成瘡用菉豆滑石末各五錢綿蘸撲之磨破成瘡加黃蘗棗葉各五錢片腦少許

王肯堂證治準繩

痤

痤即小癤世謂之熱癤是也王註云大如酸棗或如豆色赤而內有膿血也

海藏云汗出見濕乃生痤疿爲瘡癤也

痤色赤腫內有膿血

陳實功外科正宗

痤疿

痤疿者密如撒粟尖如芒刺癢痛非常渾身草刺此因熱體見風毛竅所閉宜服消風散洗用苦參湯甚者皮損匝匝成瘡以鵝黃散軟絹帛蘸藥撲之

石室祕籙　臣陳士鐸著

皮毛治法

疿瘡以暑氣傷熱而生也有雪水洗之更佳隨洗隨滅如不能得有一方最妙用黃瓜切成片擦之即愈此從皮毛治之之法也

方

旋覆花丸

旋覆花三兩　防風　白芷　甘菊花　南星

半夏　石膏　川芎　陳皮　白附子各半兩

蠍梢　殭蠶炒各三錢

右爲細末薑汁糊丸梧桐子大薑湯下三五十丸

食後服

膿胞瘡方

治熱爲主

黃芩　黃連　大黃各三錢　蛇牀子　寒水石各二錢　黃丹五分　白礬一錢　輕粉　白芷無名異各少許　木香少許（痛者加）

右爲細末麻油調塗

又方

蕎麥麪一兩　硫黃八錢研　水銀制鉛一錢研或油或猪膽汁調搽

白蒺藜散

治熱毒瘡瘙癢心神壅躁

白蒺藜炒去刺　白蘚皮　防風　大黃剉炒
赤芍藥　梔子仁　子芩　麥門冬去心焙
元參　桔梗　甘草炙赤剉　前胡去蘆各一兩

右爲細末每服二錢食後用薄荷湯調服

密陀僧散

治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

密陀僧　雄黃　雌黃　定粉各半兩　膩粉三錢

右研爲細末先用柳枝一握生甘草一兩搥碎以漿二升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾敷之

白金散

治風毒攻注徧身及手足生熱瘡疼痛出黃水

桂府滑石不拘多少

爲細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許水二椀煎上項藥至一椀去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上摻滑石末令遍身便睡至明決愈

玉粉散

治熱汗浸漬成瘡腫癢焮痛

寒水石煆出火毒　定粉各一兩　蛤粉九兩半

白石脂　白龍骨　石膏各半兩　滑石八兩半

粟米粉二兩

右爲細末研勻每用些少乾擦患處

七寶散

治熱汗浸漬成瘡癢痛不止

白礬一兩　黃芪　當歸　防風　荊芥穗

地骨皮　木通各二兩

右爲粗末每用藥一兩水三大椀煎六七沸濾去滓稍熱淋渫患處避風少時

赤石脂散

治痱子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂細研　黃蘗去粗皮剉　蠟茶末各半兩

白麪二兩　龍腦半錢另研

右爲細末研勻每用時綿搵撲之

苦參湯

治痤痱瘡作癢抓之又疼生如糠秕難以安睡

苦參四兩　大菖蒲二兩

右用河水五瓢同煎數滾添水二瓢蓋片時臨洗和入公猪膽汁四五枚淋洗患上不二三次全愈愈後避風忌食發物

鵝黃散

治痤痱瘡作癢抓之皮損隨後又疼用此撲之

菉豆粉一兩　滑石五錢　黃蘗三錢　輕粉二錢

右爲細末以軟絹帛蘸藥撲於患上止痛收乾

消風散

治風濕浸淫血脉致生瘡疥搔癢不絕及大人小兒風熱癮疹徧身雲片斑點乍有乍無並效

當歸　生地　防風　蟬蛻　知母　牛蒡子
胡麻　荊芥　蒼朮　苦參　石膏各一錢
甘草　木通各五分
水二鍾煎八分食遠服

單方

疿瘡癢痛龍腦一錢研粟米粉五兩研勻先用棗葉湯洗後用綿搵撲之

治痤瘡癢痛名玉女英滑石半兩細研菉豆粉四兩微炒研勻以綿搵撲之一方有棗葉一兩

楝花粉傅疿子搔癢用苦楝花不拘多少焙乾爲末入蚌粉滑石末各少許研勻日頻傅之

暑月汗漬腋下赤腫及疿瘡取臘雪水和蛤粉傅之

疿子用香撲粉入朴硝末如常撲使更入少許枯礬

末

熱痱瘡徧身如蠶子用不灰木棗葉爲末瘡上搽之卽止

又方用慈姑葉陰乾爲末傅之

又方用臘雪以瓶收貯遇生痱時以所化水塗傅

又方用黃瓜切斷擦痱子上卽安

又方用棗葉煎湯浴之

又方用蚌粉四兩菉豆粉二兩滑石一兩爲末乾擦之

冬霜和蚌粉傅暑月痱瘡及腋下赤腫立瘥凡收霜以雞羽掃之瓶中密封陰處久亦不壞

痱子搔癢取東壁乾土末傅之隨手愈（普濟方）

痤痱搔癢井泉石生三兩寒水石煅四兩腦子半錢爲末撲之（總錄）

腦上癰瘤石灰入飯內擣爛合之（李樓奇方）

夏月痱疱石灰煅甘草各一兩蛤粉二兩研撲之（集元方）

輭癤不愈爛船底油石灰研末油調傅之（胡氏方）

一切瘡癤土朱號丹牛皮膠等分爲末好酒一盌衝之澄清服以查傅之乾再上（集驗方）

熱痱搔癢升麻煎湯飲幷洗之（千金）

冬瓜切片摩痱子甚良

痱子搔癢舊屋梁上刮赤白堊末敷之（普濟方）

癤毒已破益母草擣敷甚妙（斗門方）

癤子腫毒鼠黏子葉貼之（千金下同）

些小癰癤發熱粉草節曬乾爲末熱酒服一二錢連進數服痛熱皆止（精要）

癰疽已潰牛膝根略刮去皮插入瘡口中留半寸在外以嫩橘葉地錦草各一握擣敷其上牛膝能去惡血二草溫凉止痛隨乾隨換有十全之功也（經驗方）

癰癤惡肉地黃三斤水一斗煑取三升去滓煎稠塗紙上貼之日三易（鬼遺方）

癤毒腫毒鹿角尖磨濃汁塗之甚妙（瀕湖方）

鬢邊熱癤貓頭上毛猪頸上毛各一把鼠尿一粒燒研油調敷之（壽域方）

癤毒狗頭骨燒煙日熏之（聖惠）

軟癤頻作露蜂房一枚燒存性以巴豆二十一粒煎清油二三沸去豆用油調傅甚效（得效方）

癩頭軟癤及諸熱瘡用五倍子七箇研末香油四兩熬至一半布絞去滓搽之三四遍即可勿以水洗之（普濟方）

乳癤初發黃明水膠以濃酢化塗之立消（簡便方）

小兒頭上生軟癤三四年不愈者老松香二錢蓖麻子肉四十九粒二味共研末用茶油少許同熬成膏只作一箇用布開貼癤子上要過七日揭開即愈

黑末子治癤毒用羊角連肉骨燒存性爲末酒調三錢分上下服之瘡可散按此方未嘗用服蓋祕方也常治面上或身卒得赤斑或癢或瘭毒不治殺人以羖羊角燒存性研令極細末以雞子清調塗之甚效本草亦云然

軟癤頻發翠玉膏通明瀝青八兩銅綠二兩麻油三兩雄猪膽三箇先鎔瀝青乃下油膽傾入水中扯拔器盛每用緋絹攤貼不須再換

頭上軟癤蝦蟆剝皮貼之收毒即愈（活幼全書）

預免瘡癤凡小兒每年六月六日照年數呑皂莢子可免瘡癤之患大人亦可呑七枚或二十一枚（扶壽方）

癰癤已潰芫花根皮搓作撚挿入則不生合令膿易竭也（集簡方）

癤子初起葛蔓燒灰水調傅之即消（千金）

醫案

儒門事親曰一省掾背項常有痤癤愈而復生戴人曰太陽血有餘也先令涌泄之次於委中以鈹針出紫血病更不復作也

寓意草曰黃鴻軒手臂忽生癰癤漫腫無頭痛極莫耐外科醫者咸謂熱毒所致揆之平素淡泊明志寧靜居心絕無生熱致毒之因究莫識其所起也尊公我兼謂昌善議病盍舍樽俎而一代庖人乎昌曰吾議此證請先爲致賀後乃言之瘡瘍之起莫不有因

外因者天行不正之時毒也起居傳染之穢毒也內因者醇酒厚味之熱毒也鬱怒橫決之火毒也治火毒與治諸毒原自天淵蓋火與元氣勢不兩立以寒凉折之則元氣轉漓矣鴻軒於此總無其因不問知爲胎毒之餘也凡人稟受天地之氣有清濁之不同惟純粹以精之體其福澤壽算俱不可限量然從父母搆精而有身未免夾雜慾火於形骸所賴者惟在痘瘡一舉暗將所藏慾火運出軀外復其粹精之恆體如鑛金相似必經爐火煅鍊而查滓與精瑩始分之爲兩吾嘗以此法觀出痘者之眸子七八日後開眼之時黑白分明者精金也赤筋紅膜包裹者混金也至於瞳人模糊神光不現則全非金矣鴻軒幼時出痘太多元氣不能充灌又爲雜證所妨臟腑中之火毒雖盡而軀殼之留滯猶存所以痘癰之發必於手足之委中曲池者則以零星小毒無處可容而潛避於呼吸難到之處耳今之癰疽正當委中之穴其爲痘毒何疑毒伏肘腋之下原無所害但粹精之體微有夾雜是亦寶鑑之微塵白璧之微纇也日者太

和元氣充滿周身將十五年前之餘滓盡欲化爲膿血而出他人見之爲毒吾已卜其爲興者機矣豈有暢於四肢而不發於事業者哉治法外用馬齒莧熬膏攻之速破內用保元湯托之盡出仍以痘門藥爲治卽日自當痊愈必不似瘡毒之曠日持久但不識證而以治瘡毒寒凉瀉火諸藥投之適以增楚貽患耳孰謂外科小恙可無樽俎折衝之人耶如法治之潰出膿水甚多果不用生肌長肉而自愈

外科湯火灸凍漆瘡門

唐孫思邈千金方

火瘡等病

凡火燒損愼勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞人筋骨難瘥初被火燒急向火更炙雖大痛强忍之一食久卽不痛神驗治火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤挍開與之然後以諸方治之

元張從政儒門事親

凍瘡

經曰寒瘡流水俗呼爲凍瘡或經年不愈者用野中淨土曬乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾爲度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傳之如夏月醫之更妙

明薛己醫按

論湯火瘡

湯火瘡證若發熱作渴小便赤澀用四物山梔連翹甘草養陰血以消毒若患處肉未死而作痛用四君芎歸山梔連翹甘草健脾胃以消毒若患處肉已死而不潰用八珍白芷甘草補氣血以排膿如未應加肉桂若患處死肉已潰而不收斂用四君芎歸黃芪健脾胃以生肌如未應加炮薑若小兒患之或目劄頭搖等證用四君加芎歸山梔健脾胃以清肝木若

食後卽有此患或腹脹作痛用四君山梔山楂神麴壯脾氣以消導大凡初患此證用神效當歸膏敷之輕者自愈重者自腐良肉易生其色赤者乃火毒未盡必搽至色白爲度倘患於肢節伸屈之處若敷此且免生痂傷碍新肉復潰難痊倘囘祿烟熏致死者以蘿蔔搗汁灌之卽甦以其辛能散氣也

李梴醫學入門

湯火瘡

湯泡火燒瘡初時宜强忍痛急向火炙愼勿以冷物熨之使熱不能出爛入筋骨後用寒水石七兩黃蘗黃連黃芩山梔大黃赤石脂各一兩甚者加冰片少許爲末酒調或鴨子淸調敷或陣玉丹亦好

凍裂

冬月下虛身觸寒冷血澀生瘡頑滯不知痛癢內服升麻抑氣飲去大黃外用木香檳榔硫黃吳茱萸黃麝香爲末麻油調搽

王肯堂證治準繩

湯火瘡

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛愼勿以冷物搨之及井底泥敷之使熱氣不出爛入肌肉

手足皴裂

夫秋冬風寒燥烈人手足爲之皸瘃者血少肌膚虛故易傷也外潤以膏澤內服益氣和血之藥可也

陳實功外科正宗

湯火

湯潑火燒此患原無內證皆從外來也有湯火熱極逼毒內攻又有外傷寒凉逼毒入裏外皮損爛者以清凉膏粟殼膏塗之毒氣入裏煩躁口乾二便祕澀者四順清凉飲下之泡破珍珠散摻之自愈

凍風

凍風者肌肉寒極氣血不行謂肌死患也初起紫斑久則變黑腐爛作膿者以碧玉膏主之生肌斂口

漆瘡

漆瘡由來自異有感而生也俗稱木生人感之非也但漆乃辛熱象有毒之物人之皮毛腠理不密故感其毒先發而癢抓之漸似癮疹出現皮膚傳徧肢體

皮破爛斑流水作痛甚者寒熱交作宜韭菜汁調三白散塗之服化斑解毒湯忌浴熱水兼戒口味不然變頑風癬癩愈而又發者多矣

石室祕籙　臣陳士鐸著

湯火傷

人有無意之中忽爲湯火所傷遍身潰爛與死爲鄰我有內治妙法可以變死而生方名逐火丹用大黃生甘草各五錢當歸四兩荆芥炒黑黃芩防風各三錢黃芪茯苓各三兩水煎服一劑痛減半二劑全減三劑瘡口全愈眞至聖至神之方也此方妙在重用大黃於黃芪當歸之內既補氣血又逐火邪尤妙用荆芥防風引黃芪當歸之補氣血生新以逐瘀更妙用茯苓三兩使火氣盡從膀胱下瀉而皮膚之痛自除至於甘草黃芩不過調和而清凉之已耳

凍瘡

凍瘡乃人不能耐寒而肌膚凍死忽遇火氣乃成凍瘡耳上凍瘡必人用手去溫之反成瘡也方用黃犬屎露天久者變成白色用炭火煆過爲末再用石灰

陳年者妙各等分以麻油調之敷上雖成瘡而爛敷之即止痛生肌神方也若耳上面上雖凍而不成瘡者不必用此藥止消荆芥煎湯洗之三日愈坐板瘡亦是肌膚之病止消輕粉一錢蘿蔔子三錢冰片半分杏仁去皮尖十四粒研爲末以手擦之瘡口上一日即愈神效奇絕無以過也

方

麻子膏

治火燒皮肉爛壞

麻子仁一合碎　柏白皮　柳白皮　山梔子碎

白芷　甘草各二兩

右剉細以猪脂一斤煎三上三下去滓以塗瘡上日三

黃蘗散

治湯火傷

黃蘗　大黃　朴硝　雞子殼　寒水石各等分

右爲細末用水調塗極效

柏葉散

治湯火傷

柏葉　梔子仁各一兩　鉛粉研半兩

右爲細末以羊髓五大合鎔化和藥以木椎研三五百遍一日三次塗之瘥

湯火傷方

大黃　黃芩　黃連　山梔子　黃蘗　知母

川貝母　密陀僧　乳香　沒藥　眞輕粉

甘草各等分

右爲細末用雞子清加蜜調不住手時時掃之

清涼膏

治湯潑火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁　黃連　白芷各二錢半　生地黃二兩

葱白十莖擘　黃蠟半兩　淸麻油四兩

右細剉於油鐺中煎地黃焦枯色綿濾去滓澄淸却於鐺內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒中用時

以雞羽搵少許塗瘡上以瘥爲度

水霜散

治火燒皮爛大痛

寒水石生　牡蠣煆　朴硝　青黛　輕粉各等分

右爲細末新水或小油調塗立止

止痛膏

治灸瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅瘢

松脂　羊脂　猪膏　黃蠟各一分

右取松脂破銚中切脂嚼蠟著松明上少頃銚內燒諸物皆消以杯盛汁傅之松明是肥松節也

神效當歸膏

治湯火瘡初起瘭漿熱毒侵展焮赤疼痛毒氣壅盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止疼痛

當歸　黃蠟各一兩　麻油四兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化放冷以磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白蠟

止痛生肌散

治灸瘡

牡蠣半兩煅研　寒水石煅研　滑石研各一分

右爲細末凡用之時切護爪甲勿令中風仍須洗瘡令淨然後摻藥薄薄令徧以輭綿帛繫之候肌生漸用柏皮膏

柏皮膏

治灸瘡久不瘥

柏樹白皮　伏龍肝各四兩　猪脂半斤煉爲油

右同熬成膏濾去滓入磁器中每用時薄薄塗之上以油紙隔軟帛裹

綠雲散

治灸瘡止痛

柏葉　芙蓉葉並端午日午時採不拘多少陰乾

右爲細末每遇灸瘡黑蓋子脫了卽用水調少許如膏藥攤楮紙上貼之養膿更無痛楚

四時貼護方

治灸瘡未著痂及出膿久不合者

春以柳絮　夏以竹膜　秋以新綿　冬以兔毛

右各隨時貼瘡上

內補黃芪丸

治鍼灸傷經絡流膿不止

黃芪八兩　當歸洗三兩　肉桂去皮　木香

乳香另研　沉香各一兩　菉豆粉四兩

右爲細末生薑汁煮糊爲丸如梧桐子大每服五十丸不拘時白湯送下

東垣潤肌膏

治手足皴澀皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青四兩　白黃蠟八錢　乳香二錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡鎔開微微熬動放淨水一大盆於旁以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿濾淨入水中折疊扯之以白爲度油當旋旋入勿令輭了以磁器盛或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子卩却捻合裂子藥亦火上炙輭塗於裂子上用紙少許貼之自然合矣

初虞世方

治手足皴裂春夏不愈者

生薑汁　紅糟　白鹽　臘月猪膏

右研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再用卽安

雉腦膏

治凍瘡久不瘥年年發歇先癢後痛然後腫破出黃水及血出不止

雄雉腦一枚研爛　黃蠟各等分　清油減半

右同於慢火上熬成膏去滓入磁器中盛每用塗瘡上

柏葉膏

治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

柏葉炙乾爲末四兩　杏仁去皮研四十箇

頭髮一拳大　食鹽半兩研　乳香二錢半研

黃蠟一兩　油一斤

右先煎油沸次下前五味藥待髮盡再下黃蠟攪勻磁盒收先以熱小便洗瘡以綿拭乾後以藥塗

卽以軟帛裹勿令寒氣侵入每日一換如瘡漸瘥三四日一換

四順清凉飮

治湯潑火燒熱極逼毒入裏或外被凉水所激火毒內攻致生煩躁內熱口乾大便祕實者服此

連翹　赤芍　羌活　防風　當歸　山梔

甘草各一錢　大黃炒二錢

右水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

珍珠散

治湯潑火燒腐皮已盡疼痛已止用此摻卽愈

珍珠一錢新白者入豆腐內煮數沸研至無聲

青缸花五分　眞輕粉一兩

右三味共研千轉細如飛麪方入罐收凡下疳初起皮損搽之卽愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨豬脊髓調搽如諸瘡不生皮者用此乾摻卽可生皮又婦人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者亦用此搽極效湯潑火燒痛甚者用玉紅膏調搽之

三白散

治漆瘡

杭粉一兩　石膏三錢　輕粉五錢

右爲末韭菜汁調敷紙蓋如無韭菜汁涼水調敷

化斑解毒湯

治漆瘡偏身癢痛者

元參　知母　石膏　人中黃　黃連　升麻

連翹　牛蒡子各一錢　甘草五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分不拘時服

碧玉膏

治凍風皮肉損爛膿水淋漓癢痛不止者

輕粉　杭粉各一兩　白蠟五錢　乳香　沒藥各

三錢　冰片二錢

用公猪淨熟油五兩同白蠟熬化傾入椀內入上

藥和勻水內頓一時取起臨用抿脚挑膏手心中

捺化攤油紙上用葱頭洗淨瘡對患貼之

單方

湯火灼爛白蘞末敷之（外臺）

湯火傷灼酢調黃土塗之（談野翁方）

又方用炭末香油調塗之（濟急方）

灸瘡腫痛竈中黃土末煑汁淋之（千金）

湯火傷灼用青瓷盌片爲末水飛過和桐油傳數次瘥（多能鄙事）

又方取多年屋上吻獸爲末油和塗之立效（事親）

又方胡粉羊髓和塗之（千金）

又方青竹燒油同鐵鏽搽之（積德堂方）

火瘡敗壞雲母粉和生羊髓傅之（聖惠）

湯火灼傷銀朱研細菜油調傅二次愈（多能鄙事）

油傷火灼痛不可忍石膏末傅之良（梅師方）

湯火傷灼年久石灰傅之或加油調（肘後方）

又方皂礬和涼水澆之其疼即止腫亦消（經驗方）

熱油火灼除痛生肌丹參八兩剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以塗瘡上（肘後方）

湯火傷灼白芨末油調傅之（趙眞人方）

又方餅爐中灰麻油調傅不得著水仍避風（衍義）

又方苦參末油調傅之（寶鑑）

又方石苔焙研傅之（海上方）

又方虎骨炙焦研敷神效（外臺）

又方白膠水煎令稠待冷塗之（斗門方）

湯火傷灼劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後乃摻末並不痛亦無痕大驗之方凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃摻藥爲妙（本事方）

湯火傷瘡葵菜爲末傅之

又方瓶盛麻油以筯就樹夾取黃葵花收入瓶內勿犯人手密封收之遇有傷者以油塗之甚妙（經驗方）

又方大黃生研蜜調塗之不唯止痛又且滅瘢此乃金山寺神人所授方也（夷堅志）

又方萞麻子仁蛤粉等分研膏湯傷以油調火灼以水調塗之（錄驗）

火瘡滅瘢赤地利末油調塗（聖惠方）

又方瓦松生柏葉同搗傅乾者爲末（摘要）

灸瘡不斂瓦松陰乾爲末先以槐枝葱白湯洗後摻之立效

湯火傷灼胡麻生研如泥塗之（外臺）

湯火傷灼未成瘡者用小麥炒黑研入膩粉油調塗之若犯冷水必令爛（袖珍方）

火燎成瘡炒麪入梔子仁末和油傅之（千金）

湯火傷灼大麥炒黑研末油調搽之

又方用稻草灰冷水淘七遍帶濕攤上乾即易若瘡濕者焙乾油傅二三次可愈（易簡方）

湯火傷灼粟米炒黑投水澄取汁煎稠如糖傅之能

止痛滅瘢痕一方半生半炒研末酒調傅之（纂要）

湯火灼瘡大豆煑汁飲之易愈無斑

火燒成瘡白糖燒灰粉之即燥易痊（小品方）

又方以酸酢淋洗併以酢泥塗之甚妙亦無瘢痕

又方菜子油調蚯蚓屎塗之（簡便方）

又方生蘿蔔擣塗之子亦可（總錄）

又方苦壺盧瓢燒灰傅之（集簡方）

又方五月五日掐黃瓜入瓶內封掛簷下取水刷之良（摘要）

又方絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調搽之生者擣傅一日即好（海上方）

火燒成瘡胡桃仁燒黑研傅

熱油燒痛以白蜜塗之（濟急仙方）

火毒生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末摻之立愈（醫說）

火灼爛瘡榆白皮嚼塗之（千金髓）

湯火灼瘡柳皮燒灰塗之亦可以根白皮煎猪脂頻傅之（肘後方）

又方經霜桑葉燒存性爲末油和傅之三日愈（正傳）

又方油調芙蓉末敷之（奇效方）

又方猪膽調黃蘗塗之（外臺）

又方狗毛細剪以烊膠和毛敷之痂落即瘥（梅師方）

又方濕牛屎擣塗之（姚和衆）

又方甘草煎蜜塗之（李樓奇方）

又方竹蠹蛀末敷之（外臺）

火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌者以酒熬牛皮膠傅之

湯傷以淋過第二次灰滓傅之立安

熱酒傷糯米粉炒黑爲末酒調傅之

湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡用白蜜封之以竹中膜貼上日三

治湯火瘡麩皮炒黑灰爲末傅上神妙此方有補性始終皆可用

湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生薑調於帛上貼之痛止

又方用鎔銀罐子細末油調傅佳

治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉傅之燥即瘥一方用雞子清調塗

治湯火燒方用蕎麥麪炒黃色蜜水調傅如神（奇效方）

保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切犬齧損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少爲極細末油調塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫苦楚日近完復永無破傷風證

湯火所傷赤爛熱痛赤石脂寒水石大黃各等分爲末以新汲水調塗傷處

火燒用桐油水銀各等分二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏末和以牛皮膠入少水鎔開外用猫兒肚底毛細剪摻上貼之

綠白散治湯熨火燒疼痛用苦參不拘多少爲細末再以小油調搽凡被燒油傷痛不可忍取厠下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老薑汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈以青黛傅之亦妙

湯火傷蛤粉散以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃爲細末用生油調如膏傅之如冰仍無痕一方以蜜水調傅

之疼立止不膿不瑕吳內翰居鄉中鄰家釜翻一小兒自頭至踵皆傷急以傅之啼立止遂無恙唯纔傷隨手用卽效少緩卽不及當須先合以備用

湯火燒瘡以側柏葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏傅傷處以帛子繫定三二日瘡當斂仍滅瘢

又方柏葉燒灰存性爲末以雞子清調傅如乾再上或蜜調亦可或擣末以脂調塗瘡上乾卽易

人向火生火斑成瘡有汁及治火氣入瘡用黃蘗薄荷爲末乾摻之卽愈一方用黃蘗皮爲末摻之立愈薄荷煎塗亦可

湯火瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調傅

又方髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患處驗

紫雪治湯盪火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡用松樹皮燒灰二錢瀝青一分研爲細末清油調傅濕則乾摻忌冷水洗日三一方不用瀝青以松樹皮陰乾爲細末入輕粉少許生油調傅如傅不住絹帛縛定卽生痂

雞黃油治湯火傷用雞子煑熟去白用黃於銀石鍋

內炒乾再炒直待都化作油去火毒毛翎掃下入部粉夜明沙爲末香油調傅濕則乾摻之

治湯澆火燒瘡止痛生肌大黃末一兩微炒當歸末一兩用燭油調搽或芝麻油調搽乾摻亦可

罌粟膏治湯潑火燒皮肉損爛疼苦焮熱起泡流水者麻油四兩罌粟花十五朶無花以殼代之浸油煎枯濾淸將油再入杓內下白蠟三錢熬化傾入罐內待四邊將凝時下眞輕粉細末二錢攪勻水內頓冷取起臨用將泡挑破用抿脚挑膏手心中捺化搽患上軟綿紙蓋絫日換二次其疼卽止次日將軟帛挹淨腐皮再搽之自愈（正宗）

湯火傷瘡小老鼠泥包燒研菜油調搽塗之（談埜翁方）

又方死老鼠以臘月猪油煎令消盡敷之則不作瘢神效（千金下同）

火燒悶絕不省人事者新尿頓服二三升良

湯火傷灼令不痛易愈無痕用人精鷹屎白塗之或女人精汁頻塗亦妙

湯火傷瘡多年乾白螺螄殼煆研油調敷（濟衆）

又方雞子清酒調勸洗即易生肌忌發物或生敷之亦可（經驗祕方）

灸瘡腫痛薤白一升猪脂一斤切以苦酒浸一宿微火煎三上三下去查塗之（梅師方）

灸火火毒入內兩股生瘡汁水淋漓用薄荷煎汁頻塗立愈（醫說）

灸瘡不瘥車缸脂塗之（千金下同）

又方鯽骨白礬等分爲末日日塗之

灸瘡癢痛不瘥楸葉頭及根皮爲末傅之（聖惠）

灸瘡血出不止用死蜣蜋燒研猪脂和塗（千金）

灸瘡不愈芙蓉花研末敷之（良方）

凍瘡破爛大黃末水調塗之（寶鑑）

手足皸裂白芨末水調塞之勿犯水（濟急方）

又方附子去皮爲末麪調塗之（試驗良方）

手足凍瘡山藥一截磨泥傅之（儒門事親）

又方老絲瓜燒存性和臘猪脂塗之（海上方）

耳足凍瘡橄欖核燒研油調塗之（乾坤生意）

手足皴裂川椒四合以水煑之去滓漬之半食頃出

令燥須臾再浸候乾塗猪羊腦髓極妙（勝金方）

又方生白果嚼爛夜夜塗之

凍脚裂坼蒸熱藕搗塗之

凍瘡裂痛乳汁調黃蘗末塗之（事親）

又方大楓子擣泥塗之（壽域）

脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一盌瓦器內熬候油沸髮鎔出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗皴裂令軟傅其上卽安一方加水粉

脚指縫皴裂或爛瘡鵝掌黃皮焙乾燒存性爲末乾則桐油調塗濕則摻之

又方以酒酵猪胰洗并傅之（肘後方）

又方牛鼻繩末和五倍子末頓入薄紙貼之（救急方）

又方牛髓敷之

又方五倍子末同牛骨髓塡納縫中卽安也（醫方大成）

凍指欲墮馬屎煑水漬半日卽愈（千金）

凍耳成瘡白蘝黃蘗等分爲末生油調搽（談埜翁方）

又方生薑自然汁熬膏塗（暇日記）

脚上凍瘡濃煎黃蠟塗之（姚和衆）

又方兎腦髓生塗之（聖惠）

又方以酢洗足研藕敷之

冬月手足坼裂黃蠟膏用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎鎔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色爲度先以熱湯洗火上烘乾即用藥敷以紙貼之其痛立止入水亦不落若入粉多則硬可以火炙軟敷之一方無五倍子

凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

又方桐油煎熱調密陀僧末傅之（丹溪）

又方五倍子煎湯洗之

漆瘡搔癢穀精草煎湯洗甚速效

又方莽草葉煎湯洗之

又方無名異末以水調敷

又方以磨刀石下滓泥塗之取瘥止大驗（千金下同）

又方爛擣七姑草封之

又方鐵漿頻洗之愈

又方芒硝湯洗之

又方白礬湯拭之

又方油調貫衆末塗之

又方挼慎火草塗之（外臺）

又方韭葉杵傅（斗門方）

又方白菘菜搗爛塗之

又方雞腸草搗塗之（肘後方）

又方莧菜煎湯洗之

又方用川椒煎湯洗之凡至漆所嚼川椒塗鼻上不生漆瘡

又方乾荷葉煎湯洗之良（集驗方）

又方宜啖猪肉嚼穄穀塗之（千金下同）

又方猪膏頻塗之

又方芥菜煎湯洗之

又方生柳葉三斤冬用皮煎湯適寒溫洗之

又方生螃蟹一味取黃塗敷日三五次

又方羊乳敷之（千金翼）

又方雞子黃塗瘡上乾則易之不過三次

又方黃櫨木煎湯頻洗之

漆瘡久不瘥用漆草搗爛敷患處立效

鍼灸

衛生寶鑑曰寒瘡流水俗呼爲凍瘡或經年不愈者用野田中淨土曬乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾爲度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡痂覺痛癢是瘡可治也然後口含漿水洗淨用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以輭帛拭乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

證治準繩曰足跟紅腫凍瘡取左足指面後跟赤白肉際骨下刺入三分彈針出血可灸三七壯

足跟凍瘡潰破用葱椒湯洗刮去腐用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傳之效

醫案

元史郝經傳曰經字伯常其先潞州人徙澤州之陵川家世業儒祖天挺元裕嘗從之學金末父思溫避地河南之魯山河南亂居民匿窖中亂兵以火熏灼之民多死經母許亦死經以蜜和寒葅汁決母齒飲之卽蘇時經九歲人皆異之

儒門事親曰戴人女僮足有寒瘍俗云凍瘡戴人令服舟車丸濬川散大下之其瘡遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

李杲十書曰老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴裂甚痛兩手不能執轅足不能履地而車上宿制潤肌膏敷之即效明日遂行自後屢用屢效

薛己醫按曰一男子孟冬火傷臂作痛喘嗽發熱此火毒刑肺金之證用人參平肺散治之喘嗽乃止因勞又惡寒發熱此氣血虛也以八珍湯加桔梗白芷治之而退再加薄桂三分以助藥勢溫氣血壞肉潰之而愈

馮氏子患火瘡驟用凉藥敷貼更加腹脹不食予以人參敗毒散加木通山梔治之外以柏葉炒爲末麻油調搽漸愈嘗用煑柏汁上浮脂調銀硃塗之更效若用凉藥逼火毒入內多致不救

一男子因醉被湯傷腿潰爛發熱作渴飲水脈洪數而有力此火毒爲患用生地當歸芩連木通葛根甘草十餘劑諸證漸退却用參芪白朮芎歸炙草芍藥白芷木瓜新肉將完因勞忍寒熱此氣血虛而然也仍用參芪之藥加五味子酸棗仁而安又月餘而瘡

痊

一男子火傷兩臂焮痛大小便不利此火毒傳於下焦用生地黃當歸芍藥黃連木通山梔赤茯苓甘草一劑二便清利其痛亦止乃以四物參芪甘草白芷而壞肉去又數劑而新肉生

一婦人湯傷胷大潰兩月不斂脈洪大而無力煩躁發熱日晡益甚此陰血虛火毒乘之而爲患耳用四物湯加柴胡丹皮熱退自凉更用逍遙散加陳皮以養陰血壯脾胃腐肉去而新肉生

證治準繩曰一女年數歲嚴寒上京兩足受凍不仁用湯泡潰至春十指俱爛牽連未落予用托裏之劑助其陽氣自潰脫得保其生此因寒邪遏絕運氣不至又加熱湯泡潰故死而不痛也余嘗見人之嚴寒而出凍傷其耳不知痛癢若以手觸之其耳即落當以煖處良久或熱手熨之無恙若以火烘湯泡其耳即死至春必潰脫落矣北方寒氣損人若此不可慎之

古今圖書集成

火灸湯漆瘡門之二十九

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十七卷目錄

醫部彙考三百七十七

外科跌打金刃竹木破傷門一

黃帝素問　脈要精微論

張機金匱要略　金瘡脈證

王叔和脈經　論脈

孫思邈千金方　打撲傷損　金瘡

劉完素六書　破傷風論

張潔古活法機要（墜損　破傷風）

朱震亨心法（跌撲損傷　破傷風）

戴思恭證治要訣（顛撲　刀傷）

虞摶醫學正傳（破傷風）

李梴醫學入門（折傷　破傷　杖瘡）

薛己醫按（正體主治大法）

王肯堂證治準繩（傷損總論　骨節條分　破傷風　外治）

陳實功外科正宗（跌撲　金瘡　杖瘡　咬傷　破傷風）

藝術典第三百九十七卷

醫部彙考三百七十七

外科跌打金刃竹木破傷門一

黃帝素問

脉要精微論

肝脉摶堅而長色不青當病墜若摶因血在脅下令人喘逆

註　肝主血而主色脉盛而色不見者血畜於下也當病墜傷或爲手摶所傷血凝脅下故喘逆也

漢張機金匱要略

金瘡脉證

寸口脉浮微而澀然當亡血若汗出設不汗者其身有瘡被刀斧所傷亡血故也

晉王叔和脉經

論脉

從高顛仆內有血腹脹滿其脉堅强者生小弱者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

砍瘡出血一二石脉來大者二十日死

砍刺出血不止者其脉止脉來大者七日死滑細者生

唐孫思邈千金方

打撲諸傷損

凡被打損血悶搶心氣絕不能言可擘開口尿其中令下咽卽醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安著以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便二升

金瘡

治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傅裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用若瘡甚深未宜速合者內少滑石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之啖燥食并肥膩之物以止渴愼勿鹹食若多飲粥及漿犯即血動溢出殺人又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞多食酸鹹飲酒熱羹臛輩瘡瘥後猶爾出百日半年乃可復常也

金劉完素六書

破傷風論

夫風病者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能爲害也故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證一例施治閭閻庸鄙往往有不知者只知有發表者不知有攻裏者和解者此汗下和三法也亦同傷寒證有在表者有在裏者有在半表裏者在裏宜下在表宜發汗在表裏之間宜和解然汗下亦不可過其法也故破傷風者從外至內甚於內者則病甚也因此卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使

寒熱更作身體反強口噤不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不差榮衞虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡爲破傷風之候故諸瘡不差時世皆言著灸爲上而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目斜皆因瘡鬱結于榮衞不得宣通而然亦有破傷不灸而病此者瘡著白痂則瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易爲鬱結而熱甚則生風也故表脉浮而無力太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和若明此三法而治不中病者未之有也

破傷風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦也宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱怫鬱而以麻黃湯辛熱發散也凡用辛熱開衝風熱結滯宜以寒藥佐之則良免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩知母石膏之類是也若止以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不

已漸傳入裏裏未大甚而脉弦小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加散風辛熱藥亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡和解之也若表勢已甚而舌強口噤項背反張驚惕搐搦涎唾稠粘胷腹滿塞便溺祕結或時汗出脉沉洪數而弦也然汗出者由風熱鬱甚于裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒藥調之則熱退結散而風自愈矣

元張潔古活法機要

墜損

夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡醫人俱作風中肝經留於脅下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脅下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人人有汗出皆屬風證諸風皆屬於肝木況敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故以破血行經藥治之

若登高墜下重物撞打箭鏃刃傷心腹胷中停積鬱

血不散以上中下三焦分之別其部分上部易老犀角地黃湯中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦可以小便酒同煎治之

更有內加生地黃當歸煎者有大黃者又法虛人不禁下者以四物湯加穿山甲煎服妙亦有花蘂石散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦可

朱震亨心法

跌撲損傷

跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎妙在下者可先須補接後下瘀血在上者宜飲韭汁或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心卽死

破傷風

破傷風多死治宜防風全蠍之類非全蠍不開十箇爲末酒調日三次

破傷風血凝心鴉翅燒灰存性研細酒調一錢

明戴思恭證治要訣

顛撲

仆踣不知曰顛兩下相搏曰撲其爲損一也因顛撲而迷悶者酒調蘇合香丸或鷄鳴散或和氣飲加大黃入酢少許煎或童便調黑神散不用童便用蘇木煎酒調亦得顛撲傷疼酒調琥珀散極佳再有烏藥順氣散用以治之風腰疼尤宜有顛撲人服藥并熏洗搽藥皆不效自若或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥各等分爲細末和勻酒調服之隨卽痛減其半

刀傷

刀傷血不止一味白芍藥散白酒調服卽以散摻傷處或其血出不透致惡血壅滯傷處赤腫或攻四肢頭面並鷄鳴散或煎紅花調黑神散其有血出不止勢難遏者用龍骨乳香等分研末窒患處蛇魚草搗塞尤妙非特可治刀傷撲血不止亦可

虞摶醫學正傳

破傷風

內經云風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能爲害也若夫破傷風證因事擊破皮肉往往視爲尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變爲惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或用艾焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其爲證也皆能傳播經絡燒爍眞氣是以寒熱間作甚則口噤目邪身體強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表者汗之在裏者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也閭閻野人多不識此證殺人甚易早不求醫治療而袖手待斃哀哉

李梴醫學入門

折傷

折傷有傷身體或墜跌打撲倒壓閃挫氣血鬱遏而破或金刃傷皮出血血外損筋骨者可治內損臟腑裏膜及破陰子耳後者皆不治

未出血者宜蘇木去瘀黃連降火白朮和中三味用

童便入酒煎服在上者宜韭汁和粥喫在下者可下血冷則凝不可飲冷水引血入心則死消瘀鷄鳴散花蕊石散順氣木香勻氣散加童便紅麴或紅酒已出血者急用陳王丹止血先服補托藥而後消瘀虛甚者亦不敢下血虛者四物湯加穿山甲氣虛者用蘇木參芪當歸陳皮甘草服半月脉散漸收方敢以煎藥調下自然銅末一味空心服之如骨不碎折者忌用素虛損甚者紫河車丹去麝香但損傷妙在補氣血或被寒冷者先宜散寒

折傷專主血論非如六淫七情有在氣在血之分然肝主血不問何經所傷惡血必歸於肝流於脅鬱於腹而作脹痛或增寒熱實者下之虛者當歸鬚散復元活血湯調之或十全大補湯加香附陳皮貝母等分水煎服

凡損傷瘡口忽乾毒攻腹內恍惚煩悶嘔吐及已出血多而又嘔血不止者難治初起嘔吐者用平胃散爲末內服外用薑汁調敷破傷風浮腫者江鰾丸氣弱者只用蜜導法

或始而出血過多或瘡口早合瘀血停滯俱是血分受病血屬陰五臟所主始雖在表隨卽入裏故多死也宜養血當歸地黃湯活神丹托裏散內托十宣散以防毒陷外用魚鰾散或用鼠頭骨爲末臘月猪脂調敷

破傷

又有破傷水濕口噤強直者用牡蠣爲末敷之仍以甘草煎湯調服二錢

或病已十分安痊而忽有口噤反張筋搐痰壅似破傷風證又似痓證其實乃氣血俱虛也凡癰疽潰後膿血大泄陽隨陰散變證只宜大補氣血果係風痓亦不宜以風藥治之血虛者四物湯加參朮氣虛者補中益氣湯去升麻陳皮加酒炒黑黃蘗五味子麥門冬肉桂大劑服之氣血俱虛汗多作渴寒熱者十全大補湯加桂附麥門冬五味子呃逆者托裏溫中湯若妄投風藥者死

杖瘡

杖瘡於法本不當治據古方破瘀去血爲先一杖畢

即飲童便和酒不可喫茶免血攻心待神氣定後體盛者用鷄鳴散下之體薄者瘡攻寒熱惡心少食宜當歸鬚散加柴胡羌活氣鬱加木香心腹脹痛加童便心下脹滿氣不通暢加木香檳榔外用熱豆腐鋪在杖處其氣如蒸其肉即紫復以熱豆腐鋪之以紫肉散盡淡紅爲度出膿血潰爛者亦宜甚者內服乳香定痛散隨以熱酒盡量而飲虛者潰後宜大補氣血脾胃兼吞紫河車丹最易平復外貼黃蠟膏馬齒膏凡杖瘡忽乾毒攻腹內恍惚煩悶嘔吐者難治

薛己醫按

正體主治大法

一脅肋脹痛若大便通和喘欬吐痰者肝火侮肺也用小柴胡湯加靑皮山梔淸之若胷腹脹痛大便不通喘欬吐血者瘀血停滯也用當歸導滯散通之內經云肝藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土肝火旣熾肝血必傷脾氣必虛宜先淸肝養血則瘀血不致凝滯肌肉不致遍潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易生若行尅伐則虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

一肚腹作痛或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胷脅反痛肝血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也用四物參朮補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下而惡寒發熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下而欲嘔胃氣傷也用六君當歸補之既下而泄瀉脾腎傷也用六君肉果破故紙補之若下後手足俱冷昏憒出汗陽氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛脣青體冷者虛極之外證也急投大劑參附湯多有得生者

一肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨作痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預爲調補脾胃則無此

患矣

一作痛若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當生肝血補脾氣

一青腫不消用補中益氣湯以補氣腫黯不消用加味逍遙散以散血若焮腫脹痛瘀血作膿也以八珍湯加白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以十全大補湯補之若骨接而復脫肝腎虛也用地黃丸腫不消青不退氣血虛也內用八珍湯外用葱熨法則瘀血自散腫痛日消若行血破血則脾胃愈虛運氣愈滯若敷貼凉藥則瘀血益凝內腐益深致難收拾

一發熱若出血過多或潰膿之後脈洪大而虛重按全無此陰虛發熱也用當歸補血湯脈沉微按之軟弱此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁肉瞤筋惕亡血也用聖愈湯如汗不止血脫也用獨參湯其血脫脈實汗後脈躁者難治細小者易治外臺祕要云陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加葱白王太

僕云凡熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動者名曰無火此無根之虛火也

一作嘔若因痛甚或因剋伐而傷胃者用四君當歸半夏生薑或因忿怒而傷肝者用小柴胡湯加山梔茯苓若因痰火盛用二陳湯加薑炒黃連山梔若因胃氣虛用補中益氣湯加生薑半夏若出血過多或因潰後用六君子湯加當歸

一喘欬若出血過多面黑胷脹或胷膈痛而發喘者乃氣血乘於肺也急用二味參蘇飲若欬血衄血者乃氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加山梔芩連蘇木

一作渴若因出血過多用四物參术如不應用人參黃芪以補氣當歸熟地以養血若因潰後用八珍湯若胃熱傷津液用竹葉黃芪湯胃虛津液不足用補中益氣湯胃火熾盛竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋濇乃腎經虛熱非地黃丸不能救

一出血若患處或諸竅出者肝火熾盛血熱錯經而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無

所附而妄行用加味四君子湯補中益氣湯或元氣內脫不能攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加附子或血蘊于內而嘔血用四物加柴胡黃芩凡傷損勞碌怒氣肚腹脹悶誤服大黃等藥傷陽絡則爲吐血衄血尿血傷陰絡則爲血積血塊肌肉青黯此脾肺虧損經隧失職急補脾肺亦有生者但患者不悟此理不用此法惜哉

一手足傷損若元氣虛弱或不戒房勞或妄行攻伐致死肉上延或腐而不痛黑而不脫者當大補元氣庶可保生若手足節解斷去者無妨骨斷筋連不急剪去若侵及好肉則不治若預爲調補脾氣則無此患大凡膿瘀內焮者卽針之而投托裏散或口噤遺尿而似破傷風者急用十全大補湯加附子多有生者

一腐肉不潰或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而不潰用八珍湯若因尅伐而不潰者用六君子湯加當歸其外皮黑堅硬不潰者內火蒸炙也內服八珍湯外塗當歸膏其死肉不能潰或新肉不能生而致

死者皆失於不預補脾胃也

一新肉不生若患處夭白脾氣虛也用六君子芎歸患處緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血虛也用十全大補湯膿稀白而不生者脾肺氣虛也用補中益氣湯膿血赤而不生者心脾血虛也用東垣聖愈湯寒熱而不生肝火動也用加味逍遙散晡熱而不生肝血虛也用八珍牡丹皮食少體倦而不生脾胃氣虛也用六君子湯膿穢而不生者陰虛邪火也用六味地黃丸四肢困倦精神短少而不生者元氣內傷也用補中益氣湯如夏月用調中益氣湯作瀉用清暑益氣湯秋令作瀉用清燥湯

一傷重昏憒者急灌以獨參湯雖內有瘀血切不可下急用花蕊石散內化之恐因瀉而亡陰也若元氣虛甚者尤不可下亦用前散化之凡瘀血在內大小便不通用大黃朴硝血凝而不下者急用木香肉桂末二三錢以熱酒調灌服血下乃生如怯弱之人用硝黃須加肉桂木香同煎假其熱以行其寒也

一大便祕結若大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸

丸或以猪膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黃丸腸胃氣虛用補中益氣湯

一傷損證用黑羊皮者蓋羊性熱能補氣也若杖瘡傷甚內肉已壞欲其潰者貼之成膿固速苟內非補劑壯其根本毒氣不無內侵外非砭刺泄其瘀穢良肉不無傷壞若受刑輕外皮破傷者但宜當歸膏敷貼更服四物芩連柴胡山梔白朮茯苓又瘡痂不結傷肉不潰死血自散腫痛自消若槩行罨貼則醞釀瘀毒矣

一跳躍搥胷閃挫舉重勞役恚怒而胷腹痛悶喜手摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸者肝經血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胷脅作痛發熱晡熱肝經血傷也用加味逍遙散若胷脅作痛飲食少思肝脾氣傷也用四君芎歸柴梔丹皮若胷腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君加柴胡芎歸若胷腹不利食少無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳白朮芎歸梔子青皮若咬牙發搐肝旺脾虛也用小柴胡湯川芎山梔天

麻鈎藤鈎或用風藥則肝血益傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛肝火愈熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血少壯者必爲痼疾老弱者多致不起

一破傷風河間云風證善行數變入臟甚速死生在反掌之間宜急分表裏虛實而治之邪在表者則筋脉拘急時或寒熱筋惕搐搦脉浮弦用羌活防風湯散之在半表半裏者則頭微汗身無汗用羌活湯和之傳入裏者舌強口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胷腹滿悶便溺閉赤時或汗出脉洪數而弦以大

芎黃湯導之既下而汗仍出表虛也以白术防風湯補之不時灌以粥飲爲善前云乃氣虛未損之法也若膿血大泄陽隨陰散氣血俱虛而類前證者悉宜大補脾胃切忌祛風之藥

一發痓仲景云諸痓項強皆屬於濕又云太陽病發汗太多因致痓風病下之則痓復發汗則拘急瘡家發汗則痓是汗下重亡津液所致有汗而不惡寒曰柔痓以風能散氣也宜白术湯加桂心黃芪無汗而惡寒曰剛痓以寒能澀血也宜葛根湯皆血氣內傷

筋無所營而變非風也杖瘡及勞傷氣血而變者當補血氣未應用獨參湯手足冷加桂附緩則不救

王肯堂證治準繩

傷損總論

傷損論曰夫傷損必須求其源看其病之輕重審其損之深淺凡人一身之間自頂至足有斫傷打傷跌傷及諸刃傷者皆有之凡此數證各有其說有當先表裏而後服損藥者爲醫者當循其理治之然醫者意也不知意者非良醫也或者禀性愚昧不能觀其

證之輕重明其損之淺深未經表裏通利先服損藥誤人多矣有因此痰涎上攻有因此大小臟腑閉結差之毫釐謬以千里所謂醫不三世不服其藥信哉此論治損傷之大綱也然用藥固不可差而整頓手法尤不可孟浪今以人之周身總三百六十五骨節開列于後

節骨條分

人身總有三百六十五骨節以一百六十五字都關次之首自鈐骨之上爲頭左右前後至轅骨以四十

九字共關七十二

骨巔中爲都顱骨者一　有勢微有髓及有液

次顱爲髏骨者一　有勢微有髓

髏前爲頂威骨者一　微有髓女人無此骨

髏後爲腦骨者一　有勢微有髓

腦後爲枕骨者一　有勢無液

枕骨之中附下爲天蓋骨者一　下爲肺系之本

蓋骨之後爲天柱骨者一　下屬脊窳有髓

蓋前爲言骨者一　言上復合於髏骨有勢無髓

言下爲舌本骨者左右共二　有勢無髓

髏前爲顖骨者一　無勢無液

顖下爲伏委骨者一　俚人訛爲伏犀骨者是也無勢髓

伏委之下爲俊骨者一　附下卽眉宇之分也無勢髓

眉上左爲天賢骨者一　無勢髓下同

眉上右爲天貴骨者一　眉上直目睛也

左睛之上爲智宮骨者一　無勢髓

右睛之上爲命門骨者一　兩睛之下中爲鼻

鼻之前爲梁骨者一　無勢髓

梁之左爲顴骨者一　有勢無髓下同

梁之右爲糺骨者一　顴糺之後卽耳之分

梁之端爲嵩柱骨者一　無勢髓

左耳爲司正骨者一　無勢髓下同

右耳爲納邪骨者一

正邪之後爲完骨者左右共二　無勢無髓

正邪之上附內爲嚏骨者一　無勢少液

嚏後之上爲通骨者左右前後共四　有勢少液

嚏上爲㗁骨者一　無勢多液

其㗁後連屬爲頷也左頷爲乘骨者一　有勢多液下同

右頷爲車骨者一

乘車之後爲轅骨者左右共二　有勢有液

乘車上下出齒牙三十六事　無勢髓庸下就一則不滿其數

復次鈴骨之下爲膻中左右前後至蓧以四十字闕

九十七骨

轅骨之下左右爲鈴骨者二　多液

鈴中爲會厭骨者一　無勢髓

鈴中之下爲咽骨者左中及右共三　無髓下同

咽下爲喉骨者左中及右共三　下同

喉下爲嚨骨者環次共十事

嚨下之內爲肺系骨者累累然共十二　無勢髓

肺系之後爲谷骨者一　無髓下同

谷下爲穀道骨者左右共二

嚨外次下爲順骨者共八　少液下同

順骨之端爲順隱骨者共八

順下之左爲洞骨者一　女人無此

順下之右爲棚骨者一　女人無此

洞棚之下中央爲𩩲骬骨者一　無髓俚人呼爲鳩尾

𩩲骬直下爲天樞骨者一　無髓

鈴下之左右爲缺盆骨者二　有勢多液

左缺盆前之下爲下厭骨者一　無髓下同

右缺盆前之下爲分膳骨者一　下同

厭膳之後附下爲倉骨者一

倉之下左右爲髎骨者共八　有勢無液

髎下之左爲冐骨者一　男子此骨大者好勇

髎下之左右蕩骨者一　女子此骨大則失夫

冐之下爲烏骨者一　男子此骨滿者髮早白

蕩之下爲臆骨者一　此骨高多訛妄

鈴中之後爲脊窳骨者共二十二　上接天柱有髓

脊窳次下爲大動骨者一　上通天柱共成二十四

椎

大動之端爲歸下骨者一　道家謂之尾閭

歸下之後爲篡骨者一　此骨能限精液

歸下之前蓧骨者一　此骨薄者多處貧下

復次缺盆之下左右至䙡以二十五字關六十骨此

下止分兩手臂至十指之端衆骨

支其缺盆之後爲傴甲骨者左右共二　有勢多液

傴甲之端爲甲隱骨者左右共二　此骨長則至賢

前支缺盆爲飛動骨左右共二　此骨短病痱緩

次飛動之左爲龍臑骨者一（有勢無髓無液下同）

次飛動之右爲虎衝骨者一

龍臑之下爲龍本骨者一虎衝之下爲虎端骨者一（俱有勢有髓）

本端之下爲腕也龍本上内爲進賢骨者一（男子此骨隆爲名臣）

虎端上内爲及爵骨者一（女人此骨高爲命婦）

腕前左右爲上力骨者共八（有勢多液下同）

次上力爲駐骨者左右共十（下同）

次駐骨爲搦骨者左右共十

次搦爲助勢骨者左右共十（左助外爲爪右助外爲甲）

爪甲之下各有襯骨左右共十（無勢無液）

復次髃骬之下左右前後至初步以五十一字闕一百三十六骨此下至兩乳下分左右自兩足心衆骨所會處也

髃骬之下爲心蔽骨者一（無髓）

髃骬之左爲脅骨者上下共十二（居小腸之分也）

左脅之端各有脅隱骨者分次亦十二　無髓

脅骨之下爲季脅骨者共二　多液

季脅之端爲季隱骨者共二　無髓

髑骭之右爲肋骨者共十二　處太陽之分也

肋骨之下爲䏚肋骨者共二　各無隱骨惟獸有之

右肋之端爲肋隱骨者共十二　無髓

蓧骨之前爲大橫骨者一　有勢少髓

橫骨之前爲白環骨者共二　有勢有液

白環之前爲內輔骨者左右共二　有勢有液下同

內輔之後爲骸關骨者左右共二　下同

骸關之下爲揵骨者左右共二

揵骨之下爲髀樞骨者左右共二　有勢多髓

髀樞下端爲膝蓋骨者左右共二　無勢多液

膝蓋左右各有俠升骨者共二　有勢多液

髀樞之下爲胻骨者左右共二　有勢多髓

胻骨之外爲外輔骨者左右共二　有勢有液下同

胻骨之下爲立骨者左右共二

立骨左右各有內外踝骨者共四　有勢少液

踝骨之前各有下力骨者左右共十　有勢多液

踝骨之後各有京骨者左右共二　有勢少液

下力之前各有釋欵之前各有起仆骨者共十　有勢

起仆之前各有平助骨者左右共十　有勢

平助之前各有襯甲骨者左右共十　無勢少液

釋欵兩旁各有核骨者左右共二　有勢多液

起仆之下各有初步骨者左右共二　有勢無髓有液女人則無此骨

凡此三百六十五骨也天地相乘惟人至靈其女人則無頂威左洞右棚及初步等五骨止有三百六十骨又男子女人一百九十骨或隱或襯或無髓勢餘二百五十六骨並有髓液以藏諸筋以會諸脉谿谷相需而成身形謂之四大此骨度之常也

頭目鼻耳傷凡腦骨傷破輕手撙捺平正若皮不破者用退腫膏敷貼若皮破肉損者先用封口藥摻之外以散血膏貼之若皮破血流者用止血散摻之若腫痛者用葛葉毛藤葉楓葉尾砍爛傅之不可見風

著水恐成破傷風

凡腦骨傷碎在輭處可治若傷太陽穴不可治如在髮際須剪剃去髮看皮破不破依上用藥敷若欲洗宜用熟油和藥水洗或和溫茶洗之

凡面目傷靑黑色用一紫散敷或紫金膏貼傷重者用補肉膏敷貼

凡腦兩角及後枕或兩眉有傷可治眼睛傷瞳神不碎可治或眼泡傷紫黑色用一紫散敷貼或紫金膏敷貼傷重者用補肉膏敷貼或頂心有損則難治

凡鼻兩孔傷凹者可治血出無妨鼻梁打撲跌磕凹陷者用補肉膏敷貼若兩鼻孔跌磕傷開孔竅或刀斧傷開孔竅用封口藥掞傷處外以散血膏貼之退腫

凡耳斫跌打落或上脫下粘或下脫上粘內用封口藥掞外用散血膏敷貼及耳後看脫落所向用鵝翎橫夾定却用竹夾子直上橫縛定縛時要兩耳相對輕縛住

舌唇口喉齒顋傷凡唇口刀斧斫磕跌墮等傷破皮

傷肉者先用桑白皮線縫合却以封口藥塗敷次以散血膏敷貼牽住所封藥不令開落仍少言語

凡跌破唇耳鼻而拔缺者即以封口藥掞外以散血膏敷貼若缺唇缺耳先用痲藥塗之却以剪刀剪去外些皮即以絹線縫合缺耳作二截縫合缺唇作三截縫合以雞子黃油塗次以金毛狗脊毛薄摻些於上次以封口藥塗抹之次日以茶輕洗就掞末一日換一次至八日剪去線又掞末

凡顋頰顴刀斧斫磕跌墮等傷破皮肉者用封口藥塡瘡口外以散血膏敷貼或跌磕損傷未破皮肉者用補肉膏敷貼

凡刀斧斫磕跌破上唇而拔缺者用絹片一小條從腦後縛向前來縛合縫定次掞封口藥外以散血膏敷貼如下唇整法却以絹片從下頦兜縛及如前法整頓次掞末敷藥或無腫不須敷藥

凡偶含刀在口內戲耍誤割斷舌頭未全斷者用封口藥傳一日換二三次藥七八日全安

凡兩臉涎囊被刀斧斫磕跌墮等傷傷開涎囊者用

絹線縫合却以封口藥塗敷外以散血膏敷貼七八日接住肉剪去線掞封口藥

凡牙齒被人打跌砍磕去了牙齒者只用補肌散摻及封口藥掞服破血藥止痛藥並用水煎藥服不宜用酒煎藥須知此法乃大有功

凡牙斷跌磕斫傷牙齒未動者用芙蓉膏末摻如齒動者用蒺藜根燒存性爲末常揩搽之卽牢

凡割喉者用騎脚患人頭項以絲線先縫內喉管却縫外頸皮用封口藥塗敷外以散血膏敷貼換藥或喉被人打歪以手搖正却以前膏敷貼若結喉傷重輭喉斷不可治以湯與之得入腸者可治若並出者不可治

頸骨肩胛脅肋傷凡高處跌墮頸骨捽進者用手巾一條繩一條繫在枋上垂下來以手兜縛頦下繫於後腦殺縛接繩頭却以瓦罌一箇五六寸高看捺入淺深斟酌高低令患人端正坐於其罌上令伸脚坐定醫者用手掣捺平正說話令不知覺以脚一踢踢去罌子如在左用手左邊掇出如在右用手右邊掇

出却以接骨膏定痛膏敷貼又一法令患人臥牀上以人擠其頭雙足踏兩肩即出

凡左右兩肩骨跌墮失落其骨叉出在前可用手巾繫手腕在胷前若出在後用手巾繫手腕在背後若左出摺向右肱右出摺向左肱其骨即入接左摸右鬢接右摸左鬢却以定痛膏接骨膏敷之

凡肩井骨及脅下有損不可束縛只捺令平正用補肉膏接骨膏定痛膏敷貼兩肋骨亦然

凡肩胛骨出相度如何整用椅一个令患人於椅後伸兩手於椅手圈住及以輭衣被盛墊脅下使一人捉定兩人拔伸却墜下手腕又著曲著手腕按捺平正却以定痛膏接骨膏敷貼絹片縛之

手傷手有四折骨六出臼凡手臂出臼此骨上段骨是臼下段骨是杵四邊筋脉鎖定或出臼亦挫損筋所以出臼此骨須拽手直一人拽須用手把定此間骨搦敎歸窠看骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊不用夾須在屈直處夾纔服藥後不可放定或時又用拽屈拽直此處筋多喫藥後若不屈直則恐成疾

日後曲直不得

肩胛上出臼只是手骨出臼歸下身骨出臼歸上或出左或出右須用舂杵一枚矮凳一个令患者立凳上用杵撐在於出臼之處或低用物墊起杵長則墊凳起令一人把住手拽去凳一人把住舂杵令一人助患人放身從上坐落骨節已歸窠矣神效若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩梯股中過用手把住木棒正稜在出臼腋下骨節蹉跌之處放身從上墜骨節自然歸臼矣

凡手䏸手腕骨脫綳直拽出醫用手擡起手䏸腕以患人本身膝頭墊定醫用手於頸項肩處按下其骨還窠却用定痛膏接骨膏敷貼若手腕失落或在上在下用手拽伸却使手撚住方可用前膏敷貼藥夾縛若手䏸骨出用圓椅橫翻向上醫用足踏住椅將病人手在椅橫內校曲入腕內以小書簿上下夾定平穩却用前膏敷貼用絹布兜縛時要掌向上若手盤出臼不可牽伸用衣服向下承住用手擠按動搖挪令平正却用前膏敷貼夾縛下用襯夾

凡手骨出向左則醫以右手拔入骨出向右則醫用左手拔入一伸一縮搖動二三次却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛

凡手脚骨只一邊斷則可治若兩手脚骨皆斷者不可治

凡手足骨斷者中間一坐縛可帶緊兩頭放寬些庶使氣血聚斷處

若接縛手者前截放寛縛些使血散前去若接足者下截放寛些使氣血散下去

凡用盤出向下將掌向上醫用手撙損動處將掌曲向外捺令平正用前膏貼再用夾向背一片長下在手背外向面一片短下在掌按處向小指一片長下在指曲處向大指一片短下在高骨處三度縛之

凡兩手臂骨打斷者有碎骨跌斷者則無碎骨此可辯之皆可用定痛膏接骨膏敷貼之

凡手指跌撲刀斧打碎用鷄子黃油潤次掞封口藥末外以散血膏敷貼絹片縛定若跌撲咬傷者用澤蘭散傅之若有寒熱者用退熱散傅之寒熱退去之

凡手掌根出臼其骨交互相鎖或出臼則是剉出鎖骨之外須是搦鎖骨下歸窠出或外則須搦入內或入內則須搦出外方入窠臼共只用手拽斷則難入窠有七八成痼疾也宜接骨膏定痛敷貼夾縛四折骨用杉皮竹片夾縛六出臼只宜以布帛包縛不可用夾要時時轉動不可一時不動恐接直骨

胷脅傷凡胷前趺出骨不得入令患人靠實處醫人以兩脚踏患人兩脚以手從脅下過背外相义抱住患人背後以手於其肩搊起其胷脯其骨自入却用定痛膏接骨膏敷貼

凡胷脯骨有拳搥傷外有腫內有痛外用定痛膏敷貼內用破血藥利去瘀血次用消血草擂酒服如刀傷先宜安骨定皮合口挪令平正却以封口藥掞瘡口外以補肌散以鷄子清調敷貼內服補損藥活血丹之類

凡胷骨筋斷先用破血藥却用定痛膏接骨膏敷貼皮破者用補肉膏敷貼

凡胷脅傷重血不通者用菉豆汁生薑和服一以壯

力人在後擠住自吐其血次用破血藥

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷破而不斷者皆可治療

凡腸出可以病人手搭在醫人肩隨其左右收起以麻油潤瘡口整入腹却以通關散吹鼻打噴嚏令腸自入用桑白皮線向皮內縫合後以封口藥塗傷處外以補肌散以鷄子淸調勻敷貼或散血膏更妙線上以花乳石散敷之

肚皮裂開者用麻縷爲線或搥桑白爲線亦用花乳石散敷線上須用從裏重縫肚皮不可縫外重皮留外皮開用藥摻待生肉

若腸上有小損孔以燈火照之腸中有氣射燈不可治

又一法腸出弔起病人手用酢煎山豆根汁服一口至二口却以針於病人頭上一刺其腸自入

凡肚皮傷破孔大肚腸與脂膏俱出放入內則用縫如孔小只有膏出用手擘去膏不用縫此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍患只須擘去不妨此

是開肉但放心去之肚內被傷者專用利大小腸不可待祕恐成重患

腰臀股膝傷凡腰骨損斷用門一片放地下一頭斜高些令患人覆眠以手伸上攀住其門下用三人拽伸以手按損處三時久却用定痛膏接骨膏敷貼病人渾身動作一宿至來日患處無痛却可自便左右翻轉仍用破血藥

凡臀盤左右跌出骨者右入左左入右用脚踏進擠捺平正用藥如跌入內令患人盤脚按其肩頭醫用膝抵入雖大痛一時無妨整頓平正却用接骨膏定痛膏敷貼只宜仰臥不可翻臥大動後恐成損患

凡腰腿傷全用酒佐通氣血藥俱要加杜仲

凡胯骨從臀上出者用二三人捉定腿拔伸仍以脚捺送入却用前等膏敷貼如在襠內出者則難治

凡脚骨傷甚難整當臨時相度難泥一說

凡兩腿左右打跌骨斷者以手法整其骨以手拽正上拽七分於前下拽五分於後整定用接骨膏定痛膏敷貼以夾縛縛時先縛中正後縛上下外用副夾

若上下有腫痛無慮五日方可換藥

凡辯腿胯骨出內外者如不貼膝便是出向內從內捺入平正如粘膝不能開便是出向外從外捺入平正臨機應變

凡脚盤出臼令患人坐定醫人以脚從腿上一踏一搬雙手一擠捺搖二三次却用接骨膏定痛膏或理傷膏敷貼

凡膝蓋損斷用手按捺進平正後用前膏敷貼桑白皮夾縛作四截縛之其膝蓋骨跌剉開者可用竹箍箍定敷藥夾定要四截縛之膝蓋不開也若腫痛須用針刀去血却敷貼用夾

若或內外踝骨左右脚盤剉跌損傷用脚踏直拽正按捺平正却敷貼前膏若膝頭骨跌出臼牽合不可太直不可太曲直則不見其骨稜曲則亦然只可半直半曲以竹箍箍住膝蓋骨以繩縛之

凡骨節損折肘臂腰膝出臼蹉跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法治之

脚傷脚有六臼四折骨凡脚板上交叉處出臼須用

一人拽去自用手摸其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拽歸外或骨出向外須用力拽歸內則歸窠若只拽不用手整入窠內誤入成痼疾也宜接骨膏定痛膏敷貼夾縛四折骨用正副夾縛束六出臼只宜以布帛包縛不可夾之

凡腳膝出臼與手臂肘出臼同或出內出外只用一邊夾縛定此處筋脈最多時時看顧不可疎慢宜接骨膏定痛膏敷貼夾縛

凡腳大腿根出臼此處身上骨是臼腿根是杵或出前或出後須用用一人手抱住患人身一人拽腳用手盡力搦歸窠矣或是剉開又可用輭綿繩從腳縛倒弔起用手整骨節從上墜下自然歸窠却用接骨膏定痛膏敷貼夾縛

背脊骨傷凡剉脊骨不可用手整頓須用輭繩從腳弔起墜下身直其骨使自歸窠未直則未歸窠須要待其骨直歸窠却用接骨膏或定痛膏或補肉膏敷以桑皮一片放在藥上杉皮兩三片安在桑皮上用輭物纏夾定莫令曲用藥治之

凡脚手骨被壓碎者須用刀割開甚者用剪刀剪去骨鋒便不衝破肉或有粉碎者去其骨免膿血之禍然後用大片桑皮以補肉膏或定痛膏糊在桑皮上夾在骨肉上莫令差錯三日一洗莫令臭穢用藥治之又切不可輕易自恃有藥便割便剪便弄須要詳細審視當行則行尤宜仔細或頭上有傷或打破或刀傷或壓碎骨用藥敷貼縛之凡纏縛之際要於密室無風之所勿使風入瘡口恐成破傷風之患切記切記切記

陰囊陰門傷凡陰囊被人扯脫者用鷄子黃油塗以金毛狗脊毛薄攤於上次掞封口藥又用散血膏敷貼外却用中葉金鎖匙紫金皮水煎服洗用紫蘇葉煎水洗

凡陰囊處有青黑紫色腫者用補肉膏敷貼或用定痛膏加赤芍草烏良薑肉桂各少許打和用韭葉砍爛同藥貼如無韭葉葱葉亦可仍服利小便藥

凡婦人腿骨出進陰門邊不可踏入用凳一條以綿衣覆上令患人於上卧醫以手拏患人脚用手一擠

上在好脚邊上去其腿骨自入却用接骨膏定痛膏敷貼

凡下近腿胯陰囊等處不用通藥但貼不令血蔭

筋骨傷凡斷筋損骨者先用手尋揣傷處整頓其筋骨平正用接骨等膏敷貼用正副夾縛定正夾用杉皮去外重皮約手指大排肉上以藥敷杉皮上藥上用副夾用竹皮去裏竹黄亦如指大疎排夾縛

凡骨碎斷或未碎斷但皮破損肉者先用補肌散塡滿瘡口次用散血膏敷貼如骨折要接骨膏敷貼夾縛或皮破骨斷者用補肉膏敷貼

凡骨斷皮破者不用酒煎藥或損在內破皮肉者可加童便在破血藥內和服若骨斷皮不破可全用酒煎損藥服之若只損傷骨未折肉未破者用消腫膏或定痛膏

凡皮破骨出差臼拔伸不入撙捺皮相近三分用快刀割開些捺入骨不須割肉肉自破了可以入骨骨入後用補肉膏敷貼瘡四旁腫處留瘡口用補肌散塡之皮肉不破用接骨膏定痛膏敷貼若破者必有

血出用力整時最要快便

凡皮裏有碎骨只用定痛膏接骨膏敷貼夾縛十分傷害自然爛開肉其骨碎必自出然後摻補肌散外以補肉膏敷貼

凡骨碎看本處平正如何大抵骨低是不曾損左右骨高骨定損了如折骨要拔伸捺平正用藥敷貼以正副夾束縛勿令轉動使損處堅固如出臼曲處要時時曲轉使活處不强

凡敷貼用板子一片就板子上將蕉葉或紙襯攤接骨膏定痛膏在上移在損處皮內有碎骨後來皮肉自爛先摻補肌散以敷補肉膏碎骨自出若破斷皮肉先以封口藥塡塗用線縫合外用補肉膏散血膏敷貼

凡平處骨斷骨碎皮不破者只用接骨膏定痛膏敷貼夾縛若手足曲直等處及轉動處只宜絹包縛令時數轉動不可夾縛如指骨碎斷止用苧麻夾縛腿上用苧麻繩夾縛冬月熱縛夏月冷縛餘月溫縛

凡拔伸捺正要氈絹輭物單正仍拔伸當近在骨損

處不得前去一節骨上仍拔伸相度左右骨各有正斜拔者

凡撙捺要手法快便要皮肉相執平正整拔亦要相度難易或用三四人不可輕易

凡筋斷用楓香以金沸草砍取汁調塗敷次用理傷膏敷貼

束縛敷貼用藥凡束縛春三日夏二日秋三日冬四日縛處用藥水泡洗去舊藥不可驚動損處洗了仍用前膏敷縛若束縛要杉木浸輭去粗皮竹片去黃用青共削約手指大片用杉木皮爲正夾竹片爲副夾疎排周匝以小繩三度縛縛時相度高下遠近使損處氣血相續有緊有寬說見前二三日一次換藥敷直要縛一个月藥次以補損好膏貼之亦要以杉皮夾住令損處堅固骨老方不夾之其杉皮貼肉上藥敷杉皮上紙被貼藥上竹片夾紙被上縛之

凡腫是血作用熱藥水泡洗次敷貼等草藥一時討不及者只用理傷膏貼最便

凡用夾須攤藥於紙上平兩頭要帶薄搭頭搭得不

厚不礙肉平坦者無高低不均之患若四岸高低不均此上便有空缺不著肉處即生泡切記之

凡敷貼接骨等藥疼痛不止者可加乳香沒藥楓香白芷肉桂南星獨活等味各量加些於藥中敷貼其肉溫暖疼痛即住刀斧傷者去肉桂南星獨活

凡換藥不可生換用手巾打濕搭潤逐片取脫隨手盪洗換藥不可輕停一時恐生肉泡仍先攤藥隨即應手換之此大節病累遭害切記之

凡傷重其初痳而不痛應拔伸捺正或用刀取開皮二三日後方知痛且先勻氣血

凡被杖打痛腫而未破者先用稜針出血若破者不須出血只用撒地金錢山薄荷生地黃地薄荷豬獮聹葉澤蘭葉血見愁搗敷貼若成杖瘡用黑膏藥白膏藥紅膏藥太乙膏牛脂膏貼之

凡刀斧傷者看輕重用藥如輕者只用補肌散挾重者宜用封口藥挾緊縛住如傷重者外用散血膏敷貼

用藥訣打顛樹木壓或自高處顛下者此等傷皆驚

動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥打血藥及通大小腸藥次第先服臨服加童子小便入藥內立效專用大小腸洗利恐作隘塞利害之甚清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無悶煩無惡血汚心以次用止痛藥服之卽止

顛撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清小便三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口出或結在內用藥打入大腸時卽泄或被打被顛被木壓惡血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上膈者打從口中吐出或歸中膈打入大腸泄出用此急救次服止痛藥卽二十五味藥中加減用

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後用童便一盞同服或止痛重傷者則用薑湯燈心湯調二十五味藥服之薄荷湯亦可

凡傷或刀傷及損內臟腑恐作煩悶崩血之患如折骨者同薑酒服接骨藥傅之如骨碎被重打重顛重木及石壓者皆用先服湯使法並用酒服如輕顛撲損傷則用薑湯調下二十五味藥立效

凡打撲傷損折骨出臼者便宜用何首烏散若發熱體實之人用疎風敗毒散若惡寒體弱之人用五積交加散後用黃白紅黑四味末子補損丹活血丹等藥調治之

凡折骨出臼者不宜用下瘀血之藥及通利大便之藥只宜疎風順氣勻血定痛補損而已

凡打撲砍磕從高跌墮瘀血攻心不能言語者用獨勝散次以復元活血湯調理

凡打撲跌墮損破皮肉紫黑色者先用破血藥次用獨聖散又次用清上瘀血湯消下破血湯

凡打撲損傷嘔惡血汁者先用獨聖散次用百合散又次用生料四物湯加硬骨牛乳根加減調理

凡打撲刀斧斫磕等傷破皮損肉血出去多頭目眩運者先用川當歸大川芎水煎服次加白芍藥熟地黃續斷防風荊芥羌活獨活南星水煎加童便和服則可不可用酒如血出少內有瘀血者以生料四物湯一半加獨聖散一半水煎服未破皮肉者上體加酒和服

凡打撲刀斧斫磕等傷破傷風痛不可忍牙關緊急角弓反張者用生南星防風等分爲末米泔調塗患處又用熱酒童便各半調連進三服即甦次用疎風敗毒散調治之

凡刀斧跌磕傷破陰囊皮者先服獨聖散次服止痛藥如內有宿血者用破血藥

凡刀斧傷破肚皮腸出者先用清心藥加童便和服及用獨聖散次用止痛藥如血出過多先用當歸川芎水煎服次加白芍藥熟地黃羌活獨活防風荊芥白芷續斷水煎調乳香沒藥末和服之

凡傷損藥中不可缺乳香沒藥此藥極能敗血止痛

凡刀斧跌磕閃肭脫臼者初然不可便用自然銅久後方可用之折骨者宜便用之若不折骨不碎骨則不可用修合諸損藥皆要去之好用自然銅必用火煆方可服之然新出火者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥烈之禍甚於刀劒戒之

凡墮傷內有瘀血者必腹脹滿而痛或胷脅滿也宜用破血藥清心藥及通利之自然而愈痛不止者用

獨聖散服之效驗如更不止用止痛藥服之大效如神

凡金刃所傷從高跌墮皮肉破損出血過多此宜止痛兼補爲先宜當歸補血湯若皮肉不破損者宜作瘀血停積治之先以獨聖散次以破血藥隨證加減續後痛不止者用止痛藥調理若胷膈疼痛用開心草雪裏開蘇木煎酒入童便和服卽效又方單用蘇木煎酒和童便服

凡治刀斧金刃打撲從高跌墮皮肉破損而傷重者中間破處挼封口藥或補肌散四邊用截血膏箍住使新血不來潮作此祕傳之妙訣也

凡損傷妙在補氣血俗工不知惟要速效多用自然銅恐成痼疾也初傷只用蘇木活血黃連降火白朮和中童便煎服在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭汁或和粥喫切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心卽死

凡老人墮馬腰痛不可轉側先用蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草煎服次以前藥調下紅黑黃白四

末子補損丹活血丹

凡杖打悶胸疼痛皆滯血證宜破血藥下之痛不可忍則傷血故也宜淸心藥更不止用獨聖散大效

凡刀斧打撲斫磕跌斷血出如湧泉者此傷經也用封口藥捺以手按實少時卽止又止血散捺之亦可如腫痛搗葱炒熱縛之

凡損大小便不通未可便服損藥葢損藥熱必用酒灑祕愈甚看患人虛實實者用破血藥加木通尚未通加芒硝虛者以四物湯加枳殼麻仁桃仁滑腸之類虛人不可下者四物湯加穿山甲

凡服損藥不可喫冷物魚牛肉極冷尤不可喫若喫牛肉痛不可止又瘟猪肉猪母肉不可喫切記之

凡損不可服草藥服之所生之骨必大不得入臼相兼君臣藥服則可要加溫補氣血藥同煎

凡損藥必熱能生氣血以接骨也更忌用火炙如敷藥不效服藥亦不效

凡用敷貼等草藥皆要臨時生採新鮮者用之有效如出遠路討不便者可研末用末不及生採者爲勝

如無草藥討處就用君臣藥接縛之

凡損藥內用酒者不問紅白只忌灰酒且重傷不可便用酒反承起氣作腹脹胷滿切記切記如稍定却用酒水煎或湯浸酒

凡打傷在兩脅兩胷兩肚兩肋却用通氣通血清心藥又看病人虛實不同虛者通藥須兼補藥放緩且用貼藥在前通藥在後

凡用通藥反不通者後用順氣藥腹肚全無膨脹而得安此爲不干血作乃是氣閉不通如腹肚果有血作一通便下亦須以順氣藥兼之庶胷膈肚腹不致緊悶氣順後却用損藥

凡人醉臥跌牀下胛背疼痛不可屈伸損藥不效服黑豆酒數日愈豆能下氣所損輕也

凡小兒跌凳角上止用蘿蔔子煎服愈亦順氣也

凡整作之法除頭腦上不可用藥水洗恐成破傷風餘可加熟油同藥水避風洗之且與住痛整時先用熱酒磨草烏服一二盞方整整時氣絕用蘇合香丸須甦未甦以黑豆防風甘草黃連煎冷服或苡草擂

水服不可用鹽解之若吐加生薑汁

右皆專科用藥之法人有虛實不可一例而施即如末條整時先服草烏酒整而氣絕灌以蘇合香丸走竄之劑未甦又以冷藥灌之若施之氣虛之人慘於加刃矣惟薛氏法量證施治專於內補可以遵用見後分證處治條學者宜審焉

十不治證顛撲損傷或被傷入於肺者縱未即死二七難過

左脅下傷透內者

腸傷斷一半可醫全斷者不可治

小腹下傷內者

證候繁多者

脉不實重者

老人左股壓碎者

傷破陰子者

血出盡者

肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

劉宗厚曰打撲金刃損傷是不因氣動而病生於外

外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情爲病有在氣在血之分也所以損傷一證專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證葢打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊惟宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不效也頃見圍城中軍士被傷不問頭面手足胷背輕重醫者例以大黃等藥利之後大黃缺少甚者遂以巴豆代之以爲不於初時瀉去毒氣後則多致危殆至於略傷手指亦悉以藥利之殊不知大黃之藥惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣胃氣虛弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止能破堅逐積用於此疾尤非切當所以有服下藥過後其脉愈見堅大醫者不察又以爲瘀血未盡而復下之因而夭折人命可不愼歟

破傷風

夫風者百病之始也淸淨則腠理閉拒雖有大風苛毒莫之能害諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合而風邪入之爲破傷風之候亦有陰瘡熱鬱結多著白痂瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風者先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並欲作痓急治之

東垣云破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治人知有發表不知有攻裏和解夫脉浮而無力太陽也在表宜汗脉長而有力陽明也在裏宜下脉浮而弦小者少陽也半在表半在裏宜和解明此三法而治不中病者未之有也此但云三陽而不及三陰者蓋風邪在三陽經便宜按法早治而愈若待傳入三陰其證已危或腹滿自利口燥嗌乾舌卷卵縮皆無生理故置而弗論也

解表羌活防風湯防風湯九味羌活湯蜈蚣散解後實之白朮防風湯攻裏大芎黃湯江鰾丸左龍丸後復小羌活湯和解羌活湯地榆防風散小柴胡湯日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血四物湯加防風藁

本白芷各等分細莘減半爲粗末每服五錢水煎溫服風藥過多自汗出者白朮黃芪湯

大汗不止筋攣搐搦白朮升麻湯搐痓不已蠲痓湯

背後搐者羌活獨活防風甘草向前搐者升麻白芷獨活防風甘草兩旁搐者柴胡防風甘草右搐加滑石

手足顫掉不已朱砂指甲散

四般惡證不可治第一頭目青黑色第二額上汗珠不流第三眼小目瞪第四身上汗出如油又痛不在瘡處者傷經絡亦死證也

外治

初覺瘡腫起白痂身寒熱急用玉眞散敷之或用杏仁去皮細嚼和雄黃飛羅白麪傅（一方只用杏仁白麪等分和勻新汲水調和如膏傳）腫漸消爲度若腰脊反張四支強直牙關口噤用鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂和傅牙關緊不能開用蜈蚣一條焙乾研細末揩牙吐涎立甦狗咬破傷風人參不拘多少桑柴火上燒令煙絕用盞子合研爲末摻瘡上仍以魚膠煮烊封固

陳實功外科正宗

跌撲

跌撲有已破未破之分亡血瘀血之異且如從高墜墮而未經損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便必難當以大成湯通利二便其人自甦不醒者獨參湯救之尋常墜墮徑以復元活血湯調之又如損傷骨節筋斷血流不止者獨勝散止之次用花蕊石散搽之又有跌斷骨節大損等證此則另有專門接骨紮縛未及詳註也

金瘡

金瘡乃刀刃所傷或有磁鋒割損淺者皮破血流而已深者筋斷血飛不住皮破者桃花散摻之其血自止筋斷者如聖金刀散摻紮止後又流者此證急用玉紅膏塗傷處膏蓋長肉蓋筋骨肉方斷斯人面色必黃外避風寒內忌冷物終保無妨有失血過多者獨參湯八珍湯補助爲要此外無法矣

杖瘡

杖瘡乃良肉受傷之患有已破未破之分正刑酷刑

之異已破肌肉者隨杖後以清涼拈痛膏敷之疼腫即消未破瘀血內攻者用針放出內畜瘀血再以大成湯下之便通自愈如傷處瘀腐已作疼痛者玉紅膏搽之自然腐化生新而愈至于辱刑非刑難受之時宜預服鐵布衫丸方得保身全命也

咬傷

人咬爲患良肉受傷但齒乃陽明胃經有餘臟腑多火多熱生之于口凡食經此無不嚼爛下咽又飲食炙煿之毒無不侵襲故傷人發腫其痛異常臭膿腐爛痛徹連心是感牙之毒也初咬時一日裏撒熱小便浸傷處洗淨牙黃瘀血咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋後出微膿漸愈如咬時未經此法致腫痛發胖疼甚者亦與童便浸洗挹乾用粗紙撚蘸麻油點火用烟焰熏腫痛上良久方住以解牙毒仍以蟾酥條插入孔內膏蓋候腫消時換玉紅膏搽之長肉完口如有雜證相兼者亦隨證而治

破傷風

破傷風因皮肉損破復被外風襲入經絡漸傳入裏

其外寒熱交作口噤咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼自汗傷處反爲平陷如故其毒內收矣當用萬靈丹發汗令風邪反出次以玉眞散患上貼之得膿爲效如汗後前證不退傷處不高或醒或昏時發時止口噤不開語聲不出者終爲死候

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十八卷目錄

醫部彙考三百七十八

外科跌打金刃竹木破傷門二

方一 復元活血湯 桃仁承氣湯 玉眞散 解毒散 聖愈湯 獨參湯 當歸地黃湯 四君子湯 小柴胡湯 八珍湯 犀角地黃湯 十味參蘇飲 二味參蘇飲 四物湯 加味承氣湯 歸脾湯 潤腸丸 當歸補血湯 十全大補湯 參附湯 清胃散 清燥湯 生脈散 二妙散 四斤丸 補中益氣湯 黑丸子 迴陽玉龍膏 復元通氣散 神效太乙膏 乳香定痛散 猪蹄湯 神效當歸膏 托裏散 加味芎歸湯 當歸

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

其外寒熱交作口噤咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼自汗傷處反爲平陷如故其毒內收矣當用萬靈丹發汗令風邪反出次以玉眞散患上貼之得膿爲效如汗後前證不退傷處不高或醒或昏時發時止口噤不開語聲不出者終爲死候

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十八卷目錄

醫部彙考三百七十八

外科跌打金刃竹木破傷門二

方一

復元活血湯　桃仁承氣湯　玉眞散
解毒散　聖愈湯　獨參湯　當歸地黃
湯　四君子湯　小柴胡湯　八珍湯　犀角
地黃湯　十味參蘇飲　二味參蘇飲　四物
湯　加味承氣湯　歸脾湯　潤腸丸　當歸
補血湯　十全大補湯　參附湯　清胃散
清燥湯　生脈散　二妙散　四斤丸　補中
益氣湯　黑丸子　迴陽玉龍膏　復元通氣
散　神效太乙膏　乳香定痛散　猪蹄湯　當歸
神效當歸膏　托裏散　加味芎歸湯

導滯散　花蕊石散　經驗方　消毒定痛散
洗藥　黑龍散　洪寶丹　沒藥降聖丹
萬金膏　接骨散　本事接骨方　沒藥丸
整骨麻藥　草烏散　定痛膏　又方　截血
膏　散血膏　接補消腫膏　一赤散　洗藥
荊葉散　敷貼藥　接骨丹　走馬散　乳香
膏　紫金皮散　內消方　消腫膏　芙蓉膏
紫金膏　拯損膏　松葱膏　退腫膏　一
紫散　一緑散　退熱散　澤蘭散　疎風敗
毒散　加味交加散　羌活乳香湯　仲景方
巴戟湯　奪命散　雞鳴散　清上瘀血湯
消下破血湯　大紫金皮散　破血藥　二
十五味藥　沒藥降聖丹　清心藥　破血消
痛湯　止痛藥　散血定痛補損丹　定痛當
歸散　四草定疼湯　聖靈丹　何首烏散
調經散　活血丹　大活血丸　黃末子　白
末子　紅末子　黑末子　牡丹皮散　橘术
四物湯

藝術典第三百九十八卷

醫部彙考三百七十八

外科跌打金刃竹木破傷門二

方一

復元活血湯

治墜墮或打撲瘀血流於脅下作痛或小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛

柴胡錢半　花粉　穿山甲　當歸酒拌各一錢
紅花　甘草各七分　大黃酒拌過炒二錢

桃仁二十粒去皮尖酒浸研

作一劑水二鍾煎一鍾食前服

桃仁承氣湯

治傷損瘀血停滯腹作痛或發狂或便毒壅腫疼痛便祕發熱並宜用此通之

桃仁五十粒去皮尖研　桂枝　芒硝　甘草炙

大黃各一錢

作一劑水二鍾煎一鍾空心服

玉眞散

一名定風散治破傷風重者牙關緊急腰背反張并蛇犬所傷

天南星　防風各等分

爲末每服二錢溫酒調下更搽患處若牙關緊急腰背反張者每服三錢用童便調服雖內有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若治風犬咬傷更用漱口水洗淨搽之神效

解毒散

治一切毒蛇惡蟲并獸所傷重者毒入腹則眼黑

口噤手足強直此藥平易不傷氣血大有神效不可以爲易而忽之

白礬　甘草末各一兩

爲細末每服二錢不拘時冷水調下更敷患處

聖愈湯

治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安眠睡不寧或五心煩熱

熟地黃酒拌蒸半日許　生地黃酒拌　川芎　人參各五錢　當歸酒拌　黃芪鹽水浸炒各一錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

獨參湯

治潰瘍氣血虛極惡寒或發熱或失血之證葛可久血脫用補氣即此方也

人參二兩

作一劑水二鍾棗十枚煎一鍾徐徐服若煎至稠厚即爲膏矣

當歸地黃湯

治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服此養氣血祛風

邪不拘新舊並治之

當歸酒拌　地黃酒拌　芍藥　川芎　藁本

防風　白芷各一錢　細辛五分

作一劑水二鍾煎一鍾服

四君子湯

治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散或潰而不斂或飲食少思或欲作嘔大便不實等證

人參　白朮　茯苓各二錢　甘草炙一錢

右作一劑薑棗水煎服

小柴胡湯

治一切撲傷等證因肝膽經火盛作痛出血自汗寒熱往來日晡發熱或潮熱身熱欬嗽發熱脅下作痛兩胠痞滿

柴胡二錢　黃芩一錢半　半夏　人參各一錢

甘草炙三分

右薑水煎服

八珍湯

治傷損等證失血過多或因尅伐血氣耗損惡寒

發熱煩躁作渴等證

人參　白朮　茯苓　當歸　白芍藥　川芎

熟地各一錢　甘草炙五分

右薑棗水煎服

犀角地黃湯

治火盛血熱妄行或吐衄不止大便下血因怒而致加山梔柴胡

犀角鎊末　生地黃　白芍藥　黃芩　牡丹皮

黃連各一錢五分

右水煎熟傾於鍾內入犀末服之

十味參蘇飲

治氣逆血蘊上焦發熱氣促或欬血䶊血或痰嗽不止加黃芩山梔卽加味參蘇飲

人參　紫蘇　半夏　茯苓　陳皮　桔梗

前胡　葛根　枳殼各一錢　甘草炙五分

右薑水煎服

二味參蘇飲

治出血過多瘀血入肺面黑喘促

人參一兩　蘇木二兩

右水煎服

四物湯

治一切血虛日晡發熱煩躁不安者皆宜服之

當歸　熟地黃各三錢　芍藥二錢　川芎一錢半

右水煎服加白朮茯苓柴胡丹皮即加味四物湯

加味承氣湯

治瘀血內停胷腹脹痛或大便不通等證

大黃　朴硝各二錢　枳實　厚朴　當歸

紅花各一錢　甘草五分

用酒水各一鍾煎至一鍾服仍量虛實加減病急

不用甘草

歸脾湯

治跌撲等證氣血損傷或思慮傷脾血虛火動寤而不寐或心脾作痛怠惰嗜臥怔忡驚悸自汗盜汗大便不調或血上下妄行其功甚捷

人參　白朮　當歸　白茯神　黃芪炒　遠志

龍眼肉　棗仁炒各二錢　木香　甘草炙各五分

右薑棗水煎服加柴胡山梔卽加味歸脾湯

潤腸丸

治跌撲等證或脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結等證

麻子仁　桃仁各一兩去皮尖研　羌活　歸尾

大黃煨　皂角刺　秦艽各五錢

右爲末煉蜜丸桐子大猪膽汁丸尤妙每服三五十丸食前白滾湯送下凡怯弱人先用猪膽導之不通宜補血

當歸補血湯

治杖瘡金瘡等證血氣損傷肌熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無此病多得於饑渴勞役者若誤服白虎湯必死

黃芪炙一兩　當歸二錢酒製

右水煎服

十全大補湯

治杖瘡氣血俱虛腫痛不消腐而不潰潰而不斂或惡寒發熱自汗盜汗飲食少思肢體倦怠若怯

弱之人患處青腫而肉不壞者服之自愈若有瘀血砭刺早者服之自消或潰而膿水清稀肌肉不生或口乾作渴而欲飲湯者尤宜服之

白茯苓　人參　當歸　白朮　黃芪　川芎
白芍藥炒　熟地黃　肉桂　甘草炙

右薑棗水煎服

參附湯

治金瘡杖瘡失血過多或膿瘀大泄陽隨陰走上氣喘急自汗盜汗氣短頭運等證

人參四錢　附子炮去皮臍三錢

右水煎服陽氣脫陷者倍用之

清胃散

治血傷火盛或胃經濕熱脣口腫痛牙齦潰爛或發熱惡寒等證

牡丹皮　黃連　生地黃　當歸酒洗各五分
升麻一錢

右水煎服如痛未止黃芩石膏大黃之類皆可量加

清燥湯

治跌撲瘡瘍血氣傷損或潰後氣血虛怯濕熱乘之遍身酸軟或秋夏濕熱太甚肺金受傷絕寒水生化之源腎無所養小便赤澀大便不調或腰腿痿軟口乾作渴體重麻木或頭目眩運飲食少思或自汗體倦胷滿氣促或氣高而喘身熱而煩

黃芪一錢五分　蒼朮一錢　白朮　陳皮

澤瀉各五分　白茯苓　人參　升麻　麥門冬

歸身　生地　神麴炒　猪苓　酒蘗各五分

柴胡　黃連　甘草炙各三分　五味子九粒

右薑水煎服濕痰壅盛參芪歸地之類可暫減之

生脈散

治金瘡杖瘡等證發熱體倦氣短或汗多作渴或潰後睡臥不寧陽氣下陷發熱煩躁若六七月間濕熱大行火土合病令人脾胃虛弱氣短或金爲火制絕寒水化源肢體痿軟脚欹眼黑並宜服

人參五錢　五味子一錢　麥門冬三錢

右水煎服

二妙散

治下焦濕熱腫痛或流注遊走遍身疼痛

蒼朮　黃蘗各等分

右爲末每服三二錢酒調服作丸亦可

四斤丸

治肝腎精血不足筋無所養攣縮不能步履或邪淫於內筋骨痿軟

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒洗　天麻　乾木瓜

鹿茸炙　熟地　菟絲子酒浸煮杵　五味各等分

右爲末用地黃膏丸桐子大每服五七十丸空心溫酒送下

補中益氣湯

治跌撲等證損傷元氣或過服尅伐惡寒發熱肢體倦怠血氣虛弱不能生肌收斂或兼飲食勞倦頭痛身熱煩躁作渴脉洪大弦虛或微細軟弱自汗倦怠飲食少思

黃芪炙　人參　白朮　甘草炙各一錢五分

當歸一錢　陳皮五分　柴胡　升麻各三分

右薑汁水煎服

黑丸子

一名和血定痛丸治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或風寒肢體作痛若流注膝風初結服之自消若潰而膿清發熱與補氣血藥兼服自斂

牛膝焙六錢　百草霜　芍藥各一兩　南星泡

川烏炮各三錢　赤小豆　白蘞各一兩六錢

白芨　骨碎補　當歸各八錢

右各另爲末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯溫酒送下孕婦不可服

廻陽玉龍膏

治跌撲所傷爲敷涼藥或人元氣虛寒腫不消散或不潰斂及壅腫堅硬肉色不變久而不潰潰而不斂或筋攣骨痛一切冷證並效

草烏二錢　肉桂五錢　南星煨　軍薑炒

白芷　赤芍藥炒各一兩

右爲末葱湯調塗熱酒亦可

復元通氣散

治打撲傷損作痛或氣滞作痛

木香　茴香炒　青皮去白　穿山甲酥炙

陳皮　白芷　甘草　漏蘆　貝母各等分

右爲末每服一二錢溫酒調下

神效太乙膏

治癰疽發背杖瘡及一切瘡疽潰爛

元參　白芷　當歸　肉桂　赤芍藥　大黃

生地黃各一兩

右用麻油二斤入銅鍋內煎至藥黑濾去柤徐入淨黃丹十二兩再煎滴水中捻軟硬得中卽成膏矣

乳香定痛散

治杖瘡金瘡及一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香　沒藥各五錢　滑石　寒水石煆各一兩

冰片一錢

右爲末搽患處痛卽止甚效

猪蹄湯

治一切癰疽杖瘡潰爛消腫毒去惡肉

白芷　當歸　羌活　赤芍　露蜂房蜂兒多者

生甘草各五錢

右用豬蹄一隻水五椀煑熟取清湯入前藥煎數沸去柤溫洗隨用膏藥貼之

神效當歸膏

治杖撲湯火瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速如棍杖者外皮不破內肉糜爛其外皮因內焮乾縮堅硬不潰爬連好肉作痛故俗云疔痂皮致膿瘀無從而泄內愈脹痛腐潰益深往往不待其潰就行割去而瘡口開張難以收斂怯弱之人多成破傷風證每致不救若杖瘡內有瘀血者卽用有鋒芒磁片於患處砭去惡血塗以此藥則疔痂自結死肉自潰膿穢自出所潰亦淺生肌之際亦不結痂又免皴揭之痛殊有神效蓋當歸地黃麻油二蠟主生肌止痛補血續筋與肉相宜此方余已刊行治者亦多用之

麻油六兩　當歸　黃蠟　生地黃各一兩

右先將當歸地黃入油煎黑去柤入蠟鎔化候冷攪勻卽成膏矣白蠟尤妙

托裏散

治金瘡杖瘡及一切瘡毒因氣血虛不能成膿或膿成不能潰斂膿水清稀久而不瘥

白朮炒　陳皮各七分　人參（氣虛者多用）　熟地

當歸身酒炒　芍藥酒炒　黃芪鹽水拌炒

白茯苓各一錢

右水煎服

加味芎歸湯

治跌撲墜墮皮膚不破瘀血入胃作嘔

川芎藭　當歸　百合水浸半日　白芍藥

荆芥穗各二錢

右水酒煎服

當歸導滯散

治跌撲瘀血在內胷腹脹滿或大便不通或喘欬

吐血

大黃　當歸各等分

右爲末每服三錢溫酒下氣虛須加桂一方有麝香少許

花蕊石散

治打撲傷損腹中瘀血脹滿欲死服之血化爲水其功不能盡述

硫黃明色者四兩　花蕊石一兩

右爲末和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上虛書八卦五行用炭三十斤煆之罐冷取出每服一錢童便調下

經驗方

治跌撲瘀血作痛或筋骨疼痛

黃蘗一兩　半夏五錢

右爲末用薑汁調塗患處以紙貼之如乾薑汁潤之周日易之

消毒定痛散

治跌撲腫痛

無名異炒　木耳炒　大黃炒各五分

右爲末蜜水調塗如內有瘀血砭去敷之若腐處更用當歸膏貼之尤妙

洗藥

凡傷重者用此淋洗然後傳藥

荊芥　土當歸　生葱切斷

右煎湯溫洗一方無葱有生薑或止用葱一味煎洗亦可

黑龍散

治跌撲損傷筋骨碎斷先用前湯淋洗以紙攤貼若骨折更以薄木片夾貼以小繩束三日再如前法勿去夾板恐搖動患處至骨堅牢方宜去若被刀箭蟲傷成瘡並用薑汁和水調貼日以風流散塡塗

土當歸二兩　丁香皮　百草霜　穿山甲炒黃或煉存性各六兩　枇杷葉去毛半兩

右焙爲細末薑汁水調或研地黃汁調亦好枇杷葉一作山枇杷根

洪寶丹

一名濟陰丹治傷損焮痛幷接斷

天花粉三兩　薑黃　白芷　赤芍藥各一兩

右爲末茶湯調搽患處

沒藥降聖丹

治傷損筋骨疼痛或不能屈伸肩背拘急身體倦怠四肢無力

沒藥別研　當歸酒洗炒　白芍藥　生地黃

骨碎補去毛　川烏去皮臍炮　川芎各一兩半

自然銅火煆酢淬十二次飛焙一兩

右爲細末每一兩作四丸以生薑自然汁與煉蜜爲丸每服一丸搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許煎至八分去蘇木空心服

萬金膏

治癰疽及墜撲傷損或筋骨疼痛

龍骨　鼈甲　苦參　烏鰂魚骨　黃蘗　黃芩

黃連　猪牙皂角　白芨　白蘞　厚朴　草烏

川芎藭　木鼈子仁　當歸　白芷各一兩

沒藥另研　乳香另研各半兩　槐枝　柳枝各四

寸長二十一條　黃丹一斤半炒　清油四斤

右除乳沒黃丹外諸藥入油內煎至黑色去之秤淨油每斤入丹半斤不住手攪令黑色滴水中不粘手下乳沒再攪如硬入油些少以不粘手爲度

接骨散

治骨折碎或骨出臼先整端正却服此藥如飛禽六畜所傷亦能治之

硼砂一錢五分　水粉　當歸各一錢

右爲末每服二錢煎蘇木湯調服後但飲蘇木湯

立效

本事接骨方

治打折傷損

接骨木（即蒴藋也）　乳香各半兩　赤芍藥　當歸

川芎　自然銅各一兩

右爲末用黃蠟四兩鎔入前末攪勻衆手丸龍眼大如打傷筋骨及閃痛不堪忍者用一丸熱酒浸開熱呷痛便止若大段傷損先整骨用川烏草烏等分爲末生薑汁調貼之縛定服藥無不效者

沒藥丸

治打撲筋骨疼痛或氣逆血運或瘀血內停肚腹作痛或胷膈脹悶

沒藥　乳香　川芎　川椒　芍藥　當歸

紅花　桃仁　血竭各一兩　自然銅四錢煆七次

右爲末用黃蠟四兩鎔化入前末速攪勻丸彈子大每服一丸酒化服按接骨散沒藥丸元氣無虧者宜用若腎氣素怯或高年腎氣虛弱者必用地黃湯補中益氣湯以固其本爲善

整骨痲藥

草烏三錢　當歸　白芷各二錢半

右末每服五分熱酒調下痲倒不知痛然後用手如法整理

草烏散

治傷骨節不歸窠者用此痲之然後下手整頓

白芷　川烏　木鼈子　猪牙皂角　烏藥

半夏　紫金皮　杜當歸　川芎藭各二兩

舶上茴香　草烏各一兩　木香半兩

右爲細末諸骨碎骨折出臼者每服一錢好酒調下痳倒不知疼處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋歸元端正用夾板夾縛定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此藥痳之或鐵鉗拽出或用鑿鑿開取出若人昏沉後用鹽湯或鹽水與服立醒

定痛膏

治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷赤腫疼痛

芙蓉葉二兩　紫金皮　獨活　南星生用

白芷各五錢

右末加生採馬藍菜墨斗菜各一兩杵搗極爛和末一處用葱汁老酒和炒暖縛若打撲跌磕壓傷骨肉痠疼有紫黑色未破皮肉者加草烏肉桂良薑各三錢研末薑汁調溫貼若紫黑色已退除良薑肉桂草烏薑汁却以薑汁茶清調溫貼之若折骨出臼者加赤葛根皮寶塔草各二兩搗爛和前藥一處又用肥皂十枚童便煑去皮弦子膜杵搗極爛入生薑汁少許生白麪一兩砍爛和勻入前

藥同杵搗勻用芭蕉葉托用前後正副夾須仔細整頓其骨緊縛看後上下腫痛消方可換藥腫痛未退不可換藥

又方

治跌打傷筋損骨疼痛不可忍

生地切　藏瓜薑糟各一斤　生薑四兩切

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相害吾有奇方可療於夢中授此方神效

截血膏

治刀斧斫磕等處能化血破瘀退腫止痛

天花粉三兩　薑黃　赤芍藥　白芷各一兩

右末茶清調勻敷瘡口四邊若刀斧傷於頭面血不止者急用此末茶清調勻塗頸上周圍若傷手則塗臂周圍若傷足則塗腿上周圍若傷各處則塗瘡口周圍使截住其血不來潮作也

金瘡著水肉翻花者用韭汁調此末傅瘡口四邊以火微炙之又用旱稻煙熏之瘡口出水即愈如

無水出卽是風襲倍加南星和敷

若瘡口肉硬不消者此被風所襲也可加獨活用熱酒調敷如又不消則風毒已深肌肉結實加紫金皮和敷有必消之理也

散血膏

治打撲傷損跌磕刀斧等傷及虎傷獐猪牛咬傷

甘草葉藤生藤上有棘葉如木綿葉又名豬獮聹又名虎聹草　澤蘭葉少許

右各生採杵搗極爛冷敷縛刀斧斫磕等傷破皮損肉者先用羊毛餅貼此膏瘡口四邊用截血膏敷貼令血不來潮作一人跌破陰囊又一人跌拔鼻孔二者俱先整理皮肉端正用此膏效驗

一法不用羊毛餅只用金毛狗脊毛薄薄鋪些些於患口上次掞封口藥再却以此膏貼效更速

接補消腫膏

治證同前

耳草葉　雪裏開　水圹葉　烏苞葉　紫金皮

右末以雞子清入桐油少許調勻敷貼

一赤散

治傷損傳藥後起疱者以三稜針挑破摻末

大黃　赤石脂　石膏煅各等分

右爲末摻之

洗藥荆葉散

治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛

頑荆葉一兩　白芷　細辛　蔓荆子　桂心

川芎　丁皮　防風　羌活各半兩

右作一服入鹽半匙連根葱五莖漿水五升煎取三升去滓通手淋洗痛處冷即再易避風處洗之

敷貼藥

接骨如神

天南星　木鼈子各四兩　沒藥　乳香各半兩

官桂一兩

右爲細末薑一斤去皮研爛取自然汁入米醋少許白麪爲糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篦夾定麻索子纏

接骨丹

治折骨出臼無草藥討處用此方效

南星生四兩　木鼈子三兩　紫金皮　芙蓉葉

獨活　白芷　官桂　松香　楓香各一兩

小麥麪二兩　乳香　沒藥各五錢

右末米酢生薑汁各少許入酒調勻攤油紙上夾縛冬月熱縛夏月溫縛

走馬散

治折傷接骨

柏葉　荷葉　皂角俱生用　骨碎補去毛各等分

右爲末先將折傷處揣定令入元位以薑汁調藥如糊攤紙上貼骨斷處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛再加沒藥

乳香膏

治打撲傷損

乳香　松香　楓香　五倍子　狗骨煆各一兩

鍋底墨　小麥麪各五兩

右末用好酒調爲糊樣熱敷痛處不可敷破處若

破爛者只用鳳尾草爲末摻之

紫金皮散

治打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮酢炒　南星　半夏　川當歸　烏藥

黃蘗鹽炒　草烏炮　川烏炮　杜當歸　川芎

破故紙　川白芷鹽水炒　劉寄奴　川牛膝

桑白皮各等分

右爲細末生薑薄荷汁兼水調敷腫處或傷處皮熱甚加黃蘗皮生地黃半兩有瘡口者勿封瘡口四邊傳之

內消方

治打撲傷損及一切腫癰未破可令內消

生地黃研如泥　木香細末

右以地黃膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一層又再攤地黃膏貼腫上不過三五度卽愈昔許元公入京師赴省試過橋墜馬右臂臼脫路人語其僕曰急與接入臼中若血漬臼則難治矣僕用其說許以昏迷不覺痛遂僦轎舁歸邸或曰非錄事

巷田馬騎不能療此疾急召之至巳日暮因秉燭視其面目尚可治乃施藥封此處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青瘀乃移在臼上自是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑血三升五日復常遂得赴試蓋用此法云

消腫膏

治胷脅跌墮打撲損傷腫痛或動筋折骨

芙蓉葉　紫金皮各五兩　白芷　當歸　獨活

骨碎補　何首烏　南星各三兩　橙橘葉

赤芍藥各二兩　石菖蒲　肉桂各五錢

右末以熱酒薑汁調乘熱縛腫處用葱汁茶清調和溫縛動筋折骨加山樟子葉毛銀藤皮及葉各五兩同前爲末酒調暖敷縛

芙蓉膏

治打撲傷損腫痛紫黑色久不退者

紫金皮　南星各一兩　芙蓉葉二兩　獨活

白芷　赤芍藥各五錢

右末生薑汁茶清調溫貼縛傷損紫黑色久不退

者加肉桂五錢

紫金膏

治赤腫焮熱者

芙蓉花葉二兩（白花者佳）　紫金皮一兩

右生採入生地黃同搗傳貼或爲末以雞子清入蜜少許和勻調入生地黃砍爛和傳

拯損膏

治諸傷損

天花粉　芙蓉葉　紫金皮　赤芍藥　南星

獨活　當歸　白芷各一兩　牡丹皮三錢

右末薑汁調熱傳貼疼痛甚者加乳香沒藥各少許

松葱膏

治傷損

松香　葱連根葉炒熱

右杵搗成膏炙熱縛傷處先以生薑砍爛炒熱罨少時次以此膏貼之退腫住痛

退腫膏

治頭腦破傷或跌破或刀斧傷處或被杖棒打破及別處傷

芙蓉葉　地薄荷　耳草葉　澤蘭葉　金桐葉

赤牛膝　大黃另研末各等分

右砍爛傅貼傷處中間留孔出氣用澤蘭葉盪軟貼住冬月用芭蕉葉一日一換藥用茶洗傷處若傷處浮腫用小青葉搗傅後用尻池葉地薄荷搗傅後痛不住用葛葉毛藤葉楓葉尾砍傅貼住痛

一紫散

治傷損眼泡青黑紫色腫痛

紫金皮　童便浸七日曬乾　生地黃各等分

右砍爛茶清調勻傅貼餘處傷不用製

一綠散

治打撲眼泡赤腫疼痛

芙蓉葉　生地黃各等分

右砍爛敷貼或爲末雞子清調勻傅之

退熱散

治跌磕打傷惟大指中指傷命餘指無妨

山布瓜根（多）　景天草　澤蘭葉　地薄荷

魚桐根皮

右搗爛冷縛傷處大退身上寒熱

澤蘭散

治跌撲咬傷及咬傷手指幷刀斧傷

芙蓉葉　澤蘭葉　白佛桑葉　地薄荷　耳草葉

右搗爛冷縛傷處留口通氣以七葉楊香葉或池黃葉熱茶盪軟貼住

疎風敗毒散

治打撲諸損動筋折骨跌磕墮傷者

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃　羌活　獨活

桔梗　枳殼　柴胡　白茯苓　白芷　甘草

紫蘇　陳皮　香附

右生薑生地黃煎入酒和服

加味交加散

治打撲傷損折骨出臼發熱惡寒體弱之人用此服之若體實之人宜疎風敗毒散

當歸　川芎　白芍藥　生地黃　蒼朮　厚朴

陳皮　肉桂　白茯苓　半夏　羌活　獨活

桔梗　枳殼　前胡　柴胡　乾薑　甘草

右生薑煎服有熱除乾薑肉桂

羌活乳香湯

治跌撲傷損動筋折骨發熱體痛挾外邪者

羌活　獨活　川芎　當歸　防風　荊芥

丹皮　續斷　紅花　桃仁　陳皮　赤芍藥

右生地黃煎服有熱加柴胡黃芩

仲景方

治墜馬及一切筋骨損傷

亂髮如鷄子大　緋帛如手大　敗蒲席三寸

久用炊單布一尺並燒灰　大黃一兩切酒浸

桃仁四十九箇去皮尖　甘草如中指節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立瘥利及浴水赤勿怪卽瘀血也

巴戟湯（潔古）

治從高墜下及打撲內損昏冒嗜臥不能飲食此謂血閉臟腑不通

巴戟去心　大黃各半兩　當歸　地黃　芍藥
川芎各一兩

右爲末水煎以利爲度

奪命散（濟生）

治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌慢火炒乾黃色半兩　黑丑二兩

右末每服二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡爲度

雞鳴散（三因）

治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死煩躁頭痛叫呼不得並以此藥利去瘀血治折傷神妙

大黃一兩酒蒸　桃仁二七粒去皮尖

右研細酒一椀煎至六分去查雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擘

口開用熱小便灌之卽愈

清上瘀血湯

治上膈被傷者

羌活　獨活　連翹　桔梗　枳殼　當歸
梔子　黃芩　甘草　川芎　桃仁　紅花
蘇木　大黃　赤芍藥

右生地黃煎和老酒童便服

消下破血湯

治下膈被傷者

柴胡　川芎　大黃　當歸　黃芩　赤芍藥
桃仁　枳實　梔子　木通　澤蘭　五靈脂
紅花　蘇木　赤牛膝

右生地黃煎加老酒童便和服

大紫金皮散

治打撲傷折內損肺肝

紫金皮　補骨脂　無名異燒紅酒焠七次
降眞香　川續斷　琥珀另研　牛膝酒浸一宿
桃仁去皮尖雙仁　當歸洗焙　蒲黃各一兩

大黃濕紙裹煨　朴硝另研各一兩半

右爲細末每服二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

破血藥

治打撲墮馬從高跌下皮肉不破者此瘀血停積內攻不能言語而或譫妄此宜攻利爲先若皮破血流者宜作金瘡亡血過多治之

柴胡　黃芩　五靈脂　枳實　當歸　赤芍藥

川芎　大黃　生地黃　朴硝　桃仁　紅花

蘇木

右水煎入酒童便和服皮破血流者不用酒

二十五味藥

治顛撲損傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並皆治之

香白芷　紫金皮　破故紙各酢炒　劉寄奴

川當歸鹽炒　赤芍藥米泔浸　黑牽牛　川芎

乳香　沒藥　川牛膝茶水浸　生地鹽水浸炒

木通　自然銅（臨好時用）　官桂　草烏酢炒　木香

川烏火煨　藿香　骨碎補　木賊　羌活

獨活各一兩　熟地鹽水炒　牛膝茶水炒各半兩

孕婦去川烏草烏骨不碎或金刃傷胜臼者去自然銅骨碎骨折者用之然須於此方內去自然銅臨好時却入用之如早服致成他疾右同研爲末蜜丸如彈子大黃丹爲衣或被顚撲損傷金刃箭鏃不問輕重每服一丸溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刃傷全斷內損重者以薄荷湯或木瓜湯薑湯燈心湯皆可服病在上食後病在下食前在中者不拘時服老人骨脉冷宜加當歸川芎川烏木香丁香人參各半兩去白芍藥生地黃

沒藥降聖丹

治打撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及營衞虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力

沒藥研　當歸酒洗焙　芍藥　骨碎補爁去毛

自然銅火煆酢淬十二次研末飛過焙　川烏頭生去皮臍各一兩　生地黃　川芎各一兩半

右爲細末以生薑自然汁與煉蜜和丸每一兩作

四丸每服一丸搥碎用水酒各半鍾入蘇木少許
煎至八分去蘇木空心服

清心藥

治打撲傷損折骨出臼刀斧砍磕等傷及肚皮傷
破腸出者

牡丹皮　當歸　川芎　黃芩　黃連　赤芍藥
生地黃　連翹　梔子　桃仁　甘草

右燈心草薄荷煎入童便和服

破血消痛湯（東垣）

治乘馬損傷跌破脊骨惡血流下脅下甚痛苦楚
不能轉側妨於飲食

羌活　防風　官桂各一錢　蘇木一錢半
柴胡　連翹　當歸梢各二錢　麝香少許另研
水蛭三錢炒去煙盡另研

右爲粗末只一服酒二大盞水一盞水蛭麝香另
研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之
兩服立愈

止痛藥

治打撲傷損折骨出臼金瘡破傷

當歸　牛膝　川芎　淮生地　赤芍藥　白芷
羌活　獨活　杜仲　續斷各一兩　八角茴香
肉桂　乳香　沒藥各五錢　丁皮　南木香
沉香　血竭各二錢半

右末老酒調服

散血定痛補損丹

治諸般傷損腫痛

當歸　川芎　赤芍藥　生地　白芍藥　牛膝

續斷　白芷　杜仲製　骨碎補　五加皮
羌活　獨活　南星製　防風各一兩半　官桂
乳香　沒藥各一兩　木香　丁皮　角茴各五錢

右末酒調服

定痛當歸散

治諸損腫痛

當歸　川芎　赤芍藥　白芍藥　熟地　羌活
獨活　牛膝　續斷　白芷　杜仲各二兩
川烏炮　乳香　沒藥　肉桂各一兩　南木香

角茴　丁皮各五錢

右末酒調服

四草定疼湯

治打撲跌墮壓磕等傷腫痛

山薄荷　寶塔草　矮金屯葉　皺面藤葉

右生採葉擂酒服根梗煎酒服

聖靈丹

治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並宜服之

乳香五錢　烏梅去核五箇　上白米一撮

萵苣子一大盞炒取二兩八錢

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒呑下食後一伏時痛不止再服

何首烏散

治打折筋骨初然便宜服此藥順氣疎風活血定痛

何首烏　當歸　赤芍藥　白芷　烏藥　枳殼

防風　甘草　川芎　陳皮　香附　紫蘇

羌活　獨活　肉桂

右薄荷生地黃煎入酒和服疼痛者加乳香沒藥

調經散

治跌撲損傷疎利後用此藥調理

川芎　當歸　芍藥　黃芪各一錢半　青皮

烏藥　陳皮　熟地黃　乳香另研　茴香各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

活血丹

治打撲傷損動筋折骨跌墮斫磕刀斧等傷諸般風疾左癱右瘓手足頑麻婦人血風渾身疼痛冷痹一切損傷悉皆治之

青桑炭一斤　當歸　牛膝　川芎　赤芍藥

熟地　黑豆酒煑　何首烏　南星製　白芷

老松節燒　杜仲製　破故紙　羌活　獨活

蒼朮製　防風　荊芥　骨碎補　桔梗　栗間

續斷各四兩　草烏酢煑炒　川烏炮　肉桂

木鼈子炒　地龍去土　白蘞　細莘　檀香

白芨煨　降眞香　松香　楓香　五靈脂

京墨煆　血竭　角茴　乳香　沒藥各二兩

右末酢煮秫米粉糊爲丸彈子大曬乾以生漆抹手上挪漆爲衣陰乾却以布袋盛挂於風處經久不壞亦不失藥味每服用當歸酒磨下傷筋折骨加自然銅煆酢淬二兩若金刃出臼不可用之

大活血丸

治打撲傷損折骨碎筋瘀血腫痛癱瘓頑痹四肢酸疼一切痛風等證

青桑炭一斤　栗間　骨碎補　南星製　牛膝

白芍藥　川烏炮　黑豆酒煮各一兩六錢

自然銅　木鼈子各八錢　細辛一兩　降眞香

楓香各三錢　乳香　沒藥　血竭各六錢

右末酢煮秫米粉糊集衆手搓爲丸緩則發裂如彈子大候乾用生漆爲衣久則不壞每用一丸用無灰酒磨化服

黃末子

治證同前

川烏炮　草烏酢煮炒　降眞香　楓香　肉桂

松香　薑黃　乳香　沒藥　細辛各五錢
當歸　赤芍藥　羌活　獨活　川芎　蒲黃
白芷　五加皮　桔梗　骨碎補　蒼朮酢煑
何首烏　川牛膝　薑黃各一兩

右末酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨者便可用之

白末子

治證同前

白芷　南星製　白朮　何首烏　桔梗　羌活

獨活　白芍藥　白楊皮　川芎　白蘞　當歸
白茯苓　薏苡仁炒　骨碎補　牛膝　川烏炮
續斷　細辛　肉桂　楓香　乳香　沒藥各一兩

右末酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨者便可用之

紅末子

治證同前

獨活　何首烏　南星製　白芷　羌活　當歸
骨碎補　蘇木　川牛膝　赤芍藥　紅花

川芎各二兩　細辛　桔梗　川烏製　降眞香

楓香　血竭　乳香　沒藥各一兩

右末酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨者便可用之

黑末子

治證同前

雄雞毛燒　桑炭　老松節炒存性　嫩松心

側柏葉酢煑各四兩　當歸　牛膝　何首烏

黑豆製　南星製　骨碎補　熟地黃　羌活

獨活　赤芍藥　川芎　白芷各二兩　細辛

肉桂　川烏炮　草烏製　木鼈子　南木香

五靈脂　降眞香　乳香　沒藥　楓香各一兩

百草霜五錢

右末熱酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨者便可用之

牡丹皮散

治跌撲閃肭傷損滯血疼痛

牡丹皮　當歸　骨碎補　紅花酒浸　續斷

乳香　沒藥　桃仁　川芎　赤芍藥　生地黃

右水酒煎服却用秫米飯熱罨縛冷又蒸熱換縛

橘朮四物湯

治跌撲磕傷滯血體痛飲食少進

當歸　川芎　白芍藥　淮生地　陳皮　白朮

紅花　桃仁

右生地黃煎服骨節疼加羌活獨活痛不止加乳香沒藥

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第三百九十九卷目錄

醫部彙考三百七十九

外科跌打金刃竹木破傷門三

方二（黑神散 當歸補血湯 接骨散 接骨方 定痛接骨紫金丹 麥兜散 接骨仙方 又方 搜損尋痛丸 白藥 理傷膏神效方 封口藥 洗藥 痲藥 本事地黃散 潔古沒藥散 生肌止血立效方 麒麟竭散 如神散 金傷散 定血散 又方 神奇散 軍中一捻金散 龍骨散 金傷散 完肌散 生肌膏 定血散 王不畱行散 定痛乳香散 磁石散 當歸散 內塞散 蒲黃散 神仙止血散 敗弩筋散 生）

乾地黃散　白薇散　虎骨散　踊鐵膏　雄黃散　紅散子　牡丹散　蠐螬丸　出箭頭
方　解骨丸　鼠油膏　綠礬散　又方　鬼代丹　乳香散　五黃散　沒藥散　又方
乳香散　又方　龍腦潤肌散　又方　圍藥　傳藥　生肌桃花散　靈異膏　乳香膏
銀粉膏　又方　牛脂膏　紅膏藥　白膏藥　黑膏藥　祕傳膏藥　萬應膏　鐵布衫丸
破血散　地龍散　定痛乳香神應散　沒藥丸　加味芎藭湯　百合散　應痛丸　乳
香散　羌活防風湯　防風湯　蜈蚣散　羌活湯　地榆防風散　大芎黃湯　白朮防風
湯　白朮湯　謙甫硃砂丸　左龍丸　江鰾丸　養血當歸地黃湯　廣利方　白丸子

藝術典第三百九十九卷

醫部彙考三百七十九

外科跌打金刃竹木破傷門三

方二

黑神散（和劑）

黑豆去皮炒半升　熟乾地黃酒浸　當歸酒製
肉桂去粗皮　乾薑炮　甘草炙　白芍藥
蒲黃各四兩

右爲細末每服二錢酒半盞童子小便半盞不拘

時煎調服

當歸補血湯

治金刃所傷及跌磕打撲皮肉破損亡血過多此宜止痛兼補爲先若皮肉不破損者宜作瘀血停積治之

當歸　川芎　白芍藥　熟地　防風　連翹

羌活　獨活　乳香　沒藥　白芷　續斷　杜仲

右生地黃煎入童便和服不可用酒氣虛加人參白术黃芪

按補血須用參芪爲君此止用四物亦活血之藥非補血也況加以羌獨防芷之耗散乎

接骨散

沒藥　乳香各五錢　自然銅一兩醋淬七次

滑石二兩　麝香少許　龍骨三錢　赤石脂

白石脂各二錢

右爲細末以好醋浸沒煮多爲上候乾就炒燥爲度臨服入麝香少許挑小茶匙在舌上溫酒下病分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而

多服儘好

接骨方

乳香　沒藥　蘇木　降眞節　川烏去皮尖

松節　自然銅酢淬各一兩　地龍去土麻油炒

龍骨生用　水蛭油炒各半兩　血竭三錢

土狗十箇油浸炒

右爲細末每服五錢酒調下在上食後在下食前

定痛接骨紫金丹

麝香　沒藥　紅娘子各一錢半　烏藥　茴香

地龍去土　陳皮　青皮各二錢半　川烏

草烏炮各一兩　五靈脂去土　木鼈子各半兩

黑牽牛生五分　骨碎補　威靈仙　金毛狗脊

防風　自然銅酢淬七次各五錢　禹餘糧四錢碎

右爲細末酢糊丸如桐子大每服十丸至二十丸

溫酒送下病上食後病下食前服

麥兜散

半兩錢煆酢淬七次　自然銅煅酢淬七次

地鼈蟲焙乾

右三味等分每服酒調一分不可多多則骨高起矣

接骨仙方

人骨煆一兩（小兒者尤佳）　喜紅絹一尺燒存性

乳香二錢

末之每服二錢溫酒下

又方

小兒骨煆一兩　乳香五錢　白麪三錢炒

右爲末無根水調爲丸如梧桐子大每服三十丸熱酒吞下

搜損尋痛丸

能接骨偏身疼痛久損至骨如金刃傷則後用之

乳香　沒藥　茴香炒各二錢　肉桂三錢

軍薑炒　丁皮　獨活炒　草烏炒微黃色

赤芍藥炒　石粘藤炒　白芷各五錢　當歸

川芎　薏苡仁炒各一兩（筋脈絕者多加）　骨碎補炒二兩

右作末蜜爲丸用生薑細嚼溫酒吞下如爲末用薑酒調服亦可浸酒喫亦可如折傷則須用藥徧

身頑痲方可用藥接骨加草烏一匕多熱酒調服量人老弱虛實加減用之如其人痲不解可用大烏豆濃煎汁解之如無豆煎濃豉亦可如吐多加薑汁

白藥

治金瘡

黃蘗　黃芩　當歸　赤芍藥　黃芪　牡丹皮
生地黃　地骨皮　木鼈子去殼　黃連　甘草
桑白皮各一錢半　馬蓼梢葉生者火煅過
白芷各一錢

右用桐油三兩煎黃色濾去滓再煎油稍熱入細白板松香一片慢火煎須頻頻柳枝攪勻却入乳香沒藥黃丹各七錢煎數沸出火頃時以少綿鋪於前濾藥滓布上濾過先用瓦鉢滿盛清水八分却濾藥於鉢水中將去清水中如綳麪狀綳三二百度愈綳愈白故名白藥常以清水浸傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日一換水刀斧一應金傷量傷孔大小取一塊塡於傷孔中以白紙護

之隨手不疼一日一換五日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同煎收瘡口加龍骨半錢碎了煎入藥內打損只敷於油紙上貼之卽愈却不須入接筋龍骨等劑

理傷膏

治打撲傷損折骨出臼刀斧跌磕等傷

密陀僧　黃丹　自然銅　黃蠟　猪油各四兩

乳香　沒藥各一兩　松香　麻油各一斤

右以折傷木皮一兩剉碎入油煎數沸濾去滓入陀僧黃丹慢火熬成膏次入松蠟鎔化再熬滴水中成珠爲度却入乳香沒藥自然銅末和勻攤貼

神效方

治金瘡

五倍子　降眞香

右各炒焦出火毒後研爲末等分乾摻虛者加人參末

封口藥

治刀斧傷割喉斷耳缺脣傷破肚皮跌破陰囊皮

等證大效

豬獮聹葉如無以葛葉毛藤子葉代之亦可

乳香　沒藥　兒茶　當歸　杉木炭各一錢

麝香五釐　片腦一分

右各另研細末秤合和勻入麝研細次入腦研勻磁器收貯如缺脣先以小氣針作三截針之用絹線一條兩頭搓豬毛以唾蘸濕抹封口藥於線上將藥線三截穿定却以麻藥抹缺處以剪刀口抹封口藥薄剪去些皮以線即縫合就以雞子黃油搽患處以金毛狗脊毛薄鋪於上却以封口藥抹掞於上每日用藥水輕洗去搽油換藥每日只換一次待八日剪去線搽藥

洗藥

桑白皮　荊芥　黃連　黃蘗　當歸　白芷

赤芍藥　連翹　生地黃

右煎去滓洗淨

麻藥

川烏　草烏　南星　半夏　川椒

右末唾調搽之

本事地黃散

治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉

地黃苗　地菘　靑蒿　蒼耳苗　生艾汁三合

赤芍各五兩入水煎取汁

右五月五日七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾入黃丹三兩更杵爲細末凡有金瘡傷折出血用藥包封不可動十日瘥不腫不膿

潔古沒藥散

刀箭藥止血住痛

定粉　風化灰各一兩　枯礬三錢　乳香五分

沒藥一字各另研

右件各研爲細末同和勻再研摻之

生肌止血立效方

治金瘡辟一切風冷續筋骨

石灰二升搗生地黃靑蒿汁和作團火煅赤細研

黃丹一兩　狗頭骨灰研　芎藭　艾葉　地菘

密陀僧各半兩　黃丹一兩　麒麟竭三分細研

右爲細末研勻密封之每遇金瘡敷之

麒麟竭散

治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風

麒麟竭　白芨各半兩　黃蘗　密陀僧　白芷

白蘞　當歸炒　炙甘草各一兩

右爲細末每用少許乾摻瘡上立效

如神散

治一切刀斧所傷出血不止并久患惡瘡

虎骨炙研　鉛丹火煆令赤　龍骨研各半兩

乳香如皂子大另研　膩粉研　丹砂研各一錢

麝香少許另研

右研極細勻一切瘡以黃連湯或鹽湯洗拭乾摻藥在瘡上不得衣粘著瘡口

金傷散

治金刃箭鏃所傷出血不止及落馬打傷肉綻血出

白芨　白蘞　乳香各一兩　遠年石灰半斤

龍骨半兩　黃丹少許

右爲細末入黃丹研如淡紅色每用乾摻患處上用軟紙更以絹帛裹護忌風水乾痂爲妙

定血散

治一切刀刃傷血出不止收斂瘡口

南星生　槐花炒　鬱金各四兩　半夏生二兩

乳香研　沒藥另研各二錢半

右爲細末研勻每用乾摻患處忌水洗

又方

治金刃或打傷血出不止

降眞香末　五倍子末　鏡面削下銅各研細等分

右拌勻傅損處昔安豐手擊朱嵩碎首用此而愈

神奇散

治刀斧傷并箭傷血出不能止者

麒麟竭研　沒藥研　自然銅煆　南星炮

乾薑燒灰　鉛丹炒黑　膩粉　瓦蘚各一分

麝香少許

右爲細末和勻先以鹽湯洗瘡却以燒葱搗汁塗然後乾摻瘡上三二次

軍中一捻金散

金櫻葉　嫩苧葉各二兩　桑葉一兩

右搗爛傅若欲致遠陰乾作末用帛縛上血止口合名草蝎經進方以五月五日或閉日收藥良

龍骨散

治金刃箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡斂口

龍骨　滑石　枯礬　寒水石　乳香　沒藥

黃丹炒各半分　輕粉少許

右爲細末每用乾摻外用膏藥貼之效

金傷散

治刀斧傷辟風生肌止痛

白芨　黃丹　陳石灰風化　桑白皮各二兩

龍骨　南星　白附子各一兩

右爲細末每用乾摻之

完肌散

治金瘡

陳石灰二兩　黃丹半兩　龍骨　密陀僧

桑白皮各四兩　麝香一錢另研

右爲細末乾摻患處

生肌膏

治金瘡及一切打損瘡

胡粉　白芍藥　薰陸香　乾薑炮各一兩

油四兩　黃蠟二兩

右爲細末以油蠟相和煎如膏用貼瘡上日二換之

定血散

治刀斧傷止血定痛生肌

密陀僧半斤　鰞鰂魚骨　龍骨　枯礬各二兩

桑白皮一斤　黃丹一兩

右爲細末每用乾摻患處定血如神

王不留行散（仲景）

治金瘡

王不留行八月八日採　蒴藋細葉七月七日採

東行桑根白皮三月三日採　甘草各十分

黃芩　乾薑　芍藥　厚朴各二分　川椒三分去目及閉口者出汗

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵篩合治爲散服方寸匕小瘡卽粉之大瘡但服之產後亦可服

定痛乳香散

治金傷并折骨打撲傷損

乳香　沒藥各二錢　敗龜板一兩　當歸鬚　骨碎補　虎骨酥炙各半兩　紫金皮二兩　半兩錢五箇如無以自然銅火煅酢淬代之　穿山甲火炮少許

右爲細末每服一錢如病沉服二錢以好酒調服損上者食後服損下者食前服

磁石散

治金瘡腸出宜用之

磁石煅研　滑石研　鐵精各三兩

右爲細末研勻每服一錢匕溫酒調下空心日午晚間各一服仍以針砂塗腸上其腸自收入一方用白米飲調服一方無鐵精

當歸散

一名內補散一名蓯蓉散治金瘡去血多虛竭此藥內補

當歸微炒　川芎　乾薑炮　川椒去目閉口炒出汗　桂心　黃芩　桑白皮　吳茱萸湯浸焙乾　白芍藥　炙甘草各半兩　肉蓯蓉四兩酒浸一宿去皮炒乾　人參　黃芪　厚朴去粗皮薑汁炙令香熟各一兩

右爲細末每服二錢食前溫酒調下日三四服一方有白芨無黃芩桑白皮

內塞散

治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱內補

黃芪　當歸　白芷　芎藭　乾薑　黃芩　芍藥　續斷各二兩　附子半兩　細莘一兩　鹿茸酥炙三兩

右爲細末每服五分匕食前酒調下日三服稍增至方寸匕一方無芍藥

蒲黃散

治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃　生地黃各一兩半　黃芪　當歸　芎藭

白芷　續斷各一兩　炙甘草三分

右爲細末每服三錢匕空心酒調下日三四服血化爲水而下若口噤斡開口與之仍加大黃一兩半

神仙止血散

龍骨五色緊者　訶子去核各一兩　白石脂

苧麻葉五月五日午時採陰乾各半兩

右爲細末每服一錢半食遠水調服之如修合時忌婦人鷄犬見

敗弩筋散

治金刃弓弩所中筋急不得伸屈

敗弩筋燒灰　秦艽　杜仲炙　熟地焙各半兩

附子炮去皮臍　當歸切焙各一兩　大棗三枚取肉焙

右爲細末每服二錢匕溫酒調下空心日午夜臥各一服一方有續斷無大棗

生乾地黃散

治金瘡煩悶

生乾地黃　當歸炒　桃仁去皮尖雙仁麩炒

白芷　續斷　黃芩　赤芍藥　羚羊角屑

炙甘草各一兩　芎藭　桂心各三分

右爲細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

白薇散

治金瘡煩悶不得眠臥疼痛

白薇　枳實麩炒　辛荑仁　苦蔞根　赤芍藥

炙甘草各一兩　酸棗仁二兩微炒

右爲細末每服二錢食前溫酒調下日三四服

虎骨散

治金瘡中風發痓肢節筋脈拘急

虎脛骨　敗龜板各酥炙　當歸　乾蠍各微炒

桃仁去皮尖雙仁麩炒　芎藭各一兩　桂三分

黑豆五合　松脂二兩

右先將松脂並黑豆炒令熟後和諸藥搗爲末每服二錢不拘時溫酒調下

踴鐵膏（寶鑑）

取一切針刺入肉箭頭入肉

鼷鼠頭一箇或用入油汁內熬　螻蛄四十九枚
土消蟲十箇　芫青　巴豆　馬肉蛆焙乾
醬蛆焙乾　信　夏枯草　硇砂　磁石　黃丹
地骨皮　蘇木　蜣蜋各一兩　石腦油三兩
蒿柴灰汁三升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭自踴出

雄黃散

治藥毒箭頭在身未出

雄黃一分　粉霜半兩各細研　蜣蜋四枚研生
巴豆三粒去皮殼別研如泥生

右用研勻以銅筯頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之七日瘡熟箭頭自出

紅散子

摩金瘡上

草烏尖　麒麟竭　茄子花　蓖麻子去殼細研

蔓陀羅子各半兩

右爲細末好酒調如膏瘡口上塗摩之箭頭自出

牡丹散

治金瘡箭頭在骨遠年不出

牡丹皮去心　白蘞各一兩　桑白皮二兩

藿香葉　丁香　麝香研各一分

右爲細末每服二錢匕溫酒調下日三服淺者十日深者二十日箭頭自出

蠐螬丸

治金瘡箭鏃在骨中遠年不出者

蠐螬五枚乾者　螻蛄三枚乾者　赤小豆一分

赤鯉魚鮓一兩　硇砂一錢　紅花末三錢

右研細以鮓研和丸如菉豆大如有瘡口只於瘡口內紝一丸如無瘡口以針撥破內藥不過三九至五丸箭頭自動輕搖即出

出箭頭方

蜣蜋自死者十箇　土狗子三箇　婦人髮灰少許

右將蜣蜋去殼取白肉與二味同研如泥用生塗

中箭處如膏塗後內微痒即以兩手蹙之其箭頭自出

解骨丸

治箭鏃不出

雄黃研　蜣蜋研　象牙末各等分

右爲細末煉蜜和丸如黍米大內瘡口內後細嚼羊腎脂摩貼之覺痒箭頭自出

鼠油膏

出箭頭

鼠一枚熬取油　蜣蜋　皂角燒灰　定粉

龍骨各一錢　乳香少許另研

右爲細末以鼠油和成膏點藥在瘡口內其上更用磁石末蓋之箭頭自出

綠礬散

治竹草刺瘡發腫作疼傷時不曾出血盡被惡毒氣注痛不止夜臥不安初破時其瘡紫赤黑色時起三五重皮是也

綠礬半兩小便燒熱放礬於內候冷取出日乾

丹參二錢半　麝香一字　馬兜鈴根一錢半

右爲細末漿水洗淨瘡口上敷貼立效

又方

治被刺入肉或鍼棘竹木等冬日不出疼痛

龍葵根皮一把洗淨　人參　臘月猪脂各一兩

酢少許

右前二味爲末和搗令勻每用少許敷瘡上其刺自出

鬼代丹

主打著不痛

無名異　沒藥　乳香各研　地龍取去土

自然銅酢焠研　木鼈子去殼等分

右爲末煉蜜丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

乳香散

治杖瘡神效

自然銅半兩酢焠七次　乳香　沒藥各三錢

茴香四錢　當歸半兩

右爲細末每服五錢溫酒調下

五黃散

治杖瘡定痛

黃丹　黃連　黃芩　黃蘗　大黃　乳香各等分

右爲細末新水調成膏用緋絹上攤貼

沒藥散（澴古）

治杖瘡止痛令瘡不移

蜜陀僧　沒藥　乳香各一兩　乾胭脂一兩半

膩粉半兩

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用同研如泥攤在緋帛上貼之

又方

治杖瘡

片腦　麝香各五分　龍骨　蜜陀僧　胭脂

輕粉　乳香　沒藥　寒水石煅各一錢

右爲細末乾摻瘡上四邊以生麪糊圍定次用緋紅絹帛貼之

乳香散

治杖瘡腫痛

大黃　黃連　黃蘗　黃芩各三錢　乳香

沒藥各另研一錢　片腦少許

右爲細末研勻冷水調攤緋絹上貼之

又方

治杖瘡

麒麟竭　輕粉　乾胭脂　密陀僧　乳香

沒藥各等分

右研細末先以冷水洗淨拭乾以猪脂調搽紅紙貼之愈

龍腦潤肌散

治杖瘡熱毒疼痛

龍腦一字　掃盆輕粉一錢半　麝香半錢

密陀僧二錢　黃丹一兩

右爲細末每用乾摻上用靑布貼之內留一孔

又方

治前證

金屯葉　寶塔草　山薄荷　豬㹚聹　芙蓉葉

地薄荷　桑葉尾　澤蘭葉

右搗爛取汁泡酒服以滓和大黃末傅貼

圍藥

治腫未破用此消腫定痛

無名異　木耳去土　大黃各炒各等分

右爲極細末用蜜水調圍四邊腫處

傅藥

治棒杖打腫痛者

豬獼矃　地園荽　田茶菊　地薄荷　血見愁

山薄荷　澤蘭葉　生地黃

右搗爛取汁泡酒服以滓傅貼

生肌桃花散

治前證止痛生肌

輕粉　血竭　密陀僧　乾胭脂各一錢

右研細每用乾摻仍以膏藥貼之

靈異膏

治杖瘡金瘡顛撲皮破湯火傷久年惡瘡

川鬱金三兩　生地黃二兩　臘猪板脂一斤

粉草一兩

右剉細入脂內煎焦黑色濾去滓入明淨黃蠟四兩熬化攪勻以磁器貯之水浸久去水收用時先以冷水洗瘡拭乾却敷藥在瘡上外以白紙貼之止血定痛且無瘢痕湯燙火燒不須水洗治凍瘡尤妙

乳香膏

治金瘡杖瘡神效

乳香　沒藥　川芎　自然銅各七錢　當歸
羌活　獨活　川牛膝　石膏　劉寄奴　黃丹
黑牽牛　黃蘗皮　破故紙　白膠香　生地黃
熟地黃　赤芍　白芍　紫金皮　白芷各五錢
黃蠟一兩　清油四兩

右除膠香丹蠟外餘藥爲末入油內煎以柳枝不住手攪試將成膏却入三味更試成膏以生布濾淨以瓦器盛水傾在水中用篦攤開貼瘡孔深者撚成膏條穿入孔中不問淺深放瘡上如作熱加輕粉片腦朴硝入膏內貼之

銀粉膏

治杖瘡

滴乳香　明沒藥　赤石脂　樟腦各一錢

水銀二錢半　光粉一兩

右末用猪脂二兩黃蠟五錢鎔化調末成膏油紙攤貼

又方

治前證

水銀　樟腦各二錢　片腦一分　乳香　沒藥

血竭各一錢　黃蠟　水牛油　猪脂各一兩

右末先將油蠟鎔化候冷和末攪勻油紙攤貼

牛脂膏

治杖瘡神效

乳香　沒藥　樟腦各五錢　水牛油一斤

黃蠟四兩

右末先鎔蠟次入油和勻調末攪勻油紙攤貼或以天芋葉攤貼極妙

紅膏藥

治杖瘡及臁瘡

黃丹飛炒二兩　乳香　沒藥　兒茶　血竭

硃砂　樟腦　水銀各一錢　黃蠟　水牛油

豬油各一兩　麝香　片腦各一分

右末先以蠟鎔化次入油和勻候冷入末攪勻油紙攤貼臁瘡作隔紙膏貼之

白膏藥

治杖瘡及臁瘡

甘石煅水淬飛過　白石脂煅　龍骨　乳香

沒藥　楓香　樟腦　水銀各一錢　光粉二兩

麝香　片腦各一分　黃蠟半兩　柏蠟一兩

豬油一兩半

右末先鎔蠟次入油和勻候冷調末攪勻油紙攤貼臁瘡作隔紙膏貼之

黑膏藥

治杖瘡及諸瘡神效

地園荽　黃花苑　側柏葉　地薄荷　豬獮聹各二兩　木鼈　白芷　杏仁　桃仁　生地黃各五錢　防風　荆芥　連翹　大黃　黃連　黃芩

黃蘗　當歸　赤芍藥　元參　紫金皮　乳香
沒藥　兒茶　大黃　當歸各一兩　杉炭皮
楓香　龍骨煅　石脂煅　血竭　樟腦各五錢
孩兒骨煅　硃砂　水銀各二錢半　麝香五分

右將後十五味爲末將前二十一味銼碎以水煎熬濃汁濾去滓再煎令汁如餳樣入豬油二斤慢火熬令汁乾入光粉一斤旋入攪至黑色成膏滴水中成珠可丸不粘手爲度次入黃蠟二兩鎔化出火毒數日再微熬鎔入乳香後十五味末攪勻油紙攤貼

祕傳膏藥

專治打傷又治金瘡及無名腫毒臁瘡若跌傷及別樣瘡忌貼

眞香油四兩將穿山甲柏枝先入油中煎數沸去二件查乘熱將薄綿濾淨油復入鍋中煎沸以次下藥

冬月用油五兩　穿山甲一片　柏枝一根已上二件止取油煎汁不用查取法見前　槐枝一莖須另發開小條不用大樹上者入藥油用此頻攪

飛丹淨水飛去標脚取細末一兩作二次入油
水花硃淨水飛去標脚曬乾取細末二錢　血竭
沒藥　乳香　孩兒茶已上四件各三錢搥碎和勻
共入銅鍋炭火上炒沸過爲細末　新珍珠
新紅象牙各麪包燒存性取細末舊者不用
面粉炭火上燒黃色各一錢　人指甲炒黃
三七曬乾取細末　石乳銅鍋內炒過取細末
黃連細末　黃芩細末各三分　海螵蛸五分
半夏大者十枚爲細末已上十六件俱用極細篩篩
過和勻分作五分留起一分看膏藥老嫩加減止用
四分作四次下下法如左　樟木細末四錢
黃蠟二錢　冰片一分　麝香三分　阿魏成塊者
五分已上四件待諸藥俱下盡臨起鍋時方下攪極
勻取出阿魏查

右藥先將細末藥分五分其四分以次下鍋如左其一分留看藥厚薄以爲增減如四分已下盡藥尚薄亦將此分漸下如正好留此一分待貼膏藥時摻在患處尤妙

煎法用上好香油四兩入銅鍋內炭火煎沸沸時入柏枝一莖穿山甲一片在內煎數沸去二藥查將薄綿紙乘熱濾淨油揩淨鍋復入油於鍋中煎沸下飛丹五錢用槐條急攪不住手至成膏方止候六七煎後用清水漱淨口噴清水少許於鍋中即取起鍋

一起鍋時於前四分中細末藥將一分漸漸逐一挑下急攪如前此分藥盡約均和了將槐條蘸藥滴水且未要成珠復置鍋火上急攪候沸起鍋

二起鍋復將末藥一分漸入鍋中急攪如前約均和滴水要成珠復置鍋炭火上急攪候沸起鍋

三起鍋漸下藥攪如前約均和將藥滴水雖成珠尚要粘手復置鍋火上如前

四起鍋漸下藥如前急攪約均和將藥滴水成珠珠要將至不粘手了復置鍋炭火上候沸起鍋

五起鍋即下黃蠟二錢飛丹五錢急攪如前將藥滴水成珠要須不粘手又不可太老了如尚粘手將前留下一分末藥漸下以不粘手爲度如不粘

手了即下水花硃三錢次下樟冰末四錢急攪方下麝三分阿魏五分冰片一分急攪不住手量藥已均和了撈阿魏查去之以藥入磁器內浸冷水中片時候凝將藥尋露天天陽淨地掘坎將磁器倒覆於坎中仍以土覆好候七日後方起

一藏法用油紙及箬包好瓶口以防洩氣

一攤膏藥時用湯中煎過淨油單紙攤上藥不用火烘止用熱湯入器中將油紙放器上以藥放上攤開又不用太厚須於紙上照得見爲妙如以絹攤用湯頓烊藥攤上

一貼時先將萊菔汁桑葉煎湯露中露過一宿用以洗患處方用貼之

一既貼後每日洗一遍不要換膏藥至二三日後血散風去方換收口黑膏藥即萬應膏也

萬應膏

專主杖瘡收口神效

眞香油二斤濾淨　黃連　黃蘗　黃芩各五兩

柏枝　槐枝各一束已上俱㕮咀去碎屑　府丹一

斤水飛去標脚曬乾　乳香　沒藥　血竭
孩兒茶各三錢已上四件用槌打碎和勻入鍋中炭
火炒沸　象皮灰用砂炒去砂　海螵蛸各五分
半夏一錢　龍骨五分已上八味爲極細末用極細
篩篩過和勻漸入後藥　阿魏五分

右將眞香油二斤濾淨入銅鍋中煎沸入黃連黃蘗黃芩槐條煎三四沸將細夏布及薄絹紙濾去查指淨銅鍋仍入油於鍋中煎沸加入前府丹用槐條急攪煎至滴水成珠乘熱入磁器中即將前細末藥八味及阿魏漸入藥中急攪不停候和勻去阿魏查藥冷爲度七日後可用藏攤洗法並如前

鐵布衫丸（正宗）

此藥預服受刑不痛亦且保命

自然銅煅紅醋淬七次　當歸酒洗搗膏　乳香
無名異洗去浮土　木鼈子香油搽殼灰焙用肉
沒藥　地龍去土曬乾　蘇木

右八味等分爲細末蜜丸雞頭實大每服三丸預

用白湯送下縱非刑辱拷可保無虞

破血散

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脅下其疼苦楚不可轉側

羌活　防風　肉桂各一錢　水蛭炒煙盡另研半錢　歸梢　柴胡　連翹各二錢　麝香另研少許

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾去滓入水蛭麝香末調勻不拘時溫熱服

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下留在太陽經中令人腰脊或脛腨臂腰中痛不可忍

地龍　官桂　蘇木各九分　麻黃七分　黃蘗　當歸梢　甘草各一錢半　桃仁九箇

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

定痛乳香神應散（東垣）

治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香　沒藥　雄黑豆　桑白皮　獨科栗子　當歸各一兩　破故紙炒二兩　水蛭半兩

右爲末每服五錢酢一盞砂石器內煎至六分入麝香少許溫服

沒藥丸

治打撲內損筋骨疼痛

沒藥　乳香　川芎　川椒（去目及合口者）

芍藥　當歸（各半兩）　自然銅（二錢半酢淬七次）

右爲細末用黃蠟二兩鎔開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨痛處臥連服二三丸立效

加味芎藭湯

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血如豆汁

川芎藭　當歸　白芍藥　百合（水浸一日）

荆芥（各二錢）

右作一服水一鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

百合散

治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血汁者

川芎　赤芍藥　當歸　百合　生地黃　荆芥

側柏葉　犀角　黃芩　黃連　牡丹皮　梔子

欝金　大黃

右水煎加童便和服大便利者去大黃

應痛丸

治折傷後爲四氣所侵手足疼者

破故紙　骨碎補去毛　蒼朮生　草烏各半斤

穿山甲去膜桑柴灰炒泡起爲度柴灰亦可

舶上茴香炒各六兩

右除草烏半斤用生薑一斤擂爛同草烏一處淹兩宿焙乾爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服

五十丸用酒或米湯送下忌熱物片時

乳香散

治打傷損手足疼痛不可忍者

乳香　沒藥各另研三錢　白芷二錢　肉桂

白朮炒　當歸炒　粉草各五錢

右爲細末研勻每服二錢不拘時酒調下

羌活防風湯

治破傷風邪初在表者急服此藥以解之稍遲則邪入於裏與藥不相合矣

羌活　防風　甘草　川芎　藁本　當歸

芍藥各四兩　地榆　細辛各二兩

右每服五錢水煎

防風湯

治破傷風表證未傳入裏急宐服之

防風　羌活　獨活　川芎各等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服大效

蜈蚣散

蜈蚣一對　魚鰾三錢

右爲細末用防風湯下

羌活湯

治破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪入於裏不宜用

羌活　菊花　麻黃　川芎　石膏　防風

前胡　黃芩　細辛　甘草　枳殼　白茯苓

蔓荊子各一兩　薄荷　白芷各五錢

右每服五錢水煎

地榆防風散

治風在半表裏頭微汗身無汗不可發汗兼治表裏

地榆　防風　地丁草　馬齒莧各等分

右爲細末每服三錢米湯調服

大芎黃湯

治風在裏宜疎導急服此湯

川芎　羌活　黃芩　大黃各一兩

右五七錢水煎溫服臟腑通和爲度

白朮防風湯

治服表藥過多自汗者

白朮　黃芪各一兩　防風二兩

右每服五七錢水煎服臟腑和而自汗者可服若臟腑祕小便赤者宜用大芎黃湯下之

白朮湯

治破傷風汗不止筋攣搐搦

白朮　葛根　升麻　黃芩　芍藥各二兩

甘草二錢五分

右每服五錢水煎無時服

謙甫硃砂丸

治破傷風目瞪口噤不語手足搐搦項筋强直不能轉側目不識人

硃砂研　半夏洗　川烏各一兩　雄黃五錢

鳳凰臺二錢　麝香一字

右爲末棗肉丸桐子大每服一丸或二丸冷水下以吐爲度如不吐加一丸或吐不住煎葱白湯止之汗出爲效

左龍丸

治直視在裏者

左盤龍（卽野鴿糞也）　白殭蠶　魚鰾炒各五錢

雄黃一錢

右爲末燒飯丸桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當用前藥末一半加巴豆霜半錢燒飯丸梧子大每服加入一丸如此漸加以利爲度利後服和解藥

江鰾丸

治破傷風傳入裏證驚而發搐臟腑祕澀

江鰾剉碎炒　野鴿糞炒　白殭蠶各半兩

雄黃一錢　蜈蚣一對　天麻一兩

右爲末作三分二分燒飯丸桐子大硃砂爲衣一分入巴豆霜一錢亦用燒飯丸每服硃砂者二十丸入巴豆者一丸漸加至利爲度後止服前丸

養血當歸地黃湯

當歸　地黃　芍藥　川芎　藁本　防風

白芷各一兩　細莘五錢

右依前煎服

廣利方

治破傷風發熱

苦蔞子九錢　滑石三錢半　南星　赤芍藥

蒼朮　陳皮　黃蘗炒　黃連　黃芩　白芷

甘草各五分

右薑水煎服

按右二方用竹瀝苦蔞實輩治破傷風熱痰脈洪者前方用南星半夏草烏川烏輩則治破傷風寒痰脈無力者

白丸子

治一切風痰壅盛手足頑麻或牙關緊急口眼歪斜半身不遂等證

半夏七兩生用　南星二兩生用　川烏去皮臍生用五錢

右爲末用生薑汁調糊丸桐子大每服一二十丸薑湯下

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百卷目錄

醫部彙考三百八十

外科跌打金刃竹木破傷門四

單方

鍼灸

醫案

外科蟲獸傷門

孫思邈千金方總論　狂犬　蠼螋　射工

戴思恭證治要訣（惡蟲蛇傷）

薛己醫按（誤吞水蛭　蛇入七竅）

王肯堂證治準繩（毛蟲證治）

陳士鐸石室祕錄（蟲獸治法）

方（雄黃消毒膏　一上散　聖惠方　又方　又方　蟬花散　定風散　扶危散　扶危散　五神散　又方　又方　五香散　野葛膏　又方　又方　又方）

單方

鍼灸

醫案

藝術典第四百卷

醫部彙考三百八十

外科跌打金刃竹木破傷門四

單方

跌撲金刃傷損以香爐灰罨之止血生肌

金瘡血出不止冷水浸之即止

金瘡困頓用蚯蚓屎末水服方寸匕日三服（千金下同）

瘢痕凸起用熱瓦頻熨之

金瘡出血不可以藥早合恐內潰傷肉只以黃丹滑

石等分爲末傅之

又方雲母粉傅之絕妙（事林廣記）

又方白薇爲末點之（子和）

又方用門臼塵切蒜蘸擦或不用蒜

又方嫩紫蘇桑葉同搗貼之（本類方）

金瘡內漏雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血皆化爲水（肘後方）

又方牡丹皮爲末水服三指撮立尿出血也（千金下同）

又方取瘡中所出血以水和服之

金瘡出血不止寒水石瀝青等分爲末乾摻勿見水（積德堂方）

又方五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末二錢入龍骨末少許湯服立效（談埜翁方）

金瘡血出取老杉樹皮燒存性研傅之或入雞子清調傅一二日愈

又方刮白檀末傅之且能止痛

又方降眞香五倍子銅花等分爲末傅之或降香用瓷瓦刮下研末亦可

金瘡出血榴花半斤石灰一升擣和陰乾每用少許傅之立止（崔元亮）

金瘡出血瀝靑末少加生銅屑末摻之立愈（經驗方）

金瘡出血不止悶絕蒲黃半兩熱酒灌下（得效方下同）

又方血見愁草研爛塗之

金瘡血出不止生麪乾傅五七日卽愈（經驗方）

又方韭汁和風化石灰日乾每用爲末傅之效（集簡方）

又方稗苗根搗傅或研末摻之卽止甚驗

又方以葱炙熟挼汁塗之卽止（梅師方）

又方慈石末傅之止痛斷血（千金下同）

又方車前葉搗傅之

又方白芍藥一兩熬黃爲末或酒或米飲服二錢漸加之仍以末傅之良（廣利方）

又方蛇含草搗傅之（肘後方）

金瘡血出過多若血冷則殺人宜炒鹽一撮酒調服之（梅師方）

藥箭毒氣鹽貼瘡上灸三十壯良（集驗方）

又方雄黃末傅之沸汁出愈（外臺）

刀斧金瘡白礬黃丹等分爲末傅之最妙（救急方）

又方白芨石膏煅等分爲末摻之亦可收口（濟急方）

又方小薊苗搗爛塗之（食療）

又方刀箭傷瘡香白芷嚼爛塗之（集簡方）

金瘡撲損用青蒿擣封之血止則愈（肘後方）

又方用青蒿麻葉石灰等分五月五日擣和曬乾臨時爲末搽之

又方夏枯草口嚼罯上即愈（易簡方）

毒箭入肉煎生地黃汁作丸服至百日箭出（千金下同）

竹木入肉生地黃嚼爛罨之

金瘡作痛生牛膝搗敷立止（梅師方）

刀斧金瘡生薑嚼傅勿動次日即生肉甚妙（扶壽方）

金刃斧傷用獨殼大栗研傅或倉卒嚼傅亦可（集簡方）

箭刀竹木在肉及咽喉胷膈諸隱處不出酒調瞿麥末方寸匕日二服（千金）

又方王不留行末熟水服方寸匕兼以根傅即出（梅師）

卒被毒箭麻仁數升杵汁飲（肘後方下同）

毒箭傷人藍青搗飲并傅之如無藍以青布漬汁效

金瘡煩痛大便不利大黃黃芩等分爲末蜜丸先食水下十九日二服（肘後方下同）

箭頭不出萬堅神應丹端午前一日不語尋見莨菪科根本枝葉花實令好者道云先生你却在這里道罷用柴灰自東南起圍了以木椑子掘取根下周廻土次日日未出時依前不語用钁頭取出洗淨勿令鷄犬婦人見於淨室中以石臼擣如泥丸彈子大黃丹爲衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中綿兜肚繫當便出也

金刃不出入骨脉中者半夏白蘞等分爲末酒服方寸匕日三服至二十日自出（太白經）

被斫斷筋蒿蒲根擣汁瀝瘡中仍以查傅之日三易半月即斷筋更續此方有效（外臺）

（抱朴子）

金瘡瘀痛薔薇根燒灰每白湯服方寸匕一日三服

箭刺入肉膿裹不出以薔薇根末摻之服鼠璞十日即穿皮出也（外臺下同）

又方苦蔞根搗傅三易自出鍼刺入肉同方

傷筋出血葛根搗汁飲乾者煎服仍熬屑敷之

金瘡瘻孔通草煑汁釀酒日飲鼠瘻不消方同

金瘡傷損生肌破血用紫葛二兩順流水三琖煎一琖半三服酒煎亦妙（經效方）

金瘡腸出用小麥五升水九升煑取四升綿濾取汁待極冷令病人臥席上含汁噀之腸漸入噀其背並勿令病人知及多見人旁人語卽腸不入也乃擡席四角輕搖使腸自入十日中但略食炙物愼勿驚動卽殺人

又方大麥粥汁洗腸推入飲米糜百日乃可（千金下同）

箭鏑在咽或刀刃在咽膈諸隱處杵杏仁傅之

金瘡斷筋楓香末傅之（得效方）

金刃所傷未透膜者乳香沒藥各一錢以童子小便半琖酒半琖溫化服之爲末亦可（良方）

金瘡出血血竭末傅之立止（廣利方）

又方柳絮封之卽止（外臺）

金瘡苦痛楊木白皮熬燥碾末水服方寸匕仍傅之

日三次（千金）

金瘡接指凡指斷及刀斧傷用眞蘇木末敷之外以蠶繭包縛完固數日如故（攝生方）

箭鏃入肉不可拔出者用新巴豆仁略熬與蜣蜋同研塗之斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍使撼拔動之取出速以生肌膏傅之

金刃傷瘡新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之亦可煑汁服之

刀瘡傷濕潰爛不生肌者寒水石煆一兩黃丹二錢爲末洗敷甚者加龍骨一錢孩兒茶一錢

瘡腫作痛生椒末釜下土蕎麥粉等分研酢和傅之（外臺）

破傷風水毒腫痛不可忍麝香末一字納瘡中出盡膿水便效（普濟）

打傷顛撲及牛馬觸動腹破血流四肢摧折以烏鷄一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搨病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一鷄少頃再作以愈爲度（肘後）

破傷風臘月收取狐目陰乾臨時用二目一副炭火微燒存性研末無灰酒服方寸匕神效無比（保壽堂方）

從高墜下瘀血搶心面青氣短取烏鴉右翅七枚燒研酒服當吐血便愈（肘後方）

傷損接骨鷹骨燒灰每服二錢酒服隨病上下食前食後

又方鶻骨燒灰每服二錢酒下在上食後在下食前骨即接如初（接骨方）

又方用下窟烏即鶡也取骨燒存性以古銅錢煅紅酢淬七次爲末等分酒服一錢不可過多病在下空心在上食後服極有效驗須先夾縛定乃服此

打傷青腫炙猪肉搨之（千金）

杖瘡血出猪血一升石灰七升和劑燒灰再以水和丸又燒凡三次爲末傅之效（外臺）

蹉跌損傷血瘀骨痛鹿角末酒服方寸匕日三（千金下同）

竹木入肉不出者鹿角燒末水和塗上立出久者不過一夕

折傷接骨用土鼈焙存性爲末每服二三錢接骨神

效或取生者搗汁酒服（摘要方）

又方用蚵蚾即土鼈六錢隔紙炒鍋內焙乾自然銅二兩用火煅酢淬七次爲末每服二錢溫酒調下病在上食後病在下食前神效（袖珍方）

又方用土鼈陰乾一箇臨時旋研入乳香沒藥龍骨自然銅火煅酢淬各等分麝香少許爲末每服三分入土鼈末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接錯也此乃家傳祕方愼之又可代杖（集驗方）

撲墜瘀血蝱蟲二十枚牡丹皮一兩爲末酒服方寸匕血化爲水也若久宿血在骨節中者二味等分（備急方）

又方刮琥珀屑酒服方寸匕或入蒲黃二三匕日服四五次（外臺）

顚撲傷損松節煎酒服（談野翁方）

折傷瘀血傷損筋骨疼痛鼠屎燒末猪脂和傅急裹不過半日痛止（梅師方）

杖瘡已破鷄子黃熬油搽之甚效（經驗方）

跌破出血鰞鰂魚骨末傅之（直指方）

杖瘡潰爛乳香煎油搽瘡口（永類鈐方）

筋骨損傷米粉四兩炒黃入沒藥乳香末各半兩酒調成膏攤貼之（御藥院方）

杖瘡跌撲童便入少酒飲之推陳致新其功甚大

骨折腫痛五靈脂白芨各一兩乳香沒藥各三錢爲末熟水同香油調塗患處（乾坤秘韞）

損傷接骨五靈脂一兩茴香一錢爲末先以乳香末於極痛處傅上以小黃米粥塗之乃摻二末於粥上帛裹木牌子夾定三五日效（子和）

損傷瘀血在腹用白馬蹄燒煙盡研末酒服方寸匕日三服夜一服血化爲水也（鬼遺方）

筋骨傷破以熱白馬屎傅之無瘢（千金）

跌撲傷損用眞牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒存性研作細末每服五錢以熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾煖取微汗痛止一宿接元如故（經驗方）

跌撲損傷瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死用紅蛭石灰炒黃半兩大黃牽牛頭末各二兩爲末每服二錢熱酒調下當下惡血以盡爲度名奪命散（濟生）

方

墜跌打擊內傷神效方水蛭麝香各一兩剉碎燒令烟出爲末酒服一錢當下畜血未止再服其效如神

一方無麝香（錄驗）

一切金瘡及刀斧傷白殭蠶炒黃研末傅之立愈（斗門方）

刀斧金瘡端午午時取晩蠶蛾石灰茅花搗成團草葢令發熱過收貯每用刮下末摻之

箭鏃入肉以螻蛄杵汁滴上三五度自出（千金）

諸瘡中風生川椒一升以少麪和搜裹椒勿令漏氣分作兩裹於煻灰火中燒熟刺頭作孔當瘡上罨之使椒氣射入瘡中冷卽易之須臾瘡中出水及遍體出冷汗卽瘥也（獨行方）

骨在肉中不出者咀茱萸封之骨當腐出（食療）

破傷中風欲死用蜈蚣研末擦牙追去涎沫立瘥

又方蟾酥二錢湯化爲糊乾蠍酒炒天麻各半兩爲末合搗丸如菉豆大每服一丸至二丸豆淋酒下（聖惠下同）

又方用蜈蚣頭烏頭附子底蠍梢等分爲末每用一字或半字熱酒灌之仍貼瘡上取汗愈（子和）

折傷水獺一箇支解入罐內固濟待乾煆存性爲末以黃米煑粥置患處摻獺末於粥上布裹之立止疼（經驗方）

金瘡脅破腸出以乾人屎末抹入桑皮線縫合熱雞血塗之（生生編）

又方以香油摸手送入煎人參枸杞子汁溫淋之喫羊腎粥十日卽愈（得效方）

又方將腸納入以慈石滑石各三兩爲末米飲服方寸匕日再服

刺在肉中嚼豉塗之

刺瘡金瘡百治百效葱煎濃汁漬之甚良

刺傷中水服烏牛尿二升三服止（梅師方）

又方煑韭熟搨之

金瘡出血不止成內漏用蝙蝠二枚燒末水服方寸匕當下水而血消也（鬼遺方）

箭鏃入內不可拔者用螳螂一个巴豆半个同研傳

傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭石灰傅之

又方用天水牛取一角者小瓶盛之入硇砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處即出也

抓瘡傷水腫痛難忍耳垢傅之一夕水盡出而愈

破傷風手足顫掉搐搦不已用人手足指甲燒存性六錢薑製南星獨活丹砂各二錢爲末分作二服酒下立效（普濟方）

破傷風作白痂無血者殺人最急以黃雀屎直者研

末熱酒服半錢（普濟方）

破傷風搐口噤强直者香膠散用香膠燒存性一兩麝香少許爲末每服二錢蘇木煎酒調下仍煮一錢封瘡口（得效方）

破傷風有表証未解者用江鰾半兩炒焦蜈蚣一對炙研爲末以防風羌活獨活川芎等分煎湯調服一錢（河間）

瘡傷風水痛劇欲死者牛屎燒煙熏令汗出即愈（外臺）

狐尿刺瘡痛甚者熱白馬尿漬之（千金）

又方乾蠍麝香各一分爲末敷患處風去速愈（普濟方）

接骨狗頭一箇燒存性爲末熱酢調塗暖臥（易簡方）

筋骨折傷急取雄鷄一隻刺血量患人酒量或一碗或半碗和飲痛立止神驗（青囊方）

損傷青腫用新羊肉貼之（千金）

墜損嘔血墜跌積血心胃嘔血不止用乾荷花爲末每酒服方寸匕其效如神（摘要）

杖瘡腫痛末生毛鼠同桑葚子入麻油中浸釀臨時取塗甚效（西湖志）

杖瘡腫痛五倍子去穰米酢浸一日慢火炒黃研末乾摻之不破者酢調塗之（易簡方）

一黃散治打撲傷痕紫黑有瘀血流注有熱者大黃爲末薑汁調溫傅

一白散治打撲傷痕紫黑有瘀血流注無熱者半夏爲末薑汁調傅

又方羊毛餅法鷄子清桐油各半打勻以羊毛薄撚作餅如紙樣貼在患處上以散血膏或補肉膏敷貼

顚撲筋斷骨折用粟米半升木鼈肉二十箇半夏半

兩婦人髮一團葱白鬚一小束同炒烟盡存性爲末熱酢調傅神效（初虞世方）

顛撲筋斷骨折用糯米一升皂角切碎半升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢爲末用好酒調膏厚紙攤貼患處神效

顛撲骨損酢搗肥皂爛厚罨之以帛縛之閃傷酢糟平胃散相和罨之

接骨用五銖錢酢焠一兩二錢黑鷄骨三兩研細匀每服病在下四錢疎服食前病在上二錢半頻服食後一方有乳香沒藥

必效酒治金瘡中風角弓反張者用蒜四破去心頂一升以無灰酒四升煑蒜令極爛并滓每服五合頓服之須臾得汗則瘥

破傷風如神用人家糞堆內蠐螬蟲一枚爛草房上亦有之捏住其脊待其蟲口中吐水就抹在瘡口上覺痲即汗出立愈後試之果然其蟲仍埋故處勿傷其命（嬰童百問）

豆淋酒治金瘡中風反强者大豆六合鷄矢白一合

右炒令大豆焦黑次入鷄矢白同炒乘熱瀉於三升酒中密蓋良久濾去滓每服五合如人行五里更一服汗出佳未瘥即更作服之汗出爲度服後宜喫熱生薑粥投之

金瘡內爛生蛆者以皂礬飛過乾貼其中即死

鍼刺入肉車脂攤紙上如錢大貼上二日一易三五次即出（集元方）

竹木入肉針撥不盡者以人齒垢封之即不爛也屢試屢驗（葉氏通變要法）

人咬傷瘡龜板骨鼈肚骨各一片燒研傅之（摘元方）

人咬手指瓶盛熱尿浸一夜即愈（通變要法）

鍼灸

素問云人有所墜墮惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痏見血則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方

靈樞經云有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下積於脅下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取於腧者有所擊

墮惡血在內若肉傷痛未已可側刺不可遠取之也身有所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢懈惰不收名曰體惰取小腹臍下三結交者陽明太陰也臍下三寸關元也

醫案

元史曰布智兒從元太祖征回回身中數矢血流滿體太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血內移時遂甦

李挺從伯顏征郢州砲傷左脅矢貫於胷幾絕伯顏命剖水牛腹內其中良久甦

本事方曰宣和中有一國醫忽承官快行押就一佛刹醫內人醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良久有二三老內人至下轎環而泣

之方得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死醫者云打撲損傷自屬外科欲申明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥囊中有蘇合香丸急取半兩於火上焙去腦麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥

崔給事頃在澤潞與李抱眞作判官李相方以毬杖按毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相拇指幷爪甲劈裂遽索金刀藥裹之强坐頻索酒飲至數杯已過量而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入溏灰火煨熱剝皮擘開其間有涕取罨損傷處仍多煨葱續續取熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用熱葱幷涕裹纏遂畢席笑語

儒門事親曰戴人出遊道經故息城見一男子被杖瘡痛焮發毒氣入裏驚涎堵塞牙噤不開粥藥不下月餘百治無功甘分於死戴人先以三聖散吐青蒼驚涎約半大缶次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大缶復煎通聖散數錢熱服之更以酸辛葱酢湯

發其汗斯須吐瀉交出其人活矣此法可以救免

薛己醫按曰一人患跌撲損傷兩脅脹悶欲欬不欬口覺血腥徧身臂腿脹痛倦怠不食煩渴脉大此血脫煩躁也與童便酒及砭患處出死血糜肉甚多忽發熱煩躁汗出投以獨參湯三劑少止又用補氣血清肝火之藥數劑飲食稍進後用獨參湯間服諸證悉退飲食頓加但不能多寐以歸脾湯加山梔竹茹四劑而熟睡因勞心遂煩渴自汗脉大無力以當歸補血湯二劑而安又以十全大補去川芎加麥門五味牡丹地骨麻黃根炒浮麥數劑而汗止死肉且潰又二十餘劑而新肉生

一人杖瘡傷處焮散唯腫痛不消余曰此瘀血在內宜急砭之不從余以蘿蔔自然汁調山梔末敷之破處以當歸膏貼之更服活血之劑而瘥數年之後但過天陰仍作痒痛始知不砭之失

一患者臂腿黑腫而皮不破但脹痛重墜皆以爲內無瘀血惟數凉藥可以止痛余診其尺脉濇而結此因體肥肉厚瘀血畜深刺去即愈否則內潰有爛筋

傷骨之患余入針四寸出黑血數升腫痛遂止是日發熱惡寒煩渴頭痛此氣血俱虛而然也以十全大補之劑遂瘥

一患者杖後服四物紅花桃仁大黃等劑以逐瘀血腹反痛更服一劑痛益甚按其腹不痛余曰此血虛也故喜按而不痛宜溫補之劑遂以歸身白朮參芪炙草二劑痛卽止

一患者瘀血已去飲食少思死肉不潰又用托裏之藥膿稍潰而清此血氣虛也非大補不可彼不從余强用大補之劑飲食進而死肉潰但少寐以歸脾湯加山梔二劑而寐因勞心煩躁作渴脉浮洪大以當歸補血湯二劑而安

一患者受刑太重外皮傷破瘀血如注內肉糜爛黯腫上干胷背下至足指昏憒不食隨以黑羊皮熱貼患處灌以童便酒薄粥更以清肝活血調氣健脾之劑神思稍蘇始言遍身强痛又用大劑養血補氣之藥腫消食進時仲冬瘀血凝結不能潰膿又用大補之劑壯其陽氣其膿方熟遂砭去洞見其骨塗以當

歸膏及服前藥百餘劑肌肉漸生

一患者瘀血雖去飲食形氣如故但熱渴焮痛膈痞有痰以小柴胡湯加天花粉貝母桔梗山梔二劑少愈又加生地歸尾黃芩柴胡山梔花粉而愈余治百餘人其杖後血氣不虛者唯此一人耳治者審之

一患者服行氣之劑胷痞氣促食少體倦色黯膿清此形氣俱虛之證也先用六君桔梗二劑胷膈氣和後用補中益氣去升麻加茯苓半夏五味麥門治之元氣漸復而愈若用前劑戕賊元氣多致不救

一患者去其患處瘀血用四物柴胡紅花治之焮痛頓止但寒熱口乾飲食少思用四物白朮茯苓柴胡黃芩花粉四劑寒熱卽退用六君芎歸藿香而飲食進腐肉雖潰膿水清稀以前藥倍用參芪歸朮茯苓二十餘劑腐肉俱潰膿水漸稠悞服下藥一鍾連瀉四次患處色黯喜其脉不洪數乃以十全大補倍加肉桂麥冬五味數劑肉色紅活新肉漸生喜在壯年易於調理又月餘而愈否則不救凡杖瘡跌撲之證患處如有瘀血止宜砭去服壯元氣之劑蓋其氣血

已損切不可再用行氣下血之藥復損脾胃則運氣愈難營達於下而反爲敗證怯弱者多致夭枉

一患者腫痛敷寒凉之藥欲內消瘀血反致臂腿俱冷瘀血併凝胷腹痞悶余急去所敷之藥以熱童便酒洗患處服六君木香當歸敷回陽膏臂腿漸溫又以前藥去木香加川芎藿香肉桂四劑瘀血解乃刺之更以壯脾胃養氣血得痊蓋氣血得熱則行寒則凝寒極生熱變化爲膿腐潰深大血氣旣敗肌肉無由而生欲望其生難矣

有一患者腹脹喘促作渴寒熱臂腿糜爛與死血相和如皮囊盛糊用童便煎四物桃仁紅花柴胡黃芩麥門花粉服之頓退彼用黑羊皮貼之益甚後砭去膿血甚多氣息奄奄脣口微動牙關緊急患處色黯或欲用破傷風藥余曰此氣血虛而變證也用參芪芎歸白朮幷獨參湯人乳汁元氣復而諸證愈仍用十全大補湯調理而安此證若膿瘀內焮者宜針之若潰後口噤遺尿而類破傷風等證者乃氣血虛極也急用大補之劑若素多痰患風證者宜清痰降火

若因怒而見風證者宜清肝降火若人不愼房勞而忽患前證此由腎水不足心火熾甚宜滋陰補氣血爲主若誤作風證治之卽死

一患者中秋夜歸墜馬腹內作痛飲酒數盃翊早大便自下瘀血卽安此元氣充實挾酒勢而行散也

一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此因元氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦并患金瘡者俱不宜食此

一男子孟秋墜梯腹停瘀血用大黃等藥其血不下反加胷膈脹痛喘促短氣余用肉桂木香末各二錢熱酒調服卽下黑血及前所服之藥而蘇此因寒藥凝滯而不行故用辛溫之劑散之

陳侍御墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胷腹脹痛按之卽止唯倦怠少氣診其脈微細而濇余曰非瘀血也乃痛傷氣血復因藥損脾氣而然耳投養脾胃生氣血之藥而愈

吳給事墜馬傷手出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕或

欲投破傷風藥余曰此血虛火動所致當峻補其血爲善遂用聖愈湯二劑即安又養氣血而瘡痊

張進士季秋墜馬亡血過多出汗煩躁翊日其汗自止熱躁益甚口噤手顫此陰血虛陽火乘之而汗出爲寒氣收斂腠理故汗不得出火不得泄怫鬱內甚而益增他證也余用四物加柴胡黃芩山梔四劑少止又用四物參芪軟柴胡五味麥門治之而痊

一婦人孟冬傷足亡血頭汗內熱作渴短氣煩躁不時昏憒其脈洪大按之微弱此陰血虛於下孤陽炎於上故發厥而頭出汗也以四物合小柴胡湯一劑汗止以四物去川芎加參芪麥門五味炙草少用肉桂四劑諸證悉去又三十餘劑血氣復而愈

鄭吏部素有濕痰孟冬墜馬服辛熱破血之藥遍身作痛發熱口乾脈大而滑此熱劑激動痰火爲患耳治以青燥湯去人參當歸黃芪加黃芩山梔半夏黃蘗熱痛頓去患處少愈更用二陳羌活桔梗蒼朮黃蘗薑製生地當歸遂痊

楊司天骨已入曰患處仍痛服藥不應肝脈洪大而

急余曰此肝火盛而作痛也用小柴胡湯加山梔黃連二劑痛止用四物山梔黃蘗知母調理而康

少宗伯劉五淸臁傷一塊微痛少食用六君子湯倍加當歸黃芪其痛漸止月餘瘀血內涸而不潰公以爲痊余曰此陽氣虛極須用調補不從至來春頭運痰涎壅塞服淸氣化痰病勢愈盛脉洪大而微細欲以參芪歸朮附子之類補之不信至秋初因怒昏憒而厥

窻友王汝道環跳穴處閃傷瘀血腫痛發熱作渴遂砭去瘀血知其下焦素有虛火用八珍加黃蘗知母牛膝骨碎補四劑頓止用十全大補湯少加黃蘗知母五味三十餘劑而斂

一小兒臂骨出臼接入腫痛發熱服流氣等藥益甚飲食少思余以葱熨之其痛卽止以六君黃芪柴胡桔梗續斷骨碎補治之飲食進而腫痛消又用補中益氣加麥門五味治之氣血和而熱退愈矣

戴給事墜馬腿腫痛而色黯食少倦怠此元氣虛弱不能運散瘀血而然耳遂用補中益氣去升麻柴胡

加木瓜茯苓芍藥白朮治之而痊

州守陳克明子閃右臂腕腫痛肉色不變久服流氣等藥加寒熱少食舌乾作渴余曰傷損等證腫不消色不變此氣血虛而不能愈當助脾胃壯氣血爲主遂從余法治之不二月形氣漸充半載諸證悉退體如常

梁閣老姪跌傷腿外敷大黃等藥內服破血之劑遂致內潰余針出穢膿三碗許虛證悉具用大補之劑兩月餘少能步履因勞心手撒眼開汗出如水或欲用祛風之劑余曰此氣血尚未充足也急以艾炒熱頻熨肚臍并氣海穴處以人參四兩炮附子五錢煎灌良久臂少動又灌一劑眼開能言但氣不能接續乃以參芪歸朮四味共一斤附子五錢水煎徐徐服之元氣漸復飲食已進乃去附子服之而瘥愈

一女子年十七閃右臂微腫作痛寅申時發熱余決其膽經血虛火盛經水果先期而至先以四物合小柴胡湯四劑熱退更以加味四物湯加香附地骨皮山梔各五分芩連炙草各三分二十餘劑其腫亦消

乃去黃連山梔又五十餘劑經水調而元氣充矣

儒者王淸之跌腰作痛用定痛等藥不愈氣血日衰面耳黧色余曰腰爲腎之腑雖曰閃傷實腎經虛弱所致遂用杜仲補骨脂五味山茰茯苓山藥空心服又以六君當歸白朮神麴各二錢食遠服不日而瘥

一三歲兒閃腰作痛服流氣等藥半載不愈余曰此稟腎氣不足不治之證也後果歿

雲間曹子容爲室人中風灌藥誤咬去指半節焮痛寒熱外敷大黃等藥內服淸熱敗毒患處不痛不潰

膿淸寒熱愈甚余曰此因凉藥遏絕隧道而然也遂敷玉龍膏以散寒氣更服六君子湯以壯脾胃數日後患處微痛腫處漸消此陽氣運達患處也果出稠膿不數日半指潰脫更服托裏藥而斂

上舍王天爵傷足焮腫內熱作渴外敷內服皆寒凉敗毒患處益腫而不潰且惡寒少食欲作嘔吐余曰此氣血俱虛又因寒藥凝結隧道損傷胃氣以致前證耳遂用香砂六君子芎歸炮薑外證悉退唯體倦晡熱飲食不甘以補中益氣湯加地骨皮五味麥門

治之而愈

外科蟲獸傷門

唐孫思邈千金方

總論

凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫毒治亦難瘥愼之愼之

狂犬

凡春末夏初犬多發狂必誡小弱持杖以預防防而不免者莫出於灸百日之中一日不闕者方得免難若初見瘡瘥痛定卽言平復者此最可畏大禍卽至

死在旦夕凡狂犬咬人著訖卽令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下卽覺心中醒然惺惺了了方知咬已卽狂是以深須知此此病至重世皆輕之不以爲意坐是死者常年有之吾初學醫未以爲業有人遭此將以見問吾了不知報答以是經吾手而死者不一自此銳意學之覺解已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將來學者非止此法餘醫方皆須沉思留心作意慇懃學之乃得通曉莫以初解一兩種法卽謂知訖極自誤也

凡猘犬咬人七日輒應一發三七日不發則脫也要過百日乃得免耳每到七日輒當擣韭汁飲一二升又當終身禁食犬肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

蠷螋

凡蠷螋尿人影著處便令人病瘡其狀身中忽有處痛如芒刺亦如刺蟲所螫後起細痦癗作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉

身惡寒壯熱劇者初起竟腰胷脅腫治之法初得之磨犀角汁塗上止其毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠼螋形以刀子細細畫蠼螋腹中取土就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由

射工

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲外臺云正黑狀如大飛生有一長角在口前如弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢因水勢以射人人或聞其在水中鉍鉍作聲須要得水沒其口便射人其蟲畏鵝鵝能食之其初始證候先惡寒噤瘆寒熱筋急仍似傷寒亦如中尸便不能語朝日小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是其證始得三四日當急治之治之稍遲者七日皆死初未有瘡但惡寒噤瘆及成瘡似蠼螋尿亦似瘭疽瘡射工中瘡有三種其一種瘡正黑如黛子皮周邊悉赤或衣犯之如有芒刺痛其一種作瘡久久穿或晡間寒熱其一種如火灼熛起似此

者最急數日殺人

凡山水有毒蟲人涉水中人如射工而無物診法初得之惡寒微似頭痛目眶痛心中煩懊四肢振焮腰背百節背強兩膝痛或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷二三日腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食人五臟熱盛毒煩下利不禁八九日雖良醫不能治矣覺得之急早視其下部若有瘡正赤如截肉者爲陽毒最急若瘡如鯉魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水與非者當作五六升湯以小蒜五升㕮咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治之

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名射工其蟲無目而利耳能聽在山源谿水中聞人聲便以口中毒射人故謂射工也其蟲小毒輕者及相逐者射著人影者皆不卽作瘡先病寒熱身不喜冷體彊筋急頭痛目疼張口噓欠欬嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒

晡夕輒復寒熱或以傷寒發石散動亦如中尸便不能語病候如此自非其土地人不常數行山水中不知其證便謂是傷寒發石散動作治乖僻毒盛發瘡復疑是瘭疽乃至吐下去血復恐疑蠱毒是以致禍耳令說其狀類以明其證與傷寒別也

明戴思恭證治要訣

惡蟲蛇傷

爲惡蟲蛇所傷用白芷細嚼傅患處仍以酒調芷末服蜈蚣傷用雞屎塗蛸傷用蕨萁芒燒灰香油調傅犬傷用虎骨末傅猫傷用薄荷指蜂蠆傷用人參嚼而傅之或用諸蟹殼燒存性研末蜜調傅凡諸惡物傷急於傷處灼艾數壯亦佳

薛己醫按

誤吞水蛭

治誤吞水蛭食蜜卽愈試以活蛭投蜜中卽化爲水屢驗一書云井中生蛭以白馬骨投之卽無試之亦驗夫蛭卽螞蝗也雖死爲末見水復活人吞之爲害不小治以前法無不愈者

蛇入七竅

凡蛇入七竅劈開蛇尾納川椒數粒以紙封之其蛇自出更煎人參湯飲之或飲酒食蒜以攻內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜杵爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒蟲傷並效

王肯堂證治準繩

毛蟲證治

春夏月樹下壇塹間有一等雜色毛蟲極毒凡人觸著者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不效用好豆豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傅痛痒處經一時久豉氣透骨則引出蟲毛紛紛可見取下豆豉埋在土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸即鰞鰂魚骨爲末傅之愈

治刺蝥傷無如甘草妙口內細嚼傅之即時愈今蘇州虎丘山下民家皆以種植樹木爲牛周十里內無蝥乃時用甘草汁灑樹故也

石室祕錄　臣陳士鐸著

蟲獸治法

世人被虎咬傷血必大出其傷口立時潰爛其疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨化隨易連用地榆一斤爲細末加入三七根末三兩苦參末四兩和勻摻之隨濕隨摻血即止而痛即定葢地榆涼血苦參止痛三七根末止血合三者之長故奏功實神

方

雄黃消毒膏（寶鑑）

治蠍螫不可忍

雄黃　信各半兩　巴豆三錢　白礬生一兩

右爲細末黃蠟半兩鎔開入藥攪勻爲錠子如棗子大用時將錠子簽於燈焰上炙開滴於螫著處其痛立止

一上散

治蠍螫痛

半夏一字生用爲細末　雄黃一字另研細

巴豆一个去皮如泥

右三味同研和勻上之

聖惠方

治蛇咬蠍螫蟲咬妙

雄黃三錢　信一錢　皂子　巴豆各四十九粒

耳塞　麝香各少許

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗爲細末在杏子核內封之鍼挑出上痛處大有神效

又方

治毒蛇所傷

細莘　香白芷各五錢　雄黃二錢

右爲末加麝香少許每服二錢溫酒調服效

又方

治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青　小青　青木香　烏桕葉　火炊草

山蕨肌　過山龍　地蜈蚣　天門冬　白芍藥

香薷

右細末用白木香研細生白酒調服查罨咬處累效

蟬花散

治夏月犬傷及諸般損傷蛆蟲極盛臭惡不可近者

蛇退皮一兩燒存性　蟬殼　青黛各半兩

細辛二錢五分

右爲細末每服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如犬咬傷用酵子和喫蛆皆化爲水蠅子不敢再落又以寒水石末乾摻上

定風散

治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發大有神效

生天南星　防風各等分

右爲細末乾上更不再發無膿效不可具述

扶危散

治狂犬傷出毒法

防風五錢　盤蝥一錢　麝香二分　雄黃二錢

大黃　黑牽牛頭末各三錢

右爲末每二錢滾水調服惡物從小便而出又生麻油研豆豉爲膏丸如彈子大常揩拭所咬處却掐開看豉丸內若有狗毛茸茸然此毒氣已出掐至無茸毛方爲痊可

扶危散

治風狗咬

盤蝥七日內用七箇七日外每日加一箇十日十箇百日百箇去翅足與糯米同炒　滑石一兩

雄黃一錢　麝香一字

右爲末溫酒調服不飲酒者米飲下毒從大小便出卽愈

五神散

搽一切瘴毒蛇傷蠍螫大效

金線釣壺盧　紫河車各二錢　續隨子去殼

雄黃各一錢　麝香少許

右末酢調塗患處蛇傷以刀割去損肉以末乾搽或以唾調搽或加騎蛇獅子根葉同煎搗用亦妙

又方

治前證

水苦蕒　槐枝葉　柳枝葉　嫩柏葉　小青葉

連叉大青

右煎水浸洗

又方

治射工中人三種瘡

升麻二兩　烏扇根三兩

右二味㕮咀以水三升煑取一升適寒溫盡服滓薄上

五香散

治江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡

甲香　犀角　鼈甲　升麻　薰陸香　烏翣

丁香　沉香　黃連　青木香　羚羊角　黃芩

甘草　牡蠣各四分　吳茱萸三分　黃蘗六分

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸匕日二升以水和少許洗之仍以雞子白和塗腫上乾則易

野葛膏

治射工惡核卒中惡毒

野葛一升　巴豆　烏頭　蜀椒各五合　茵芋

躑躅　附子　丹砂各一兩　雄黃　大黃各七兩

右十味治下篩以不中水猪膏三斤煎三上三下去查內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合名膏皆無令產婦女人小兒雞犬六畜見之唯宜潔淨

又方

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者

吳茱萸一升　生薑切一升半　犀角　升麻

橘皮各二兩　烏梅十四枚

右六味㕮咀以水七升煑取二升分二服

又方

治猫兒眼見猫狸及耳雜有所聞

相思子　蓖麻子　巴豆各七枚　硃砂末二銖

蠟四銖

右五味合搗爲丸先取麻子許大含之即以灰圍

患人前頭著一斗灰火吐藥火中沸即盡火上作十字其猫鬼並皆死矣

又方

入山澤辟衆蛇

乾薑　麝香　雄黃各等分

右三味搗爲粗散以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗瘡集驗方云如無麝香以射罔和代之救急方云以蜜和爲膏傅螫處良

單方

解狼傷毒鹽汁飲之（千金）

虎狼傷瘡月經衣燒末酒服方寸匕日三（藏器）

又方水化沙糖一椀服幷塗之（摘元方）

熊虎傷毒生鐵煑令有味洗之（肘後方下同）

虎犬傷人礬末納入裹之止痛尤妙

又方地榆煑汁飲幷爲末傅之亦可爲末白湯服日三忌酒（梅師方下同）

虎傷人瘡生葛煑濃汁洗之仍搗末水服方寸匕日

夜五六服

又方但飲酒常令大醉當吐毛出

又方先喫清油一盌仍以油淋洗瘡口（濟急方）

又方內服生薑汁外以汁洗之用白礬末傅上（祕覽方）

虎狼傷人乾薑末傅之

虎爪傷人刺蝟脂日日傅之內服香油

熊羆傷人蒴藋一大把以水一升漬須臾取汁飲以滓封之（備急方）

虎傷人瘡蠐螬搗爛塗之日上（經驗方）

馬咬成瘡腫痛用鷄冠血塗之駁馬用牝鷄牡馬用雄鷄（肘後方）

又方益母草切細和酢炒塗之（千金）

又方馬齒莧煑食之

又方獨顆栗子燒研傅之熊虎爪傷亦同（醫說）

馬咬踏瘡腫痛作熱鼠屎二七枚故馬鞘五寸和燒研末猪脂調敷之（梅師方）

猪咬成瘡龜版燒研香油調搽之（摘元方）

又方松脂鍊作餅貼之（千金）

虎犬咬人杵薤取汁飲一升日三瘥傅傷處（本草下同）

虎狼傷人生雞肉食之又生葛汁飲之又洗瘡又婦人月經赤衣燒爲灰和酒服

牛觸腸出不損者急送入以桑白皮尖或生白麻爲線縫合肚皮縫上摻血竭末或百草霜末血止立活或封罨恐內作膿（入門下同）

脅破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參地骨皮湯淋之皮自合喫羊肉羹十日愈

凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者卽是狂犬若被其傷乃九死一生之患急用鍼刺去血以人小便洗淨用核桃殼半邊以人糞塡滿掩其瘡上著艾灸之殼焦糞乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸至三五百壯爲佳（千金）

又方先口噙漿水洗淨或以熱人尿淋咬處嚼生薑擦之又用葱白嚼爛塗之又杏仁嚼碎傅之以帛繫定或同馬藺根研細葱湯洗後塗之尤妙（綱目）

又方於患人頂心中有一紅髮卽當拔之後服藥快效（十三方）

犬咬人久不差口吐白沫者爲大毒入心叫喚似犬聲天靈蓋燒灰東流水調服一錢（本草）

狗咬傷瘡爛嚼杏仁塗之（寇氏）

又方白果仁嚼細塗之

猘犬傷毒烏梅末酒服二錢（千金）

又方桃白皮一把水二升煎一升服（梅師方）

犬咬出血以井華水洗至血止綿裹之

猘犬咬取牀腳下土和水傅之灸七壯

犬咬傷取蚯蚓泥以鹽研傅之狂犬傷出犬毛神效

又方苦酒和竈灰傅之或熱湯和之（千金）

猘犬咬傷每日食蝦蟆膾絕良亦可燒炙食之勿令本人知之自後再不發也（肘後方）

又方用蝦蟇後足搗爛水調服之先於頂心拔去血髮三兩根則小便內見沫也（袖珍方）

又方故梳韭根各二枚水二升煑一升頓服（外臺）

又方雄黃五錢麝香二錢爲末酒下作二服（救急良方）

又方膽礬末傅之立止（濟急方）

又方人參置桑柴炭上燒存性以盌覆定少頃爲末

摻之立瘥也（經驗）

風狗虵虺咬傷紫蘇葉嚼敷之（千金）

猘犬咬傷地黃搗汁飲幷塗之百度愈

惡犬咬傷蓼葉搗泥敷之（肘後方）

狗咬昏悶浸椒水調莽草末傅之（便民圖纂）

惡犬咬傷莨菪子七枚吞之日三服（千金）

又方莨菪根和鹽搗傅日三上（外臺）

猘犬咬傷七日一發三七日不發乃脫也急於無風處以冷水洗淨卽服韭汁一盌隔七日又一盌四十九日共服七盌須百日忌食酸鹹一年忌食魚腥終身忌食狗肉方得保全否則十有九死（簡便方）

又方瓦松雄黃研貼卽不發（生生編）

又方鼠屎二升燒末傅之（梅師方）

猫咬成瘡雄鼠屎燒灰油和傅之曾經效驗（壽域）

犬咬傷瘡重發者用蔓菁根搗汁服之佳（肘後方）

猘犬傷人乾薑末水服二匕生薑汁服亦良幷以薑炙熱熨之

惡犬咬傷虎骨刮末水服方寸匕幷傅之（小品方）

又方野菊研細酒調服盡醉止效（綱目下同）

又方蓖麻子五十粒去殼研爲膏傅之

又方左蟠龍卽人屎也厚封之數日卽愈（經驗方）

猘犬咬傷蝟皮頭髮等分燒灰水服（外臺）

又方蚺蛇脯爲末水服五分日三服無蚺蛇他蛇亦可又方自死蛇一枚燒焦爲末納入瘡孔中（千金方）

又方紅娘子二箇盤蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五十歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲加一箇五十歲加二箇海馬半箇續隨子一分乳香沉香桔梗各半分酥油少許爲末十歲者作四服十五歲作三服二十歲作二服三十歲作一服極良（談野翁方）

又方頭垢蝟皮等分燒灰水服一匕口噤灌之（千金下同）

犬咬瘡重發頭垢少許納瘡中用熱牛屎封之

又方以蠟炙鎔灌入瘡中（葛氏方）

風狗咬傷乃九死一生之病急用盤蝥七箇以糯米炒黃去米爲末酒一盞煎半盞空心溫服取下小肉狗三四十枚爲盡如數少數日再服七次無狗形永

不再發也累試累驗（易簡方）

又方大螌蝥三七枚去頭翅足用糯米一勺略炒過去螌蝥別以七枚如前炒色變復去之別以七枚如前至青煙爲度去蝥只以米爲粉用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以小便利下毒物爲度如不利再進利後肚疼急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黃連水亦可解之但不宜服一切熱物也（大成）

狐尿刺瘡烏驢尿頓熱漬之（千金）

又方治腫痛欲死者桑灰汁漬之冷即易（肘後方）

又方杏仁研爛煑一兩沸及熱浸之冷即易（必效方）

爲猫所傷取薄荷葉細嚼傅之

又方虎骨虎毛燒爲末塗之

虵入七孔割母猪尾血滴入即出也（千金）

毒虵咬螫以閉口椒及葉搗封之良（肘後方）

因熱取臥地下有虵入口不得出者用刀破虵尾納生椒二三粒裹定須臾即自退出也（聖惠）

虵螫血出九竅皆有者取蝱蟲初食牛馬血腹滿者

三七枚燒研湯服（肘後方）

蛇咬毒瘡用吳茱萸一兩爲末冷水和作三服立安（勝金方）

蝮蛇螫傷生蝦蟆一枚擣爛敷之（外臺）

又方蜈蚣燒末傅之

蛇骨刺人痛甚用死鼠燒傅（肘後方下同）

蛇骨刺人毒痛鐵精粉豆許吹入瘡內

蛇咬毒入腹取兩刃於水中相摩飲其汁

又方新地榆根擣汁飲兼以漬瘡

壁鏡毒人必死白礬塗之（太平廣記）

蟲蛇獸毒及蠱毒生明礬明雄黃等分於端午日爲末黃蠟和丸梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熟水送下（東坡良方）

蛇咬蠍螫燒刀矛頭令赤置白礬於上汁出熱滴之立瘥此神驗方也（傳信方）

毒蛇傷螫嚼鹽塗之灸三壯仍嚼鹽塗之（徐伯玉方）

毒蛇射工沙蝨等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹白礬甘草等分爲末冷水服二錢（瑞竹堂方）

蟲虺螫人凡蜈蚣蛇蠍毒蟲傷以五靈脂末塗之立愈（金匱鉤元）

又方急以小便洗去血隨取口中唾頻塗之極效（摘要）

又方取蛇茵草根葉搗敷咬處當下黃水

虎咬蛇傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之（集簡方）

蜘蛛蛇蠍咬傷縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩至醉良久酒化爲水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚妙（直指方）

一切毒氣虎狼蛇虺所傷溪毒野蟲惡刺等毒草犀燒研服之臨死者亦得活

毒蛇傷螫野鼠屎水調塗之（經驗方）

蛇傷手腫用新剝羊肚一箇帶糞割一口將手入浸卽時痛止腫消（集要）

又方生蠶蛾研傅之（必效方）

又方青木香不拘多少煎水服效不可述（袖珍方）

又方青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以查傅之毒從竅中出以柤棄水中卽不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅傅藥方（摘元）

又方小青一握細研入香白芷半兩酒調服手按患處俟黃水出爲效一方用小青大青牛膝葉同搗汁和酒服以柤傅之

毒蛇溪毒沙蝨射工等傷口噤眼黑手足强直毒攻腹內成塊逡巡不救蒼耳嫩苗一握取汁和酒溫灌之以柤厚傅傷處（勝金方）

蛇傷搗水蓼莖葉傅之蛇毒入腹心悶絞汁服之（唐本）

又方用海根以酒及水磨服并傅之

蛇蠍螫傷葵菜搗汁服之（千金）

惡蛇咬傷地菘搗傅之（易簡方）

又方菰蔣草根燒灰傅之（外臺）

毒蛇螫傷牙入肉中疼不可堪者勿令人知私以荇葉覆其上以物包之一時折牙自出也（肘後方）

蛇虺螫傷酢草搗傅

又方梳垢一團尿和傅上仍炙梳出汗熨之（千金）

蛇咬傷瘡生堇杵汁塗之（畢萬術）

蛇蠍螫人射茵傅之頻易血出愈并治沙蝨毒（梅師方）

蠍蠆螫人半夏末水調塗之立止（箧中方）

蛇咬腫悶欲死用重臺六分續隨子仁七粒搗篩爲散酒服方寸匕唾和少許塗咬處立效（海上方下同）

又方獨莖狼子根或葉搗爛臘豬脂和塗立瘥

蛇咬久潰成瘡小茴香搗末傳之（千金）

又方暖酒淋洗瘡上日三次蜘蛛毒蜂螫傷同之

毒蛇螫傷急飲好清油一二盞解毒然後用藥（濟急良方）

又方清酢急飲一二盌令毒氣不散然後用藥

又方豆葉搗傳頻易取瘥（廣利方）

又方乾薑雄黃等分爲末袋盛佩之遇螫傳之便定

又方薑末傳之乾卽易（千金下同）

又方胡荽苗合口椒等分搗塗之

又方以竹筒合瘡上鎔蠟灌之效（徐玉方）

又方卽時嚼蒜封之六七易仍以蒜一升去皮以乳二升煑熟空心頓服明日又進外以去皮蒜一升搗細小便一升煑三四沸浸損處一方用獨蒜酸草搗絞傳咬處

又方紫莧搗汁飲一升以查塗之（集驗方）

蛇犬咬傷以熱尿淋患處良（日華）

蛇纏人足就令尿之便解（肘後方）

諸蛇傷毒桂心苦蔞等分爲末竹筒密塞遇毒蛇傷卽傅之塞不密則不中用也

蝮蛇傷人令婦人尿於瘡上良（千金下同）

又方楮葉麻葉合搗取汁漬之

又方先以小便洗去血次以牙垽封而護之甚妙且不痛腫（醫方摘要）

又方以口含男子陰毛二十條嚥汁令毒不入腹

又方櫻桃葉絞汁服滓傅傷處

蛇繞不解熱湯淋之卽脫（千金下同）

蛇咬瘡用猪槽中水浸之效

諸蛇螫傷胡粉和大蒜搗塗

毒蛇尿草木著人似刺劄便腫痛肉爛若著手足指節墮落研砒霜和膠清塗之（本草下同）

蛇骨刺人毒腫痛燒死鼠爲末傅之

蜈蚣入腹猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出

蜈蚣咬傷胡椒嚼封之卽不痛（多能鄙事）

又方鷄冠血塗之（篋中方）

中蜈蚣毒舌脹出口是也雄雞冠血浸舌并咽之（青囊雜纂）

蜈蚣傷螫麻鞋底炙熱揩之即安（外臺）

又方頭髮燒煙熏之

又方頭垢苦參末酒調傅之（篋中方下同）

又方酢磨生鐵傅之

又方嚼香附末塗之立效（袖珍方）

又方蛇含草挼傅之（錄驗）

又方取灰莧葉擦之即止（談野翁方）

又方嚼小蒜塗之良（肘後方）

又方獨頭蒜塗之即止

又方菜子油傾地上擦地上油塗之即好勿令四眼人見（積德堂方）

又方馬齒莧塗之

又方楝樹枝葉汁塗之良（簡便方）

又方白鯗皮貼之（集成）

蜈蚣蜂蠆蜘蛛螫咬嚼鹽塗之或鹽湯浸之（梅師方）

又方蜘蛛研汁塗之并以生者安咬處吸其毒（廣利方）

又方嚼人參塗之或以人參末傳之

蠍有雌雄雄者螫痛在一處井泥傳之雌者痛牽諸處取瓦屋溝下泥傳之無雨時以新水從屋上淋下泥用（本草下同）

又方冷水漬之即不痛水微暖復痛即易新水

又方半夏生一字雄黃一字巴豆一箇同研傳之（綱目）

又方白礬半夏爲末酢調貼之痛止毒出（得效）

又方驢耳中垢或猫屎塗之蜘蛛取汁傳之又地上磨生薑汁塗之又薄荷細嚼傳之又白礬鎔汁滴傷處（本草）

又方以木盌合螫處神驗不傳（錄驗）

又方川椒嚼細塗之微痲即止（摘要）

又方猫兒屎塗之三五次即瘥（心鏡）

又方水調硇砂塗之立愈（千金）

又方酢磨附子汁傳之（心鏡）

又方苦李仁嚼塗之良（錄驗）

桑蠍螫人丁香末蜜調塗

蜂蠆螫傷蟹殼燒存性研末蜜調塗之（時珍）

又方端午日午時收壁虎一條以雞膽開一竅盛之陰乾每以一星敷上卽止神效（青囊）

又方苦蕒汁塗之良（摘元方）

蜂蠍螫人小蒜搗汁服以滓傅之（肘後方）

又方薄荷香葉挼貼之（外臺）

又方野莧挼擦之

又方油木梳炙熱熨之（救急方）

蛇蟲蜂蠍猘犬毒箭等傷菩薩石爲末傅之

沙蜂叮螫朱砂末水塗之

蜂蠍蛇傷蠼螋尿瘡雞子一箇輕敲小孔合之立瘥（兵部手集）

毒蜂螫人嚼靑蒿封之卽安（肘後方）

又方淸油搽之妙

又方野芋梗擦之良汁可塗蜘蛛傷

九里蜂毒皂莢鑽孔貼叮處艾灸其上三五壯卽安

蜂蠆蟲蟻螫人頭垢封之

又方五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等分陰乾爲末水調塗之（肘後方）

又方人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈（壽域）

又方鵓鴿骨一錢白礬二分爲末㗜鼻在左壁者㗜左鼻在右壁者㗜右鼻（寶鑑）

又方牛角䚡燒灰酢和傳之（肘後方）

又方以水浸故布搨之暖即易（千金）

又方溫湯漬之數易至旦愈（華佗）

又方反手取地上黃土傳之或入酢調（千金）

凡蚯蚓及諸惡蟲咬瘡取百舌窠中土酢調傳之

蜂蠆諸蟲螫人及蜘蛛咬瘇痛取土蜂窠酢調塗之

又方用尿坑泥傳之

又方瓦摩其上唾二七遍置瓦於故處（千金下同）

又方牛屎燒灰苦酒和敷

又方酢調黃丹塗之（肘後下同）

又方人尿洗之

又方用酥塗之妙（聖惠）

鼠咬成瘡麝香封之妙（經驗）

又方猫頭燒灰油調敷之以瘥爲度（趙氏方）

又方猫毛燒灰入麝香少許唾和封之猫鬚亦可（急救）

（良方）

又方猫屎塗之即愈（壽域方）

蠶咬傷屋上爛草和酢汁研傳

又方苧汁飲之又塗之苧近蠶種則蠶不生（本草）

又方蜜調麝香傳之（廣利方）

諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煑茵草服之亦搗敷瘡上

螻蛄咬用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭乾納少許灰於瘡中

又方酢和石灰塗之（聖惠）

蚯蚓咬人其毒如大風眉鬚皆落以石灰水浸之良（經驗方）

又方濃煎鹽湯浸身數遍即愈浙西軍將張僧病此每夕蚯蚓鳴於體一僧用此方而安蚓畏鹽也（經驗方）

蚯蚓吹用老茶葉細末傳之

射工中人狀如傷寒寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莖搗汁飲一升日再服之（集驗方）

又方熊膽塗之更以雄黃酒磨服即愈（斗門方）

又方用芥菜子末和酒厚塗之半日痛即止（千金）

又方馬齒莧搗汁一升服滓傅之日四五次良（海上方）

又方鬼臼葉一把酢漬搗汁服一升日二次（千金下同）

又方射干升麻各二兩水三升煎一升溫服以滓傅瘡上

閩廣有溪毒中人似射工但無物初病惡寒發熱煩躁骨節強痛不急治生蟲食臟殺人用雄牛膝莖紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲日三服（肘後方下同）

又方知母連根葉搗作散服方可投水絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可煑湯浴之甚佳

中射菵毒大麻子汁飲之

又方蚯蚓屎末井水調服二方寸匕（千金）

又方猪血飲之即解（肘後方下同）

誤吞螞蝗取田中泥酒和一二升服之當利出

水毒中人以小蒜三升煑微熱大熱即無力以浴身若身發赤斑文書毋以他病治之也

射工溪毒用鷄矢白者二枚以餳和塗瘡上

又方鼠婦豆豉巴豆各三枚脂和塗之

又方用鸜鵒鳥近病人卽能唼人身訖以物承之當有沙出其沙卽含沙射人之箭也又可籠鳥近人令鳥氣相吸又取其屎燒灰水服

射工毒瘡大蜈蚣一枚炙研和酢傅之（千金下同）

又方狼牙冬取根夏取葉搗汁飲四五合幷傅之

沙蝨在水中人澡浴則著人身鑽入皮裏初得皮上正赤如小豆黍粟摩之痛如刺三日後寒熱發瘡毒若入骨殺人嶺南多此卽以茅葉刮去以苦菜汁塗之佳（肘後方下同）

又方萵苣菜搗汁塗之良

又方蟹螯二枚一枚末服一枚煉至烟盡研細末傅瘡中立瘥

蠼螋蟲如小蜈蚣色青黑長足隱於壁間以尿射人遍身生瘡出黃水甚於湯火傷遶身匝卽死烏雞翎燒灰鷄子淸調塗之（綱目）

又方取扁豆葉挼傅卽瘥（本草）

又方黎葉搗塗之乾卽易（篋中方）

又方槐白皮酢浸半日洗之（千金翼）

又方畫地作蠼螋形以刀細取腹中土唾和塗之再塗卽愈孫眞人子得此疾經五六日不愈或敎此法遂瘳乃知萬物相感莫曉其由也（千金下同）

又方酢和胡粉塗之

又方烏雞翅毛燒灰油調傳之蟲畏鷄故也（瑣碎錄）

又方大麥嚼傳之日三上（類要）

又方磨犀角汁塗之（千金）

又方鹿角燒末苦酒調服（外臺）

又方治瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿泡疼痛至甚者速以草茶幷蠟茶俱可以生油調傳藥至痛乃止（勝金方）

又方鹽湯浸緜搨瘡上（食療）

又方以蒺藜搗傳之無葉用子（備急方）

又方杵豉傳之良蟲刺螫人豉心嚼敷少頃見豉中有毛卽瘥不見再傳晝夜勿絕見毛爲度（外臺）

蠼螋咬瘡大黃末塗之（醫說）

蜘蛛咬瘡遍身皆有以葱一枚去尖頭將蚯蚓入葉中緊揑兩頭勿洩氣頻動搖卽化爲水以點咬處甚效（譚氏方）

又方雄黃末傅之（朝野僉載）

又方羊桃葉擣傅之立愈（備急方）

又方油麻研爛傅之（經驗後方）

又方香油和鹽摻之（普濟方）

又方炮薑切片貼之良（千金）

又方取久臭人溺於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服之不爾恐毒殺人（藏器）

又方牛乳飲之良（生生編）

又方用驢尿泥傅之

諸蟲毒傷青黛雄黃等分爲末新汲水調下二錢又外塗之（本草下同）

人被天蛇毒似癩而非癩天蛇卽草間黃花蜘蛛也人被其螫因爲露水所濡乃成此疾遂煎秦皮汁一升飲之瘥

蛇蠋蜘蛛咬生鷄卵輕敲一小孔合咬處立瘥

諸毒蟲傷大紙撚蘸香油燒火熏滅以烟熏之即愈（綱目）

花蜘蛛毒咬人與毒蛇無異蒼耳搗汁一盞服仍以查傅之（摘元方）

山中草木上有石蛭著人足則穿肌入肉中害人但以臘豬膏和鹽塗足脛趾即不著人也（千金）

南方多雨有物曰水蛭大類鼻涕生於古木之上聞人氣則閃閃而動人過其下墮人體間即立成瘡久則遍體惟以硃砂麝香塗之即愈（醫說）

人爲蝸牛蟲所咬毒遍身者蓼草汁浸之即瘥（本草）

百蟲入耳以兩刀於耳門上摩敲作聲自出

諸毒蟲傷青黛雄黃等分研末新汲水服二錢（錄驗）

蝸牛咬毒行遍身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰令弱也（藏器）

解黃蠅毒烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中嚙人初無知覺漸痒爲瘡勿搔但以冷水沃之擦鹽少許即不爲瘡（方輿勝覽）

惡蟲咬人紫草煎油塗之（聖惠方下同）

又方以酥油和血塗之

毛蟲毒方取蒲公英根莖白汁傅之立瘥

又方用鍋底黃土爲末以酸酢捏成團於痒痛處搓轉其毛皆出在土上痛痒立止神效無比

夏月有雜色毛蟲極毒觸人生瘡痒痛骨肉皆爛豉一椀清油半盞同搗厚傅傷處經一宿取見豉中有毛蟲埋土中棄之白芷湯洗後鯽魚骨末傅之即塗（綱目下同）

熏衣去蝨天茄葉鋪於席上次日蚤蝨盡死天茄即龍葵一名老鴉眼睛草

熏衣去蝨百部秦艽爲末入竹籠燒烟熏之蝨自落亦可煑湯洗衣（經驗方）

五月取浮萍陰乾燒烟去蚊（千金下同）

壁蝨蜈蚣蕎麥稭作餅燒烟熏之

辟除壁蝨以木瓜切片鋪於席下（臞仙）

陰蝨作痒陰毛際肉中生蟲如蝨或紅或白痒不可忍者白果仁嚼細頻擦之取效（劉長春方）

楝花焙末鋪席下殺蚤蝨

鍼灸

千金方曰凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者卽是狂犬若被其傷乃九死一生之患急用鍼刺去血以人小便洗淨用桃核殼半邊以人糞塡滿掩其瘡上著艾灸之殼焦糞乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸至三五百壯爲佳

被狂犬咬者只就咬牙跡上灸之一日三壯灸至一百二十日乃止常食韭菜永不再發

凡猘犬所嚙未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當

日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒及猪犬肉

凡衆蛇螫灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小爇之

丹溪心法曰凡蛇虺蜈蚣毒蛇咬傷於傷處灸五壯或七壯卽愈

養生方曰狂犬咬人當先鍼刺去惡血仍灸瘡中十壯自後日灸一壯至百日乃止忌飲酒常飲韭菜自然汁以滓封灸瘡永不再發

醫學綱目曰猘犬傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴三壯又灸所咬之處七壯立愈

治風狗咬用桃核殼半个將野地乾人糞塡滿以榆皮蓋定罨於傷處又用艾於桃核上灸十四壯卽愈永不再發或用野犬糞如前法灸之

又方艾灸傷處五七壯

本草綱目曰諸蟲蛇傷人艾灸患處數壯甚良

射工溪毒獨頭蒜切三分厚貼之上用艾灸令蒜氣射入卽瘥

被毒蛇螫卽貼蛇皮於螫處艾火灸其上引出毒氣

醫案

夷堅志曰毒蛇傷螫臨川有人被蝮蛇咬傷卽昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺臍中汩汩然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末搽之

徑山寺僧爲蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入膽礬麝香少許摻之惡水涌出日日如此一月平復

薛己醫按曰陳鎰居庸關人蠍螫手疼痛徹心頃刻焮痛至脅寒熱拘急頭痛惡心此邪正二氣相搏而然以飛龍奪命丹塗患處及服止痛之藥俱不應乃以隔蒜灸法灸之遂愈余母及余皆嘗被螫如前灸之痛卽止余母又嘗爲蜈蚣傷指亦用前法而愈凡蛇毒之類所傷依此療之並效本草謂蒜療瘡毒有回生之功信哉

一獵戶腿被狼咬痛甚治以乳香定痛散不應余思至陰之下氣血凝結藥力難達令隔蒜灸至五十餘壯疼痛悉去仍以托裏藥及膏藥貼之而愈

王生被鬬犬傷腿頃間焮痛至股翊日牙關緊急以玉眞散治之不應亦隔蒜灸三十餘壯而蘇仍以玉眞散及托裏消毒藥而愈

醫學綱目曰張薦昔在劍南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色粗細如筯繞項上從胷前至心經二宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千幷薦家財五百千募能療者忽一人應召云可治張相初不

甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一磁碗取蜘蛛投入藍汁良久方出甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂甦及以藥滓塗患處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不效驗

萬病回春曰一人夏月收麥被騾踼倒又咬傷二三處至五七日膿潰臭惡蛆蠅極盛藥不能救一道人見之傳以蟬花散方修合服之蛆皆化水而出蠅亦不敢近旬日良愈